





SS.S.H. 12

FRIDERICI HOFFMANNI

CONSILIARII REGIS BORUSSIÆ INTIMI.
ET ARCHIATRI,

PROFESSORIS MEDICINÆ PRIMARIJ IN ACADEMIA HALENSI,

OPERA OMNIA PHYSICO-MEDICA

Denuò revisa, correctæ & aucta,

IN SEX TOMOS DISTRIBUTÆ;
QUIBUS CONTINENTUR

DOCTRINÆ SOLIDIS PRINCIPIIS PHYSICO-MECHANICIS,
& anatomicis, atque etiam observationibus clinico-practicis superstructæ;

METHODO FACILI AC DEMONSTRATIVA DEDUCTÆ,
& per experientiam L.VII. annorum stabilitæ.

CUM VITA AUCTORIS.

Et ejus PRÆFATIONE de differente medicinæ & medicorum statu atque conditione,
& criteriis boni ac periti medici.

TOMUS TERTIUS.



GENEVÆ,
Ad D. de la Coll. de la Soc. de la Soc.
Apud FRATRES DE TOURNES.

M. DCCXLVIII.





CONSPECTUS TOMI TERTII.

MEDICINÆ RATIONALIS SYSTEMATICÆ

TOMI QUARTI PARS TERTIA.

De Morbis spasmodicis & convulsivis.

SECTIO PRIMA.

De Epilepsiâ.

CAPUT I. De Epilepsiâ.	Pag. 9
II. De motibus convulsivis.	24
III. De motibus spasmodicis vagis	34
IV. De Catalepsi, seu affectu cerebri spasmodico - ecstatico, vulgo cataleptico perquam raro.	44
V. De Malo Hysterico, sive affectu spasmodico-convulsivo ex uteri vitio.	50
VI. De malo Hypochondriaco, seu affectu spasmodico-flatulento.	64

SECTIO II.

De spasmis & Convulsionibus particularibus; speciatim de Palpitatione Cordis, Aithmate spasmodico & suffocativo, Tussi convulsivâ, singultu, spasmo & suffocatione Oesophagi, Vomitu, Cholera & Dysenteria, & de uteri Convulsione, abortu.

CAP. I. De Palpitatione Cordis.	83
II. De Asthmate convulsivo & spasmodico flatulento.	94
III. De Tussi rheumatico-convulsivâ.	109
IV. De singultu.	122
V. De morbis œsophagi & pharyngis spasmodicis.	130
VI. De vomitu, sive motu ventriculi convulsivo.	139
VII. De Dysenteria.	151
VIII. De Cholera & Diarrhœa biliosa.	165
IX. De convulsione uteri, sive abortu.	176

MEDICINÆ RATIONALIS SYSTEMATICÆ

TOMI QUARTI PARS QUARTA.

De Morbis ex viscerum labe partiumque solidarum atonia provenientiibus:

CAP. I. De nervorum resolutionibus.	Pag. 194
II. De affectibus soporosis, Comate, Caro, & Lethargo.	209
III. De	III. De

CONSPECTUS TOMI TERTII.

III.	<i>De vertigine.</i>	Pag. 219
IV.	<i>De guttâ serenâ.</i>	228
V.	<i>De visûs imbecillitate ex lippitudine & suffusione.</i>	233
VI.	<i>De auditûs vitius ex atoniâ.</i>	239
VII.	<i>De aphonîâ.</i>	247
VIII.	<i>De delirio melancholico & manico.</i>	251
IX.	<i>De virium lapsu & animi deliquis.</i>	267
X.	<i>De subita morte & morbis aliis insanabilibus, ex vitali sanguinis per polypos intercepto circuitu ortis prudenter præcavendis.</i>	277
XI.	<i>De affectione phthisicâ, sive tabe pulmonali.</i>	284
XII.	<i>De cachexiâ ictericâ.</i>	301
XIII.	<i>De cachexiâ & chlorosi.</i>	311
XIV.	<i>De hydropè.</i>	322
XV.	<i>De flatulentiâ ventriculî & intestinorum, & affectione tympanica.</i>	339
XVI.	<i>De cachexiâ uterinâ, sive fluore albo.</i>	348
XVII.	<i>De gonorrhœâ benignâ & virulentâ.</i>	357

MEDICINÆ RATIONALIS SYSTEMATICÆ

TOMI QUARTI PARS QUINTA.

De Morbis ac vitiis externas potissimum partes adfligentibus.

CAPUT I.	<i>De Scorbuto, ejusque verâ indole.</i>	369
II.	<i>De sphacelo à causâ potissimum internâ, ejusque curatione.</i>	387
III.	<i>De purpurâ præsertim chronicâ scorbuti sobole.</i>	397
IV.	<i>De lue ventrici.</i>	413
V.	<i>De pustulosis & pruriginosis varii generis adfectionibus cutis.</i>	426
VI.	<i>De omnis generis ulceribus, tam benignis quam malignis præsertim canerosis.</i>	443
VII.	<i>De circumspectâ ulcerum fistulosorum curatione.</i>	459


SUPPLEMENTUM MEDICINÆ RATIONALIS SYSTEMATICÆ NUNQUAM EDITUM.

De Morbis infantum præcipuis.

Præfatio.

CAPUT I.	<i>De morbis Infantum in genere.</i>	469
II.	<i>De regimine recens natorum & præservatione à morbis infantilibus.</i>	472
III.	<i>De pathematibus ex dentitione difficili.</i>	476
IV.	<i>De torminibus Infantum & flatulentis.</i>	478
V.	<i>De aphthis.</i>	480
VI.	<i>De variolis & morbillis.</i>	481
VII.	<i>De Epilepsiâ & Convulsionibus.</i>	484
VIII.	<i>De tabe seu atrophîâ infantum.</i>	485
IX.	<i>De Rachitide.</i>	488
X.	<i>De Vermibus.</i>	490
XI.	<i>De aliis infantum morbis.</i>	494

FRIDERICI
HOFFMANNI
MEDICINÆ
RATIONALIS SYSTEMATICÆ
TOMI QUARTI,
QUO
SPECIALIS MORBORUM PATHOLOGIA
& huic superstructa solida Therapia,
CUM MEDENDI METHODO,
CAUTELIS CLINICIS. ET MORBORUM
ENARRATIONIBUS, ADJUNCTA EPICRISI, EXHIBENTUR.
PARS TERTIA,
DOCTRINAM SPASMODICORUM ET CONVULSIVORUM
morborum perspicua & demonstrativa methodo tradens.



OMNIBUS ET SINGULIS
MEDENDI SCIENTIÆ DEDITIS
QUI
ARTEM HIPPOCRATICAM
EXPERIMENTO PERICULOSAM
ET JUDICIO DIFFICILEM
SECURA FACILI ET RATIONALI
CURANDI METHODO TRACTARE, ET CONTINUA
OBSERVATIONE AC SEDULA MEDITATIONE
ARTIS INCREMENTA
IN SALUTEM HUMANI GÉNÉRIS
PROMOVERE GESTIUNT,
HUNC TOMUM
DE LONGIS ET GRAVIBUS ADFFECTIBUS
QUI AGIT
SACRATUM ET DICATUM VOLUIT
AUCTOR.



P R Æ F A T I O.



EXHIBEO nunc candido & erudito Lectori tertium therapeutices to-
 mum, qui ad medicinam systematicam rationalem pertinet. In hoc
 præcipue atroces convulsivi generis morbos, qui vel universum cor-
 pus occupant, vel certis tantum partibus graviter infesti sunt, expli-
 candos & pertractandos sumsi. Videtur quidem horum affectionum æ-
 tiologia & rationalis evolutio non adeo facilis, sed valde ardua; eo
 quod, non ex causis mechanicis, ut febres, hæmorrhagiæ, & spasticæ affectiones,
 explicari posse videantur, sed alius & eminentius quoddam principium ex parte pro-
 causa agnoscere: nempe animæ voluntatem, utpote in epilepsia, & universalibus
 istis moribus convulsivis partes voluntati, & animæ imperio subjectas graviter exer-
 cere, atque in cerebro, quod & Medicorum, & Philosophorum consensu pro sede
 & domicilio animæ habetur, originem suam petere, constans & rata ab omni ævo
 Medicorum est sententia. At, vero quam obscura, abdita, & multis difficultatibus, at-
 que dissensionibus natura animæ humanæ, ejusque potentia, & operandi ratio in
 corpus sit innexa & implicita nemo facile insiciabitur: neque doctiores Medicorum
 usque eo inter se conveniunt, an anima immediato & incorporeo actu membra mo-
 veat, & percipiat, an medio quodam materiali fluido nimirum nerveo mobilissi-
 mo, quod Veteres spirituum animalium nomine indigitarunt, ad hos actus opus ha-
 beat. Ut iraque ego in re difficili & non exigui momenti & considerationis meam,
 quatenus ad praxim medicam spectat, sententiam præferam; dico primum corpus hu-
 manum neutiquam esse puram machinam, ex diversi generis partibus & organis,
 summa & divina sapientia inter se connexis, ad motus, qui potissimum conserva-
 tionem ejus vitali inserviunt, constructam; sed cum altioris originis & naturæ, spi-
 rituali nempe principio, quod & percipiendi, & intelligendi, & res invicem dis-
 cernendi, & certos quosdam motus dirigendi potentiam habet, mutua & inti-
 miori unione esse conjunctam. Num vero exquisitior hujus principii incorporei &
 spiritualis cognitio Medico ut Medico summe & absolute scitu sit necessaria, id
 est, de quo valde dubitamus. Neque aliud HIPPOCRATEM voluisse mihi persua-
 deo, dum in principio libri *de nat. hum.* qui genuinus ejus fœtus unanimi Criti-
 corum consensu habetur, ita scribit: *Quicumque de natura humana amplius diffe-*
rentes audire consuevit, quam quod ad medicinam pertinet, huic non est commodum
hunc meum sermonem audire. Jam veto in his quæ sequuntur, prolixè demon-
 strat, corpus humanum ex certa & temperata elementorum & humorum propor-
 tione, qui pro differentia ætatum, temporum anni, regionum, victus, & aeris
 differunt, constare, & ad hanc Medicum in morborum causis investigandis, &
 adpositis ad eas expugnandas inveniendis remediis unice respicere & attendere de-
 bere. Quibus certe clare innuit, verum medicinæ objectum esse corporis huma-
 ni mechanismum, (neutiquam vero moralismum, ut nonnulli nostri temporis Me-
 dici opinantur) illum autem à causis maxime externis & corporeis sustineri, &
 mutari; & hinc sanitatis, mortis, vitæ, morborum, & sanationis originem &
 fontem esse. Equidem non negandum, animam ad movenda certa membra, im-
 perium & directorium quoddam habere, uti in voluntariis id clare adparet motibus;
 neque negandum est, animam humanam motus & animales, & vitales, & natura-
 les turbandi, & invertendi magnam possidere potentiam, ut in gravioribus animi
 adfectibus, & viribus corruptæ phantasie adparet luculentissime. Quod autem ani-
 ma

ma motuum vitalium, & animalium quoque proxima & efficiens causa fit, in quam medicina vim quandam sanantem exerere possit, ab hac sententia utique me prorsus alienum esse profiteor. Nam rebus paullo altius perpensis, clare intelligimus, animam sine mediis & causis physicis ac mechanicis nihil plane posse in humano corpore, nec intelligere, nec cogitare, nec sentire, nec motus certos dirigere, vel etiam ordinatos immutare, aut inordinatos in ordinem revocare; multo minus motus vitales, cum quibus maxime Medico negotium est, ut sunt cordis, arteriarum, & omnium vasorum fibrarumque efficere. Quod assertum, tanquam longe in medicina utilissimum, ut paullo firmioribus argumentis corroboretur; operæ fore pretium arbitror. Ecquis doctiorum Medicorum ignorat, laeso & non integro organo sensorio, ut oculo, auro, vel etiam motorio, ut musculo, animam nec movere, nec sentire, nec videre, nec audire posse; eoque vitio per artem medicam restitutum integros rursus evadere sensus. Videmus quoque organis & sensoriis & motorii recte, & secundum naturam constitutis, beneque conformatis, animam nihil efficere posse; licet efficacissime velit, nisi affluxu sanguinis arteriosi, vel liquidi nervosi bene constituti illa robor & vigorem accipiant. Neque amplius obscurum esse potest, tota cerebri structura salva, salvis nervis & membranis, salvis etiam sensuum organis, cessante vero vel deficiente sanguinis ob cordis languidiorem systolen motu ad caput, omnem sensum, omnem memoriam, omnem cogitationem, & intellectum simul & semel perire. Simul ac vero hic motus per congrua remedia restituitur, ut videmus in syncopis, illico animæ operationes rursus observantur. Sanæ rationis in homine ulum à placido & temperato sanguinis per cerebri vasa progressu dependere, Divus Senex passim in scriptis suis docuit; adeo, ut *Lib. de flux. assertat*, sapientiam homini per bonam dietam præstari posse. In omni delirio, five aberratione mentis, vitium & causam vel in ipsius cerebri substantia, aut ejus membranis, præsertim dura matre, vel in minus temperato vitioso sanguinis motu constare, ex eo satis recte colligitur, quod sublato hoc, per remedia convenientia, vitio menti restituitur sanitas. Surrexerunt nostro tempore Medici quidam, qui affirmare ausi sunt, animam sine ope & sine medio fluidi cerebri & nervorum omnes motus & sensus in corpore efficere posse, hoc fundamento maxime innixi, quod tubuli & eorum cavitates in nervis non conspici possint. Sed qualis hujus argumentationis sit infirmitas, vel ex eo intelligi potest, quod testiculi & hominis & animantium nil nisi congeries sint minutorum, subtilissimum succum vehentium & fecerentium vasculorum; licet eorum cavitates oculis visumque plane effugiant. Plantarum folia & flores, & fructus quoque tenuissimo succo per minutissimos canales nutrir, tam certum est, quam quod certissimum. Qualis vero sit usus & cerebri & nervorum, ipsi hujus sententiæ auctores ignorant. Quum autem in doctrina medica potissimum à posteriori, & per effectus, in rerum & causarum cognitionem pervenire liceat; & quotidiana doceat experientia, à tenuissimo fluido, quin à solis effluviis & exhalationibus, animales actiones plane interturbari, perverti & sisti posse, uti patet in ebriosis, in iis qui narcotica medicamina majori copia sumserunt, vel copiosum carbonum accensorum fumum inspiratione hauerunt, dissipatis hinc cunctis & animalibus, & vitalibus viribus, quæ tamen solo sæpius analepticorum remediorum usu, vel naturæ amico & suaveolenti odore protinus resuscitantur: ecquis igitur negare ausit, fluida summæ activitatis & virtutis moricis ad motus & sensus præstandos concurrere debere. Hisce satis solidis argumentis aliud majoris fere ponderis subjungendum esse puto, animam in corpore humano plane nihil posse efficere sine motu vitali; cujus essentia & formalis ratio in alterna & reciproca cordis, arteriarum, ac vasorum & fibrarum systole & diastole, & inde fluidorum sanguinisque pendente progressu & circuitu consistit. Nunc vero celebris oritur questio: unde hic vitalis motus causam & originem suam trahat? Recentiores quidam animam, & quidem rationalem, hanc esse, omni modo & labore contendunt: Sed nullo unquam argumento id demonstrarunt. Verum ego cum aliis solertioribus rerum naturalium scrutatoribus primam & veram virtutis moricis & systalticæ activæ vitalis, quæ in fibris, & tunicis musculosis, corde, arteriis, canalibusque viger, causam in parte subtiliori expansivâ, elastica spirituosa atmospherici aëris, cum fluidis corporis nostri intime permixta, rectissime quærendam esse duco. Nec hominem, nec ulum animal sine respiratione, sine aëris in pulmones vel sanguinem ingressu vivere posse, nullus amplius dubitandi locus est; adeo ut, substracto aëre, vel eo non renovato, vita animantis mox pereat. Atque sicut flamma candelæ in-

clusa vasi aëre pleno mox exstinguitur; ita etiam id accidit cum omnis generis animantibus: quoniam uti intestinus partium sulphurearum, quæ flammam constituunt, motus eodem modo, intestinus partium sulphurearum sanguinis, ab aëris fluido sustinetur. Ad flammam itaque pariter ac vitam conservandam renovato semper opus est aëre, quo vaporibus qui refertus est expellatur, atque recens & novus in ejus locum succedat. Causam vero respirationis, ad vitam necessariæ, si quis inde repetere velit, quod aëris ingressus in thoracem ad expansionem vasorum pulmonarium, & consequenter ad liberiores sanguinis ex uno cordis ventriculo in alterum progressum, tantummodo summæ sit necessitatis; cum valde errare existimo: quia animantium, vel à subtracto aëre, vel ab eo vaporibus nimium referto mortuorum pulmones, aperto corpore valde inflati adparent. Ego multos homines, qui suffocatione mortui fuerunt, novi, in quibus post dissectionem tota thoracis cavitas pulmonibus inflatis distenta fuit. In aëre itaque, catholico illo summæ activitatis fluido, elastico, vitam seu potius ejus pabulum, imo causam querendam esse, non sine ratione & fundamento, Veteres æque ac Recentiores Philosophi affirmarunt. Divus Senex passim in scriptis suis, *Lib. de stat. de morb. sacr. de diæta* &c. aerem sensum & motum præstare membris, & maximum in omnibus, quæ corpori accidunt, auctorem, dominum, & morborum quoque causam esse, diserte & expressis verbis asseverat: & hanc ob causam etiam in libris suis *Physicis de aere, aquis, natura humana, de locis in homine* &c. à natura regionum, locorum, à diversâ temporum anni & tempestatum constitutione, prout aëre plus vel minus salubri fruuntur, tantas mutationes in corpore humano ratione roboris, sanitatis, morborum, viriumque derivat, & ut ad hæc attendant Medicos monet summo opere: quin imo ob eandem causam sapientissimus ille & antiquissimus Medicorum ad sanandos longos morbos aëris & locorum mutationem commendat, quod assertum ipsa etiam experientia confirmavit. Vero itaque simillimum est, Medicum in doctrina, quæ agit de vita, morbis, eorum causis, iisque sanandis, ad causas maxime physico-mechanicas, evidentes, & rationi sensibusque obvias, sine quibus etiam id, quod præest nostræ machinæ, spirituale principium nihil agere vel operari potest, respicere, & inde demonstrationes & explicationes suorum dogmatum mutuari debere: siquidem is recte suo fungitur munere, qui causis morborum continenribus & proximis recte occurrere, & sese opponere didicit, non ad valde remotas, multo minus obscuras, abditas, & incomprehensibiles, quas inter principem animæ sibi vindicat locum, attendendo. Et ut hæc exemplo illustremus: omnibus obvium est, à graviore quodam animi adfectu, v. g. ira, terrore &c. gravissimas corpori nostro induci adfectiones, cujus generis sunt epilepsia, motusque convulsivi spasmodici, qui totam naturalem motuum evertunt æconomiam. Nihilominus in cura, non ad ipsam hanc causam remotam, sed ad proximam, quæ effectus est perturbatæ animæ, ut videlicet motus irregulares & inordinati convenienti diætâ & medicina in ordinem redigantur, humorum intemperies corrigatur, & quod vitium corruptumque inde fuit, ex sphaera corporis convenienti modo, & per congruas vias eliminetur, respicere oportet rationalem Medicum. Hac doctrina, quæ antiquissima & HIPPOCRATICA est, & quæ pure physicis mechanisque nititur principiis & rationibus, medicinam dogmaticam nostram & systematicam tam docendo, quam scribendo, usque eo pertractavimus, & ea etiam in conscribendo sicuti universo nostro systemate, ita quoque hoc tertio Therapeutices Tomo usi sumus; in quo potissimum de morbis, qui actiones animales lædunt, & convulsi dicuntur, egimus, eorumque causas & modum, quo functiones secundum naturam pervertunt & turbant, clare & perspicue demonstravimus. Quos inter morbos principem fere epilepsia tuetur locum, cujus origo & genesis, & mali sedes ac causa, ejusque effectus in corpus usque eo valde obscura & perplexa latuit; & quidem ut puto, eam ob causam, quod duræ matris mechanica structura, & usus ad functiones animales, & quæ fiunt in cerebro, & nervorum systemate, nec anaromice nec physice recte cognita perspectaque fuit. Quod videlicet illa, ut VIRUSSENS in *Neur. L. I. cap. II.* & PACCHIONIUS tr. de durâ matre, & in *epist. ad Doctorem Vestii, Ventum medicum*, probe annotarunt, ex duplici serie fibrarum musculosotendinosarum, obliquo modo sese interfecantium, & decussatis sibi invicem intertextarum composita, musculus sui generis membranaceum constituat; qui dilatione sua sanguinis introitum in arterias cerebri adjuvat, & qui alternativa sui constrictione, cerebrum ejusque vasa comprimendo, subtilissimum fluidum, è sanguine

guine secretum, in corticalem ejus substantiam, & ab hac in tubulos nervorum medullares exprimit & propellit, adeo, ut dura sic dicta mater cerebri & nervos involvens sit primum illud motus progressivi fluidi, quod in nervis est, instrumentum; sicut cor ipsius sanguinis, dum nimirum motu gaudens systaltico & diastaltico sanguinem per totum corpus circumagit. In morbis itaque gravioribus capitis, cerebri & nervorum, hanc partem quam maxime præter naturam & quidem, vel à sanguinis nimia ibidem congesti mole stagnatione, vel ejus intemperie stimulant salina, acri, caustica affici, certissimum est; unde illius actio & functio naturalis variis modis, sive ab intensione motuum, nimirum spasmo, sive ab atonia, aut remissiori & languesciente motu læsa, gravissimos universi corporis spasmodicos ac convulsivos parit morbos. Neque ibimus inficias, graves illas animi perturbationes, ut est vehemens ira vel terror, immediate & proxime in principem hanc actionum animalium partem, duram nempe matrem, hostilem suum effectum & potentiam exferere; unde graves generis nervosi capitique morbi suam trahunt originem & sicut per hos affectus systole ejus nimis augetur, seu spasmus inducitur; ita diuturna animi tristitia & angor hanc virtutem systalticam nimium imminuendo, & relaxando fibras, morbis producendis aptissima sunt. Et hoc maxime obtinet in iis morbis cerebri gravioribus, nec non convulsivis, qui universam motuum æconomiam perturbant. Aliæ se res habet in motibus convulsivis certarum partium v. g. cordis palpitatione, singultu, vomitu, asthma convulsivo, tussi &c. ubi ipsæ partes motu systoles & diastoles instructæ immediate à causis materialibus præter naturam læduntur & afficiuntur; motus vero voluntarii salvi manent ac integri. Horum singulorum morborum & symptomatum genefin & rationalem explicationem, summa facilitate & perspicuitate, quantum in nobis fuit, in hoc Tomo persequuti sumus, & secundum causarum & naturarum differentiam ex indicantibus, & contraindicantibus, genuinum medendi ordinem, ac convenientem remediorum adplicationem cum necessariis observationibus, & cautelis specialissimis adjunximus: & denique clinicis morborum historiis, candidè & ingenue adductis, doctrinam nostram illustrare laboravimus. Quisque hinc diligens & peritus Lector facile perspiciet, quanta observatione, quanta attentione, quantoque judicio opus sit, pro circumstantiarum ratione salubre & appositum remedium invenire & recte adplicare, ne contra nostram voluntatem, quod pro dolor! sæpe evenit, plus nocemus, quam profimus. Quemadmodum vero in doctrina medica, ita quoque in medendi methodo, antiquissimum medicinæ parentem sequuti sumus; quæ, ut rem in compendio proferam, in eo consistit, ut causis evidentibus atque proximis, quæ vel numero, sive quantitate, vel mensura sive qualitate, vel pondere sive motu peccant, probe cognitis circumspiciatque, juxta definitionem ab HIPPOCRATE *L. de Flat.* traditam, ratione quantitatis, temperiei atque motus, quæ superflua sunt, auferamus, & quæ in his deficient, per congrua adjiciamus medicamina. Recte enim dixit gravis ille auctor, medicinam nihil esse, nisi adpositionem & ablationem; adpositionem quidem eorum quæ deficient, ablationem quæ excedunt; & addidit, illum, qui hoc optime facere potest, optimum censei Medicum; quantumque quispiam in eo deficiat, tantum ab ipsa arte deficere. Sicut igitur sanitatem, sive integritatem ac vigorem actionum humanarum, in eo potissimum sitam esse observamus, ut novo semper aëre, novisque reficiamur alimentis, atque ut excreta ingestis nunquam non respondeant: ita è contrario ab ingestis vitiosis, & eorum, quæ excerni debebant, retentione, materiales morborum causas progigni tam certum est, quam quod certissimum. Quoties enim cunque sagax Medicus primam morborum originem investigare gessit, nullum eorum, nisi à retentis per alvum, per urinam, per transpirationem lordibus excrementitiis, & suppressis inutilium atque superfluum, quin etiam sanguinis excretionibus v. g. per vasa uterina, hæmorrhoidalibus, & in juvenili ætate per nares, aut sordibus quæ per cutem effluerunt, improvide repressis, oriri animadvertet. Præcipuum itaque sicut naturæ, optimæ morborum medicatricis, ita & sequacis artis opus est, ut debito modo, ordine, tempore, congruoque loco excrementitiæ morbosæque materiæ è corporis sphaera per convenientes removeantur medicinas; cujus generis sunt sanguinis detractio per venas & cucurbitulas, aliarumque fordium evacuatio per alvum, per vomitum, per urinas, per sudorem, & transpirationem, per abstinentiam, per motum, per vesicatoria, fonticulos, feracea, & id genus plura: de quibus, eorumque usu, antiquissimi Medicorum, & in iis HIPPOCRATES atque CELSUS *Lib. II.* fusius egerunt. Ad hanc salutarem materiæ perniciosæ excretionem juvandam, per-

multum profecto sic dicta alterantia, quæ mobilem & ad evacuationem opportunitatem reddunt materiam, viasque simul respiciunt, & has obstructas referant, contribuere deprehenduntur. Et cum motus denique solidarum pariter ac fluidarum partium, qui formale morborum constituunt, vel nimis aucti, vel nimium depressi sunt, eo-que ipso curationis successum mirum quantum sæpius remorantur: præbuit quoque ea benignissimum Numen nobis remedia, quæ non modo vires motusque languentes erigendi ac refuscitandi, verum etiam excedentes placide consopendi, reprimendique egregia pollent efficacia. Hac itaque simplici, facillima, antiquissima, naturali, & humanæ rationi ac experientiæ convenientissima physico-mechanica methodo, nos usque eo, ut in omnibus morbis, ita quoque atrocibus illis & terribilibus generis nervosi, de quibus præfens agit tomus, affectibus sanandis, non sine prospero sub divina gratia successu usos fuisse, attentus, ab omnibus præjudiciis vacuus, & qui veritatem sine ambitione sectatur, lector perspiciet clarissime. Vale, Lector benevole, hisque feliciter fruiere; si Deus suppeditabit vitam, viresque, hunc Tomum mox sequetur quartus & ultimus.

C O N S P E C T U S

C A P I T U M,

Quæ hoc Tomo continentur.

SECT. I. CAP. I.	<i>De Epilepsia.</i>
II.	<i>Motibus convulsivis.</i>
III.	<i>Motibus spasmodicis vagis.</i>
IV.	<i>Catalepsi.</i>
V.	<i>Malo hysterico.</i>
VI.	<i>Malo hypochondriaco.</i>
SECT. II. CAP. I.	<i>Palpitatione cordis.</i>
II.	<i>Asthmate convulsivo.</i>
III.	<i>Tussi rheumatico-convulsiva.</i>
IV.	<i>Singultu.</i>
V.	<i>Spasmodicis œsophagi morbis.</i>
VI.	<i>Vomitu.</i>
VII.	<i>Dysenteria.</i>
VIII.	<i>Cholera & diarrhœa biliosa.</i>
IX.	<i>Abortu.</i>



CAPUT PRIMUM.

De Epilepsia.

§. I.

*Paroxysmus
epilepsiae
varia
epilepsia.*



NTER tot calamitates & afflictiones, quibus genus humanum post tristem & miserum lapsum subinde infestatur, nulla mihi ferocior, nulla tristior, nulla terribilior videtur, quam *universalis illa externarum partium prae voluntatem concussio, & vehementis agitatio, cum sensuum tam internorum, quam externorum interceptio*ne stipata, quam vocant epilepsiam. Non enim solum sub hoc duro malo corpus variis,isque indignis plane deformantur modis; sed etiam ipsa mens ac animus e sede sua quasi dimoveatur. Hic quoque horribilis agrotantium aspectus, & insignis symptomatum vehementia causam quaerentibus offert, cur Veteres hunc morbum *æter* *ægypti* dixerint magnum, Herculeum, Divinum atque sacrum. Dicitur enim magnus atque Herculeus ob suam vehementiam, & quoniam vix superari arte humana potest; Divinus, quasi a Diis in vindictam missus, & opem humanam eludens; & denique sacer, quod sacram corporis partem, mentisque, quae sanctissima est, sedem occupat.

§. II.

*Definitio
epilepsiae.*

Sed ne in nominibus subsilamus, aggrediamur rem, & epilepsiam describamus, quod sit invita, praeternaturalis ac fœmine violenta partium nervo-membranosarum, hinc musculosarum & totius corporis concussio convulsiva, cum sensuum abolitione stipata, à membranarum cerebrum, spinalem medullam, ac nervos eingenitum spasmodesca stricatura, & hinc fluidi mobilissimi impetuosiori in organa motoria, pariter in sensoria influxu, natales suos mutuant.

§. III.

*Modi
hujus.*

Progressus hujus morbi una cum symptomatibus ita se habet: interdum subito & prae omnium opinionem invadere solet; unde Graeci epilepsia dicitur; saepius vero illius accessiones praecedunt, atque significant quaedam symptomata. Horum possitima sunt: totius corporis lassitudo, capitis gravativus dolor cum quadam sensuum perturbatione, inquietus somnus, insolitus pavor, visus obnubilatio, aurium tinnitus; in quibusdam cor incipit valde palpitare, praecordia inflantur, respiratio intercipitur, nutrimura sentiuntur in ventre, alvus emittit foetida;

urina mingitur larga, artus refrigerant: in quibusdam à partibus extremis aures frigidae ascensus ad superiora versus est & cerebrum percipitur. Tum quidam subito in terram concidunt (unde morbus caduci etiam nomine venit), pollices arctissime inera polles manuum includuntur, ut vix magna vi extrahi possint, oculi contorquentur, invertuntur, ut non nisi album conspiciatur, perit omnis sensatio, ut nullo clamore, nullo odore, utut fortiori, nullo tactu acutiori excitari possint; spuma cum sibilo ex ore provenit, lingua dentibus laceratur, artus vehementer tremunt, & succutuntur. Variantur vero & convulsiones, & sensuum laesiones tam gradu, quam specie: nam interdum loco motuum convulsivonum ipsius vix rigidos membra corporis totius prehendi, ut haec dissoluta nec per vim explicare liceat, ac totum corpus subinde tam rigidum sit, laud secus, ac si ligneam statuat quis movere velit. Erigitur quoque penis in infantibus; in adolescentibus semen ejicitur, & saepius urina ad magnam distantiam prorumpit. Tandem horum symptomatum sequitur remissio; ut longiori vel breviori intervallo ad se redeant; tum vero adhuc de dolore, torpore & gravedine capitis, omniumque artuum lassitudine conquerantur. Qui ulteriores symptomatum recessionem cognoscere cupit, adeat inter veteres *CÆLIUM AURELIANUM lib. I. Cap. 4. & ARETÆUM lib. I. Cap. 5.*

§. IV.

Ipsi hujus mali paroxysmi, qui pro causarum ac corporum diversitate vel crebriores aut rariores, vel longiores aut breviores sunt, plerumque certa temporis periodo, certis diebus aut horis, vel etiam mensibus, circa lunae mutationes & quadras, praeteritum novilunium & plenilunium, maxime in leviore sexu circa mensium tempus revertuntur; & quod maximum est, à levi saepe causa & occasione, e. g. à quavis subita animi perturbatione, terrore, iracundia, repentina letitia, à seria animi contentione & meditatione, à potu inebriante, à nimio calore vel frigore, vel veneris exercitio, protinus recrudescunt.

§. V.

Neque vero ignorari oportet, nullam esse aetatem, in quam frequentius epilepticum malum tyrannidem suam exerceat, quam infantilem, adeo ut, à nonnullis eandem ob rationem vocetur

*Paroxysmus
epilepsiae
rara.*

*Symptoma
epilepsiae.*

nam morbus infantilis ac puerilis. Hinc crebrior attestatur experientia, maximum numerum, & dimidium ferme infantum partem singulis annis in quavis urbe convulsionibus vel à dentitione difficili, vel à gravibus intestinorum torminibus, quæ inæconium retentum aut lac corruptum produxerunt, subortis interire. Et omnes ferme infantum morbos, siue fuerint chronici, siue acuti, præsertim verminibus complicatos, plerumque cum epilepticis ac convulsivis ligari motibus, in propinquo est; sicuti vel solo morbillorum aut variolarum exemplo luculenter patet. Præterea nec fugiet eos, qui in frequenti artis versantur exercitio, feralem huncce morbum subiectis spongiosis, mollioris ac succulentioris corporis habitus, tænarumque tenerioris, & tam animi quam corporis ratione sensibilibus longe esse frequentiores, quam us, quæ robustiorem obtinent naturam. Testantur id rasciorum liberi, qui sub variolarum exclusione, à lacte per cibos antiquique pathemata corrupto, & sub denitum eruptione non tam facile epilepsia corripiuntur, quam infantes sensibiles, teneriores, in urbis delicatis enutriti.

§. VI.

Quæ seu
P. 11. §.
hæreticorum

Neque est ultus morbus magis gentilius, & qui tam facile à parentibus in liberos devolvitur, quam epilepsia: cujus fundamentum in partium nervosarum & membranacearum textura nimis sensibili & ad motus anormales suscipiendos admodum apta, hæreticorum jure ad infantes propagata collocandum est. Neque porro minus n, qui caput à natura vel errore in dicta commisso à primis annis valde debile & imbecille habent, atque coryza, oculorum ac aurium deflexionibus, glandularum colli tumores, achoribus & capitis tines crebrius vexantur, vel in puerili ætate frequentes patiuntur hæmorrhagias, præ aliis insignem ad epilepticæ passionis obtinent proclivitatem.

§. VII.

Auctoritas
opinionis
de causis
epilepsie.

Hui prælibatis, ad causam atque sedem mali epileptici transgrediendum est. Hanc in cerebri læsione sitam esse, nemo est, qui in dubio vocabit: in quo vero consistat hæc læsio, & quomodo producat, id hæcenus minus distincte explicuit deprehendi. Quibus religionis semper placuit prætextus, illi à deo appellare haud vererent, quasi satis esset in Deum rejicere, quæ intellectui claro ac distincto, vulgarique principii haud adeo respondent: alii vero ad venenam inebrians, & narcoticum siue stupefactivum; alii ad fermentum specificum; alii ad materiam acrem nervos irritantem; alii ad violentam spirituum animalium vim explosivam in fibris muscularibus & nervis existentem confugiunt: quidam in fluxorem archæ, alii in turbulentum & confusum principii vitalis seu animæ rationalis motum causam rejiciunt. Sed hi Medici fere sunt, qui non res, sed nomina pro causis habere fuerunt, quorum in applicatione & demonstratione nullus omnino est usus. Qui vero causas sensibus manifestas præ commentis allegare amant; illi CAROLI PISONIS doctrinam sequentes, colluviem feri viscosi poros cerebri vel obstruentem, vel æqualem fluidi nervi in partes influxum remota pro vera epileptice agnoscunt causam.

§. VIII.

Nam vero ex physico-mechanica causis gravissimum hunc capitis affectum à fluidorum motu atque circulo per vasa cerebri minus recte se habente derivamus. Quemadmodum enim, si sanguinis temperati per cerebri vasa liber & æquabilis progressus fuerit, & hinc debita lymphæ spiracularis secretio, & per nervos distributio, omnes utique functiones, quæ animæ imperio subiectæ, & animales vocantur, recto succedunt ordine: ita è contrario in omni, eoque gravi capitis morbo, ubi sensationum & motuum voluntariorum ingens observatur læsio, sicuti quam maxime fit in malo epileptico, linguam per caput haud expedite progredi, rectissime colligitur. Atque hoc est, quod jam olim antiquissimus artis nostræ auctor HIPPOCRATES notavit, dum libro de flatibus §. 21. ita scribit: *Sacer morbus fit, cum obstructions multis modis circa venas contingunt, & sanguinis motus prohibetur, atque alie quidem loco consistit, alio lentius penetrat, alicubi autem citius: quæ sane inæqualitate transusus sanguinis per corpus facta, omnigena inæqualitates per omne contingunt corpus. Quæ sane gravissimum sensus sententia ita est comparata, ut nostro tempore, detecto sanguinis circulo, tanquam scientiæ totius medicinæ principio, ex eo non apud epilepticum morbum, quoad ortum & causam, evolvi & explicari possit.*

§. IX.

De circulo
humorum
per caput;

Quum vero circulus humorum per caput atque cerebrum peculiarem præ reliquis partibus obtineat indolem: haud alienum erit, pauca de illo commemorare, ut ipsi innixa epileptice ætiologia eo melius innoteat. Primum enim haud ignorari oportet, quod arterie, quando caput ingrediuntur, tunicam suam robustiorem deponant; & membrana duntaxat tenui, sensu & motu carente dotata, in intimam corticalem cerebri & cerebelli substantiam distribuuntur, ut scilicet spirituosam lympham, ad motum edendum aptam & necessariam, quæ ad nervos & membranas nervosas deferret, separent; sanguis vero relictus per sinus venosus in dura matre, mediantibus vasis jugularibus, ad cor seu motus circularis fontem revehar. Deinde vero, notum digna est singularia plane hæc die dictæ matris structura; quæ ex peculiari fibrarum nervosarum & muscularium apparatu composita est: quarum hæc tam linea recta quam obliqua feruntur, & circa sinus duos laterales magis arcuatæ & circulares deprehenduntur; illæ vero nervo carneæ insilant columnarum ab uno pariete in tribus sinus majores dissectis ad alterum abeunt, ubi cellule quoque ovales secundum venarum seriem, quæ illos ingrediuntur, disposuæ conspiciuntur: quæ fibrarum modo impediunt, quo minus ab irrumpente sanguine sinus plus jussu dilatentur; sed & id efficiunt, ut, cum successiva sese contrahant, sanguinis progressus ad venas jugulares & cor promtor fiat, & expeditior. Columnarum autem officium est, ut sanguis rediens paullo crustior, & subtili lymphæ destitutus melius conquantur: & cellule denique sunt insilant valvularum, quæ impediunt, quo minus elapsus cruor regredi, atque eadem vasa rursus intrare possit. Hæc plane peculiaris & artificiosissima sinuum venosorum fabrica clare satis demonstrat, hos ipsos ad promovendum sanguinis versus cor circu-

circulum, eodem ferme fissiles ac diafoles motus, haud locus ac arterias vel cordis auriculas omnino gaudere.

§. X.

Præter hanc singularem sinuum venosorum motum, insignis quoque durae matri motus tonicus, seu potius elasticus adscribendus est, qui in omnibus reliquis corporis nostri nervo-muscularibus tunicae & membranis, quæ influxu liquoris nervi & arteriosi animantur, viget. Huius ceteris membranis, quæ non solum cerebrum cingunt, sed etiam cerebellum, verum etiam medullam spinalem, & omnes machinæ nostræ nervos tegit, ambit & cingit, motus dilatatorius & contrictorius haud tantum ad sanguinem per caput circulum, sed quoque meliorem fluidi spiritalis, in nervis undantis, secretionem promovendam, egressum suae confert momentum. Nam quondocumque pulsus arteriarum cerebri hæc membrana elastica elevatur & expanditur; tubuli nervorum ad recipiendum subtilius fluidum magis redduntur idonei: quando veto post expansionem, dum proprio suo elatere, qui per appulsus sanguinis arterialis, ex tribus insignibus ransis, carotide nimirum interna, externa, atque cerebri advechi non minus, ac influxu fluidi nervosi adagetur, rursus sese contrahit, corticem cerebri quodammodo comprimit; tum fluidum tenuissimum ex eo in substantiam medullarem, & nervorum principia eo melius propellitur. Hi ergo tam durae matris, quam fluidum ejus majorem motus, systolici & diastolici reciproci, ubi sunt æquales & convenienti sunt modo, recte se habet circulus sanguinis per caput, atque ab eo dependentes functiones optime peraguntur: cum contra ab hisce motibus læsa graves capitis morbi propullent. Quæ omnia apud BAGLIVUM, qui primus solidorum naturam & motum in pathologia introiit, Lib. I. de fibra puerice pag. 295. salus declarantur.

§. XI.

Quodsi ergo sanguis crassus vel etiam copiosus intra durae matris sinus stagnaverit; motus illius systolicus, & ab eo pendens regressus ad cor facile impeditur; & hinc major, quam par est, sanguinis per arterias advechi copia ibidem congeritur, ut nunc non amplius subtilissimæ æthereæ particulae, sed rudiores, atque & aëreo-elastice magis expansivæ indolis, sensus & motus omnino turbantes, in cerebri ac nervorum tubulos transeant. Ab hoc autem porro sanguine in sinibus durae matris & venis jugularibus stagnante, vasa nimirum dilatantur, hinc nervosæ fibræ comprimuntur, & inde stricturna spastica nervosæ huic membranae insertæ, quæ proxima ac principalis mali epileptici causa est. Nam hæc ipsa ejus est indolis, ut tenuissima pie matris arteriosa vascula, & corticalem cerebri substantiam nimis comprimat: unde præter voluntatis imperium fluidum illud subtilissimum copiosius & majori impetu in cerebrum & nervorum tubulos influat. Quoniam autem dura mater, omnium fere Anatomicorum consensu, radix & principium est omnium membranarum: aliter fieri nequit, quin ætiam cum ipsis foveat consensum, qui in mutua inordinatarum motionum communicatione consistit. Quam autem ex hoc auctiore durae matris spasmio, nervi potissimum, qui ad sensoria abeunt, fortiter con-

stringantur, ut omnia fere liquidi tenuissimi influxus intercipiantur: fit inde, ut in perfecta ac completa epilepsia omnes tam interni, quam externi sensus cessent. Contra vero, ad organa motoria major atque vehementior fluidi huius mobilissimi fit impulsio atque influxus, & hinc terribilis illa ætuum & musculorum dissenio, contractio, fuscullio & agitatio erit deducenda. Præterea certo constat, per nervorum oclavum, quod & vagum dicunt, ex cerebro ad præcipua interna viscera, partemque nervas, ad motum & sensum præstandum aptas, ramos suos dispergere: in quos dum fluidum nervorum majori viâ ac vehementiori impetu influit; partes quoque istæ sub paroxysmo in motum præternaturalium ac violentorum consentium rapiuntur: hinc cor incipit palpitare, arteriæ celeri & inæquali ciente motu; respiratio fit suspensiva cum sibilo, salivæ fluunt ex ore, vox perit, murrurque & borborygmi in intestinis sentiuntur.

§. XII.

Ex his adparebit, in omni epilepsia præsto esse membranae cerebrum, medullam spinalem, ac nervos investientis stricturnam, seu causam illius proximam. Prout vero causæ remotiores, quæ hanc stricturnam inducunt, ac circulum humorum per cerebrum & caput inæqualem reddunt, admodum sunt variae: ita quoque diversæ species ac denominationes motuum epilepticorum exurgunt. Hinc innoscit differentia epilepsie in *idiopathicam* & *sympomaticam*: quando enim causæ intra ipsum cerebrum existunt, nec aliorum proveniunt, dum dicitur *idiopathica epilepsia*; contra cujus causæ ex aliarum partium vino demum ad caput transferuntur, ea audit *sympomatica*.

§. XIII.

Idiopathica nascitur sæpius ab externa violentia. Res enim apud Medicos æque ac Chirurgos notissima est, quod à gravioribus capitis & cranii per vulnerationem, fracturam, percussione, depressionem, inductis lacionibus, frequentius graves, quam nunquam lethales, proveniant epilepsie. Præcedunt tum plerumque capitis dolor, atque sensuum torpor: & post mortem vel sanguis, vel serum corruptum stagnans inter duram & piam matrem, vel inter cranium & duram matrem, vel festuca durae matri insititæ inveniuntur. Sæpius etiam fit, ut epilepsia chronica certa temporis periodo recurrent, à spinis acutis ossis interne in basi cranii, interdum etiam in sinu falciformi vel lateralisbus anatis, quæ curari nequit, excitetur: interea tamen ars impedire potest, nè ex nimio motu sanguinis, cerebrum ita disponatur, ut pressio ejus contra spinam fit tam magna, ut inde oriatur insulzus epilepticus.

§. XIV.

Ad causas epilepsie idiopathice atque lethales referri quoque meretur obstructio venarum jugularium, vel etiam sinuum durae matris, præsertim falciformis, a sanguine viscido, aut polyposi concretione enata. Ejusmodi tria mihi innotuerunt exempla, & plura apud BONETUM in *seculæbreto anæsticos* passim occurrunt. Hoc etiam spectat observatio a SPONJO in *aphor. Lib. II. aph. 19. allegata*, quæ quidam primum somnolentia, post epilepsiam factus,

Differentia epilepsie idiopathice & sympomaticæ.

Epilepsia idiopathica a causa interna.

Chronica idiopathica.

*Ab obstru-
ctione
venarum
a polyposi*

de hinc mortuus; aperto cranio monstravit in variis venarum jugularium ramis obstructions a muco viscido de tartaro tantas, ut gyppo infarci viderentur; & præterea cruor in ventriculos cerebri fuit extravasatus. Non minus, si capitis morbis vel acutis, ut phrenitidi, vel chronicis, veluti manie & melancholice jungitur epilepsia, tales vasorum infarctus à sanguine subsistente crasso post mortem reperiuntur: qualis epilepsia, mea quidem sententia, rectius refertur ad idiopathicam.

§. XV.

Ab animi affectibus.

Porro inter causas idiopathice epilepsie, animi affectus, maxime ira acque terror, haud ultimum sibi vindicant locum. Hi enim proxime & immediate in nervosa corporis partes & membranas, eas vel fortius constringendo, vel plus jussu dilatando agunt; & in universa machina vitalem motuum æconomiam inverunt. Sed id sane mirabile est, quod a gravi animi affectu vitium in fluidis etiam transcat partes: quod nutrices suo attestantur exemplo, quæ ira vel terrore graviter commotæ, si statim ulcera præbuerint infantibus; hi læpius haud ita multo post epilepsia corpi observantur. Quin imo haud rarum est, quod infantes, si matres gravitate fevioribus indulerint animi commotionibus, primis ætatis annis facillime fiant epileptici. Porro complures hinc inde apud auctores consignate reperiuntur observationes, quosdam ex solo aspectu epilepti-
corum, qui graves passi fuerint insultus, tanto correptos fuisse terrore, ut mox in eundem incidere morbum. Vehemens quoque rei venerit desiderium à semine copioso abortum, ob castitatem tamen suppressum, gravem hunc epilepticum affectum provocandi potentiam habere, plurima notatu digna confirmari potest exemplis. Fœminas pariter, alias castissimas, ab infans amore in hoc malum incidisse, cujus optatum tam præservatorium, quam curativum remedium conjugium fuit, res identidem per observationes certa acque confirmata est.

§. XVI.

Epilepsia symptomatica, scilicet in pectore tracta acque obstricta.

Sapientissime ortus mali epileptici est sanguinis serosi impurius nimia & impetuosa translatio ad caput in corporibus cachecticis, hypochondriacis, & ubi ventriculus & intestina spasmi ac flatibus sunt repleta, eorumque peristaltis naturalis cum debitis se & excretionibus valde læta ac perversa est. Quando enim cumque in antecedentes & epilepticæ, & aliarum cerebri graviorum ac inveteratarum passionum causas inquirimus: plerumque ejusmodi ægrotantes vel hypochondriacos, & hæmorrhoidarios vel melancholicos, vel cachecticos fuisseprehendimus. Tum uplurimum sanguineas excretiones, quæ in viris per hæmorrhoides, in fœminis per menses fiunt, aut parciore, aut nimias huic diro malo viam stravit, innumeræ auctorum observationes, & quotidiana experientia attestantur. Qualis epilepsia recte vocatur *symptomatica*, serosa, hypochondriaca vel cachectica; quæ certis plerumque periodis, sicuti ceterorum ex spasmi primarum viarum oriendorum morborum non fert, adoriatur.

§. XVII.

Spring

Ejusmodi symptomatica vero epilepsia non

tantum à sanguine vel sero tenaci, copioso, in vas subsistente, ea obstruente, & totum liquorum circulum turbante oritur; sed etiam à materia impura, acris, caustica, ad duram matrem per sanguinem arteriarum serosum delata, fibras nervas lancinante, & ad spasmos proripiente producit. Hoc contingit in chronicis acque acutis ægri tudinibus. Quem enim fugit, quod tale acre ac corrupeum serum in febribus exanthematicis, petechialibus, variolis, morbillis, purpura, vel anæ macularum ad cutim propulsionem, vel post earum retrocessionem, firmius duræ meningis impactum, durum illud, & in fine morbi funestum plerumque excitet malum epilepticum. Et idem denique fieri à conglobatis antiquis ulceribus, retropulsa scabie, vel alia cuius defecatione, achoribus & sinea capitis perperam curatis, intus nimirum acta vitiosa materia, innumeris exemplis confirmatum est.

§. XVIII.

Datur adhuc quedam epilepsie species, quæ vocatur *sympathica*, & vehementioribus aliarum partium nervosarum doloribus acque spasmi, per consensum ad duram usque matrem propagatis supervenit. Quid enim crebrius contingit, quam ut infantes ex dentitione difficili in epilepsiam incidunt? quid frequentius, quam ut in personis sensibilibus graviore odontalgia, aut atrociori otalgia superveniat epilepsia? ventriculi etiam fevioribus spasmi, præteritum, qui à venenis causticis, emeticis vel purgantibus improvide sumis, aut inmoderati ira proficiuntur, tandem epilepsiam ut plurimum funestam subungi notissimum est. Talis enim chronice ac periodice epilepsie ortus facillime est in ventriculo, vel etiam intestino duodeno: in quibus partibus dum humor biliosus, & falivæ peregrina fermentatione corruptus hospitatur, ille certa temporis periodo in motum actus, primum catholici sycopicæ, & demum ipsam epilepsiam, quæ tum plerumque *habitualis*, per consensum excitat. Neque minus gravibus intestini ilei vel coli doloribus acque spasmi associari motus epilepticos, vel insensum lætentium exemplo patet; qui ejusmodi atrox malum ex lacte acuto, corrupto, intestinorum membranas arrodente, & faeces alvina viridi afficiente colore sæpenumero experiuntur. Porro haud exigua sunt exempla, ubi à gravi dolore ex calculo in uteribus, vel introitu in vesicam hærente, epilepsia in ætate etiam provectori excitatur; quæ hinc vocari meretur *sephatica*. Non minus in pueris ex vino uteri, aut mensium vel lochiorum retentione, vehementes prius partium vicinarum ac intestinalium spasmi, tum ipsa epilepsia accedere observatur; quæ hinc audit *hysterica*. Et nihil ferme est frequentius, quam quod ex lumbricis, tunicis intestinalium nervas vel arrodentibus, vel dum mortui sunt, vaporosa sua putrilagine, vellicantibus, in pueris præsertim horrendis motibus complicata suboriatur epilepsia, *verminosa* nomine digna. Talem denique ex mortui canis rabidi quoque concitati, & plurimæ docent Medicorum observationes.

§. XIX.

Quod tandem causas mali epileptici remotiores attingit; illæ erunt fere, quæ insignem debilitatem & atoniam fibræ membranaceæ & nervosa

Nephritica.

Hysterica.

Verminosa.

*Causæ epæ
hære re-
motiores.*

voss ingenerant, & tonum ac elaterem vasorum labefaciunt. Quamvis enim epilepsie causa proxima ac formalis in spasmus magis, quam atonia consistit; attamen quia leges motuum, qui sunt in machina nostra, ita sunt comparatae, ut nimium fibrarum elasticarum contractionem & spasmus, demum nimia atonia, & hanc humorum congestio sequatur, congestionem vero spasmus iterum excipiat: non mirum est, quod cause tonum & robur partium infringentes, ad spasmodicas strictiones & accessiones frequentiores recursum omnino contribuant. Ad hasce vero causas ex classe rerum non naturalium pertinet, vappidi & praesertim noxiolissimi carbonum fumo repleti aeris usus, aut si quis in locis declivioribus, humilioribus, minus transpirabilibus dormiat: inter cibos, qui inflant, caputque vaporibus replent, ut sunt alii, cepurum, apii species, fructus horae, item dulcia fermentescibilia: inter potulentia, immoderatus viui, praesertim vaporosi & fumo sulphuris infecti, aut cerevisiarum crassiorum valde lupulatarum potatio, & inde orta frequens crapula & ebrietas; ex medicaminum autem penu, narcotica, opiatia, item valde odorifera, generationi horum morborum mire velficiuntur. Huc etiam pertinent immoderatae sanguinis effusiones, siue per nares, siue per venas uteri aut sedis, quae mire debilitant, & robur partibus subtrahunt, atque adeo corpus multis excrementis ferofis replent particulis. Ceterum immoderatae & inemptivae, primis in annis celebratae veneris usus, diuturnior quoque tristitia, intemperantia in studiis, ferisique mentem fatigantibus cogitationibus, ob summam debilitatem, quam generi nervoso inferunt, ad hoc malum minime displicent. Vidi juvenem, qui quoties attentius litterarum studiis incumbendo, memoriam & ingenium fatigabat, toties momentanea quasi epilepsia, cordis palpitatione, spirituum distractione ac eclasi corripiebatur. Ad studium vero reversionem placide semper se habebat.

§. XX.

Missa vero ulteriori causarum disquisitione; paucis prosequeremur mali epileptici prognosin. Et hinc per antiquissimam, & ipsius HIPPOCRATIS *Sect. III. aph. 28.* experientiam cognitum est, quod pueri hic morbus solvatur circa annum septimum, decimum quartum aut septimum, annos nimirum pubertatis; seminis autem circa tempus mediusae eruptionis, quod est annos decimus quartus: quibus annis ingens in oeconomia vitaliprehenditur mutatio. Non minus epilepsia chronica non modo mutatione aetatis, sed & locorum, dietae & vitae generis, siue remediorum ac Medicorum ope sponte sanata fuisse, crebris constat observationibus. Perite scripta HIPPOCRATES *Sect. II. Aphor. 45.* juvenibus comitialium liberationem, mutationem maxime aetatis & regionum & victum inferre. Huc etiam spectat, quod superveniente quartana febree sicut aliae graves passionis, ita etiam convulsivae ac epilepticae penitus tollantur; rectissime id observant HIPPOCRATE *Sect. IV. aph. 70. item lib. VI. epid. §. 16.* Intermitteutes etiam, quando rite tractantur, corpus à colluvie vitiosorum humorum liberant & expurgant, & purius ac siccius efficiunt: id quod etiam congrua medicamenta praestare debent. Neque etiam ignotum est, procedere in exitu

Frid. Hoffmanni Oper. Tom. III.

nam cutim scabie, vel exulceratione; vel aliis exanthematibus, veluti in variolis, morbillis, purpura ad summam cutim propolis, hoc diurnum symptoma remittere, vel plane cessare: Spes ergo sanationis haud penitus est abiectenda, quando malum hoc non diu duravit, & ejus insultus haud adeo longi sunt; ipsum malum haud est hereditarium, aetas potius puerilis; aut si ex vitio primarium vitium, verminus, malo regimine, vel perperam curato subcutoaneo morbo provenit. Neque desperandum est, si levior est epilepsie gradus, & arger imminens accessioem praesentem per sensum aerae frigidae, ex partibus extremis ad dorsum, praecordia, caput ascendens, quem anxietas, virium defectus & stomachi ad vomitum propensio praecedunt: aut quando sub paroxysmo sensus non penitus aboli, sed saltem imminuti fuerint; aut denique malum non diu invadit sine pollicum incurvatione.

§. XXI.

Contra vero per experientiam liquidum est, *Signa prognostica mala & fœstia* epilepsiam hereditariam, licet optimis tractetur remediis, curatu esse difficilissimam; nec leve sanationis impedimentum deprehenditur in habituali atque chronica, quae per multos annos duravit, ac crebrioribus, longioribusque accessibus corpus enervat; atque conformationem vasorum & membrarum cerebri quasi permutavit. Minus quoque auspicias eventus ac sanationis est ea, quae non circa annos pubertatis, vel in foemina ingruente mensium fluxu solvitur; ut & quae demum post hos annos, imo post vigesimum primum accedit: tunc enim plerumque hereditarium later vitium, recte id advertente HIPPOCRATE *de morbo sacro*, qui §. 13. ita scribit: *Postquam 21. anni praterierint, non amplius facit morbus corripit, praeterquam paucos aut nullum, nisi à puero conatus fuerit.* Pessimum porro signum est, quando accessiones magis frequentant, quam solebant: sic enim functiones animales saepe destruantur, ut non tantum memoriae, ingenii, ac iudicii immutatio, sed & stupor & stulticia emerget. Epilepsiam autem in cecitatem, surditatem, ac memoriae amissionem terminari, malum; eandem in paralyfin, aut plane apoplexiam transire, mortiferum est. Omnis enim epilepsia desinit tandem in apoplexiam lethalem; & in defunctis vis morbis vel sanguis, vel, quod frequentius evenit, serum in ventriculis aut basi cerebri extravasatum ac corruptum, teste experientia, deprehenditur; quod falso pro causa epilepsie venditur. Porro minor salutis spes est, quando in fluxu febrium acutarum, phrenitidis, petechiarum, morbillorum, variolarum &c. superveniunt epileptici motus; nec denique sine periculo est infansilis epilepsia, quae ex ditione difficili, vel intestinalium torminibus accedit, & sine intermissione adfligit. Neque novum est, congenitum, idiopathicum & inveteratum malum in melancholiam, maniam & denique furorem degenerasse, accedere praesertim plane perverso vitae regimine & gravi animi passionum intemperantia.

CURATIO.

§. I.

Curacionem morbi comitialis aggressurum *De Epilepsia, aut comitia, lib. I.* oportet primum causas materiales remotiores &

B

cor-

corpore proferbere ac emendare: & deinceps vehementiorem duræ maris ac partium nervosarum spasmodum mitigare aque consopire. Hunc ultimum scopum bis potissimum remedium generibus alicui licet, nimirum vel sedativis, vel roborantibus: illa motus effrænes & impetuosus componere, & compescunt, hæc vero imbecillitatem & atoniam, ab atrocitate spasmodum relicta, quæ ad novos paroxysmos animum submittit, tollendam, ac elatrem naturalem restituendum plurimum conferunt.

§. II.

Quæ sint
sedativa
& sic dicta
antepileptica.

Sedativa sunt, quæ blande & sulphurea indolis vapore & exhalatione nimium liquidi nervi motum refrænant. Huc ex regno vegetabilium pertinent herbe & flores, qui temperatam habent fragrantiam, & ex his per destillationem educæ aque, veluti sunt aqua ulmarie, melissæ, falviæ, basilici, primule veris, liliorum convallium, alborum, rosarum, tilie, acacie, poronie, florum aurantium, citri, radices pæoniae, valerianæ, nucleum cerasorum, periscorum, prunorum &c. quæ etiam spectant crocus, flores papaveris in forma extracti, semen hyopodii, papaveris albi, & ex aromatibus nux moschata. Ex regno animalium specifica quasi virtute antepileptica celebrantur, quæ vapore quodam sulphureo summi temperato nervosis partibus admodum amictu pollent: quorum classem constituunt ex durioribus rasura dentis hippopotami, eboris, cornu cervi, lapidia manati, unicorni veri, cranii humani, talorum leporis, sed hæc recens esse debet; alius parum proficiet. Spectant huc quoque ex mollioribus animalium partibus & viceribus depræparati, si leniter exciscantur & in pollinem rediguntur, uti sunt humbrici terrestres, castoreum, secundina humana, sanguis humanus sani hominis leniter secutus, cor & hepar ranarum, talparum, pulvis excicatorum limulidum, & potissimum leporis embryonis excisi & excicati; quæ sulphure magis vaporoso suavolenti nervosas partes afficiunt, earumque ciliæ motus compescunt. Ex chymicis medicaminibus præ aliis syrimum nitri dulcem bene præparatum, vel potius liquorem meum anodynum mineralem experientia edocuit commendo.

§. III.

Quædam
composita
antepileptica.

Hæc sunt præcipua pulverum antepilepticorum specificorum ingredientia, quæ cum abstergentibus misceri possunt. Inter ejusmodi celeberrimæ sunt pulveres, *draco figens*, quem mille experimentis à se probatum esse scribit DOLÆUS in *encyclop. med. pag. 156.* dignus est, qui noceat. Illius hæc est formula: *Recipe nucis moschatae drachmam unam semis, cinere talparum drachmas duas, talorum leporis no. tres, pulveris herbe cardii benedicti scrupulum quatuor, unguularum alcis, succini albi, visci querecinæ ana scrupulos duas & dimidium, margaritarum præparatarum drachmam unam, cornu cervi nri drachmam semis, unicorni veri scrupulum, cranii humani drachmas tres, seminis pæoniae drachmam unam & semis, sacchari Canariensis notias duas, foliorum auri q. v. M. f. pulvis subtilissimus, cujus dosis est drachma dimidia vel scrupuli quatuor.* Non minoris efficaciz esse creditur pulvis epilepticus anodynus D. WEISMANNI, Phylci Windsheimensis, qui sic se habet: *Recipe cornu alcis si-*

ne igne præparati, rasura ungula alcis, dentis hippopotami, unicorni veri, lapidis manati, coralliarum rubrorum, succini albi, crysalli montani, lapidis smaragdini, pulveris lumbri- carum terrestrium, spinarum mustelarum flavianilium, sulphuris vegetabilis corallini, vel seminis hyopodii, margaritarum orientalium ana drachmam, cinabaris nativa drachmas duas, theriacæ celestis scrupulum, pulveris castorei scrupulum semis, m. f. pulvis, qui cum aqua florum tilia, liliorum convallium, cerasorum nigrorum, pæonia, hirundinum cum castoreo, vel aqua epileptica Langii propinetur. Est mihi quoque familiaris in uso, ejusmodi specificum antepilepticum, quo in chronica epilepsia, si debito tempore & ordine usurpetur, singulares plane effectus præstitos interdum vidi.

§. IV.

Inter roborantia vero, quæ præ aliis peculiariter & speciali virtute se usque eo commendaverunt, ex vegetantium classe sunt flores lavendulæ, spicæ, herba melissæ, roristræni, rutæ, mæstranæ, succinum, lignum aloes, santalum cinereum, cardamomum, caryophylli, & ex iis varia destillata & præparata olea, essentia, decocta, balsama, liniment: ex compositis aqua antepileptica Langii, hirundinum, balsamum meum vitæ, & id genus alia. Ausura vero gryscæ in epilepticis morbis omnium antepilepticorum tum roborantium, tum sedativorum vires superat longissime. Miræ quoque efficaciz sunt spiritus cornu cervi, vel eboris simplex, aut succinatus, spiritus Bullii, oleum cornu cervi, vel eboris per crebram rectificationem in summam redactum subtilitatem. Neque decocta lignorum, maxime Guajaci, sassafras, santalorum &c. ob principium, quo pollent, refinofum siquæ laude carent; quorum usus jam apud Veteres celebratus est. Ita ALPH. FERRUS, & JACHINUS se plurimos epilepticos simplici guajaci decocto, bis de die ad sex vel octo uncias præscriptu, ejusque decocto secundario, vice potus ordinarii assumere curasse affirmant; præsertim, si tali decocto radix pæoniae, alique specifica addita fuerint; quod vero per 30. vel 40. dies ut continuetur, singulisque dosibus aliquot guttulæ spiritus vitrioli addantur, nucleosæ sunt.

Quæ roborantia
ad
epilepsiam
proficiunt.

§. V.

Habent vero etiam tonica ac nervina extrinsecus adplicata eximium usum. Sic pulveris ex herba majoranæ, floribus liliorum convallium, spicæ, maro vero, succino, pulvere caryophyllorum aromatizationem, benzoe & nucisæ compositi, & capiti crinibulque infusperi usum in epilepsia, aliisque gravioribus capitis morbis depræhendendi præstantissimum: quippe qui præter nervinam virtutem, etiam humores viscidos & spissos incidentem possidet efficaciam; unde illius intra nares quoque susceptio ad colligendum tenacem pituitum egregie convenit. Hæc autem proposita remedia in corporibus senescioribus potissimum, & ad cachexiam proclivibus, inque epilepsia chronica, extra paroxysmum pariter ac ad præventionem, rite adhibita, insigni efficaciz sese à longo jam commendaverunt tempore.

§. VI.

Verum cum vero antequam adhibeantur Epilepsia

com-

*Caractere
epilepsie
distinguitur
a
aliis
morbis.*

commendata hæcenus remedia, necesse est, ut causæ materiales malum sustentantes, quantum fieri potest, removeantur. Quare si sanguinis, in vasis ac membranis cerebri incarcerationi atque stagnantiæ colluvies malo nostro originem præbuerit; & hinc vasa cruento turgent, vel ipse impetuosius ad caput rapiatur, quod sæpius fit in hypochondriacis, melancholicis, sceminiis gravidis vel hysteriis &c.: tum sanguinis missione, detractioes ac revulsiones à capite ad inferiores partes, præsertim circa talum instituantur, nec non hirudinum ad venas, quæ in animum explicantur, appositiones & utilissimæ, & summe necessariae sunt. Hoc in passu consentiunt mecum peritissimi & nostrorum & veterum temporum Medici; quos inter conferri merentur GALENUS *tr. de cruatione per sanguinem*, MERCURIALIS *Tom. IV. consil. 45.* ZACUTUS LUSITANUS *Lib. 1. de med. princip. lib. pag. 45.* CELSUS, RHASIS, SCHENCKIUS *Lib. I. pag. 113. obs. 3.* RHODIUS *Cent. I. obs. 64. 65.* nec non SYLVATICUS *Cent. I. consil. 45.* qui pro revulsione & derivatione commendat, ut sanguis singulis mensibus bis ad quatuor uncias ex venis sedalibus elucatur. Interdum nec alienum est, venas jugulares externas aperire, & stagnanti in sinibus duræ matris sanguini liberiori exitum & motum conciliare: hinc epilepsia sectione venarum jugularium curatæ exemplum allegatur in *M. N. C. Dec. 1. ann. 1. obs. 244.* Nec denique sine fructu ipse cucurbitula cum scarificatione cervicis & paribus capit vicinis apponuntur; modo, si plethora ad vasa minimum urgeat, ea prius per sectionem venæ in inferioribus partibus fuerit diminuta.

§. VII.

*Caractere
epilepsie
distinguitur
a
aliis
morbis.*

Alia vero curandi ratio est, quando morbus ex sero imputris in capite, ejusque membranis, & vasis hærente suam traxerit originem; sicut in corporibus cachecticis, scorbuticis, ab improvide curatis tumoribus pedum oedematosis, vel antiquis ulcerationibus, aut fonticulis præmatute consolidatis, vel retropulsa scabie, tinea capitis, aut imprudenter abscissa phœca poliorica &c. contingit: tum curatio feri impuriis discussione, evacuatione, & ad alias partes derivatione erit perficienda. Hoc scopo præter alonica serum per alvum educuntia, ac humores impuros depurantia pharmaca, Veteres æque ac Recentiores ad educendam visiosam materiam commendaverunt setacea, fonticuli, cauteria atque vesicatoria. Conf. HIPPOCRATES *Abro de morbo sacro §. 7. seqq.* TULPIUS *Lib. I. cap. 8. in fine.* Sic apud VICTOREM TRINCAVELIUM quinquagenarius per sordum malignumque exanthema toto corpore exsudans ex caduco morbo convalescit; & apud WILLISIUM *Lib. de morbo convuls. cap. 3.* puella in ignem præcepis facta, totoque capite perusta, ac per accidens cauterisata, tandem à morbo suo libera permansit, quandoque incurata ulcera fuderunt sanient; quibus consolidata epilepsia recruduit.

§. VIII.

*Caractere
epilepsie
distinguitur
a
aliis
morbis.*

Quandocunque ex gravioribus animi affectibus, præsertim vehementiori iracundia, acrimonia acris, biliosa, caustica, volatilis, ex primis viis ad nervorum genus delata, produxerit epilepsiam: præter pulveres, qui biliosam hancce

Frid. Hoffmanni Oper. Tom. III.

acrimoniam attemperant, atque demulcent, serum lactis non minus ac temperate acidule per aliquot menses cum debito regimine usurpate, insignem pollicentur fructum. Inter medicamina egregie sunt virtutis acidula, ut spiritus vitrioli philosophicus, vel spiritus nitri bene rectificatus, atque cum floribus papaveris rheodensis & poconie in tincturam redactus, ex aquis temperantibus, diluentibus & anisipalmodicis, largius exhibitus datus. Atque profecto in hujusmodi capitis morbis peculiare quid habet aqua frigida simplicis fontanæ, & pluvialis purioris potus paullo largior: quippe quæ præter vim temperantem, humorumque acrimoniam dilucentem, partibus etiam relaxatis robat atque tonum restituendi, insigni pollet facultate.

§. IX.

Quando epilepsia oritur ex dolorum vehementia, v. g. ex calculo in uretere hærente, vel gravi odontalgia, vel otalgia, vel ventriculi ac intestinorum spasmo: tum ante omnia clysteres ex meris oleis v. g. amygdalarum dulcium inspiciens sunt: tum si plethora peccaverit, sanguis mittendus; & interne exhibenda mixtura, quæ ex aquis anisipalmodicis, liquore anodyno minerali, pulvere marchionum, cinnabari, aliquot granis m. sicc. pilularum Wildegansii & syrupo papaveris albi composita est. In epilepsia portio insitum, quæ vel ex ventris torminibus, vel lacte corrupto proficitur, vel à densione difficili produciatur, nihil est præstantius, quam idoneis subsidii acrem ex primis viis laborantem eliminare. Hinc scopo egregie inserviant clysteres ex lacte, in quo saponis veneti portio soluta est, ano crebrius insili; interne vero pulvis marchionum cum pauillulo cinnabari, vel pulvis epilepticus quidam cum extracto rhabarbari, & syrupo cichorei cum rhabarbaro & manna in electuario redactus, insigni asserit solet levamen. Neque minus sequens mixtura mirabilem sæpius præstitit opem: *Recipe aquæ lilorum convallium, primulae veris, storum tilie, cerasorum nigrorum ana unciam, lapidum cancrorum, pulveris marchionum ana drachmam, spiritum Sylicii volatilis oleosi, liquoris anodyni mineralis ana guttas decem, moschi orientalis cum saccharo probe subacti grana duo. m. d.* Laudatissimam enim moschi in compescendis insensum passionibus epilepticis virtutem plus vice simplici expensum sum. Quod si denique vermes, nervæ intestinorum tunicas arrodentes excitaverint epilepsiam: tunc antiepileptici & demulcentibus oleosis præmissis, specificis antihelminthicis, & quæ simul facultate innoxia purgante possint, adhibere oportet: inter quæ tanacetum, allium, camphora, asa fetida, semen fantomici, mercurius dulcis, zithiops mineralis, extractum elulæ primas tenent.

*Caractere
epilepsie
distinguitur
a
aliis
morbis.*

*Caractere
epilepsie
distinguitur
a
aliis
morbis.*

CAUTELE ET OBSERVATIONES PRACTICÆ.

§. I.

Quando certis periodicis, vel lunæ quadris epilepsia recurrit; vicium & sedes mali plerumque in ventriculo, vel potius duodeno, & vicinis partibus, ductibus nempe biliaris, aut ipso pancreate quaeri debet. Et tum aliquot dies ante statum periodi tempus consultum est, clj sterem in

*Ratio
epilepsie
distinguitur
a
aliis
morbis.*

picere, & vacationem vomitu tentare, quæ accommodata sit his viis expurgandis. Est autem efficacissima & securissima, quæ ex drachma dimidia radicis Ipecacuanhæ, recenter pulverizata, in decocto paffularum soluta conficitur. Postea subijuncta hæc specifica longe præstantioris erant operationis.

§. II.

Quæ inter-
dici in po-
roxyfimo
epileptico.

Ufus fri-
ctionum,
Veficatori-
um ad
causam
removendam.

Sub ipsis paroxysmis probe cavendum est à nimis volutillium, spiritaliorum, suave ac grave olentium, quæ caput vaporibus replent, usu: nec consultæ sunt ea, quæ sternutamentum, aut vomitum movent; quippe quæ humorum motus magis ad caput derivant, & sæpius ipsos revocant paroxysmos. Præstat potius ægotantem in recto tenere situ, & pedes atque manūs bene fricare: namque frictions calidæ ac siccæ insigniter profunt in epilepsia ex spasmo artuum proveniente. Veficatoria, fetacea, ac insusceptiones cervicis cum ferro candenti in puerorum epilepsia, à sori colluvie producta, licet non penitus usu suo careant: anamen aliquando noxam inferunt, & corpora languorem relinquunt atque stuporem. Contra vero in contumaci chronica epilepsia, item ubi à lymphæ acri, scorbutica suboritur, veficatoria vel fonticuli cruribus applicati, auspiciorem spondent effectum. Hinc etiam ludi cum non exiguo fructu talum ad tendinem Achillis asperunt, & ulcus per tēnētre servant aptum.

§. III.

Quæ pars
cognita in
epilepsia.

Ufus vini
p. tinctis.

In qualibet epilepsia præstat ab omni vino, atque cerevisia abstinere, ac pura potius aqua uti: de qua sæpius observavi, quod contumacem, imo à parentibus derivatam epilepsiam insigniter vel mitigaverit, vel penitus depulserit. Circa venæ sectionem notare convenit, quod ea in habitu corporis plethorico, & ubi paroxysmi circa æquinoctia invadunt, vel solstitia, maxime in hypochondriaci, hæmorrhoidarii, atque melancholici in talo, præmissis clystere viscidis humores cum flatibus evacuant, insinuanda sit. Quando etiam hypochondriaci passio epilepticum suscitavit morbum: tum præmissa pro re nata venæ sectio, potum aquarum temperatarum mineralium, minime vero balneum, accessiones mitigasse novi.

§. IV.

Quid de
antepilep-
ticorum
usu so-
lentem.

Ante specificorum antepilepticorum usum, evacuantia, temperantia & alacritas exhibere oportet: alias enim plus damni inferunt, quam emolumentum. Quodcumque malum ab externe capiti illata violentia, & hinc suborta flagnatione vel extravasatione humorum in capite originem traxit: tum cinnabarina rite preparata, ad est in tenuissimum polinem crebriori trituratione aut levigatione in marmore redacta, quo ejus particule in massam sanguinis abire queant, & interne largius cum alius cephalicis ac dia-phoreticis exhibita, vere specifica ea possent efficacia; quæ in hoc casu quo gaudent virtute, lympham stagnantem resolvende ac discutiente absolvitur. Inter externa remedia ad compescendos motus effluens infervientia, nihil deprehendi præstantius sumentis ex exangia humana urtica una, olei nucis moschata expressæ unctis dimidia, olei rosmarinii, lavendule & rute ana drachma una compositis, ac cervici & spinæ dorsii inunctis. Quando æger eo fruitur beneficio, ut

imminentem prævideat accessionem: tunc opera est pretium, malo occurrere clysteribus, partium inferiorum frictionibus, ac recto vivendi ordine uti.

§. V.

Opiata & nimis vaporosa infantibus & debilibus castissime præbenda sunt, utpote quæ ingentem cerebrum & nervosa partibus inbecillitatem & atoniam inducunt. Ex cerebro usu syrapi discodii in infante lethalem epilepsiam animadverti: vidi quoque mentis stuporem infantibus remansisse, quibus pulveres anodynæ & theriacalia frequentius fuerant exhibita.

§. VI.

Quam denique morbi comitialis ea sit indoles, ut à levissimis recidat causis, & à multis pharmacia magis exacerbetur: præstat omnino, ab horum multitudine abstinere, ac pernitenti videtur observatione, gravem hunc præcavere morbum. Hanc paucis verbis, sed satis egregie complectitur CORNELIUS CELSUS, dum Lib. III. Cap. 23. dicit: *Fugere oportet solem, balneum, ignem, omniaque calidiora: item frigus, vinum, venærem, loci præcipitis conspectum, omniumque terrenorum, ventum, lassitudinem, solitudinem, negotia omnia; & ubi tertio die cibum datus est, internitere quartum.* Vitanda quoque dulcia, fermentescibilia, fructus horæ, præsertim in infantibus: præterea adolescentibus maxime abstinendum est à venere: vestitus enim scribit MERCURIALIS in præf. pater. pag. 572. *adolescentes Germanos plurimos à vinis venere fieri epilepticos.* Evitanda porro sunt nimis mentis fatigationes, siquidem, teste CELSO, *quibus caput afficitur, ne cogitatio quidem tuta est.* Hujus memorabile exemplum allegat GALENUS Lib. V. de loc. affect. c. 5. dum *Grammaticus quidam juvenis, ait, quatenus vel nimis vehementer doceret, vel cogitaret, aut esseret, comitiali morbo corripiebatur; & hoc ipsum sane est; quod de Francisco Petrarcha increbuit, cum post multas profundasque meditationes tandem incidisse in epilepsiam. Maxime omnium vero fugienda sunt omnes ad terrorem, metum, & itam occasiones; nam facillime malum inde revocatur.*

ENARRATIONES MORBORUM.

OBSERVATIO I.

Puella XII. annorum, habitus corporis stric-tioris, valde plethorica, floridæ faciei colore conspicua, largo aspectu, maxime panis gaudens, & alvi puritatis obnoxia; incidit post vehementem terrorem in gravem epilepsiam, cum omnium sensuum abolitione, ac artuum violenta agitatione stipatam: cujus duo priores paroxysmi ultra binas inhæserant horas, cum insigni vultus rubore, ac vaporem eximia turgescencia. Accersitus quidam Medicus, sub ipso tenio paroxysmo stylum naribus intrudit: quæ cruentate ultra tres sanguinis fuderunt uncias, cum momentanea paroxysmi remissione. Tum & ego consultus deprehendi pedes adhuc insigniter frigidos; quare ut motum humorum ad partes inferiores derivarem; clysteres injeci, & puellam bis quotidie in temperata pediluvia, ex aqua simplici parata descendere jussi. Posthæc, exhibui insulam theiforme ex floribus tilia, & herba melissa confectum,

Opiatorum
usu.

Preceptum
autem mor-
bosum.

Epilepsia
ca. tremor,
serena
hæmorrhoides
soluta.

Etiam, & quavis vespere pulveris mei antiepileptici dosim propinavi: quibus factum est, ut dñum hoc malum penitus omnino depelleretur.

Epilepsis.

Epilepsia hæc à nulla alia causa originem trahit, quam à sanguinis & humorum vehemēti ad caput congelitione, per insignem terrorem excitata. Hujus enim ea est vis ac-indoles, ut externas corporis partes frangendo, succos vitales majori copia ac impulsu ad interiora, & præcipue caput compellat. Et hanc eo facilius ac violentius terror exferere observatur efficiam in infantibus ac junioribus; qui gula nimis indulgent. Inde enim non solum primarum viarum fordes acide producuntur, quæ fictioris appetitus tactum non semper causæ existunt: verum etiam sanguis copiosus, simul tamen crassus ac viscidus generatur, qui ad caput raptus, membranas cerebri eo facilius ad violentas protritare valet stricuras. Hoc in nostro casu apparet ex vultu rubore & vasorum turgescētia sub paroxysmo: hinc etiam non alienum fuit, sanguinis fluxum per nares promovere, & sic illius progressum per caput reddere liberiores. Sed notari meretur, post ejusmodi vacuaciones sanguinis, humorum motum protinus ad inferiora esse revocandum: alias enim facillime recurrerent epileptice agitationes. Quod cum crebris pediluvii ac clysteribus factum fuerit: tum opera fuit pretium, pulveres epilepticos propinare.

OBSERVATIO II.

*Epilepsia à
menstruis
per terrorem
sup-
pressis orta.*

Puella Hebræa, XIV. annos nata, corporis stricioris sed vasa capacious instructa, præviā hinc inde spasmodicā stricuras, mensium fluxorem primum incidit. His per biduum fluentibus, relatum ipsi fuit, patrem peregre factum subisse mortuum. Inde puella, more hisce gentibus consueti, tanto percussa fuit terrore, ut non solum menses protinus supprimerentur, verum etiam extrema mox refrigerarent, cor palpitare cœperit, vehementes jactantia occuparent anxietates, & denique in ipsam incidere epilepsiam: sub qua corpus violentius agitabatur, pollices contraherentur, dentibus stridebat, eoque adeo commovebatur, ut vi effringi deberent. Quidam mecum consultus Medicus suavitatem, ut stylo in nares protruso, sanguinis effluxus tentaretur: at ego, cum mensium suppressio malum fovcret, ne major humorum ad caput fieret affluxus, eorumque per uterum fluxor impediretur, diffusum hoc remedium genui, & potius jussi, ut sub fine paroxysmi, pedibus in aquam missis, sanguis mitteretur. Quo facto statim ad se rediit, & tum injectus fuit clyster oleosus ex floribus chamæmeli, sambuci, malvæ, tilia, oleo lini &c. paratus. Recruduit quidem aliquoties paroxysmus, sed erat levissimus: hinc ægram potare jussi insulam calidam ex herba mellissæ, floribus tilia, & semine cymini: & quavis vespere dedi pulverem meum antiepilepticum. Denique cum insisteret menstrua periodus, aliquot ante eruptionem dies propinavi pilulas meas balsamicas, & pulverem præcipitantem nitrosum: quibus factum est, ut redierent menses, & ægra à malo suo perfecte liberaretur.

Frid. Hoffmanni Oper. Tom. III.

Epilepsis.

In tali casu, ubi menses sunt suppressi, & motus ad superiora vergunt, præstat venam in pedibus incidere, ut motus deriventur ad uterum: neque ideo congrua fuit narium ad hæmorrhagias procatio. Vocari meretur hæc epilepsia *uterina*, quoniam ab utero transit originem. Elucescit simul ex hoc casu, haud prius in usum vocandos esse pulveres sedativos específicos, quam ubi inversi humorum ad caput motus, qui à spasma & sanguinis plenitudine non, fuerint sedati: tunc enim adhibiti tales pulveres ab ulteriori mali insultu præservant. Nec rari mihi occurrerunt casus, semina octavo jam mense gravidas, ab ira, dolore, aliusque animi affectibus in epilepsiam incidisse: largiori vero sanguinis ex vena in pede tusa missione, ac pulveribus cinnabarinis cum nitro ac succino perfecte convalescere.

OBSERVATIO III.

Infans tres anni quadrantes natus, corporis spongiosi ac obesi, qui sæpius ventris torminibus cruciari, & sterora viridia dejecto sueverat, nutritis à spectro sibi videri putatus gravi terrore perculsus ubera sugens, protinus corripitur epilepsia. Neque vero ignorari oportet, nutriticem hanc jam antea alii infanti ubera præbuisse, & sic per septem jam anni quadrantes muni hunc præstulisse: quod meo quidem arbitrio minus salubre lactantibus est, quoniam diuturna lactatione lac incipit accrescere. Protinus ergo infanti injectus fuit clyster emolliens oleosus, & interne dicta mixtura ex aqua liliorum convalescentium, florum tilia, cerarum nigrorum, pulvere marchionis, syrupo de cichorio cum rhabarbato, liquore anodyno minerali, & unico moschi orientalis grano parata; nutriti vero propinavi pulveres bezoardicos cum aceto destillato, & infuso theiformi cum regimine despoico; atque hinc protinus cessavit epilepsia. Verum enim vero aliquot post hebdomades, cum infans achoribus capitis corripitur, & hi unguento illi repellentur, recruduit epilepsia, & alvus obstruita non nisi virides reddere cœpit feces. Hinc ablactato protinus infanti adhibebantur iterum clysteres, & dabatur partim pulvis ex rhabarbato, lapidibus cancerum, & semine cymini compositus, partim mixtura ex aquis antiepilepticis, specifico cephalico Michailis, liquore anodyno miceralsi, spiritu eboris & syrupo pæoniarum parata. Efficetum etiam his est, ut restituta alvi libertate, epilepsia remitteret: sed hæc tamen singulis adhuc mensibus bis vel ter recruduit. Ordinatus igitur pulvis antiepilepticus misigavit quidem malum; illud tamen singulis tribus mensibus recidit, & hæc ad annum ætatis quartum egit scenam. Tum denique infans colli tumoribus inflammatis, inslar carbunculorum infestabatur; quibus exulceratis, ab omni profus liber evasit epilepsia.

Epilepsis.

Ex hoc casu discimus: 1) epilepsiam infantum à matris terrore per lac illis communicari excitari posse. Namque ea est terrores indoles, ut non solum partes solidas afficiat, sed etiam in humores agat, eos fortiter commovendo;

B 3

qua

qui dum cum lacte ad primas infantum vias pertingunt, ibidem majorcm subeunt acrimoniā, & hinc ad cerebrum delati epilepticos inducunt motus.

2) Nihil ad reprimendas capitis ulcerosas efflorescentias reperitur valentius, quam pinguis ac oleosa. Ea enim, dum poris cutis se intine indignant, neque tam facile ex iis evocari possunt; ita salutarem impediunt transpirationem, ut ideo serum acre impurum intra corpus remaneat, & membranas cerebri incumbens, eas graviter afficiat. Præstat potius in tali casu, primas vias blando laxante, vel clystere purgare; & externe caput aqua d'argusade ablueri; quæ egregie succat, & labefactas corroborat partes.

3) Epilepsia à consolidatis ulceribus facillime recrudescit: quo casu, præsertim in adultioribus, vesicatoris vel cauterii nihil est præstans. Hinc etiam in confirmata epilepsia SEPTALIIUS *Lit. VI. animadv. p. 173.* vesicantium usum per universum caput commendat, diutius ulcusculis in cute capitis relictis: contumacissimos enim morbos capitis hac ratione curatos vidit.

OBSERVATIO IV.

*Epilepsia
ab externa
causa
excitata.*

Epilepsiam ab externa capitis violentia atque læsione admodum obnoxia sunt metallorum sulfures; præsertim ubi mineras ac saxa metallica, accenso pulvere pyrio distringunt. Namque tale frustum capiti alligatum, tantum ipsi contusionem inferre valet, quanta pro excianda sufficit epilepsia. Sed in eo casu nihil vidi Claustrarii præstantius ac efficacius cinnabari, sive sit nativa, sive antimonii largius exhibita; cujus nimirum ac fucini præparati scrupulus unus bis quotidie ex aquis cephalicis missile, siliorum convallium, florum tilie propinari, & per decem circiter dies continuari debet. Neque verum tamen neglenda sunt externa, quæ inter laudem merentur, primum epithema ex caryophyllis aromaticis, floribus chamæmeli Romanæ, herba rosamarinum, floribus lavendule cum vino decoctis paratum, & affecto loco appositum; deinceps cucupha ex caryophyllis, cardamomo, & cubebis toti capiti applicata. Quibus denique eo majori fructu adjungitur insusum theiforme ex carduo benedicto, summitatibus millefolii & floribus tilie. Hac quoque ratione pristina sanitas olim restituta virum sexagenarium, qui à scala præcepit in caput factus, primum omnibus privatus sensibus, mortuusque habebatur; ut incisâ vena, atrocem incidebat epilepsiam, quæ per octo dies, singulo vel decies invadendo inharcebat, tandemque recensita methodo sublata fuit.

Epiresis.

Notabile est, cinnabarin magna, uti hæctenus vulgo creditur, vi sedativa ac anodyna non polleere: sed potius, more mercurialibus consueto, discutiendo, coagula humorum resolvendo, ac diaphoretin movendo virtutem suam exercere. Hinc non secus ac æthiops mineralis, præsertim ex antimonio paratus, in omnibus contusionibus ac sanguinis stagnationibus mirificam præstat opem; maxime si simul lapides cancorum cum aceto saturati exhibeantur. Huc pertinent observaciones passim in Medicorum

scriptis occurrentes, de epilepsia salivatione curata: qualem reperies in *M.N.C. cent. IV. obs. 136.* ubi puella novem annorum, à parente, qui antea lue venera laboravit, nata, incidit in epilepsiam sæpius recurrentem: quæ postquam trochiscos *Serretæ*, qui continent mercurium dulcem, masticando devoraverat, alvum habuit fecies solutam: & tum sequens salivatione, ab epilepsia facta fuit immunis.

OBSERVATIO V.

Virgo generosa, xx. annorum, *linguinea-Epilepsia* succiplena, acidorum usum nimium indulgens, & multis abhinc annis acetum vini larga copia quotidie ingurgitare solita, incidit forsan ante aliquot annos in febrem, ex Medici sententia ardentem; quæ bezoardicis, maxime volatilibus, tractata fuit. Facta quidem hinc est quintot morbi die symptomatum remissio; at vero paroxysmi erant valde irregulares, & mox singulis, mox alternis diebus, sæpius bis uno die cum horrore & infrequentè assu invadabant. Alvus subinde, quæ ante morbi invasionem jam pigra fuit, per totum morbi decursum manebat adstrictissima; nec solvi poterat, licet variis ac sine assumeret remedia: clysterum enim infusionem renuobat omnino. Tandem pulveres purgantes, ex salibus & jalappa confecti, quorum per septem dies, singulis unum adsumebat, aliquantulum ducebant alvum; parum tamen proficiebant; siquidem febris cum symptomatibus persistebat, nec somnus ullus, nec adpetentia ciborum per xv. septimanas aderat. In tali rerum statu præter omnium opinionem circa tempus menstruum erumpentem convulsiones epileptice: sub quibus facies adparebat rubicunda, membra hinc inde agitabantur, quandoque fortiter clamabat, & absorta loquebatur, ac male coherens. Ipso quoque in paroxysmo humidum adpatebat, & oblatum eo line aquam frigidam copiose bibebat. Hinc laxata alvo, mens ad se rediit; sed posthæc febricula cum languore corporis, adpetitu prostrato, alvo segni, urina crassa, obscuri coloris, semper persistebat, & illa perpetuo morore & angore infestabatur. Ceterum epilepsia circa tempus mensium, quandoque extra illud, si ira exandesceret, recruduit cum spuma oris, corporis elevatione, artuum agitatione, mentis alienatione, & magna vociferatione. Hæc aliquoties contingebant, & quod notabile est, cum toto morbi tempore nec ederet, nec dormiret ægra, tamen & succulenta manebat rubicunda. In usum ergo vocabantur omnis generis remedia antifebrilia, laxantia, salia aperitiva, castorina, antispasmodica, venæ sectiones; sed nihilo minus & febricula & epilepsia per sedecim inharcebant hebdomades. Tandem subit ægra conjugii leges, & tum melius habere coepit: cibum appetit, vires collegit, menses ordinem servarunt, ac paroxysmi epileptici penitus remiserunt.

Epiresis.

Fœminæ, præsertim salaciores, haud raro partim ob mensium defectum, partim etiam à lymphâ genitali stagnante & corrupta, atrocissimos incurunt motus epilepticos. Horum in nostro casu antecessus causa fuit acidorum abusus: hæc enim defluunt ventriculi ac intestinorum tonum, alvum costringunt, & mensium

Ruo-

fluorem impediunt. Hinc sanguis in venis accumulatur, & sic circa mentis præcipue pericordium, ubi ad evacuandum per uterum cruorem solennes spasmus insilui solent, cum magno impetu partim ad caput, partim ad pectus compellitur: uode etiam facies rubicunda, ac sanguine turgida, vociferatio, partium agitatio, atque delirium dependent.

Pessime autem in nostra ægrotante egerunt Medici, qui ipsi dederunt falsa volatilia: hæc enim & alvi constrictioni facies firmatur, & intestinorum tonus plus destruitur. Et perpetua sane est regula, quod, quo constrictionis est alvus, eo plus sanguinis ad superiora rapiatur, & vehementiores ibi fiant spasmus. Hinc consultus fuisset, clysteribus oleosis alvum moliri; qui præstantissimum adferre solent lenimen. Nec proficua fuerunt in nostro casu anodyna & antispasmodica: quippe quæ, sublata nondum causa, malum reddere solent contumacius. Neque succedere sole venæ sectiones; licet alias usu suo haud destituantur; nec denique utiles fuerunt acidula, quibus usa est ægra. Hæ enim frigida nocent nervis; & cum ob debilitatem intestinorum per alvum haud iterum excludantur, sed in intestinis stagnant, spasmos magis adaugent. Hinc præstantissimum mali remedium fuit in conjugio: hoc enim, præsertim si frequentior celebratur concubitus, sanguinis motus inveniunt, ad uterum retrahitur; vasa uteri, teste HIPPOCRATE, distenduntur, incallescunt, mensum fluxus procuratur, & sic remota causa, ipsum malum debellatur.

OBSERVATIO VI.

*Epilepsia
à lumbrici-
bus, alijs-
que causis.*

Puer XIV. annorum, quinta jam à nativitate hœa infultu correptus fuit epileptico. Annum nati corpus, post vehementissimum nutricia iram, duris tuberculis undique obducitur: quæ Medicus pro variolis ventosis habens, lumbis inde valde adfectis applicat emplastrum. Hinc protinus evanescunt omnia tubercula: at vero in eorum locum succedebat epilepsia cum spuma oris, atque mirifica artuum tractione; & per aliquot septimanas quotidie hora circiter pomeridiana prima recurrebat. Posthæc remittebat, nec sub variolis postea accedentibus recrudescerebat; nisi forte semel sub dentium eruptione. Verum enim vero sexto ætatis anno, cum lumbricorum colluvies intestina occuparet, resurgere graves epileptici insultus; & ad annum usque decimum quartum sæpius, maxime ventis impetuose flantibus, celo turbato ac pluvioso, & tempestate autumnali invadebant. Præcedunt paroxysmum maxima anxietas, pedes, manusque refrigerant, dentes dolere incipiunt: tum humum prosterminur, & post paroxysmum capitis dolorem, & corporis totius retinet lassitudinem. Neque minus ante paroxysmum flatulentia imi ventris exerceatur; imi vexatur, & urinam reddit albam; sub illo facies fit tumida bruni coloris. Olim quoque pigra fuit alvus, jam expeditior. Neque ulla hæcenus profuerunt remedium generis: quid? quod salivatione tractatus poer pejor habuit, sanguis erat viscidus, omnique colore destitutus.

Epilepsia.

Epilepticam hæc affectionem ab intestino-

num lumbricis ortam esse, certissimum quidem est. Cum autem nervorum genus jam à primis incunabulis, & deinceps à tuberculis retropullis, hæc motibus jam adiectum fuit: non mirum, si ob hæc dispositionem paroxysmi jam fierent atrociore & contumaciore. Notatu subinde dignum est, quod ab applicato ad lumbos emplastro, procul dubio narcotico, tubercula illa protinus evanuerint. Locus enim hæc circa lumborum vertebra, ubi insignes nervorum occurrunt plenus, valde est sensibilis; cui si admoventur narcotica, habitus corporis constringitur, humorum circulus fit tardior, & noxia materia ad interiora repellitur. Quare magna cum cautione topica ad hæc regiones applicanda sunt: & nota multa sunt exempla, quod in seminis ab emplastris, hoc in loco admotis, menses adeo cohibiti fuerint, ut nunquam redierint. Novi etiam plures casus, ubi in viris post impositum, ad refræmandam gonorrhœam, lumbis emplastrum ex spermate ranarum, alumine, saccharo saturni & oleo hyoscyami, ingens testiculorum tumor sequutus fuit.

Neque minus notari meretur, quod malum sub venosâ aëris constitutione fuerit exacerbatum: mirifica enim est aëris in partes nostri corporis solidas, maxime nervas, & quæ sensibus atque motibus interserviunt, potentia. Et quod denique ægrotans noster sanguinem exhibuerit mucidum, rubedine privatum; ceno est indicio, ipsum fuisse cachecticum, qualia corpora epilepsie chronice admodum deprehenduntur obnoxia.

Anno demum ætatis decimo quarto sublata fuit hæc epilepsia; postquam per semel itro elixirium nostrum balsamicum, & sal volatile oleosum ad xxx. guttas sub epulis sunt usu pata. Hæc enim remedia blandum spiritalcentiam chylo ac sanguini restitunt, & solidas partes corroborant; sed temporis beneficio ac diuturnitate opus est. Tandem vero hæc curatione confirmatur aphorismus Hippocratis, quod epilepsie chronice non nisi ætatis, aëris, ac vitæ mutatio curentur.

OBSERVATIO VII.

Puerpera XX. annorum, sanguineo-cholerica, constitutionis admodum sensibilis, & ob inordinatum victus regimen hysterica olim obnoxia passionibus, lochiis autem bene succedentibus gavisâ, die à partu undecimo ex esu anguillæ corripitur febre tertiana, sub qua more suo alvi fuit adstrictio. Consultus Medicus dedit primum pulveres ex conchis preparatis, antimonio diaphoretico, nitro, & arcano duplicato confectis; hisque circa quartum paroxysmum corticem chinæ subjunxit. Tercio autem post hujus usum die incidit ægra atrocissimos convulsivos, & epilepticos motus, cum intercurrentibus animi deliquiis, & præcordiorum anxietatibus.

Epilepsia.

Spasmodicam commotionem causa sæpius in primis viis, sabura acris, caustica referitur, residet, quæ, nervosum genus afficiendo, seminas præsertim in hysterico-motus jam proclives, facillime in epileptico-convulsivos conjicere potest insultus. Sic etiam nostra ægrotans ex esu anguillæ, quæ robustiorem ventriculi

digestio.

digestionem expolita, collegit sibi et primarum viarum cruditates, & ex his febrem incidit tertianam. Hunc vero febris fomitem, qui in puerperis magis adhuc variis sordibus adaugeri solet, consule Medicus statim ab initio blando laxante expurgare debuit. Sed cum parum fixioribus terreis, parum adstringentibus hancce saburram magis compactam reddiderit, ac intus retinuerit: non mirandum, si ipsius, qui semper in febrium principio junguntur, demum in ipsa abierint convulsionem.

Jam ergo eo intendere oportet curationis scopos; ut porrim fordes biliosas, acres corrigantur, & blande educantur; parum etiam motus perversi conspiciantur, ne diutius perferantur, & in habitum transeant. Quomodo in ipso paroxysmo naribus admoveere convenit nisturam ex spiritui salis ammoniaci visco, essentia assueti, & oleo rure paratam; cujus visus in illo, quod nervis est inimicum, discutiendo egregia est.

Sordes primarum viarum optime educunt pilule mee polychrestas, cum extracto clamaeneli, millefolii & croci mixtas: cui quoque scopo clysteres emollientes ac oleosi inserviant, maxime si illis, ad discutiendos flatus, tantillum niri & camphoræ fuerit additum.

Nec minus ad corrigendam humorum acrimoniam insigniter proficiunt pulvices ex lapideis cancerum, pulvere marchionis, nistro, cinnabari & arsenico duplicato compositi; nec non aque antiepileptice cum essentia corticum aurantium.

Diximus ceterum ex hac morbi historia, quam perniciosam sit, in puerperis nimis mature, præposse & ante sordium evacuationem cortice chinæ vel aliis adstringentibus febriles motus suppressere, & noxiam materiam intus retinere. Hinc enim spasmos febriles in epilepsiam degenerare posse animadvertimus: qui tamen alias ad resolvendas viscidas fordes ac viscerum obstructions, ideoque ad epilepsiam quoque curandam ac præservandam almodum sunt idonei. Quare recte scribit HIPPOCRATES, quod quartana epilepsie superveniens eam tollat.

OBSERVATIO VIII.

*Epilepsia
in 1790 et
tertiana
supervenit.*

Vir xx. annorum, constitutionis tenerioris, ante tres circiter annos febre tertiana correptus, & ab ea copioso cortice chinæ usu vindictus est. Abhinc adpetitus languidior esse coepit, præcordia ingens pressit anxietas, & insignis spirandi difficultas: febris quoque nonnunquam rediit, sed valde irregularis. Posthæc ex improvise mentis abalienationem incidit, quæ cum omnium sensuum perturbatione, memoria defectu, animum iustatione, & vulnus rubore stipata, brevi quidem tempore transiit: accessiones autem hujus nulla fuit remissionis. Hoc denique malum tandem excepit fortis epilepsie insultus, qui cum ordinariis symptomatibus sæpius, ac incertis periodis repetit, & mentis abalienationem, paroxysmi semper habuit præmonitionem. Ceterum color faciei est pallidus, adpectus mediocris, ventriculi inflatio, intestinorum murmur: ab epulis mollicius sæpe in ore percipitur ardor, sitis ingens in jejuniis, & magna ad sudorem proclivitas. His denique duos ante mensis spontaneum, & per tres hebdomadas inha-

rens accessit alvi profluvium, sponte remittens. Ipsa epilepsia novissimo anno penitus evanuit; sed eo frequentior est mentis abalienatio, quæ sæpius paroxysmos formas, & nonnunquam ter in una recrudescit hora. Consulti & clarissimi Medici, & adhibita præstantissima remedia, nullam hæcenus malo operam tulerunt.

Epilepsia.

Adparet & ex hoc casu, omnem febrium intermittentiam, quæ in infimo ventre, ac infarctis primis officinis fomitem suum habent, adstrictionem atque suppressionem, quæ ante viscerum refectionem, & sordium ex primis viis eliminationem fit, esse nocentissimam. In nostro nimirum agrotante tertiana febris procul dubio ex viscerum infarctu ortum traxit. Cum vero febrilis illi motus, qui ad resolvendum illum infarctum destinati sunt, præposere fuerunt suppressi: hinc factum omnino est, ut & lymphæ gastricae, quæ ex glandulis pancreatis acque duodeni aditus distillat, & bilis, quæ digestionem perficiendæ egregie inservit, à naturali crasi recesserint. Hinc autem turbata digestionem, pellime in primis viis cumulate sunt cruditates; à quibus suborti fluxus ac spasmi intestinorum, horum non solum nervas partes graviter affecerunt, verum etiam totum nervorum genus, capitisque membranas in violentorum motuum rapuerunt consensum. Haud enim raro insultuum epilepticorum origo ab intestinorum flatulentia, & spasmodica crispatura natales suos mutuatur.

Curatio vero hujus mali sequentem in modum instituta est: primum singulis septimanis datum fuit elixirium emeticum, quod placide & sine violentia ventriculum ac superiora intestina à viscosi liberavit cruditatibus. Deinceps quotidie bis, mane nimirum ac vespere ex aqua linorum convallium sequens pulvis sumus est: *Recipe pulvis marchionis, cornu cervi fusi igne, matris perleram, antimonii diaphoretici, lapidum cancerum, succini preparati ana drachmas unam, cinnabaris drachmam dimidiam, essentia ambra guttas xx. m. d. diss. est drachma dimidia.*

Tum quoque sub epulis adhibuit eger elixirium stomachicum, ac essentia corticum aurantium, tinctura tartari, oleo macis & cardamomi paratum; & pro potu ordinario decoctum ex radice peronis, visco querno, radice chinæ, scorzonæ, herbe melissæ, rasura ligni aloës & semine foeniculi confectum ususavit. Alvus segnis refoverat est clysteribus emollientibus, oleosis, qui simul herbas cephalicas nervinas, veluti abrocarum, majoranæ, origanum, faturejam, rutam, rorem marinum, flores lavendulæ, & sal commune habebant: & denique infusus fuit brachiis foniculus. Ex quibus rite usurpatis atrox hoc malum, quæ Dei est gratia, debellatum fuit.

OBSERVATIO IX.

Fœmina xxx. annorum, constitutionis valde sensibilibus, affectibus animi, præsertim iracundiæ dedita, à parentibus morbo melancholico affectis progenita, hæcenus sterilis, ex inopinato mariti morbo insigni oppressa fuit morore. Quo tempore cum ipsi mentis fluerent, &

*Epilepsia à
terreno,
menstruo
morbo du-
centum sub-
lata.*

& sub eo fluore nuntiis de ipsa mariti morte accedente tristissimus; illa vehementi terrore percussa, mensum suppressionem protinus incidit. Hinc anxia, inquieti, infomnis reddita, nullum assidue cibum; sed verba sine ordine loqui coepit. Tum spasmodica primum faciei torura, quam cynicam vocant; correpta, denique graves, atrociores toleravit convulsiones; quibus nec sanguinis missiones, nec ulla remedia opem ferre volebat. Tandem purpura rubra nullum quidem mitigavit; illud autem minime remisit penitus; sed circa tempus mensuum pertinaciter recruduit, cum tanta mentis perturbatione, ut à multis furori vicina haberetur. Hinc in ulum vocavit thermas ac acidulas, cœlum sæpius mutavit, multorumque Medicorum consilia imploravit: sed rediit nihilo minus malum, licet minori atrocitate. Verum cum denique secundas subiret nuptias, ab affectu suo proflus fuit liberata; & tum nuntiatum est, eam olim veneris ac libidinosis cogitationibus nimium indulgisse, ac hinc violentos hosce motus subiret coarctasse.

Epilepsia.

In subjectis sensibilibus ac imbecillioribus, quæ natura debile nervorum genus habent, & ad irregulares motus obnoxia deprehenduntur, veluti sunt saniores, maxime salaciores præ viis, nihil magis ad graves cerebri affectus & epilepticos motus inducendos valet, ac si sub ipso hæmorrhagiarum, maxime mensum fluore vel animo corampefiant, vel vehementi petulantur terrore. Eo magis hoc contingit, si diuturnus moror præcesserit, quo nervosæ partes debilitantur, adeo, ut accedente terrore humoribus copiosius suscipiendis, & hinc spasmodicis striculis subeundis magis reddatur idonea. Quo vero celerius hæc adfectiones ex allegatis propullulant causis: eo etiam graviores, contumaciores, ac curatu sunt difficiliores. Nostra equidem ægrotans ab erumpente purpura omnino mali sui aliquale percepit levamen. Hæc enim, sicuti ex stagnante & corrupto sero, vel lymphæ originem trahere, & ideo puerperia etiam, si lochia haud rite fluant, familiaris esse solet: ita quoque eadem ad corporis superficiem prorumpente, acrimonia nervis insensæ expellitur, & sic pabulum malo epileptico subtrahitur. Opiatum autem auxilium ex transitorio redundavit; quippe quo libido extinguitur, menses suppressi revocantur, ærumna atque sollicitudines depelluntur, & toti corpori ingens accedit mutatio.

OBSERVATIO X.

Notabilis
epilepsia ab
acrimonia
nervi
sensibilis.

Trēs circiter abhinc annis ex vicina quadam urbe ad me accessit, meumque flagitavit auxilium, vir quadam rei venatoris addictus, xl. annos natus, constitutionis valde robustæ, atque musculosi & carnosissimi admodum corporis habitus. Ille nimirum ante duos menses praviæ vertigine, atque sensuum abolitione, subito in terram ceciderat, & per integram horam paroxysmum epilepticum satis gravem toleraverat: quo etiam percellebatur subinde, quoties ira exandefcebat. Quod vitam ante actam, & causas malum illud inducentes attinet: gavius erat æger vegeta olim ac illi-

bata sanitate, nisi quod per intervalla vertiginem incidere, atque sensum gravitatis, & ponderis in nucha perceperit. Alvi autem erat tegrioris; ad iram facilissimus; pro potu ordinario utebatur cerevisiæ valde lupulata atque spirituosâ; & corpus suum validis ac fortioribus motionibus, in horrida etiam cœli tempestate vi officiis subeundis, sæpe numero insigniter defatigabat. Acciderat vero, ut à Præfecto ipsius coram Principe criminum quorundam, falso quidem impuratorum, accusaretur: unde subito tam graviter animo commotus fuit, ut totum fere corpus ad præcordia usque præ frigore rigeret. Haud ita multo post, dejecta profusus ciborum adpetentia, largam cerevisiæ consuetudinem hausit quantitatē: polidide rusticulas jussu Principis persequitur, in locis humidis ac paludosis ad genas usque per octo horas obambulavit; & cum tertia die vehemens accesserit iracundia, repente incidit in dictum superius paroxysmum epilepticum, qui cum spuma oris, corporis vehementi concussione, & subsequente membrorum summa lassitudine stipatus, quater circiter recruduit. Notatu vero dignum est momentum, quod singulas accessiones præcesserit spasmus, tremor ac frigus brachii dextri; quæ sensationes abhinc ad nucham adpetentes, tandem in convulsivos desierunt motus. Pulsus ceterum satis magnus, ac validus erat; & facies florida, tumidaque. Susciit igitur sectionem venæ, quæ primum singulis diebus mensibus, deinceps autem quovis anni quadrante celebrata fuit. Ad alvum, quæ vix alternis diebus respondebat, appetendam commendavi passibus Corinthiacis rhubarbarinas, brevi ante epulas ter in septimana sumendas. Pro potu ordinario loco cerevisiæ ordinavi decoctum ex radice scorzonæ, graminis, cichorei, & rasata cornu cervi concinnatum: vespere ante lecti introitum ex largo aquæ frigidiæ haustu sumendum præscripsi pulverem, ex lapidum cancerum, concetrarum preparatarum ana drachmis duabus, succi preparati, nitri purificati ana drachma una cum dividua, cinabari scrupulo uno confectum; cuius drachmam unam pro dosi, alterius diebus cum tringinta liquoris mei anodynî guttulis mixtam adhibuit. Nec spem felicitatis hæc curatio: siquidem satis longo tempore à paroxysmo suo liber mansit. Quamobrem continuavit quidem medicinarum usum, sed rarius illas sumisit, atque refractori dosi: præterea mane infusum theiforme ex herba melissæ ac floribus tilis infusillavit; decoctum commendatum sub prandio, inter cœnam vero & vespere cerevisiam potavit: ita percitus illico pulverem nitrosum cum rhubarbo adhibuit; & sic per illos annos nullum amplius passus est paroxysmum. Quam vero nonnumquam vertiginoso insultu infestari soleat: avertere illum potest, si protinus, percepta quadam accessione balsamum meum vitæ, aliquot guttulis golytippo exceptum caribus intrinquet.

Epilepsia.



Docet nos hæc morbi historia: I. quod homines etiam robusti, succis & sanguine pleni per vehementes animi commotiones, terrorem, iram atque frigus externum repente, atque simul & semel in gravissimos capitis affectus, ac epilepticos motus incidere queant: quos affectus iracundiæ facillime revocare potest. Il-

lis enim causis facci vitales ex superficie corporis ad caput copiosius compelluntur, ibidemque nervosas partes ad spasmodicas proritare stricuras.

2.) Deinceps res notatu digna est, praesens malum absque usu specificorum, cephalicorum, ac antiepilepticorum, solis venae sectionibus, alterantibus, diluentibus, laxantibus, & bilem acriorem demulcentibus expugnatum fuisse. Nec cognitus difficultis est ratio: siquidem his remediis humorum moles imminuitur, acrimonia attenuatur, aequalis circulatio restituitur, & sic causa mali removetur. Sed horum medicamentum, utut refractori dosi postea tumorum continuatione per satis longum tempus opus est; quoniam motus ejusmodi praeternaturales facillime iterum recedunt. Quo etiam sine opere fuit pretium, post animi commotionem, ac iracundiam, absorbentia blandis evacuantibus juncta propinare.

OBSERVATIO XL

Epilepsia.

*Epilepsia
ex prima
vix ita.*

Virgo generosa, xx. annorum, sanguineo-melancholica, cujus mater ex infelici perperio comitiali formet contraxerat morbum, tribus abhinc annis ex mala vichii observatione quarantam incidit febrem; cujus singulae accessiones nausia, atque inani vomendi conatu erant sparsae. Accivit igitur Medicum, qui praemissis incidentibus, intercalari de leno dedit vomitorium: quod quidem egregium praestiterat effectum; cum autem agra vix finitis vomitibus, frigido nimium indullisset poni, enar-mes primum anxietates praecordiorum, & brevi post ipsam pulsa est epilepsia. Vocatus iterum Medicus fuisse, ut illustra largius rapidiori aqua vomitus cerneretur: quo facto evanuit epilepsia, febris remisit, & mendiosa rediit purgatio. Verum enim vero, longo tempore praeterlapso, nova sollicitas coepit affeccionem; qua saepius nausiam, ac levem animi defectionem, cum sensuione auras frigidae ex infimo ventre per latus dextrum ascendentes, spirandi difficultatem inferente, & demum in formicantem manuum sensum, quem vocant, *des Engstlausen*, abeunte percipiebat. Hoc vitium versus lunam plenam insensibilis vehementius, cum sensu abolitione, & summi defectu, nunquam vero turbabat adpetitum: sed denique, frustra datis uterinis, ac epilepticis, frustra quoque sanguine misso, quotidie recurrebat aliquoties. Tandem ex improvviso in horridum repente incidebat epilepsiam; qua paululum contopita, omnes undique ex vellis colligebat acus, calque incredibili celeritate ori intrudebat; ut ad illas commendas magno opus fuerit labore. Abhinc de insigni, atque tanta conturbabatur abdominis tensione, ut cum externa vix corrugare potuerit, mensibus ceterum rite fluentibus. Consulens ego commendavi, ut praeter exactam dietam, quavis septimana vel vovisus emetico ex radice ipocacuanhae, lapidibus cancrorum, & tartaro vitriolato confecto moveretur, vel alvus pulvere thabarbarino subduceretur; porro singulis mensibus binas cucurbitulae cum scarificatione admovebantur: mane insulam theiforme ex floribus tiliae ac sambuci forbillaretur, & ex illo liquor mens anodynus nonnunquam sumeretur. Dedi quoque pulverem meum antiepilepticum, pondere scrupulorum duorum saepius capiendum; & denique ventriculi regio-

nem ac dorsi spinam, nervino iungi iussi linimento. Horum remedium usum excepit tumor linguae, gingivarum, & glandularum colli inflammatorius, cum copiosa salivatione, per quatuordecim inherente dies. His autem ope gargarisatum debellatis, agra à malo suo per aliquot dies libera vixit, ac incolumis. Quin licet etiam recrudescerent convulsivae agitationes: illae tamen pristinis longe miciores deprehendebantur, & notabile fuit, his finitua agram ingenti semper aviditate cibos, minus quidem malitiosos devorasse. Inde de acidis ructibus, ac amaro sapore conquesta, incidebat demum in tertianam febrem: cujus horridam accessiorem epilepticus semper, utut levior, comitabatur insultus, atque vomendi conatus, saepius vomitus materiae mucida ac infipida accidebat. Curata vero congruis subsidii hacce febre, agra absque ulla virium decremento bene habere coepit.

Affectum hunc ex solo primarium virium vitio, nempe crudelitibus acido-viscidis biliosis, in duodeno stagnantibus, quae etiam quartanam progesserant, ortum fuisse, nullum est dubium; eo magis, cum in nostra agra haereditario jure quaedam generis nervi ad morbos spasmodicos deprehendatur dispositio. Hicce remotioribus causis cum denique accederet aquae frigidae post sumtum emeticum potus; non mirum, si exinde spasmus ventriculi exacerbat, primum anxietates praecordiorum induxit, ac in ipsam demum eruperit epilepsiam. Frequentius enim observavi, cardialgiam spasmoticam, si fuerit vehementior, saepenumero in epilepticos transire motus; quoniam videlicet insignis inter nervos ventriculi & capitis partes, vi octavi nervorum paris, intercedit connectio. Quemadmodum vero potus ille frigidus tam atrox malum procreavit: ita e contrario tepidior ipsi sopiendo perquam fuit opportunus. Non enim solum calore suo partes nervae, spasio tenus iterum relaxavit; verum etiam largiori copia leviorum excitavit vomitum, quo restans adhuc salubra eliminata, atque ideo omnis morbi causa remota fuit. Notatu subinde perquam dignum est, quod sub praesenti malo, & praesertim tensione illa abdominis, quae spasmorum est progenies, nientis rite fluxerint. Hunc autem fluxum minime secundum naturam fieri, sed omnino praeternaturalem esse credo, qui ex vehementi dolore atque strictione partium in imo ventre sitarum suos motus natales: unde etiam factum est, ut sub hac critica excretionem, spasmotica nihil minus continerent symptomata. Tandem vero ex hac morbi historia adparet, quod quemadmodum epilepticum malum ex febre intermittente male tractata suboriri possit; ita illud etiam nova superveniente febre iterum testissime debelleat, uti in praesenti casu tertianae esse deprehendimus. Ratio in aprico est: haec enim febres, dum obstruuntibus ac infarctibus viscerum referendis convenientissimum sint remedium; expugnando causam spasmoticorum motuum, ipsam quoque morbum tollunt.

OBSERVATIO XII.

*Epilepsia
in inter-
missa forma
secessione.*

Viginti annorum virgo, corpore strictiori, venis amplioribus ac sanguine plenis, animo autem ad iracundiam ac terrorem admodum proclivi prædita, per totum quidem vitæ suæ tempus laeto atque copioso indulset victui; sed paucissimo potu usa fuit, & ab illo per tres septuaginta dies abstinuit. Neque tamen minus iusto tempore menses satis largi fluere cœperant; & tanta insuper humorum abundantiâ infestavit, ut à decimo septimo anno bis quotannis venam in pede secundam præbere debuerit; nec sine egregio fructu. Sanguis ex vena detractus semper admodum ater, atque exigua feri quantitate præstinus adparuit. Sed cum binis abhinc annis solitam sanguinis missionem neglexisset; accidit, ut medio autumno ex improvviso convulsionibus corripereetur epileptica, cum pectoris, capitis, artuumque vehementiori agitatione, & accedentibus subinde lipothymis, omniumque virium insigni prostratione slipatis. Verum enim vero aucta succellente diaphoresi, citra aliorum remedium usum, hæc molestiæ remiserunt. Interim cum nihil secus præstinæ vivendi rationi inhæreret, solidos cibos magna cum adperentia assumeret, potui paucissimo indulgeret: factum est, elapso biennio, ut, intermissa denovo circa autumnale æquinoctium venæ sectione, post præviam animi vehementiorem excandescen-
tiam, eodem ac olim mense, atrocem rursus inciderit epilepsiam. Namque per intervalla horarum aut dierum, mox mentis deliquia, cum pulsus ac sensationis cessatione; mox vehementissimæ orationis & marmarum elevationes, præcordiorum angustie, subitundi artuum, maxime manuum, in abijciendis corporis integumentis gestus, cum pulsu celerissimo ac fortissimo, sineque ferme inextinguibili, misero discruciantur ægram. His autem post aliquot dies, per congrua antiepileptica, præsertim li-
quorem anodynum, essentiae castorei nuptum, conspiciis symptomatibus, succederant capitis dolores, cum fibrili pulsuum celeritate, æstu atque siti ingenti, pectoris opprobriatione, tussis sicca, & dolore hypocondrii sinistri atrocissimo juncti. Quamobrem sanguinis sex uncia, ex vena in pede tusa, detrahebantur; dabatur pulvis rhabarbarini, cum niero & lapidibus cancerorum permixti; proponabatur post aliquot dies salis Sedlicensis uncia una cum dimidia; purgabatur leniter primæ viæ, subjun-
gebantur pulvis diaphoretici, & liquor anodyni, ac denique elixirum viscerale sub epulis exhibebatur. Quibus denum factum est, ut ægra prælinæ sanitati perfecte restitueretur.

Epicrisis.

Docetur ex hoc casu, à sola sanguinis cra-
fi atque glutinosi, ob defectum sufficientis potus, ac motus cumalata mole, præsertim in foeminis, quando menses non sufficienter fluunt, venæ sectio negligitur, & denique iræ affectus supervenit, epilepticum malum excitari posse, à qua causa generate epilepsie longe facilior est curatio. Præterea in nostro casu spasmodica primarum viarum, non minus à stagnante ibidem sanguine productus, fibrilibus originem dedit commotionibus: quarum demum ope

materia nervoso generi inimica penitus disculsa, evacuat, & ægra denique a malo suo liberata fuit.

OBSERVATIO XIII.

Uxor viri, cujus observatione X. mentio facta fuit, eo tempore, quo maritus primum epilepsia tentabatur, gravida, peperit quidem iusto tempore infantem per omnia sanum; sed postea crebrius vel ex lacte corrupto, vel dentitione epilepticos passum motus. Neque vero tantum illi metum incusserant, ut mater Medicos consulere; sed ex dato pulvere Marchionis, cum rhabarbaro maritimo semper semiserunt.

Epicrisis.

Hic casus confirmat id, quod multoties observavi; infantem nimirum à matribus, quæ gestationis tempore gravioribus animi passionibus indulserant, aut affectibus hystericiis, antriciis atque spasmodicis nimium excruciatæ fuerant, natos facilissimos esse ad subeundis exlevissimis causis motus convulsivos. Simul ac enim lac fugant impurum, ac corruptum, protinus illos incurunt: quo quidem in casu nihil deprehendi præstantius, quam pulveres ex rhabarbari, lapidum cancerorum ana drachma una, & seminis cymini granis duodecim paratos, si eorum olivæ circiter pars bis quotidie propinetur. Hoc locum monendum omnino duxi, ut nutricum recta habeatur ratio; quippe quarum culpa plerique infantum in hos atroces conjiciuntur morbos. Omnem nimirum curam impendere illas oportet, ut lac conservent purum, nec illud, si jam inveteratum fuerit, aut nutritrices diu maternas præbereint, infantibus porrigant. Placent mihi verba, quæ de nutricum regimine habet ALEXANDER TRALLIANUS Lib. 1. Cap. XV. quæ cum totum seminem exhaustum videantur, hæc allegare haud alienum credo: *Juvare nos, inquit, curamque habere oportet, ut lac nutritricis benignum sit, & recrementis liberum; sit autem probum bonique succi, si nutritrici animam adhibeat, & exercitius ut ipsa & mediocriter exerceatur, & cibis boni succi utatur. Si lac fuerit tenue, paulo ipsam crassius efficere convenit: si crassum, extenuare quibusdam, quale est succulum, aut anethum, aut anisum, aut crucca, aut ruta, aut pœrum: omnia vero hæc, dum viridia sunt, assumantur. Evigilantur cuncta, qua menses cuncti, his enim sumentibus, necesse est, lac immitti: quare etiam venas lactentibus est inimica, lac enim tenue & fastidi odoris inde fit. Si contingat concipere, adhuc multo fit perniciosius, ac cavendum est, ne illa nutritrix puero mammillam porrigat. Lac si fuerit crassum ac caesum, exhiat infantibus convulsiones: quare opus est, ut nutritrix ante cibum corpus moveat.*

Plures de hoc morbo casus legi possunt in Consultationibus medicis, nuper editis Sect. I. casibus XXVIII. ad XXXII.

CAPUT II.

De Motibus Convulsivis.

§. I.

Definitio
Convulsivæ

Nullum morbi genus est, quod immensi ferociæ, ac horrendæ visu symptomatibus mortales excruciat, certe sunt *motus convulsivi*. Hi vero, cum à convulsivis non nisi nomine differunt, sunt *præternaturalis*, ac *summe violenta partium nervo-membranosarum & musculosarum, trunci potissimum, ac artuum externorum contractio, à membranarum, medullarum spinalium, & inde prædentes nervos cingentium, spasmodica stritura, & impetuosiori liquidi tenuissimi in organa motoria influxu excitata.*

§. II.

Differe-
ntia
convulsivæ
ab epilep-
sia.

Hinc mox adparet differentia, quæ motus convulsivos ac epilepsiam intercedit. Quemadmodum enim hujus primaria causa in nervis ipsis, quæ cerebrum ac reliquis capitibus partes sub nomine duræ, piaque meningis involvunt, membranis residet: ita è contrario convulsio vera sedes in illis membranis, quæ spinalem potissimum medullam, ac inde propulsantes nervos ambiunt, querenda est. Differunt non minus utriusque affectus symptomata; licet plerique ob archifissimum, quo hæ nervæ invicem gaudent membranz, consensum, ferme eadem, saltem admodum convenire deprehendantur. Enim vero in ipsa epilepsia observantur mentis alienatio, sensuum tam internorum quam externorum defectio, spuma oris, pollicum in manus compressio, & denique, si malum cessaverit, omnium gestorum ignorantia. Sed hæc sere à convulsivis moribus aliena videntur: nam nec mentis error incidit. nec os spumam reddit, nec pollices in pugnum colliguntur: quæ si contigerint, hos cum epilepsia complicatos esse indicant, & malum constituunt convulsivo-epilepticum.

§. III.

Objectum
convulsivæ.

Proprie malum convulsivum, more spasmodicis moribus consuetum, in eas potissimum partes tyrannidem suam exercet, quæ nervosæ, fibrosæ, ac membranaceæ sunt. Sed cum hæc aliis musculosis, glandulosis, cartilagineis, ossisque copiosissime deprehenduntur intertextæ; illas quoque in se invicem motuum rapiunt societatem. Atque licet externas potissimum regiones, ac artus excruciet hi violenti motus; artamen ad interiora etiam viscera penetrant, in illisque fontica mala machinari valent.

§. IV.

Signa
convulsivæ
demonstrantia.

Varis modis hæc adfectio miferos adorat: quoties enim subito absque ullis venturi mali notis prehendit; in aliis autem signis quibusdam sui adventum prænuunt. Horum potissima sunt artuum externorum, maxime pedum refrigeratio, vel formicans sensus; qui etiam os coccygis occupat, & insit auræ frigida per spinam dorsum ascendit. Accedunt hypochondrii sinistro tendivi inflativi dolores, & alvi tanta obstitio, ut nec status, nec excrementa exire queant, nec

sæpius tenuissima fistula anam intrare possit, aut etiam glandes ac cœcæ vi spasmus per vomitum cum stercore ejiciantur. Væica constringitur archissime, ut urine vel nullæ, vel tenues ac albz reddantur. In aliis præcedunt oscitationes, pandiculationes, totius corporis tremores; vel etiam præcordiorum anxietas, cum pulsus inæquali duro, contracto, cardiacæ, nasæ, vomitus, cordis palpitaciones, deglutitionis impedimentum, dolor capitis, dentium, tinnitus aurium, vertigo &c. & tum excipiunt convulsiones.

§. V.

In ipso paroxysmo artus potissimum externi mirum in modum agitantur, hæc vel illuc trahuntur, retrahuntur, dilenduntur, crispantur, jactantur, contorquentur, & incurvantur. Mox brachia in tergum retrahuntur, ut illis insidere videantur; mox inanibus auram verberant ictibus; mox pedes in varias plagas abripiuntur; mox valide terram quantum & conculant; mox spina dorsum incurvatur, & veluti arcum format, pectus attollitur; mox totum corpus obrefcit, & laxo magis immotum tenetur &c. Multos hæc agitationes in eo situ, quo sunt, occupant, nec in terram prosteruantur; alii more epilepticorum subitò concidunt, sicut, sident, dentes commovent, ore hiant, linguam exserunt, oculos variis modis contorquent, & capite circumgyrantur. Quemadmodum vero gelus ac motus partium, quos in hoc morbo deprehendimus, mira ac incredibili varietate tristem scenam ludunt; cujus singulares recessiones occurrant in M. N. C. anno VI. obs. 23. Dec. Læus IX. obs. 64. Dec. II. anno III. obs. 77. anno VII. obs. 135. HORSTII *epistol. pag. 356. &c.* in longe majorem admirationem necetur, & potentio videtur simillimum, tales ægros laud raro pergrinas, quos nunquam didicerunt, linguas strepere, & insit vaidicorum futura præfigere. Unde quoque à veteribus pro demoniacis habiti fuerunt. Vid. FORESTUS *obs. med. Lib. X. obs. 56. Sched. pag. 406.*

§. VI.

Superatis accessivis plurimi ineffabilem totius corporis per lunque languorem retinent; multi in animi deliquia, altumque soporem delabuntur; quibusdam explosione vultuum, flammæ, vomitu, cojiola lymphæ ex gula rejectione malum solvitur. Sæpius muci vel sanguinis evacuatio per nares, uterum, hæmorrhoides &c. insequitur: quidam clamore, alii que innumeris modis accessione sinunt. Ceterum in his ægria somnus esse solet turbulentus, terroris, timorisque plenus; adpetentia ciborum vaga; alvus plerumque segnis & pigra; ægros ad sudorem difficillimi, ad animi vero passionem, & præsertim *paroxysmum* admodum proni observantur. Accessiones modo longiores, modo breviores, per intervalla mox breviora, mox longiora recidunt: & lunæ mutationes sæpe stricillime observant; quid? quod nota mihi suæ exempla, ubi certo anni tempore revertere, per aliquot duntaxat mentes sævirent, postea ex toto silebant. In sexu sequiori mentium eruptionem vel antecedunt, vel ipsum fluxum comitantur: sumis epulis frequentiores exiliunt ac faviores; & à levissimis causis, præsertim animi affectibus, facillime excitantur.

§. VII.

§. VII.

*Convulsio-
nem sub-
jicit.*

Ferali huic malo præ aliis obnoxii deprehenduntur, qui genus nervosum debile vel ex nova constitutione, vel aliis causis obtinent; eo magis, si succorum vitium impura accesserit temperies. Hinc etiam morbus ille non solum per hereditatem ad liberos transit, verum etiam per longam generis scierim, quasi per manus postera traditur: maxime si parentes hypochondriaci, hysterici, arthritici, hæmorrhodici fuerint, vel mater gravida ad graves animi commotiones inclinaverit. Ex eodem fundamento pueri, adolescentuli, præ adultioribus; femine præ viris huic affectui sunt expostiti: ad quem etiam proclives reperiuntur, qui animi sensibilibus de ingenti acrimonia sunt, veluti cholericis temperamento præditi.

§. VIII.

*Causæ præ-
dictæ mor-
bus con-
vulsivum.*

Sed missa morbum convulsivorum historia, pathologiam aggreffum, causam horum proximam in membrarum medullam spinalem, cingentiam, de inde productarum partium nervosarum valia ac violenta structura ponitur. Hinc patet, in convulsivis illas dumtaxat partes agitari, quæ spinæ medullæ nervos suos mutantur: cum autem dictæ membræ cum cerebri meningibus, cujus tunc productiones, intima communione gaudeant; cognoscere facillimum est, cur convulsivi cum epileptici n. o. cibus frequentius complentur; quia de his sapienter transeant.

§. IX.

*Structura
medullæ
spinæ.*

Hæc, ut eo clarius fiat, haud ignorari oportet, medullam spinalem esse cerebri finitim, ex parte alia seu medullari, de cuncta compoli am, cerebri continuum: (vid. HIPPOCRATES L. de carnibus §. 11. III. GALENUS L. VII. de usu partium Cap. 1., VESLINGIUS Anat. Cap. XIV. par. 22.) uno communi membraneo involucre, quod spindylis verberarum adheret, de tribus propriis membranis, intima secundaque à pia cerebri meninge productis, tertia ex dura matre propagata investita, de intra specum verberarum recouditum: VIEUSSENS Neurograph. Lib. II. cap. 1. Guadet illa vesis sanguiferis arteriosis pariter ac venosis, per ipsam illius substantiam disseminatis. Recipit nimirum arteriosos ramos ex arteriis verberalibus, de trunco aorta descendente: ex quibus refusus cruor per venulas primum in sinus verberarum venosus, in venas verberarum, venam sine pari, aliisque venulas, de tandem in venam cavam ascendentem effunditur: vid. VIEUSSENS loc. cit. Tab. XVIII. fig. 1. II. III. Denique ea potissimum hujus medullæ videtur esse functio, ut varios è sinu suo nervos emittat; quorum triginta sunt paria, de duo nervi spinæ, accessorii à WILLISIO dicti, qui ad par vagum tendunt: Ibid. Tab. XIX. fig. 11. Hi ergo nervi primum ad musculos cervicis, colli, pectoris, dorso, abdominis, artuum superiorum ac inferiorum tendunt, harumque partium motui interviunt; deinde per interna pectoris ac abdominis viscera distribuuntur, membranas in eis obvias constituunt; de denique varios insignes ramos ad musculos externos faciei capisque dimittunt, de ad horum motum multum contribuant.

Frid. Hoffmanni Oper. Tom. III.

§. X.

Hanc allegatam causam, quicunque cum omnibus morbi symptomatibus rite contemplantur: facile illorum nexum rationalem invenire, ac causam mechanicam reddere poterit. Sed notandum est, hanc dictarum partium convulsivam iritationem duplici commovere posse ratione: namque vel ipsæ spinæ medullæ membranae primario irritantur, convelluntur, de in hanc convulsivam societatem alias sibi connexas partes abripiunt; vel harum partium quædam prius spasmodice afficiuntur, de hanc dissectionem cum medulla spinali communicant; ex qua ad alias iterum deferuntur regiones. Hæc rationes, quid obstat, quo minus prioris generis convulsivis idopathicis, posterioris sympathicis adscribamur.

§. XI.

Inter causas autem mediatas, quæ ad spasmodicam hanc medullæ spinæ contractionem disponere valent, principem locum occupant graviores animi passiones: quibus ad inducendum non mirum quam fovendis, talis dira motus nihil est efficacius, maxime si externum frigus, de diasse errores acculerint. Memorabilem de dira convulsione, ex subita animi commotione ab eorum antea stuporem excitata culum allegat HENRICUS ab HLER obf. XXIV: de quid frequentius, quatuor homines, præterim juniores ac gravi serore ac iracundia vehementissime convelli? Ex ista mirum in talis morbis excitanda, nimis libitum, venereque præmaturo aut immocho exercitio vis est: unde quoque ceteris parva epilepsia vocatur.

§. XII.

Dande inter horrendi hujus mali causas materialis recte collocatur succorum vitium acritas; eorumque præsertim dykrasis quedam acris, salina, senouica. Hinc sapienter enunciantur convulsiones ab arthritide, polagra, scabie, purpura &c. inra corpis retroposita; de his iterum ad externum habitum de acris compentibus, denno nunguntur. Quam autem porro impuritati humorum inducende nihil magis faveat, quam ipsorum abundantia, vel spissitudo; maxime si excretionis naturalis per sudorem, vel alvum, vel etiam sanguine hæmorrhoidales, ac uterine fuerint immixtae aut suppressæ: facile patet, cur morbis hypochondriacis, hysterici, mensium ac hæmorrhoidum ultimæ tentati, hæc convulsivis spissius præ aliis obstrictis obnoxii. Hinc quoque credita obvium est experientia, quod virgines, menstruum nondum passæ excretionem, levius convulsivis, spasmodicisque tenentur agitantibus; quæ toto mensium fluxu sæpenuero cessare deprehenduntur.

§. XIII.

Si ulterius inquiremus in eas nervosas partes, ex quibus structura convulsivæ ad spinæ medullæ membranas propagari solent: has inter principem locum sibi vindicant membranæ ventriculi ac intestinum canalæ, cujus velliçationes efficacissimam causam universi generis nervosi dissectionibus suppeditant. Ipse enim hæc partes vi fabricæ eandem nervo-mem-

*Deferunt
morbus
convulsivum
sub-
jicit, de
propagant
eum.*

*Convulsio-
nem ab
animi
motu
sub-
jicit.*

*Convulsio-
nem ab
vitio
humorum
sub-
jicit.*

*Convulsio-
nem ab
vitio
humorum
sub-
jicit.*

C bra-

branaeque infirmam proclivitatem possident ad suscipiendos motus irregulares, & à levisima causa graviter adficiuntur. Cum autem ventriculus nervos suos primum ab oesophagi pariete externo tam dextro, quam sinistro; deinde etiam à nervis ex prima, secundaque dorsae vertebra emergentibus; & in laterocostalem ramum abscissibus maneat; & intestinis ramos nervos à ramo oesophagi pariete interno, cum intercostali concurrente, & plexum mesentericum fornamate adificiantur: ratio in apico est, cur harum partium stricture ad membranas spinales medullae, & universum nervorum genus facillime propagentur.

§. XIV.

In dextro
loco
fuerit
causa
convulsiva.

Tali ratione non frequentiores occurrunt convulsiones, quam quae in duodeno postillimum intestino primariam agnoscunt sedem: in quo flabulantes cruditates acidae, atque viscidæ, ob concursum biliosi ac pancreatici succi, promittunt acrem, ac causticam fere indolem acquirunt. Sic notabilis casus de catalepsi cum hærentibus convulsivis, cujus fomes in primis visceribus, recensent M.N.C. Dec. III. anno III. obs. 8. Hinc etiam remedia acris, caustica, atque venena, rodendo membranas intestinales, convulsiones universales excitare valent. Sic has à vivo lithargyrio dulcificato oboritur referunt M.N.C. Dec. III. anno IV. obs. 30. pag. 81. Et quem fugit, purgantia acriter M.N.C. superius excitasse malum? Conf. iterum M.N.C. Dec. II. anno VII. obs. 162. Hæc omnia coarctus sunt, facillimeque, si scorbutica concurrat diathesis: hinc de convulsivis epilepticis violentis ex cisternæ acris in dolibus ventris fortuitis incaute adplicato excitatis notabilis recurrebat observatio M.N.C. obs. 77. Dec. II. anno III.

§. XV.

Convulsio
in dextro
loco.

Huc etiam pertinet observatio, quæcum innumera à probatissimis auctoribus prodite leguntur, de vermibus in intestinis flabulantibus, admirandas monum convulsivorum species, ambulatorias, rotoarias &c. maxime in pueris excitantibus: quales notati dignos calus regerit apud GEORG. HORSTIUM epist. medicæ. Sect. III. pag. 377. M.N.C. Dec. I. anno VI. obs. 187. Item Dec. III. anno III. obs. 59. & FORESTUM obs. med. L. X. obs. 117. Si in causis inquirimus, illæ non solum in rosiionibus ac vermicibus intestinalium, quæ quidem in infantibus locum obtinent, consistunt; verum, ubi in adultioribus contingunt, magis mortis in intestinis vermibus sunt accensende; qui putredinosum vaporem spargunt, ac nervoso generi insinuant: unde in hisce castis halitus oris sæpius deprehenditur fetidus, ac cadaverosus.

§. XVI.

Convulsio
in dextro
loco
causa
de mero.

Quum porro vesica urinaria atque uterus ramos suos nervos accipiunt ab interni oesophagi pariete infimis ramulis pariter ac à quibuscumque ossis sacri propaginibus: facile judicari potest, cur harum etiam partium vellicationes, spasmi, atque graviores lacerationes in convulsionem abeant. Quæ innumera sunt exempla convulsivum epilepticarum ex suppressione urinae productarum? teste celeberrimo ETTMULLERO Coll. Practic. P. II. Tom. I. pag. 658. Ut om-

nia silentio præteream; haud rara sunt exempla, quod peculiariæ animi convulsivæ motiones in parturientibus observentur; quando nempe spasmus uterini supioria petunt, & nervos medullæ spinalis invadunt. Unde manus atque collum sæpius hinc inde ex uno latere ad alterum agitantur, pectus valide antollitur, contremiscunt membra, totumque corpus: & nisi conquiescant, & ad statum expellendum rursus deriverentur, infanti non minus ac matri letis graves, ac ipsius vitæ minantur periculum. Quamvis enim notissimum sit, nullum partum abique moribus spasmodico-convulsivis obtineri: probe tamen tenendum est, eorum sedem in utero potissimum, esse sacro, vicinisque musculis naturaliter residere debere. Quando vero à variis causis simul ad superiores corporis regiones propagantur, medullæque spinalis superiorem partem occupant; varias horrendas, trissequæ ludunt tragedias.

§. XVII.

Non minus externas ipsius medullæ spinalis pariter, ac aliorum remotiorum etiam nervosorum partium lacerationes infrequentius horrendæ convulsiones. Fracturis atque luxationibus vertebrarum dorsae, ubi festuca ossæ punctum spinalem medullam, supervenire motus convulsivus, cuius Chirurgorum notum est. Et quem fugit, quod graviora nervosorum partium vulnera, nervorum vel incauta venæ sectione, vel aliis casibus inductas puncturas ac vellicationes, gravissimæ excipiant convulsiones? Talis casus de convulsivis ex nervo in manu puncto sibi notavit RHODIUS obs. anat. I. obs. 32. & 50. ex punctura nervi per venæ sectionem male perforatam FORESTUS obs. Lib. X. observ. 118. & 119. ex vulnere obs. 20. &c. quid? quod de moribus hisce violentis ab unguibus incaute resecis casum adferat RHODIUS loc. cit. Hinc quoque punctura, vulnera, atque lacerationes quarundam capitis exteriorum partium & musculorum sæpius in convulsivis motus abire deprehenduntur, & hos quidem à laceratione musculi temporalis excitatos vidi. Nec etiam mirum; nam ex nervo secundo verticali rami quidam sursum per aurem extertam reflexi, varios ingrediuntur faciei musculi, annotante VIEUSSENS Neurograph. Tab. XXIV.

§. XVIII.

Eidem fundamento inniuntur convulsiones ab iclu variorum insectorum productas. Harum admirandam speciem à morsa muscæ majoris allegant A.N.C. Dec. I. anno IX. obs. 65. Hæc præcipuas stupendas artuum, dorsique agitationes, incurvationes, jactationes cum turbata etiam phantasia stipatas, ab ictibus moribulæ ira percussorum insectorum excitari, mulæ à probatissimis Medicis conscripæ attestantur historiarum quibus etiam clarissimum sit, valde exilæ, & admodum perniciosa esse illam materiem, quæ tantos tumultus, & irregulares motus in universo nervorum, nervosarumque partium systemate suscitare valet.

§. XIX.

Quamvis horrendum, terrorisque plenum hoc præputum adpareat: neutiquam tamen adeo funestum est, ut quos corripuit, subito occidat. Ubi recens est, ætas junior, ac reliqua corporis constitutio integre accesserint: spæ est facillioris ac brevioris curationis. Quod si sanguis

nis naturales excretiones per uterum aut liemorrhoides suppressae hunc affectum foviverit; hic iterum revocatis omnino mitigatur, ac prorsus depellitur. Contra vero, si humores ipsius ac impuri sunt, excretiones suppressae manent, temperamentum accedit sensibilibus, atque propebor, ac ipsum malum vel haereditarium, vel temporis diuturnitate in perniciem habitum degeneratum est: petarduum omnino videtur illi penis meliori. Tum enim non solum fluidae partes peccant; verum etiam solidae nervae, in quas acris halitiosa materia veluti impaeta, ac juxta hospitii nata est. Praeterea nervi, dum sub violentis concussionibus admodum extenduntur, loco fluidi tenuissimi ac aetherei vapore callosiori aereos amplentur, & hinc difficillime in naturalem reducantur statum. Exinde quoque his morbis obnoxiorum hominum insigne, quo sub paroxysmo pollent, imbor derivandum est. Haud etiam raro, accidentibus praeteritis mala vicius observatione, aut perversa medicatione, & convulsionibus abeunt in veram epilepsiam, vel etiam melancholiam hypochondriacam. Et denique quicunque his pereunt, apoplezia abripitur: hinc in dissectis cadaveribus in ipso cerebri vel vasorum a flagante in iis sanguine infectus, ac diffusio; vel crassa aut feri hinc inde in ventriculis cerebri, vel medulla oblongata extravalatio in conspectum venit.

CURATIO

C. L.

Indications are comparative.

Convulsivos motus expugnato, tres occurrunt potissimum indicationes, quarum prima est, ut causas materiales malum fontes corrigat, ad exitum præparet, & opportune è corpore ejiciat: *drinde* violentas & irregulares partium nervorum motiones demulcat; ac *drainde* ne more ipsi confecto iterum recidant, genus nervosum corroborat. Ante omnia vero, maxime si paululum inveteratus fuerit affectus, monendus est æger, ut curationem summa patientia per aliquod tempus probet. Necque enim illam multa ac drasticæ remedia perficere, sed magis blandis, ac nature congruis influere convenit præsidia; quæ patientia, ac temporis diuturnitate adjuvæ omne curationis momentum absolvere possunt.

6. IL

Vom fr-
die mit
erleben-
de.

Itaque, circa curandi rationem generisum ita tenere oportet. Quod si finalium juxta HIPPOCRATES a nomia humorum repletionem febrium; a sanguinis justo copiosioris Stokes, aut spissitudinis cum pulsa magno fuerit pressio, et praesentem temperamentum accedat sanguineum: a sanguinis detractioe autipsum curiosis capendum est, perula vel in brachio, vel pede venae. Neque etiam minus per ratione plethorae venae sectiones bis vel ter in hoc morbo iterandae; vel etiam scarificationes interponendae sunt. Praeterea vero paroxysmo soluto, quam in ejus accensione sanguinem mittere: non semel enim inde longetruculentiora, et diutius perseverantia animal-verti symptomata.

6. III.

*Distarchia
a. f. amplifolia
arctica.*

Deinde vero nunquam fere vidi debellatos
motus convulsivos, nisi accedente recta victus
ratione. Quamobrem inveteratis potissimum
Frid. Hoffmanni Oper. Toen. III.

convulsivus accommodatissimus est, sicut in locumque, praeterit si vapidus nimium ac humidus existerit, permittit; atque tunc caelo fereno ac clementiori vivere, iuncturibus ac crebris exercitiis corpus sedulo movere. Cibi etiam ligantur congrui, molliores, ac concoctu faciliores; omnesque potus calidiores, spirituosius, vinosi ac cerevisiosi evitentur: quorum in locum pro potu ordinario affundenda sunt decem ex radice scorzonerae, et rasura cornu cervi concinnata, aut serum lactis, aut acidule Seltzerianae. Tui quoniam in usum Vocanda sunt pediluvia, quae ex sili aqua fluviali, et fursibus trinitica, ac floribus chamamelis parari possunt. His dumtaxat tepidioribus circa lecti introitus pedes paulo et profundius immergere, et tum in lecto leniter iudare oportet: sic enim humorum circulum promovendi, et stricturas spasmodicas coniungendi, egregiam possident vim.

6. IV.

Inprimis vero nihil molliendum est, nisi al-
vus simul conservetur aperta: quo quidem fine,
si pigra est, & officio suo haud respondens, con-
ducant vel pilulae balsimicae, vel insula ac po-
tiusculae mannatae, vel manna loco sacchari ac in-
sulo calidiori sumta, vel denique, si plane obstu-
da fuerit, clysteres emollientes foriter oleosi
etiam iterandi. Quando vero mali fomitem in
primis viis residere, certa sunt indicia; consultum
est, praesertim circa huius mutationes emeticum
cum laxante jungere; & e.g. decocto mannato,
quod recipit unam marinæ unciam, grana duo
vel tria tartari emetici admisceretur pro superflua
pariter ac inferiora sufficiens humorum vitio-
rum fiat evacuatio.

L. V.

Inter simplicissima, ac diætetica, quæ morbis convulsivis incredibiliter ferre solent openi, remedia, præstantissimum est aqua simplex, naturali frigidaque largius haurita; qua sola atrocissimi convulsiones profragitur vixi. Ea namque levitate ac fluiditate sua minima corporis nostri vascula penetrat, et crassorem magis fluxum reddit, partes roborat, humores atque vapores æres sulphureos involvit, ac leniorem excitando sudorem secum à corpore ducit. Idcirco etiam congruus, ac bene ordinatus acidularum, ac thermarum temperaturation usus insignem in his morbis pollicetur utilitatem.

§. VI.

Quod si speciatim in pubertatis vel adolescentie annis à nimia vel inempte facie venire, aut si, aliqui animi contrarietibus originem traxit malum; cavendum est ab omnibus, quæ commotionem & orgasmum in partibus fluidis concitant, vel frigida impetuose movent, & ad graviores strichuras proritant; veluti sunt aromatica, acris purgantia, emetica, calidiora fomenta, spiritus, fortiores corporis & animi motus. Contra vero, major spes in dieteticis, emollientibus & demulcentibus, nutritivis collocanda est; quo sine cura lactis bubuli, vel asini, vel etiam ferri lactis, nec non balnea ex aqua dulci, assidue lacte, parata insignem merentur commendationem. Non minus conferunt juscula gelatinosa, nutritia, decocta ex radice scorzonera, borbore, rasura cornu cervicæ, et carne vipæratum, parata, pro potu ordinario usurpanda; decoctum succuladæ tenuis, aliæque. Jungenda his denique morus

spasmodicos demulcentia remedia, anodyna & specifica; quorum inferius fiet mentio.

6. VII.

A. tumida
has 6 pr
mature
quarant
total 20-
dolls.

Quandocunque verminosa colluvies animum, causticam præbuit convulsionibus; tunc ad hos expellendos atque enecandos intentio medendi debet ferri. At vero probe notandum, non omnia hic invenire locum anthelmintica specifica, uti asilicæ, vitriolicæ, venereæ, aloeticæ, acrota purgantia, & mercurialia incaute adhibita; quippe quæ vermibus quibus adversantur, simul vero partibus nervosis inimica sunt. Operæ magis erit pretium, externis pugnare remediis; quæ inter chylores ex lacte, ac dulcibus oleosisque parati; & linimenta purgante præcitate virtute, veluti unguentum de arbutaria, extreme umbilico atque abdomini applicata palmum obtinent. Quæ interne exhiberi possunt anthelmintica, simul roborem ac nervorum possidere debent efficaciam, uti semen faniculi, vel in pulverem, vel effusum inanis spiritus aromaticus relictum; vel mercurius dulcis, si cum duabus cicalariis medicinalis partibus miscetur, & cum extracto ranæ, thalbarbari atque cœnauri minoris in formam pilularum redigatur. Aliis primarum viarum visis, fondibus acidis, biliosis, vicibus opposenda sunt incidentia, refoventia, digestiva, absorbentia, acrimoniam attenuantia, ac leviter evacuantia vel emetica, vel laxantia. Si acrota purgantia, caustica, & venenosa remedia malum introhuciant; eorum oculis remedia pinguis, oleosis, mucilaginosæ atque lacticius sunt abundanti.

6. VIII.

*At a rate
from 1890
forward
state, for
your
dist. and*

Si mentium suppressio horrendum hocce ma-
lum fulsitaverit: probe cavendum, ne eueni-
antignis abhique calidioribus medicinis, & que
vulgo solent adhiberi, eorum revocationem te-
nemus. Hoc in casu prestat balneum natura-
lium, & aquarum thermalium usus; vense sectio-
num prudenti administratione; pediluvii ther-
pidioribus, pulvis balsamicis, infusis calidis ex flo-
ridis mellisæ aëque tilis; pulveribusque tempera-
tioribus humorum æqualem circulum restituit;
tum motus potius solidiorum irregulares anti-
spasmodici, ac anodynus, veluti et liquor me-
sentericus cum essentia callosæ matris, quod
puffinitum omnium est medicamentum,
coërcere, ac his denique sedatis imbecillas partes
corroborare. Quod si vero hemorrhoidum sup-
pressio, vel immixtio malo dederit pabulum:
præter commendatorem remedium, & vense
sectionum usum, hirudines ad anum applicare
egregium spondet emolumentum.

6. IX.

A. Cooper
for the '90s
and also
in 1990.

Haud raro contingit, ut sudores retrospuli, excretiones ulcerosae, scabiosae, purpurasque interpresit, aut morbo arthritico vel podagrico inter corpus aeti, malum convulsivum inducant. Hoc in casu acrimoniae primarum viarum temperanda, simulque spasmodicis stricturis demulcentibus egregie conveniunt pulveres absorbentes ex lapilibus cancrorum, pulvere marchionum, succino preparato, cinabari, nitro, antimonio diaphoretico, & extracto croci, callosi confecti. Vespri sumi potest liquor melis anodynum cum refracta dosi spiritus bezoardici *Buffi* & callosi remittitur; aut pilula auriferae *finsiae*, quae ex extracto millefolii, siccum chamomilla, berta car-

*diu benedicti, ana drachma una, theriaca, succi-
ni, cinnabaris, ana drachma dimidia, croci gra-
ni duodecim, & olei chamamelii veri guttis octo
paratur: quibus crebra interponi debent laxan-
tia. Tum denique cura lactis afrinui cum acidu-
li Selteriani remittitur: etiam feri lactis in usum
vocanda, & per aliquot hebdomadas, interposita
quandoque manna cremori tartari nupta, pro-
turbanda est.*

L. X.

Tali ratione remotis causis materialibus, præfertim crassioribus, si adhuc refinescit motus convulsivi: illis obviam eundem et remedia morus effrænes sedantibus atque specificis, quæ vaporum subtili fulphureo, nervis impactis, & mali generis pabulo sunt inimica. Ad eorum censum præprimis pertinet antispasmodica ac antiepileptica hic dicta specifica, quæ ex regno animalii petuntur: horum enim fragrantia quædam, olfactu mox percipienda, revera halitibus istis gravolentibus, convolutionum nutriticibus adversatur, eoque specifica virtute infringit. Hoc nomine infamem merentur laudem ratura dentis hippopotami, eboris, lapidis manati, ungule alcis, crassius humani, item secundaris ac sanguis humanus exsiccat, viscera viperarum & terpentum, eorumque cor, fel & hepar, tali leporum ficcati atque pulverisati, aqua hirundinum cum castoreo, maxime omnium pulvis lumbeicorum terrestrium napalmis. Neque minus quædam medicamina ex regno vegetabili ac minerali desumpta sunt efficacissima: quæ inter carbones tibi pulverisati, extractum croci, flores & radix geomeæ, papaveris rhœasalis, cinnabaris medicinalis etc. digna sunt, ut commendemus. Huc quoque spectant, & singulari fructu adhibentur remedia sedativa, ac sic dicta anodyna; veluti sunt liquor meus anodynus cum essentia castorei minus: pilule de cynoglossa si cum auro fulminante & cinnabari nativa commiscuerint; pilule *Wildgeugli*, quæ remota crassiori materia, habitualis motus infirmum refrænant, ac condopunt. Quorum, ut & roborantium, tertie indicatini satisfaciunt, amplius præcedente capite de epilepsia facta est mentio.

§. XL.

Neque vero negligenda sunt externa remedia, *Erreos*
que inter unguenta ac linimenta nache & ligna *resolida*
dofsi inungenda non carent fua laude. Moxim
precipua ingredientia funto xungine baurana,
taxi, urfi, muris alpinj, finguendo caliores, vipe-
ratus; quibus admifceantur olea defillata v. g.
rutæ, lavendulæ, majoranæ, torfiminij, nuchæ
&c. & ad meliorem penetrationem aliquot fpiri-
tus falis ammoniaci volatilis guttulæ. Sed nota-
ndum effi, olea defillata in fubjectis, quæ illa per-
ferre nogueunt, omittenda; & folis xunginis
ac mucilaginosi utendum effe. Tum vero omnibus
præferri meretur balnea aque dulcis circa tem-
pus infaftionis ufurpata: a quorum ufu lenis pro-
vocat fudor, vel ipfa natura fponde ad hunc in-
dicante, vel adjuva infufio theiformi æe floribus il-
lic, quæ peculiaris firi virtutis, primulæ Veræ,
hypocistæ & radice valerianæ parato: quibus fæpius
hotendæ accelfiones anticipantur.

CAUTELÆ, ET MONITA PRACTICA.

£. L.

Quandocunque in convulsivis motibus, à ver-
minum colluvie productis mercurius dulcis cum

*convulsi-
onem cum
maledictis.*

purgante exhibetur : probe observandum est, ut ante hujus, aliorumque antehemicorum usum demulcentia mucilaginosa, ut oleum amygdalarum dulcium ad aliquot cochlearia, vel lac ipsum fumatur, vel etiam superbibatur, quo distensus intestinum hinc demulceatur.

§. II.

*Circum-
fectum.*

Quoniam venae sectio sepiissime locum habet in hinc affectibus, maxime si plethora, aut humorum spissitudo, dykrasia, aut mensium vel haemorrhoidum superfluo pressio fuerint, vel etiam caput afficiatur graviter : probe tamen cavendum est, ne simul & semel larga cruoris detrahatur copia, nec temere ac promulcue adhibeatur. Quum enim malum, si sepius revertitur, longe frequentius à benigni sanguinis defectu, quam nimia illius mole proficiatur : facile sit, ut ab immoderata illius missione vires imminuantur, stomachus debilitetur, perspiratio retardetur, & praeterea in corporibus haud manifeste plethorici majus damnum excutiet, quam emolumentum. Neque etiam in latere affectio tam influere convenit, nec in ipsis equinoctiis, sed quatuordecim circiter ante, vel post illa diebus : quoniam hinc temporibus mali accessiones plerumque sunt graviore, in quibus nihil molendum est.

§. III.

*Mor-
bum ap-
p-*

Ubi suppressae haemorrhoides foverint convulsiones, & jam lenis tumor, ac valorem obstructions concurreant : praemissa praemittendis non praestantibus quicquam reperitur martialis. Unde laudem meretur sequens insulum vinosum : *Recipe radicis zedoariae, elaeberi ana unciam semis, summitatum centaurei minoris, florum boragini ana pugillus quatuor, corticum citri recentium unciam semis, passularum maturarum unciam duas, vini Rhodani mensuram unam : mixta, lenique calore digesta ad usum referantur.*

§. IV.

*Circum-
fecta a velo-
re. M.
ap-*

Nihil deterius est in hinc morbis convulsivis, quam ea retentia exhibere, quae humores in graviores rapimur commotiones, utpote, qui ad easce subeundis tam sunt praesentissimi. Quare case pejus & angue fugienda sunt omnia calidiora, spirituosiora, volatilia, tinctura ac essentiae calidiores, nec non crudiora adstringentia, narcotica, opiata : quippe quae non solum ipsas mali accessiones revocant, verum etiam malum reddunt deterius, ac pertinacius.

§. V.

*Circum-
fectum de
lactis ca-
ram.*

Ad balnearum usum non temere statim transseandum est : sed bene providendum, ne res lecto fordidus duodeno, vel sanguine nimis copioso, impuroque existente, hocce curationis genus ineamus. Verendum enim est, ne ubi quid ejusmodi vitii in corpore hareat, materiae malignitatis, remediis opre excitata per totum corpus diffundatur. Idem circa lactis curam, in cujus locum subjectis biliosioribus magis convenit serum lactis. praecipiendum est : ad quam non prius accedere oportet, quam si primae viae a fordibus purgata, usque ad viscera sua consistat integritas. Talis curatio utilissime vel adulto, vel praecipiti vere insitum.

Frid. Hoffmanni Oper. Tom. III.

§. VI.

Alvus in hinc morbis semper existit lubrica, *Circum-
fectum de
lactis ca-
ram.* eo magis necesse est, quo vehementius, illa existente obstructa, observatur insulum. Huic vero scopo interserviant laxantia blanda, rhubarbarina, passulata, mannata, clysteres, ac victus emolliens. Linimenta autem, licet in demulcendis ac relaxandis spasmodis eximie sit efficacia : tamen consultius remittente paroxyfmo, quam sub ejus vigore inungantur : maxime si corpus acrius in balneum fuerit ingressum.

§. VII.

De specificis antiepilepticis pariter ac spiritibus *Circum-
fectum de
lactis ca-
ram.* his corroborantibus probe tenendum est, ne in tali principio, sed omni materiali asque crassiori causa subducta demum exhibeantur. Hac enim remota cessant sepius convulsivi motus, abique specificorum ope. Et notabile est, homini efficacissimum esse virtutem in malo ab animi affectibus inducitur atque sustentatur, & si viscera aliunde fuerint integra : tali enim ratione juvenem, qui per sedecim annos diutis epilepsia laboraverat motibus, per dexam, praemisso vomitorio, pulverem meum antiepilepticum, felicissime retinuum vidi.

§. VIII.

Quod denique mali praeservationem attinet, *Mor-
bum ap-
p-* illa optime recto rerum non naturalium usu impetratur. Aeger nimirum aere puro, sereno, ac temperato utatur : & cum HIPPOCRATES *Secul.
II. aphor. 45.* juvenibus per calis mutationem à convulsivis liberationem promittat : igitur peregrinato ex locis praesentem paludosis, frigidis, humidis, crasso de densiore aere sitis, ad loca aliora, sicca, salubriora plurimum haudenda erit. Vivandus quoque est decubitus in terra humidiore, diuturnior in aere viciore, vespere, & circa noctem obambulator, item die sole servidiori existente. Vultus si facili, potui mervant vel aqua frigida, vel medicata, vel infusa calida : anima conserve, ut hilaritas, venas si percellimus, motus corporis exercetur : somnus plenior capitur, alvus servetur lubrica, ac ne cumuletur moles sanguinis, congruis venae sectionibus, aut scarificationibus praecipitur.

ENARRATIONES MORBORUM.

OBSERVATIO I.

A Dulescens xviii. annorum, constitutio- *Convulsi-
onem ex
lactis ca-
ram.* nis tenerioris, biliosae, & valde sensibilibis, horis fructibus large indulgens, incidit autumno in scabiem : ad quam abigendam absque praeparatione evacuatione, statim utitur externis unguentis ex sulphure, oleo olivae & nitro paratis : quibus quidem repellitur scabies, mox auctum itumorem efflorescit. Paulo vero post, cum brumali tempore sub gelu intensissimo per aliquot horas versaretur, propeus de penitus evanuit scabies, ac aeger habuit optime. Tum accidit, ut hausto sub epulis vino Seel, elapsis aliisquot horis de summa praecordiorum anxietate, ac atrocissimis imi ventris torminibus conquiretetur. Advocatus Medicus ordinat clysterem oleosum, ac intense essentiam carminativam & antispasmodica praescribit : sed paulo post invadent aegrum violentissime convulsiones epilepticae, cum ejulatu atque clamore maximo. pu-
la
aucto

aucto ac artuum immensi agitatione stipata. Adstiterat, venenum sub vino Sect propinatum suis-
se rari, Medici opem denuo implorant: qui ob
nimiam ingurgitati vini copiam, lene ex tribus
tartari emetici granis concinnatum exhibet emetico
tum felicitissimo successu. Resistat quidem ma-
lum, sed longe minus, & tandem, adhibita con-
venienti medicatione, penitus est debellatum.

Epietis.

Præfens malum à scabie repulsa originem tra-
xit, luculenter patet. Ad illam vero intra cor-
pus repellendam nihil magis valet, quam fri-
gus ac purgantia; quibus motus humorum, qui
in scabiosis hinc morbis in corporis poris sumum
superficie viget, ad centrum magis convertuntur,
transpiratio impeditur, & sic impura sa-
lia in massa remanent sanguinea. Hæc naturæ
sunt acris, & fere causticæ, atque, si ad in-
ternas nervosque partes cum succis perveniant,
illisque firmis inhaereant, sonica machinantur
mala, atque gravissimos motus spasmodicos &
convulsivos inducunt. Noxiostissimam hæc effi-
ci aciam eo magis exierunt, si humores vitales
vehementius commoveantur ac exagitantur, uti
quidem in præfenti casu nimio vini Sect potu
tumef. Curatio igitur binis absolvitur indi-
cationibus, nimirum ut primum, aucta transpi-
ratione, salinae fordes ad corporis propellantur
habitus; incipiens motus convulsivus consopiantur.
Priori scopo sanificiens pulvere, qui ex pulve-
re marchionum, nitræ, cinnabari nativæ, succino,
antimonio diaphoretico & aliquot theriacæ coele-
stis granis componitur: atque infuso theiformi,
quod habebat radicem chinæ, herban veronicæ
& flores sambuci; alteram vero indicationem
mixture ex effluvia calidiori & liquore meo anody-
no concinnata imperavimus; & hæc, sub-
junctis laxantibus, ægrum restituitur.

OBSERVATIO II.

Convulsi-
oni ab im-
munda
Baculi.

Virgo generosa, xviii. annorum, sangui-
ne succulenta plena, habitus corporis laxioris,
spongiosioris, vitæ sedentariæ addicta, atque
cibis horis, nimioque aceti usu per plures an-
nos delectata, vehementi aliquando brevi ante
mensum eruptionem percellabatur terrore. In-
sequens uteri fluor erat parvus, atque vehe-
menti præcordiorum angustia, dolore artuum
tensivo, ac oscitationibus stipatus. Brevis post
extrema frigeant; thorax horridis convulsi-
onibus attollitur, cum molestissima præcordio-
rum constrictione; cor palpitabat vehementissi-
me; dolor tensivus, à cordis scrobiculo ad spi-
nam usque dorsi protensus insigniter adflegebat,
atque præterit in faucibus difficilis deglutitio
cum sensu intus palpi percipiebatur. Præterea tus-
sis aderat sicca, nausea, conatus vomendi, va-
sorum capitis turgescencia, narium fictitas, at-
que ingens bibendi desiderium, cum alvo per-
nanciter obstitata; quæ symptomata per inter-
valla recrudescabant, & circa menstruum pe-
riodum perniciatius inhaerebant. Præter venæ
sectionem varia remedia antispasmodica tam fixa
quam volatilia, nec non anodyna fuerunt
adhibita: quæ quidem malum mingebant, pe-
nitius vero extirpare non poterant. Tandem meæ
se tradidit curatori; quare ipsum in balnea cre-
bro descendere jussit, & deinde pilulas meas bal-

sanicas, ac pulverem antiepilepticum propinavis
quorum ope perfecte restituta fuit sanitas.

Epietis.

Hic affectus spasmodico - convulsivus sedem
suam positum habuit in ea medulla spinalis
parte, quæ intra speciem vertebrarum dorsi ac
colli continetur. Namque haud ignorari opor-
tet, convulsionum causam non semper in tota
spinali medulla hæreere; sed sæpius unam vel al-
teram illius partem duntaxat occupare; unde
etiam particulares artuum ac corporis agitatio-
nes derivandæ sunt. Causam vero materiale
severioris hujus affectus suppeditavit humorum
vitium; qui per viam sedentariam, atque dia-
tætam crassam acidamque accumulati, spirituosos,
quin & insipidi fuerunt reddit: imprimis vero
acide ac viticulae cruditates in intestino duodeno
generatae, aniam dederunt flatulentis ac imi
ventris spasmis; quibus, accedente vehementi
terrore, sanguis exitu suo per loca uterina desit-
tutus, ad superiores partes, maxime præcordia
regurgitavit; ibidemque flagrans, nervas mem-
branas vellicavit, & sic continuata ad membra-
nas medullæ spinalis strictura, convulsivum in-
ductum fuit malum. Quare ea fuit medendi in-
tentio, ut imminuta per venæ sectionem sangui-
nis mole, mensura restimeretur purgatio; hu-
mores ad peripheriam & inferiora corporis par-
tes revocarentur; ac denique violenti motus con-
sopirentur. Quibus quidem scopis accommodatissi-
ma fuerunt balnea temperata; quæ tensas par-
tes relaxandi, ac æqualem sanguinis circulum
promovendi, egregiam obinent viam; ut
tum denique ad sedandos violentos motus,
pulvis antiepilepticus cum fructu adhiberi po-
tuerit.

OBSERVATIO III.

Virgo annorum viginti, & quod excurrit, <sup>Convulsi-
oni cum
vitiis alius
obstanti-
bus</sup>
temperamenti sanguineo - cholericæ, anuo circiter
abhinc tempore post cibum ab ira vehementer
furnum, altero die vomitibus afflicta; per
sex integras hebdomadas, quibus omnia, quæ
assumeret, protinus ere reddebat, & insuper
assidua ventriculi pressione, capitis dolori-
bus infestabatur. Hicæ vero symptomatibus im-
provida curatione per opiata & martialia cum
stomachicis elixiris mixta consopitis, successerunt
spasmodico - convulsivæ motiones pedum
atque brachiorum, ac si ferrum duceret, aut
mallico quid percuteret, conjuncta spiratione ce-
lesterrima. Paroxysmi sæpius redibant quotidie,
nec nisi per quadam minuta inhaerebant: ac
tandem vomitibus iterum complicabantur, &
cum hicæ per aliquot hebdomadas alterabant.
Neque tamen minus alvus aperta erat, & men-
ses fere fluxebant. In tali rerum statu post reme-
diorum quorundam calidiorum usum, vena in
pedibus secabatur: quo facto accedebat febris
intermittens, admodum irregularis; sub qua ces-
sabant motus violenti, & datis subinde pilulis
balsamicis remittebant quoque vomitus; ventri-
culi autem pressio, & capitis dolores adflege-
bant. Verum enim vero uterque affectus brevi
post recrudescere demum, & ludebat varium
valde scenam: siquidem mox alter, mox uter-
que evanescerebant, mox iterum redibant. Ego
tandem consultus, præmissis præmittendis, aci-
dulas

chulas Selteranas cum lacte potandas, ac balnea Hirschbergensia commendavi; quibus factum est, ut favente Dei gratia, egrotans pristinam recuperaret sanitatem.

Epilepsis.

Dici vix potest, quam gravis spasmodicus striculus & pressioibus post vehementiorem iram, si quis flatum capit cibos, ventriculus affigatur. Vehemens enim hic animi affectus maxime in partes nervosas, ipsamque ventriculi motu quodam striculus convulsivo agit. Hic si repletur alimentis, non modo ab eorum copia tunica nervosa cum nervis parvis vagi magis distenduntur; sed etiam turbata sic digestionem, crudum viscosum bile acriori permixtum largior in intestino duodeno generatur colluvies, quae veram continuam vomitionibus causam praebet. Hinc optimum ab initio fuisse auxilium in blando & accommodato emetico; ut illius ope biliosa saburra ex fundo duodeni penitus expulsa fuerit. Quam diu enim quaedam adhuc remanet sentina; tam diu novum ex ventriculo affluens chymum fermenti instar in suam permutat naturam: quare tali in casu Veteres puerum vomitum curare. Et imprudenter sane ejusmodi violenti ventriculi motus, relicta causa materiali, sopientibus sistuntur: namque licet exinde motus in stomacho consequantur; tamen acris illa ac impura materies, in massam sanguinis atque lymphae rapitur, & tali ratione universales in artubus musculisque corporis inducit convulsiones. Inde etiam factum fuit, ut reveris propter collectam denuo impuritatem in primis viis inoleam vomitionibus, cessarent convulsivi motus; praesertim cum accesserit febris tertiana, quae ordinario à bile impura in primis officinis subsistente suam trahit originem. Hi enim febriles motus cum obnoctant inoleam, ut fordes acres, spasmodorum nutrices, ex artubus, imo ipsis visceribus, optime discutiantur, & sic subdito convulsivum pabulo has etiam tollant. Verum enim vero cum in nostro morbo, humorum massa, morbi diuturnitate, plane à naturali temperie recessit, mirum haud est, si & vomitus & convulsivi motus redierunt, donec tandem nostro consilio tota sanguinis & humorum moles, ipseque primae viae atque viscera à pravis succis per acidulas & balnea depurata fuerunt, & partes nervosae temperiem suam naturalem ac motum ordinarium recuperaverunt.

OBSERVATIO IV.

Convulsivus a 17^{to} aetate.

Novendecim annorum adolescens, melancholici temperamenti, a servitio domini cujusdam, scabie diu vexatus, tempore aliquando hiemali circa horam nonam vespertinam in platea circa custodiam, ex qua ante quatuor dies fur quidam in viridi veste ad patibulum deductus erat, obambulans, huncce furem in spectri forma sibi observari imaginabatur. Hinc incredibili timore, ac plus quam panico terrore percussus; pondus spectri humeri suis inhaesit credens, illudque à semet ad aedes usque domini sui deportatum fuisse, perinaciter existimavit. Domum ingressus insigni horrore, sudore frigido, summaque virium imbecillitate prehendebatur, & abhinc per quatuordecim fere dies, appetitu plane dejecto laborabat. Postea ipsi intra lo-

cum decumbenti idem spectrum visum fuit, quod pollicem dextri pedis quasi extrahere molebatur. Pollex etiam sequenti die insigni robore affectus, in ipsam abiit suppurationem: sequebatur brevi post immoens partium nervosarum concussiones ac convulsiones, ita, ut nunc iollar artus inflexi corpus in sublimem attolleret, nunc instar globi incurvaret, linguam morficaret, conjuncto calore partium praenaturali, pulsu citiori, siti, & alvi concuraci obliptione. Mox lingua deficiebat, mox verba sine ordine faciebat, quin etiam per senectam se praecipitaturum minabatur. Paroxysmi per intervalla certis redibant temporibus, & ager eorum accessione praesensiebat, dum atque quaedam ex inferioribus per dorsum ad superiora ascendente videbatur. Remedia, quorum quae levum hoc malum fuit depulsum, erant venae sectio in pede administrata; alvi, quae erat constrieta, reseratio per clysters emollientes & paretgoricos; frequens pulveris usus, qui ex antimonii diaphoretico, coram cervi uña, radice prunae, cinnabari, succino, singulorum aequis partibus confectus erat. Tibiae affecti pedis emplastrum vesicatorium admodum fuit, vasis diurnis apertis servatis: pro poro luncti aquam frigidam; ac denique in capite gessit epithema ex aqua majoranae, aceto rosae, rutae, & aliquot canthorae grana confectum: quorum ope intra mensis spatium felicitur fuit curatus.

Epilepsis.

Temperamentum hujus aeri fuisse melancholicum, & defectus lymphae atque sanguinis subtilioris, & sanctorum humorum spissiorum per caput circuitus indicant. Hoc temperamentum praedit praeter alia ad recipiendas varias impressiones apti sunt; hinc illos etiam saepius spectris terri videmus: quae ut plurimum nihil aliud sunt, quam insomnia vigilantium, ex corrupta phantasia inducta, praesentium quando tempore nocturno timore corripuntur. Vidi plures, passione hypochondriaca flatulenta laborantes, adparentibus spectris, licet sua mutaverint domicilia, diu multumque exercitatos; quos convenientibus remediis, venae sectione in pede, potu diluente, laxantibus, carminativis ac sufficiens corporis labore, adjuvante divino auxilio restitui. Praeterea ad praecipientis mali generationem multum contribuit, quod ager diu antea scabiosa cutis defecatione, quae impurius, salinae, acris lymphae scabies est, laboravit. Quam itaque vehementi ob spectrum visum timore ac terrore cutis fuerit contricta, & materia serosa corrupta ac impurius ad nervosas medullae spinalis membranas, cui simillime inhaesit, delata fuerit, mirum sane non videtur, tam gravem convulsivum passionem inde prognatum esse. Neque parum ad exacerbationem mali consuli flatus ac corruptio lymphae in pedis pollice per excharum, ob iterato adparente spectrum, terrorem inducta. Exigua enim saepius est portio materiae corruptae, & malignae, quae sola exhalatione nervis & eorum fluido adversa, mali convulsivi causam praebere possit; dum ascensus aëris ex inferioribus ante paroxysmum percipitur: uti observationes testantur facient, quae existant apud ZACUTUM LUSITANUM Lib. de praxi admiranda obs. 22. TULPIUM Lib. IV. obs. 4. HOECHSTETTERUM in obs. part. II. cap. 7. GALENUM Lib. V. de locis

*afertis cap. 6. DOL/EUM encyclop. medic. prae-
f. p. c. 118. Quodam igitur à lymphâ aciori
purgetur volatili, nervos eorumque fluidum per-
turbante, malum originem traxit: tum utique
diaphoretica ex regno minerali petita, cum ce-
russa antimoniâ, bezoardicum minerale, cin-
nabaris, aethiops mineralis, cum aliis demul-
centibus & antispasmodicis sociata, vesicato-
ria quoque, per quæ lymphæ impurioris ex-
itus paratur, omne curationis punctum abso-
vere solent.*

OBSERVATIO V.

Canoni-
m. i. omnes
per se
etiam si
g. d. m. c.

Puer Hebraeus XII. annorum, à terrore & frigore incidit in ingentes praecordiorum anxietates, cum tulli, virium lapu, extremorum tremore, intercurrente horripilatione & interno æstu. Tertia die post manus & pedes convulsivis motibus, & subulsiis, per horæ dimidium infensibilibus agitati sunt. Inde magis magnificè increverunt convulsivi hi motus, ut dorsum & collum aspectu horrendis incurvationibus & contractionibus aliquoties de die qualiaeretur. Sub paucissimo pedes frangebant, thorax elevabatur, respiratio erat crebra, pulsus celer & durus, sensus tamen constabant: post illam corpus languebat univèrsim, appetitus vero cum somno erat integer. Multi in consilium adhibiti Medici, extiterunt etiam, partem verminodam progeniem fuisse, partim per terrorem inductum esse malum reputarunt. Sed data, tam ex illorum sententiis ambulantibus, quam ex horum præscripto antiepilepticis, adhibitis simul balneis, fuerunt proflua frustra. Milanæ postea perfrinit idem, quum subinde factum acerbius. Tandem miser, quum frigidum fontem, ad unam vel dimidiam mensuram, quotidie cum dosi pulveris antiepileptici bibere pulsus est: qua intra quatuordecim dies motus illi convulsivi paulatim compoissit, nec in hoc usque tempus iterum insisterant.

Epicrife.

Quandocunque sine singulari humorum vitio, aut dydysia praecedente, febrique visceribus, à causa plane immateriali, ut vehementiori terrore, timore, frigore praeteritum superveniente, partes nervosae de mulatolite in effractus et impenetrabilis exagitantur commotiones; quotidiana scilicet experientia, frustra adhibetur evacuantia, alterantia, roborantia, nervina, cephalica, venar sectiones, fomenta, vesicatoria &c. quorum ulla misere plerumque ægrotis cruciari solemus medici, de malum exacerbant. Potius specifica, quae blanda subtili exhalatione sulphurea, membranas nervosae sese infusant, & morus hostis visibiles contemperant, omnium sunt praefantissima. Haec vero potissimum ex regio animalis declinantur, utpote quae natura ac mixtione sua, solidis aequae ac fluidis corporis nostri partibus accommodata amica, coxis autem vaporibus plane adversa sunt. Notandum vero, ea omnia recentia, nec ultra aliquot menses asservata esse debere: quoniam alias rancida fiunt, atque suam amittunt fragrantiam. Præter hæc, auxilium magis quandoquidem est in clemeutia, quam in istis pharmacis, praesertim si malum diutius inhaerit. Quare nosse etiam æger, curatus est potu aquae frigidae de quidem fomite; cuius egregiam virtutem experientia comprobavit.

Et namque, sicut in peculiari dissertatione de
salubritate aque frigidae demonstravi, non mo-
do propter frigidum, verum etiam frigidum suum
principium ad corrigenda tam fluidorum vitia,
quàm roborandas partes solidas est aptissima;
modo sub certis circumstantiis, atque debito or-
dine adhibeatur. Maxime obveniat hæc re-
gule, ut, si prius non nimis copiosis aque lar-
gis haustibus, sed successe bibatur; & deinde
externum corpus, maxime pedes atque ven-
tricali regio à frigore externo probe muniantur,
ut hoc remedi genas auctor subséquatur
perfuratio.

OBSERVATIO VI.

Adolescenti xvi. annorum generosius, constitutionis sanguine, ac succulente, citius præteritum acidus in delictis habens, jam decem annorum puer colica convulsiua per duos ferè isagogicos menses tam gravi adflictus erat, ut plures incantamentum iubeffe crederent. Præterea præmaturum venere exercere, corpus frigori lapidei exponere, atque pallinibus animi, præsertim iracundie magis tacite, incli gere luevit. Hinc tandem ex improbitu isag prædium corruptis præteritum immani aqum tremore, quem subito excipiebat convulsio pectoris convulsiua, cum brachiorum abque pedum agitatione, & omnium sensuum absolute flupata. Inhectus jam per duas hebdomadas hic gravis afflictus; & paroxysmus ad duas vel tres horas durans quotidie ter quaterve reliebat. Cum ego ipsum accederem, edixit malè, quod malum vehementissimis in epigastrio circa cordis scrobiculum doloribus conflit elotio invaderet, qui se extendentes ad finitum latus, ubi ventriculi situs est, tandem per dorsum intra scapulas ad fauces ascendentes. Sub ipso paroxysmo vehementissima erat pedum ac brachiorum jactatio, agitatio, tremor atque frigus; & adus plerumque adflicta, quandoque etiam nimis laxa.

Secata sunt vena, infusi clysteres, data antispasmodica, callosa, cinnabarina, fed in calum. Ordinauit infusum melleosum, & florum chamæmæi, cum cremore lactis miscendum, & pariori, fed fæpius iterata, dosi fumendum: balneum aque dulcis; pulueres ex lapideis cancerum, cum pulvere marchionum & pauillo faccini collectis; & denique vesicatorium etiam sura pedum curavi adplicandum. Sed omnium frustanea erat opera. Tandem commendatæ à me sunt acidula Seltzerianæ cum lacte; & alvus alteris diebus, drachma una pilularum ex saponе veneto paratarum purgata est: quo facto malum remisit, & æger perfecte conuulsus.

Epicratis.

Veneris nimius ac intempestivus usus iis praesertim quum maxime nocet corporibus, quae sunt sensibilibus ac debilibus naturae, aut quae jam antea morbo spasmodico vel alia lesione capitis, aut nervosorum partium laborantur. Sic ego saepe observavi, in capitis gravioribus à causa violenta externa lesionibus, super coitu funella accessisse symptomata: quae de re confertur HILDANUS Cent. 1. *els.* 22. & Cent. IV. *els.* 26. Multo magis autem inimica est venus, si aliae causae, quae nervos debilitant, sanguinem commovent, &c. cum specifica stricture in partem solidam agunt, ut sunt ira, extrema

externum frigus, & id genus alia, concurrant. Quare nullum est dubium, quin in presenti casu ira suppreffa ad crebriores paroxysmos multum contulerit: quod etiam testatur vehementer ille dolor cardiacus, in epigastrio circa cordis scindulum se exiens, & ad fauces ascendens, qui plerumque corruptum & mordacem in duodenae biazestem bilis humorem per causa agnoscit. Quamobrem insignis levamen attulerunt acidula Selterana cum serbia lactia parte ad integram mensuram per aliquot septimanas usurpata; atque pilulae ex sapone veneto concinnatae: utpote quibus acrimonia biliosa non modo temperata, diluta & educata sed etiam laeso nervorum ventriculi membranarum emollita fuit. Alias in epilepsia de motibus convulsivis, qui à vehementi iracundia suum excitant, non sine singulari fructu usum feri lactis aciduli; vel etiam solam aquam frigidam, tincturæ florum papaveris, quæ cum spiritu vitrioli rectificatissimo parata sit, nuptam, per vices hauriendam fuisse.

OBSERVATIO VII.

Ante plures annos consigit, ut adolescens quidam XVIII. annorum subito consideret seminanis, cum horrore de artuum tremore, facie tamen rubicunda de pulsu adhuc intente. Et licet elapsa hora, remedium ope restitueretur: ingentem tamen non solum totius corporis languorem perenset; sed etiam haud ita multo post eodem paroxysmo, post gravem precordiorum anxietatem, & artuum lalilitatem, correptus est; qui aliquoties intra hebdomadem repetens, ardentem insulit in dextri cubiti angulo dolorem, tumore & contractura demum brachii flipatum, & abhinc augmento suo de exacerbatione mali accessiones praenuntiavit. Medici in consilium vocati, modo venies, modo aliam fundicam enuatam fuisse credentes; variis contra atrox hoc malum pugnavant praesidiis; sed tantum alevat, ut ilud debellarent; ut potius magis magnique exacerbaretur. Ego tandem in auxilium vocatus, sulo decocto ex antispasmodicis, demulcentibus & nervino - anodynis parato, & mense aliquamdiu potu ægrum ab intum morbo liberavi; cujus causa posthac in apicem prolata fuit, dum ancilla gravida de partu vicina fassa est; juvenem illum, antequam hoc morbo corripere, singula fere nocte cum ipsa concubuisse.

Ita quoque ante annum adolescens nobilis, in Page, in aula propinqua, satis alias incoluit, subito præter omnium expectationem de opinionem, horrendis prehendebatur convulsionibus, oculos vehementer contorquebat, vociferabatur, linguam exierat; caput a pariete violenter alladebat, artusque tam superiores, quam inferiores tanta concutebat agitatione, ut vix aliquot viri eum coercere valuerint; ipsa vero ante os nulla erat, nec pollicum contractio, nec loquelæ impedimentum. Calescio per imposita stragula corpore, & data mixtura ex aqua analgetica & antispasmodicis composita, remittebant convulsionem, noctem transigebat somno placido, & in toto corpore apparuit sudor. Expergefactus non nisi de lalitudine corporis conquerabatur. Causam nam subito & gravis affectus cum inquirerem, nullam aliam, quam praenatum de nimium ve-

neris usum, atque detestandam masturbacionem explorare potui. Suasi itaque, ægrum in lecto temperate calido ac blanda quiete servare, & non nisi jalsulis ex carnibus, cancris confectis & rasura eboris ac cornu cervi confectis uti. Pro potu ordinavi emulsionem amygdalinam tenuem; dato quoque pulvere Marchionum ex aqua liliorum convallium, Bonum titius, primulae verae &c. quorum remedium ope ab ulcerionibus male insulubus liber evasit.

Epietis.

Quemadmodum intemperata & nimia veritas in omni, etiam robusto corpore, vires insigniter frangit, atque debilitat: ita et in magis nocet, etate imbecillibus. pueris, quibus & sensibus. Recte enim HIPPOCRATES Lib. de genitura §. 1. scribit: *Kokkistijum per concitum occiditur, quia à venis usu tam pauca materia emissa imbecillies reddunt; & certe feminis dependium plus debilitat, quam larga veritas scilicet.* Nihil itaque est, quod adolescentibus plus nocet, etique ad graves nervorum morbos, ac ventriculi debilitatem disponat, quam praenatura & intemperata veritas. Non enim solum vera sunt, quæ HIPPOCRATES Lib. VI. epidemior. effatur, quod quilibet, dum ventre uritur, insietur venter, & strepitus inde fiant: verum etiam multiplex experientia annotat, juvenes in academia, Bicho & venere vires suas consumentes, quando in morbum acutum, ut variolas de morbellis inciderunt, plerumque fuisse mortuos. Neque vero virum dejectiones solum, ac morbi ex atonia solidorum partium naturales suos mutantes, ex abusu veneris inducuntur; sed sepius etiam spasmusque atque convulsiva, etque gravissime subalacuntur affectiones. Sulcet sub ipso congestus, ac servidiori actu venereo, qui recte à Democrito parva vocatur epilepsia, ex animi habundia, ac corporis condito est, ut universum nervorum genus, & liquidum tenuissimum, in illis contentum, impetum faciens, graviter exagitetur, & in motum arbitratu praeter naturam. Hinc fit, ut sub ipso comu pulsus valde citatus & vehementer manum vibret, cor palpitet, partes tremant, pedes post actum vacillent, & omnium humorum gravis pressio sit ebullitio. Ceterum si in ullo mortis genere genuina causa Medico rationali exploranda est; id certe in affectionibus convulsivis ac epilepticis observare oportet. Quando igitur peripiscit sagax Medicus, quod nuncum ejusmodi insolationem de inopinato accedentium insulitum causa nimis debilitati, ex excessiva venere inducta, debeatur; non alius certe, nisi nutrimentis, demulcentibus, vires de succos laudabiles restaurantibus, & denique motus impetuosos refranantibus pugnandum est remediis.

OBSERVATIO VIII.

Virgo generosa, XIII. annorum, ingenitè convulsiva ex ab-
alacrioris, menses nondum passa, cujus mater
arthritis atque cephalica doloribus admodum
obnoxia erat, maculis scabiosis per totum cor-
pus efflorescentibus corripiebatur, quæ remediis,
nescio quibus, tractata evanescerebat. Accedente autumno, cum vespertino tempore sub ære
valde humido & frigido in hortu obambularet, posthac de languore corporis, dolore capitis,
pra-

praefertim in sinistro latere, tussi atque coryza conqueri coepit. Quae symptomata, aëlu praeternaturali stipata, cum singula revertentibus vespere: morbus pro catarrhali febre habitus, variisque oppugnatus fuit medicinis. Sed tantum aberat, ut mitigarentur haec affectiones, ut potius quotidie invalescerent: namque dolor capitis hemisphaericus ita increbescbat, ut omnem somnum, adpentionem & vires sustulerit. His malis ultra mensis spatium tentata, nulla nec medicamentorum, nec alimenterum, praeter aquam frigidam atque lac assumere volebat. Tandem incidebat in motus convulsivos, cum spasmo, quem vocant cynico, labiorum orisque distorsione, atque effuso risu junctis: accedebant brachiorum modo unius, modo alterius agitationes; collum variis modis mox anteriorum, mox retrosum torquebatur; tanta quidem violentia, ut, nemo assstantium illam posset coercere, & si hoc sine omnes nervos intendebat, agra animo delinquebat: ceterum parum, & non nisi absorta loquebatur; assidue urgebatur vigilis, & alvus non nisi globulis scharini sollicitata respondebat. Hinc malis per duos infestata menses, meum tandem implorabat auxilium. Exploratis ergo cunctis momentis, insignem in sinistro capitis latere, circa parotides glandulas tumorem, rubore stipatum annotabam; quem cum paullo fortius comprimerem, proximus cum ejulatione clamabat agra, atroxque conorsio inciderebat. Hinc facile iudicare potui, eisdem mali eisdem haurire; & ideo, quoniam omnia interna medicamina respuerat, nihil praeter cataplasma ex mica panis simlaginei, croco, vitello ovi, cretae lachis, & floribus sambuci concinnatum, repetitis vicibus curavi adplicandum. Quo factum est, ut interjectis paucis diebus, ingens liquoris viscidis, flavi & saniosi ex menis auditorio copia efflueret; & brevi post non solum cuncta symptomata conquiescerent; verum etiam adhibitis tum congruis remediis temperantibus, integre sanitati agra fuerit restituta.

Epilepsia.

Genuinum morbi sedem, ejusque originem expectem adeo absconditum esse, ut etiam peritissimus non nunquam falli possit Medicus; inter plures historias haec quoque clarissime docet. Haud enim raro ipsi aegrotantes, praefertim infantes, quando capite affecto mens quoque & functiones animales simul sunt perturbatae, nihil, ex quo certi quidpiam in diagnosticando elicere possit Medicus, edicere & declarare valent. Quamobrem in tali rerum statu opora est praetium, ut Medicus ipse tangendo, & aspiciendo morbi sedem exploret thideat. Praeterea ex nostro casu patet, convulsivas agitationes ex velicatione remotarum partium laborari posse, praefertim in subiectis constitutionis sensibilioris. Hic enim abcessus circa aurem occultatus, propter vehementes fibrillarum distensiones & distractiones tam graves totius corporis excitavit convulsiones; quae tamen non ultra caput, ejus insegmenta, atque brachia se extenderunt; quia videbatur brachia & externae capitis partes à nervis cervicalibus seors accipere ramulos.

Qui plures de moribus convulsivis ac epilepticis casus, cum mea consultatione legere cupit; eas inveniet in Consultationibus ac Responsis medicis Sect. III. capibus CL. ad CLIX.

CAPUT III.

De Motibus Spasmodicis vagis.

§. I.

Est quoddam motuum spasmodico-convulsivorum genus, quod cum totis ferme inhaerescat corporibus, & mox caput, mox pectus, mox abdomen, mox externos artus molestissime detorquendo, mira volubilitate totam pervagetur machinam; nomen affectus spasmodici vagi, quem vulgo die Krübel-Kranchheit dicunt, sortitum est; nec incondie à TIMÆO à GULDENKLEE *epistol. 9. Lib. I.* epilepsia mira nuncupatur. Re autem vera hoc malum nihil est, *Definitio nisi violenta, involuntaria, plus minus vaga affectus spasmodici omnium totius corporis partium, maxime externarum artuum agitatio ac contractio; ex membranarum nervorum, juncturas partium involutionem vellitationem, per vaporem subtilem, acrem, volatilem facta. Et vi consensus ad cerebri ac medulla spinalis meningis sapissime propagata, originem trahens.*

§. II.

Patet ergo differentia, quae motus spasmodicos vagos ab epilepsia distinguit, & convulsivis. Quomodo enim epilepsia sedes in membranis cerebri, & convulsivum causa in medulla spinalis meningibus quaerenda est: ita & contrario motus convulsivi vagi à stricturis earum membranarum positionum, quae juncturas partium contingunt, natales suos mutantur; atque per consensum tantummodo in violentas meningum cerebri ac spinalis medullae contractions transeunt. Quamobrem sapissime quidem eam symptomatibus convulsivorum & epilepticis complicantur: attamen ab his ita differunt, ut convulsiones ac epilepsiae totum corpus aut partes quasdam simul & sensus invadant, eaque in uno paroxysmo solas pertinaciter adfligant; contra vero spasmi vagi incerta sede & per universum corpus circant, & ex una parte nervosa ad alteram transeant, cum contractionibus, distensionibus, inflammatione, tumore, crispatura minime exagitem, ejusque functiones vehementer laedant, atque prosterneant.

§. III.

Neque porro minus noster affectus insigniter discrepat ab anthride sic dicta vaga scorbutica. *Ab affectu scorbutico, vix ab epilepsia* Hae nimirum incertis quidem locis per totum corpus vagatur, & juncturas artuum potissimum occupat. Sed nunquam est sine doloribus, minime autem artuum convulsionibus ac agitationibus sic dicta eloncis stipata deprehenditur; contra vero affectus spasmodicus vagus plerumque doloribus vacuus, & à viot ejus partium vibrationibus, & admirandis geliculationibus semper conspicuus. Deinceps utroque affectus ratione causarum differt; quae in anthride vaga scorbutica humor crassior, acris, salinus exitit; in spasmodico autem vago affectu non nisi subtilissimus ac halitusiosus vapor, nervosa parsu repente lacessens & delectans.

§. IV.

Sciendum igitur est de nostro morbo, quod *Histore more*

paroxysmi
spasmodici
vagi.

more convulsionibus solent, suas per intervalla modo longiora, modo breviora format accediones, visu sapius horrendas; atque etiam tempestivam, lunæ mutationem, quæ de mensuræ purgationis in sequiori sexu habeat rationem. Expositi sunt huic immensi morbo foeminae præ viris, juniores præ adultioribus, & qui habito corporis laxo, spongioso, succorum languinifque pleno pollent. Deinde hic affectus hieme præsertim, inensibus Decembri atque Januario circa solstitium hibernium invadere observatur; atque præterea etiam deprehenditur hæreditarius; sic novi quidam in nostra civitate haud incelebrem familiam, cui familiare admodum fuit, & in qua omnes liberos severissimis ac atrocissimis misere cruciavit symptomatibus.

§. V.

Paroxysmorum
descriptio.

Ipse paroxysmus tot, tamque variis modis tyrannidem suam exercet, quot adoritur individua. Frequentissima symptomata hæc sunt: sentiunt acri sensum formicationis in manibus, vel pedibus; sequuntur oscitationes, pandulationes, præcordiorum anxietates: tum excipiunt ipse volutationes ac agitationes spasmodico-convulsivæ, ab uno membro ad alterum ambulantes. Mox enim brachia manusque attolluntur, trahuntur, retrahuntur, jactantur, variisque modis agitantur, ac si tribulantur; mox pedes in diversis plagas extenduntur, dextrum erus anteriorum, sinistrum retrorsum, aut vicissim trahuntur, terram validissime quatunt, conculcantur; genua ad corpus retrahuntur; mox totum corpus anteriorum, retrorsum, ad lætera movetur, attollitur, circumgyratur, committitur, spina dorsi incurvatur, arcum format; mox in terra interiorum illarum reptant, ac misere quatuntur; mox unguitas dilacerant vestes, scalant parietes. Non minus caput afficitur, torquetur moribice, non omnes plagas rotatur; oculi violentè aperiuntur, in pyrum moventur; os bñat, mox clauditur, huc vel illuc torquetur; linguam ore exierunt, atque commouent. Somnus edunt varios, miris omque hæc cum aliis que animalium voces amulant, ut à dæmone videantur oblecti; sicut, ridensque sine ratione, & aliorum voces acutissimis auribus excipiunt. Pæque vero internæ partes atque viscera à sævis spasmiæ inaniæ sunt: quæ, quod notatu dignum est, cum exteriorum artuum fibrilæ alternant. Hinc respiratio est angustissima cum suffocatione metu; cardialgia vehementi, crudelissima inter ventris tormina; singultus, cordis palpitatio; alvus asficcilissima; urinae veron vel nullius mictio; & verbo, nulla in toto corpore pars est, quam non pervadat truculentum malum.

§. VI.

Paroxysmi
finitio.

Finito tandem tristissimo hocce spectaculo, remanent ineffabiles corporis languores, vel alti sopores: haud raro truces articuli agitantur terminantur in tumores inflammatorios: in quibusdam cutis veluti bile suffusa flavelcit; in aliis pustulae foedæ ulcerosæ, vel vesiculæ magnæ aqua repletæ corpus obducunt. Quidam extra paroxysmum bene habent, bene ingerunt, bene egerunt; foeminae nonnunquam menses rite fluunt, interdum parcius. Post mortem in diffecis cadaveribus inflammationes ventriculi, intestinorum, hepatis, henis, pulmonum observantur; vesiculae fellis admodum turgida, &

ipsa bilis ad aliquot cochlearia in ventriculum effusa adparet. Conf. BONETI *syndecetum anatomicum, & Oper. de moribus convulsivis* pag. 120.

§. VII.

Notatu salinde dignum est, quod affectus noster spasmodicus vagus, certo anni tempore, certisque locis ac regionibus grassatus fuerit populariter. Sic junctus aliquando fuit febribus epilepticis adficientibus: hinc HORSTIUS in *Op. lib. medic. Tom. II. lib. VIII. par. 105*, refert historiam febris epidemicæ olim per Hassiam grassantis, cui gravissima præterea succurrit convulsio. Neque minus SENNERTUS delectat talem febrem epidemicam cum spasmis siquidam, quæ annis 1595, & 1597, in episcopatu Colonienfi, Westphalia, ac comitatu Waldeck, sub nomine *der Krübel-Krampf* populum elidit stragem; de qua peculiare Medicorum Marpurgensium exstat consilium. Hoc quoque nomine memorabilis est ille spasmodicus & orbæ, qui superioribus annis incolæ Minia, Marchia atque Lufiæ corripuit, & misis favicis symptomatibus tragolum luit; idemque ac prior nomen obtinuit. Descripsit est in actis MEDICOR. BEROLINENS. *decad. II. vol. VI. de à coelesti Basilio Medico, D.D. BUDDO tractatu peculiari.*

§. VIII.

Transito autem ad ætiologiam affectus spasmodici vagi; & illius cuiusvis formæ præmissum pono in fibrilæ spasmodicae eorum potissimum membranarum, quæ juncturas & articulos nostri corporis investiant: ex quibus vero vi contentis ad universum nervorum genus, hinc etiam membranas cerebri atque medullæ spinalis nervos lapissime propagatur. Inde enim clarissimum fit, cur frequentissime juncturae, vel unum alterumque membrum solum afficiatur: non minus ratio patet, cur haud raro totum corpus successe agitur, atque motus convulsivi & epileptici simul complentur. Et cum nervorum fere principes intercostales, ex variis nervosis ramis non modo ex cerebro proficiscensibus, verum etiam è medulla spinali oriundis, cervicalibus, dorsalibus, lumbalibusque compositis, per omnia corporis viscera, atque partes distribuantur: explicato facillimum est, cur motus in nostro affectu violenti, nulli sume regioni parcas, sed pro varia phantasia, quæ tantum non semper in paroxysma læsa observatur, tam diversas agitationes ac admirandas gestulationes producant.

§. IX.

Hujus vero vellicationis membranarum nervorum, & insequens convulsivi motus causæ, vel materiales sunt, vel, quod pierque fitim conrta partium nervosorum debilitate, atque prolixitate ad hos vagos motus reficunt. Nimirum parentes hisce moris tamati tantum non semper generant infantes, quorum genus nervosum ad eodem affectus valde dispositum est. Hæc vero dispositio consistit potissimum in ea particularum minutarum, quæ fibrarum ultimam consueunt, cohesione, quæ ex levidimo ac vix naturali majori vel fludiorum impulsu, vel alio quodam per animi affectus inducto impetu, in præternaturalem ac violentam agitationem compellitur. Quæ si nativa ac hæreditaria passio fuerit dif-

Conf. paroxysmi
descriptio
vagi.

Conf. paroxysmi
descriptio
vagi.

Conf. paroxysmi
descriptio
vagi.

dispositio; tum accedentes causae occasionales vel levisime tantos excitare valent tumultus, quantos in aliis sanis ac robustis subiectis ne quidem gravissimae prognerare possunt. Et nisi eadem haec nervosi systematis imbecillitas nativa deprehendatur; tamen, in malo praesertim inveterato, per motum diuturnitatem acquiritur, eamque quiescentibus offert, cur ii morbi tam difficiliter admittant curationem.

§. X.

Causa materialis.

Ubiunque non adest hereditaria ad motus spasmodicos vagos dispositio: hi semper pro materiali causa agnoscunt dyscrasiam quandam ac impuritatem humorum. Sciendum vero est, eam minime in humore quodam acri, salso, scorbutico crassiori consistere; sed potius in volatili, subtili, sulphureo, halituoso humore, vel vapore, exigua saepenumero quantitate in massa sanguinea oberrante, qui eo facilis ac intimius mixtus partium nervosarum poros subintrare potest, collocandam esse. Et tali ratione morbus nosse vagus ac arthritis vaga scorbutica eo melius distingui poterit; prout iam egregie ostendit JOH. DRAWITZIIUS in *tr. de scorbut. Tit. II. de affectu spasmodico scorbutico pag. 71*. Cuius etiam de morbis ejusmodi convulsivis ex scorbutica humorum diathesi subtilis SALOMON ALBERTI, WIERUS *de Causis* & MOELLENBROECK *de articulis scorbuticis* &c. Talis huius atque vapor subtilissimus inheret possumus lymphaticis lacis, qui ob suam viscositatem ad eos recipiendos aptissimus est: cum quo etiam per totum corpus circulat, & ad i. verveas deponitur partes. Hanc propulsis ad hancum corporis pustulis, vel maculis purpureis, scabiosis, vel ulcerosis, notabiliter vel immutatis, vel plane sublati fuisse hanc vagam nervosi generis moriones; neque minus istam vesicatoria vel cauteria insignem tulisse opem, probatissimorum Medicorum innumera testantur documenta. Quaevis vero est, cur vapor iste inimicus, cum lymphata oberrans, juncturas partium porulorum occupet, non neque alias partes? Non difficultas sine responsa. Cum enim in juncturis ac articulis, ad flexibilitatem ligamentorum conservandam, insignis lymphaticae subtilissimae portiones, cui inhaeret halitus noxius, ex glandulis volatilis acrimonia feceritur copia: necesse omnino est, ut in istis locis, ubi copiosior est proventus, major motuum violentorum deprehendatur frequentia.

§. XI.

Causa spiritus epidemici.

Quae igitur causae vaporem ejusmodi volatilem, causticum ferre ingenerare valent: illae omnino contribuant ad producendos motus spasmodicos vagos, & audiunt antecedentes. Haec inter se nobis primum offert aer exhalationibus malignis volatilibus repletus, qui etiam morbo nostro, ante aliquot annos in Lusitania ac Maritima epidemice grassanti suam dedit originem. Talis enim aer, suas exhalationes in forma rubiginis malignae, vel frumentaceae, vel mellitae, in fruges campenses, maxime fecale, eo, cum florent, tempore deponit; & hinc non solum utriusque fore frumentum coquina, verum etiam ad lolium praesertim frumentaceum, sanum aut temulentum, quod Botanici vocant *Lixium*, nostri *das Mutter-Brand-Aron*, den *tauben Rocken*, generandum mul-

tum contribuit. Fovet autem hoc lolium sulphur quoddam narcoticum, vaporosum, nervis admodum inimicum: hinc non solum antiquissimis temporibus cerebrum afficere, & oculorum caliginem inducere perhibebatur, atque ob hanc rationem lolio vichiesse myopes atque cocientes dicebantur; v. l. PLAUTUS *mil. glorios. Act. 2. Scen. 3. v. 80.* verum etiam vertiginem, temulentiam, vomitum, cardiacalgiam, soporem, delirium & spasmodicos affectus iude excitari jam annotavit M. N. C. *anno III. dec. II. observ. 186. & dec. II. anno VIII. obs. 183.* ACTA URATSLAV. *Temam. XXIII. mensis Januarii pag. 38.*

§. XII.

Non ergo dubitandum est, quin talis aer non solum per se inspiratus, sit noxiosissimus; hinc in ACT. MEDIC. BEROLIN. *dec. II. vol. VI. pag. 57.* observatur, piscatores, qui mane & sero in navibus suis commorantur, primum omnium hoc morbo correptos fuisse: verum maxime lolium illud frumentaceum, pani pisto immixtum, atque coactum, diuturnum illud malum spasmodicum progneravit. Namque annotavit Celeberrimus BUDDEUS *tract. de hoc morbo, pag. 24.* quod homines, quibus fuit curta supellex, & qui hoc frumento vesci delibant, longe frequentius moribus spasmodicis correpi fuerint, quam quidem opulentiores, qui fruges suas ab intermixto lolio depurandas curare possunt. Et sane lolis impurus sitidiusque vichis sufficit omnino generandi malignis humoribus, & hinc inducendo atroci maloque etiam illud ea insequi observatur tempora, quibus infensae annoae est caritas, annotat DRAWITZIO *tr. de scorbut. Tit. II.* circa convulsiones epidemicas anno 1596. ex eadem causa per Haliam grassantes.

§. XIII.

Quemadmodum vero affectus nostri spasmodici vagi, epidemici grassantis origo fulminans est; ita & contrario illius ex aliis causis producti generatio eo tardior, simulque contumacior duratio deprehenditur. Sordes primarum viarum, maxime in intestino duodeno stabulantes, acres, biliosae, acidae, malum illud excitare posse, nemo negabit: sed quomodo? Ex acrimonia primarum officinarum, praesertim si excretiones naturales per alvum, cutem ac urinam imminuantur, vel sanguineae suppressae fuerint, salia scorbutica fixiora in massam sanguineam transigrare certum est. Sed haec nondum sunt spasmodicorum vagorum causae: verum, si temporis diuturnitate, vehementioribus humorum commotionibus, aliisque causis, talia fixa salia sensim resolvuntur, attenuantur, ac in vaporem tenuissimum volatilem commutantur; tum enascitur malum nostrum scorbuticum. Inde patet, cur semina hysterica, viri hypochondriaci, alique, quibus impuri sunt humores, haud raro morbo nostro afficiantur.

§. XIV.

Eundem porro ad verminosa colluvie generari posse, experientia comprobatur. Hoc vero in calu non solum rationes inestimatorum, & verminibus vel vivis, vel eorundem acrimonia productis sufficit: sed quocumque vapores putres, caustici ex verminosa kentina mortua, corpora ac purrefacta exhalantes, in massam humo-

Affectus
de scorbutico
vago
exhalatione
produci
possunt.

A verminosa colluvie generari.

*de rebus
pulpa can-
nari mor-
bis.*

morum abripuntur, tunc demum efficiunt mo-
tus spasmodicos vagos. Tali ratione hi quoque
sequuntur purpuram, scabiem, achores, arthri-
tidem, podagram, ulcera, & alias cutis efflores-
centias, vehementi frigore aut ex aliis causis re-
pressas, ac intra corpus actas: quando nimirum
salia impura fixa, per recensita vitia prius ad cuti-
m depulsa, jam vero inus retenta, in volatilem,
acrem, causticamque naturam commutantur. Et
tum sciendum est, sepius exiguum valde firmen-
ti hujus acceritio molem, tantos, tamque graves
excitare posse tumultus.

§. XV.

*Causae
epilepticae.*

Quando igitur cunque vel nativa ad hocce
motus dispositio, vel vapor sulphureus in humo-
ribus praesto fuerit: tunc facillimum est, ut cau-
sae occasionales levissimae desiccantes malum ex-
citant. Ad has vero referenda sunt omnia ea,
quae succos vitales in motum naturali majorem
agere possunt; tum eum commovent & exaltant
simul simul inimicos, adeoque immanes
paroxysmos inducunt. Haec inter principem lo-
cum obtinent graviora animi pathemata, terror,
iracundia, moeror, tristitia, libido, & immo-
deratum gaudium; quippe quae in motus par-
tium corporis nostri & fluidarum & solidarum
concussio magnum habent imperium. Ob eandem
rationem alimenta, potulenta, quin & me-
dicamentis acris, drastica, purgantia, volatilia,
commoventia &c. efficacissimas ad revocandum
malum praebent occasiones. Est praeterea hic fa-
cile aer, si vel malignis & acris exhalationi-
bus repletus, vel pulso fervidiorum mox frigidi-
or exipiat: hunc enim insignem in excitandis ma-
chinis motibus possidere efficaciam, neminem fu-
git. Est hujusmodi constitutio ratio quoque
reddi poterit, cur affectus spasmodicus vagus per
certa temporis intervalia reveniat, & cur in lo-
cis potissimum paludosis ac humidis grassetur.

§. XVI.

Prognosis.

Quod denique attinet feralem hujus mali pro-
gnosis: dolendum sine est, cum plerumque non
nisi insuperatam suppeditari posse. Quamvis
enim illud non adeo perniciosum sit, ut protinus
reguler homines; saepissime tamen tam pertinaci-
ter inhaeret, atque adeo firmam sibi vindicat se-
dem, ut cunctam medicamentum eludens, per
multorum annorum seriem persillat, atque tan-
dem in epilepsiam, aut apoplexiam, aut ipsam
denique mortem definat. Ubicumque vero haere-
ditaria abest dispositio, morbus recens, à causa
externa inductus, aetas junior: tempestiva medicatio
selecem saepe numero sortitur eventum. Verum
quando vapores virulentius, nervosae partes jam
intus penetraverunt, & aliores jam egerunt ra-
dices: difficillimum est, illos expellere, atque
desideratam restituere sanitatem.

CURATIO.

§. I.

*Indicatio-
nes curatio-
nae.*

Affectus spasmodici vagi curatio quatuor po-
tissimum absolvit indicationibus; quarum pri-
ma est, ut materiam subilem venenatam, quae
tantos in systemate partium nervosarum ac mem-
branacearum excitat tumultus, corrigamus, ad
exitum disponamus, & e corpore prociubamus;
altera, ut impetuosas partium solidarum morio-
nes cohibeamus ac sedemus; tertia, ut causas, ac
Frid. Hoffmanni Oper. Tom. III.

fordes crassiores, quae malum sustentant, peren-
nenque fomitem subministrant, removeamus ac
eliminemus; ac denique *ultima*, ut debilitatas
partes, ne affectus hi inde solito recrudescant,
corroboremus.

§. II.

Quod priorem attinet indicationem; notandum
est, materiam illam inimicam, quae hos morbos
producit, duplici maxime deprehendi natura:
Aut enim illa est vaporosa, narcotica, sulphurea,
acris; aut magis salina, acris, volatilis. Prior oc-
currit in affectu, à causa externa epidemica, fru-
gibus impuris, loto temulentis, herbis ac semini-
bus venenatis hyoficymi vel danuae comellis in-
ducto: posteror observatur, si malum à diaethesi
scorbatica, putrilligie primarium vitium veneni-
tiosum, vel alia quacunq; retro pulsus exanthema-
tibus &c. suos traxerit natales.

§. III.

Quemadmodum vero haec misclinata malig-
na, cujuscunque sine generis, per cutis poros, vi
remediorum diaphoreticorum mitigentur, &
quam citissime prociubere oportet; in illis invol-
vendis, invertendis ac obundandis non praestanti-
ora sunt, quam acidula leniora ac subtiliora.
Haec namque omni veneno narcotico adversantur,
ejusque virtuti, & texture sunt contraria: tunc
hinc notabilis est observatio, quam LONGO-
LIUS in judicio medicis de grassante affectu spas-
modico communicat, dum recit, plures à solo
acido vini in principio morbi summo sanatos, &
à gravissimis symptomatibus liberatos esse. Est
praeterea etiam est aceti vini, aut succi citri effi-
cacia, si cum lapidibus cancrorum, & anthro-
no diaphoretico exhibeatur. Hoc nomine egre-
gia porro virtus debent nimirum simplicis, maxi-
me si juxta *Paracelsi* mentem pareat. Ille nimis
spiritum vini rectificatissimum super vitreo
calcinato destillavit, destillatum cujuscumque
tenui assidit, & sic aliquoties reiterari lo-
bit, obtinuit spiritum vitrioli, quem vocat antiepilep-
ticum; cujus tres partes, cum spiritum tartari ac the-
riacalis camphorata ana una portione permixta,
constituerunt mixturam ejus simplicem. Ex usu
mihi etiam est liquor meus anodynus, tribus par-
tibus cum una spiritus vitrioli bene preparat, ac
dimidia spiritus tartari volatilis, aut ebore mari-
tantis: quibus remediis mature datis, saepius ve-
nenum narcoticum involvitur, obundatur, atque
tum subpanctis diaphoreticis fixis è corpore de-
pellitur. Haec nimirum cum acidis istis alternatim
propinare convenit; & inter ea non praestantiora
deprehendi pulveribus, qui ex lapidibus cancro-
rum, succino preparato, pulvere marchionum,
nitro depurato, antimonio diaphoretico, cinnaba-
ri, & aliquot theriacis coelestis, quam & callores,
granis consociantur. Nec minorem laudem
merent decocta humectantia, infusa theiformia
diluentia, & quaecunque temperatam promovere
valent transpirationem.

§. IV.

Prius vero, quam ad horum remedium
usum accedamus; respicienda sunt causae ma-
teriales, acrimoniam illam inimicissimam gene-
rantes, & haec, quantum fieri poterit, removenda,
ut malo praestindatur pabulum. Quare si morbus
sit populariter grassans, & à victu impuro, aut
externa causa inductus: vim ejus insigniter fran-
get lenis emeticum, mature, primis diebus, &
*Melli spi-
ritu melle
casto.*

D

non solum cruditates in primis viis facile colliguntur, verum etiam ipsum malum recidere solet. Quare haud luctetur opera, si in usum vocentur balnea maritima, naturali frigidityate praedita, uti sunt Lauchladiensis, vel Freyentalensis; quae ad roborandum & confortandum corpus egregiam obtinent virtutem. Sub horum usu pariter ac eo absoluto, adhibenda sunt decocta diluentia, ex radice chinæ, scorzonæ, visco quercino, qui infigne roborans constituit: quo etiam nomine excellentis virtutis est cortex Peruvianus, in pulvere subtilissimo, cum succino, cinnabari, antimonio diaphoretico maritatus. Hic enim cortex blanda sua balsamica vi, humores corruptos, acres, biliosos in duodeno potissimum hærentes invertit, ac benignos reddit; atque ventriculæ ac primas vias roborans constituit: digestionem egregie adjuvat. Quo etiam scopo elixir nostrum balsamicum viscerale præstantissimum pollicetur opem; præsertim, si pilulis balsamicis, quandoque devorandis, primæ officinæ semper à Iordibus liberæ conferuntur.

§. XI.

Mechanici
proferuntur.

Præter hæc denique præsidia, ad nostræ affectionis præservandum, sedula causarum hac dispositionem evitatis, quam plurimum contribuit. Fugiantur nimium loca uda, humida, palustria; & aer feligatus purus, serenæ aque tenus: hinc etiam in malo epileptico effluente domicilia atque conclavia haud sine fructu suffraginis imbuantur. Victus porro sit facilis ac conveniens; ne cruditates in prima regione, novi mfractorum bubulum generentur: quare SEVERUS EUGALENUS *trakt. de Scorbuto pag. 119.* calum receniet, de convulsionibus scorbuticis in infante, qui nullis remediis utari prius poterunt, quam donec nutriti sana fuit quæstia. Inprimis cane popus & angue sugiantur alimenta ac potulentia calidiora, comensentia; ut & tam animi pathemata, ira, terror, cura, tristitia: utpote quibus in revocando moribus spasmodicis de convulsivis nihil est aliud. Aliis nunquam sit obstructa, nec sanguinis mox pilulo major: si licet hæc congruis venæ sectionibus ac scarificationibus ventilianda; illi victu emolliente, clysteribus, ac pilulis balsamicis lubricanda. His denique omnibus, præsertim viciis sollicitum brumale, quo plerumque hi adfectus recrudescere solent, utendum erit.

CAUTELÆ.

§. I.

Caveat
circa
medicam
cautela.

Si ullus est morbus, qui delicatius, ac levior quasi brachio tractari debet; certe est nosfer spasmodicus vagus. Responit ille valida, ac exacerbatur ab omnibus, utut levissimis spiritibus, comomentibus: ac calidioribus, bezoardicis, alexipharmacis, volatilibus, essentis, otens detestillaris &c. Materia enim sabno-sulphurea, quæ hos morbos sovet, tam subtilis existit, tamque volatilis, ut ab ejusmodi remediis admodum exaltetur & exagretur. Cuncta, quæ exhiberi possunt, medicamina, sint temperata; & in pulverem, mixturarum aquarem, decoctionum ac infusionum forma propinentur.

§. II.

Circa
medicam
cautela.

Hanc etiam cautelam circa ipsa antiscorbutica observare oportet: ex quibus non nisi *Frid. Hoffmanni Oper. Tom. III.*

temperatissima seligantur, uti sunt beccabunga, acetosa, & succus nascitur aquatici, quod præter sal volatile subamaræ & roborantis est virtutis. Optime enim in succo exhibetur; maxime si ille aut sero lactis, aut ipsi lacti nuptus, purgatis antea primis viis, propinetur. Si decoctionum formale arideant; illis addere convenit niterum; quippe quod radicem, herbarumque paulo acriorum vim comenorem inigniter hebetat.

§. III.

Fortiora purgantia adhibere, maxime, ubi scorbutica præsto est acrimonia; nihil est, nisi oleum camino addere. Narcotica, sulphurea, opiat, adstringentia &c. remota non tam materiali causa, propinata veniunt iustis sunt. Licet enim prima fronte malum allevare videantur; re tamen vera illud reddunt pertinacius, ac immam nervorum relinquunt debilitatem. Idem de asæ fætida, naribus extrinsecus almona, tenendum est; cui substitutæ præsto corium illud ex Russia ad nos deportatum, quod vocant *Jachten-Leder*. Fonticulos, vesicatoria, setacea &c. non promtue applicare decet; sed in certis duntaxat ac reservatis casibus, ubi nimium exanthemata, aut ulcera ad partes corporis interiores sunt retroacta, & malum est pertinacius.

§. IV.

Ubi affectum spasmodicum vagum, præter scorbuticum humorum dyssinam, atitichas hyssericus, aut excretionum sanguinearum suppressio sustentaverit: haud temere ad ischiaca, aut motus præternaturales sciencia, interna pariter, ac externa confugiendum est; sed antea bene providendum, ut a laqueis hæc effluat excretionum. Hoc sine venæ sectionibus convenienti tempore instituitur; clysteres; pulveres temperantes & antispasmodici; pilule blande balsamicæ; tepidiora potiluvia, &c. bonum ab horum usu regimen, quin & balnea temperata, ac denique rectis aequum miterum potatio utramque paginam absolvunt. E. georathio sciendum est, nihil magis felicem curamoniis succi elum adjuvare, quam si pori cutis aperti, & alvus libera fuerint.

§. V.

Adhuc circa scorbutum, si malo nostro bubulum dederit, tenendum est, quod in illo magis frigido, ut cum Veneribus loquar, aut ubi simul pinuita mucida, vappida, acida, in subjectis nature humidioris ac frigidioris peccat, magis è re sint antiscorbuticæ radices ac herbe in decoctis adhibenda. Contra vero, ubi subjecta fuerint strictiora, calidiora, cholericæ, & acrimonia magis biliosa, sulphurea, omnium remedium virtutem antecellit serum lactis.

§. VI.

Generatim hæc, & medicamina ex illo parata, si debito ordine, ac primis viis à biliosa acris fibura repurgatis usqueantur, ad infringendum & obviandum maximum malignorum, in his morbis peccantium, acrimoniam, præstantissimi usus est. Hoc iter alia patet, exemplo venenorum, ac drasticatorum purgantium & emeticorum: nihil enim certius & efficacius, ad convulsionem, & alias atrocissimas passionem ab illis excitatis deprehenditur, quam opportunus lactis usus.

D 2

§. VII.

§. VII.

Circa remedia
fœdiora ac
mercurialis.

Perniciosissimus in morbo nostro spasmodico, ubi jam salia acris, scorbutica præsto sunt, est quorumcumque salium & fixiorum & volatilium frequens & largior usus; quippe quæ materiam ac causam morbi magis adaugent, & symptomata exacerbant. Quare nec cinnabarina, quæ alias cum diaphoretica ac absorbentibus mixta securi sunt usui, cum salibus irritantibus combinare deest. Maxime omnium à mercurialibus quibuscunque sedulo cavere expedit: quoniam illa, si cum salina acrimonia permisceantur, causticam ac venenatam obtinent naturam.

§. VIII.

Circa remedia
fœdiora ac
mercurialis.

Sæpius tanta urget motuum violentorum vehementia, ut nulla fore resiliens intervalla, quibus convenientia propinari possint remedia. Tali in casu nihil est præstantius, quam remediis externis, ac limimentis, cum oleo hyoscyami permixtis, ad tempora adplicandis, blandum conciliare somnum; quo sævi tumultus placantur, ut deinde reliqua medicamina feliciori successu adhibeantur. Ceterum etiam roborandi sine limimento vertebra lumbares, ventriculi regionis, ac junctura parium adplicari possunt; ubi loco olei hyoscyami, oleum nervinum & lumbricorum terrestrium substitui debet.

ENARRATIONES MORBORUM.

OBSERVATIO I.

Observatio
huiusmodi
morbi.

Imploravit aliquando opem meam Comes illusterrima, annorum XXXIV. undecum liberorum mater, gravibus curis ac terroribus obnoxia, quæ per septem jam annos præter passiones hypochondriacæ convulsivæ vagæ per intervalla tam admiranda infestabatur, ut à multis salino adscriberentur, nec verbis lais potuerint exprimi. Extra paroxysmum vaga erat adpetentia; at sic ut plurimum ardentior, sub qua fauces & oesophagus plorabant lympham, saporem nunc meri piperis, nunc meri salis, nunc cupereum referentem. Præcordia distendebantur visibiles; venter resonabat continuis murmuribus; inestimationum volumen post levissimum motum sæpius occupabat colica convulsiva; alvus mox erat stricteissima, mox fluida, nunquam tamen absque tenesmo vel inguinum spasma reddebatur. In hypochondriis perpetuo sentiebatur inflammatoria quædam & quasi ulcerosa exæstuario, quæ sæpius sternum invadebat cum sensatione animalculi ibidem oberrantis. Urgebant mentis deliquia, cordis palpitaciones, & nocte præsertim tanta spirandi angustia, ut suffocari videretur. Caput crebra vertigine afflictebatur, cum dolore mox unius, mox alterius lateris spasmodico; & tanto sæpius assu intus & exus exardescibat, ut cerebrum quasi prunis afflari, facies roto igne afflari videretur. Somno utebatur turbulento; vigilans metu, tristitia, pavoreque sine causa percellabatur frequenter; ac ipsæ mentis facultates immixta carperunt. Ceterum partes externas nunc formationibus quidam sensus, nunc motus abolitis, nunc etiam tremor undulans, cum gravitate oppressoria occupabat: interdum tanta pedum urgebat elasticitas, ut perpetuo ambulans ac saluberrime adficeretur desiderio; mox in gens rigor totum corpus concubebat, qui in iriguum desine-

bat sudorem, interioribus ferventibus. Facies mox sanillima, mox ex nigro fulci coloris adparebat; pedes nunc tumebant, nunc variis pingebantur maculis; nunc etiam vesiculis, quæ disruptæ lympham stillabant ac errantem, obidebantur.

Menses rite fluunt; lochia, si sortis enixa fuerit, bene succedunt, & nonnunquam massulas purulentas simul fundunt, acrimonia aquam fortem superantes. Dietæ est ægra studiosissima; & pro potu ordinario nil nisi aquam simplicem assumit. Ipse paroxysmi visus sunt horrendi: namque illustrissima ægra horrendis motibus, nunc totano, nunc episthotono, nunc emprosthotono convolvitur, tenditur, circumgyratur, in choreas nunc ambobus, nunc uno saltem pede ducentes cogitur, & in cursum nullis frenis sustinendum rapitur. Nunc super genas, nunc super digitos pedum, nunc super plantas obliquas volutatur, donec in terram concidat, linguam cautum more cum sono anhelantium mortat; dentes collisis maxillis conterit; palmas manuum collidit; & tunc attonito & quasi moribundo sine detinetur. Sensus interni in convulsivo paroxysmo omnes sunt salvi, & ad inquem novit, quæ sub illo fuerint acta. At in posteriori accessione veluti cataleptica oculis licet clausis, carmina concepta, propria manu in charta dekeribit; clausis etiam oculis ita serica artificiosissime contextit; & ante facies stantes, utat sibi ignotas, nullo indrastre, ad se vocat. Hi paroxysmi per intervalla redeunt, & prænunciantur somnolentia jussu profundiori, adpetentia de pulsu aucta: tum viscida maci particula per freatum ejicitur; aut globiformis sepi transverberis comotio sentitur; & hinc subito superveniunt artuum agitationes.

Epicrisis.

Notabile hoc est exemplum motuum spasmodicorum vagorum, cum catalepticis symptomatibus & insigni humorum dyssasia scorbutica complicatarum. Hanc enim significat lymphæ illa acerrima, ex faucibus ac oesophago stillans, variolique spores referens, dolores rodentes, lancinantes, pungentes totius fere corporis; macule ac vesiculæ pedes occupantes, atque moleculæ illæ acerrimæ cum lochiis excretæ. Notabile vero in hoc casu est, quod appetitus, qui extra paroxysmum vagus erat, brevi ante ipsam accessiorem admodum auctus fuerit. Namque exuari appetitum à salibus acidis, unquam ventriculi vlcitantibus, neminem fugit; hæc vero salia, quæ sub motu spasmodico, i silent, reliquis viscida humoribus immixta quasi coarctentur; at quando per incipientes violentos motus è suo contextu extricantur, iterum efficiunt nervosæ partes; ut adeo causa pateat, cur imminens paroxysmum adpeditus antecedit auctior. Totum vero malum primum habet fundamentum in perverlo partium & fluidarum & solidarum motu: quod ex passionibus quas toleravit hypochondriacis clarum fit. Complicati in his adfectibus inestimationum motus spasmodici in causa etiam sunt, quod alvi negotium succedat admodum inordinatum; & illa, consequentibus spasmi, lubrica, his vero recrudescuntibus conditissima sit. Tenesmus, singula dejectionibus conjunctus, ab humorum acris oria dependet; & rostonis ille ac aestuatioti in hypochondrio dextro sensatio, à bile acriori, flagrantem, & per poros vesiculæ scilicet transfluente, vicinacitæ partes vellicante suas manatur natales.

Hujus

De Motibus Spasmodicis vagis.

41

Hujus autem affectionis, quæ adeo inveterata solidas pariter ac fluidas partes profus destruxit, curatio difficilissima fuit, ut adeo haud mirum, si omnium remediotorum, utæ præstantissimorum efficacia fuerit irrita. Laxantia vero, diaphoretica, balnea, aquæ minerales, vietus ac coeli mutatio insignifissimum in hoc spinoso morbo levamen attulerunt.

OBSERVATIO II.

Celebris vir, XXX. annorum, decem abhinc annis mensè Martio podagrico corrigebatur insultu, qui pedem finistrum occupabat, & intra tres hebdomades iterum evanescibat. Post elapsam exinde quinquennium, eodem mensè Martio ex improvisi doloribus vagis arthriticis omnium artuum, cum horrendis convulsionibus infestabatur: quibus intra sex hebdomades debellatis, succedunt tanta totius corporis imbecillitas, ut per tres integros menses obambulare, ac pedibus insillire nequiverit. Ante biuos annos, iterum mensè Martio reocurrerunt idem motus vagi, spasmodico-convulsivi & primum pollicem finistri, tum dextri pedis prehensibant, ac abhinc per calcaneum, pedes, genua, spinam dorsi, pectus, humeros, brachia, manus, digitos, cervicem & occiput protensis, rariis usum semper tollebant. Sedata atroces hæ affectiones, insequente mensè Novembri, eadem vehementia, quin convulsionum majori violentia recidebant, & symptomata visû horrendis fiebant. Tum accitit aliquando, ut in ipsâ dolorum exacerbatione, illam dorsi regionem, ubi diaphragma vertebri adhaeret, manu fortiter percussendam præberet: quo facto, remittebant quidem artuum externorum tormenta, sed atrociores intellectum prehendebant dolores, ut arthritim retropulsâ videretur. Vix autem una elapsa hora, alvus sponte solvabatur, & cum elyptemibus aqua, coctionis fœdes ac flatus reddebatur: quibus excretis cuncta conquiescebant symptomata, formæ & adpeditus redibant, & perfecta sequebatur convalescentia.

Epirrhia.

Plane singultrius, & attentione perquam digna est hæc observatio, quod fortè facta percussione ejus dorsi regionis, ubi tendines diaphragmatis vertebri lumborum adhaerent, externa artuum tormenta mox remiserint, & ad intestina retrocesserint: tunoque secuta crebrior alvi dejectione, & copiosa sordium eliminatione, vis motusque symptomatum mox conquiescebat. Nam si ullus in universo corpore locus est notabilis; certe hic ipse, cujus in historia morbi meminimus, attentionem meretur. Idem enim septi transversî tendines vertebri lumbaribus firmiter junguntur, & osciculum venriculi finistrum, valde nervosum atque sensibile; porro plexus major mesentericus, cum arteria & vena mesenterica, ac finis duodeni, in quo vitiosus morborum spasmodicorum & periodicorum fomes est, suum suum habent. Hinc vero videtur finissimum, & paullo fortiori hujus loci externa percussione, ingentem tam motuum nervosi generis spasmodicorum, quam etiam causarum hujus motus sustentantium, factam esse mutationem, eorumque ex uno in alterum locum translationem. Hujus externi remedii effectum in puerorum serena, atque suffocatio-

Frid. Hoffmanni Oper. Tom. III.

nem minime tulli, aliquoties vidi præstantissimum: neque etiam minus in viro quodam honoratissimo, qui sæpius cruciebatur graviori podagra, adnotavi, quod à parvis affectibus per malileum facta, usut dorifica percussione, insignifissimum dolorum perciperet allevamentum. Recle mechanica dici potest hæc curatio; quæ, si tempestive fiat, in certis circumstantiis felici haud carere potest effectu.

Quod autem præsens morbus demum per alvi dejectionem fuerit curatus; certum præbet indicium, causam illius materiam in prima latuisse regione. Hæc ergo idonea fors ejicienda est subtilius; cui quidem scopo formæ purgantia, salina, & stimulantia maxime inserviant; sed quæ leniendo, demulcendo, simulque evacuando agunt, magis conveniunt. Ex horum censu, mea experientia, omnibus reliquis præferri merear solonium mannatum, rhubarbariorum, tartarizatum, pro re nata cum uno vel altero tartari emetici grano acutum. Sic citra oracum noxam & tumultum tam per superiora, quam per inferiora subarua primarum viarum, quantitate sunt copiosa protuberant.

OBSERVATIO III.

Puer XI. annorum, strictioris corporis habitus, à teneris vultu pallido ac haurio præditus, & lapsus de iuni veneris torminibus consequitus, parentibus tamen lenis natus, obambulat aliquando hinc inde tempore in horto, ibidemque prævio gravativo in pectore sentit, & vomendi conatu, incidit in paroxysmum fere epilepticum; in quo post aliquot horas remanens, de oculis claudat prehendebatur. Abhinc malum magis invalevere cepit, & aliquoties quotidie recurrat, cum tanto membrorum robore, ut vix à tribus vix coherere potuerit. Paroxysmum antecedebat angustia præcordiorum, palitationes cordis, verigo, tintinnus aurium, & capitis gravitas: cum ipsiusmodi agitationis ab umbilico primum ad caput ascendunt, & ex hoc in externos artus diffusundunt. Quando caput afficitur, omnes cessant sensus & rationis potentia habetur; quando autem artus concutuntur, rationis redi integritas. Ipse corporis agitationes vanis quotidie modis tristem ludant tentant: mox enim insular galli cucurrit, mox boatum vaccarum amulasur, mox forium, quo venatores feræ alliciunt, modulatur; mox peregrinus linguis strepit; mox more n uscorum, modum canis manibus moderatur; mox magis mutus est quam piscis, & tum scribendo significat, prohibere jam sermonem se intra spatum esse requiraturum, uti etiam fit. Fingit præterea sibi meti solum varias inanes leas, ac terribiles imagines, loque spectra videre affirmat; verum etiam prædicit sæpius in paroxysmo res, quæ actu sunt. Et notum dignum est, ægerum aliquando, cum accitus vestri divini minister nomen Jesu pronunciasset, ingentem edidit clamorem; quo finito tranquillius præ se fundere valuit. Ceterum extra paroxysmum servilo insensu ad ætatem, somnosque placidissimum; & utrum magis æquodum. Ex exercitiis lenioribus bene habet; sed post insillitum protrahit veræ seditionem, malum exacerbati videbatur.

D 3

Epirrhia

tur : quo facto cuncta protinus remanebant symptomata.

Epicrisis.

Prodigiola unique, & quæ omnem mentis caput superare videtur, est illa vis, quæ in hominis phantasia latet, & quæ in morbis cerebri, atque generis nervosi atrocioribus, quam maxime sese exierit. Quænam Vetusitissimi, & Hippocratis tempore viventes Medici, loco naturalium causarum, quas ignorarent, vi Divi, sive divinum quid in subsidium vocarent : & non eandem rationem epilepsiam nomine morbi sacri insigniverunt. Nihil certe est locus, qui in Libro HIPPOCRATIS de morbo sacro §. 11. exstat, dum : *Qui primi, inquit, hunc morbum sacrum esse pronuntiaverunt, tales homines mihi esse videntur, quales etiam nunc sunt magi, & expiatores, & circulatores, & quidam arrogantes, qui se vehementer pios esse simulant, & amplius quid fidei. Hi itaque consilii & mentis inopie obvolantes, ac preterenti divinitatem, quæ nihil haberent, quod exhiberent prædixit ut ne manifesta fieret ipsorum error, aut sacra hæc affectio nem esse pronuntiarent, & relictis idoneis rationibus, curantibus in expiamentis & incantamentis quæserunt.* Verum cum causæ, quæ ad turbulenta ejusmodi, ac plane perverfam contriungunt phantasia, omnino sint physicæ acque mechanice, siquidem animus non nisi in mechanismo, per mechanicas causas & cum materia agere, agere & geri potest, quo immutato, illius quoque operatio mutatur : illæ hinc diligentius à medico sunt corrigendæ, & de corpore, & non de mente. E. ipsi jam Vetus, & recentior. HIPPOCRATES, talium cum corrupta phantasia comparationum, morborum curationem in remediis dieteticis, cibis accommodatis, si ubi aere, sique demum in helioboro deinde præparato quærites inveniri sibi. Quemadmodum enim à cibis copiosis, flatulentis, & qui crassius viscidiusque ingenerant succos, nec non aere nimis densio vappilique corpora, & per se jam imbecilla facilitate ad graves generis nervosi ægitudines disponuntur : ita omnino ad has præcavendas pariter, ac sanandas, convenienti vita regime, & victu tenet, qui nec stomachum gravat, nec cruditates relinquere nervis inimicas, & benigno coelo nihil observatur præstantias.

OBSERVATIO IV.

*Morbus
frigidus
et convul-
sivus, ex
animo et
corpore
procedens.*

Puer VII. annorum, alacris antea, & vegetus, ex improvise capitis acuto corripiebatur dolore, qui cum assu præternaturali, acque pulsus celeri erat conjunctus. Brevis post superveniente febrili circa regionem umbilicalem tormina, cerebri vomendi conatus, intolerabilis in ano pruritus, alvi obstinatio per triduum inhaerens ; & tandem eiciébant horrenda manuum pedumque convulsiones, & agitationes ex uno membro in alterum transientes : quibus cessantibus, absque sensu & motu, intentis oculis, graviter respirans jacebat. Hæc ergo symptomata præter antispasmodica, liquorem meum anodynum mineralem, cum tertia parte spiritus virosi junctum, & pulverem ex cinnabari, lumbricis terrestribus, nitro, & pulvere Marchionis confectum, opurgabantur laxante, quod ex munna, rhubarbo, semine fantonici, ac sale sediceni erat compositum. Hoc & recipiebant crebra alvi dejectiones, & cum illis, mirum dictu ultra milia asaridum tenuissimum, glomeris insulari juvencæ consortarum, excreuebant

Epicrisis.

Vermes, intestinis tenuibus, vel ipsi ventriculo incarcerationas, horrenda & portentosa in partium nervosarum systemate excitare symptomata, neminem fugit. Sed id non adeo obvium atque compertum est, ascarides, quarum sedes in recto, tanquam ultimo, & à capite remotissimo intestino est, convellendo universum nervorum genus, totam motuum vitalium, uno functionum animalium turbare posse economiam. Verum haud infrequenter non tantum in pueris, sed etiam adultioribus, præsertim foeminas ob mensium viuum cachecticis, ex ascaridibus varios & mirabiles capitis affectus, aphonia, profundum soporem, epilepsiam, catalepsin, convulsiones artuum vagas, ac mentis alienationes observavi. Quando vero hi vermes per suppositicia, anthehmica cum purgantibus juncta, ex quibus semen Santonici cum mercurio dulci ac plappa mixtum palam obinet, non omittis balniamis, foras pulsi fuerint, remittunt omnes affectiones. Causam tam gravissimarum passionum non in sola intestini recti vellicati-ne collo audam esse arboris ; nam læpe nec ullus dolor, nec pruritus in ano lenitur ; sed potius in puris horum animalculorum effluvis ac exhalationibus, per poros in nervos ac membranas partes sive insinuantibus ponendam esse, certus credo.

OBSERVATIO V.

Vir quidam LXIV. annorum, laborat affectu ipsi modo o vago, qui sic se habebat : ante invasionem concurrebat de pedum & crurum vehementi refrigeratione ; ut calore hæ partes foviri debuerint. Cassante paullo frigore, tormina atrocia infestabant abdomen, quibus præteritis nec flatus, nec faeces, nec urinae nisi poterant. Tum excipiebant quædam contractio in medulla spinali circa lumborum vena ; sub qua venter magis occludebatur, spasmodicus vero dolor ad tujnora simul ascendebat, cum junctis ructibus, capitiq; doloribus tensivis, gravativis, ac quodam stupore. Tandem assu cum pruritu totum corpus persundebat, & maxime regionem umbilicalem tanta occupabat ariditate, ut cutis veluti torrefacta, ac adusta, apparet. Non etiam minus extra paroxysmum crura semper manebant frigida ; manus vero notabiliter languere, & fligiditate, tremore, sensationisque potius ac motus quadam impotentia adhierebant : quid ? quod denique vera paralysis pedes acque manus obsiderit : reliquis symptomatibus spasmodicis in uno tenore perseverantibus. In tali rerum statu multa, ac vari generis medicamina, sed frustra succurrat assidua. Ego tandem consultus, clysteris emollientes ano insinui ; & decoctum ex sero lactis, floribus sambuci, & saffurcio aquatico paratum potari jussi ; ex quorum utro tormina & dolores abdominis admodum mingabantur, & conjunctis tandem balneis aquæ dulcis, alvi libertas inquebatur, æqueque habebat melius. Denique in faucibus de labiis, vesiculæ sero aquoso plene efflorescebant ; atque alvi profluvium lais copiosum accedebat, quo multæ sordes excrementitiae reddebantur. Et cum abhinc quondam deco-

*Symptoma
et al. aut
monia
impet
fuit*

decoctum chinæ potaret, externalque partes oleo
lumblicorum terrefruium sæpius perfundendas cu-
raret; vires sensum collegit, integramque recu-
peravit sanitatem.

Epiphyllum

Notabile spasmodum vagorum, licet cum violenta convulsionibus haud complicacionem exemplar fassit hic casus. Incepit nimirum illi in pedibus, horum refrigeracionem inferentes; ab hac per spinam dorsii, nervosa abdominis, maxime intestinorum partes obseclerunt, pertinaces alvi confusionsis & tormina exciando, tum pedes invaserunt atque praecordia; anxietates, ructus, ardorem ventriculi, & lymphæ ex ore vel poris facibus stillicidium inducendo. Tandem etiam caput occupavit, et in illo melancholiam, stuporem, vertiginem, vigiliis, delirio gravatum, tinnitum aurium, fistulam caninum, ac denique paralyticum affectus progenerant. Hocce vero malum à dyscrasia lymphæ de sanguinis acris, tenui, caustica, in nostro ætate originem traxisse; inter alia exinde patet, quod post æritum, quo ordinario spasmus declinatur, pruritus, fervor & exsiccatio cutis, & vesiculae in toto corpore apparuerint. Hinc etiam factum est, ut decocta diluentia, humectantia, & quæ acrimoniam temperant, ut siquidem lactis, in quo flores sambuci ac herba nasturtii aquatici decoquuntur, elyses emolientes, decoctum chinæ, atque balnea opem tulerint praefantissimam. Contra vero omnia, quæ intendunt loriculam humorum acrimoniam, veluti sunt fortiora purgantia, sudorifica, atque falina plane onari debent, quoniam his plus damni excipitur, quam emolumenti.

OBSERVATIO VI.

Vir XL. annorum, per duos abhinc annos crebris venereali inflationibus, ac infirmi abdominis tensione diuexatus, incidit ab aliquando post prævium iter, in vehementissimum gentium finitum lateris dolorem, adeo ut per aliquot horas inflat apoplectici omni fere sensu ac motu privatus esset. Tunc paroxysmus bis adhuc circa novitimum femp̄ recidebat; adhibitis vero vesicatoriis & scarificatione tandem remittebat. Posthæc circa ultimam lunæ quadrantem, ingentes laniationes cruris finitum prehendebant, cum totius corporis lassitudine, & quotidianis animi delictis signare; quæ subsequeute plenilunio in omnes atres diffundebantur, cum: nigredine ac motus impotentia in brachiis, horum quæ iunctura veluti è fæsa fusa disforquebant. Huiusmodi amicorum, locum mutare, iter ingredi, & corpus movere corripit: unde accidit, ut aliquando præter opinionem cruris finitum violenter retractum, dextrum vero antrofurum vehementer distillum fuerit. Diu etiam vixit in hoc misero statu, mulæ quæ Medicos adhibuit, quorum quidam infuleus apoplecticos, alii arthritidem, alii calculum, alii malum hypochondriacum iussicabantur, & variis quidem contra ea mala, sed in casum, pugnantibus remediis. Tandem cum atrocia & fere convulsiva intestinorum volumen excresceret tormina; injecti intra nyctem periton ultra decem cycleres, materiam compellam ac globosam inflat pororum Bordoridianorum minorum evacuatur; quorum globulorum singuli veluti calce erant obduli. Horum dejectioni fu-

perveniebant quidem animi defecimus; ut elapsi abhinc paucis hodie, singulare visum incrementum aeger recuperavit. Tum ulum esse lacte caprino, & ad ibernia Torphicenses concessit, & post illarum ulum f, inam dredi & juncturas artuum oleo nucis moschate fusi mungi curavi: quibus factum est, ut paucis diebus omnia remiserint symptomata, ac tantum pedibus accesserit robur, ut commodè ambulare poterit. Notabile ceterum in hoc morbo fuit momentum, quod manus, usus astricti, in d-fractae doloribus, paralyti fuerint immunes; quae tamen crura, à spasmus libera, omnino occupaverat. Nec tamen praeterendum est, aegrum iunias cabis rarissime habuisse animi d, liqua, quae vero in japoni fuerant frequentiora.

Enserif.

Lacenter ex hoc casu docemur, quoniam graves affectiones pernix alvi obligatio, & intestinumque a subura crassa atque compacta oppletio, nisi progredere, saltem sustentare valeat. Prælia igitur alvum in morbis chronicis, spasmus, convulsus lubricum ferreus; cui loco, tantum absenti purgantis convenienti, ut serpius etiam blanda laxantia oretenus exhibere haud liceat. In nostro saltem casu omnia purgantia, quoniam & laxantia non nisi vomitus excitant, & spasmos exacerbant. Contra vero consilium est, clystera ano infundere oleosis, ac emollientes; quibus forces crassiores diluantur, & ad exitum disjiciuntur. Tum quoque jungere licet laxantia, & quidem lentissima, veluti egi marina cum oleo amygdalarum dulcium. Hicce inque tubulis postquam exurgate fuerint sordes crassiores: reliqua remedia, quæ ad temperandam Italia scorbutica sunt opposita, felicitati successu, majorique cum fructu adhiberi poterunt, quæ inter terum lactis, præteritum dulce, est præzantissimum. Tandem ad artem roborandos thermæ Terphentes, & olea juncturis iuncta, utilissimam tulerunt opem.

OBSERVATION VII.

Puella XII. annorum, diu male habens, tandem in afflictum spasmodicum vagum delabatur, cujus paroxysmi per vires sequentes in modum invadebant: conipitur prius aegre dolore abdominali atrocissimo; quo cessante maculae hinc inde per corpus dispersae efflorescunt, & his demum et convulsionibus, spasmodicae motiones narium pedumque succedunt, atque tandem epilepticae juncturae agitationes. Observatione hic dignum fuit, quod quotiescunque externarum partium dolores ad spasmi remittuntur, illi protinus interiora occupantur, cum aliis adflictionis consummatis, & tanta contractione, ut filigines clysticam non intrudere fere fuerit impossibile. Contra vero cessantibus internarum partium moribus, spasmi iterum ad externas transferuntur; & haec scena per longum tempus acta fuit, donec tandem morbus, clysteribus oleosis, sive lactis, decoctis anisoforbaticis &c. feliciter fuerit profugatus.

Epistola.

Notari ex hoc casu meretur, quod sub violentis
intellinorum tormentis, crassa praesentia atque
reclum, circa exitum, adco confringi solent

Abstract
v. 1: 1945-1949
v. 2: 1950-1954
v. 3: 1955-1959
v. 4: 1960-1964
v. 5: 1965-1969
v. 6: 1970-1974
v. 7: 1975-1979
v. 8: 1980-1984
v. 9: 1985-1989
v. 10: 1990-1994
v. 11: 1995-1999
v. 12: 2000-2004
v. 13: 2005-2009
v. 14: 2010-2014
v. 15: 2015-2019
v. 16: 2020-2024
v. 17: 2025-2029
v. 18: 2030-2034
v. 19: 2035-2039
v. 20: 2040-2044
v. 21: 2045-2049
v. 22: 2050-2054
v. 23: 2055-2059
v. 24: 2060-2064
v. 25: 2065-2069
v. 26: 2070-2074
v. 27: 2075-2079
v. 28: 2080-2084
v. 29: 2085-2089
v. 30: 2090-2094
v. 31: 2095-2099
v. 32: 2100-2104
v. 33: 2105-2109
v. 34: 2110-2114
v. 35: 2115-2119
v. 36: 2120-2124
v. 37: 2125-2129
v. 38: 2130-2134
v. 39: 2135-2139
v. 40: 2140-2144
v. 41: 2145-2149
v. 42: 2150-2154
v. 43: 2155-2159
v. 44: 2160-2164
v. 45: 2165-2169
v. 46: 2170-2174
v. 47: 2175-2179
v. 48: 2180-2184
v. 49: 2185-2189
v. 50: 2190-2194
v. 51: 2195-2199
v. 52: 2200-2204
v. 53: 2205-2209
v. 54: 2210-2214
v. 55: 2215-2219
v. 56: 2220-2224
v. 57: 2225-2229
v. 58: 2230-2234
v. 59: 2235-2239
v. 60: 2240-2244
v. 61: 2245-2249
v. 62: 2250-2254
v. 63: 2255-2259
v. 64: 2260-2264
v. 65: 2265-2269
v. 66: 2270-2274
v. 67: 2275-2279
v. 68: 2280-2284
v. 69: 2285-2289
v. 70: 2290-2294
v. 71: 2295-2299
v. 72: 2300-2304
v. 73: 2305-2309
v. 74: 2310-2314
v. 75: 2315-2319
v. 76: 2320-2324
v. 77: 2325-2329
v. 78: 2330-2334
v. 79: 2335-2339
v. 80: 2340-2344
v. 81: 2345-2349
v. 82: 2350-2354
v. 83: 2355-2359
v. 84: 2360-2364
v. 85: 2365-2369
v. 86: 2370-2374
v. 87: 2375-2379
v. 88: 2380-2384
v. 89: 2385-2389
v. 90: 2390-2394
v. 91: 2395-2399
v. 92: 2400-2404
v. 93: 2405-2409
v. 94: 2410-2414
v. 95: 2415-2419
v. 96: 2420-2424
v. 97: 2425-2429
v. 98: 2430-2434
v. 99: 2435-2439
v. 100: 2440-2444
v. 101: 2445-2449
v. 102: 2450-2454
v. 103: 2455-2459
v. 104: 2460-2464
v. 105: 2465-2469
v. 106: 2470-2474
v. 107: 2475-2479
v. 108: 2480-2484
v. 109: 2485-2489
v. 110: 2490-2494
v. 111: 2495-2499
v. 112: 2500-2504
v. 113: 2505-2509
v. 114: 2510-2514
v. 115: 2515-2519
v. 116: 2520-2524
v. 117: 2525-2529
v. 118: 2530-2534
v. 119: 2535-2539
v. 120: 2540-2544
v. 121: 2545-2549
v. 122: 2550-2554
v. 123: 2555-2559
v. 124: 2560-2564
v. 125: 2565-2569
v. 126: 2570-2574
v. 127: 2575-2579
v. 128: 2580-2584
v. 129: 2585-2589
v. 130: 2590-2594
v. 131: 2595-2599
v. 132: 2600-2604
v. 133: 2605-2609
v. 134: 2610-2614
v. 135: 2615-2619
v. 136: 2620-2624
v. 137: 2625-2629
v. 138: 2630-2634
v. 139: 2635-2639
v. 140: 2640-2644
v. 141: 2645-2649
v. 142: 2650-2654
v. 143: 2655-2659
v. 144: 2660-2664
v. 145: 2665-2669
v. 146: 2670-2674
v. 147: 2675-2679
v. 148: 2680-2684
v. 149: 2685-2689
v. 150: 2690-2694
v. 151: 2695-2699
v. 152: 2700-2704
v. 153: 2705-2709
v. 154: 2710-2714
v. 155: 2715-2719
v. 156: 2720-2724
v. 157: 2725-2729
v. 158: 2730-2734
v. 159: 2735-2739
v. 160: 2740-2744
v. 161: 2745-2749
v. 162: 2750-2754
v. 163: 2755-2759
v. 164: 2760-2764
v. 165: 2765-2769
v. 166: 2770-2774
v. 167: 2775-2779
v. 168: 2780-2784
v. 169: 2785-2789
v. 170: 2790-2794
v. 171: 2795-2799
v. 172: 2800-2804
v. 173: 2805-2809
v. 174: 2810-2814
v. 175: 2815-2819
v. 176: 2820-2824
v. 177: 2825-2829
v. 178: 2830-2834
v. 179: 2835-2839
v. 180: 2840-2844
v. 181: 2845-2849
v. 182: 2850-2854
v. 183: 2855-2859
v. 184: 2860-2864
v. 185: 2865-2869
v. 186: 2870-2874
v. 187: 2875-2879
v. 188: 2880-2884
v. 189: 2885-2889
v. 190: 2890-2894
v. 191: 2895-2899
v. 192: 2900-2904
v. 193: 2905-2909
v. 194: 2910-2914
v. 195: 2915-2919
v. 196: 2920-2924
v. 197: 2925-2929
v. 198: 2930-2934
v. 199: 2935-2939
v. 200: 2940-2944
v. 201: 2945-2949
v. 202: 2950-2954
v. 203: 2955-2959
v. 204: 2960-2964
v. 205: 2965-2969
v. 206: 2970-2974
v. 207: 2975-2979
v. 208: 2980-2984
v. 209: 2985-2989
v. 210: 2990-2994
v. 211: 2995-2999
v. 212: 3000-3004
v. 213: 3005-3009
v. 214: 3010-3014
v. 215: 3015-3019
v. 216: 3020-3024
v. 217: 3025-3029
v. 218: 3030-3034
v. 219: 3035-3039
v. 220: 3040-3044
v. 221: 3045-3

ac coarctari, ut nec excrementis, nec flatulentis vaporibus exitum permittant, neque subilum, qui clysteres injiciuntur, ut uti tenuissimum recipiant; aut si quoque hanc admiserint, ipsi tamen infusi clysteribus, veluti vi quadam flatum repellant. Hujus vero momenti ratio, falso à quibusdam flatibus obicem ponentibus imputatur: siquidem ex physicis liquet documentis, quod fluida, quæ vi quadam ex clysteribus ano impelluntur, resiliunt, obstantium flatuum longissime superent. Vera potius causa in ipsa intestinorum pertinacissima contractione latet, quæ etiam motus eorum persiliciter haud raro ad superiora convertitur. Hinc lapidime fit, ut non solum ventriculi inflationes, cardialgie molestissimæ, anxiætae præcordiorum &c. suboriantur; verum etiam laxaotia cretæna data, per vomitum reddantur, quin nonnumquam ipsi clysteres cum flatibus per superiora eruantur. Præstat itaque in tali casu sub ipso paroxysmo, nihil nec laxantibus, nec clysteribus moliri; sed potius partes conflictas externis emollientibus relaxare, & extra accessum tempus blandis vacuumque sabbatum acrem eliminare; aliisque antispasmodicis & anodynis irregularæ ac inversæ morus demulcere.

OBSERVATIO VIII.

Concussion
and lacerations
of the scalp
and parietal
bone.

Puer annorum circiter XIV. inter rixas cum commisitombus, faxo satis duri circa os suam ac coenitica graviter percussus; cum subsequeto parvis albidis vehementi tumore ac dolore, tinnitque absum diffixi, ac povere pleno. Vicarius Chirurgus os coxeygs fratum dicebat, varisque extrinsecus aliphaticis emplastris pariter ac linimentis. Neque tamen minus tertio die post accedebant horrenda artuum convulsiones, cum vehementi cordis palpitatione, praecordiorum subulibus, feminum difficultate, & memoriae debilitate fipate, ut vix cognosceret adstantes, ac pollicum tamen contractione immunes. Datis diaphoreticis ac anisipalmodin medicinis, intra quinque dierum spatium cessabant hae praeternaturales motiones; sed singulis menibus, secundo vel tertio anni lunam plenam die, quo percussio violenta erat facta, semper redibant. Accetiones flans frigidiores, ex offe facro per dorsum ad cerebrum ascendentes, antecedeabant; tum incomposita loqui coepit, non dormire, nec domi contineri poterat; oculi laepius torvi videbantur ac terribiles, & redeuntibus lenique sentibus, vaga artuum convulsio sequebatur. Tali malo per anni dimidium cruciatus ager, tandem per balnea aquae dulcis; per pulveres anisipalmodicos, quorum basis erat cimabris, ac pulvis lambrocorum terrestrium; decoctum vici quercus, radicisque chinæ, cum quarta lactis partem totum, aequae per linimenta, quae praeter alia oleum hyocyanici ac camphorum habebant, offe factum adpicata, quae Dei est gratia, prorsus remittebatur sanique.

Epicrifer.

Ex hac morbi historia, diligentius pensitata, luculenter patet, quam admirandus sit membranarum, quae maxillum hyemale cingunt, cum aliis nervosis ac membranaceis partibus consensus, qui in manua motum vitiosiorum communicatione ac propagatione consistit. Sensatio

autem illa frigidae auras ex loco affecto per dorsum ad caput ulque ascendunt vix ab aliqua causa dependet, quam à fibrillarum spasmis, et per materiam subfistula aëris et ichorolæ vellicationem inducitur, in ossis sacri medulla incipiente, et in forma motus undulatorii succedente ad cerebrum ulque propagata. In tali casu, ubi etiam ex plantis pedum ad caput aspirant, aura frigida epilepsiam peperit, non sine fructu applicare fructu temperatum vesicatorium, quod ex drachma una cantharidum cum emplastro de melillo uncia una permixta paratum, per aliquot septimanas parti affectæ impositum servetur. Hoc enim sine dolore operatur, et ingeniem feri vitio- rum extrahit coquum.

Notabilem de hac re videas casum in *Consul. medic. feli. IV. cas. CXXXV.*

CAPUT IV.

De Aff. du cerebri spasmodico-ecstatico, vulgo cataleptico, perquam raro.

5. L.

Potentio similis, & admiratione dignus est nervi generis afflicti. qui homines laesit, statique marmoreis immobiliores reddidit, ut ait Plinius, quam Latini per deprebenfionem, ditionem, ac cancellationem interpretantur, nomine labatur. Est illa, si reale spectemus definitiorem, spasmica fibrillarum nervorum, ac nervorum, alitibus potissimum volucriis, & sensibus deponentium, prope sua origines contractio, & inde dringens liquiditudo, quae in cerebro ferri, cuius ego sum ac motui animae, in nervorum canales infundit: unde omnes sensus ac motus volubriter perierunt, & corpus in eo, quo fuit necesse mali est, fixe, immobile perstat; cuius imaginationis flatus intenditur.

4. 11.

Agitur inter Veteres controversia, an catalepsis idem sit cum catop. hoc morbus; necne? Quidam dicuntur habere adficionem; & catop. illum esse potibent affectum, quem contra vigil adpellant Veteres; ubi somno pene videtur agniti, & tamen vigilant, sed nec sari, nec ullum membrum movere valent, sensu praeteritum tactu inextinguo. Contra vero plerique catop. cum catalepsi pto synonymia habent; quos inter HENR. AB HEER *op. III. & NICOL. PISONEM de morbis cognoscendis Lib. I. Cap. 10.* allegare sufficit. Reali autem est quae catalepsi ac tetani intercedit differentia. Quenadmodum enim in *tetani* totum corpus, & cuncta membra tanto rigore dissenduntur, ut illa ligno rigidiora nec tumere visclicere aut incurvare valias; & praeterea lentius parit ac ratio sibi consilare: ita è contrario in *catalepsi* immotum quidem fiat corpus, sed flexile manet, & quocunque autem fluctare ac agitare potes; atque lentius omnes pariter ac ratio ureunt.

6. III.

Cataleptis omnium sane morborum est rarissima; ut ideo HENR. AB HEER Medico, se plunquam milites vidisse catalepticos narravit.

jaclanti, responderit: *O te infelicem, non puto fuisse mille catalepticos, ex quo marbarum terra incubuit color.* Quotquot tamen legeris de hoc morbo in libris Medicorum sparsim obvias observationes; invenies illum humilis potissimum tempellate, & sub frigore intensissimo homines invadere. Quomadammodum enim frigus generit nervoso generi est inimicum, & ad producendos morbos spasmodicos admodum opportunum: ita vero quoque simillimum est, in nostro morbo nervorum fibrillas ad concipiendam spasmodicam conductionem frigore reddi agtissimas; eo magis, cum solo horrendo frigore prodigiosum hoc malum excitari, plurimae testantur observationes. Corripit equidem mixtos per intervalla, & paroxysmos, qui saepius per aliquot horas durant, & juvenem quandam, cujus meminit FORESTUS *Lib. X. obs. 42. pag. 369.* per tres integros dies detinuerant. Raro quaedam praecedunt notae, mali adventum praemonstrantes; nisi quod sacerdos quidam, de quo FORESTUS *loc. cit. agi.* obitum antea in posteriori capitis parte senserat dolorem; ac monacho, cujus calum recenit HENR. AB HEER *obs. III. pag. 43.* ante invasum mali oculum riguit.

§. IV.

*Perseverans morbum de-
scripsit.*

Plerumque subito invadunt paroxysmi, & sic se habent: In quocunque situ fuerint acri, in eodem simul ac itenel manent rigidi ac immoti; sedentes sedent, stantes stant, cubantes cubant; si clausi fuerint oculi, clausi manent; cum vero malum de die plerumque accedat, oculi tenentur aperti, irretiti, in unum locum fixi, ac si Medusae caput inmeruerant; & licet illos studio perfrinaxeris, inconsuenter manent. Interim loco moveri, & arnus flecti possunt; sed quocunque inflectantur, illic immoti persistunt; impulsi progrediuntur; & puer, quem ex FERNELIO allegat FORESTUS *Lib. X. obs. 47. Scd.* & sculo sublevis confitebat. Neque vero ullus adest sensus, nec vident licet aperti oculis, nec audiunt, nec gravissime compuncti sentiunt. Nihil tamen minus actus automatici legitime succedunt; pulsus scilicet naturalis, spiratio facilis; & auctoritate FORESTO *loc. cit.* quicquid insinuat ori, devoratur. Saepius abdomen, ac coxae inferiores convelluntur, testantibus eodem FORESTO, SYLVIO, FLATERO & BOLAO *Encyclop. med. pag. 6.* Ituc alva tanquam adstrictissima, ut nec temulura inarcti creat fistula, observante HENR. AB HEER *obs. pag. 39.* Color faciei manet floridus, juxta NICOL. PISONEM *Lib. I. Cap. 13. pag. 93.* Tandem inter alta suspiria ad se redeunt; tumque mira, quae audirent ac viderent, iustis eclatiorum, narrant. Extra paroxysmum plerumque a cibis vel plane abstinent, vel saltem pauca comedunt.

§. V.

*Sublevis
cataleptico.*

Huic malo, praesertim cum eclasi conjuncto, forminae prae viris deprehenduntur obnoxiae, astantibus BORELLO *Cap. XI. hist. 54.* & MARCO MARCI in *Philos. resp. pag. 397.* Possident enim illae fibras molliores, teneriores ac sensibiles, quarum ratione non solum ad suscipiendos generis nervosi motus inordinatos admodum proclives sunt; verum etiam ad impressiones ac passiones animi fortiores fovendas, & morbos ex corrupta phantasia subortos per-

quam opportuna existunt. Deinde vero si sit temperamentum melancholicum, & ubi vis imaginationis excelsit, facillime hic morbus suboritur; praesertim si juxta NICOL. PISONEM *loc. cit.* & ipsam experientiam, viclus frigidior, tempus anni, & regio ad frigidam constitutionem prompta accesserint. Et denique adhuc notari meretur, quod in hoc morbo patiens vasa, quae in basi cerebri ad synchitum tendunt, sanguine crasso nurgida, ac posteriori cerebri pars letrosa colluvie imbuta reperiuntur. HENR. AB HEER *obs. III. pag. 45.* in tali subiecto cerebrum in anteriori parte durum, in basi mollius ac humidius; nervorum vero origines sicillitima & solito graciliores deprehendit.

§. VI.

Tradita hac cataleptico historia; ad causam ipsam, atque formalem rationem indagandam progrediemur. Hanc in posteriori capitis parte habere; non modo defunctorum sectiones, atque dolores in posteriori capite ac nucha paroxysmos nonnunquam antecedentes testantur; verum etiam omnes unanimi ore adfirmant Medici. Verum in praesens determinanda symptomatum causa, in variis minus clarae abierunt opiniones. Plurimi spiritus animales adeo fixari ac concernari afferunt, ut in motu suo praepediantur: quod de hisce corporibus subtilissimis ac penitissimis nullo modo concipi potest. SYLVIVS *prax. Lib. 2. pag. 474.* experimento clymrico, quo spiritus urinae volatilis confusus cum spiritui vini rectificatissimo in coagulatum spiritus concretis, persuasit, credit in catalepsi spiritus animales, qui ad indolem spiritus vini rectificatissimi accederent, a spiritu volatili urinoso, fraternaturaliter in corpore genito congelari, ut immobiles manerent. Verum falsa subest applicatio, & fallacia non caute ut causae: namque primum tantum abest, ut spiritus animales epuldam cum spiritui vini sint naturae, ut posui hic in quantitate assumunt, narcotici inducat. Deinde in allegato experimento spiritus vini neutiquam coagulatur, sed val volatile in proprio suo phlegmate solum, continetur, effusione spiritus vini rectificati precipitatur.

§. VII.

Nos potius causam cataleptico in denegato Equi tenuitatis in nervos ad motus voluntarios ac sensus destinatos influat, qui & contrario in nervos actibus vitalibus & automaticis interviens naturalis, quoniam ex parte impetuosior est, collocamus; at quomodo ille interpretatur, jam disputandum est. Quod si ergo perpendamus; omnes totius corporis sensationes, omnesque functiones animales in cataleptico penitus cessare, vero est simillimum, fluidi nervosi influxum in eo potissimum loco intercepti debere, ex quo omnes nervorum nostrorum fibrae principium sumunt, ac primum originem trahunt. Hic locus audit sensorium commune, & ille est, in quo primum quoque animae sedem, nos collocare oportet. Quamvis enim illa, tanquam substantia immaterialis, non bene includi queat loco; attamen cum cerebello sit, spiritum hunc immortalem archetypum cum corpore vivere commercium, & magnum in sensus & functiones, quae dicuntur animales habere directorium; necesse est, ut ipsi ratione operationum, quas bene-

*Sensum
motorium
de
causa
cataleptico.*

*Causa
cataleptico
presumenda.*

ficio fluidi tenuissimi, modo nobis incomprehensibili edis, certum utique adsignemus spatum, ex quo omnes, quae in fibris sunt, mutationes feriant, & actionibus, quae ipsius voluntati subjacent, commode fungatur.

§. VIII.

*Sensum
compositum
describo.*

Commune vero sensorium nec juxta CARTESIUM in glandula pineali; nec ad mentem LANCISI *differt, de sede animae cogitantis* in corpore cerebri calloso; sed cum anatomicorum accurationibus ac recentioribus, in medulla oblongata, atque ea quae basin cerebri constituit, collocamus. Exinde enim egressi canales nervosi, tunicae extimae, à pia meningē copiosissimis vasis intertexta, ac medullares cerebri trachus ambiente, mutantur, & sic ad totius corporis partes, sensui motuique voluntario inferri abeunt. In haec vero fistulas nervas, fluidum subtilissimum, cum sanguine per artenas carotides ac verebrales ad caput delatum, resorpta à venosis vasis crurali substantia, in parte cerebri corticali secretum, & denique per medullarem regionem vi quadam impellitur; ut hujus beneficio certas cogitationes sequantur certae motuum in corpore determinaciones; & vicissim certas corporis motiones excipiant certae in anima ideas.

§. IX.

*Quomodo
et ubi
fieri
influxus
habeat
res d
nervorum
gubernetur.*

Quomodo modum igitur effluo fluidi tenuissimi influxus recte, & proportionata quantitate se habent, omnes sensationes, & functiones animales vigent, debitoque peraguntur ordine, atque tum fini vigilamus: na si parcius fuerit ille influxus, dormire dicimus, eoque plane intercepto, omni sensu ac motu voluntario destitui. Omnis vero hujus influxus interceptio, vel fibrillarum nervearum paralyti, vel spasmusica constrictione fit: namque nervorum obstructionem, quam stantem, nequaquam locum habere, jam in *Comit. ac Resp. med. Sect. I. Casu 49. Tom. I.* demonstrarum dedi. Enim vero in catalepsi paralyti fibrillarum nervearum ea non potest esse causa, quae remotetur fluidi subtilissimi introitus in nervos; cum paroxysmi per intervalla recurrant, & sub iis facies sit rubicunda; quae in morbis ejusmodi à causa paralytica inductis, quorum idea sententia soporosi spectant affectus, longe aliter sese habent. Ergo in catalepsi fibrillarum nervearum, in sua origine, antequam piam matrem penetrant, spasmotica constrictione & causam denegat spirituum in nervos influxus; & hinc reliquorum omnium symptomatum verum & amplissimum juxta §. VII. praebet fundamentum.

§. X.

*Remane
sensum
compositum.*

Hinc igitur omnes utique sensationes, omnesque animales functiones cessant; cum autem in paribus his interviemibus nullus sit spasmus; ratio patet, cur membra per se immota, flecti queant, ac quocunque illa flexeris, ibidem vi movere careant, immota rursus quieti. Sed dum haec sunt, vigent omnes motus, quos automati vocant. Namque constat ex anatomicis, quod sicuti nervi sensibus, ac motibus voluntariis destinati ex cerebri medullari substantia suam trahunt originem: ita & contrario functiones vitales, quae animae imperio nequaquam subiacent, nervis ex medullari

ac inferiori cerebelli parte propulsantibus administrantur, testante inter alia experimento à Clarissimo VIEUSSENS *Neurograph. Lib. I. Cap. XX. pag. 123.* allegato. Jam vero in catalepsi illas fibrillas, quae ex cerebro orae nervos dant actibus voluntariis inservientes, comprimimus; at illae, quas cerebellum ad vitam conservandam emittit, salve manent in statu naturali: hinc pulsus cordis & arteriarum viget, facies rubet, respiratio fertur naturalis &c. Interim cum fluidi tenuissimi in organa sensui, & motui voluntario ministrantia denegatur influxus: facile fit, ut illud majori copia ac impetu in partes actus vitales perfricantes ex cerebello impellatur. Hinc petinacissimae, quae alvum occupat, constrictionis, motuumque abdominalis & pectoris convulsivorum origo petenda est.

§. XI.

Restat adhuc illud momentum explicandum, quo cataleptici saepenumero observantur ecstasici. Picurumque enim finito paroxysmo narrant mira gaudia, aut phantasmata tragica, visiones divinas, consuetum angelorum; quin & futura praenunciare videntur, ac vaticinos se simulant. Tales memorabiles casus paucim observantur in medicorum scriptis. Conf. PAULINUS *Cent. IV. observ. 18.* MARCELLUS DONATUS *Cap. I. pag. 91. seqq.* AUGUSTINUS *de civitate Dei Lib. XIV. cap. 23.* ACT. MEDIC. BEROL. *Dec. I. vol. II. pag. 62.* A. N. C. *Dec. III. anno III. obs. 61. & Volum. I. obs. 250. pag. 563.* Neque vero in his casibus diabolus vim quandam adhibere; nec animarum & corpore ad alia loca, quin plane caelum secessum fluitare, nec alias praeter naturam causas allegare necesse est; nec ad nos pertinent ecstasies Pauli, Sanctorumque; quidem de illis dumtaxat loquimur, quae in morbis corporibus sunt. Et si tali ratione consideremus, subjecti catalepticos plerumque esse melancholicos, vi imaginariae fortiori gaudere, ac circa ideas sacras de Deo, angelis, vita aeterna tantum non semper esse occupata; deinde, si experientis, ac exemplo infirmorum sussili supponamus, animam, quo magis à perceptione objectorum externorum, ac motuum vitalium exercicio seriatim, eo intensius phantasiae indulget: firma sequitur conclusio, visiones ecstasiacorum catalepticorum non nisi effectus esse intensioris phantasiae: dum anima à commercio rerum externarum vacua, praeteritis rerum ideas repetit, ex quibus inter se collatis etiam fieri potest, ut futura praenunciet. Sed revertamur ad causas mediatas, quae malo cataleptico excitando sunt opportuna.

§. XII.

Eminet inter illas vitium humorum crassorum, ac viscerum, quos Veteres dixerunt succos melancholicos; qui in capite ac cerebro difficiliter progredientes, & in hujus basi praesentim ac pia meningē flagnantes, efficacissimam constrictionem fibrillarum nervearum suppediant occasione. Hinc non tantum formae hystericae, virique hypochondriaci ac melancholici praeter alios catalepsi patiuntur, verum etiam hoc morbo peremptarum scitio docet, vasa in posteriori cerebri parte crassio & consurgula sanguine repleta fuisse, ac in ipso cerebro extravasatam serosam haesisse colluviem. Conf. HOLLERIUS *Lib. I.*

*Causae
catalepticae
modicae
sunt
inter
causas
compos.*

de morb. intern. & SCHENCKIUS Lib. I. obs. 2. Ex his quoque patet clarissime, quare con-
fuetas & ordinarias sanguinis excretiones sup-
pressas, nonnunquam subsequatur catalepsi: vi-
de FONSECAM Lib. II. Causalt. 92. Neque
minus ratio patet, cur puer ille, cujus AETIUS
Tetrabibl. 2. Serv. 2. Cap. 4. meminit, per tri-
dium congelatus, tandem effluso per nares co-
piosissimo sanguine, statim convalescit. Eo magis
à spissis humoribus catalepticum laborari po-
terit malum, si illorum vehementis expansio ac
excessus, & hinc exorta valorum cerebri ac
piae matris diffusio accesserint. Unde concipi
poterit, quomodo illud, ex febris intermit-
tentibus, incongrue suppressis ac volatilibus
tractatis, juxta DODONÆUM obs. med. 41.
ex nimia vini generosi ingurgitatione, teste
PLATERO lib. 1. fol. 27. ex ebrietate ac ni-
mia iracundia, notante DOLE in encyclop.
medic. pag. 56. prognatum fuit. Nec silentio de-
nique praeterniti debent vermes, ac lumbrici
intestinalium, qui sicuti gravissimus morbus, ita
& cataleptico animum trahere possunt, testante
observatore à MARCELLO DONATO Lib. II. Cap. VII. pag. 166. recensita.

§. XIII.

Animi pa-
thema.

Præterea ingens debetur animadversio gra-
vioribus animi pathematibus, quibus con-
vulsionem fibrillarum in cerebro nervarum, cum
subsequente catalepsi, excitari pariter ac relaxari,
in crispiorum monumentis passim relatam
legimus. TULLIUS Lib. I. obs. cap. 21. juve-
nem quendam ex inopinato maritimonii repudio
catalepticum factum, & illo promisso restitutum
allegat. RONDELETIUS Lib. I. pag. 10. casum re-
fert de puella, viro, quem insigniter oderat,
nupta, quæ ex cerebro hunc morbum
incidit, equique paroxysmum, quoscunque ma-
ritum vel vidisset, vel de eo audisset, vel etiam
cognovisset, rotinus correpta fuit, HENR.
ab HELR observ. III. recenset catalepsi fin, quam
vir quidam melancholicus ex nimio moreto to-
leraverat. Idem malum, nimium quoque men-
tis intentionem, ac profundas fixatque medita-
tiones, præsertim si temperamentum frigidum,
aliæque occasionales causæ accesserint, excipere,
probatissimum Medicorum documentis con-
firmatum habemus. Quales casus reperies in
GALENO Causarum, in HIPPOCR. .. cap. 56.
ZACUTO LUSITANO Lib. I. Epist. 47.
FERNELIO in pathol. Lib. V. cap. 2. Multo
magis ad nostrum affectum, cum oculi complicati-
one, meditationes sacre profundiores contri-
bunt; imprimis si spiritualis de conatibus peccatis
supererexit tristitia. Conf. SENNERIUS
in praxi pag. 598. HERFELT tr. philof. hominis
pag. 183. AUGUSTINUS de civitat. Dei
L. 14. c. 24. GEIERI præf. trall. Liebe Gottes
und des Nächsten.

§. XIV.

Catalepsi
ex frigore
hæretica.

Refertur quoque ad catalepticos merentur, qui
nimio atque horrido frigore percelluntur ac
veluti congelantur. Ratio hæc est: frigus vim
habet externum corporis habitum, quem imme-
diatè ambit, validissime comprimendi: quo
confrieto, humores ad interiora majori copia
compelluntur, in capite præsertim cumulantur,
in vasis cerebri stagnant, hæc distendunt, &
hinc fibrarum nervarum ex cerebro prodeun-

tiam stricturnam, catalepticos cum omnium ten-
sationum abolitione suppetat originem causantur.
Continuante frigore insensibilis, & hinc duran-
tibus jam recentius illius in corpus effectibus;
tandem fit languis aut feri in capite extravasatio;
quæ sæpius comprimitur cerebellum, ut nec
in organa vitalia influere queat tenuissimum fluidum,
& inde denum mora legitur. Quales tri-
stissimi casus, sicuti quotiæ contingunt, hæc præ-
sertim à FORESTO Lib. X. obs. 41. conspici-
mi deservimus: ubi tub hiems alperitima gelu
emplexus milites in excubis plantas mortui hæc
reperi; alii equis insidentes, ac habentes in manibus
albac habentes, congelari ex equis sublati
sunt, quia & ipsi tandem equi immoti perierunt.

§. XV.

Quod si perferretur causæ, quæ paroxys-
mos catalepticos revocare solent, occasionales
has inter principem locum illic vindicare gravi-
res animi commotiones, ita, scilicet, gaudium,
metus, consilium. Pertinent hæc quoque ob-
jectorum intrinsecorum visum: vid. casus §. XIII.
ex RONDELETIO allegatus. Quodam ex
verbis quorundam recreatione, aut psalmo-
diarum cantu congelari, scriptores perhibent; &
ego ætiam vidi, quæ, auditæ verba ardentis-
simi Cæsi amorem experientibus, distende-
batur; quemadmodum peribyr ille, cujus
morbum recenset AUGUSTINUS hæc, cit. ad
prolas lamentantium vocis, suo vehementius est
paroxysmo. Non minus ad hujus rei mali gene-
rationem contribuit frigus ær, habitatio in
locis alius, montosis, frigidis, tempus anni hæc
male, ac vicius crassus; annotante NICOL. PI-
SONE L. I. c. 13.

§. XVI.

Quod tandem attinet prognosin catalepticos; prognosin
ea si fuerit ab animi passionibus, aut profundis
meditationibus orta, non adeo grave, ac sub-
ito lethiferum innuitur periculum: contra vero,
quæ à sanguine crasso, vitioso, impuro, ac ex-
cretionibus sanguineis superpelis fovetur, gravi-
ssimum metum incutit. Namque vel in melan-
cholicum definit, sicuti observat NICOL. PISO
loc. cit. pag. 92. vel commutatur in morbum co-
nitialem, ut MARCELLUS DONATUS
Cap. VIII. pag. 186. ex Benivento allegat; vel
denique in morbum subito terminatur apople-
xiam, vitæ que tollit. Npc. levioris momenti est
congelatio, quæ à frigore inducitur; nisi enim
tempestive ferantur supplicæ, mors sequitur re-
pentina.

CURATIO.

§. I.

Quod attinet spinosi nostri mali curationem, indicandi
illa duobus potissimum absolvitur indicationibus;
quarum prima est, ut spasmodicam, qua
fibrille nervæ in cerebro deservunt, stricturnam
relaxemus; altera, ut causas materiales si-
ve mediatas, quæ ad dictam confriktionem
inducendam contribuerunt, decenter removeamus.
Quemadmodum priori indicationi in ipso
maxime paroxysmo satisfieri oportet; ita
posteriori potius extra paroxysmum inq. curare
debet.

§. II.

§. II.

ENARRATIONES MORBORUM.

OBSERVATIO I.

*Catalepsi
circa narium
paralytica-*

Sicuti in omnibus capitis gravioribus affectibus, qui à sanguine copioso, valde commoto, ac largius ad caput raptio suboriantur; uti sunt cephalalgia, deliria, convulsiones, epilepsia &c. ita quoque in affectu nostro cataleptico, si talem agnovit causam, praesentissima est sanguinis, intruso naribus stylo, facta detractio. Neque vero veteribus ignota fuit hac operatio; & digna sunt verba ARETÆI, quæ de *Cerat. marb. dist. Lib. I.* exstant, ut hic allegentur. Namque *necesse est*, inquit, in allegatis narium calibus, ut sanguis è nasi interioribus detrahatur: inter enim prælongum instrumentum immittitur, quod caietadion vocant, aut illud, cui stonyne nomen est; aut si quis horum capiam non habuerit, penna enserina cavem et afforem sonere debet, eoque nervosam partem denticulatum inflet ferre incidere, atque sic intra narem usque ad ossa, quæ ethmoides ob fori similitudinem vocantur, immittitur, deinde ut aque manu agatur, quo locus à dentibus insculpat, ac vulneretur. Facilis est enim ac copiosus sanguinis cursus: nam vena gracilior in nares desinunt, corporaque in hac parte mollius sunt, et fessiori habita.

§. III.

*Uter aëris
mutatio-*

Morbus catalepticus, si ab imaginatione sustentatur, spernit & eludit omnium remedium opem: peregrinatio vero ac aëris mutatio optimam spondent auxilium. Dicit enim vix potest, quanta virtus & efficacia ad morbos nervosi generis & spirituum sanandos, insit peregrinationibus, in loca præsertim quæ salubri aëre fruuntur, & qui secundum Celsi monitum contrarius est illi, qui morbum fecit. Aer enim illud elementum præcipuum & tenuissimum, quod portione sua elastica ætherea cum sanguine & succo lymphatico mixta & sensum & motum moricibus lobulis paribus præstat, & secundum Galenum divini quid in se habet in mortis. Præter ea peregrinatio id quoque habet beneficii, quod ideæ consuetæ, quæ mentem turbant, subtrahantur, & jucundioribus animæ affluat. Quin ipso temporis beneficio sponte debellari hoc malum, haud raro observatur; siquidem progrediente ætate & fibræ nervæ sunt robustiores, & anima constantior redditur.

§. IV.

Præserva-

Quod præservationem atinet; ea obtinebunt, si causæ occasionales, ad hoc malum contribuentes, probe fugiantur. Ea cum haec inter frigoris insignem efficaciam obtinet, omni studio illud acere oportet; atque etiam, si rationes domesticæ permiserint, ex habitationibus frigidis, montosisque, ad loca, ubi benignius cælum est, discedere. Viçtus sit conveniens, inque eo sagiantur cibi acidi, ac qui frigoris quoddam ventriculo inferunt. Evitentur solitudines ac soligantur grata consortia, quibus animæ à curis, morboribus ac meditationibus sit vacua. Maximore versus hiemale tempus probe observetur, ne materiales in corpore causæ relinquuntur, quæ malum illud inducere valent: quo fine & primæ viz à sordibus severetur liberæ, & sanguinis copia, congruis illius mulsionibus, nec non frequentiori corporis exercitatione, immittatur.

Puella XII. annorum, temperamenti sanguineo-melancholici, ingenii admodum vegeti ac vivaci, novem abhinc mensibus prima vice uterinae evacuationis onus subit. Elapsa inde quatuor hebdomadibus, cum inflaret menstrua periculosus, multa edulia saccharo condita, cyminique semen, quod semper in deliciis habuerat, ingurgitavit, & brevi post ingenia in ventris tormina percepit. Datis ergo laxantibus, & antihelminticis remediis, insidique uno chyloribus, lumbricus per alvum reddebatur longissimus: menses vero hoc tempore silebant, quamvis circa lumbos & ipsum uterum atroces lavarent dolores. Hinc succedebant convulsivi ac epileptici motus, cum delirio furoreque quasi uterino juncti; & frustra misso ex vena in pede rufa sanguine, frustra quoque datus remediis antispasmodicis, uterinis, antihelminticis, carminativis &c. per quinque septimanarum decursum peritaciter insarebant. Paroxysmi tam variis modis, tamque mirandis symptomatibus, tristem ludabant scenam, ut vix describi queant. Mox enim inter deliramenta, singulus, ac graves septi transversi convulsiones, totum corpus è lecto in altum elevabant: & remanebant convulsiones, relicta corporis languoribus, ac præcordiorum doloribus. Mox sub delirio convulsivi motus atus duntaxat misere torquebant; ut omnes manuum pedumque digiti incurvarentur, pollex vero ac medius digitus rigidus extenderetur; deinde brachia retroriam traheret, usque caput percueteret; tum eadem antrorsum vi quadam raperet, ac pectori validissime alliceret. Mox inter hæc violentas agitationes mentis compos videbatur, sacrosque cantus cum summa devotione per satis longum tempus modulabatur. Tandem accedebat catalepsi, quam vocant, ecstasica; dum per aliquot horas lecto affixa mansit rigida, & nulla arte excitari posuit, oculis apertis, vultuque amæno, ac si de quadam re gauderet, decumbens. Postquam ad se rediit; narravit jucundissimas visiones de Deo, angelis, cælo, visa æterna; atque validam se gessit. Ceterum per quinque fere hebdomades eorum nihil plane assumsit, præter gelatinam corvi cervi, novissimis tantummodo diebus sorbillantem; cerevisium vero ac vinum quotidie, sed parca quantitate, potavit; & quod notabile est, singulis diebus copiosa ac valde dura alvo reddidit stercora. Vultus colore gaudebat floridissimo, qui nec sub ipsis animæ defectionibus, quas crebro patitur, expallescebat, sed roseus manebat. Pulsus ferebatur naturali similis; nec urina, præter largum sedimentum, mingebatur præternaturalis. Noctes, nisi tranquillo somno, atamen ab omnibus symptomatibus vacuas transiit; ac omne tempus pios meditationibus, & sub insigni mentis reque consumit.

Epiëpisy.

Duplicis generis causæ hunc portentum ac mirabilem sustentaverunt affectum: nimirum partim lumbrici in canale intestinum hospitantes; partim sanguis in vasis uterinis, ob mensum defectum stagnans, atque corruptus. Hinc non sane mirum, si symptomata fuerint eo graviora, ac atrociora, cum a duabus causis, quarum quævis

*Catalepsi
circa uterum
paralytica, &
vires hysterice
propaganda.*

sola tali morbo inducendo sufficit, sint excitata. Quamobrem in mali hujus curatione, ad hanc duplicem causam directa fuit medendi intentio: præter enim temperatiora, simul tamen efficaciora, anthelmintica, exhibenda curavi congrua antihysterica, ut eorum virtute liber sanguis per uteri vasa circueat, ejusque superflui per mensuram periodam excretio facilitaretur. Fuerunt ex horum numero pilulæ balsamicæ, ad ductum Becherianarum cocinnatæ, cum aliquot granis extracti croci, atque cassiæ maritatæ, & alternis diebus, maxime circa tempus menstruum, propinatæ, mane desuper forbillato infuso, ex herba melissæ, artemisiæ, floribus cheiri, ac chamæmeli vulgaris. Jussimus præterea ante horum remedium usum, ad relaxandos intestinorum spasmos, durasque faeces emolliendas, ano injici enemata, quæ plurimum olei cocti habebant. Denique præter alia antispasmodica, motum corporis per deambulationem, ac vectationem in curru sub ære sereno commendavimus: quibus factum est, ut ægra perfectam recuperasset sanitatem.

OBSERVATIO II.

*Causæ
et progressus
meditationis.*

Persona frequentior sexus vix excedens annum ætatis xxiv. conditionis vilioris, rudioris minus culti ingenii, aliquando in templo tempore brumali, attentius hauriens sacrum verbum de vera contritione, ac iniunctione cordis in versione, de peccatorum abominanda ac detestanda coram Deo iussissimo iudole, summo mentis angore afficiebatur, inque dies & horas meditationibus istis anxius sacris macerata, moerissimum semper incedebat vultu. Elapsis abhinc quatuordecim diebus accidit, ut ipsa, audita in templo concione, omni penitus sensu ac motu ex improviso privaretur: & finito cultu divino, instar statui immobilioris, oculis apertis, & cælo affixis, omnem excitationem eludens, reperiretur. Tandem post horæ spatium sua sponte, emissis aliquot suspiriis ad se redibat, sensumque cum motu recipiebat. Examinata respondebat, se nihil sensitse, vel audivisse, bene habere, & quasi altissimo somno sepulchrum jucundissimè habuisse speculationes, ac contemplationes sui Salvatoris. Huic accessum, plus centum vicibus intra quadraginta diem spatium expensum est, interdum mihiorem, & breviorum, interdum longiorum & graviorum, semper tamen talem, ut omnis tentata excitatio, per fortissimos spiritus volatiles, nebulas ac naribus admotos, frictions, atque punctiones, elusa fuerit, ac frustranea. Ipsa in paroxysmo pulsus fuit naturali similis, & respiratio salva, ac integra, præter quod circa declinationem, nonnunquam fortissimas thoracis atque abdominis concussiones, & elevationes, cum palpitante cordis motu toleraverit: quæ tamen, simulac sensus & motus rediit, statim exspirarunt, ægra de nullo dolore vel molestia amplius conquerente: vires etiam post paroxysmum ita seipsum constabant, ut consueta sua munia subire poneret, totum corpus calore ac colore naturali eret persensum; excreta omnia se bene habebant, nec mentis sui officii oblivisciebantur. Attamen per quatuordecim ferme dies ab omni cibo, potuque abstinens, & quotiescunque exorata aliquid acciperet, summa præcordiorum anxietate, cum metu suffocationis juncta infestabatur, somnoque fruebatur parvissimo. Ex quod notata erat dignissimum, hi paroxysmi fere semper in-

vadebant post auditam psalmodiam, aut verba ex divino codice positum usque prolata, quæ ardentissimum Christi exprimebant amorem. In tali casu in usum vocabantur multa, varique remedium genera, alias generosissima, venæ sectiones, topica, quæcunque excitantia: sed cuncta eludebat perniciocissimus affectus: docec tandem, mutato aere, ægræque ad alia loca peregrinante, sponte sensim evanescere.

Epiresis.

Insignissimum cataleptico ecclæsticæ exemplar notabilis hic sistit casus. Nullam istæ causam materialem habuisse videtur; sed à solis pertinaciter animæ indixis ideis originem traxit. Hinc eleganter pariter ac perite Clarissimus MORHOFIUS in *disser. de paradoxis sensum* scribit: *Mirabile præ ceteris, quod tamis vulgarissimum, posse ex auditu verborum, ac orationis elaborata homines duci, & quasi extra se rapi.* Atque eo majorem homines efficiendi possident efficaciam verbum divinum; ut, si nostri infinitus ratio exigeret, dictum PAULINUM, quod in *Epist. ad Hebræos Cap. IV. v. 12. exstat*, hoc nostro casu, egregie illustrare possemus. Quod nullæ prelo fuisse causæ materialis, vel exinde patet, quod paroxysmi, excitati per psalmodiam quidam aut verborum sacrorum sonum ideis, revocati fuerint; ac præterea ægrotas omnibus functionibus, quas vitales vocant, absque ulla labe gavisa sit. Quod atinet convulsivas nonnullarum partium in ipso paroxysmo agitationes; illæ fluidi tenuissimi impetuosiore ex cerebelli in organa vitalia influxui, qui illud ob denegatam in partes, sensui, motuique voluntario intervenientes, introitum, abundantie debetur, originem suam petierunt: Dejectæ ciborum appetentia ratio facile etiam poterit suppeditari; si ex experientia repetatur, illos, qui meditationibus suis intentius in obiectum quoddam feruntur, passus oblitivi, ac cibos fere averſari. Tum vero, quo diutius à cibo abstinemus, eo magis perire adeptum, præter multa documenta, vel ex historia testatur, quam DIEMERBROECK in *vol. ænætem. pag. 38.* de semet ipso refert: se, postquam cum locis per seque diem jejunaſset, non amplius famem sensisse ad tertium utique diem. Hinc vero cognito quoque facillimum, cur nulla materiali causâ præſente, nulla opem tulere remedia; sed tandem mutatio aëris, ac ætatis sponte spiritus exspiraverit affectus.

CAPUT V.

De affectu spasmodico-convulsivo ex uteri vitio, sive malo hyſt. rico.

THESES PATHOLOGICÆ.

§. I.

MORBUS ille, aut potius morborum cohors, quam per vocem *affectus hystericus* interpretantur Veteres, æquo, quin majori quam ullus alius affectus, jure, ad passionis generis nervosi spasmodico-convulsivæ, & quidem universales, referri meretur: siquidem nulla fere in tota machina animalis nervosa, ac fibrosa pars est, quæ non plane effrenatis spasticis fibrillaribus, & convulsionibus extinguitur, torqueatur, & gravissime distra-

*Definitio
mali hysterici.*

distrahatur. Hujus ergo ideam suppetituri, ipsum definimus, quod sit *effectus generis nervosi spasmodico-convulsivus, ex utero à hymphæ & sanguine in ejus vasis tenente vel corrupto proveniens, & per nervos ossi facti, ac lumbares & totam medullam spinalem, universi corporis partes nervosas plus minus infestans.*

§. II.

*Hysteria
mali hysterici.*

Perperam confunditur atrox hoc malum à plerisque nostri ævi Medicis, cum sic dicto hypochondriaco; aut si fortan admittitur quedam differentia, ea solummodo sexum respicit, adeo ut passio hypochondriaca ad nobilitatem, hysterica ad molliorem restringatur; utriusque tamen insidiosa ac natura, pro uoa, eademque habeatur. Quo vero patet, longe aliam ac realem hujus affectus intercedere differentiam; operæ erit pretium, primo omnium veram morbi hysterici historiam præmittere. Hoc sine si Veterum monumenta paulo perussumus, & ex iis præsertim HIPPOCRATIS, ARÉTÆI, FERNELII, DURETI, MONTANI, BALLONII, HOLLERII, MERCURIALIS, JOH. HEURNII scripta consulamus; in eo ad unum omnes convenire videntur, quod fascium strangulans, intercepta ad suffocationem usque respiratio, animi defectio, vocis privatio, soporque profundus, vera, propria, & essentialia lupus morbi uterini signa, & symptomata habenda sint. In eo etiam plures concordare deprehenduntur, ante mali hysterici invasionem, motum globi cuspis à sede inferiore ad superiora ascendente sentiri: unde etiam signum multo mulierculis familiare nascitur, quasi uterus versus superiora feratur.

§. III.

*Paroxysmi
mali hysterici
descriptio.*

Hæc præcipua sunt quidem, quæ malum hystericum constantur symptomata; sed ante eorum invasionem de præsa longe alia & plura observantur, quæ successive in paroxysmo miseris invadunt, & nulli corporis regioni parcent. Nam quod caput attingit, frontis, temporum, vel etiam oculorum cum lacrymarum effusione, visus obnubilatio; dolorem pressurium, sensuumque & mentis torporem, omnium rerum tactu stupor, ut plurimum præcedere adnotamus. Deinde correptæ hoc malo plerumque alvum fortiter adstrictum, & compressum habent, ingentem quoque ad urinam, quæ clara instat aquæ mioginæ, stimulum, neque minus anxiam & suppressam spirationem, atque universi corporis languorem experiantur. Hisce postea gravis dolor lumborum, cum ingenti algore & horrore succedit; venter durus & inflatus est, postea umbilicus retrahitur, adeo ut foveæ, cui includi aliquid potest, relinquatur; & tunc globum quandam ex inferiore ventre ad hypochondria & diaphragma ascendere perferunt. Mox cor cum tremore incipit palpitare, cum pulsu inæquali & duro, quandoque intermittente; extrema algescunt, fauces angustantur, ut fune veluti strangulata videntur; facies fit pallida, spiratio valde est difficilis, vox perit, arteriarum pulsationes vi amplius percipiuntur. Tanta vero est ventris strictura, ut nec ulla flatas transmitti, nec propter ingentem resistenciam quicquam clysticis admitti possit. In quibusdam tanta est mali vehementia, ut convulsivæ de capitis & artuum agitationes, cum vel sine pollicum conclusionem deprehendant.

Frid. Hoffmanni Oper. Tom. III.

tur. Aliæ in profundo, sine ullo sensu & motu, sopore jacent; quibusdam facies cum collo à sanguine est inflammata, rubicunda, arteriæ fortiter pulsant; aliæ in risu inmodico solvantur, & resiliunt voce delirus loquantur.

§. IV.

Quandocunque vero paroxysmus remittit, & miscere incipit, quod sæpius certa sit temporis periodo, tum pulsus, qui antea valde debilis, languidus, & absconditus erat, vegetior, mollior & erectior redditur, in partes extremas redit calor, facies contracta & pallida fit explicatior & rubicundior; eructationum per superiora impetus auditur, horborygnæ de murmura in ventre oriuntur, & tandem è profundo quasi somno evigilantes, vocem, sensum & motum recipiunt; de dolore autem capitis gravativo, totius corporis & semorum ac pedum languore, & gravitate conqueruntur. Mirum certe videri potest, quod sæpe tam brevi tempore, ejusmodi perniciosa, atque præsentem interitum minitanti symptomata cessent, & internant; adeo, ut quæ pridie mortui videbantur, nunc sanitate integra frui censeantur. Accidit vero nonnunquam, ut perseverantibus symptomatibus pro mortuis habitæ, sepulchro destinatæ, imò sepultæ fuerint: sed mors in hystericiis semper vel epileptico, vel apopleptico contingit insultu.

§. V.

Tradita hæc pleniori severissimi hujus morbi historia; facilius erit, ejusdem à malo hypochondriaco docere differentiam. Quamvis enim horum affectuum symptomata inter se similia ac utrique valde communia deprehendantur, tante utriusque historia, quæ ratione posterioris mali sequenti capite explicabitur: attamen plura adhuc restant, quæ, cuivis propria, insignem illorum testantur discrepantiam. Namque morbus hypochondriacus est longissimus, atque diuturnam semper expostit curationem: at hysterica passione gravidas, puerperas, viduas, sanguine turgentes, post gravem animi motum, vel virgines post repentiam fluxum mensuræ suppressionem, sæpenumero gravissime infestari; ab ea tamen per rectam medendi rationem ita viodicari, ut nunquam revertatur, experientia docemur. Hæc pono subito, vehementer, & ex improviso mæras haud raro adoriuntur, ut omni sensu ac motu private, repente in terram concidant; quod in hypochondriaciis non animadvertitur. Atque etiam peculiare illud hystericiæ habent, quod maxima symptomatum vehemensia, si sensum mentisque functio intercipitur, vel solo penarum accensarum suffusa, naribus admoto celeriter diminui, quin & tolli possit. Præterea in paroxysmis hystericiis, musculi abdominis vi ipsarum interiorum contrahuntur, & umbilicus profundius retrahitur: cum ut hypochondriaciis venter potius extorsum distendatur. In illis regio lumbaris acri ac incredibili frigore occupatur, ut manibus percipi, nec calefactus lintea temperari queat; sæpius ingens instat clavi certæ in capitis vertice regionis velut infixi dolor urget, quem nomine *clavi hysterici* insigniunt; & in multis globi ex imo ventre adscensus versus superiora percipiuntur: quæ cuncta à malo hypochondriaco sunt longe remota. Nec in hoc tam frequens animi deliquium, & tam subito ad suffocationem usque

*Paroxysmus
mali hysterici.*

*Differentia
mali hysterici
& hypochondriaci.*

E 2 inter.

intercepta respiratio, cum faucium tam forti strangulatione, quam quidem in hysterica affectione observatur. Et denique nulli unquam hypochondriaci pro mortui, ac sepulchro destinati fuerunt habiti; qui quidem de hysterica fide dignæ restantur historiæ.

§. VI.

*Differen-
tia morbi
causarum
& reme-
diorum.*

Differunt porro magni hi duo morbi ratione causarum. Quæmodum enim mali hypochondriaci perniciatissimi vis in membranaceo intestinorum, ventriculi, ac oesophagi canale potissimum, per spasmos pariter ac flatus se extensis animadvertitur; & hi spasmi sanguini, ob denegatum per vasculorum hepatis, totumque ramificationum venarum portæ systema, æquabilem circuitum, intra tunicas intestinorum nervæ stagnanti debentur: ita è contrario prima spasmodum hystericonum origo in utero querenda est. Hinc ob archissimum, quo uterus cum vesica urinaria gaudet, consensum, spasmi uterini ad vesicæ sphincterem propagantur, & hysterica sub morbi accessione continuam ad matulam stimulum perferunt; quo hypochondriaci omnino carent. Ex hac causarum diversitate fit etiam, ut quædam symptomata, quæ utrique morbo convenientia videntur, in quovis peculiarem agnoscant causam. Sic spiritus difficultis sollicitat & hystericas, & hypochondriacas; sed in his ab inflato ventriculo, descendum sepi transverſi impediunt; in illis vero magis a vehementi musculorum abdominalis contractione & compressione originem ducit. Tandem etiam alia mali hypochondriaci, alia hysterici solutio, & alius quoque utriusque in morbos est transitus: namque illud frequentius in melancholicum, scorbutum, lentam febrem, morbumque sic dictum nigrum terminatur; hoc infestior læsus in epilepsiam, lethalem synopen, furorem uterinum, ac acutam febrem transit. Ac denique in corporibus passione hypochondriaca defunctorum, imi ventris viscera, hepatis, lien, pancreas indurata, scorbutica, ac corrupta plerumque offenduntur: cum in hysterica, uti infra pluribus trademus, vitium ac corruptela magis in utero atque ovaris deprehendatur. Et hæc sunt, quæ notabilem inter hos duos morbos intercedere differentiam, satis clare demonstrant: quæ eo plenius commemoranda dunt, quo major de ea error Medicorum animis indilet.

§. VII.

*Differen-
tia morbi
hysterici
a syncope.*

Sed restant adhuc morbi, à quibus probe discernere oportet passionem hysterican. Sic differt à syncope, in qua pulsus penitus cessat, facies est contracta, & moribundo similis; quæ in præfocatione uterina plerumque observatur colorata, tumida, sub pulſu languida; hæc quoque ad duos vel tres dies perdurare potest, quod de syncope dici nequit. Deinceps differt ab apoplexia, ubi sub lentum & motum voluntarium abolitione, stertor cum ægerina spiratione, & pulſum celeritate est; qui in hysterica minime conspicitur. Differt porro ab epilepsia; quæ sicuti causam proximam in dura matre, & principio spinali medullæ habet, ex qua spasmi ad universum corpus abeunt; ita hysterica passio in utero primam sedem agnoscit, ex qua spasmi ad medullam spinalem, totumque nervorum genus propagantur. Et symptomatum, quæ hunc utrumque morbum comitantur, differentiam nervosè pariter ac eleganter describit

a) ab apoplexia.

b) ab epilepsia.

CORN. CÆLSUS Lib. IV. cap. 20. dum: *Vol-
ve morbus, incuit, interdum sic exanimat, ut
tanquam contritali morbo proferatur. Dissat ta-
men hic casus, eo quod neque oculi vertuntur,
nec spuma prelosum, nec nervi distenduntur.* Dissat non minus a doloribus *ex calculo*: nam licet in utroque morbo nulla inter se convenientia symptomata; atamen in calculoso affectu deficit faucium strangulatio, animi defectio, respiratio valde intercepta, & quod affecti non à suavolentibus tam graviter lardantur. Et quomodo denique hysterica passio a flatulentia primarum viarum discrepet, egregie docet BALLONIUS Lib. de virginum morbis pag. 232.

a) à reme-
diorum cal-
culo.

§. VIII.

Quod attinet mulieres, morbo hysterico præ aliis subiectas & obnoxias, notari meretur, non omnes, cuiuscunque ætatis, temperamenti, ac vitæ instituti id genus morbi pati: sed præcipue virgines sensibilibus & tenerioris naturæ, ante mensium primam eruptionem, viro maturas, item viduas juniores, & feminas conjugatas, imprimis sanguinis & succi plenas, sine prole tam viventes, neque minus moliter in otio educatas, texture tenerioris, & animi sensibilibus, frequentius atque gravius illo divexari. Consentiunt in eo Veteres Medici, & GALENUS præcipue viduis, quæ utero purgari, parere, concubare gaudere desierant, hysterican passionem evenire testatur. Juxta FORESTUM Lib. XXVIII. obs. 268. mulieres virgoles, jamdum continentes, aut virgines, sed venere appetentes, corpulentæ, multo sanguine præditæ, victu calido, humido, & flatulento utentes, in otio viventes, cum venarum irritamentis, vino nempe generoso, multique delicatis ferulis, venere excitantibus fruuntur, licet non suppressi sint mentes, crebrius in hunc morbum incidunt: ad quod etiam BALLONIUS lib. cit. & LEVINUS LEMNIUS Lib. de oculis natura miraculis Cap. VI. confirmant. Deinceps etiam, teste inter alios ARETÆO, juvenes mulierculæ, quæ sunt sensibilibus generis nervosi, texture tenerioris, & ad affectus animi proclives, præ iis, quæ robustæ, plebeæ, animæ constantioris, & laboribus dedite existunt, immansissimè hoc spasmodico morbo agitantur. Nec denique silentio prætermittendum est, feminas, quæ sanguineæ & cholericæ constitutionis, & ad impetuosas ac præcipientes animi commotiones prona sunt, levæ & violentas in partibus nervosis motiones experiri: illas autem, quæ phlegmaticæ, & torpidiorem obtinerunt naturam, non adeo impetuosè convelli, sed potius in crebriori animi deliquia incidere; nullumque nec murmur, nec venient vel assilant, nec odorem suaviorem, nisi ægerime ferre.

Subiecta
mali hy-
perici.

§. IX.

His præmissis, ad causas tam duri affectus transicendum, & antea sedes morbi vel potius causæ morbificæ disquirenda est. Recentiorum Medicorum quidam, hysterican ac hypochondriacam passionem pro uno morbo habentes, ut nominatim HIGHMORUS, SYLVIUS & SYDENHAM ventriculum, pancreas, mesenterium, venam portæ, pro genuina sede perperam accusant. Minus recte etiam CAR. PISO in sticticioribus observationibus præcipuum sedem in cerebro, vel potius nervorum principio collocavit; siquidem subiectum causæ morbificæ &

Morbi hy-
perici se-
des, &
causæ pro-
xima.

& mortis invicem confudit. Nos vero cum antiquissimis Medicis, symptomatum hystericorum primam originem ab utero, ejusque membranosa & vasculosa substantia & vasis ad illum spectantibus, in primis spermaticae petendam esse, firmiori persuasi sumus; quorum partium spasmoticæ constrictiones postea in nervos vicinos ossis sacri, & lumborum sese infundunt, & ob consensum totius medullæ spinalis nervas membranas gradatim occupant, à partibus inferioribus ad superiores sensim paulatimque se propagando. Quamobrem deprehendimus maximum in puerperis, quando hoc malo affliguntur, spasmos in orificio uteri interno, immo in ipsa quoque vagina incipere; quoniam hæc partes frigide, & aride huius, & derepente lochiorum, sive ichorolæ materie effluxus sistitur, & alvus peritussimè clauditur. Deinceps ipsam & dolores cum frigore lumbarem regionem petunt, & in abdominis musculis aleunt, umbilici retractionem, cum ini ventris duritie junctam efficiunt; tum impetunt diaphragma, & intercostales nervos, ipsamque par vagum, & difficillimam, inro sulli cativam lyrationem, cum sauctum strangulamine causantur; ubi postea intercepto sanguinis per cor circulo, ejus palpitatio, & animi deliquium, atque tandem sufflaminato sanguinis per cerebrum motu, sensuum mentisque subsequuntur abolitiones. Ex quibus omnibus, rite invicem comparatis, non solum reliquorum omnium symptomatum ratio bene suppeditari poterit; verum etiam clarissime patet, totum hystericum affectum, ad morbos spasmodico-convulsivos, qui universum nervorum systema occupant, summo jure esse referendum.

§. X.

Consequenter
postea
referenda.

Jam ergo causas mediatas ac materiales, quæ ad ingenerandum hoc durum malum contribuant, explicaturi; hæc duplices postillam generis esse, nimirum partim semen corruptum, partim cruorem menstruum in utero vitiatum, cum Medicis tantum non omnibus statuiamus. Utræque hanc causam digna est, ut ejusvis peculiaris, & exacter institatur inquisitio. Namque exquisitiori anatomicorum solertia satis eviclum est, in nobiliori quidem sexu peculiariter exsistere organa, quæ testes vocantur, in quibus liquor subtilis spirituosus seminalis, ex sanguine per arterias spermaticas advehit fecerunt, & in certis loculamentis asservatur: in sexu vero sequiori ejusmodi organa secretoria non inveniuntur, sed ad lactea uteri corpora quadam globosa, ex vasis sanguinis, membranis, & vesiculis cutata, quæ ovaria dicuntur, à provida natura esse posita; spermatica vero vasa innumeris ramificationibus ad uteri substantiam ferri. Quamergo Recentiores Physiologi vesiculas in ovario contentas, in quibus suspensæ ac infusæ parvæ magnitudinis tortus spiritus genituræ virilis explicandus ac succundandus continetur, pro femine muliebri habeant, alium vero liquorem feminalem in hoc sexu plane denegent: dispendium jam erit, an & quomodo humor in ovulis contentus corrupti, corruptisque causam duri nostri malo præbere possit.

§. XI.

Circa præterea
monere quæ

Quæ ut rite intelligantur, præmonenda duximus quadam momenta, & præsertim illas *Frid. Hoffmanni Oper. Tom. I. l.*

mutationes, quæ circa pubertatis annos corporibus humanis eveniunt. Observamus virginem ætate decimum quartum ætatis annuum colorationes evadere, vultum fieri pulchriorem, mammasque intumescere; maribus barbam crescere, vocem reddi magis sonoram, & universi corporis partes majus acquirere robur, atque vigorem: in utroque vero sexu stimulos ac desideria ad venerem excitari. Etiam sicut in maribus major sanguinis ad testes, pro fecerendo seminali liquore, atque etiam ad erigenda genitalia fit affluxus: ita in foemellis quoque circa pubertatis annos, major sanguinis copia ad uterum, & ejus vasa, ad ovum, si adest, succundandum congeritur; & inde mensuræ fluxus, si imprægnatio deficit, causâ & origo petenda est. Sed idem ille copiosior ad loca uterina humorum affluxus, nos ducit ad considerationem mutui atque mirabilis illius consensûs, quem animi desideria cum motu sanguinis vitali & naturali ad certa membra, præsertim generationis destinata habere conspiciuntur. Simulac enim major sanguinis circa pubertatem in utroque sexu ad organa generationis interferventia fit affluxus; statim etiam stimuli & desideria ad venerem incitandam suboriuntur: & vasculum, quando idæ ab objectis externis venustus in animo desiderium ad venerem accendunt; proximus ad genitalia major sanguinis & liquidæ nervosi congestio insequitur.

§. XII.

Quando vero cunque copiosior humorum per vasa spermatica ad ovarium, ad uteri quoque fabricam, vel ob ætatis rationem, vel veneris cupiditates fit motus & affluxus, lymphæ nutritiæ ad dicta loca congeritur, ibidem stagnat, corrumpitur, causamque præbet malo hysterico. Hinc observamus, virginis circa pubertatis annos, formam ætate vegetas, vultu orbas, veneris igne stimulas, calore multo, ac sanguine vegeto abundantes, diuturno nostro malu vehementer agitari. Et notabilis est locus, quem ad illustrandum hoc assertum suggerit CHARLETON exercit. pathol. VII. & sic se habet: *Mulieres quadam ætate copiosior spermatis liquoris prurientis, desideria consequendi cum viris in febris hysterica pathemata occidunt; hæc tantum in virginibus juxta ac feminis salacioribus mali hysterici est prætextus.* Qua de causâ etiam Antiquiores Medici penitus fuerunt, ut retentum semen pro principe nostri mali causâ habuerint, omnemque medendi scopum eo direxerint, ut vel conjugium commendaverint, vel retento in utero semini variis modis exitum parare studuerint. Quales historas plures invenies in ZACUTO LUSITANO, ac PETRO FORESTO; & addunt finito paroxysmo ex relaxata muliebribus copiosum huiusmodi exillasse liquorem. Conf. etiam GALENUS comment. in HIPPOCRATEM Lib. VI. de locis affectu Cap. 5.

§. XIII.

Duplici autem ratione fieri statuiamus, ut humor sic dictus seminalis, vel sanguis, qui circa uterum nuntium congestus, & ex diuturniori natura, atque stagnatione vitiatum tantis in universo corpore nervosarum partium turbas concitari possit. Primum nempe altissimus, corruptus materiam teris, quos emittit, vaporibus, purissimo nervorum & fibrarum fluido infusus,

Quæ utriusque
est præterea
causam
hystericæ
genitæ
sympptomata

filimis, ad progignendum id malum parafiffimam vident. Magnam enim & fufcolemum vaporum vim & potentiam in invendis, vel immutandis motibus vitalibus effe; præter narcotica, fumos carbonum noxios, & exemplum ab HELMONTIO *tr. de lubia* f. 59. allegatum, quo mulier quædam ex certo fuffitu proinus corruit apoplectica: testatur & illud momentum, quo in difpofitis paroxifmos hystericos fola mofchi vel zibethi odore refufcitari, & rurfus etiam folis graveolentibus compelli obfervamus. Sed aliud adhuc modus eft, quo circa uterum fufiftens ac corruptus humor nocere poteft; qui in violenta valorum & membranarum nervæarum, à nimium congesto liquore, diffentione ac diftractione confulit; ex qua violenti fpafmi ad univerfum nervorum fyftema propagantur. Et quæ de hoc effeâ ambigere poterit? qui confideraverit, à fola fanguinis flagnatione intra tunicas ventriculi ac inteftinorum, malum hypochondriacum, & fæviliffimos fuboriri poffe in colica fpafmos.

§. XIV.

*Annotati-
onæ cruci-
atæ muf-
culorum
defum. lar-
cum.*

Que quod ita fe habent, testantur exempla feeminarum, paffione hysterica perenturam. Sic VESALIUS *Lib. V. de humani corporis fabrica* cap. 15. testes hysteriarum pila læpe grandiores, modo luteo, modo alio graviter olente humore infarctos, & reperiiffe fcribit. RIOLANUS *anthropol. Lib. II. pag. 35.* tefitem pugno majorem induratum notavit. BINGERUS *Cent. II. obf. 50.* testes cum vafis fpermaticis, & tubis uteri valde tumidis, & inflatis humore crasso, albo, & ex parte induratum refertos, inflar fcatometris dimidiæ libæ vidit. MANNAGETA in *M. N. C. D. I. a. I. obf. 32.* uterum cum testibus materia feminali corrupta, quæ cafo recentur coagulato haud abfiffimis erat, surgidum invenit. Et denique DIEMERBROECK *Anat. Lib. I. de ventre inferiore* cap. 24. memoræ prodidit, fe in hysterici pterumque aliquem magnitudinis circa uterum excessum, in eoque liquorem quendam argutinosum, vel croceum, aut flavescen-tem deprehendiffe. Ex quibus demum omnibus luculenter patet, quæ ratione fermen circa uterum flagnans corruptumque mali hysterici causa dicatur.

§. XV.

*Alterati-
onæ hysteri-
cæ effe-
ctus cum
fuerit
morbofæ.*

Proximum jam eft, ut etiam noftam de altera causa, quæ nunc temporis maxime urgeat, vitio nempe menftrui fanguinis fluxu, fententiam proferamus. Hanc criticam excretionem, præternaturaliter fe habentem, fempè proximam mali hysterici causam conftituere, neutiquam per rato flatoque habendum credimus; fiquidem novimus virgines haud fæcus, ac fæminas annofas, hysterico malo pertinaciter laboraffe; quibus tamen menfes, vel hæmorrhoides fatis liberè profluxerunt: qua in re confentientem habemus CAR. PISONEM *Lib. cit. Sect. II. Part. II. c. 7.* Interim fæpius obfervamus, fluorem hunc uterinum lub ipfo morbo fieri inordinatum: atque tum pro effeâ ac fymptomate mali hysterici æftimandum eft excretionis illius vitium; fiquidem ea eft fpafmofus indolens, ut omnis generis excretiones turbem ac pervertant. Enimvero ex toto caufam paffionis hysterice cenfu menfium fluxum excludendum effe, minime flaturus.

Nam multoties obfervavimus, virgines, quando menfium fluxus circa pubertatem inflat, ob illius impediorem per vala uterina trandum, & fubfequentem valorum diffentionem, graviffimas poti hystericas paffiones: quæ etiam fæminis, in quibus difficilis fluit uterinus cruor, brevè ante ejus eruptionem evenire folent; & in ACTIS VRATISLAVIANUM anno 1700. eleganter defcribuatur. Præterim notabilis in tali cafu eft clavus ille hystericus, ubi dolor acerbiffimus & penetrantiffimus in certo tantum pericranii punctulo hæret, & fæpiffime horrenda anxietatibus cardiagici, vomitibusque enormibus flipatur: Conf. SYDENHAM *pag. 487. & 499.* Neque porro delunt nobis exempla, ubi repentinam purgationis menftrux, per vehementem terrorem, præferim in perfonis nature fenfibilibus fuppreffionem graviffima mox hysterica, quin & epileptica exceperunt pathemata.

§. XVI.

Neque gravidæ, maxime fi fanguineo-chole- rice fine constitutionis, à fæviffimis uteri fpafmis funt immunes: vidimus illas circa tertium, vel quartum menfem, gravi iracundia percuffas in præfocationem, furtum viram lapsum, imò in lyncopen per aliquot horas duntaxat fubinde incidiffe; à quibus tamen fecla vena, & adhibitis medicinis fpafmodicis, nirofolque fœliciter evaferunt. In puerperis vero, ob lochiorum non rite fuccedentem fluxum, hystericas paffiones frequenter obfervamus; quod etiam fuo tempore HIPPOCRATES notavit, *Lib. de natura mulierum f. IX.* Novimus puerperas primis fæpenumero à partu diebus, ab aere frigido ad inum ventrem admiſſo, à levi animi motu, à longiori corporis extra lectum detentione, in fæva fymptomata hysterica incidiffe; quæ etiam preſſo iniquantur pede, fi lochiis primis flarim diebus deficientibus ac ceſſantibus, feclione venæ tempelliva haud fuccurraq. Nec denique minus haud raro evenit, ad immodica, & diutius perferente lochiorum fluxione, leviori exterior causa accedente, paffiones hystericas, animi præferim deliquia, cum extremo refrigeratione inlequi; quæ tamen convenienti cura, accommodatque præſidiis faciliore negotio difcutiuntur.

§. XVII.

Quicquid igitur vehementiorem fanguinis, li- quonifque genitalis ad uterina loca affluxum concitare; aut menfium eruptionem, atque fluxionem fupprimere, vel impediorem reddere valer: illud ad claffem caufarum paffionis hysterice occasionalium pertinere videtur. Ex harum cenſu primum occurrit ipſa ætas conjugio opportuna, aut denegatus, antea tamen fueris, concubitus; unde naporem ad uterum fieri affluxum fupra docuimus. Ex eodem fundamento huc pertinent temperamenti fanguineum, atque cholericum, nimia ad libidinem proclivitas, diæta vinoſa, exæſtuans, opifora, iracundia vehemior, ac graviores animi corporifque commotiones, & exagitationes. Leinceps ex altera parte vita fedentaria, victus craſſus, aidus, frigidus, intermiſſe fanguinis miffiones, diuturni morores, curæ, follicitudines &c. humorum ſpiffitudinem inducendū, partes folidas debilitando, ideoque menfium perruptionem difficiliorem reddendo, ad generationem

nerationem mali hysterici contribunt: ac denique terror fubitaneus, refrigeratio corporis insignior, maxime ipsi fluxui uterino supervenientes, excretiones sufflaminando sanguinea, inducunt spasmos hystericos. Tandem etiam odor suaveolentium, ambræ, zibethi, moschi &c. aur aliorum fragrantium pro peculiari idiosyncrasia, gravissimos evocant paroxysmos.

§. XVIII.

Prognosi.

Circa prognosin id maxime omnium monendum esse duco, quod vera hysterica passio, ut valde dira & terribilis videatur, in se non adeo periculosa sit; nisi præputiter curatio, vel perversum regimen accedat, vel in corpus incidat valde imbecille & valetudinarium. Atque etiam nullus morbus est, cui tam facile epilepsie & convulsionum artuum junguntur, quam qui ex uteri vitio pronascitur; ut adeo etiam exinde discrimen mali hypochondriaci & hysterici judicari liceat. Rursum haud infrequenter constat observatione, hunc affectum, ubi ab infelici abortu vel gravi puerperio ex culpa sive Medici sive ægrotantis progignitur, quam facile recurrere, & ex levi quadam causa nervosum genus affligente, de novo corpus infestare. Neque etiam novum est, sed toto fere die observari, multum hystericum & hypochondriacum sapient complicatum esse, & tunc morbum valde diuturnum & difficilioris sanationis fieri: quod maxime fit in feminis, quæ vitæ sedentariæ & animi commotionibus nimium indulgent, & perveria dieta & vitæ regimine utuntur: hinc excretionem sanguinis menstrui vel hæmorrhoidalis perturbant, de quo complicato affectu, qui sæpius in praxi occurrit, uberius differere sequenti capite constitutimus.

THESES THERAPEUTICÆ.

§. I.

Indicatio-
nem curatio-
nis.

Explanatis ergo satis dilucide morbi nostri genio, sede, causis, ac differentiis; proximum est, ut ad ejus curationem nos convertamus. Quum vero omnis rectæ curationis ratio, in eo potissimum consistat, ut naturam ægrotantis probe cognitam peripsæque habeamus, atque tum morborum causis amolendis accommodata remedia inveniamus: eo magis hæc circumstantia in nostro adfectu probe considerate oportet; cum non modo causa mali non eadem semper sint, verum etiam naturæ materiam, quas in cura probe discernendas, jam diu HIPPOCRATES inculcavit, valde differentes deprehendantur.

§. II.

Quid de
terris se-
rentur sit
significan-
dum?

Primum itaque discernendum est, num femina, quam curandum suscepimus, sit valde plethorica, vel potius sanguine & viribus exhaustum corpus habeat? In priori casu ad spasmodum, & convulsionum vehementiam, quæ in sanguine abundantibus longe major est quam in aliis, minuendum, non facile presentius & efficacius ipsa venæ sectione remedium invenitur; quæ si major sanguinis copia urget, largior esse debet, vel etiam iteranda. Videmus feminas, spasmis uterinis crebrius & immaniter cruciatis, sine omni sensu & motu, facie rubicunda tumida, inflat apoplecticae jacentes; novissimæ quoque virgines, sanguine plenas, spiratione ac

loquela fere privatas, mensibus repente per terrorem cohibitis, vel epileptico insultu correptas, quæ venæ sectione insensita protinus ad se redierunt. Consistentes etiam habemus permultos Veterum Medicorum, qui venæ sectionem omnibus aliis remediis generibus præferunt, quando malum in sanguinis abundantia, & menstruum retentione fovetur: quæ inter MERCURATUM & ROD. à CASTRO, HOECHS-TETTERUM Dec. IV. cap. II. HIGHMORUM L. de passione hysterica, PANAROLIUM in *Introversis sententia* II. obs. 30. RIVIERUM, SEPTALIUM, & M. N. C. D. I. anno X. obs. 42. & 58. allegasse sufficit.

§. III.

Ante omnia eo fudeat Medicus, ut in ipso paroxysmo mali ferociam mitiget. Sequentes hæc in re Medicorum antiquissimum HIPPOCRATEM, graveolentia naribus adplicanda suademus, qualia sunt castorei, asa foetida, simus plumarum perdium: quod remedium, uti mulierculis familiarissimum, & doctissimum, ita præstantissimum est. Ex compositis aqua hirundinum acida cum castoreo, spiritus urinosus volatilis cum oleo rutæ, & essentia castorei nobilitatus, extrinsecus naribus afficitur. Vidimus ab horum remediis usum, scisselas gravi sopore oppressas, moribundisque similes ad se rediisse. Ratio in eo videtur consistere, quod salina volatiles quædam vapores; dum in nervosis cerebri membranis penetrant, ipsis novum robur, ac vigorem addant, & vim systolicam depressam restituant, & sanguinem, humoresque ibi subsistentes discutiant. In puerperis hoc malo correptis, insigne levamen offert compressio imi venus cum angulo, ex corio Molcovitico vulgo *Jucketa* confecto; quod odorato & hypochondriaci & hysterici valde amicum est. Magnum porro si præsentia fuerit paroxysmus, in expedita alvi, ut plurimum constrixisima, apertione est præsidium: qua in re commodam operam præstant clysters, ex speciebus appropriatis, ut radice, & semine levisi, quæ specifica sunt, floribus chamomellæ vulgaris, sambuci, herba veronica & feminibus quatuor carminativis, sive lactis incoctis sunt appandis; quibus posita sufficiens quantitas, olei ex anetho, vel floribus chamameli costli adjici potest. Ubi vero fortior strictura alvi, & intestini recti est, ut clysters admitti nequeant; longe consultius est, pura olea expressa vel auxungias injicere: cujus generis sunt auxungia taxi, pinguedo castorei, oleum anethinum &c. a quorum usu misceat quoque mensum & lechiorum fluxus adjuvatur.

§. IV.

Sunt adhuc quedam, quæ extrinsecus admodum insigne præstant levamen. Ex his magnam inter Veteres ac Antiquos Medicorum obtinent laudem emplastræ, quæ graveolentiam habent, ut sunt ex opoponace, bdellio, galbano, sagapeno, asa foetida parata, si umbilico, vel pudentia adplicentur: quæ de re notabile exemplum allegat FORESTUS Lib. XXVII. obs. 2. Neque vero inter externa, antiquissimum HIPPOCRATIS & GALENI auctoritate comprobata, silentio sunt prætermittenda suaveolentia, utero immunda. Quævis vero nostram de singulari eorum effectu non possumus adducere experientiam; tamen cum horum operatio

E 4 magnæ

magnæ rationum probabilitati innititur, nolumus illorum usum pecius repudiare: ob hanc potissimum rationem, quod iuvenolentia ut morbus, zibethum, styxas, benzoe, ex quibus suffragia ad uterum apparatus solent, copiosa, & blanda sulphurea exhalatione fibras uteri spasmo valde contractas relaxandi potentia gaudent, ut sæpe ab horum applicatione, teste superius adducta FORESTI observatione, crassius & putridus humor sensibiliter effluit.

§. V.

*Qualis inter-
terras sub-
peris iussu
prospici*

Ad immanes uteri spasmos præter externa jam recensita, naturæ jam languescenti per appropriata quædam interna succurrendum est: quæ inter principem sibi vindicant locum essentia callores cum partibus tribus liquoris anodyni permixta, item pilula antispasmodica, quæ ex myrrha, jagaprio, opoponace, asa fetida, callores, croco, theriaca, sompiti ad drachmam dimidiatam aequalibus partibus paratur; adjectis interdum sex vel octo granis camphoræ & Laudani opii. Ex serapulo uno possum formari pilula decem, & singulis horis dosi assumi, cum aqua florum chamomille: incomparabile sæpe præter omnem spem ac opinione ex hoc remedii genere observavimus auxilium.

§. VI.

*Primo via
terras sub-
peris iussu
prospici*

Hæc sunt, quæ potissimum in ipso paroxysmo conferunt; sequitur, ut circumspectius, quæ extra paroxysmum, quiescentibus jam gravioribus spasmodis, ad eradicandas causas præcipuum sibi vindicant locum. Quo loco experientia ac ratione ducti assueverunt, primam regionem, quæ visioforum humorum colluvie plerumque valde repleta est, accommodatis remediis esse expurgandam; eo magis, quando in ipso paroxysmo anodyna, graveolentia, & vehementes commotiones silentia, largius fuerunt adhibita. Ex horum censu pilula Becherianæ, sive ad eorum exemplum concinnatæ, ob insignem usum laudem merentur; præsertim, si loco stimuli, extractum panchymagogum Crolii, & ex antispasmodicis, cinnabaris præparata, & unum vel alterum granum extracti croci & callores adijciatur. Sic primis officinis ad sabura visioforum humorum sufficienter liberatis, ea in auxilium vocanda sunt, quæ virtute & sedativa, & semel diaphoretica sanguinis & humorum motum ad exteriora dirigunt, atque liberrima perspiratione scilicet visioforum dissipationem procurant. In harum classe mirabili plane effectu gaudere videmus, spiritum cornu cervi, vel eboris per rectificationem purificatum; vel etiam spiritum bezoardicum Buffi, spiritum cornu cervi succinatam, spiritum tartari bene præparatum; qui spiritus volatiles coemmode retracta dosi dari, itemque nartari possunt cum liquore anodyno minerali, essentia croci, callores, succino, immo cum laudano liquido; quo medicamento prudenter pro temporis & circumstantiarum ratione usurpato, nihil videri præstantius. Sicuti enim sponte sæpius solius naturæ beneficio, hæc spasmodicæ affectionis largiore solvantur sudore: ita eo magis Medicum ad hunc finem obtinendum curatiolem dirigere oportet.

§. VII.

*Spasmodi
& anodyni*

Hæc ad eundem scopum obtinendum, alia non inferioris facultatis præsidia interponi pos-

sunt utilissime; cujus generis sunt pulveges, quæ secreta, & specifica quadam qualitate spasmodis & convulsivis moribus sopiendis dicati sunt; ut pulvis Marchionum, specificum cephalicum Michaelis, pulvis noster antiepilepticus, item qui ex secunda humana siccata, visco quercino, succino, corallio, croco, & callores, & antipylis paratus est: quorum usu inflat incantamentum convulsivæ epilepticæ motiones, artuumque agitationes siluisse aliquoties observavimus: si modo ejusmodi indolis & virtutis remedia non ante solutam plethoram, nec ante impuriorum humorum sufficientem per alvum evacuationem usurpentur.

§. VIII.

Præterea, quom hoc malum quam facile, si morbum non perite tractetur, revertatur, vel in alium morbum chronicum, inque primis hypochondriacum degeneret, id omni modo ac ratione præcavendum est: quod fit, si post morbum finitum ad morbum reſiciamus excretionem, sive hæc irregularis morbum ipsum produxerit; sive sub hoc, uti plerumque fit, vitata fuerit. Ad hunc scopum obtinendum nihil præstantius, nihilque efficacius commendare possum, quam thesaurum Carolinarum usum internum, cum convenienti regimine & prudentia administratum: siquidem thermales aquæ semper sere & tutiores & convenientiores ipsis frigidis acidulis in morbis mulierum percutandis observantur. Sed in promptu adhuc sunt alia remedium genera, quæ tonum & robur utero restituendo, graves ac ad affectiones arcent, cujus generis sunt temperata balsamica ex myrrha, succino, extractis amaricantibus & carminativis, præsertim zedoaria, corticibus aurantiorum cum mentruo minus spirituosum in elixirum redacta, & frequentius usurpata. Nam hæc ipsa mensuum negotio & ventriculi digestioni egregie velificantur; præsertim, quando temperatis balsamicis, pilulis polychrestis, decem tempore usurpatis, sordium alvinarum excretio simul adjuvatur.

§. IX.

Supereſt adhuc aliud summum auxilii genus, quod ex conjugio expectare licet: cujus incomparabilem vim, ad expugnandum affectum hystericum, præter summos virorum auctoritates, & experientia & ratio luculenter suffulciunt. Commendavit illud HIPPOCRATES libro de virginum morbis Cap. 3. VALESCATES de TARANT. philan. pharm. Lib. 6. cap. 10. si fiat, inquit, affectus in virgine præter retentionem spermatis, subat illa, & morbum effugiet. CAPIVACCIO vero, ut efficacius fit hoc remedium, jubet, ut vir penem iungat oleis aromaticis & Zibetho. Notabiles quoque sunt observationes, quas de admiranda conjugii in morbis hysterici virutis, allegant DURETUS in erratione ad caput LIX. HOLLERIUS, ZACUTUS LUSITANUS §. 2. prax. med. adjuv. anal. §§. 91.

CAUTELÆ, ET MONITA PRACTICA.

§. I.

Quandocunque hysterica passio ab uterinæ lymphæ organo subleatur; omnia calidiora carne pejus, & angue vitanda sunt: ex his enim magnum inferat damnum, quemadmodum RÔDERICUS ad CASTRO de morbis mulierum

rum

rum Lib. II. & LUD. MERCATUS Lib. II. de morbis uteri Cap. 3. variis attestatur exemplis. Potius ad temperandam lymphæ acrimoniam, & organum sanguinis & humorum refrigerandum, refrigerantibus uti præstat; ex quorum censu potus aquarum, serum lactis pro potu, atque nitrosa eminent; quorum virtutem in extinguenda libidine TIMÆUS a GULDENKEE Lib. III. Cap. 57. non satis dilatare potest.

§. II.

Quum in hysterici morbis nature individuum insigniter discrepat: non sine matum est, si unum remediis genus in uno subiecto salutem, in alio nullum, ac magis noxivum edat effectum. Sic vidimus hoc malo affectu, quæ nullo modo graveolentia, sive interno, sive externo usu ferre poterunt; quæ in aliis præsentissimam operam tulerunt. Videmus nonnullas, quæ ipso in paroxysmo, graviore syncope oppressæ erant, sola aquæ adijctione in facie, lustrâ adhibitis validioribus & spiritibus in vitam revocatz fuerunt. Quædam calidioris & sensibilibioris nature nulla calida sive extrinsecus, sive intrinsecus adhibita tolerare possunt; a leo, ut à balneo, fomentis, linimentis, nervinis calidis non parum ledantur: non minus anodyna, ac opiata quibuscum exopatiissimum assunt levamen; quum in aliis, ubi genus nervosum maxime debilitatum est, non minimum excitem damnum. Vidi quoddam solo aquæ potu à gravi paroxysmo liberatas, qui aliis erat nocentissimus. Tantum refert, naturas femininarum recte discernere; quemadmodum jam HIPPOCRATES Lib. I. & II. de morbis mulierum sæculo inculcavit.

§. III.

Quam familiare nostris est temporibus, ut nulla fere mali hypochondriaci inter mulierum morbos fiat mentio; sed potius promiscue & indistincte omnis, quæ cum dolentibus, ipsâ, flatibus, anxietatibus jungitur passio, pro hysterica habeatur: tam necessarium est, genus horum morborum cognoscere distinctum; ex cuius neglectu magnum relictæ sæpenumero damnum. Quemadmodum enim in malo hypochondriaco, vehementi corporis motus & exercitatio, medicamenta carminativa, spiritusosa, & volatilia, stomatica, & aromatica, salia acuta stimulantia, aquæ minerales, amare alvum solventes, inque primis martialia, optima præbent auxilia: ita hysterice femine his magis leduntur, & potius à venæ sectionibus, quiete corporis, anodynâ, nitrosâ, antiepilepticâ, refrigerantibus, potu aquæ frigide, sero lactis, exclusis calidis, quin ipso vino, summum experiantur solatium.

§. IV.

Ad præcavendam recidivam, & ne malum evadat chronicum, & mensium & alvi ratio sollicite habenda est; & moderandum, ut convenienti vitæ regimine, commodaque medicina hæc excretionem secundum ordinem fiant. Cavendum autem maximopere est, ne alosticis vel pilulis purgantibus, quæ insignem portionem aloës, & gummatæ resinosa calidiora recipiunt, utranque evacuationem moliamur. Non leve enim damnum & ingentem symptomatum exacerbationem, vel morbum longius productum, inde me observasse certa fide asseverare possum, &

hoc maxime locum habet in plethoricis ac tenacioris & sensibilibioris indolis feminis. Tutionis effectus sunt passiva corinthiaca cum infuso rhabarbari per leniorem incoctionem probe saturata. Inter cibos panifici, placenta, quibus maxime delectantur mulieres, & acetaria penitus proscribi debent. Nam ex nimio harum rerum usu, ac vita otiosa & potu parco & nimis incongruo, accedente simul animi intemperantia, sicuti & hypochondriaci & hysterici ipsam suam originem præcipue petunt; ita majori cura, quæ huius vitæ jam corruptæ sunt, ab eis abstinere debent.

§. V.

Castorea unum & interno, & externo usu in spasmi & hysterici & hypochondriaci mitigandis, teste quotidiana experientia incomparabilem virtutem habeant; tamen is non nimium solumdem, quoniam ad materiam ledentem submovendam idonea satis non sunt: non parum quoque nimis eorum usus nocet; dum anodyno illo vapore & capiti & nervosis partibus imbecillitas, quæ nunquam sine periculo est, inducitur.

§. VI.

In spasmi, hysterici præsertim, qui puerperas exercent, si alvi tunc adstrictio, hæc horum salum neurotorum & sic dictorum digestivorum stimulo manne molienda est: vidi enim à majori & crebriori horum salium dosi periculosa symptomatum incrementa.

§. VII.

In profundiori suffocatione hystericarum, ad eas excitandas præstat sal volatile ammoniacum cum essentia castorei remissum, vel aquam hirsutianam cum aceto & castoreo caribus applicare, & frictionibus circa præcordia item in pedibus cum panco alferiori instillatis, quam nimio fumo foetidorum, plumarum perdicum vel asa foetida, aut etiam camphora, quam perpaucæ ferre possunt, uti.

§. VIII.

Ego singularem sæpius effectum in feminis hypochondriaci hysterici ad præsciendâ ipsa symptomatica, maxime in cholerica & sensibilibioris nature mulierculis a pulvere nitroso præcipitante, cum equali succini & parca croci portione mixto, & à frequentiori elixiri visceralis nostræ compositionis, cum equali liquoris anodynâ dosi narranti usu, multa annoavi emolumenta. Ad mitigandos vero paroxysmos, tempore intermissionis chysterici, qui ex herbis lenioribus paregoricis carminativis parati erant, adjuncta insigni olei expressi quantitate, nihil utilius deprendi. Blando crum suo & temperate calido tepore ac vapore proximè & immediate uterum & vicinas partes leniendo & demulcendo afficiunt.

§. IX.

Pediluvia extra paroxysmum adhibita, si valde temperata fuerint, egregiam habent symptomatica allevandi efficaciam; si vero nimis fuerint calida, præsertim ubi corpora sint plethorica, & succi plena, nocentissima sunt, atque ad paroxysmos revocandos apertissima, quod non semel, sed sæpius animadverti.

OBSERVATIO I.

*Posse hy-
stericos
cum mor-
bis con-
vulsivis
ac epilep-
ticis junctis.*

Requirebat aliquando opem meam, virgo XVIII. annorum, habitus spongiosi, ac temperamenti phlegmatico-sanguinei, sanguine fuscis- que plenissima, ac irregulari per aliquod tem- pus menstruum fluore adfecta; quæ post præ- vium refrigerationem, noctu correpta erat ve- hementi tussis convulsiva. Hac sedata, post ali- quot dies violenta pariebatur hystericum paro- xysmum; sub quo præter atrocissimos vomendi conatus, alvi obstructionem pertinacissimam, urinæ retentionem, extrema algebant, cor vehementer palpitabat, facies tumida rubebat, arteriæ in capite fortiter pulsabant, ut apople- xiz esset metus. Post horæ quadrantem ad se- redibat; sed pharynx manebat contracta, adeo ut nec fluida, nec solida deglutire potuerit, pul- sibus feriebatur parvus ac debilis. Ipse vero pa- roxysmus, singulo horæ dimidio revertebatur; & misso ex vena in pede tusa sanguine, per octo quidem quiescebat horas: tum autem atrocior, & epilepticis spasmus motibus recru- descebat. Consultus ego, cum deglutitio adhuc valde impedita esset, curavi primum, ut clyste- ribus ano infusus, finimentis nervinis nuchæ spi- naeque inunctis, atque pediluvio, partium exter- narum constrictiones demulcerentur; tumque internis diaphoreticis, ac antispasmodicis malum oppugnabam. Quibus factum est, ut omnes si- luerint præterasteriales motus; & quam ex levi diæta crasse viderentur reverti, dato blando la- xante, ab eorum eruptione non solum præca- vebatur, verum etiam perfectæ restituebatur fa- milia.

Epicrisis.

Ad spasmodica, quæ ex uteri vitio proveniunt, pathemata concutanda non opus semper est, ut materia corrupta & viciata, utero inhaerens pro- xime & immediate id efficiat; sed crebrius id à causis externis fit, scilicet ab intenso frigore, quod partes inferiores, præcipue vero lumbarem regionem, tangit & afficit. Hac enim ratione in feminis sanguine copioso & impuro scatenti- bus, ita a partibus exterioribus ad interiores im- petuose compulsiis pro harum differentia varias spasmodicas, imo convulsivas movet afflictiones. In præfati casu ex congestione ad pectus facta vehemens & convulsiva tussis orta est; cum postea humor lædens, sedem suam mutavit, & ad nervos præcordiales, item ventriculum ejus- que nervos & per consensum ad ipsum caput translatus fuit, ac passiones, quæ hic in hyste- rica apparuerunt, produxit. In ejusmodi affec- tibus optimum est, curationem ab externis & internis, quæ spasmodicas nervosarum partium stric- turas blande relaxant, sulphicari, & postea tem- peratis carminativis, diagnosticis & antispasmodicis curam abolvere, & ad recidivam avertendam mensuralem excretionem in ordinem redigere; quod optime per commodam diætam, per motum & medicamenta, quæ non modo sordes ex primis viis, sed & ex ipso utero expurgandi fa- cilitate instructa sunt. Inter quæ utique pilulæ polychrestæ balsamicæ, quæ nostro tempore in usu sunt, maxime si cum antispasmodicis & salinis detergentibus pulveribus earum virtus se- cundenatur, principem sibi locum vindicant.

Adolescens nobilis, XVI. annorum, stature proceræ, & habitus corporis robusti, atque car- niosi, sanguine & succia præter naturæ modum turgens, de gravi circa inguina, ubi vasa sper- matica descendunt, dolore pronuper conquere- batur, & quod præter voluntatem ad membri erectionem, variisque ad venerem in animo observantibus desideriis folliciescitur. Haud ita multo post in febrilem quandam incidebat in- fultum, per aliquot dies infestantem, quo re- mittebat post aliquot septimanas, eadem circa inguina passus est molestia inconstans; sed jam longe alia superveniebant accidentia, hysterici plane non dissimilia: nam horribiles spasmi à pubis regione ad dorsum, ad præcordia, ad septum transversum, ad cor, ad fauces, imo ad ipsum cerebrum adicendentes, præcedente cordis palitatione, strangulationem faucium, spirandi angustiam, animi deliquium, soporem, accedentibus etiam artuum convulsivis tractionibus concitabant, qui paroxysmus sin- gulis fere mensibus repetebat. Hic, quod erat perquam notatu dignum, immani semper cibo- rum urgebatur appetentia; alvus autem addi- ctior erat, ita ut fortiora etiam elaberet purgan- tia. Præter hæc vasa mium turgabant sangui- ne; pulsus, qui sub accellione valde erat in- equalis & depressus, post eam magnus, & con- citatus observabatur. Variis usus est & Medi- cis, & medicamentis antispasmodicis, antiepi- lepticis, soteriis quoque fortibus, sed parum in- de percepti utilitatis: postquam vero ex nostro consilio, singulis fere mensibus, sanguis ex ve- na secta sex semper uncis fuit immixtus, & loco ponis ordinarii aqua fontana largita: nitro- trois quoque pulveribus paullo largiori portione ad sanguinis organum deprimebatur in usum vocata; tranquillum corporis motum, & ab ar- duis meditationibus, quibus excellentis ingenii adolescens nimium semper indulgebat, vacuum servavit mentem; integræ sanitati brevi tem- pore fuit restitutus.

Epicrisis.

Solvit & explicat peculiaris hic casus, nodo- sam & intricatam admodum questionem: Qua- re nimirum viri non similibus, vel iidem symp- tomatibus affligantur hysterici, qualia in fe- minis observantur, eo, quod simili modo, & sanguis, & liquor seminalis in partibus genera- tionis dicatis, nimirum vasis spermaticis, testi- bus, capsulis quoque seminalibus stagnare, ibi- que vitari ac corrupti possit? Namque non desse ejusmodi exempla, licet non tam fre- quentia, adolescentium, qui circa, vel etiam post annos pubertatis, ejusdem generis symptomata spasmodica, & convulsiva cum dolore prefforio, & lancinante circa illa, & in pubis regione, nec non languorem totius corporis, extremo refrigerationem, subsequente mox ingenti præcordiorum angustia, cordis palitatione, faucium strangulatione, difficilique ad suffoca- tionem usque spiratione patiuntur: inter alia præfens docet casus. Nec me fugiant plura exempla non modo adolescentum, sed etiam vi- rorum extra conjugium viventium, qui ex ni- mia castitate in eodem, quæ hysterico affectui propria & essentialia esse solent, pathemata in- cidentur: quid? quod nonnullis quoque in con-
vulsiones

*Malum
hystericum
in juvene.*

vulsiones artuum, inque syncopen prolapsos esse, aliquoties observavi. Si in tam atrocium symptomatum originem inquiramus, varia se offerunt momenta, quae clare demonstrant, ea à nulla alia causa, quam à copiosiori sanguinis ad vasa spermatica & testes affluxu, has partes vasculosas & nervosas nimium distendit ac distrahente suborta fuisse. Et eandem in nostro aegrotante causam significant dolores ac tormina circa inguina primum conspicua, atque tum ad alias corporis nervosas partes propagata. Quare etiam sedato per accommodata subsidia humorum organismo, ac derivato affluxu, cuncta conquieverunt symptomata.

OBSERVATIO III.

Honestæ, venustræque virgo, annorum XVIII. tenerioris quidem constitutionis, sed acutioris ingenii, animique mobilioris, in vicina urbe degens, postquam formoso etiam juveni, qui frequentius eam aegrotante invisitabat, desponsata fuit; valetudinis, quæ antea satis firmæ erat, status plane est immutatus. Ab eo enim tempore variis gravibusque affligebatur passionibus: nam dolores mox in dorso, mox in abdomine valde torquentes, mox artus cum tremore agitantis experiebatur: virium aderat ingens collapsus, ciborum adpetentia penitus languebat; alvus constrieta erat, tenebris tamen, & mingendi desiderium urgebant. Accedebant per vires animi deliquia, cum saucium strangulatione, & semper fere conquerebatur de phlogosi, extremorum frigore, ac horripilatione, ac subsequente calore præternaturali. Anxietates præcordiorum constriktivæ, quas ægerima comitabatur spiratio, nunquam fere non aderant: pulsus ferebatur varius, nunc celer, & debilis, nunc plenus exiguus, & inæqualis; urina plerumque infusa aquæ limpidâ, interdum pauca, cum rubro sedimento mingeatur: somno lapsus plane carebat; & si quidquam cibi, vel medicaminum adsumebat, agebatur circa præcordia anxius ac pressorius dolor. Mensium fluxus erat parcius, serosus, acris; & circa hoc tempus, cuncta exacerbabantur symptomata. Consulti Medici in dignoscendo morbo valde hæsitabant: quidam enim fibrin quotidianam, alii hæticam, quia ingens corporis præstilo erat contabescens; alii summam imbecillitatem ventriculi, & imi ventris acculebant flatulentiam. Hinc varii generis remedia, stomachica, carminativa, nervina, emmenagoga, laxantia, intestinalia data fuerunt, ac vena quoque in pede aliquoties secata. Cuncta vero tantum aberant, ut levamen inferrent, ut potius symptomata exacerbarent. Postquam igitur aegrotâ per tres fere menses hoc diu malo inflata, ego quoque accitus fui; exploravi protinus genuinam morbi causam, & consilium dedi, ut à medicamentis fere prorsus abstineret; ac pro potu ordinario lacte asmino, cum æquali acidularum Seliteranarum pondere mixto uteretur. Deinceps alvum clysteribus emollientibus, qui ex decocto florum sambuci, chamomillæ, herba majoranæ, mellisæ, ac semine cymini, addita fesser olei lumborum ac liliorum alborum largâ quantitate erant parati, subiacendam curavi. Tum quoque imperavi, ut licet imbecillis, corpus per vecturam sub temperato ac sereno coelo sæpius ac blande moveret; & per tempus aliquot ab omni colloquio & confortio cum sponso caveret. Tandem commen-

davi copulam conjugalem, quæ facta sensim paulatimque vires recuperabat, sine peculiari remedium opore. Concepit etiam, & anno elapso peperit infantem: at in ipso puerperio pathematâ hysterica cum saucium strangulatione experiebatur; sed nostro tandem auxilio, ac consilio restituta, jam laudabili fruatur sanitate.

Epierysi.

Haud exiguis ejusmodi casus in anoxiiformea præxi adnotavi, quod virgines venustæ, & antea vegetæ à nulla alia causa, quam à vehementem amoris occultâ, in miserum aegrotandi statum fuerint delapsæ; omnibus & animi, & corporis functionibus inde pestumdati. Ubi frustra, quin interdum non sine noxa, exhibitis omnibus medicamentis pharmaceuticis, opimum & efficacissimum remedium fuit in conjugio, non tamen omnia convenientibus dieteticis. Tantam vim & potentiam habent animi passiones diutius inhaerentes, universum motuum æconomiam, & naturales functiones perturbandi! Hinc inter philosophos PLATO de amore præsertim affirmat: *Non solum, inquit, in animam impetum facit amor; verum & illi corpus sæpe numero tyrannidem exercet virginitatis, curiæ, maciæ, dolore, tabundine, & mille aliis afflictiis, letalem noxam inferentibus, corpus vexat.*

OBSERVATIO IV.

Fœmina, æt. annorum, texturæque tenerioris, ante quinque annos febre quartana corripita sæpius recedente, & tandem copioso corticis chinæ usu prostrigata. Ab eo tempore mensuræ excretio sensim cepit immitti; & quum præterea ad affectus animi valde inclinaret, parum biberet, cibibus insuavis, induratis, concoctisque difficultibus maxime delectaretur: in variis incidit hystericos, spasmodicosque affectus, qui circa menstruum posticum periodum graviter infestabant. Tum enim sensit in abdomine gravissimum spasmodicam contractionem, cum alvo adstrictissima; saucium affligitur strangulatione, & spiratione ad suffocationem usque intercepta; pedes sunt gelu frigidiores, cor palpitat; interdum circa ventriculi ac septi transversæ regionem, tam acuti sentiunt dolores, ut digiti quosque atrachtu exacerbent. Sæpe numero sub tali paroxysmo, dextram capitis latus, oculiculis hemichronico dolore, ac intolerabili frigoris sensu afficiuntur, cum feri salissimè ex oculo fluxu. Quandoque in paroxysmo cuncta vomitu reddit, & à clysteribus dolorum majorem percipit exacerbationem. Ceterum remittente paroxysmo sana est, ac bene adpetit.

Epierysi.

Meretur hic affectus nomen hysterico-spasmodici, utut levioris; quem ab hypochondriaco alienum esse, vel ex eo patet momento, quod ægra extra paroxysmos, qui circa menstruum invadunt periodum, sana videatur; nec habeat, de quo conquærat. Originem trahit à sanguinis mensuræ circuitu, per valâ uterinâ impedito; quo factum est, ut partes ac fibras uteri nervæ ob distensa nimium vasa, ad spasmodicas proritate fuerint stricturas; quæ ad nervosas alias regiones, præsertim quæ à pari vago quosdam accipiunt ramulos, propagatæ, præcordiorum, ventriculique dolorem, impedimentum

Possit hysterica ex acculeta amore.

Possit hysterica ex acculeta amore.

spirationem, strangulationem, tormenia hemi-
cranica, aliaque pepererunt symptomata. Ad
inducendam autem humorum in utero stagna-
tionem, præter inordinatum victum, quam
plurimum contribuit, febris quartana, cortice
chinæ præpositere tractata: unde etiam viscida
ac scorbutica humorum dyscrasia, quæ semper
quartanæ febris mater est; magis fuit adaucta;
ut inter alia ex feri acrioris ex oculo effluxu
patet. In curatione mali igitur, præter ordi-
natam rectam vivendi rationem, remittente
paullisper paroxyfmo, clysmata pure oleosa ano
sunt injecta; atque linimenta nervina regioni
umbilicali applicata; quæ etiam cum communi
quidem, sed minime contemnendo remedio,
scilicet avena tosta, facculo calidiori inclusa al-
ternari possunt. Extra paroxyfimum ea fuit me-
dendi intentio, ut mitigatis per liquorem ano-
dymo-mineralis spasms, menses debitis venæ
sectionibus, blandis ac balsamicis laxantibus, ac
balneis in ordinem reducerentur; quibus etiam
perfectam restituimus sanitatem.

OBSERVATIO V.

Convulsi-
ones hysteri-
cæ.

Flagitavit aliquando meum auxilium virgo
quædam, pubertatis annos vix egressa, cui fluor
mensium irregularis erat, & quæ ideo per bina
circiter septimana convulsivos patiebatur motus.
Hi ipsam quotidie per frequentissima intervalla
invadebant, atque dolore lumborum, & abdomi-
nis, umbilici retractioe, alvo adstricta, tre-
more, diffinitione artuum, spirandique difficultate
se prædebant, maximeque caput occupa-
bant, ita quidem, ut oculi in omnes plagas cir-
cumrotarentur, ea, quæ vix concipi poterat
celeritate, ac vehementia: caput ad latera deor-
sum traheretur; ejusque arteriæ validissimo pul-
su admodum ferirentur manum. Neque vero con-
cidebat; sed sub mali invasione scilicet insidens,
in medio paroxyfmo surgebat, & tum incredi-
bili celeritate in gyrum movebatur: quod etiam
fiebant, si inter ambulandum convelleretur. Ipsa
accessionem præsentiebat; ac sub illa perfecta
loquendi facultate pollebat; nec de ullis capitis
conquestis doloribus; finito paroxyfmo hilaris,
& optime habebat. Remedia tollendo huic ma-
lo satis idonea, quæ propinabantur, parum pro-
fuerunt; præter commendatos clysteres demul-
centes, & linimenta nervina, temperatiora, spi-
ritu dorsali inuncta, quæ levamen præstiterunt.
Verum mutatione cæli, & peregrinatione in alia
loca, inuito quoque alio victu, & adsumto loco
cerevisiæ aquæ simplicis potu, insueta & atrocia
hæc symptomata sensim, sensimque conquevie-
runt, & penitus tandem expirarunt.

Eperisfa.

Id non semel, sed ferèberrimis vicibus ani-
madverti, morbos nervosi generis, seu, ut alii
loqui amant, spirituum, qui horrendis sympto-
matibus stipari solent, omnia fere respuere ex
fonte pharmaceutico petita medicamenta: eo,
quod vitium non tam in mole materie, sed po-
tius anomalis motibus, eorumque assuetudine
consistat. Tunc enim optatum præsidium est,
nullo uti remedio: sed præcipuum sanationis
punctum in mutatione ætatis, aeris, vitæ ge-
neris, vicibusque consistere, sive experientie com-
pertissimum est. Et certe elementa provido &
circumspecto usu plus efficiunt, quam medica-
menta activæ indolis; quod præcursum præcep-

tum admodum sibi commendatum habebant Me-
dici juniores. Namque rarissima profecto sunt
ea, quæ nervos, si læsi & à naturali tono de-
jecti fuerint, blanda, & temperata vi solan-
tur: quin potius plurimarum medicinarum na-
tura ita est comparata, ut vel nimium irritan-
do, vel iusto magis sedando ladeant. Deinceps
id quoque in persanandis generis nervosi mor-
bis est observandum, quod non omnibus ægris
eadem auxilia conveniant; neque, quod semel
profectit, id alio tempore juvet. Siquidem non
ubique & omni tempore eadem est nervosorum
partium dispositio, ac constitutio: hinc naturæ
agrotantium probe sunt discende.

OBSERVATIO VI.

Fœmina xxx. circiter annorum, quæ abor-
tendo concretum polyposum utero excer-
nebat, elapsa hinc anni spatio, sub ipso men-
sium flore poma, ac lacticia comederat, &
præterea corpus insigniter refrigeraverat. Quo-
re incidit repente in convulsivos motus, qui-
bus in terram prolapsæ caput præsertim, atque
pedes misere torquebantur, manibus liberis;
commodebat dentes, ac vehementer clamita-
bat. Talis paroxyfimus subdiode circa mensuras
recurtebat periodos, neque ullas habebat no-
tas prænuncias: post illum urgebant languores
universi corporis, gravitatis capitis sensus,
crebre vertigines, & alvi obstructions. Tum
vero utero coepit gerere & sub toto gestationis
tempore à malo convulsivo-hysterico immunitas
vixit, felicemque tandem habuit partum. Lo-
chia primum rite succedebant, sed die decima
immodica fundebantur ferum sanguinolentum;
alvus etiam per sex à puerperio dies officio non
fungebatur. Hinc sensim redibant tensiones
capitis, vertigines, flatulentie, ac imi ventris
tormina; sonni ac appetitus defectus, ac
tandem accedebant pristini motus convulsivi,
sinistrum maxime latus occupantes, sub quibus
fluor uterinus sanguine denso tinctus adpare-
bat. In curatione hujus affectus clysteres car-
minativi, & oleosi; nec non pilule temperate
balsamicæ, cum resecta dosi calidiores, & cro-
ci mixtæ, sive Seltænas pro potu ac denique
internus Carolinarum, & externus aquarum
Tropiceus usus, præstantissime fuerunt ef-
ficacia.

Eperisfa.

Nulli morbi tam graviter totum partium ner-
vosorum systema præter naturam afficiunt, nul-
lique universi corporis functiones tam subito ac
vehementer ledunt, quam qui ex uteri labe
prognascuntur; quæ ut plurimum per infelicem
abortum, & malum in puerperio regimen con-
trahitur. Horum certum indicium præbet, si-
mulque male affectum uterum, & destructum
per ejus vasa sanguinis circulationem signifi-
cat sæpenumero concretum membranæ,
sic dicti polyposi, sive molanum exclusio: un-
de diuturnas & atroces nasci aggritudines ma-
nifestum est. Quicumque igitur in persanandis
mulierum morbis præ aliis excellere vo-
lunt Medici; ad fontem horum malorum res-
piciant, & curationem eo dirigant, necesse est.
Neque ego certius & efficacius auxilium, quam
in exquisito vitæ regimine, ac circumspecto
ac convenienti fontium tam calidorum, quam
frigidi-

frigidorum usu, inveni unquam, maxime, quando temperate balsamicis, uterumque roborantibus, & laxantibus curam persequamur.

OBSERVATIO VII.

Fœmina, XXI. ætatis agens annum, constitutionis terrentissimæ, ac biliosæ, binis abhinc annis ex iracundia incidit epilepsiam. Elapsio anno contraxit matrimonium, & haud ita pridem peperit infantem: sub quo partu enonnis cruor uterini copia effluxit, sed datis improvide adstringentibus cohibitus est fluxor. Nihil tamen minus post duas hebdomadas restit fluxus menstrualis; sed cum denique vehementer percelleretur terrore, mox percepit miros circa lumbos cruciatus, & acutissimos dolores, perpetuum ad alvum & urinam stimulum; urina succedebat cum magno ardore, insignique difficultate, deponebatur arenulæ. Sollicitabat insuper perpetui vomendi cupiditas; dolores mox circa umbilicum torquebant, huncque violenter retrahabant, mox inguina obfidebant, cum pertinacissima sphincteris vesicæ constrictione; & acutissimis quoque in mammis doloribus. Hicce atrocissimum tormentis per binas ferme adfligebatur hebdomades, apertu, somnoque pereunibus: quin etiam epilepsicæ superveniebant agitationes, & in paroxysmis deliria loquebatur: crebro fluxit quoque materia alba acerrima instar puris ex utero. Adhibita sunt varia remedium genera, efflyctes oleosi, emollientes; unguenta nervina, ac anodyna, pulvis balsamicus &c. sed malum exacerbare videbantur. Tum propinabantur de pulvis ex nitro purificato, camphora, & pulvere Marchionis confectus, & elixirum, quod habebat essentiam croci, myrrhæ, tincturam tartari, & extractum castorei. Unde una depoocebat sedimentum, & menses aterrimi, foetidique coeperunt fluere. Tum continuatis his remediis, omnia tantummodo camphora, conjunctoque infuso veronica, cruor uterinus, naturali similis, floridiorque ferri coepit, & ægra intra breve tempus perfecte convalescit.

Epijisis.

Videbatur primum hæc affectio Medico cui-dam calculosa; sed revera non fuit, nisi hysterica, ex lociut improvido adstringentium usu superfluo, originem trahens, & calculum meriens. Quam enim in hysterica passione nervi uterini, qui cum nervo vesicæ, maximeque sphincteris fabricæ, insignem sœvent consensum, spasmodice contrahantur, non mirum est, si illæ structuræ ad vicinas partes, præsertim vesicæ sphincterem, transierint, crebramque mingeandi cupiditatem, & urinæ retentionem producerent. Quamvis vero hi ipsius partes inferiores occupant; humor ille, ut ita loquar, corruptus, qui stagnando in uteri cavitatem irrupit, externi haur potuit; hinc nec siluerunt symptomata. Verum postquam ipsius relaxati, & ope myrrhæ, croci, & c. mens-truus fluxor promotus fuit; hinc materia foetida effluxit; non fieri potuit, quin remiserint omnes passiones.

OBSERVATIO VIII.

Est hic loci affectus quidam, certis familiis peculiaris, qui subiecta, in pubertatis potissimum annis constituta, magis femini sexus, & habi-

Frid. Hoffmanni Oper. Tom. III.

tus spongiosioris, succorumque pleni invadit; atque variis in callum adhabitis remediis, tandem post aliquot annos sponte remittit. Adoritur frequentissime ratione: sentium inter morbi initia, sensum fornicationis in manibus vel pedibus; sequitur pandiculario, oscitatio; dolor fluxus, gravique circa lumborum vertebra; mox agitationes, ac volutationes manuum per gyrum, sursum ac deorsum continuæ sunt, & involuntariæ: præcordiorum summa urget anxietas, spiratio citatissima, angustissima, cum suffocationis metu, palpebræ ab uno lacere ad alterum trahuntur, oculi vertuntur in gyrum &c. Sed admodum variant hæc symptomata; nunc alvus suo fungitur officio, nunc pertinaciter clausa est; nunc urina fluit, nunc retinetur, cum vehementer circa inguina dolore. Interdum collum ab uno latere ad alterum perpetuo volvitur; interdum crudelissima infestant tormina intestinorum, cum cardialgia, vomitibusque vehementioribus: mox femora ad anum contrahuntur, cor violenter palpitat, accedit singulus; mox totum corpus atrolitur, spina incurvatur; mox oculis aperti, membris rigidis, nullus est sensus, nulla excitatio &c. Hæc est paroxysmorum descriptio, qui modo sæpius, modo rarius revertuntur: extra quos bene habent, bene appetunt, dormiuntque. In foeminis mentis plerumque recto succedunt ordine, & debita quantitate; quando usque gerunt, morbus quiescit; sub partu vero sæpius revertitur. Nullis curantur remediis, sed mitigatur lumbicalibus & castoreis: tandem vero victus, loci, & maxime ætatis mutatione certissime debellatur.

Epijisis.

Rarus & prodigijs hic affectus, speciarim quidem in numerum morborum, sic dictorum spasmodico-vagorum, quos Cap. III. petraclavimus, referri meretur: verum ego, cum jam per quadraginta annos functioni Professoris præfui, sæpissime, si quædam ex hac non incelebri familia hoc malo fuerunt cruciata, in consilium accinas sum; omniaque morbi momentis probe exploratis animadverti, obnoxia ei passioni subiecta, sive foeminae, sive mares fuerint, ad libidinem; resque veneræ appetentiam valde proclivia, & insuper animi inconstans, mobilioris, ad tristitiam pariter ac nimium gaudium valde disposita fuisse. Hinc vero videtur simillimum, causam hujus affectionis, quæ commode hysterici adnumerari potest, in uteri vicio collocandam esse plerumque. Adest enim primum hæreditaria ad hos irregulares motus proclivitas; accedunt præterea pubertatis anni, in quibus major, maxime concurrente libidine, ad partes generationis dicatas & feminales fit affluxus; qui denegato exitu, quemodo hystericas spasmodicasque totius generis agitationes excitare valeat, superius sub causis mali hysterici ostensum est. Meretur hæc hysterica passio vocari hæreditaria, ac gentilitia; quæ, quam hæreditarium quid subest, omnino discrepat ab ea, quæ individuas singula patiuntur. Ceterum periculo fere vacat, & uti jam dictum est, ætatis mutatione, vel nonnquam etiam conjugio, sponte expirat.

OBSERVATIO IX.

Virgo annorum XVIII. iracunda, tenerrior, diæta usque irregulari, maxime lacticiis & acc-

cræ ja-mica pe-culians.

Rarus hy-sterici & fluxor epi-jisis.

Pallio hy-sterici & fluxor epi-jisis.

Pallio hy-sterici & fluxor epi-jisis.

ex in a-
fina sup-
propterea.

accretis, refrigerationi sæpius ob curas domesticas exposita, & ideo fumo carbonum vivorum, in clauso conclavi frequentius superfedere solita, incidit in mensium suppressionem. Versus tempus illius fluxus patiebatur atroces motus hysterici, cum horrendis lumborum doloribus, crudelissimis imi ventris ac capitis tormentis, alvo adstricta, duriore, pedumque refrigeratione. In consilium vocatus Medicus ad ciendos menses præscripsit pellentia, nempe essentiam myrrhæ, & croci, spiritus salsi ammoniaci nuptam, & pulverem baccarum lauri. Inde evenit, ut misera præter opinionem in atroces epilepticas mutationes incidit, sub quibus artus non corrugabantur, sed ita potius rigida expandebantur, ut flexi haud poverint. Incita protinus in pede vena, mitigabantur quidem hæc symptomata; ut paroxysmus nequiquam in totum desinebat, sed quotidie circa meridiem invadebat, adeo ut præviis extremorum frigore, anxietate, dorsi dolore, cordisque palpiatione, totum rigesceret collum, vel etiam hinc inde agitteretur; caput & brachia cum insigni rigiditate expanderebantur, spuma os occuparet, ac omnis abesset sensatio. In curatione hujus mali venam in pede incidi iussimus; namque datis pilulis blande balsamicis, quæ facilius mentes ciendi, ac debiles imi ventris partes roborandi possent, pediluvia ac infusæ ex emollientibus paratas ordinavimus, usque felici cum successu vias uterinas relaxavimus, ac obstrukcionem referavimus. Tandem subjuncto interno, recto tamen aquarum Carolinarum usu, ægram præliæ restitui- mus sanitati.

Epilepsia.

Malum hoc hysterico-spasmodicum primo, & deinde incauta curatione exacerbatum, & in epilepticas commutatum motiones, uterini fluxus cohibitioni deberi, extra omne posuitur est dubium. Ad hanc vero mensium obstrukcionem non modo vitium in diæta, sed maxime externa nimis frigidi aeris ad uterum & partes abdominis admisso quin plurimum contribuit. Sicui enim perversa diæta sanguinem & humores valde lentos, crassos, & excretionibus minus aptos peperit: ita frigus valè ac glandulas nimis contrahendi, & angustandi, insignem exseruit potentiam. Non minus ex incongruorum edulcorum justo largiori usu, crudities in primis viis, maxime intestino duodeno stagnantes sunt procreatae, quæ in causa fuerunt, quod paroxysmus circa meridianum tempus invaserit. Debenar quoque aliqualis animadversio, noxiosissimo carbonum usus; quorum vapor narcoticus partium nervosarum totum, & elastem indignantem pellimedit. Hinc cum accessit inconveniens curatio, quæ Medicus, ante venæ sectionis administrationem, viarumque obstruktarum refrigerationem, calidioribus menses ciere conatus est; non fieri potuit, quin humores magis magisque exagitati, partes nervosæ, jam debilitatæ vehementer distenderint, affecerint, atque tandem ad spasmodicas & epilepticas convulsiones proripaverint.

OBSERVATIO X.

Formina XXX. anorum, temperamenti sanguineo-melancholici, hysterici passionibus in puerperio, & circa illud, lætipis obnoxia, nartum

hysterica
passio in-
stabilis.

gravida, gestationis tempore nec venæ sectionem admisit, nec exquisitè servavit præcepta diætica. Primis post partum diebus non bene purgata est utero: sed de dolore lumborum, torminibus ventris, alvo adstricta, & somno per aliquos noctes inquieto conquereretur. A præctico, quem in corticum vocavit, validiores essentia ad pellenda lochia fuerunt datæ; & ad alvum aperiendam uncia dimidia salis amari Sedlicensis in aqua simplici soluta est oblata. Inde auctis torminibus, nec facta per alvum, nec per uterum excretionem, conversio sanguinis versus superiora motu desiravit, & accedentibus convulsionibus extincta est.

Epiersia.

Ubi natura valde sensibilis, ad motus spastici hystericos, vel hypochondriacos est proclivis, ad excretionem, si illæ desunt, promouendas, summa moderatione opus est, ne per nimium stimulantia, vel purgantia & commoventia id moliamur. Quod motuum semper & ubique in puerperis servandum est, lochia non rite fluxerint. Nam non modo purgantia fortiora, sed & salina paullo majori dosi data ac digestiva natura tunc minime ferre potest. Multo vero magis à drasticis purgantibus sibi cavere debent puerperæ, quæ à partu laborioso viribus fuerunt exhaustæ, ne illa ad promovenda lochia prioribus fumantur diebus. Tristis quæmodi casus paucis abhinc diebus in nostro contigit suburbio, ubi femina partu valde fatigata, ad ciendum lochiorum fluxum tertia die, loco pilularum polychrestarum, quas sumere volebat, pilulas contra obstrukcionem dictas, ex errore numero viginti capiebat, quæ ex æquali parte aloes solatæ, & extracti panchymagogi *Crolli*, adjecta limatura martis parantur, & ordinario pondere trium vel quatuor granorum exhibentur. Ab hoc autem pharmaco, sub ingentibus imi ventris torminibus, extremorum frigore, summa corporis jaclitatione, atque fluxus uterini plenaria suppressione, marinarumque lacte atque turgentium contractione, præter crebros vomitus, intra tres dies, plus quam centies alvum deposuit, & septimo tandem die exspiravit. Quæ remedia ad mitigandas, vel compedendas hæc truculentas passionis adhibita fuerint, mihi incognitum est. Interim ex fatali hoc casu, Medicorum juniores addicere possunt, quum blandis, & temperatis medicamentis puerperæ, prinis præsertim diebus, quando per partum laboriosum, & monum vehementiam vires deprecidit sunt, tractari debeant. Sed iussissime quaritur, quoniam convenienti præsidio, si tam perniciosa data sit medicina, lagax Medicus, summo periculo mature possit succurrere? responso patebit ex sequenti observatione, quæ cum ante viginti annos in aula Berolinensi degerem, me annotasse, hæc occasione memini. Erat nempe Comes XII. circiter anorum, cui ex tinea capitis laboranti, præscripti pilulas sex dosibus sumendas, quæ drachmam unam extracti panchymagogi *Crolli*, & drachmam quoque iercuri dulcis, ac trochiscorum Albandal grana sex habebant. Hæc cum omnes in una scutula ex pharmacopœio essent allatæ, Comes, remoto eo, quod mensibus studiis illius præerat, eas cunctas suas sponte una vice devoravit. Ille accedens obstupuit, & cito hora vespertina nona ad domum meam venit, atque lacrymandus meam opem imploravit: quia de

de tota ejus fortuna actum fuisse, si id resciverint parentes illustrissimam. Ego accedens, cum talis casus in praxi mihi nunquam obigerit, praevis deliberatione confectus, ut aliquot lactis mensuras curaret apportandas. Summis etiam Comes lac tepidum larga quantitate: quo facto circa noctem, quae infomnis erat, quidam tormina expertus est. Mane per vices quatuor sedes habuit copiosissimas, cum imi ventris crucians, & excreto simul lumborico satis lato; tumque nihil mali amplius passus, perfecte convaleuit. Ita vero argumentatus eram: si copia lactis affluerit spasmos, quos venenum arsenici inducit, mitigare, & mortem avertere potest; quidni etiam idem remedium, ad infringendam vim purgantium acriorum, & mitigandos spasmos atrocissimos posset inservire?

OBSERVATIO XI.

Fœmina generosa, XXXVI. annorum, temperamenti sanguineo-melancholici, habitus corporis nec ad eomacilentiam, nec nimium pinguis, sed mediū, tempus, quo utero gestabat, maximam partem vita desidi sine motu transiegit, & plus iusto etiam somno indulsit. Post partum satis facile & felicem, ingentem sanguinis per aliquot dies ex utero profudit copiam, & hinc adeo debilitata fuit, ut sine metu lipothymiae corpus atque caput haud diu in erecto situ tenere ponerit. Ponerat quoque conclave calidius optime tolerare: nam ab aura paulo frigidiore ad corpus adfringente mox inhorrescebat; hanc potum quoque temperate calidum hauriebat. Septimo & sequentibus diebus, ingens viscidus, impuri, sanguineique feri copia effluebat: nono die inopinato terrore ex levi tamen occasione affliciebatur. Inde partes extremæ statim algebant, flatus uteri suscebatur, & genitalia frigida, aridaque evadebant. Accedebat ingens circa præcordia oppressio, & anxietas, cum omnium collapsus virium, corporisque frigido ac tanto sudore, ut ipsa, & omnes adstantes mortem metuerent. Accius ego dedi liquorem meum anodynomineralem, cum tertia parte essentiae callosae, ac liquoris bezoardici Bullii mixtum, atque tertia quavis hora ad guttas triginta, cum aqua mellis & cardui benedicti sumendum, hauris desuper aliquot infusi calidioris Theæ vasis. Sequebatur sudor calidus, meliusque habere coepit. Sed cum per quatuor dies alvus non fuisset aperta, neque clysterem admittere voluerit, tentata est per suppositorium alvina excretio; & cum paulo diutius ad alvum deponendam frustra stimulata, exuta lectum commoraretur; subito mentis deliquit ad suffocationem usque incidebat. Tandem admisso clystere castinativo & oleoso; datisque postmodum pilulis balsamicis, reddidit per alvum visigenem stercorem, humorumque putridorum copiam; & de cetero restituta uteri fluore, perfecte convaleuit.

Epilepsia.

Ad pathologiam non minus, quam therapiam hystericae passionis melius cognoscendam, scire expedit; spasmodicas ejusmodi ex utero passiones, vel à nimia sanguinis, humorumque exsuperantia, quam HIPPOCRATES nomine repletiois notat; vel eorumdem inopia, quam verbo inanitionis designat, & cujus indolis præsertim est casus, suboriri. Corpus enim sanguine, viribus

Frid. Hoffmanni Oper. Tom. III.

que exhaustum, non modo à frigore externo, verum etiam à metu vel terrore facillime, & graviter afficitur: quibus causis excretiones sustinentur, & motus spasmodici ad interiora convertuntur; nec prius cessant, quam donec naturæ emergia, & artis subsidio excretiones, revocatis motibus, restituantur. Ego non semel, sed sæpius post graves, præsertim ab abortu, hæmorrhagias, superveniente terrore, vel inopportuna refrigeratione, non modo syncopes, sed & oppressionem pectoris, spirandi angustiam cum extremorum frigore, imo, quando non mature satis convenienti medicina obvium inam est, ipsius convulsivas ac epilepticas agitationes excepisse adnotavi. Quo casu nec venæ sectiones, nec antispasmodica, nitrosa, anodyna, aut vaporosa, vel nimis calida quicquam proficiunt; sed omnis curatio lenioribus analepticis, temperantibus, spasmos mitigantibus, & iis, quæ excretiones blande procurant, absolvitur felicissime; cavendo, ne fortioribus medicinis collapsis jam vires proflus pessumdentur.

OBSERVATIO XII.

Illustrissima vidua, XXX. annorum, habitus corporis succulenti, & sanguinei, in puerperio suo ab hysterici symptomatibus non fuit immunita. Mortuo marito, laute diæte indulgit, nimis salutaribus sæpius commovit corpus, illudque etiam intempestiva refrigeratione, dum frequentius nudo pedice gramina in hortis insisteret, exposuit, neque minus horros fractus, & acetaria in delitis habuit, usque corporis vires, ac ventriculi robur ita destruxit, ut subinde de præcordiorum anxietatibus, spiratione difficili, dorsi dolore, alvoque adstrictiori fuerit conquassa. Præsertim loco sanguinis uterini circa tempus menstruum, interdum extra illud, magis ferum effluxit viscidum. Et quum aliquando, ad intensam imi ventris refrigeratione, hic fluore etiam suscebatur; apparuit circa inguina tumor durus, dolore pressorio stipatus, latitudinem quatuor digitorum, & longitudinem fistulae occupans. Atque hinc sequebantur gravissima symptomata; Namque ex improvviso concidebat in terram, omni motu, sensu, ac ratione privata: facies erat inflata, ac vix rubicunda; mammae mirum intumescabant, fundebantque sudorem, rubro lineæ imbuentem colore. Pullus ferebatur plenus, & magnus, venter turgescere flatus, & pedes algecebant. Celebrata sectione venæ mox ad se rediit; atque hunc paroxysmum albicantem intra unius mensis spatium, pluriusquam quinquaginta vicibus, modo mitiorem, nodo gravorem, absque tamen notabili virium jactura, patiebatur; cujus vehementia non nisi sanguinis missione sublevari ac mitigari posuit. Ego tandem vocatus, explorata totius morbi historia, & agrotantis natura, eam à nimis venæ sectionibus, præsertim in superioribus partibus abstinere jussi; frequentiore autem pediluviorum tepidorum usum commendavi. Et quoniam alvi erat adstrictior, clysteribus oleosis, ac castinativis alvum subinde ducendum curavi. Interne quoque crebro, tamen moderate, dedi pulvres nitroso-aborbentes cinnaburinos, pilulasque nostras polychrestas, interdum cum grano callosi, interdum quoque cum tertia parte extracti panchymagogi Crolii permixtas. Tumori porro inguinali vesicam decocto emolliente cum lacte repletam applicari jussi, & speravi, ut advocata obsterix

F 2 in

in tumore inguinis, & statum genitalium paulo curatius inquireret. Illa satis perita tumorem illum à fluore alio cohibito ortum fuisse suspicabatur: quare curationem per chylorem uterinum, aliquoties admittit, influendam esse iudicavit, quo ex fero lactis, cum floribus chamomillæ, & semine cymini cocto & infuso, ingens mucî, glutinis inflat copia fuit educta cum levamine momentaneo. Pro pona sumit suntem Selteranum foterium, cum pariori vini portione; & sic paulatim melius habere coepit, atque tandem maritata plenarie convalescit.

Epieris.

Non semel, sed sæpius in paroxysmo hysterico graviori, ubi omnis motus & sensus sublati videntur, in valde plethoricis, pulsuum adnotavi magnam; ut ideo affectus magis ad apoplexiæ levioris, quam syncope speciem referri mereatur. Quo in casu sanguinis missio, presentaneam quidem fert opem; sed cavendum probe, ne illam nimis crebro iterando, vires frangamus, malumque reddamus perniciatius. Docetur præterea ex hac morbi historia, quale incommodum, & quæ periculosa symptomata, fluoris albi suppressio progenerare valeat; præsertim si latentes venere accedant igniculi; quibus extinguendis conjugio non præstantius est subsidium. Simile malum oritur in virginibus, cum cachexia, colore vultus plumbeo, lassitudine, febre lenta, & anxietatibus junctum, à suppressione veneris; ubi ex mora liquor genitalis vappens ac corruptus, succos vitales in mixtura & motu suo varie turbat, & alterat. His suadendum optimo jure conjugium est; utpote cujus beneficio liquor femininus excernitur; & motus humorum à ipicui genituræ virilis, novum veluti robur adipiscitur, idemque ipsi etiam partibus solis novus vigor, novusque color restituitur.

Plura de malo hysterico exempla reperire licet in *Consult. ac Resp. medicin. Sect. III. casu XLIII. & sequentibus* & *Sect. IV. casu XLII.*

CAPUT VI.

De affectu spasmodico-flatulento, seu hypochondriaco.

THESES PATHOLOGICÆ.

§. I.

NON ultimum inter morbos generis nervosi spasmodicos vindicat sibi locum passio sic dicta hypochondriaca; quæ quam sub mucronata carulagine, ac colliis spuris, in hypochondriorum regione potissimum suam exerceat tyrannidem, nomen suum ex græca traxit origine. Est illa, si realem speciemus ideam, affectus primarum viarum, nominatim ventriculi, ac intestinorum spasmodico-flatulentis, ab inverso ac perverso illorum motu peristaltico natales suos mutuans; per consensum vero totum nervosorum partium systema, in irregulares motus conjiciens & totam æconomiam functionum perturbans.

§. II.

Hujus aggressuri historiarum, præmonendam duximus, quod nulla corporis pars sit, nulla fun-

ctio, quæ in hoc longissimo morbo non lædatur, ac præter naturam habeat; & symptomata tam gravia, tamque plurima sint, ut vix cuncta recenseri queant: adeo, ut quemadmodum febri inter passiones acutas præ aliis universalis dici potest morbus, ita noster hypochondriacus affectus, hoc nomen inter chronicos iustissime mereatur. Ut autem ordine procedamus, & initia pariter ac incrementa polymorphi hujus mali explicemus: ab ini ventris cavitate, quæ omnium primo illius tyrannidi subiacet, ordiendum est. Sic itaque in primis morbi principii grava sentitur ventriculi ac intestinorum tensiones, ac inflationes flatulentæ, præsertim sub costis spuriis in hypochondriorum, maxime sinistri, regione; in qua nonnumquam tumor satis durus conspicitur. Speciatim quod attingit ventriculum, ac oesophagum; excurrunt se nausea, ciborum fastidium, appetitus vagus, mox plane prostratus, mox avidior; ingesta male conficiuntur, cruditates acidæ, viscidæ quæ progengerantur; dolor ventriculi pressorius, & gravatius, maxime postulum excipiens, spasmodica contractio gulæ, freuens mucî linsidi ex ore rejections, deglutitionis impedimentum, gravis cardialgia, ardor stomachi, ructus acidissimi, vomendi conatus, ac ipsi vomitus, quibus redditur saburra tam acris, ut inde stupefactos dentes, ac corrosa linteamina observaverint auctores. Annoravi etiam vomitus in hypochondriaci pure sibiaceos, *disf. mea de remed. benign. abusu* §. 17. *Conf. M. N. C. Dec. I. anno III. obs. 253.* Porro in volumine intestinorum, & quidem tenuium, percipiuntur graves circa umbilicum dolores, & cruciatus, torsiones, lincationes, borbovymia, murrura; crassiorum quoque adligunt graviora tormina; alvi mox est profluvium, mox & quidem pertinacissima adstrictio, cum statum retentionis, qui vel per superiora, vel inferiora eructati, reliquis paululum levant passiones, at mox copiosissimum provenit regerantur. Contra vero frequentes scijus urgent desidendi conatus, & non raro tubercula, ac cæcæ hamorrhoides anum obsident, quin & ipsæ fluor sanguineus, symptomatice aliquando succedunt. Melio in quibusdam est difficultas, dolorifica, urina redditur tenuis, diluta, alba, largo nonnumquam sedimento, coque arenario imbuta: quid? quod conspirans in totam regionem dolor, calculum sepe summo meminitur.

§. III.

Neque vero solum abdomen diris symptomatibus discruciat passio hypochondriaca; verum etiam alias in consensum trahit regiones. Sic occurrunt in pectore insignes angustiae, contractiones, vehementes spirandi difficultates, cum oppletionem pectoris nonnumquam junctæ, cordis tremor ac palpitatio. Ingravescens malo coepit etiam infestatur; in cujus partibus exterioribus, cephalalgia, hemicrania, varii dolores tractorii cum rigiditate, & immobilitate juncti, atque sic dictus clonus sentiuntur; in interioribus vertigo, aurium tintitus, cum auditu difficili se exerit, oculi tristi scotomia obnubilantur, visio nunnulla fit duplicata, oculi dolent cum siccitate, dolor linguam, sæpius in certo spatio occupat ardens & valde molestus, & saliva fluit uberrime, ut ideo sputatores dicantur hypochondriaci. Tandem animales quoque labantur functiones; animus vel nulla, vel saltem levissima causa incitatus, ad perverfas commotiones, inquietudines, an-

Definitio
mali hypo-
chondriaci.

Historia
mali hypo-
chondriaci.

Concomi-
ta morbi
hysterici.

angores, terrorem, tristitiam, iram, metum, diffidentiam abieperunt, ad vanas inclinat imagines, perversamque phantasiam; perit vis memoria, ratio labacit; somnus est turbulentus, difficilis, turbulentissimus plenus. Sunt denique quaedam symptomata, quae totum corpus spectant; illud enim crebris phlogosis, aut copiosis sudoribus persudant, vires prosteruntur, languet totum corpus, & ad omnes torporum est labores; sensum conturbat; artus dolore contusorio, saepius lancinatorio dissonant; ac omnes denique se- & excretiones, praesertim sanguineae pervertuntur. Et quis potest omnia ac singula eorum symptomatum recensere; quae quot adoriuntur individua, tot fere diversas ludunt tragedias.

§. IV.

Conspiciunt cum hac recensita morbi historia, Vestalissimum Medicorum monumenta; ex quibus GALENUS Lib. I. de locis affectis pag. 278. edit. Græca Basilensis adducit fragmentum, ex DIOCLIS libro, qui nomen morbi hypochondriaci, flautenti, & melancholici, à veniculo sibi. Nec indigna est descriptio, quam refert, ut hic breviter suppediteur: Nam apud, inquit, ubi cibum assumit, præcipue colla diffilens, & ardore excitare aptum, evensum spontaneum humida, copiosa, nullus aridus, nullatones, præcordia affluunt, fluctuationem percipiunt, non illico, sed quando emissiones cohibent. Aliquando etiam ventris vehementes dolores percipiuntur, qui in manibus supra diaphragma excutuntur, & consilium quidem cibi mitefecerunt: quam præterea vero cibum refecimus, eodem modo adigunt; quin saepe etiam jejunis, & post eam molesti existunt. Quod si evocant; eruda, & pituitam subactam, calidam, aculeo reperiunt, usque adeo, ut & dentes inde stupore afficiantur. Et quia frigida opem adferunt; internamque partem aflu morbum foveri iudicat.

§. V.

Dum adhuc circa morbi hypochondriaci historiam sumus occupati; monenda sunt quaedam momenta, scilicet perquam necessaria. Quomodo modum scilicet malum hocce, suos habet gradus, qui in suppedianda prognosi majorem accedendum hanc: ita enim exacerbationes involvit, & satis graves format paroxysmos. Quamquam enim nunquam recte habeant hypochondriaci; attamen hiemali ac autumnali, quin quacunque frigidiore tempestate longe vehementiorem symptomatum suorum patiuntur atrociam; contra vero eo, quo calidior ac æstivus est æt, tempore, magis vegetiores deprehenduntur. In foemina poro, hoc malo infestatis, major illius vehementia observatur circa illud tempus, quo menses debent fluere; qui plerumque quodam laborant vitio. Nec silentio prætermittenda, sed notatu digna est observatio, quod hypochondriaci rarissime febribus continuis, epidemicis, contagiosis, quin ipsa peste afficiantur, & à multis aliis morbis grassantibus immunes maneant. Ratio in eo videtur esse posita, quod in ipsorum primis viis, multæ ordinario crudæ acido-vicidæ hæreant; quæ contagiorum, quorum ratio in summa tenuitate partium subpæreantur consistit, efficaciter resistunt, & hæc partes evolvant quasi, atque figunt. Unde etiam fit, quod senes, ac homines melancholici ab ejusmodi morbis acutis, immo contagiosis rarius afficiantur.

Frid. Hoffmanni Oper. Tom. III.

§. VI.

Quod attinet subiecta nostri mali; deprehendimus, illud maxime infensum esse ætati juvenili, ac virili, à vigesimo circiter ad quinquagesimum annum: quo superato, naturam suam mutat, & in arthritidem, podagram, gonagram, malum ischiadicum, calculum renum, catexiam, scorbutum, morbum nigrum, obstructiones viscerum, hæcticam &c. aliisque fonticos morbos transit. Obnoxii poro huic affectui sunt, qui habitum corporis spongiosum, mollem, laxum, & vasa exiliora obtinuerunt, præ iis, qui corporis strictioris sunt. Non minus eos adoriuntur, qui vel natura languidiores existunt, aut jure hæreditario quandam dispositionem sistent; vel qui perverto vivendi genere, aut per longos morbos, insignem virum ac roboris naturalis libetem contraxerunt imbecillitatem. Praesertim insistentur hac affectione, qui vitam sedentariam sunt addidit, litterarum studia nimium indulgent, assidueque vacant meditationibus & luctationibus: unde morbus est literatis familiarissimus, & veluti proprius. Ex eodem denique fundamento, nec sequor sexus ab eo immunes observantur; sed tantum non majori, quam nobilior frequentia ab illo afficitur; licet harum passionum hypochondriacæ perperam cum malo hysterico confundantur, & sub hujus titulo significantur.

§. VII.

Sed accedamus ad indaganda mali hypochondriaci sedem; in qua determinanda Veteres non minus, quam Recentiorum quidam errant. Veteres, cum viderunt, sub collis sparis latera sinistri, ubi lienis situs est, sæpius percipi tumorem tendum inflatum, in hoc quoque vixere sedem mali hypochondriaci collocarunt: unde etiam hodie perperam de Miltæ-Krankeheit dicitur; qualem causam defenderunt RHODIUS atque HEURNIUS. Verum ut tacemus, lienis visus per structuræ suæ rationem, ad recipiendum tam acutum, & lancinatorium sensum, qualis est in hypochondriaci, valde ineptum existere; docet etiam experientia, & cadaverum sectio, in hypochondriaci sæpius nullum post mortem inveniri lienis vitium. Hac in re consentientes habemus SYLVIIUM diff. de usu lienis, HOFFERUM in Heracle medico Lib. III. cap. 3. HOECHSTERUM Dec. V. pag. 502. & 388. Neque vero negandum est, quoniam nonnunquam lienis infectus subesse possit: à quo tamen nec dolore acutum, nec ipsam morbi sedem derivare licet.

§. VIII.

Quidam Recentiorum, veram ac universalem passionis nostræ flautentæ sedem, in vena portæ, ejusque ramificationibus consituunt; atque putant, stagnantem in hujus vasis sanguinem, unicam ac genuinam concutorem symptomatum esse causam, quæ semper in viris excretionem hæmorrhoidalem, in foeminis menstruum respicerent; atque hæc natura, vel arte procurata, penitus cessarent. Veterum enim vero, quævis non negandum sit, sed inferius quoque allegatum invenitur, quod irregularis harum excretionum successus, & hinc enata cruoris refluatio, in iis præsertim ramis, qui intra tunicas intestinorum valde nervas sparguntur, sæpius causam passionis hypochondriacæ mediatam constituat: attamen sciendum est primum, hanc non solum, nec unicam

Subiecta
mali hypochondriaci

Sedes mali
hypochondriaci non
est in lienis

Sedes mali
hypochondriaci non
est in vena
portæ

undique esse causam; deinde morbi ac symptomatum sedem minime in ea querendam esse. Haud enim raro nulla in hypochondriacis adest ad fluxum hemorrhoidalem dispositio; & saepius cruor per venas fedales copiosissime profunditur, absque insequente mali levamine; uti attestantur observationes à RHODIO *Causar. II. obs. 93.* CLAUDINO *Consil. 89.* & MONTANO *Consil. 246. &c.* allegatae.

§. IX.

*Sed et passim
hypochondriacis
occurrit.*

Ut igitur nostram de fese motu hypochondriaci sententiam aperiamus; hanc in canale illo alimentari, membranaceo, ac valde nervoso, qui ventriculum, ac intestinorum volumen constituit, collocandam esse censuimus. Tubus hic ex quatuor potissimum tunicis constat, intima villosa, villis papillarum instar erectis, ac per vias praedita, altera nervea, tertia musciosa validiori, ex fibris partim longitudinalibus, siquae paucioribus, partim annularibus contexta; atque vasa sanguinea copiosissima continente, & extrema membranacea. Haec tunicas tres intercedunt contextus cellulosi; una inter villosam, & nerveam; altera inter hanc & musculosam, & ultima inter hanc & membranaceam; novissime tunica cellulosa *Roysebi* insignitam. Vi tunicae musculosae, ejusque fibrarum carnearum annularium, recessitae partes motu gaudent verniculari quodam, qui vocatur peristalticus, & in alternante earum, placida tamen contractione, ac relaxatione, à parte superiori ad inferiorem tendente consistit. In hujus motus vires naturalis, ac integritate magna profecto vis ad sanitatem conservandam latet: hujus enim beneficio ciborum digestio rite conficitur, secretio bilis ac pancreatici succi adjuvatur, chyli preparatio promoveatur, ejusque laudabilis, ac generosi propulsio in vasa lactea facilitatur, unde reliqui machinae nostrae designi sunt, atque spirituosus. Contra eodem hocce intestinorum motu, cruditates, & inertes fordes, non minus ac flantenti, aëri vapores, qui ex cibis digestis, ac laudabili succo privatis, relinquuntur, per canalem alimentarem propelluntur, ac per anum eliminantur. Idem porro earum partium tonus, si recte, ac secundum naturam sit habet, adjuvat, facilitatque sanguinis liberum & acquabilem circuitum; atque sic praecipuum constituit medium, quo functiones, quas natura intestinorum canali assignavit, rite possunt administrari.

§. X.

*Causa pro-
xima motu
hypochondriacis.*

His praemissis facilis jam erit, causam morbi nostri proximam, & symptomatum rationem explicare. Illam equidem in dicti motus peristaltici, quo ventriculus, & intestina gaudent, praeternaturali constitutione, & quidem tali potissimum; ubi ille partim, ac in uno loco defectus, atque destructus, partim, & in alio loco intensior, atque passim inversus i. e. ab inferioribus ad superiora tendens exsistit. Tales enī, & resolutio, & distensio spasmodica, simul praesentes in intestinis, sed diversis locis se invicem excipientes, genuinum mali hypochondriaci essentiam constituunt: & ad explicanda cuncta symptomata, clarissimum praebent fundamentum. Constituant haecce sententiam, praeter ipsam experientiam, doctissimorum virorum testimonio, quos inter ORTLOBIIUM, ETTMULLERUM, NEEDHAMIUM, WEDELIUM,

& CONRINGIUM *differt. de morbo hypoch. §. XI.* allegasse sufficiat. Tentemus igitur, an ex hac causa, severissimum molestiarum, quarum luxurians in hypochondriacis est progenies, rationalem suppediare queamus aetiologiam.

§. XI.

Proximum ergo vinati ac labefacti motus peristaltici confectarium est, digestio turbata, chylosificatio laesa, sursumque excrementitiarum impedita excretio. Hinc remanent in canale intestinorum, atque praesertim plicis & flexuris eorundem fese infinitae acidae, viscidulaeque cruditates; & status generantur copiosissimi. Quid inde? fontes ille mora diuturniori à naturali textura deficiunt, & acrimoniosius quandam contrahunt, qua nerveam intestinorum tunicam vellicant, & ad spasmodicas strictureas proritant. Stringitur itaque tubus ille in novemulis locis arctissime, ut nec status transmitat. Ergo, hi fluctuant in ea canali parte, quae à spasmus vacua est, eamque distendunt mirifice: & sic primum apparet ratio marmarum, borborum, ac molestissimarum inflationum. Porro status, inferius exire nesci, posito à spasmus obice, ad superiora magna compelluntur, & tum praesertim occupant colon, & de in ejus flexuris, quoniam est plenissimum, incarcerationem. Namque sciendum est, quod intestinum colon, praesertim, ubi sub costis spuriis in utroque hypochondrii flexuras format, & cum sacro reum adiposo cohaeret, media sui parte longe sit angustius: ibidem vero, maxime in sinistro latere à flatibus frequentissime, & violenter infarcitur, ac in tumorem elevatur, acutissime dolentem: quem falso lienis visio tribuitur. Continuantes spasmus, accedente inversa peristaltica, & invalente malo, halituosus illi vapores in ipsam penetrant ventriculi cavitatem, quam ultra modum distendunt, & anxiam inflationem sensibus conspicuum inducunt. Expansus praeterea naturam ventriculus, remoratorem liberum sepi transversi motum, atque descensum: unde fit angusta difficillique spiratio. Et quod pessimum est, stringuntur saepius vel sinistrum, vel utraque ventriculi ostia; atque sic in ejus cavitate vapores velut in carcere inclusi tentantur, parsuntque ineluctabiles praecordiorum anxietates, & dolores cardiacos; qui, uti remanent contractiones, & eructantur halitus, insigniter mitigantur.

§. XII.

Et haec est tristis tragedia, quam status, ob *Roysebi* destructionem ventriculi, ac intestinorum motum peristalticum, copiosius generat pariter ac exitu suo destinati ludunt, & quae à Graecis per *va madigmata* quondam exprimitur. Videndum jam est, quae mala pariant, cruditates, quae ex cibis assumtis, atque in ventriculo fermentatis, deficiente vegeta peristaltica, intra ventriculum, intestinum maxime duodenum, ac in plicis coli relinquuntur. Haec videlicet, ob diuturniorem moram, accedente praesertim in intestino duodeno, bilis ac succi pancreatici copia, corrumpuntur, accescunt, & pessimum inducunt acrimoniam. Inde vellicando causam lubrificantis spasmus, doloribus tendit, lancinatoriis, torminosis, ac rodentibus, qui ventriculi maxime regionem, & reliquum ventrem, circa umbilicum graviter adhaerunt; atque subinde perpetuum

etiam flammam generationi præbent fomitem. Ex
hæc porro fordibus, ædipatus avidior, nausæ,
cardialgia, vomendi conatus, ructus, & vomitus
acidissimi suam trahunt originem: atque,
cum sub quavis digestionē in vehementiorem
motum fermentativum rapiuntur, ratio patet,
cur hypochondriaci, fumis potissimum epulis,
peffime habeant. Et denique, cum ob tam contin-
uatum intestinorum flumulum, eorum spasmus,
cum flauteris diffusionibus reciprocantes subor-
iantur: luculentè patet, cur alvina excretio in
hypochondriacis sit tardior, quin sæpius, tam per-
tinax addictio, ut nec tenacioris halitus, multo
minus feces transire queant.

§. XIII.

Symptoms—acute or recurrent periorbital, conjunctival, and lacrimal gland swelling; periorbital pain.

Adhuc reflant ea incommoda recensenda, quæ in sanguinis motum, ex vitato motu peristaltico redundant. Quædammodum enim ex hoc naturaliter se habente, liber humorum ac æqualis per intestina circuitus conservatur: ita hoc è contrario destructo ac labefactato, circulatio quoque redditur tardior, ac inæqualis. Namque in uno intestinorum loco eff spissus, qui contrahit compressitque firmis vasa sanguifera: in altero loco flatus latera tunicarum distendunt, expandunt, & ita quoque graviter prementur adiacentia vascula. Eo vero magis retardatur sanguinis per venam hæmorrhoidalem regressus; cum illa furi prædita sit perpendiculi. Hinc palam laboriorum humorum stagnationes in tumoris intestinorum; quæ sicut ex allegata ratione symptomata flatulentis mali effe possunt; ita etiam ejusdem sapienter mediatum causam præbere solent; quædammodum ex infra dicendis clarius apparebit. Inprimis frequenter bilisum est, ut eror circa exitum intestini reddi cumuletur, & in tubercula, quæ cecac dicunt hæmorrhoides eleveur, quin sæpius vi perrumpat, & in fluxum hæmorrhoidalem, qui tum effi symptomaticus, definit. Ex diela non minus humorum stagnatione originem suam: petunt, excretionem sanguinearum per uterum atque ac venas sedales suffragientes, quæ, malo invalescente, nunquam non fiunt: immo ex eodem fundamento derivare licet rationem excretionum cruentarum, atque nigrarum, per mittum, vomitum & alvum; quæ præter naturam in hypochoëdriis, malo valde inveterato, contingere, fide dignæ attestaverunt observationes. De tali excretionem per vomitum, vide RIOLANUM, *anthropolog. Lib. II. cap. 2. ADR. SPIGELIUM Anatom. Lib. VI. cap. 5. per alvum. conf. SOLENANDRUM consil. 7. §ell. 3. pag. 121.* & urinam hypochoëdriis, interea rebidine tinctam isse vidit.

§. XIV.

Review Symposium
promulgation
Spafman's
et al.

Hæc in ipso intestinorum canale sunt; ex quo, malo invalenscens, gravissima symptomata, per totum corpus propagantur, omnesque turbant functiones. Fit hoc mediante consensu, quem omnes universi corporis nervi, nervosæque partes invicem possident; & cujus causa spasmi intestinorum, ad alias quoque propagantur remotiones regiones. Ubi vero stricture nervorum est specifica; ibi quoque circulus humorum fit inæqualis: hinc aspernet ratio, cur in passione hypochondriaci inveterata in toto corpore fiant spasmodicæ stricture, & tardior humorum circulatio. Sic primum in ipso abdomine, partes intestina vicinæ coarctantur: ob

vesicam, ejusque sphincterem male affectum, mingitur urinas tenues, dilutæ, aquosæ: ob membranas nervas, rentes involuentes graviter convulsas, tubosuntur dolores calculum mentientes: ipsam ad pectus devoluti ingentes illius constrictiones, cordis tremores, palpitationes inducunt; ad caput delati, varii generis dolores machinantur; & per corpus denique externum propagati, extremitatum frigoris, cerebrumque horripilationem sunt causæ.

€ XV.

Quum itaque in malo hypochondriaco generatur chylus crassus, ac impurus; ipsiusque per totum corpus grassantur, ac circulantur humorum fit inaequalitas, & denique salutares, quæ per alvum, cutem, ac urinam fiunt excretiones impediuntur: non fieri potest, quin succellere febribus humorum increfcat dyfcrasia, atque sic fiat malum hypochondriaco-ferbicitium. Quod si porro sanguineæ excretiones, quæ in sexu fequiori per uterum fiunt, suffaminantur, & ideo humores sanguinei vel feminales circa uterum, atque partes generationi infervientes stagnant, accedente præsertim libidino temperamento: tunc facillime cum hypochondriaci passionibus complicatur motus hysterici, & malum fit hypochondriaco-hystericum. Si denique crassi viscidique humores, vi gastrorum, qui in ventris partes occupant, ad superiores partes, atque caput majore copia compelluntur, & in cerebri vasis difficultus progrediuntur: detrahuntur etiam animales functiones, languescunt sensitives, vis memoriae ingenique lædatur, insignis est ad mores, diffidentiam, atque lacrymarum proclivitas; vana surgunt imagines, ac inanes ideæ: atque sic lentis tandem passibus appropinquat melancholia-hypochondriaca.

€ XVI.

His ample satis, atque copiose, prout rei necessitas postulat, deductis; deveniendum jam erit ad recensendum earum causarum, quæ malis hypochondriaci medicæ audiunt. Ex his præcipue, & suis frequenter se nobis offert, sanguinis, humorumque vitalium flagratio, intra tunicas intestinorum nervas & musculosas, quæ passim debetur cordæ tardiori per hepatis circulationi. Hepatis est vicus maxime vasculosus, & plures foret venas, quam quidem arterias: illarum binæ sunt, cava nimirum & portæ vena; & quæ fugit, quod posterior, a quo totum intestinorum volumen, Ventriculus, mesenterium, lien, pancreas, quin & uterus, nisi omnes, tamen per totos venosus ramos nutrantur, inverso quasi naturæ ordine, sanguinem ex his cunctis in venas visceribus refluxum accipiunt, & omne officio arteria funclura, pulsa tamen ac validiori impulsu destituit, intra hepatis vebat, ac effundit? Hinc ratio patet, quæ etiam in familiis statu, sanguinis per dictum hepatis viscos circulo, longe fit tardior, ac difficilior quam ejusdem per reliqua universi corporis viscera progressus. Quæ cum ita sint, non difficile erit cogniti, quæ in statu præternaturali, humorum per hepatis cursum primum omnium impediatur, atque retardetur. Quo retardato, ac difficiliori, necesse est, ut vi legum hydraulicarum, cruorurgat ex illa denus viscera, ex quibus antea ad hepatis iter fons direxit. Idcirco magis defendit vasa dictarum partium, maxime vero mæstrica, & intestinorum, quorum

molles tunicae non adeo fortiter possident resiliē-
tiam: & tali ratione ex impeditiori sanguinis per
hepar circuitu, ejusdem stagnatio in intestinis
suboritur, quae solidatur, fluidarumque partium
aequilibrium tollit, & tanquam mediata causa,
robur ac tonum motus peristaltici naturalem de-
struit; cujus destructi luxurians progenies fit pas-
sio hypochondriaca.

§. XVII.

*Selle an-
te hoc hy-
pocho-
ndriaci-
um.*

Hoc est fundamentum, ex quo ratio deprimi
poterit, cur ex malo hypochondriaco, in alias
morborum species tandem transmutatur, perem-
torum cadavera, ea offendant phaenomena, quae
partim ex vitioso humorum per abdomen circulo
eorsa sunt, partim hunc magis viciant. Sic
GUARINONIUS *conf.* 484. venas meleniterii
obstruētas, & adeo dilatatas in hypochondriaco
post mortem reperit, ut speciem intestinum
prae se tulerint. LUD. MERCATUS *Tom. III.*
Lib. I. Cap. 17. vasa melenica admodum va-
riosa invenit. BRUNNERUS *Cogit.* 7. in-
gentem sanguinis visciditatem in venis me-
lenicis deprehendit. Porro RHODIUS *Creat.*
II. obs. 76. colon adnotavit Kierhsium; WEL-
SCHIUS *disp. de malo hypochondriaco* observa-
vit colon torum à flatibus distentum, sub in-
sertione vero in intestinum rectum adeo contra-
ctum, ut cohaesce videretur. BLASIUS in
Comment. in Verlingium pag. 67. memoriae pro-
didit, quibusdam tamen viscus in immensam
elevatum fuisse magnitudinem. Pancreas ob-
structum fuisse, ipse quondam in viro cele-
bri, ex hypochondriaca passione desuncto vidi;
HIGHMORUS *disposit. anat.* *pag. 47.* nec
non HARDERUS *obs.* 59. *pag. 242.* illud
Kierhsium ac ulceratum observant; ut alia
auctorum monumenta silentio praetermittam.

§. XVIII.

*Causa re-
mota
sive ex-
ternam
supponen-
tem sup-
pressant.*

Iner causa vero remotior, quae ad tardio-
rem sanguinis per hepar progressum, & hinc
suboritur ejusdem intra ini ventris viscera, &
maxime intestina stagnationem, quam plurimum
coarctant, velut in locum obtinent, excre-
tionum sanguinearum, quoniam foemini per ute-
rum, in viris per venas haemorrhoidales, tan-
quam venae portae, intercedente ramo splenico,
solent, contingunt, immissiones atque sup-
pressiones. Sic cum ex observatione constet,
viros in juvenute largum à naribus cruorem
fundere solitos, si post haec aetate proveciori ha-
emorrhoidales putantur excretionem, quae tan-
tum non semper haereditariam supponit disposi-
tionem, & ad facilitandum sanguinis per abdo-
men & hepar circuitum, multum adfert momen-
tum; ea hujus irregulari succellu, aut plane sup-
pressionē, quacunque de causa facta, malum
incidere flatulentum. Namque cruor abundans,
cujus vires per hanc excretionem salutari pla-
ne consilio irminuta fuerat, hac cohibita, co-
piosius in abdomine cumulat, hinc, ob dictam
§. praeter. rationem, agrius per hepar circu-
litur, adeoque ad intestina tegurgitans, noxi-
simum subit stagnationem. Eodem modo res
se habet cum uterina in sexu sequiori purgatio-
ne; quae si imminuta, vel suppressa fuerit, cruor
accumulatur in arteria melaerica, exitum affe-
ctat per haemorrhoides, & hoc denegato, regur-
gitat ad intestina, cursumque humorum per ab-
domen sic reddit difficiliorem. Atque adeo in
sequiori sexu generatur saepius malum hypochon-

driacum, quod facillime cum hysterico compli-
catur, si simul sanguinis circa ipsum uterum con-
tingerit stagnatio. In hisce casibus, revocate ex-
cretionēs, si tempestive fiant, certissimum malū
hypochondriaci pollicentur sanationem.

§. XIX.

Verum quam plurimae adhuc dantur causae,
quae motum intestinum pervertunt, sicque pas-
sionem hypochondriaco-flatulentam ingenerare
valent. Inter eas praecipua debetur animadver-
sio haereditariae dispositioni, quae consistit in ea
partium nervosarum, maxime intestinum, per
nativitatem propagata constitutione debiliore, qua
illa ad suscipiendos motus irregulares existunt
facillima: ad quam etiam venarum exilitas, ac
laxus spongiosusque habitus, quo pollet hypo-
chondriaci, referri merentur. Hac proclivitas,
parentum vitio ad liberos protrahit, primum
plerumque, sicuti plurimorum morborum, ita
praesertim passionum hypochondriacarum, atque
fluoris quoque haemorrhoidales, praebet funda-
mentum. Sic patentes hypochondriaci tales
generant filios; atque mater, quae gestationis
tempore, hysterici motibus cruciata fuit, parit
infantes, qui aetate proveciores ex levissima cau-
sa, in flatulentam ac hypochondriacam delabuntur
passionem.

§. XX.

Neque vero paucae sunt earum rerum, quas
non naturales dicunt, quae ad generandum ma-
lum hypochondriacum aptae existunt. Ipse aer,
frigidus maxime, insignem hoc in casu obtinet
potentiam; dum externam corporis superficiem
constringendo, humores majori copia ad inte-
riora agit; qui, quo magis cumulatur, eo faci-
lius stagnationem subeunt. Humida aëris tem-
peries vi pollet fibrarum motricium tensionem
relaxandi; ex quo hanc ob causam, omnes
morbi, qui ex atonia sunt, & generantur, &
incrementa capiunt. Nocet praeterea frigus in-
testinorum canali, si vel abdomini liberalius ad-
mittatur, vel pedibus; quorum intiniorum cum
intestinis consensum, illud inter alia docet mo-
mentum, quo teneriores, si nudis pedibus stratis,
pavimentisque incedunt frigidioribus, mox
tormenta intestinum, atque flatulentias patiuntur:
quemadmodum FORESTUS *Lib. X. obs.*
10. de fratre suo refert. Hinc ratio patet, cur hy-
pochondriaci aetate longe melius habeant, quam
hieme; nec non cur in regionibus, quae ad septen-
trionem vergunt, multo frequentius sit ma-
lum, quam in us, quae sub coelo sereno ac tem-
peratiori sitae sunt.

§. XXI.

Praeter aërem, viscus quoque crassior, malo
hypochondriaco causam praebet antecedentem.
Cibi crudiores, acidi, flatulenti, legumina, ho-
raei fructus, lacticia, acetaria, pascifica, praeser-
tim recentia, & adhuc calidiora generant chy-
lum crassum, impurum, reliquunt in primis
vis multas fordes, atque motum intestinum
peristalticum insigniter pervertunt; praesertim si
vita ab omni corporis exercitatione vacua acce-
ssit. Nocent imprimis cibi, aut minus recte
masticati, aut ventriculo, à via superata mor-
bo, vel alia causa valde debili, julto avidius
ingurgitati. Ex hoc fundamento, BLANCAR-
DUS *P. 2. prax. cap. 61.* morbum hunc Frisii,
ob

ob pisorum, lacticionum & acetariorum abusu pronunciat familiarem; & SIMON PAULI in *quadripart. Botan. pag. 537.* recenset casum, de femina à pane, quem adhuc calentem, & vix è fornace extractum comederat, hypochondriaca. Potus duplici ratione malum illud flatulentum inducere valet; vel si largius ad crapulam usque assumatur, vel si frigidior calenti corpori ingurgietur. Posteriori casu presentissimum est malum; in priori diuturniori demum exercitio, tanquam dignum helionibus flagellum contrahitur. Peccat quoque potus, si assumatur parvus, aut nimis ilique aquosus, aut spissior, crassius ac foeculentus.

§. XXII.

*Vitiosus
vires.*

Frequentissime resultat malum hypochondriacum ex vita otio immerita, quæ unam sæpius nascentis morbi causam constituit. Quomodo enim frequens corporis exercitatio non modo solidam partium, musculorumque robur ac motum valde promovet, verum etiam humores reddi fluxiores: ita ex hujus intermissione languenti vires, fibrarum elaxi prostermitur, ac humores non vegete circumacti redduntur spissii. Hac vivendi ratio ad inducendum nostrum morbum eo fit opportunior, quo plures ac immo-deratior meditationes, lucubrationes, atque vigiliæ, studiorum causa diutius protrahæ accedant. Quodvis horum inmensorum insignem obinet potentiam, ad infringendum partium solidarum elatorem; maxime cum iis indulgentes, curæ, inflexioque corpore libris quasi incumbere solent; ac inter epulas veluti cum cibis literas devorare volunt. In hac causa situm est præcipuum fundamentum, quod formæ otio, & parco poni indulgentes, quodque vini, chartas impalescentes, ac inter libros sepulti, plerumque cruciuntur hypochondriaci pathematibus, quæ morbum litteratorum constituunt.

§. XXIII.

*Animi
vires.*

Nec negligenda sunt animi pathemata; ex quibus diuturnus moror, curæ, sollicitudines præcipuum in generando morbo flatulento hypochondriaco vim obtinent. Quanta enim ipsorum sit potentia, in destruendo partium solidarum robore, ac præsertim digestionem pervertenda; quotidiana docet experientia. Ex auctorum Medicorum observationibus, huc spectant binæ admodum notabiles; quarum unam HORSTIUS *Lib. IV. pag. 194.* allegat, de viro, quem diuturnus moror ob obitum filiorum fregerat, hypochondriaco, quin tandem melancholico facto; alteram recenset PECHLINUS *ibid. 31. pag. 71.* de viro, ex adversa fortuna adeo contristato, ut immanes flatulentes incideret affectiones. Inprimis hoc loco commemoranda est exitialis efficacia, quam venerarum cogitationum uberior provemus, & inde natales mutans immo dicimus, maxime præmaturum veneris exercitum, in debilitando intestinorum ac ventriculi robore exerunt: unde febrium morbum hypochondriacum sæpius vidi.

§. XXIV.

*Proprii
morbi.*

Frequentissime non minus hoc morbo constituntur, qui ex prægressis morbis, præsertim si incongruis medicamentibus, veluti adstringentibus, opiatis, narcoticis, improvide fuerint tra-

ctati, aut quæ ex difficiliore parte, male transacto puerperio, imbecilla retinere corpora: in hisce enim valde languidus est ventriculi, ac intestinorum tonus, qui ab errore diætetico, aut animi affectu graviore facillime prorsus destruitur. Tali ratione sæpissime mihi adnotare licuit, homines colicis torminosis, diarrhoeis, dysenteria correptos, & non remota materiali causa, crassius adstringentibus, tractatos, sensim in molestissimas flatulentas ac hypochondriacas incidisse affectiones. Idem malum à gonorrhoea, fluoreque albo, præmanare ac pessimo illo magisterio ac saccharo saturni cohibitis subortum, plus simplici vice adnotavi; ralemque casum CONSULT. ac RESPONSIS MEIS MEDIC. *Tom. II. Sect. III. cas. 99.* inferui. Ex quid est frequentius, quam ex febrium intermittentium inopportuna suppressione, aut improvido cortice Peruviano in ipsis, maxime si subiecta spissis humoribus prædicta, vita sedentaria addicta, spasmi que primarum viarum obnoxia fuerint, usque, hypochondriacum generari passivum: quam ex febre quartana subortum recenset HORSTIUS *Lib. X. obs. 28. pag. 189.* & ego ex tertiana natam haud raro vidi. Nec denique infrequens est, seminis ex difficili parte, ac male administrato puerperio evadere hypochondriacas. Et, ut uno verbo dicam, quicumque morbi, quæcunque curationes, & quæcunque causæ, motum ventriculi ac intestinorum peristalticum ledere valent, ac destruere, inter causas mali hypochondriaci summo juri collocari mereantur; ex quibus adhuc commemoranda sunt purgantia, ac fortiora emetica, repetito propinata: præsertim aloëica, & improvida, nimisque pitularum, quæ alogen sœvent, usus; quibus humores ad anum invitantur, exinque ob deficientem dispositionem denegato, ibidem stagnant.

§. XXV.

Supereft, ut paucis mali nostri flatulentis, differantiam ab aliis quibusdam morbis, ne cum iis confundatur, atque tum prognosin subnectamus. Quodnam discrimen hoc, & morbum hystericum intercedat, priori capite satis deduximus; diximus supra, in nostro malo internum simul esse motum intestinorum peristalticum: quæ inversio, cum adhuc quorundam morborum causa fit; videndum utique, quæ has intercedat differentia. Sic internum deprehendimus motum peristalticum in vomitu, & passione iliaca: sed in vomitu hæc inversio incipit à pyloro, aut fæsan intestino duodeno, & per ventericulum, atque gulam ad fauces usque propagatur; in iliaca vero passione vehementissimo ipsa, quin convulsiones motus universi canales intestinales ac ventriculi, à sphinctere usque ad orificium oesophagi invertitur, cum sublequenti demum vomitu stercoreo. Verum res aliter se habet in malo hypochondriaco: namque inversio motus illius vermicularis non nisi certa intestinorum loca occupat, & spæcia relinquit libera, quæ sedem præbent flatulentis vaporibus. Hinc adparet ratio murmurum, ac borborygmorem, sitis magno strepitu in abdomine circumactorum; atque fluxum per omnes abdominis oras, sursum, deorsumque, & ad latera ruentium, matutino potissimum tempore, vel etiam post graves mentis desatigationes, nullo intestinorum ventris crepitu, vel alvi deiectione siveientium. Scilicet mox certis in locis inclusi veluti,

*Mali
hypochondriaci
diff.
ferentia.*

1) A vomitu, & passione iliaca.

cessat.

vum ducere solent. His quoque remediis extra paroxysmum, alvi lubricitas conservanda, foridumque generatio praevidenda est, si per vices, & mox quovis octavo, mox quovis decimo quarto die, prout rei necessitas exigit, exhibeantur.

§. III.

*Que res-
dites
temperat.
& spasmus
solut.*

Soluta alvo, ea sit curationis intentio, ut fordes acidas, biliosaeque, quae in primis viis, praesertim duodeno hospitantur, corrigamus & attemperemus. Hoc scopo potitur beneficio pulverum absorbentium, praecipitantium, antispasmodicorum, simul leniter carminativorum; qui spasmos quoque demulcent, ac roborando intestina, flatus potenter evacuant. Tales ex lapidibus cancrorum, matre perlarum, pulvere Marchionis, nitro purificato, succino preparato, cinnabari, tartaro virgolato, arcano duplicato, tantilloque castorei &c. parari, & in aquis antispasmodicis, praesertim ea, quae ex floribus chamomillae cum cerevisia triticea debilitatur, propinari possunt. Longe vero efficacior eorumdem erit virtus, si cum ipsis viginti circiter guttulis liquoris nostri anodynii mineralis exhibeantur. Praeterea hoc quoque faciunt, & fordes impuras, quae in massa sanguinea obversantur, per diaphoresin ex corpore proficiunt infusa theiformia, matutino tempore in lecto fortillanda. Usitatissima, ex quibus illa componuntur, ingredientia, sunt herbae melissa, veronica, betonica, agrimonias, scordii, cardui benedicti, summitates millefolii, flores bellidii, chamomillae vulgaris, semen fœniculi, anisum stellatum &c.

§. IV.

*Que viis
venarum ab
digestione
rejuvantur.*

Ut porro ventriculus corroboretur, ejusque vis digestiva restituatur; in usum vocari possunt effluvia balsamica, ac leniter carminativa. Cavendum vero, ne nimis sint spirituosae, ac humores in organis vehementiores rapiant; uti ab aquis vitae, essentiaque stomachicis, quae vulgo adhiberi solent, certo est metuendum. Securius effectus existunt essentia cnicorum auranthorum bene preparata, tinctura tartari, spiritus nitri dulcis, vel elixiria ex herbis, ac radicibus balsamicis, cum mentis livivinis parata, quale est illud, quod in *notis ad Fœterium* descripsi, & meum viscerale stomachicum; cujus praecara in affectibus flatulentis & hypochondriacis virtus, à longo se jam commendavit tempore: sed notari meretur, horum usum debere esse diuturnum. Non minimam denique utilitatem in ipsis paroxysmis hypochondriacis exierunt, pediluvia temperata; quae humorum ciculo ad externas corporis partes invitando, relaxandisque imi ventris spasmus egregie vehiculant. Haec potari possunt ex sola aqua fluviatili, cum furfuribus triticeis, floribusque chamomillae; nec sint nimis fervida, sed temperate calida; quibus pedes paullo profundius immitti debent.

§. V.

*Tertia in-
dicatio
refrigerans
tertia in-
dicatio.*

His rite usurpatis, procul omni dubio cessabit ac imminuetur paroxysmorum vehementia. Quum autem illi facile revertantur, extra illos studendum est, ut juxta tertiam indicationem causae tollantur, stagnationes humorum discutiantur, viscerum obstructions referantur, humorumque circuitus per totum corpus reddatur aequalis. Hoc nomine felici curationi viam quasi

stemunt, eamque egregie fervant, sanguinis missiones per convenientes venae sectiones administrandae. Eas raro in superioribus corporis partibus instituere decet, ne tali ratione, motum humorum, qui per se ob stricture imi ventris ad superiora vergit, magis coarctemus. Apertissima est venarum in pede incisio, ex qua pro humorum quantitate, plus vel minus cruoris detrahi oportet. Commodissime tempore sanguis mittitur, vernali ac autumnali tempore circa aequinoctia; vel etiam necessitate exigente, circa solstitia, ubi solemnitatis tempore humorum commotiones. Eo felicius erit earum effectus, si brevi ante alvus blande ducatur, ac adhibitis pediluvii, humores ad inferiora deriventur. Praeterea, si adist dispositio ad haemorrhoidalem fluxum, ejusque suppressio malum foverit, singulo mense aliquot hirudines sub debita cautione, ano sunt admovendae: quo etiam casu, pilulae blande balsamicae per aliquot successive dies, cum pulvere antispasmodico nitro propinatae expedit.

§. VI.

Non vero ad referandas viscerum obstructions, acidos ac impuros humores attemperandos, excretionem per alvum, urinam & cutim, quin etiam sanguineas suppressas promovendas, & sanguinis circulum per totum corpus aequalem reddendam, ex toto remedium tam pharmaceuticum, quam dieteticorum apparatus, certius, praestantius, ac universalius est subsidium, quam quod ex prudenti aquarum mineralium usu recipere, benigna permittit natura. Circa earum potationem notari meretur, ne sit nimia, nec nimis diu protrahatur; quoniam tali ratione tonum ventriculi ac intestinorum magis labefactant, ac destruant. Corpus quoque probe est preparandum, adeo, ut primarum viarum fordes removeantur, humorumque nimia moles imminuatur: siquidem ipsi quoque potationis interponenda sunt blanda laxantia, & conjugenda corporis moderata exercitatio. Inter ipsas potius haece aquae selectus institui debet: foeminae enim, & qui corporis sunt laxi ac spongiosi, & spasmus immaniter divezzatur, magis prodentur thermæ, inque iis praesertim Carolinae, aut saltern, si aruerint acidulae, illae debent esse calefactae. Contra vero sanguineo-phlegmaticis ac torpidioribus magis profant acidulae Schwabacenses, Egranae, Pymontanae, & subjectis strictionibus, agiloniis, cholerici quoque proficiunt potius suae acidulae Selteranae, Spadanae, Tœrnfladenses ac Wildungenses.

§. VII.

Praeterea summum auxilium à recta vivendi ratione expectari debet: quae si negligatur, omnia reliqua curatio irrita erit, atque frustranea. Ex iis aer primum feligendus est purior, ac temperatior; evitando frigidum, humidum nebulosumque & minime in tali loco dormiendo: neque tamen propterea, metuendo aeris injurias, corpus penitus ab ejus liberioris usu prohibendum est, ne jussu fiat sensibilis, & ex quavis mutatione tempestatis, eaque levissima graviter laedatur. Praeprimis autem omne frigus, maxime boreale, praesertim à ventriculo, lumbis, ac pedibus sedulo arcendum est; upote à quo dictis partibus liberalius admissio, protinus inflatio ventriculi, dolor dorsi circa lumbarem regionem, & intestinorum tormina recondescunt. Porro ciborum sit rectus ac modicus usus; ex illa enim,

*Præstat
ferre hoc
sine pro-
fuit a-
quo con-
sistit si-
tem est.*

*Videtur
est.*

erim, primis officinis, à faburra, acri, biliosa repletis, nutrientia quoque sunt nocentissima; quoniam juxta HIPPOCRATIS effatum, *Sect. II. aph. 10.* impura corpora, quo magis nutritur, eo magis laesit. Ceterum ab omnibus acidis, salis, flatulentis, oleosis, panificis, pomis, simlagineis, calidioribus, aromatatis &c. probe abstinentum; nec gula nimium, maxime in coena, indulgendum est. Namque temperantia ab illecebris viciis summum est morborum chronicorum remedium; quemadmodum rectissime veteres Medicorum docuerunt, & CAR. PISO *tr. de morbis à ferofa colluvie pag. 241.* praeclare docet.

§. VIII.

Corcor-
nem po-
rit.

Magna praesertim efficacia in recto potus genere sita est. Onerat ventriculum, eique insensibile omnis fere cerevisia; omneque potus spirituosus, ac calidiores deprehenduntur noxiosissimi. Vinum vetus generosum Rhenanum, vel Burgundiacum bonae notae cum aqua dilutum, periclitissima quantitate sub epulis concedatur, ad roborandum stomachum; reliquo vero tempore invicem potus ordinarii seligendi debent aut acidulae Selteranae vino nuptae: aut hoc nomine praestantissimi usus sunt decocta, frigide potanda; quae ex radice scorzonerae, cichorei, chinae, farfaparrillae, rasura cornu cervi, vel eboris, radice glycyrrhizae, herbae cardui benedicti &c. parantur: quibus cortices citri, vel aurantium addi debent. Subiectis sanguineo-cholericis, si tulerit ventriculum, conferat sola aqua pura simplex, quae sanguinis organum egregie quoque deprimat.

§. IX.

Motu cor-
poris.

Omnia remedium genera in allevando malo hypochondriaco, longissime superat motus corporis; qui nunquam à reliqua curatione excludendus est. Hoc enim sanguinis & humorum circulus, atque cum eo transpiratio saluberrima, & universum se- &c excretionum negotium promovetur, humores redduntur fluxiores, eorumque transitus per hepatis insigniter facilitatur; ventriculi & intestinorum motus, cum digestionis egregie adjuvantur. Instituitur autem illud oportet moderate, atque tum praecipue, ubi digestio absoluta, ac ventriculus à cibis vacuus est; vel equitabone, vel unctione in rheda, vel obambulatione. Ceterum animi pathemata, non minus, ac multo magis remedium farago, cane pejus & angue vitari debent. Et in hac commendata victus ratione, si alvi simul libertas conservetur, ac flatu repetantur venae sectiones, non modo curandi rectissima via, verum etiam felicissima methodus praeservatoria sita est.

§. X.

Exacer-
tae explet
quoniam
indicatio-
nem.

Verum mitigata sic mali hypochondriaci symptomatibus, remotis causis, liberisque omnium exercitium vis; ad praecavendas recidivas, roboratio de primarum viarum, & totius nervosi systematis adgredienda est. Tum vero, praeter continuatum citius supra memorati ballastici visceralis, utrum, & observatam rectam victus rationem, locum habent, & praestantissima sunt martialia; quae stringenda leniter debilitatas fibras, primum robor illis restitunt. Haec optime in forma liquida offeruntur, uti est tinctura martis tantulata Zoodyseri, Ludovici; vel etiam linatura vel crocus martis in ulveribus commo-

de exhibetur, qualis parari potest ex facula radicis ari, lapidibus cancorum, succino, cinnabari, arcano duplicato, & croco martis aperitivo, additis olei ligni assafrae aliquot guttulis. Non minus insignem utilitatem praestabit cortex caecarillae & chinae, inter pulveres mox recensitos; potest etiam alius ex radice pimpinellae, ari, cort. caecarillae, aurant. succino, macis, semine cymati, sale absinthii, parari, qui blanda balsamica virtute roborat ventriculum, & intestina, digestionem adjuvat, & cruditatem impedit preventum. Nec denique parum emolumenti sperare licet à balneis externis martialibus, veluti sunt Lauchladiensis, Freyenwaldensis, ac Tœplitzensis, potationi Carolinarum subjugenda, quippe quae totum corpus mirifice confortant.

§. XI.

Nec denique silentio sunt praetermittenda externa remedia: quae in molesto inflationibus intestinorum magnam vim praestant. Haec inter multiplici edoctus experientia, commendare possum emplastrum saponatum *Barbette* camphoratum, aut antispasmodicum *Hieronymi ab Aquapendente*, ad hypochondria applicatum. Non minus praeciarum operae faciet pretium, balsamum meum vitæ, cum binis aquae Hungaricae partibus commixtum; quod bis quotidie, mane pariter ac vespere ventriculo & hypochondriis est inungendum.

CAUTELAE, ET MONITA PRACTICA.

§. I.

Nullus est morbus, qui majorem aegrotanti pariter ac medenti figit crucem, quam quidem noster hypochondriaco-flatulentus; siquae saepenumero utriusque culpa, ut ipsius curatio vel diutissima sit, vel plane reddatur frustranea. Aegri enim varietate Medicorum pariter ac medicamentorum delectantur, ut opus haud raro sit, eos commone-
*Cur mor-
bus hypo-
chondri-
cae fere se
inmodum
velit.*

§. II.

Ex horum numero primum se offerunt vomitoria; quibus nonnunquam aegri, vel sibimet ipsi sapientes, vel saepius Medicorum fusu, sibimet consulere volunt, maxime, si ingentibus praecordiorum anxietatibus, ventriculi inflationibus, nausea molestissimis, vomendi conatibus, obftructione ac constrictione hypochondriorum tanta, ut veluti fune compressa, vel pondere quodam infarsa videantur, atque eructationibus atrociter consistantur. Neque negandum est, quoniam in tali rerum statu ex leni emetico aliquid suorum symptomatum levamen perferant. At vellem, ut à fortioribus stimulantibus prorsus abstinere; solamen enim, quod adferunt, brevissimum est, & post se trahunt graviora symptomata. Interim non penitus prohibere licet lenissima vomitoria, ex radice specacanthae ac lapidibus cancorum remittente: nec reformidandi sunt illi vomitus, qui hypochondriacis saepe-

sæpe penultimo sub initio potationis (pafino data ther-
ma penultimo Carolinarum eveniunt; continuo enim
potu, & evacuato ex fundo duodeni mucro spon-
te cessat, & æquum operatio melior succedit.

§. III.

*Caute-
riva par-
gavia de
Linnæo.*

Quum porro Medico nihil magis curæ con-
digne esse debeat, quam ut alvum conservet lu-
bricam; caveat, ne acrimoniam fortiorumque pur-
gantium, scammoniorum, jalapinorum &c.
usu olcum camino addat. Illa enim intestina ad
graves immunesque prestant spasmus, humores
valde commovet, & majorem relinquit atoni-
am, ac contumaciores adstrictionem. Tene-
rosiores, ac sensibiles nec salia media magna
dosi tolerant; usque magis conferunt alimenta
lubrificantia, clysteres, mannata ac rhabarbarina.
Nec pilule illæ polychrestæ, balsamicæ, quæ
alio foveat, omnibus subjectis, nec nimis cre-
bro usu conveniunt; maxime ubi naturalis ad fluxum
hæmorrhoidalem deest dispositio, nec im-
minuta humorum abundantia; stimulant enim
ad intestinum rectum, vasculque conatus, & per-
tinaciam flagrantem æque ac siccitatem cau-
santur. Contra ubi suppreffus hæmorrhoidum vel
medius fluxus malum fovet, præstantis sunt usus,
si singulo mense per aliquot successive dies exhi-
beantur: nec alienum erit, illis, si humorum or-
gasmodum excitare videantur, pulverem nitroso-
precipitantem admiscere. In quibusdam, quo-
rum prene viæ alidius foveat cruditates acidas,
sepenumero soli cancerum lapides, aut conchæ
preparatæ, alvum movent egregie: dum nien-
tum cum acido ventriculi coeunt, sal constitu-
tum medium amaricans, quod leni stimulo in-
testina ad rejectionem sordium excitat: saltem
meliori cum fructu, quam ipsa magnesia, ad-
hibentur; quæ absente aciditate, vellicat ven-
triculum & intestina.

§. IV.

*Circa
mucosa
Cecypar.*

Quidam occurrunt hypochondriacorum, qui-
bus n. annata remedia hypoch. & adalugent fla-
tulentiam; aut etiam vomendi conatus, nausea,
ac vomitus concitant. Tali in casu ab iis abstin-
ere decet, & vel rhabarbarinis, vel clysteribus
succurrendum. Nec pauca inter formicas præ-
sertim reperitur, quibus clysteres molestias
creant: tum vero illos cum larga oleorum quan-
titate componere juvat, & aliquoties iterare,
conjunctis oretenis iis, quæ cuiusque pro con-
stitutionis varietate proficua videantur.

§. V.

*Circa op-
ne frictu-
rum.*

Venz sectio prudenter administrata, sicuti
præstantissimi in hypochondriaca passione usus
est: ita hæc ipsa nihil deprehendit perniciosius,
ubi inopportuno tempore locoque infirmatur.
Falsum enim est, ac inconveniens, illam nimis
crebro ob suppositum undique sanguinis spissitu-
dinem celebrare velle. Sic quidam, qui nimium
virium jacturam patiuntur, ex iusto copiosiori
sanguinis missione, in majorem incidunt debili-
tatem. Contra quorum vasa sanguine turgent,
aut ubi plane sanguine excretionem suppreffe
sunt, iis omnino largiores profunt venæ sectio-
nes; neque vero, quod probe observari meretur,
nisi certis casibus in brachiis infirmis debent. Eo
præsertim tempore ab omni refrigeratione, ac
victu crassiori cavere expediet; & mentis tran-
quillitati sedulo studere; ne scilicet ab aere frigi-
diori salutaris cohibeat perpiratione, aut victu

Frid. Hoffmanni Oper. Tom. III.

crassiori cruditates in primis vis generentur.

§. VI.

Magna quoque in admoventis hircidibus *Circa hi-*
opus est cautio; ubi enim nulla existit ad hæ-
morrhoidalem excretionem proclivitas, aut illa
fiat symptomaticæ, tantum abest, ut illam ap-
positis hircidibus promoveri liceat, ut potius
motum humorum in iis locis derivare ac revel-
lere oporteat. Verum si cruenta per anum eva-
cuatio præsto fuerit, & cohibita exitum afflicte,
& dolores in offe sacro, ac intestino recto ur-
geant; aut ubi colica torminosa hæmorrhoidalis
adfligit, saluberrimus sanguifugaturus est usus.
Sæpius autem necesse est, ut præmittatur univer-
salis humorum per venæ sectionem inanitio: nec
vana est opera, si loca hæmorrhoidalia foribus
demulceantur, atque tum eo, quo natura erup-
tionem hæmorrhoidalem molitur, tempore se-
lectæ hircidines adponantur.

§. VII.

Circa motum corporis, ut desideratam præ-
stet opem, notandum est; quod sub aere sereno,
ac amico insiliat debeat, ne ab externo frigore
plus damni contrahamus, quam ab exercitatio-
ne emolumentum speramus. Neque sit impetu-
sus, sed moderatus, per gradus continuus,
ad lenem usque corporis incalcescentiam; & pro-
be discipiendum, ut tum moles humorum sit
imminuta, ac alvus aperta, ne sanguis nimium
exauctet. Nunquam fiat statim à passu; id
quod inprimis de equitatione ac veltione te-
nendum est; quoniam his succussionibus flau-
lentæ exacerbantur molestiæ. Commodissimum
tempus est vel matutinum, haussis antea aliquot
insuli calidioris vasculis, vel vespertinum, si di-
gestio fuerit absoluta.

§. VIII.

De potu nihil absolute certi determinari po-
test; sed quilibet explorare debet, qualis sita sit
proficiat. Quidam ex cerevisia leviori secu-
daria optime habent; neque ideo ab ejus usu
prohibendi sunt. Nonnullis aqua pura frigida,
vel sola, vel cum cinnamomo decocta ingens-
tem præstat utilitatem: hinc nec dissuadenda est.
Ubi concurre scorbatica humorum diathesis,
repurgatis primis regionibus, non modo serum
lactis, si tulerit ventriculus, insigniter confert,
verum etiam ipsum lac cum aciculis Seheranis
commixtum loco curæ adhiberi potest. De aci-
culis adhuc notandum probe est, quod in iis,
qui spasmi vehementioribus agitantur, aut car-
dialgia gravi laborant, minime potari debent
frigida; quoniam frigus nervis est valde infen-
sum: præstat tali in casu vel thermis, vel aci-
culis tepidissimis uti. Inter vina denique cuncta
acida, veluti Rhenanum ac Mosellanum recentia
aciditatem ventriculi augment: contra vero
moderatus veteris Rhenani, aut Burgundiaci,
quod bonæ notæ est, aqua diluti usus concedi
potest.

§. IX.

Quia nunquam fere non corrupta phantasia
huc iævo morbi generi conjungitur, & non po-
rari ejus concusationem augeat; proficiendum
est, ut omnis præclindatur occasio, quæ animum
turbare queat. Principem hac ratione locum
obtinent animi pathemata; quæ nisi tempe-
rentur, omnem reliquam curationem reddent
frustra.

*Animi pa-
themata,
ac labo-
rum curia
habenda.*

G

frustraneum. Deinceps fuscendum est confortium amonum, & quacunq; fieri possit ratione, recreandus est animus. Quare etiam triplici modo hypochondriacos solentur itinera ad thermas potissimum, aut acidulas instituta; dum nimis exercitiorum corporis, mutationi aëris, gratique confortis occasum præbent, & ipsa sui virtute corporis vicis opitulantur. E contrario dissuadendæ admodum sunt lubricationes, ac meditationes nimis, quæ præcipuis sub passu, & brevi ab eo fiunt; quoniam certe experientia constat, digestionem ciborum à mentis diuturnis fatigationibus maximopere profleri. Litteratis vero, qui penitus à mentis laboribus sibi temperare vi muneris haud possunt, præter motum corporis, ad præpediendum statum ac trudituram generationem, non præstantius ulla medicina fert auxilium, quam elixirum nostrum balsamicum, in *notæ ad Posteriorum Cent. II. Cap. 39.* descriptum vel temperatum nostrum viscerales.

§. X.

*Quid sit
crisidum,
si malum
ab aliis an-
geritis.*

Quando melancholia passioni hypochondriacæ supervenerit, ita ut furibundi etiam immanent impetus, quod non raro evenit: tunc non præstantius, neque certius auxilium est, quam balnea temperate calida, ex aqua dulci paranda. Quomodo enim horum affectuum melancholico-maniacorum fundamentum, in corporis exterioris ac interioris spasmodica constrictione, humorumque impetuosiore ad caput rapu, ostilissimum, situm est: ita in spasmi relaxandis & aequali humorum circulo restituendo, nihil superat vim dictorum balnearum. Coniungere etiam juvabit potum acidularum, & sanguinis missiōnem tam è pedibus, quam subinde ex naribus instituere.

§. XI.

*Crisis
circa mor-
balem.*

Magnæ famæ, laudisque in morbis hypochondriacis sunt martialia remedia: quæ vero sicuti justè adhibita magnam utilitatem inferunt; ita nulla temporis, ac reliquarum circumstantiarum ratione habita, noxam pariant certissimam. Quod si enim spasmus adhuc urgeat ferocia, viscum præstio sit obstructio, alvi segnities, humorum abundantia, primarumque viarum cruditates resistent; abstinendum ab eorum immoderato usu; quoniam tunc facilis est in cachexiam transitus. Verum quando remiserunt spasmi, moles sanguinis immixta fuit, tunc excretiones liberiores efficiendo, singularem pollicentur efficaciam; sed cum sufficienti liquidorum diluentium copia offerri, simulque corporis exercitatio imperari debet. Quibus deest occasio acidulas utendi; his proderunt juscula, ex radicibus apertioribus cum tinctura maris *Zwelferi*, vel cydoniata, vel pomata commixta, Julia dosi & crebro usurpata.

ENARRATIONES MORBORUM.

OBSERVATIO I.

*Pulsus hy-
pochon-
driaci in
supposita
febre ter-
tiana.*

Vir XXXVI. annorum, annuo abhinc tempore incidit in febrem tertianam, quæ usque corticis chinæ subtilata quidem, sed decimo quarto die reversa, quinque hanc scenam lustr, ita, ut semper dicto die recideret, semperque dicto remedio suppresseretur. Tum excepit dolor dextri hypochondrii circa costas spurias, ad sinistram quoque latius excurrens; nec remittebat

post varia remedia, etiam martialia, ipsi propinata. Accedebant potius cordis palpitatio, spirandi difficultas, inclinatio ad vomitum, maxime post iram, à qua semper pessime habebat; jangebantur porro æstus, vertigo, gravitas in capite, visus obscuratio, præsertim in dextro oculo, qui quasi humore lento obfusus conspicitur, & obversantes cernit imagines. Præterea nares sanguinem quandoque stillant; dolor vehementer cum frigoris sensu, lumbos, spinamque dorsalem vexat; flatusculis plenum abdomen, quarum excretio malo infert egregium levamen: non minus artus, pedes manulque vagis tormentis distrahuntur; saliva est viscosa, ac salia; & urina, quæ remittente paroxyfmo turbida mingitur cum sedimento, lux ejus vehementer feritur alba, tenuis, & clara. Mox tandem curæ se commisit æger; cui dedi pilulas meas balsamicas, bis quavis septimana sumendas; & sub epulis propinavi essentiam corticum aurantium, cum elixiro nostro viscerali mixtum, ad quinquaginta guttas capiendum. Mane potari jussi infusum theiforme ex summatibus nullefolii, floribus chamæmel, aniso stellato, corticibus aurantium, & ligno sassafras confectum; vesperi circa solni tempus ordinavi pediluvia, & crebrius corporis per equitationes motum. Paroxyfmo invalescente exhibui pulverem nitro-temporantem; hiique medicinis effectum est, ut æger præsentissimum solamen invenir.

Epiçrisi.

Egregia sunt, quæ ex hac morbi historia in usum medicum trahi possunt, momenta; 1) Febres intermittentes, etiam tertianæ, male tractatæ, & inopportune per adstringentia, corticemque Peruvianum suppressæ, post se trahunt malum hypochondriacum spasticum-flatusculum. In hac fibris enim, ob scemam quandam acrem, acidum, biliosum, in duodeno hærentem, jam præstio sunt irregulares parvum nervosorum, maxime ventriculi ac intestinorum, motiones. Quando vero, non sumota quæ peccat materia, adstringentes propinquantur medicinae, augentur spasmi, noxia saburra, altius ac firmius in viscera, ac plicas intestinorum impingitur; humorum circulus fit irregularis, hique stagnantes stultissimo-spasmodicum inducunt malum.

2) Data improvide sub morbi initio, nec liberis excretionum vis, nec eliminata adhuc primarum viarum saburra, martialia, a laxantibus magis partium inferiorum & abdominis spasmos. Hinc succi vitales, majori copia ad partes superiores, pectus atque caput compulsi, irritando nervorum genus, cordis palpitaciones, anxietatem, spirandique difficultatem, in capite vertiginem, capitis dolorem, obubilationem oculorum, ac cruoris è naribus stillicidium produxerunt.

3) Spasmi hypochondriaci, si fuerint recentes, convenienti medicina funditus, brevique tempore expugnari possunt; si nimirum alvum moliamur, status discutiamus, æqualem humorum circulum, & salubres excretiones prouoveamus, ac robur intestinorum, nervosque generis confortemus. Contra vero si hæc mala, temporis vetustate, in habebat transissent; difficilius omnino ac diuturniori opus est medicatione, quæ vix alia via ac decretis aquarum mineralium tam interno quam externo per balnea usu obtineri poterit.

OBSER-

OBSERVATIO II.

Pelle hypochondriaci ex grece tradita.

Generosus vir, annorum xxx. temperatae sanguineus, habitusque corporis spongiosus, in aula multis corporis amicumque fatigationibus aduersus, animi hilarioris, & ad melancholiam nunquam vergentis, & haec lenitate illibata gavisus, incidit aliquando in gravem terrorem; dum scilicet sub venatione, repente ex equo lapsus, vehementerque in nucha ac scapulis dolore affectus, sibi persuadebat exitalem capiti vel cervici illatam esse lesionem. At postquam ad se rediit, seque ab omni labe immunem sensit; venando continuavit sub aere frigidiore, atque redux, vino calidiori Rhenano copiosius indulsit. Ab eo tempore male habere coepit, & his potissimum angebat molestis: languor totum corpus occupat; alvus pertinaciter obstruita, & abdomen continuis flatibus, ructibusque plenum est, vexant vertigo, dolor capitis gravatus, somnus inquietus, anxiosus turbatus infans; animus perpetuo angore afficitur; insignis praecordiorum urget anxietas; mane pleniusque, post nauseam, ex ore eructatur lymphae acidulatae, dentes stupeficientia; & urina mingitur mox dura, mox saturata. Adhibuit multos Medicos, insignemque remediorum hausit farraginem; sumit purgantia, martialia sicca purior ac liquida, quin thermas quoque potavit & acidulas: neque tamen minus in dies exacerbarant symptomata, & ultra annum jam inhaeruerunt. Tandem nostram imploravit opem; & cum ipsum nimia humorum mole abundare viderem, primum venam in pede curavi secandam; tum crebra commendavi pedilavia; mane potandum dedit insulsum aliquod theiforme; & sub epulis essentiam corticum aurantium, & vesperi pulverem praecipitantem. Non minus bis quavis hebdomade propinavi pilulas ballanicas; & omnem aliorum remediorum usum interdixi; quibus factum est, ut ad pristinam rediret sanitatem.

Epietisi.

Dicimus ex hoc casu, quod homines rectissime valentes, sanguine ac valde hilari temperamenti, sine ulla praecedente viscerum labe aut obstruptione, aut sanguinis excretionis suppressione, ex solo vehementi terrore, & gravioribus diuturnioribus, in malum hypochondriaco-flautulentum repente possint incidere. Nota mihi sunt plura ejusmodi exempla, ubi homines ex sanis vegetisque protinus facti fuerant hypochondriaci; ob nullam aliam causam, quam si post sumpta fortiora purgantia frigidum potum hausissent, animi affectibus indulserunt, aut vino facti frigido aeri corpus commiserunt; aut ab hoc crapulis se polluerunt. Horum enim momentum, maxime si plura simul compliceantur, tanta est efficacia, ut unita vi nervorum genus, & maxime delicatissimas ventriculi ac intestinorum tunicas, insigniter laedere, earumque robur destruerent valeant. Tunc affectus dici meretur idiopathicus; ubi morbus, salvis humoribus pariter ac visceribus, protinus à vitio canalium alimentaris incipit; qui congruis medicaminibus sub initio facile expugnari, & in prima veluti herba suffocari potest. At postquam invaluit, atque labe ad solida & fluidas partes propagata fuit; quorum purgantia, martialia, in-temperative data, aquae minerales, non habita

Frid. Hoffmanni Oper. Tom. III.

OBSERVATIO III.

Vir nobilis, xxxii. annos natus, temperamenti sanguineo-phlegmatici, carnis spongiosae, ac laxioris, tenerimae, & sub delicato vivendi genere educatus, alvi expeditoris, omniumque experti morborum, elapso abhinc anno, per aliquot hebdomades strenuis interfuit computationibus, multumque vini acidi Francici ingurgitavit. Hinc alvi corruptior profusio, quod dati à Medico pulveres opiani, quorum viginti quatuor, quavis hora unum capiendo, sumerat, mitigant quidem, non vero penitus suppresserunt. Incidit potius in molestias hypochondriacas; quae ingentibus praecordiorum anxietatibus, pathematibus imi ventris spasmoticis, & flatulentis, borborygmis, inflationibus, mala digestionem, virium languore, somno inquieto, animique perturbationibus, interdum deliris sese exerebant. Consulti sunt plures Medici, qui omnes hypochondriacam passionem accusantes, mox narialibus, & calidioribus stomachicis; mox volatilibus ac aromaticis illam oppugnaverunt. Sed irrita erat omnis opera; continuabat alvi fluxus, horrendis spasmus doloribus, & dijectionis paucis mucos, animum corroderent permixta, quosque, vel plures quotidie urgebant, conjunctis ructibus acidulissimis, & fere corrosivis. Insistebat insuper tormina intestinorum flatulenta, explosis per anum halitibus paulisper allevata: & hac scena per binos luctuatos annos. Secuta fuit in pede vena; date pilulae Becheronae, cum siliis aperitis, & absorbentibus; potae quoque acidulae Schwalbacenses: sed malum eludebat cuncta; nisi quod à novissime dictis acidulis, aliquale, at non diu durans, levamen perceperit. Sumebat potius majora incrementa; vivebat quidem alpeius, sed cibi indigesti egeruntur; atque mane pariter ac peracta concoctione post insignem anxietatem, phlogosin, & extremorum refrigerationem, lymphae istarum aquae fortis corrosiva eructatur: oris est assidua siccitas, bibendique desiderium: & notabile est, quod interdum circa vesperam, ubi externa frigent, calor & sudor in dorso observatur. Ceterum scire licet, quod ab usu martialium pessime habueris; tantum enim exinde sperandi incidit difficultatem, cum extremorum frigore, ut sapius suffocari videretur. Postquam se tandem nostrae tradiderat cure, amor, ob insignem qui adparebat ibidem tumorem, hirudines applicari iussimus; tum sub epulis dedimus elixir nostrum viscerales; peracta digestionem tumendum suum pulverem praecipitantem, cum cortice castanillae, ossibusque seipae coactum. Propinavimus insuper insulsum theiforme, mane torbendum; decoctumque conveniens pro potu ordinario; & alteris diebus pilulas antispasmodicas, ex extractis florum millefolii, chamomillae, sagapaeae, opopanaeae, nymphae, croci, castoreo paratas exhibuimus. Horum usus, adjunctis recta victus ratione, fontiumque Schwalbacensium potatione, cum per aliquod tempus insisteret apert, divina fuisse gratia insigni mali hujus allevamentum, est expertus.

Hypochondriaci passio à diarrhoea opo-

Epicrisis.

Hoc morbi genus, quod est hypochondriacum cum histeria mixtum, destructum ventriculi ac intestinorum tonum, pro vera ac proxima agnoscit causa. Destructio autem illa primas origines traxit à nimia vini Franconici acidi positione; & subinde per copiosa ac improvide data opiate majora fuenit incrementa. Omnia vero hæc non obstitissent, quo minus convenienti medicatione malum adhuc recens facillime debellari potuisset: at quum varia, eoque incongrua palli remedia, maxime martialia, nimia quantitate fuerint usurpata, non potuit omnino æger cum morbo in gratiam redire. In cura, quum nimium debilitatus esset, nullam venæ sectionem insistentem curavi; at, ut humores ob summam intestinorum atoniam in his flagnantes imminerem, & tubercula hæmorrhoidalia, quæ fiebant symptomatica, discuterem, iussi sanguisugæ adponi; atque tum præcipuam medendi curationem, ad robur intestinæ ac nervosæ generi restituendum direxi. Docet quoque hæc morbi historia, quod ex sola motus peristaltici intestinalis per causas externas facta destructio hoc malum fieri possit; cum multi nostri temporis filii perissuam habere, sanguinem in venis mæstricis & vena portæ spissum flagnantem, & qui non exitum habet per venas hæmorrhoidales, unam esse hujus affectus causam; sed, quod sæpius animadverti, conatus ad hæmorrhoidalem fluxum & difficilior sanguinis per hepæ transitus pervertitum intestinorum motum peristalticum demum subsequitur.

OBSERVATIO IV.

Hypochondriacus affectus ex febre acuta ter continuata.

Judeus quinquagenarius, temperamenti melancholici, elapsis jam quatuordecim annis, febre acuta, ter in uno anno recedente, confectus, largissimo ferre diffusum sudore. Unde non modo omnium virum insignem passus est jacuriam; verum inde in magnam ventriculi ac intestinorum incidit debilitatem. Namque ab eo tempore gravia imi venarum tormenta, atroces sub costis spuriis in dextro latere dolores, crebram vertiginem, animi desolationem, visus obnubilationem, anxietatem præcordiorum, tremores & palitationem cordis, alivque significationem pati cepit; quæ, accedente ob obitum filii gravissimo morore, magis invalescebant symptomata, mentisque angore, ac turbata phantasia slipabantur: atque demum cæcæ jungebantur hæmorrhoides. Contra hæc mala descendebat in balnea frigida; sed quum ex his contumaci afficeretur friguitu; ad usum acidularum Schwalbacensium confugibat; ut reliqua, quibus usus est, medicamina silentio prætermittam. Quæ cuncta, quoniam haud respondebant voci; neam tandem requisivit opem. Omnis ergo cura fuit, ut universam sanguinis & humorum massam emendarem, chyloque blandam conciliarem spiritusæscionem; atque hanc ob causam tonum ventriculi confortarem. Et huic scopo non inveni præstantius medicamen, quam elixir meum viscerale balsamicum; sed, quod probe nosandum, diutissime adhibitum. Præterea vero exactam dietæ, renuncque non naturalium observationem imperavi; & ob acrimoniam primarum viarum lapides cancerorum cum aliis præcipitantibus mixtos dedi; alio prorsus paluis balsamicis, sanguinis molem per venæ sectiones immu-

nui; exercitationem injunxi, & denique thermarum internum pariter ac externum commendavi usum. Quibus cum diu, patienterque uteretur æger, bene valuit.

Epicrisis.

Præsens morbus ex tono ventriculi & intestinorum, totiusque navos generis, per febrem acutam, ter recedentem, copiosius sudoribus slipatam, destructio suam traxit originem. Namque per hanc febrem non modo solidae partes nimis debilitate fuerunt; verum per copiosius sudores fluidior & spirituosus pars sanguinis deperdita, & reliquus cruor spissior redditus fuit. Inde nō languidiorem intestinorum tonum & motum digestio vitiata, alvi excretio turbata, ac sanguinis per hepæ circuitus tardior effi factus; quæ vitia, quia non tempestive fuerunt oppugnata, majora sensim ceperunt incrementa, & ob inæqualem per universum corpus humorum cursum, ipsam & distractiones ad omnes fere partes nervosas sunt propagavæ. Inprimis hæmorrhoides cæcæ, quæ tandem supererunt, non nisi pro symptomatice, & ex flagratione sanguinis in extremis vasculis propulsi sunt declarandæ; neque adeo ad eas promovendas hirudines conveniunt. Neque etiam mirum est, quod ex balneis ac acidulis frigide, spissis nonnullis consopitis, nec præparato antea corpore, potis invaluerint symptomata, & præsertim singulis accessit: omne enim frigus nervis est insensum, & spasmodicas affectiones insigniter auget. Contra, ubi vehementia mali congruis medicinis mitigata, ac corpus præbe præparatum; eadem acidulæ, quæ antea nocuerunt, præstantissimum tulerunt levamen. Neque ego, quod bonæ fide testari possum, in hoc longo & pertinaci malo vel miungendo vel debellando, vel gravius periculo avertendo, securus & præsentis remedii vel auxilium deprehendi, quam post convenientem aquarum mineralium & balnearum usum in exquisito vitæ regime, moderata dieta, motu & exercitatione corporis, & temperioribus stomachicis, quæ virtutem intestinorum peristalticam placide roborent, status discutiunt, & alimentorum dissolutionem promovere.

OBSERVATIO V.

Vir quadragenarius, melancholicæ constitutionis, ex vita sedentaria, atque continui & inopportuni lucubrationsibus per viginti jam annos contractum patiur malum hypochondriacum: quod ipsum præcordiorum anxietatibus, pectoris & septi transversæ compressione, dolore inflativo hypochondrii sinistri, alvi obstructione contumaci, atque insigni mentis angore primum cruciavit. Accessit ante decennium hæmorrhoidalis fluxus, & abhinc sæpius adparuit; nullam vero prorsus malo tulit opem: sed illud potius novis symptomatibus, nimirum cordis palitatione, dolore capitis, cervicisque & podagricis demum insulsiis fuit adauctum. Tempestate huiusmodi existente, stantibusque potissimum ventis septentrionalibus, cuncta mirum in modum exacerbantur: quando artus extremi, nimis atque pedes, fucis anæa turgidi, horrent, detumescent, vaseque dispares; cerum est indicium, in propinquo esse paroxysmum; quod si vero dictæ partes naturalem colorem ruboremque recuperant; protinus remittunt symptomata. Notatu quoque dignissimum est, quod si dolores

Passio hæmorrhoidalis ex causa a vitiis præcedentibus.

artus

artus externos vexant, caput pectusque eorum immunitate gaudent; at si dolor extrema defuerit, majori levitate pectus caputque affliguntur. Ceterum alpeius viget, & saepius iusto est avidior.

Epicrisis.

Exhibet hæc observatio quædam momenta, quibus peculiaris utique debetur animadversio. 1) Nimirum docetur exinde, fluxum hæmorrhoidalem non semper præservare, vel sublevare passionem hypochondriacam, vel podagricam. Enem vero si hic fluor ante malæ invasionem rite succellit, & ab huius suppressione morbus excitatus fuerit; certior ipse est, fore, ut ab ejus revocatione morbus mitigetur ac saepius tollatur. Quod si vero hæc cruenta evacuatio, in subjectis minus dispositis, ex ipsius diuturni morbi causâ, symptomatice concitata fuerit, uti in præsentis casu factum est, spes salutis inde expectande, relinquatur sane angustissima. Interim ex hæmorrhoidibus vel coctis, vel fluentibus, malo hypochondriaco supervenientibus, ea semper sequitur certissima conclusio, quod humorum in intestinis flagratio nimium increverit.

2) Attendendum quoque illud est momentum, quod syndromæ symptomatum ab intemperie aeris & coeli frigida aucta fuerit: namque in passione hypochondriaca inveterata, tanta adit generis nervosi imbecillitas, ut à quacunque vel levisima externa causâ in præternaturales & irregulares conjici possit motus. Sic observamus sæpenumero, à cibo infante, haustu vini acidi, aere horrido, vel saepius aura tantummodo frigida, levioni animi motu, vel medicamento nimis activo, protinus recondescere sopitos hælenus motus. Quare ea probe tenenda est cautela, ut, causis materialibus remotis, moribusque irregularibus sedatis, summo animaturæ studio, quo genus nervosum rursus consentiens.

3) Nec denique illud silentio est prætereundum, quod, spasmi ac doloribus exteriores corporis partes occupantibus, interiores ab eis sint immunes; his vero spasmi infestatis, exteriores partes, carent doloribus. Ex hoc phænomeno illud singularis usus in præxi eliciendus est, quod in epistemi hypochondriaci spasmi, artus externos vexantibus, cane pectus & angue vitanda sint omnia ea, quæ facilitate ab exterioribus ad interiora repellendi pollent; cujus generis sunt refrigerantia, ipsius frigus, anodyna, narcotica, isturmina, vel etiam spirituosâ lumina exterioris adpata; nec non interna, quæ stimulant intestina, eorumque tormina inducunt, uti sunt purgantia, emetica, potus frigidi, fructus horæ dec. Contra vero profunt, quæ transpirationem augent, & consilicant cutem relaxant, ejusque spiracula patula servant.

OBSERVATIO VI.

Per litteras pronuper opem meam requisivit, vir quidam literatus, consiliarii manere fungens, annorum xxxvii. temperamenti cholericæ-sanguinei, corporis paulo habitioris; qui juvenis saepius, multumque cruoris è naribus fundere solevit, atque ceterum sub laeta diæta, ac intercurrentibus vi vini potu excessibus, non obstante insigni plethora, illibata gavisus fuit sanitate. At per sex circiter annos, *Frid. Hoffmanni Oper. Tom. III.*

post prægressum diuturnum morem, accedente viâ ledensaria, passionibus hypochondriacis affligi coepit, quarum hæc potissima sunt: urgent per intervalla fluctuante imi ventris distensiones, tanta ferocitate, ut accedant vertigines, sudores frigidi, & animus ad cuncta negotia reddatur torpidus, & anxius. Sub costis igitur in sinistro maxime hypochondrio gravitatus, mox tenuis sentitur dolor, qui saepius ad femur totumque pedem, cum hujus quâdam stupidiâte excurrit, & calculi renalis suspicionem movet. Junguntur tinnitus, susurritusque aurium; alvua plerumque sicca, & ciborum appetentia mox dejecta, mox avidior; sed à passu male habet; atque urina mingitur pauca, cum crebro stimulo. Quatuor albicæ annis affluente quasi convulsivo prehendebatur, in febrem quantamque desinente. Ab hac diu durante, tandem per insignem terrorem, ob magnum urbis incendium subortum, liberabatur, & ab eo tempore cuncta symptomata acerbiora sentit. Inprimis flatus rufulique multam crucem figunt; artus externa sæpenumero ipsiâmodicæ ac itere convulsive torquent agitationes, noctisque somno ideis terrificis pleno, sudoribusque copiosis flupato transiguntur. Consuluit varios frustra Medicos, quorum hi malum hypochondriacum, aliî renum vitium accusant. Ego vero commendavi, ut venæ sectiones ter quotannis celebrandas curaret; pro potu ordinario decocto convenienti uteretur; à passu rincluram coricem aurantiorum sumeret; alvum per pulverem rhabarbarinum fervaret apertam; aurium, ac temporum regionem balsamo vitæ inungeret, ac denique thermas Carolinas sub debito regimine adhiberet.

Epicrisis.

Viri sanguinei temperamenti, ob nimiam sanguinis abundantiam, si nec convenienti detractioe per sectam venam, nec decenti corporis motu & abstinencia eam minuunt, quam facile à gravi & diuturno morem animi in malum hypochondriacum incidit; nihil enim est, quod tam subito vim venericis & intestinorum digestivam & peristalticam debilitare & deprimere valet, quam gravis in animo conceptus dolor, & assidua ejus per profundas cogitationes fatigatio. Canalis vero hujus nervosi & membracæ atoniam, progressus contentorum languidior, humorum flagratio, & ex hac propullulantes status & borborygmi, pressio pede loquantur; quippe qui vim suam quam maxime in intestino colo, quod in hypochondriis situm suum habet, ejus tunicas distrahendo, distendendoque exerunt; status vero in intestinorum flexuris incurcati cum violentè nervosâ partes afficiunt, omnino reliquorum acerbiorum in diffusis partibus symptomatum & formalem & materialem, præcipuam etiam in nostro casu causam continent. Quare etiam potissima medendi intentio in eo reposita est, ut omni modo & cura peremptum intestinum naturalem & saluberrimum motum restituamus, & in hunc scopum omnium remediorum tam dieteticorum, quam pharmacæuticorum virtutem & operationem dirigamus.

OBSERVATIO VII.

Comes quidam illustrissimus, annorum xlvi. habitus corporis spongiosi, ac an-

Pess. hypochondriaci ad diuturnum morem animi, & sup-pressionem peristalticam quærendam.

Abdum hypochondriaci ad diuturnum morem animi, & sup-pressionem peristalticam quærendam.

*Uterus
vires
capit
distans*

mi sensibilibus, hilaris, & temperamenti sanguinei, iuventutis sue annos, mobili vite genere ac crebris peregrinationibus, sub illibata quidem sanitate transiit; attamen a flatulentis molestiis, utur levissimis, quas per luxuriam a matre, iidem passionibus misere cruciata, acquisivit, nunquam prorsus immunis vixit. Verum per aliquot annos, cum vite genus sedentarium, crebra exundescens, plerumque superflua, stipatum agere coepisset, variis flatulentis ac spasmodicis affectionibus infestata fuit. Præsertim elapso circiter anno, & quod excurrit, de spasmis in sinistra colli parte, doloribus illius lateris ardentibus, atque stupore paralytico, oculorum caligine, molestique ructibus conquebatur. Contra hæc mala tandem suavi Medicorum, vena in pede secata est, tam felici successu, ut & oculorum obcuritas, & spasmus colli, sinistrique lateris stupor remitterent; nisi quod sub aspero caelo interdum recurrebant, & ciborum cupiditas dejecta maneret. Hanc restitutus, elixir stomachale adhibuit; sed cum sub huius usu cœcæ accederent hæmorrhoides, insigniter ardentibus; illud omisit, & hæc oleo verbasci feliciter expugnavit. Neque tamen minus vehementes ossis sacri dolores, post lapsum in illud os, exacerbati, cum spasmis hypochondriaci, graviter excruciantur. Comitum periculum. Usus hinc est aciculis Egræ per octodecim dies; quibus dolores hæmorrhoidales quidem sunt debellati; at hypochondriaci pallio abhinc maiora cepit incrementa. Namque à levi animi & corporis motu, multo magis sternutatione, pessime habet, status cum sonitu, ac dolore acutissimo ab uno latere ad aliud devolvuntur, & incarcerationi summam inferunt anxietatem; adeo ut novissime melancholici quid accedere videatur. In hoc rerum statu commendavi, ut ter quotannis vena in pede, vel si cœcæ forsan adparuerint hæmorrhoides, in brachio nudaret; dein sub epulis uctoginta elixiri visceralis guttæ capiantur; velipero vero ex haustu aque frigide liberaliori, vel pulvis precipitatus, nitrosus, zhabarbaricus & detersivus, vel liquor anodynus ad quindecim guttas sumatur; & externe hypochondriis emplastrum saponatum *Barbette*, bene camphoratim imponatur.

Epiptisi.

Quando hypochondriaci sanguineæ constitutionis, doloribus & spasmis in capite & partibus inferioribus afficiuntur; causa non tam in catarrhali destitutione, vel sero acri stagnante, sed potius in sanguine per status & spasmis imi ventris illibi congesto, quaerenda est; quo casu omnino ea, quæ sanguinem ad partes inferiores derivant, & copiosiores emittunt; uti est vena scellio in pede, plus emolumenti afferunt, quam alia interna & externa discussione feri dicata remedia, sicut præsens nos docet observatio. Secundo, quando hypochondriaci de dolore presens circa scrobiculum cordis, qui in dorsum usque protrahitur, cum inflatione sinistri lateris, & summa anxietate oppressoria, frequentibus eructationibus, & conatibus ad vomitum conqueuntur, & per consensum in eodem maxime latere sinistro capitis partes nervosæ afficiuntur, ut in præfenti casu, certum indicium est, materiam causam flatuum non solum in ventriculo, sed potissimum in duodeno hæere. Quare præcipua medendi intentio esse debet, con-

nientibus remediis & internis & externis, quæ spasmus sedant, status discutiant, & naturale robur partibus restituunt, succurrere. Quidam Medicorum emeticis curam aggrediuntur; sed hæc licet leniora fuerint, si continuantur, non adeo proficua deprehendi. Nam licet materiam mucidam & biliosam educendo, quodammodo levamen afferant; tamen quia motus intestinalium peristalticus, qui dorsum feri debet, per hæc remedia, sursum invitat, firmior convalescentiæ spes in iis minime quaerenda erit.

OBSERVATIO VIII.

Illustis matrona florentissimæ ætatis, per aliquod tempus horrendis passionibus hystereticis agitabatur; quæ omnes univervi corporis tam internas, quam externas partes cum atrocissimo mox dolore, mox tumore discruciant. Præsertim in pede & femore sinistro, circa os ischion dolorem sentiebat fere intolerabilem, cum motus pedis impotentia: urgebant non minus horrenda capitis aque ac dorsi tormenta, præcordiorum anxietates, & difficultas spirandi suffocativa, vehementissimi singultus, inquietudines, vigilie, & artuum extensorum dissimili spasmis. Præterea de inguini in sinistro latere circa regionem licus conquebatur dolore, & manifesta erat sub costis illius lateris durities, ac vertebrae dorsi extenta, & manu percipienda. Non minus infestant uteri & abdominis vehementes inflationes, cum rugitibus, borborygmis, vagitus doloribus; & per pudenda status interdum cum impetu erumpunt, spasmorum, dolorumque levamen inferentes. Alvi tanta est siccitas, & coarctatio, ut eam non sine magna difficultate, & crudelissimis tormentis reddere queat: fœces semper duræ, & conglobatæ inflar ovorum excrementorum in podice lubiflunt, nec egredi possunt, nisi prius intruso in anum digito exitus pareatur; qui calloso, vel potius membranaceo præternaturali impedimento videtur occludi. Interdum quoque fit, ut simul cum excrementis filamentum quoddam membranaceum, tenue, latitudine lumbici terrestri, vel pennæ minoris, extra anum propellatur, qui sterora indurata, veluti vinculo alligata adhærent, quod extra podicem propendens non sine magna vi extrahitur. Redduntur simul cum excrementis rotundæ quædam particule, substantiæ membranose, duræ, & pellucidæ inflar ovorum formicarum. Cuncta, quæ materies medica suppeditat, antihysterica quidem in hoc casu sunt adhibita, sed in casum: potius præter rectam vivendi rationem, aquæ minerales, inque iis primum Sedlicenses, tumque Carolinæ molares, spinosum hunc penitus expugnavit affectum.

Epiptisi.

Est quidem præsens morbus hystericus, sed cum plane singularibus hypochondriaci symptomatibus conjunctus; in quo tria præsentia momenta, notata dignissima occurrunt. Primum est, tumor ille durus in sinistro hypochondrio circa splenis regionem: cuius sedes minime in liene, tanquam vlcere ad dolores tumoresque ejusmodi plane inepto, residet; sed potius in ea coli portione, quæ circa hanc regionem flexuram patitur, collocata est. Hoc nimium intestinum, sicuti in tympanitide fieri solet, à flatibus marum in modum distensum, subpacentes quoque partes in tumorem ejusmodi attractum durum

*Affectio
hyst. hyst.
dr. u. hyst.
dr. u. hyst.
dr. u. hyst.*

durum elevat. Alterum momentum est flatulentia uterina, quæ in hujus præternaturali constitutione facile generatur; & afficiendo nervos uterinos, mali hysterici præcipua in nostro casu causa existit. Talis notabilis casus conf. in CONSULT. MED. *Tam. II. Sess. III. Caf. 47.* Tertium, cui animadversio debetur, momentum, est exclusio concrenentis illius filamentosi, membranæ; quod nihil est, nisi mucus intestinorum glutinosus, ob calorem, ac siccitatem corundem, narium induratus; quem Veteres non ignorant intestinorum affectum, & tale concrenentum sub nomine pituitæ vitæ significarunt; quale etiam notabile exemplum in LIPSII *Epistolis* occurrit.

OBSERVATIO IX.

Malum hypochondriacum à crebris puerperis.

Matrona generosa, XXXVII. annorum, victu utens moderate vinoso, nec tamen ratione ciborum, quos valde nutrientes amat, satis accurate, somnum nimis diuturnum capiens, & hinc sanguine succisquæ, ut ex florido vultus colore apparet, plenissima, crebros partus, eoque singulis ferme annis excludit. His non modo valde debilitata est; verum etiam gravia à puerperis semper resinuit incommoda, moxque vomitum cruentum, mox febrem acutam, & elapso alihinc biennio, tertianam diuturnam toleravit. Præterea alvi est siccioris, quæ nullis parit medicinis, clysteres enim prorsus nequit ferre, & suppositoria, aqua Sedlicensis lacti nupta, pilule balsamicæ, magnesia alba &c. non nisi momentaneum semper tulerunt levamen; maneat vero potiusculum vomitu reddit. Accedunt sensim hypochondriacæ affectiones: siquidem molestissimi ructus, inflationes ventriculi dolorificæ, præcordiorum compressiones, anxietates, spirandi difficultates, ani tenesmus &c. graviter ipsam extra partus periodum exercent; & juncitæ vertigines, molestique aurium tinnitius, prohibent, quo minus corpus nec ambulando, nec curru vehendo exercere queat. Ceterum menses rite & sufficienti quantitate succedunt; neque etiam minus hæmorrhoides gestationis tempore largiores, extra illud parviores, tamen regulares sunt. Nec negliguntur artificiales sanguinis missiones, siquidem ipsi gravidae his vel ter plerumque tunditur vena; extra graviditatem ter quotannis, detractis semper octo uncis, inciditur in pede; quoniam in brachio aperta, majorem post se trahit præcordiorum anxietatem. Postquam igitur contra hæc mala permixta adhibuit medicamina, nullo sequuto levamine; abstinent à cunctis, & per novissimum semelstre non nisi liquore meo anodyno, & elixirio balsamico usa est, atque ex his bene habuit. Sed cum nondum omne malum debellatum sit; meum desideravi consilium, & ut præsertim alvi lubricitatem procurarem, rogavi. Commendavi ipsi clysteres oleo probe imbutos, pediluvia, item lotus ex herbis & floribus emollientibus cum lacte decoctis, ad una ventris admittendos.

Epieris.

I. Sicuti viri, ita etiam femine, sanguine à natura complexionis, per inconvenientem vitæ & victus regimen, sanguine & succis turgentem, multis & inagris morbis patent: nam accedente virum ex quacunquæ causa, in feminis vero per frequentes partus & gravia puerperia, de-

jectione, in peritænes chronicas, cujus generis sunt hypochondriacæ & hysterice, passionis incidunt, quas perferant non tam facile est, ut vulgo putatur.

II. Quando à confstrictissima alvo, nulla scire medicina visibili, statim ad intestina tenuia, & maxime ad ventriculum & duodenum accedentes, distendendo summas in dilata etiam partibus molestias efficiunt; certissime judicari potest, intestinum rectum vehementissimis spasmus à stagnante ibi & in consermentis partibus sanguine confstrictum esse. Quo casu externa unguenta ex axungis, maxime animalium, clysteres quoque oleosi, bulba, pediluvia, lotus, & venæ sectio in pede infinita præsentissimum allevamentum & auxilium afferre solent.

OBSERVATIO X.

Vir annorum XXVIII. patre natu philoso, juvenis sub laeta ac vinoso diata, illibata, præter levem spiationis angustiam, usus est libertate. At cum academacum ingreditur vitam, crebris feminis profusionibus, ac nimis medicationibus, neglecto corporis motu, indulgisset, male habere corpe, atque præsertim spasmodicos circa pectus stricuras, ac tussi sicca infestatus fuit. Post hæc munici præfectus ecclesiasticus, majus malorum sensu incrimenem, & sublevi corporis motu, ipsique concionibus, tantis subito pectoris compressionibus, ad suffocationem usque, tantisque phlogosis, non raro prehensus est, ut à motu pariter ac concionibus abstinere debuisset. Hicce vicis conjugio consultatus, eodem inito, majora fere incidit; siquidem per intervalla, præter lunarium mensis angorem, frequenter accedebant sensuum defectiones, ac lipothymie; quas tandem adplicatione frigidissime nivis debellabat. Sed succedebant strepitus, tinnitiusque in capite, murmura in abdomine, colli sub inspiratione, ac potus assumptione constrictiones, ac ferme strangulationes, fuloresque mox frigidi, mox calidi: interim sanguis ex vena missus, floridus atque fluidus apparebat. Medici consulti diversas fovebant sententias: quidam enim morbum pro hypochondriaco-spasmodico, à viscerum obstructione, humorumque dykrafia suborto habebant; alii vero fascinum accusabant, spasmumque ab immateriali derivabant causa. Adhibuit ergo varia, quibus crebre phlogoses ac commotiones sanguinis exquælabantur; at reliquis adhuc per quatuor jun annis addidit symptomatibus, quorum hæc est idea. Per intervalla, maxime ventriculo jejunio, ac sub concionibus repente corrumpit spasmodicis, abdominis, ventriculi ac colli constrictionibus; sub quibus venter atque pectus, veluti fune confstricta, ac pondere oppressa, magno impetu ad interiora retrahuntur, angusta fit spiratio, loquelæ interceptio; totumque corpus, fuso per seculum contrectu. Præterea solita sub ventris exercitio deficit titillatio, unde crebrius repetitur; animus interdum redditur tristis, ac inquietus, atque tum invaldeus spasmodica symptomata. Ceterum integro gaudet appetitu; & pro potu vinis utitur, quoniam cerevisia sacrum conditionem inferre videtur.

Epieris.

Quam perniciosa & functionibus acue vitalibus ac animalibus infesta sint intemperata & nimia præsertim primis adolescentiæ annis veneris

exercitia, & quam maxime iis, qui vitæ sedentariæ, locubrationibus, & profundioribus meditationibus indulgent; id toto prob dolor! die observamus. Vis enim & robur naturæ ac generis nervosi ita debilitatur, ut corpus inde quam facile ex levi data causâ ad omnes generis motus morbosos & anomalos proclive reddatur. Quando ejusmodi subiecta morbis acutis afficiuntur, summo nunquam non vitæ periculo sunt exposita. Ex chronicis passionibus pariantur maxime eas, quæ ex irritato nimium systemate nervorum proliciuntur; cuius generis sunt epilepsia, motus convulsivi, spasmodici & arthritici vagi, quorum etiam referri debent spasmici præcordiales strangulantes & suffocatorii, ad quos imprimis concitiores, si hypochondriaci laborant malo, sunt proclives. Hi enim quia cum impetu, vehementi vociferatione sanguinis & humorum motum ad pectus, cor & caput impellunt, non mirum est, quod præ aliis pectoris ad suffocationem velque compressiones, phlogoses, sensuum defectiones ac lipothymias cum strepitu & tintinnu in capite & auribus, constrictiones faucium suffocatorias cum sudore frigido, modo calido experiantur; sanguine tamen existente suis fluidis & florido; qualis per respirationem suam sub celeriori per pulmonum vasâ transitu efficiatur. Ego in tali casu per longam experientiam non melius & tutius aliquod remedium lætè asinino, conveniendi tempore & methodo exhibitum, sufficiente motu & analepticiis, balneis quoque aquæ dulcis, decerni ratione admissis me unquam deprehendisse, certa fide asseverare possum.

OBSERVATIO XI.

Melancholici
hypochondriaci
sæpe hæmorrhoidum

Persona quædam illustris, annorum XLVII. temperamenti sanguinei, corporisque robusti, ac proceri, matre nata hypochondriaca, per multos jam annos quotannis fluxum hæmorrhoidalem patitur. Ob varias autem per aliquod tempus res, quæ ipsi obigerunt, adversas, hæc excretio sensim immittitur facta, & mollescit ani ardore semper stipata fuit. Accessit ergo ante septem annos dolor in pede sinistro podagricus; huncque silentem, & non amplius recrudescentem, excepit arthritis vaga; non minus singulo vere purpuracea efflorescentia, cum catarrhali affectione, ardore, ac pruritu cutis, largisque sudoribus totum corpus occupare soluit, sed & siccitate sub recta vivendi ratione deficcatur. Tandem hoc novissimo anno prodit hypochondriacum malum, sævitque symptomatibus atrocissimis. Namque primum insignis est adpectus prostratus, ut læpius sub ipso pallo asfuita vomitu reddere teneatur. Adstringunt insuper indignis lassitudo, anxietates præcordiorum, conatusque gravativi ac pressorii sensus, cordis potissimum occupantes froticulibus, & ad scapulas excurrentes, vertiginosa capitis perturbatio, tintinnus aurium, serpens terribilissimus. Abdomen, & hypogastrica præterea regio valde inflatur, multique murmuribus adlucitur; ventriculus & gula ingentibus stringuntur spasmis, cum aliquâ deglutitionis impedimento. Hæc symptomata vespertino tempore exacerbantur, & calore capitis, manuumque præternaturali complicantur. In hoc rerum statu commendavi potationem fusiorem Egranorum tepescitorem; usum clisterii balsamici, pilularumque balsamicarum; nec non pulveris laxantis rhubarba-

rini. Pro potu ordinario decoctum quoddam; & ad vertiginem, auriumque tintinnu, balsamum vitæ extrinsecus iungendum fusi; nec rectum vitæ regimen, ac corporis motum negligendum, iussu. Abhinc illustri ægro post primam pilularum dosin, hæmorrhoides, cum insigni levamine fluere coeperunt; ut nullum superesset dubium, quin reliqua curatio recte instituta, malo latura sit suppetias.

Eperisfa.

Morbam hypochondriacum & fluxum hæmorrhoidalem, sive potius dispositionem ad eum, ingentem inter se habere connexionem & conspirationem, certo certius est: ita proferat, ut utraque affectio sit quam maxime hæreditaria, & hæmorrhoidali quam facile pathebatibus spasmodico-fluulentis, & rursus etiam hypochondriaci irregularibus sanguinis per venas sedes commotionibus afficiantur. Nam non raro deficiens & suppressus hæmorrhoidum fluxus causam affectus hypochondriaci subministrat; non raro etiam homines, qui nunquam à natura proclives ad hunc fluxum fuerunt, spasmos & fluulentis intestinorum propter impedimentum progressum sanguinis per venas efusaricas & venæ portæ redditum, hæmorrhoidales fiunt, adeo, ut doloribus & si alius circa os sacrum, hæmorrhoidibusque tam cæcis, quam fluentibus obnoxii reddantur.

Deinceps quoque certæ in praxi medicæ est experientia, & hypochondriacos & hæmorrhoidales ex facili fieri podagricos, arthriticos, & scorbuticos, atque silentes forsitan altero affectu; ut plurimum succedere ac recrudescere alterum. In ejusmodi intricatis & complexis morbis utique optimum reconvalescentiæ signum est; si & artis & naturæ beneficio per sedes venas fluxus, qui & cacochymia & plethoræ opime medetur, procurari & in ordine servari potest.

OBSERVATIO XII.

Vir juvenis, XXVII. annorum, temperamenti sanguineo-melancholici, parentibus melancholicis, & patre plane maniaco natus, animi sensibilibus, in prima juventute rachide laboravit; tumque superatis cum epilepsia variolis, anno ætatis decimo achoribus capitis infestatus fuit. His remediis mercurialibus, absque recto regimine, sublati succellit tumor totius abdominis, maxime scroti pellucidus; laxantibus sensim sanatus. Quatuordecim annos natus, crebris manuflationibus, semen provocare coepit, perque aliquot annos continuavit, cum insequente corporis contabescencia. Insimul ad studia nimium incubavit; & postquam semen turpi manu elicere desit, non modo crebris pollutionibus nocturnis vexatus, verum etiam tantas narium hæmorrhagias passus fuit, ut sæpius animo delinqueret. A decimo nono ætatis anno, academiæ ingressus, Baccho operam non raro dedit; medicotrici valuit; donec quinque abhinc annis sub epulis aliquando subito fieret, ut frustum cibi in faucibus obliquisse videretur. Spongia intrudebatur gula; sed non modo sensus palæ pharyngi inisi permanebat; verum etiam uvula prolabebatur, & post multam operam elevata, hoc reliquit incommodum, ut quoties Nicotianam fugat, vel vinum hauriat, procius faucium ardorem sentiat, & vel uræque prolapsum, vel tonsillarum intumescencia patitur. Posthæc vita genus ini-

Melancholici
hypochondriaci
sæpe hæmorrhoidum

valde

valde inordinatum; siquidem debebat in loco, multis flagrant, impurque aëre pleno; sarpusque corpori calenti, ac fortiori motu commoto aquam frigidam ingurgitavit. Hinc febrem intermittentem incidit, valde irregularem, & mox tertianam, mox quartanam, mox quotidianam: qua tandem, ope electuarii cuspidam, sanata, vanis, tristibus, ac meticulosis exerceri coepit cogitationibus. Has expugnaturus, elapso proxime anno, Jenam se contulit; sed ibidem majora incrementa cepit melancholia, cum plenaria adperitus prostratione juncta; ut omnem cum amicis consuetudinem fugere teneretur, gelidisque sumpserunt perfunderetur sudoribus. Curæ Medici cuspidam se tradidit primum; à quo martialibus tractatus, cum nullum sentiret levamen, & malum, accedente ob mortem matris atrociori, magis exacerbaretur, acidulas Selteranas adhibuit, conjunctis venæ sectionibus, pediluvii, aliarumque convenientium medicinarum usu. Sed cuncta fuerunt frustranea: siquidem crebris sollicitat phlogosis, humorum ad caput congestio, fortiori cordis palitatione; & sub epulis præsertim insigni mentis angore adsciebat. In tali rerum statu, consultus ego, primum pro potu ordinario decoctum consuevi; ad alium ducendam, infusum rhubarbarium; pro nervis, capiteque confortandis pulvitem, ex lapideis cancorum, pulvere Marchionis, succino, nitro, olio cinnamomi, masisque confectum ordinavi; pediluvia quoque, de extrinsecis ad splenis rigorem, emplastrum splenicum *à quæprudenti* commendavi; & præter rectam dietam, longas peregrinationes, ætæque mutationes fusi.

Epiresis.

Multa occurrunt in hac moti historia momenta, quæ tanquam causæ remotiores, ad malum hypochondriaco-melan-cholicum contribuerunt. Primum quidem notandum est, agrum nostrum jure hæreditario quandam ad melancholiam obtinuisse dispositionem; quæ in tenerioribus ætatis annis in ea potissimum consistit nervosarum partium constitutione, atque debilitate, qua ad tuberculos variis generis morbos proclives fuerunt. Hinc enim in prima satim infania, digestio, chylosationis, ac nutritionis negotium, minus rite successit; & ideo atrophica corporis consumio, cum rachitide enata fuit. Qua percurata, restitisse tamen videtur, sanguinis ac lymphæ potissimum quedam acrimonia; quæ tandem salutari naturæ consilio, ad cutis superficiem depulsa, sub actonum forma comparuit. Recte quidem data tum fuerunt mercurialia; at cum inconvenientis accesserit regimen, non fieri potuit, quin contracta corporis superficie, impura exanthemata retrocesserint, tumoremque corporis oedematofum inducerint.

Deinceps quum tantæ nervosi generis debilitati, & per hæreditatem, & graves morbos acquiritæ, sustentatæque, accesserint crebræ manifestaciones: non sane mirum, si partes solide tantam ad irregulares commotiones proclivitatem obtinuerint, ut cessantibus voluntariis seminis profusionibus, illud non modo præter voluntatem sub nocturnis ludibris promanaverit, verum etiam ipse sanguis, ad animi usque deliquium è naribus eruperit. Tum magis adhuc fregerant naturæ, nervosique systematis vires, errores dietæ in academia committi; quibus

in acceptis ferendus est spasmus pharyngis, quo inter epulas, sumto forsitan liberaliori vino, correptus est. Hunc, accedente improvida siנגie in gulam intrusionem excepit tanta atomia partium, in faucibus sitatum, ut ad hunc usque diem, post potum spirituosiores, aut aliud faucium irritamentum, vel uvulæ prolapsum, vel tonsillarum inflatio subsequatur.

Tandem ex irregulari diæta ac vitæ regimine in febrem incidit intermittentem, admodum irregularem; quæ ope electuarii, forsitan chinati, suppressa, primam originem hypochondriaco ac melancholico malo præbuit. Huic subinde majus pondus ac incrementa dedit, partim improvidus martialium usus, partim diuturnus moror ex obitu matris conceptus. In hoc igitur morbi genere, ubi cuncta remedia incassum fuerunt propinata, præter ordinatam vivendi rationem, potum convenientem & balnea aque dulcis, non ullum relinquatur subsidium, quam æris mutationes ac diuturnæ peregrinationes: quæ nisi votis respondeant, omnia fere opera ac olem perditum est.

OBSERVATIO XIII.

Matrona xxx. annorum, temperamenti sanguino-phlegmatici, elapso abhinc anno, cum ob menses retenta se gravidam reputaret, ex mariti obitu, vehementi affectu mota, huic nimium indulgere coepit, & solitudinem quaesivit. Erumpens paulo post cum magnis doloribus, uterum, æd parum, cruor, lussationem graviditatis discubebat; & illa ab hominum consilio fere remota, in prædio vivebat. Ibi ex improvise fiebat, ut, prævia raucedine, & ardore faucium, in his sentiret ingens gelu, sed mox per totum pectus, ad utraque hypochondria excurrebat, tandemque in præsternum, tensivumque pectoris dolorem desinebat. Sumto pulvere contra acedinem largiori quantitate, accedebat tanta spirandi angustia, ut suffocari videretur; & tusa in utroque crurum vena, totius corporis horror, pectorisque oppletio jungebatur; noctem transigebat insomnem, altero die non nisi desira, mensis prius impos, loquebatur. Accedens Medicus deprehendebat pulsus sortem, celeritatemque; urinam intense tinctam, cum sedimentis fursuaceo, salubusque floronicis; anhelationem gravem, quæ tandem reiectione pleuræ tenacilior, fere purulenta solvebatur. Sermonem continuum sine ordine movebat, mox sibat, mox ridebat; alvus erat assiduatissima, formis nullis, ciborum fastidium, scintillabant oculi; artus insigni pollebant robore, continuèque motuatiouibus agitabantur; & inardum in cruribus adpæctans exanthemata, abique calore præternaturali. Hæc symptomata, vespertino ten-pote vementiora, alternis potissimum diebus exacerbabantur; nec vesicatoris, camphoræ, anodynæ, aliisque remediis obducebant. Notari quoque meretur, epidemiam hoc tempore fuisse catarrhalem febrem, exanthematibus plenumque complicatam. Consultus ego crubrum usum pulvis temperantis, ex pulvere Marchionis, antimonio diaphoretico, cornu cervi phlogopice præparato, succino præparato, nitro depurato, & cinnabari confecti commendavi; & vesperi liquorem anodynum, ex haustu aque frigide sumendum fusi. Pro potu ordinavi servum lactis,

*Affectus
motus
sermo
vix
pudens*

lactis, & ad molliendam alvum, mannâ, nitro antimoniatâ naptâ propoliâ; non minus emulsiones refrigerantes propinari, capâque *epithema ex semini cucurbitarum uicia dimidia, anelorum persicorum drachmis binis, aquæ storacis sambuci, rosarum, tilia, liliorum convallium, papaveris rhæodas ana uncis duabus, nitri scrupulis duobus, camphoræque in spiritu rosarum solutæ granis tribus*, adplicari julli. Tandem narium hæmorrhagiam, si impetuosior raptus humorum ad caput fuerit, intusio iis stylo, provocandam curavi; ac præter corporis exercitationem, balnea aquæ dulcis ordinavi.

Epierisja.

Varie sunt causæ, quæ ad ingenerandum hoc dirum contribuerunt malum; prima est mensurarum retentio, quæ forsâ à vita nimis sedentaria originem traxit, & licet sponte revocata sit, parior tamen fuit; altera debetur diuturno morori, ob mariti obitum inducto; & hinc inita vita sedentaria, ab hominum consortio remota; unde imi ventris spasmodicæ stricture, humorumque major ad caput raptus, ortum petunt. Debetur insuper animadversio febri catarrhali exanthematicæ, tum temporis grassanti; quæ nostrum, spasmodicis moribus obnoxiam, raudescere, faciemque ardore id resplendentibus, procul dubio occupare voluit. Gelidus in oesophago sensus, non nisi ex spasmodicâ illius stricture fortiori, sanguinemque profundius reprimente, natales suos mutuatur; quæ per reliquum corpus, maxime pectus, protensa, hujus compressiones, spirandique difficultatem induxit. Quin idem spasmodicus motus per inconsultam venæ sectionem ad totum corpus propagatus, hujus horrorem excitavit; atque sic aucta partium inferiorum, maxime abdominis, stricture, humores ipsi pariter ac impuri majori copia ad pectus caputque rapti, illius op-
pletionem: in hoc vero circulum impeditiorem effecerunt; quo tandem factum est, ut turbatis animalibus functionibus, raptus melancholicomaniacus exceperit.

In tali igitur casu, non aliæ sunt medendi indicationes, quam ut relaxatis corporis exterioris spasmis, humorum effluens motus confopiantur, & impetus à capite ad exteriora & inferiora corpus derivetur. Hinc ex internis profunt temperantia, lenia anodyna, potulique ferri-lactis; extrinsecus juvenat clysteres, ac episthemata capiti adplicanda. Vix vero operæ pretium faciunt hæc medicamina, nisi accesserint balnea aquæ dulcis, quibus relaxatur contractum corpus, succique ad inferiora derivantur. His scilicet cum successu, si ex prioribus malum non remittat, sed magis invalescat, jungi potest sanguinis, & naribus ope styli ipsi intrusi facta provocatio; cui quædam interdum universalis humorum per venæ sectionem præmitti debet instanti, at quem illa in nostro casu brevi ante morbi invasionem instituta fuit; commode ipsi supersedere potuimus. Nec vero negligendus est corporis motus, quippe qui virtutem reliquarum medicinarum egregie secundat, & tali ratione malum hoc, maxime si fuerit recens, sæpe curatum vidi.

OBSERVATIO XIV.

Epist. hyst. hyst.

Vir generosus, habitus corporis spongiosi, sanguinis humorumque plenissimus, diu jam pal-

sionibus flatulentis, ac hypochondriacis, maxime in sinistro latere, cum doloribus colicis fuit discrucians. Præsertim vero per novissimos aliquot menses, cum è mobili vite genere ad magis sedentarium transisset, autumnali hiemalisque tempore, summis epulis, hora circiter tertia vel quarta pomeridiana, sensa molestem & pressuram in cordis scrobiculo, dextroque hypochondrio dolore, ad dorsum usque procurrentem, atque cum præcordiorum anxietate, pectorisque oppressione ac coarctatione slipatum; pedes infimul algent, vultus sanguine turget, rubetque, polsus ferit citator, manusque calent. Sub hoc paroxysmo vexant sæpius conatus vomendi, modo irriti, modo ipsi vomitus, materiam saporis acidissimi, dentes stupefacientem, faucisque ærodentem, licet parviori quantitate eructantes. Levatur malum ructibus copiose explosis, atque sudore; circa vespertinum tempus erumpente proflus solvitur. Eo gravius autem, & frequentius torquet, si æger cibis leguminosis, flatulentis, piliculisque marinis avidius indulgerit. Cæterum vires languent, corpus emacrescit, & alvus nunquam sponte suo fungitur officio.

Requisiti Medici pugnantur elixiris, stomachicis, volatilibus, purgantibus &c. sed frustra, magisque malum exacerbant. Ego vero, prospecta penitus morbi causa atque sede, pulveres acrimoniam humorum temperantes, lenioresque laxantes, ex lapidibus caustorum, radice ari, croco maris subtilissimo, rhubarbato, tartaro vitriolato, cinnabari, semineque cymini confectos ordinavi. Præterea, ut abstergeret ab omnibus flatulentis, ac leguminosis cibis, atque vini Rhenani potu, cui lactenus adlucuerat, jussit; eorâ quoque parviori ureretur, corpusque scdulo moveret, imperavi. Tum thesaur. Carolinas commendavi; quibus aliquoties, sub recto regimine, usurpatis, optime valere coepit.

Epierisja.

Hæc affectionis hypochondriacæ species, quæ ab antiquis Medicorum ad cardiacalgiæ referri solet, nec raro nostris temporibus, legioris potidimum sexus personis familiaris deprehenditur, commode fluorachica appellari potest. Ego quidem illius selem in inaccessio duodeno collocandam esse censio; cujus vetus æque naturale robur, si fuerit dejectum, facillime in eo flagrat massa alimentorum, in ventriculo minus recte digestorum, & accedente pravio bilioso pariter ac pancreatico succo, acriorem subit fermentationem, vaporumque elevationem. Hi vero nimium inflando, ac distendendo ipsam duodenam, atque super hoc frum plexum magnum mesentericum, item arteriam, & venam mæstacalem comprimendo, nec non officia ventriculi, & flexuram, quæ in fine duodeni est, ærodoendo, ac eludendo, omnium recentissimum molestarum causam præbent, atque fundamentum. Tam ingens vero succorum acidorum, qui observantur in hypochondriacis, proveniunt, non nisi humoribus in ventriculo ac incessu stagnantibus debetur, qui læpnumero ad corrosivam accedunt naturam, resplendent vomitionibus. Vitioso huic acido in acceptis quoque serenda est alvi adstrictio; idemque bilis texturam corrumpens, album generat læcum alvinarum coloreem. Inde porro petenda est ratio, cur in tali casu purgantia remedia effectu suo delinquantur; eorum enim vim non magis quam ab acidis infringi notit-

notissimum est. Ego vero in hisce affectionibus ad alvum laxandam nihil præstantius nannatis passulique rhabarbarinis, non omittis motu sufficiente, potiusque humedante, deprehendi; nec minorem virtutem exserunt ablorbentia alcalina, dum acidum absorbent, cumque illo sal quasi medium amaricans constituunt, cujus ope vim laxantem obtinent. Præterea thermæ, maxime Carolinæ, propter copiosam terram alcalinam, & sal, quod complectuntur, amaricans, omne fere curationis punctum absolunt. Et tunc ad acidum absorbendum, viscidum incidendum, alvum laxam reddendam, cunctas excretiones promovendas, viscerumque obstructionem resciscendam, sagaces ac periti Medici nul-

lam unquam medicinam, hisce thermis præstiosorem invenerunt, atque judicant.

Atque has de passione hypochondriaci allegasse sufficiat observationes: plures, qui cognoscere cupit, adeat **RESPONSA**, atque **CONSULTATIONES** nostras medicinales. Sic inveniet de malo hypochondriaci exempla in *Scd. III. Casus XXIX. usque ad XXXIII.* hypochondriaci-hysterici *Casus XXXIV. ad XXXIX.* hypochondriaci - spasmotico - flatulento *Casus XXXVII. ad XXXIX.* hypochondriaci-scorbutico *Scd. IV. casus L. seqq.* melancholia hypochondriaci ac hysterici *Scd. III. Casus XL. ad XLII. casus LII. ad LIV. seqq.*

S E C T I O II.

D E

SPASMIS ET CONVULSIONIBUS

particularibus; speciatim de Palpitatione Cordis, Asthmate Spasmodico & Suffocativo, Tussi Convulsiva, singultu, Spasmo & Convulsione Oesophagi, Vomitu, Cholera & Dysenteria, & de uteri Convulsione, abortu.

CAPUT I.

De Palpitatione Cordis.

THESES PATHOLOGICÆ.

§. I.



XPOSITIS his spasmodico-convulsivis affectibus, qui tanquam universales, totum nervorum genus occupant, omnesque fere corporis functiones perturbant: transcendendum jam ad illos est, qui certis tantummodo partibus inherant, cuique magna sæpenumero violentia exagitant. Hos inter atrox malum est *cordis palpitatio*, quam vere talem definimus, quod sit violenta, & perquam molesta musculi cordis subsistens, ac convulsiva, sive à naturali sua sede devio, ab influxu liquidi tenuissimi in nervos cardiacos impetuosi, & crasso justo majori copia in dextrum cordis ventriculum impulsu, vel ab acrimonia, aut alia causa originem petens.

§. II.

Hanc veram esse definitionem, ex infra dicendis patet: jam vero præmonere conveniet, eam esse intelligendam de palpitacione cordis vere tali, i. e. que morboſa, valde moleſta, & sæpius satis chronica existit: que differt à tremore cordis, atque leviori illius palpitacione, corporibus etiam sanis eveniente, ciqueque transitoria. Tremor nimirum cordis fit à fluidi nervi in eas nervosas fibras, quæ communi itinere

cum vasis, maximeque arteriis coronariis, exterram cordis ambiunt superficiem, vel celeriori, vel impeditiori per nonnullos ramos influxu: hinc **LOWERUS** de *Cord. Cap. II. pag. 91.* adnotavit, quod cor canis, ligato oclavi paris nervo, protinus contremuerit. Inde quoque ratio patet, cur talis uremor, partim post graviores animi affectus, & serviliorem veneris appetentiam contingere observetur; partim etiam viribus amissis accedere soleat, & mox animi deliquia præannunciet, mox febres malignas committetur, mox insignis sanguinis profluvium sequatur, mox moribundus vexet. Datur quoque ærebrior cordis palpitatio seu motus, qui occurrit in his, qui celeri cursu, sulatione, lusu pile, aut balneis nimirum calidis corpus exagitantur; vel effusiori gaudio indulserunt, vel fortiori iracundia exarserunt; nihilque est, nisi celerior, atque velocior cordis & arteriarum systole, à commotis nimium, atque citius per cordis cava circulantibus succis inducta. Hæc eadem celerior cordis systole, dum à pulsus duritie vacat, sese distinguit à febrili pulſu, qui huius frequentia cum duritie juncta absolviuntur. Distingui porro debet cordis palpitatio ab ea, quæ interdum, maxime in senibus circa ultimos gestacionis menses, in epigastrica abdominis lentius regione; & nihil est, nisi arteriarum in eo loco sitarum, præcipue coeliacarum, nimia à copioso & in prompto per venas splenicæ regreſſu præpedito cruore, repleto, validiorque pulsatio: quæ optime sanguinis missione curatur. Tale exemplum profert in *A. N. C. Dec. I. anno VI. p. 261.* De his nobis directe non sermo est; sed de ea loquitur specie, quæ ægros non raro sine evidenti, ac externa causa adiutor, & tanta cordis contractione & agitatione perficitur, ut illud etiam è naturali sua sede dimoveatur;

Definitio palpitacionis cordis.

Differencia tremoris præmonere & à convulsione cordis.

moreatur; & vel ad finistram magis latus propellatur, vel violenter ad costas, atque silemum allidatur, tantaque vehementia prae cordia elevet, ut pulsatio externa tegumenta attollat, & quandoque extra parietes percipi poterit; testantibus FORESTO *Obs. Lib. XVII. Obs. 10.* & CHRISTOPHORO à VEIGA *Lib. II. de art. med. cap. 8.* Quin RIVINUS *de Cordis Palpitatione* §. 13. memoriae prodidit, & in aegro cordis palpitatione laborante, in eo pectoris loco, ubi admodum manus pulsationem percipiebat, maculam rubicundam; in altero callum deprehendisse.

§. III.

*Pulsus
cordis.*

In historica hujus affectus descriptione occurrunt quaedam momenta, quae merentur considerationem. Primum quidem valde obnoxia huic malo deprehendimus subiecta, quae sunt corporis strictionis, temperamenti sanguineo-melancholici, animique sensibilibus, in terrorem maxime proclivia, aetate juniora, quae sanguine succiliqueurgent, horum consuetas evacuationes, siue fuerint naturales, siue artificiales suppressas, vel neglectas patiuntur; maximeque sequioris sexus personae, quibus menstrua non rite succedunt, vel rarum haemorrhagiae suppressae sunt. Hinc BALLONIUS *Lib. 1. consil. pag. 519.* *Uti in juvenibus*, inquit, *ex epibei excedentibus, quibus debet esse frequens haemorrhagia, si ea desit, palpitatio potest contingere; haec etiam virginibus nondum menstruatis accedere potest, recurrente ad partes superiores sanguine.* Ipsa palpitatio levior vel gravior est, & per intervalla plus minus longiora invadit; mox noctu ex improviso adortur miseris dormientes, ut subito evigilent; mox interdum accedit, summiisque saepius epulis invalescit. Antecedunt interdum graves praecordiorum anxietates; sub ipso paroxysmo velox & anhelosa fertur spiratio; jungitur interdum tremor cordis, & quod probe notandum, pulsus arteriarum, licet sit intermittens, tamen cordis motui saepe non respondet, sed languidus fertur ac immixtus; quin testante TIMÆO à GULDENKLEE *Epist. 23. pag. 140.* prorsus non sentitus fuit in corpore. In gravi paroxysmo percipitur magna molestia in praecordiorum regione, ob septum videlicet transversum vi nervi phrenici, circa cordis sinistram latus siti, & ab ejus palpitante motu agitati male affectum; non minus insignis corporis languor, artuumque tremor remanet.

§. IV.

*Sedes &
causa morbi
proxima.*

Quod attinet ad ipsas mali causas & sedem: formalis causa semper est violenta cordis contractio, atque convulsio tanta, ut & sede sua dimoveatur: materialis proxima vero est quaedam cruoris potissimum in dextro cordis ventriculo stagnatio, & nimia ad eum aggressio, propter quam impetuosior fluidi nervi in nervos cardiacos & fibras cordis fit influxus & eorum praeternaturalis contractio. Quae ut eo facilius intelligantur; operae erit pretium, quaedam de intimiori cordis structura, huc apprimè facientia, praemittere.

§. V.

*Motuum
cordis
naturalem
describit.*

Aetque primum ex solertissimi JOH. MARIÆ LANCISII *tr. de motu cordis, & aeternisationis* allegandum duximus, quod con-

tra plurimorum Medicorum sententiam, quae valde exiles, & vix animadversione dignos cordi tribuunt nervos, hos potius insigniores ac innumeros, cordis musculus communicari, penitior doceat anatomia. Naeque in singulo latere, dextro pariter atque sinistro, quinque adnotare licet nervorum paria; quorum *primum*, vagum dictum, in cerebro internates, testefque subortum, & in molli hujus substantia, inter ramulos carotidum arteriarum progressum, communi cum vena cava itinere ad pericardium fertur, & sparsis ad auriculas, artiaque ramulis, definit in rete nervosum, inter aortam ac pulmonalem arteriam, in fossica cordis basi reperitundum. *Alterum*, quod intercostale superius vocatur, eodem cum priori principio natum, & est capite per foramen ossis petrosi emissum, supra aortam descendit arteriam, inque tres divisi ramos, unum externo cordi, reliquos duos diello reticulari communicat contextui. *Tertium*, quod audit vertebrale, adhuc intra cerebrum prope decimum nervorum par erumpens, cum arteria vertebrali per ossiam viam progreditur, & circa septimam colli vertebrae egressum, cordi variis insinuat locis, tandemque in memoratum rete distribuitur. *Quartum*, nomine intercostalis inferioris praeditum, ex spinali medulla inter tertiam, quartamque colli vertebrae surgit, & rasis quibusdam ad auriculas & utraque venas ramulis, ad formandum saepius allegatum plexum concurrit. *Quintum* denique, quod phrenicum vocat, ex ultimâ colli, primisque dorsi vertebra erumpens, nervos dat auriculis ac ventriculis, atque eundem perperat nervosum plexum; ex quo denum innumeri rami per totam cordis feruntur substantiam. Hinc docetur, unde cordis musculo tanta vis sit, quae omnium totius corporis musculorum robur longissime superat: curque, uno nervo ligato, cor quidem, ob irregularem fluidi tenuissimum per reliqua nervorum paria influxum tremat; ejus vero motus non proflus interceptatur. Praeterea notari meretur, secus fornum nervorum tria esse paria, quae ganglia formant; reliqua duo his vacare. His efficitur regularis, ac naturalis cordis motus; illis irregularis ac violentior, animi pathemata excipiens: unde patet, cur animi affectibus tanta in alterando cordis motu sit potentia. Nec ignorari oportet, cavam venam praere reliquis valis, numerosissimam obtinere nervorum copiam; quoniam illa ad revehendum totius corporis sanguinem, magno opus habet robore.

§. VI.

Adhuc notato est dignissimum, cor esse musculum, seu potius congeriem multorum musculorum. Namque dum docet anatome, illud ex innumeris fibris, columnisque carnis constructum esse; eadem quoque penitor manifestat, singulam fibrâ ex quamplurimis compositi fibrillis; quarum quaevis, quam iteram fit congeries fibrillarum minimarum, muscoli nomen meretur, maxime cum singula tegatur membrana tenuissima, ex fibrarum nervorum artiarumque contextu apparata. Hinc sequitur, cor undique, interne pariter, ac externe, valde nervosum, valdeque esse sensibile, & ab omni, quod ipsi inhaeret, ad contractionem posse vellicari. Deinceps cor est musculus liber, à quatuor magnis valis pendulus: ergo à motu naturali majori ad omnes plagas rapi, & consuetâ sede dimoveri potest.

*De forma
motu, &
causa morbi
proxima.*

potest. Usus cordis est, ut sanguinis circulum per totum corpus promoveat; de quo ad nostrum scopum hac notamus. Sanguis ab omni corporis puncto, opo venarum primum exiliorum, mox capiorum, fertur tandem in venam cavam, ejusque, quem prope dextram cordis auriculam format, sinum amplum, & ex eo in dextram auriculam, tanquam cavum intus musculum, sub ejus dilatatione ingreditur: simulque chylus ex subclavia, per descendentem cavam, eandem subintrat auriculam. Hac igitur humoribus plena, ad sui contractionem sollicitatur, qua facta, cruorem cogit in dextrum cordis ventriculum, vel profus laxatum, vel juxta *Lancetti* mentem, in fine dialloles atque principio systoles confinium. Ille vero cruoris mole, ob fabricam valde nervosam, stimulus valide confringitur, pellique contentum fluidum, impedito per valvulas tricuspidales ad auriculam regressu, in pulmonalem arteriam per pulmones undique distributam. Inde liberis undique viis, tendit ad pulmonalem venam, perque hanc idem modis, à sinistro cordis thalamo exiit, & ex eo per aortam arteriam in totum corpus effunditur. Expreßo è corde cruore, ejus ventriculi vacui, in situm vere naturalem, qui diallole est, se restituit, & quamprimum cruore impletur, ob mechanicam necessitatem, rursus contrahitur. Sic alternat systole, atque diallole tam diu, quam diu vita, quæ integro humorum circulo absolvitur, perdurat.

§. VII.

Ex his patet, ad cordis motum naturalem requiri: 1) justum proportionem fluidi movendi, atque solidi, ut scilicet illius ea duntaxat afflatur quantitas, quæ vi cordis naturali possit superari, 2) fluidorum temperiem, ac mixturem naturalem, 3) cordis justum robur, & hinc sufficientem fluidi nervi, & arteriosi spiritus influxum; 4) ductuum valorumque sanguinem ad cordis vasa venientium, ac revehientium rectam dispositionem, liberamque ab omni præternaturali causa cavitatem. Quæ si minus legitime se habeant, cordis motum variis modis viciant; sed quem nobis de vera ac violenta duntaxat cordis palpitatione ferre sit: ad eam à reliquis motuum cordis vitis distinguendam, sciendum est, ad eam perficiendam semper requiri: 1) ut cordis ventriculo dextro infensum quid, quodcumque fuerit, inhiæreßet; 2) ut hinc major ac impetuosior fiat fluidi nervi ad nervos cardiacos influxus; & 3) consequenter, naturali major, ac summe violentæ musculi cordis subsultatio, atque contractio insequatur, quæ sæpius atque celerrime continuata, non prius cessat, quam donec expulsum fuerit inimicum, ac remotum impedimentum; 4) ut tam violenta agitatione, cor è sede sua, quoniam liberum est, pendulumque, dimoveatur; ac 5) non raro ad sinistram maxime latus protrudatur; quoniam à dextro latere ad sinistram fit impulsus; ut 6) denique humorum per arteriarum vasa irregularis fit progressus, quin interdum plane per aliquot minuta cesset; unde in corpore pulsus percipitur plerumque intermittens, debilis, parvus, vel plane nullus, & non raro mentis junguntur deliquia.

§. VIII.

His præmissis, jam inquirende erunt causæ palpitationis cordis mediatæ: quo fine præmittendum duximus sectionem eorum, qui hoc

Frid. Frigimontii Oper. Tom. III.

morbo perierunt, historiam. Tacemus polypos, calculos, aliasque res præternaturales, in cordis, vasorumque cavis obvias; de quibus files sit penes auctores: tacemus quoque aquam, sanguinem tinctam, jussu majori copia in sacculo pericardii post mortem reperiendam; cujus infra subjungemus explicationem: sed commemorabimus duntaxat, qualis reperta fuerit cordis confinium. Sic A. N. C. *dec. II. anno IX. obs. 44.* referunt, aperto tali cadavere, cor mole maximum adparuisse, dextrum ventriculum dilatatum, ac sanguine nigerrimo repletum, arterias conniventes, venamque cavam ascendentem in tumorem ingentem fuisse elevatam. Idem confirmat *WILLIUS tr. de medicament. oper. Scil. VII. Cap. 3. pag. 103.* ubi præter infarctum dextri cordis ventriculi, ac dextræ auriculæ, pulmones quoque atro, flagrantie, ac extravalato cruore fuerunt infarcti. *JOH. COUSIN in Nov. æsthet. Hyg. III.* refert, corda ad infarctum bovis quadrati semper invenisse.

§. IX.

Persequuntur igitur causas, quæ ad inducendam cordis palpitationem contribuant, mediantes eas vel intra, ac circa cor ipsum hærentes, vel in partibus magis remotis residere deprehendimus. Ex priorum censu occurrunt primum, atque frequentissime polyposa concretiones, si sola semper ac inenarrabiles, in cordis posticum ventriculis, ac auriculis generata, tum in venas protensa, & ex his non raro intra arterias compulsa. Ubi hæc causam præbent cordis palpitationi, hæc plerumque deprehendimus notas: à motu corporis valdiori, à scalarum ascensione, vel ubi sanguis levissime commovetur, protinus cordis palpitatio invaleßcit; fit ingens circa præcordia anxietas, cum pulsu debili, & inæquali, quandoque etiam plane intermittente; spiritus ægre trahitur, ut suffocationis non raro sit metus, sæpiusque animi punguntur deliquia: morbus præterea diutius perseverat, nec ullis cedat medicamentis. Tale concretum, si cordis thalamis inhiæreßet, pro vario, quem format, situ, nunc plus, nunc minus sanguinem, per cavam venam advehi admittit; hinc pro majori, minorive cruoris copia pulsus quoque nunc fortis, nunc debilis ac obcurus editur. Quando polypos ejusmodi in eo loco, ubi firmier, accrevit, immotus quiescit, nullam observamus palpitationem; quod si vero à loco suo avulsus, libere in cordis ventriculis fluctuet, hinc forte una cum sanguine in vas sanguiferum patulum propellatur, firmiusque in illud adigatur, ita ut plane occludatur, & hac ratione sanguinis transfluxus impediatur tam diu, donec illud repagulum rursus solvantur: tum non modo pulsus arteriarum plane intermitit, atque silet; venam, obstrictam sic vasis, & continue perspetuo ad dextrum cordis thalamum affluxu, flagrant cruor in hoc ventriculo, ipsum distendit, atque sic musculum cordis ad vehementissimam sui concussionem, quæ est palpitatio, proritat, non prius cessantem, quam donec iter aliquo modo sanguini liberum restituantur.

§. X.

Hinc in iis, qui cordis palpitatione, à polypos suborta, extinguuntur, cordis posticum dextrum ventriculum, una cum auriculâ, atque vena cava, in suspendam à flagrantie intra cruore elevatum deprehendimus molem. Notabiles

H loc

Ratio pal-
pitationis
corde hæ-
chanica.

Causæ
medie sunt
polypos
cordis.

Señe co-
dorum,
cordis pal-
pitatione

Palpitatio
causatur
medie.

hoc nomine est historia, quam de sectione cordis palpitatione, à polypo enata peremti allegant M. N. C. dec. II. anno VI. obs. 233. & sic se habet: totum cor, quantum possibile, in sinistram pectoris cavitatem detulimus jecit, dextra auricula mihi expansa, & spatiose comparente, quippe cujus cavitas ventriculo cordis, ad quem viam pandit, longe amplior existit. Pericardio, cujus membrana jullo crassior fuit, aperto, feri fibra ad minimum effluxit. Incisa hinc dextra auricula, fluidus primum promanavit sanguis, porro major coagulata ibidem hæsit; sub quo crus polypi cujusdam delitescbat, qui ex sero viscido, & in massam tenacem congelato confans, median dextra ventriculi cavitatem implebat, & auriculam transcundo, in arteriam pulmonicam, ejusque ramos exporcelis pedibus profunde decurrebat; pedes filum varios intra columnas dilti ventriculi carneas inferebat, tenaciter ibidem adherens. In sinistro ventriculo apparuit polypus latus, & spissus, pluribus pedibus retro columnas carneas enatus, pollicis de latitudine & crassitie; qui ventriculum egressus, per auriculam sinistram in aoriam, & carotidem, ejusque ramos multiplicatis pedibus expandebatur &c. De polyporum generatione, cum nostri non est institutum, non agemus pressius: sed id duxerat monebitur, quod à sanguine crasso, viscidoque ejusmodi particulæ in cordis dextro cavo relinqui, ac in fibrarum tandem texturam coire possint. Hæc facillius penetrabit, qui consideraverit, in diltum cordis thalamum ferri non modo chylum, adhuc crudum, nondumque cum sanguine mixtum; verum etiam sanguinem, reliquo crassiore, parteq; subtiliori ac spirituosiori orbatum, qualis est parum ille, qui à hepate per cavam ascendentem adducitur, partim è capita per cavam descendente in cordis ventriculum dextrum revolvitur. Omnes vero causæ, quæ cruorem copiosius ad præcordia cogunt, de quibus inferius tanquam palpitationis causis agitur, ad polypos generandos contribuant. Horum, quasi hærdiciorum, cor infans à primis ætatis annis observandum, illudque ad crebras palpitationes irruentium, memorabile exemplar recense in ACTA BEROL. Dec. II. Vol. VII. f. 45. 99.

§. XI.

Humorem
abundantem.

Frequens porro morbi nostri causa in ipso partium fluidarum vitio querenda est, & primum quidem nitur earundem insigniori, ac vires solidorum superante mole. Quando enim humores nimia peccant abundantia, non fieri possit, quam ut tam vasa, quibus continentur, quam præsertim cordis thalamus, accedente niturum vel fortiori eorundem commotione, vel majori ad superiora ob spasmos inferiorum raptu, prægrandi, ac modum naturalem excedente copia struant, illos vehementer distendant, relaxent, atque tum ad contractionem palpitatoriam prætorient. In tali casu vultus est floridus, ac rubundus, vasa cruore turgent, ac pulsus fertur magnus. Hoc vitii genus à tali causa inductum in juvenibus potissimum locum habet sanguineis, qui pueruli largum è naribus fundere suserunt cruorem; & his hæmorrhagiis cessantibus, pectoris compressiones atque motus finit. Idem quoque non raro accidere observamus illis, qui solennibus sanguinis detractionibus adjuvi, easdem justo tempore non repetunt, sed neglectui habent. Hinc explican-

da sunt exempla eorum, qui certis anni temporibus recurrentem cordis palpitacionem sola venæ sectione prævertere poterant. Tale de cordis palpitacione quotannis recurrente, ac tandem venæ sectione præservata, exhibet ZACUTUS LUSITANUS M. P. H. Lib. II. hist. 39. pag. 251. id quod affirmat etiam STALPART VAN DER WIEL observ. rarior. Cent. 1. obs. 36. qui casum ex Galeno allegat, quod quidam juvenis per tres successivos annos certo tempore palpitacione cordis vexatus, à venæ sectione semper sensu levamen, quæro autem de sequentibus, tempestiva venæ sectione se ab hoc molesto malo præservavit.

§. XII.

Longe frequentius est, à sanguinis & feri viscidioris nimia congectione ad cor ejus induci palpitacionem. Sciendum enim est, spissos ac crassos humores in motu suo circulari primum omnium in hepate perturbari, ob eam, quam Cap. de malo hypochondriaci allegavimus, rationem. Tum vero in imi ventris visceribus, partibusque nerveo-membranaceis flagrantibus, has ad spasmodicas proritant stricuras. Constrictio abdomine cruor majori copia ad præcordia cogitur, & ex vena portæ omnium altius per venam cavam, in dextrum cordis thalamum pellitur, ea quantitate, ut naturalis systole ipsi propellenda haud sufficiat. Tam crassus vero ac viscidus sanguis non raro relinquit flagrantem in corde portione, cui expellende palpitans motusque sæpe vehementissimus opponitur, & inde quoque prima tantum non semper polyporum ponuntur rudimenta. Hinc ratio reddi poterit, cur hypochondriaci, scorbutici, atque cachectici, cordis palpitacionem, tanquam gravissimum symptomata non raro experiantur: curque puellæ, ob indignem imi ventris compressionem, vestimentis huic scopo adaptatis factam, eodem facillime corripiantur malo. Non minus hinc clarum fit, quare viri ex hæmorrhoidum suppressione, gravi hoc symptomate adligantur, ac quare virgines cacochymicæ à mensibus incipientibus, haudque regulariter fluxucentibus; nec non semina, tribum lunare solvere desinentes, idem incidenti vitium; quo plerumque circa lunæ insigniores mutationes laborant. Hoc in casu, ubi spissi sunt vitales succi, iis qui colica vel flatulenta, vel nephritica discruciantur, familiare symptomata cordis est palpitatio: dum enim & status, & spasmus compriment distenduntque imi ventris vasa, & hinc cruorem majori copia compellunt ad præcordia; facili est ratio, inde subortæ cordis palpitacionis.

§. XIII.

Est porro non raro palpitacionis causa, materia quedam subtilis, acris ac caustica; quæ non modo nervis præcordialibus ac cardiacis insidet, spiracionem difficilem producit; venam etiam cum humorum massa ad cor ejusque vasa coronaria delata, fibræ carnea, nervisque adhærescent, eas graviter vellicando, ad violentos motus disponit convulsorios. Sic proflant innumera exempla eorum, qui à scabie retrogressa, purpura, vel non satis ad curam progrediente, vel plane retrocedente, aliisque exanthematibus improvide retroactis; aut ulceribus præmaturo consolidatis, cordis passus sunt palpitacionem: quod etiam de materia arthritica, podagricaque intus compulsa statuendum est. Quin notari

Sanguinis
crassus.

A materia
acris, ac
vellicante.

meretur ille casus, quem de gravi cordis palpitatione, ex foreore pedum suppreffo enata refert SIMON PAULI in *quadripart. botan. pag. 215*. Huc & illae spectant observationes, ubi quidam ex vaporibus terribis, venenatis in hunc diurnum morbum inciderunt; qualem ex fumo antimoniali in pulmones suscepto obortum adnotavit GODOFREDUS SCHULTZE *tr. de nat. siml. brevard. Cap. V.*

§. XIV.

Ex defectu sanguinis.

Non vero solum à dictis humorum vitis atrox hoc malum inducitur, sed ad illud ingenerandum, sanguinis quoque defectum contribuere, pluribus compertum habemus exemplis. Sic post enormes sanguinis profusiones, sive per uterum in abortu, aut puerperio, aut mensuris, sive in pulmonibus per haemoptysin, sive ex aliis locis quadam violentia provocatae fuerint; non modo cordis tremorem, sed veram quoque palpitationem insequi, experientia comprobatur. Quenadmodum enim ad systolem & diastolem rite perficiendam, liquoris nervi non minus, ac sanguinis arteriosi debitas in cor, & ejus vasa requiritur influxus: ita hoc in dictis casibus imminuto, cordis quoque vigor labefactatur, nec sufficiens fit ejus contractio. Hinc ab imminente sanguine successeve grami & coagula in cordis cavi relinquuntur, quae tandem cumalata, non modo impediunt regularem sanguinis transitum, lipothymiarum haec adfectibus plerumque junctam causam; verum etiam ad eam commotionem ipsum cor prorsitant, quae audit palpitatione, sed in hoc casu levior deprehenditur, & simul crebrior.

§. XV.

Ab animi afflictibus.

Inter causas nostrae mali omnino praecipuum sibi vindicant locum immoderatus animi perturbationes; quarum modus agendi varius; quaedam ita sunt comparatae, ut vel humores celerius commoveant, & à partibus interioribus ad corporis superficiem compellant, veluti ira est, atque gaudium; vel eodem magis ad interiora restringant, contractis exterioribus, quenadmodum de metu, terrore, tristitia &c. observamus. Hac ratione & iracundia, & effusum gaudium, rarissime veram inducunt cordis palpitationem; contentient praeter experientiam GABELCOVERO *observat. Cent. IV. Curat. 84*. Sed potius leviores illum palpitantem motum excitant, quem §. 11. non nisi frequentiori cordis & arteriarum systole atque diastole absolvi, & à vera palpitatione probe distinguendum esse docuimus. Metus frequentius efficit cordis tremorem, eundem vero causam palpitationis esse posse, testatur BAGLIVUS *prax. medic. Lib. II. pag. 229*. Omnium autem maxime terrorem ad provocandum hoc malum esse potentissimum, quotidiana confirmat experientia. Ratio in eo videtur posita: dum terrore ea vis est, ut contractis externis corporis partibus, flos vitales ad interiora magis compellant, ruant hi majori copia ad cordis machinam; hancque, ultra naturalis dilatationis sphaeram dissendam, ad praeternaturalem cogunt resistens, quae gignit palpitationem. Non semel quoque observavi, viros ac juvenes hypochondriacos, & qui debiliiori nervorum genere sunt instructi, ex acrioribus meditationibus, praevia extremorum refrigeratione, atque vertigine, in cordis palpitationem incidere; quam etiam foeminae hystericae ab odore suaveolentium patiantur.

Frid. Hoffmanni Oper. Tom. III.

§. XVI.

Ex causis mali nostrae remotioribus hac spectant cibi flatulenti, ab iis praesertim comesti, qui languidam obtinuerunt digestionem, veluti hypochondriaci sunt. Cibi nimirum tales leguminosi, ac oleacei mucosum in ventriculo ac intestinis relinquunt lentorem, ex quo resoluti vapores, non modo intestina distendunt, atque sic liberum sanguinis per abdominis vasa circulum perturbant; verum maxime ventriculum expandendo, debitum sibi transversus defensionem, cruorifuge per pulmones cursum praepediunt, & illius expeditum per cordis cava remotatur iter. Sic de se ipso testatur MALPIGHIUS in *Epistola ad Boerlium*, & ab adiunctis leguminibus, palpitationes praesepae molissimas fuisse experitur. Hinc quoque ratio in promptu erit, cur hypochondriaci à patu potissimum palpitationem cordis patiantur: & quare permulto Veterum causam hujus adfectus in flatulencia collocaverint; adeo ut HIPPOCRATES *Lib. II. epid. §. V.* dixerit, quod in omni cordis palpitatione sit flatulencia. Nec negligenda in classe causarum occasionalium sunt uni ventris, pedum, tibiarumque stricture, ac vestium iustitior applicatio: quippe quae humores ad superiora magis compellendo, in dispositis ad producendum malum plurimum contrahunt, quenadmodum GABELCOVERUS *Cent. III. Curat. 114. pag. 161.* confirmat; & FORESTUS notabilem allegat casum, ubi quis propter tibias arctius ligatas, dum somno meridiano se daret, cordis palpitatione prehendebatur; soluta vero iis, placide ac suavius quievit. Ex denique in iis, qui à nimia sanguinis crassitie, vel polyposi crementis, cordis palpitationi obnoxii sunt, quam plurimum ad eam revocandum contribuunt omnes humorum commotiones, sive fiant per fortiora animi pathemata, sive per cibos potusque calidiores, quale exemplum de cibis nimis aromaticis conditis allegant M. N. C. *Dec. I. annus III. obs. 134* sive denique per vehementerem corporis motum, qui illis subjectis semper observatur noxius.

§. XVII.

Prius quam relinquamus pathologicam nostrae mali considerationem, breviter adhuc tradendum est, quid de aqua pericardii statuamus. Constat nimirum per plures observationes, quod in iis, qui cordis palpitatione extincti perierunt, aqua in pericardio copiosius collecta adparuerit: id quod variis exemplis confirmant CAR. PISO *de morbis à serosa colluvie pag. 170*. OLAUS BORICHIUS in *Art. Hassiensi. pag. 173*. HOLTERIUS in *Schol. Lib. 1. cap. 39*. TULPIUS *Lib. IV. cap. 20*. FERNELIUS *lib. V. pathol. cap. 12*. Multi dictam pericardii aquam pro causa palpitationis vendiderunt; at nos potius cum LOWERO *tr. de corde Cap. II. pag. 104* statuimus, quod sit effectus palpitationis. Namque sicuti multis observationibus compertum habemus, quod sanguis, si in loco quodam stagnaverit, serosam subtiliorem portionem dimittat, uti in cerebro, intestinis, utero, vesica &c. deprehendimus: ita non minus persuasum habemus, quod à cruore in thalamis ac auriculis cordis flagranter, & summa violentia conquislato, subcibus pars secedat, & in sacculum pericardii extra valeat: unde non hujus modo, verum etiam pectoris hydropem generari, ac cordis palpitationi supervenire observamus.

H 2

§. XVIII.

Causa remota sunt cibi flatulenti.

Servituta potius est arteriarum.

Causa, quae commovet humores.

De aqua pericardii.

§. XVIII.

Prognosis.

Quod prognostion hujus mali antinet; insignis est locus, quem GALENUS *lib. de locis affectis* habet, dum dicit: *qui in juvenili vel declinante aetate corripuntur gravi cordis palpitatio, raro ad senectutem perveniunt, sed citius moriuntur.* Et AVICENNA *sen. 3. primi l. dist. 5. cap. 1.* cavendum maximopere, ne morte subita intercipiatur, qui sic affectus fuerit, his verbis comminuit: *Ille, inquit, cui tremor cordis assidue contigerit, de se ipso sit sollicitus, ne subita intercipiatur morte, quod symptoma hujusmodi, cum principis partis proprium sit, in hystropen, & inde in mortem facile transmutetur;* sicut idem auctor *sen. XI. tertii tr. Cap. II.* conceptis verbis affirmavit. Neque profecto parvi habendus ac negligendus est hic affectus, a quacunque deum suboritur causa: namque non raro contingit, ut ille, si cor ultra sphaeram elasticitatis adeo distendatur ut se confringit nequeat, in lethalem suffocationem, ac hystropen terminetur. Et facilis quoque illius in periculosa hystropis, phthisi, cachexiam, asthma convulsivum, hydropem pectoris & anasarcam est transitus. Metuendum maxime de infelici est exitu, si palpitatio fuerit frequens, si magna, si cum anhelitu, animi deliquis, & pulsus inaequalitate contingit. Generatim & in prognostice suppeditanda, & curatione nulli scilicet absolenda, adnotare oportet Medicum, nam cordis palpitatio fit idiopathica, aut, quae causam intra ipsum cor, aut saltem vasa ipsi vicina agnoscit; anne symptomatica, quae morbis spasmodicis, convulsivis, hystericis, ac hypochondriacis tanquam molestem jungitur symptoma. Illa curari fere nequit; haec, sublato primario morbo, profus cessat.

CURATIO.

§. I.

Indicatio-
ari morbo-
na.

Curatio affectus nostri convulsivi, quo hic magis inveteravit, eo difficilior redditur: namque cordis fibrae, si tam frequenter praeter naturam vellicantur, ac distenduntur, tandem adeo debilitantur, ut morbus fiat habitualis, & à levissima resuscitetur causa. Quare si in ullo, certe in hoc morbo, principis obitare oportet; quoniam non nisi nascenti morbo, perfecta curatio, ipsi vero invalescenti, praesertim idiopathico, palpitativa dumtaxat superest medela. Ipsa vero medendi ratio hac est: 1) adjuvi oportet, ut nimia commotio partium fibrosarum & nervearum cordis ac vasorum apte sopiatur. 2) Sanguinis stasis circa cor & pulmones impedi debet; ejus adfluxum revocando, ac circulum reddendo liberorem. 3) Causae, quae malum excitant, extra paroxysmum sunt removendae.

§. II.

Quod
in paroxys-
mo sit
faciendum.

Quod paroxysmus attinet; dispiciendum est rationali Medico, quae occasionalis causa ad illum inducendum contribuerit. Si videlicet nimiam humorum ebullitionem subesse cognoverit; praestantissima sunt remedia, quae temperant illam, simulque vi pollent praeternaturalem partium solidarum motum compescendi. Hoc nomine praecarii usus sunt pulveres anisipalmodici, qui ex lapideis cancerum, antimonio diaphoretico, nitro depurato, cinababz, succino, di-

te hippopotami philosophice preparato, cornu cervi sine igne, & tantillo extracti callores appa-
rantur; nec non pulvis noster precipitans vel solus, vel liquori anodyno minerali nuptus, & ex haustu aquae frigidae, quae in temperando humorum orgasmis, excellentem obicit virtutem, liberaliori sumtus. Ubi flatulencia intestinorum sufficit malum, alvus adstricta, cutis arida, pedesque frigidi sunt; praeter dicta interna temperantia, externis quoque dimicare convenit; & inprimis flammam per inferiora subductioni, alvinarum excretioni succurrendum per clysthes, oleosis leniter carminativos. Pedes quoque in aquam tepidam immittere oportet; sed ea cautione, ut si jussu frigidiores fuerint, prius pannis calidioribus probe fricentur. Quando-
cunque nimiae haemorrhagiae praesertentur, virtutem insignis profusio cum crebris animi deliquis praesto est, temperantibus jungenda sunt analeptica; veluti mixtura, quae ex aquis filorum convallium, mellisae Turcicae, cinnamomi sine vino, ceraforum nigrorum, pulvere Marchionis, lapidum cancerum, liquore anodyno, & syrupo quodam analeptico, v. g. florum quatuor cordialium conficiuntur. Et ipsa essentia ambae egregia virtute & analeptica, & roborante in hoc casu sollet.

§. III.

Neque vero spernendus est externorum remedium usus: ex quorum numero sunt foci sacculi-
culi discutientes, & balsamici, ad praecordia & cordis scrobiculum adplicandi, qui ex rore-
marino, mentha, melissa; floribus chamomillae Romanae aliisque speciebus; aqua mellisae vino-
sae, sive *Pean des Carmes* utronis adparari possunt. FORESTUS mellisam viridem cum borragine calefactam, & cum aqua rosacea, ac momento aceti adnotat laudare satis nequit: cui scopo etiam balsamum nostrum vitae, praecordia inun-
ctum faciet satis. Denique si sanguis abundaverit, & per latus longum tempus ex vena haud detractus fuerit; nec ex commendatis remediis paroxysmus cedere velit: nihil fere superest, quam ut vena velin pede, vel etiam, si reliqua permissa-
runt circumstantiae, in superioribus corporis partibus tundatur, & sufficiens cruoris detrahatur quantitas. Sic enim liberantur praecordia à nimia humorum mole; ac aequilibrium inter solidas, fluidasque restituitur partes. Hinc HORSTIUS *lib. III. Obs. 16.* venae sectionem in ipso paroxysmo ad miraculum profuisse testatur. Quidam facta lateris dextri ad terram inclinatione, paroxysmos levare ac tollere possunt: quales casus ipse vidi aliquoties, & unum in A.N.C. *dec. Anno II.* relatum legi. Neque obscura est ratio; hoc enim incurvato corpora sine, celeriter sanguinis per venam cavam descendente ad cor affluxus paululum intercipitur.

§. IV.

Extra paroxysmos omnia curandi intentio eo est dirigenda, ut causae malum solventes tollantur, vel saltem imminuantur. Quo quidem fine impigre invigilandum est, ut quaecunque subit causa, excepta quae defectu sanguinis nituit, humorum incrementum studiose praecaveatur. Sic enim succurrimus plenitudini, ac spissitudini illorum; sic quoque polyporum, si praesto fuerint, retardamus augmentum. Est sane praestantissimum, cujus ope hoc fine potiri licet, remedium est decenter instituta venae sectio: quae sicuti

Eximus
in paroxys-
mo adli-
benda.De venae
sectione
§. IV.

In ipso paroxysmo insignem fert opem, ita quoque extra illum, ad praevendendas novas accessiones, egregiam exhibet virtutem. Hinc GALENUS *Lib. V. de locis affectis* Cap. 2. adfirmare non dubitat, omnes palpitatione cordis laborantes, venae sectione, & alimentis, ac medicamentis attenuantibus curatos fuisse ac liberatos. Conferuntur hac in re ANT. ab ALTOMARI *Cap. XLP. CAPIVACIUS Lib. II. Praef. cap. 8. VICTOR TRINCAVELIUS in Praef. de compos. medicament. & Cap. de palpitatione cordis. STALPART van der WIEL. obf. rarior. Cent. I. obf. 36. ZACUTUS LUSITANUS M. P. H. Lib. II. lib. 39. pag. 251. & VERZASHE obf. 50. Hoc sane remedium genus, uti in illis, qui ex nimia sanguinis plenitudine, aut etiam spissitudine cordis palpitatione laborant, omnium remedium vix de superat, & secundat: ita sane unicum fere est subsidium, quo eos, quos polyposa in corde concretione vexant, solari possumus.*

§. V.

Præterea pressius ad causarum ablationem accedendum erit; qui quidem nomine, si symptomata fuerit cordis palpitatio, ad morbum primum in medendo respicere oportet. Hic si fuerit hypochondriacus, rependa & in usum vocanda sunt ea, quae *Cap. de malo hypochondriaco* commendavimus. Praesertim vero quædam animadverteri debent humorum spissitudinis; quæ sicuti mater est concretionum polyposarum; ita eandem fere cum his requirit curationem, hac differentia, ut ea in simplici humorum spissitudine funditus excludenda, in polyposi vero non nisi ad graviora pericula præcedenda locum habeat. Utrouque autem casu hic est curatio: cardo, ut & alimentis & medicamentis perpetua humorum fluxilitas conservetur, atque salutarium excretionum successus adjuvetur. Quamobrem præscribenda sunt infusa ac decocta aperientia, attenuantia, ac resolventia; brodia ex iussulis tenuioribus cum radice cichorei, graminis, herba chaerifoli &c. parata. Commendat quoque in tali cordis palpitacione, quam melancholicam vocat, serum lactis RHODIUS *Lib. II. obf. 40.* Omnium vero medicaminum virtutes longissime superant aquæ minerales, inque primis thermæ Carolinæ: quippe quæ humores spissos; coagulatos, viscidosque optime resolvunt, attenuant, impuros per excretionem proferunt, viscerumque infarctus solvunt. Et novi prosculo quædam subiecta, quæ palpitacione cordis vexata, polyposa in corde fovere videbantur consentanea; & ab usu venæ sectionis, thermarumque Carolinarum annuo, se per multos annos in vita conservarent.

§. VI.

Quando malum causam & originem habet a mētiū, vel hæmorrhoidum retentione: operæ pretium erit, has excretionis in ordinem revocare; id quod medicinis temperantibus, antispasmodicis, diluentibus, blandis laxantibus, venæ sectione, pediluvio, balneo, aquis thermalibus, aliisque pro circumstantiarum varietate peragere solet. Quod si ulcera, scabies, arthritica materia, aliaque exanthemata intra corpus depulsa, evacuatis per blanda laxantia, quæ in primis visis hostitantur, crassis fordibus, su-

Frid. Hoffmanni Oper. Tom. III.

dendum est, ut materiam acrem subtilē in matia sanguinea obstantem involvamus, ad exitum disponamus, atque tum; & erutus spiracula eliminemus. Quam in finem egregiam præstibus utilitatem absorbentia, ac diaphoretica furosa; aut acidula: veluti est mixtura simplex cum liquore anodyno primum solo, deinceps spiritus benoardico *Bingii*, vel cornu cervi succinato nupto marinata. Hoc etiam sine profuit infusa calida theiformia, mane intra lectum cum regimine diaphoretico, etoque temperatissimo torbilla. Ubi denique vitium in ipso corde, ejusque præternaturali constitutione, duritie ossa, excrementa, abscissa &c. latet: nihil profus valet ars medica. Interim ne nihil egisse videamur, eadem via, qua oppugnandos duximus polypos, incendendum erit.

§. VII.

Præstantissima vero methodus, qua hoc morbi genus præservare licet, in studiosa casualium occasionalium evitacione atque rerum non naturalium recto usu consistit. Quamobrem ii præsertim, qui polypos onerati videntur, sunt admonendi; ut motum corporis, maxime fortorem fugiant; ne commotis ex eo humoribus, avellantur forsitan fibrosæ illæ concretiones, & libere in vasa fluctuando, celeritius ac funestum producant eventum: bene id monente GABELCOVERO *loc. cit. Cru. III. tit. 14. 114.* qui etiam suadet, ut vestimenta, præsertim abdomini, femoribus, ac ubis, maxime compressoria in sexu squorosi, laxiora admoveantur. Hoc non minus, ac alia momenta egregie explicat CRATO, dum *Lib. V. Consil. 12. dicit: adjiciat vestis circa ventrem improbat: bene ventriculus, & pectus munientur, ne ulla frigida apra ad ea perveniat. Versari etiam in aura frigidiore minime tutum est; mollis aer videri. Et inchoante palpitacione subito chylus ingruendus, & manus ac pedes fricandi.* Vichum poro non minus ac potum oportet esse tenuem; ac cibi, qui status movent, cane pejus & angue evitentur. Cum primis vero cavendum ab animi affectibus, maximeque ira, atque terrore, ut & a voluntariis venereis & nimis meditationibus; utpote quæ res ex sua natura hunc affectum in senam producere valent. Possremo opera danda est, ut excretionis corporis bene respiciatur, alvus semper officio suo fungatur, & transpiratio liberior conservetur.

CAUTELÆ.

§. I.

Commendant auctores quidam opiata in cordis palpitacione remedia, & de his magna prædicant. Verum cavendum maxime sumo, ne vaporosa & fortiora narcotica, qualia sunt opiata, præsertim minus correctæ, in hoc affectu consopiendo interne adhibeamus; quippe quæ, & cumyrimis si offerantur iis corporibus quorum vires ab enormibus hæmorrhagiis penitus fere prostratæ sunt, potius damnum inferunt, & malum deterius reddunt, tantum abest, ut solamini sint adficia. Feminis autem hystericiis, in paroxysmis qui palpitacione cordis fluctuant, non sine fructu tantibus admoveere licet vaporosa satida ex castoreo, aia fatida, penis

H 3

Methodus præservativa.

Quomodo appropinquat morbus polyposi.

Causæ malæ & originis hæmorrhoidum.

Cautele circa op. 114.

ustis &c. parata. Contra vero in hisce casibus à suavescentibus cavendum est: quippe quæ non modo ipsum malum exacerbare, verum etiam protinus revocare valent.

§. II.

*Pedibus
virorum
spas.*

Quemadmodum in omnibus spasmodicis affectibus, tam circa venarum in pedibus incisionem, quam pediluvia, perpetue instar regulæ tenendum est, quod hæc medicamina, si pedes frigidi fuerint, minime in usum vocanda sunt; quoniam malum sic exacerbatur: ita præsertim hanc cautelam in cordis palpitacione adnotare oportet. Potius frictionibus, ac fomentationibus humorum adfluxus in pedes est invitandus, & tum quosmodi subsidia adplicanda.

§. III.

*Quæ con-
servata in
cordis pal-
pitacione
ab omni
indole.*

Quandoque malum ab humorum, per hæmorrhagias deperditorum inopia, & virium jactura originem traxit; analeptica & vires rescitientia, quæ vero minime nimis calida esse debent, ne organum inducant, sunt adhibenda: ex quibus instar omnium esse potest essentia ambræ cum liquore anodyno mixta. Succurrendum porro est cibis nutritivis, lacticiis, emulsivis, quæ sanguinem cito regenerant: & quo digestio sit vegetior, ea sunt conjungenda subsidia, quæ tonum ventriculi roborant, veluti est elixir nostrum viscerale balsamicum. In malo chronico commendamus etiam aeris & loci mutationem, peregrinationem, jucundumque confortium.

§. IV.

*Civitas com-
mota per-
petua
accidit.*

Emetica, fortiora purgantia, commotientia, volatilia, nimis aromatica, & acriora, studiose in hoc malo sunt evitanda: ea enim humores nimis commovent, & ventriculum spasmo afficiunt, quem pressio pede humorum ad præcordia affluxus insequitur. Ob vim commotivam caute etiam cum balneis aque dulcis procedendum est; illa enim, si adhibeantur, tepidissima, & paroxysmo remittente ex usu esse debent. Contra blanda diaphoretica, in eo potissimum casu, ubi retropulsa sunt exanthemata, insignem merentur laudem; quippe que lenem provocando sudorem, inimicam materiam simul expellunt, ac efflorescentiam ad corporis superficiem revocant.

§. V.

*Spasmi
cordis
per
injectionem.*

Quando cordis palpitatio ab insigniori plethora originem traxit, facietque crasso valde turgida adparet: præstat interdum sanguinem, ex tusa vena jugulari externa detrudere. Sed notandum circa talem est operationem, ut tepidiora pediluvia, & ante, & inter eam adhibeantur, ne nimius sit ad superiora sanguinis affluxus. Nonnunquam quoque necessitas postulat, ut præmittatur phlebotomia in pede; & ea in collo posthac instituantur.

ENARRATIONES MORBORUM.

OBSERVATIO I.

*Palpitatio
cordis a
repleto
sanguine
in corde.*

Generosa & venusta XVIII. annorum virgo, hilari & acuto ingenio prædita, succi & sanguinis plena, laeto vivendi generi adjecta, singulis fere pueritiæ annis sanguinis litis insignis ex naribus profluvium experta est. Quo ve-

ro per bienniumjam parcius succedente, exinde vel acerbiori capitis dolore, vel cordis vehementi pulsatione, magna cum molestia ad aliquot dies interdum perdurante, haud absque ingenti virium collapsu afficiebatur. Eadem quoque motu paulo validiori & animi & corporis vel repetebat vel ingravescebat cum pectoris oppressione & spirandi angustia, pulsu subinde intermitte & inequali conjuncta. Neque parum hic affectus capiebat incrementi, quando ex male concoctis alimentis dolore ventriculi tenso & pressorio cum flatibus & ructibus ore plurimis emellis angebatur. Ceterum vero notatu erat dignissimum, quod parentes, in adolescentia, similes plane affectus, nimirum & narium hæmorrhagias, & cordis palpitacionem fuerant experti. Hi igitur crebrius meam requirebant opem & consilium; equidem nolui multa suscita promittere, eo quod polyposi concrementsi quidpiam jam tum præcordis inhaerere judicabam. Ad levandum tamen malum suavi, ut sanguinem, qui ob copiosum mensium successum nunquam antea à chyrogo fuerat detractus, ex brachii vena bis vel quater mittere quotannis; à vino, quo una cum parentibus, qui in regione vinit abundante & cerevisie carente nati ac educati erant, liberalius inter cibum uti consueverat, impositum abstinere, & loco potus ordinarii aquam puram simplicem sumeret. Deinceps quoque animi ac corporis quietem commendavi, quibus effectum est, ut mutationibus deinde factis paroxysmis & corpus conturbatum & vires collapsæ incrementum cepissent. Denique vero elapsi aliquot annis ingenti mœrore ob parentis obitum perturbata, gravius afflicta, & febrem tandem superveniente hectica, è vivis sublata est.

Epietis.

Id non semel, sed sæpius observavi, sanguine ob nativam & hereditariam corporis dispositionem abundantes, sub primis ætatis annis, quando per aures crebrius sanguinem evacuarunt, hoc subsistens fluxus cephalalgis, imo cordis palpitacionibus valde tentari; ita quidem, ut accedente narium hæmorrhagia, cordis tremor desinat, illa vero vel immutata, vel penitus sublata invaleseat. Et sicuti dixi, quæ succos temperatos copiose ingenerat, eorumque ebullitionem concitat, causam omnino huic affectui subministrare valet: ita victus tenuis, potus aque simplicis loco vini vel cerevisie, sanguinis quoque superabundantis per vices repetita misio, non modo si corpus natura dispositum sit ad tale malum, id præservandi, sed etiam si præsens est, mitigandi vel sanandi insigni omnino energia valent; adeo, ut etiam polyposi in gignendis concretionibus, quæ sanguineæ complexionis hominibus valde sunt familiares, & nostrum affectum incurabilem efficiunt, facis valde resistant.

OBSERVATIO II.

Vir generosus XX. & aliquot annorum, patre aulico mere sanguineo, qui canonicæ quasi omnes, quæ à sanguinis copia nascuntur, morbos a primis pueritiæ annis passus fuerat, natus, gracilioris sed proceri corporis, validis, cum in Academia degeret, corporis exercitiis vacans, postea quoque in aula fortiori pilæ lûli adjectus, cum

*Palpitatio
cordis a
sanguine
in corde.*

cum aliquando per aliquot dies eidem incumbere exercitio, finis illo omnibus fere viribus collapsis in animi deliquium inadebat; subsequenti insigni cordis tremore, quo eo tempore à levi corporis vel etiam animi motu sæpius fortiter ad aliquot horas correptus fuit. Ipse vero, uti in aula mea est, nulla habita diæta & regiminis ratione, cum liberalius se ingurgietur vino, factum est, ut subsequenter annis, præsertim verno & autumnali tempore vires fumendo tam graviter sæpenumero priori remaneret afflictione, ut præ summa spirandi angustia & præcordiali anxietate ferme letaniamis jaceret; extremis algescerentibus, & facie ac pectore sudore frigido perfusa, pulsus languido & inæquali, quandoque etiam intermitteute. Ad mitigandos graviores, si forte incidebant paroxysmos, non præsentis inflexione dextri capitis latera ad terram elevatis curibus auxilium invenit. Suavi ego potum aque frigide, crebriores sanguinis è brachio dextro missiones, à spiritibus abstinentiam, atque ut quieti se daret, & quotannis aquis thermalibus Carolinis, quæ à molendino nomen habent, uteretur. Cui consilio etiam paruit, & rationa inde longeque minora expertus est pathemata.

Epiçrifa.

I. Sub validissimo ejusmodi & diutius durante exercitio, quia sanguinis ad cor, & omnis generis vasa vehementior est impulsus; fit inde, ut crebrius succedente vehementissima ventriculi cordis dextri, imo arteriæ pulmonalis expansione, robur fibrarum cordis & illius arteriæ, una cum systolica vi maxime imminuatur; ita, ut copiosius aggesto, & difficilior progrediens sanguini, qui convulsivæ cordis motui causam præbet rite propellendo non sit æqualis ac sufficient.

II. Quod vero ab inflexione capitis ad dextrum latus in terram, morbi vis statim remiserit, id inde factum existimo: quia sub tali fœtu impetuorum sanguinis ad dextrum cordis ventriculum per venam jugularem affluxus impeditur, ut postea eo melius congestum sanguinem per arterias expellere possit.

III. Sectio venarum jugularium, imo earum quæ in brachio sunt, in hoc morbo majoris est efficacie, quam ea quæ aliis locis ventilantur, quippe, quo proprius ea sit loco affecto, eo præsentius auxilium ferre observantur. Sed videndum maxime est, ne confertim & sensel, sed repetitis vicibus emittatur sanguis; ne impedio legitimo humorum ad cor affluxu, sublatæ sensu omni systole animi deliquium accersantur.

IV. Ad generationem vel augmentum polyorum in corde ejusque vas, qui subitum non modo vitæ exitum, sed & sensus & graves morbos, hydropem, asthmata, & id genus alios inferunt, præcavenda, ego simplici aquæ potu vel etiam thermis Carolinis, quæ sale abundant alcalino, præstantius vix aliquid inveni; sed opus est, ut mature id consilium exsequamur.

OBSERVATIO III.

Puer XII annorum, constitutionis teneritatis, ac macilentæ, temperamenti sanguinei, ob grave domus incendium, ingenti periculis terrore, protinus in cordis palpitacionem

incidit; quæ per intervalla longo tempore exercebat illum, & à pulsu maxime invalebat. Datus à Medico pulveris an epileptici cum opio remitti exacerbat malum; cui post aliquot septimanas, dolor hypochondrii prævaluens, interdum tenens, respirandique difficultas accedebat. Hinc judicium fuit, alij nationem ex obstructis hypochondriis fuisse laborantem; & ideo anthypochondriaci, aperientibus, manibus, aliisque, sed frustra pugnatum est remediis. Quare, cum nullum fore superfluum videretur consilium, per anni diuturnum omnem medicinarum usum resque eger; atque tandem mare extenuatus, pedum primo, mox totius abdominis tumore prehenderetur, cum insigni palpitacionis levamine; superiora marcescebant, adpenius peribat, ingens vexabat tussis, & hoc immedicabili pressus hydropæ, dicam obit supremum.

Epiçrifa.

Quod gravis terror cordis palpitacionem inducere possit; vel eo tempore doceatur, quo periculosa incendia urbis incolæ terrent: tum enim plures palpitante tremore insistentis discurre videntur; veluti hoc malum eo in casu esset epidemicum. Prout vero subsecutorum diversæ est constitutio; diversum quoque terror edit effectum, plus minus graviorem. In nostro puero mali vehementia adauxit opisthorum pulverum usus; quibus sanguis viscidior, & ad subeunda concretamenta opposuimus redditur. Atque cum tali ratione, morbus in principio inconvenienter tractatus, dein plane liti relictus fuit: non fieri potuit, quin humores hinc inde stagnaverint, eorumque serolis porio extravasata, hydropem generaverit. Tum vero, cum nimis succorum moles extra vasorum alveos extravasata, à corde derivata fuit; ejus motus palpitacionis omnino minor esse debuit.

OBSERVATIO IV.

Juvenis, annos natus XVIII. temperamenti cholericæ, tenerioris constitutionis, & vivacis ingenti, hausto post vehentem iracundiam copioso potu, eoque frigido, mox ingenti cordis palpitante motu corripitur. Is per integrum vexabat annum, ita ut per intervalla, mox aliquot horarum, mox diurnum recrudesceret; & à quavis humorum commotione, vel per vinum calidius, vel fortiores corporis motum, vel graviorem animi afflictum excitata, nec non ab usu ciborum flatulentiorum protinus rediret. Interim manebant integræ vires, adpenius avidior, sanguine vultus, torumque corpus surgebat: quare, in cassum dati vari generis antispasmodici, succineis, castoreis, pulveribus antiepileptici, pilulis aperientibus, aliisque, tandem sanguis, ex vena in pede rufa, singulis detrahebatur mensibus; quo facto, juvenis ille, à malo suo feliciter fuit liberatus.

Epiçrifa.

Varie in præsentis casu concurrunt causæ; quarum una alteri manus præbuit auxilium. Juvenis nimium ille ingenti humorum præditus copia, simulque ad eorum stagnaciones dispositus fuit. Accessit iracundia, quæ vim possidet exstinguendi, & ad habitum corporis compellen-

di sanguinem; potus vero frigidus eundem in orgasmo constitutum ad interiora validius rapiendi facultate pollet. Quamobrem hujus copia nondum imminuta, in cassum utique data fuerunt cuncta, utut praestantissima remedia. Praestat potius in tali casu, sanguinis molem venae sectionibus saepius repetitis imminuere; atque tum relaxata fibris, per congrua subsidia, veluti sunt martialia, pristinam infirmare robur.

OBSERVATIO V.

*Pulsus
cordis à
pulpa le-
vatus.*

XVIII. Adolescens annorum, celeberrimi archiatri filius, constitutionis tenerioris, post corpus pilae lusu ad calorem, sudoremque communem, copiosam ingurgitavit cervicem; neque vero ullam, praeter corporis lassitudinem, inde sensit molestiam. Elapsis duabus septimanis, largius hausit vinum; & insequente nocte protinus insigni capitis dolore, praecordiorum anxietate, vomitu, cordisque palpitatione corripitur. Hanc retinuit per quatuor annos, modo longioribus, modo brevioribus intervallis recurrentem, atque cum gravissimis semper suspensum anxietatibus: notabile tamen fuit, paroxysmos, incurvato corpore, vel reclinato ad dorsum capite, insigniter imminutos ac mitigatos fuisse. Si corpus fortiter commovebat, vinum large bibebat, aut animi quodam affectu exardebat; vel etiam in sinistro decumbebat latere, repente invadebat paroxysmus, sub quo urina ferebatur tenuis & aquosa. Usurpavit varii generis remedia, sed in cassum; quin martialia malum exacerbarent, sed frictions pedum, ac clystera semper levamen ferebant. Tandem se consulit ad Bremenſe Gymnasium ubi victu sano, ac aëre marino usus, pejus semper habere coepit; donec tandem mortuus in lecto repertus fuit. Cadavere aperto, cor mixte fuit magnitudinis; & dexter maxime ventriculus, cum pulmonibus à cruore valde distensus adhaeruit; sinistrum ausem thalamum, & arteriam sortam polyposa ebulliente concretio.

Epijisi.

Mors in hoc casu clarissime ostendit, polyposam concretionem cordis palpitacioni causam dedisse: quae qua potissimum ratione, ab hausu potus frigidi, corpori commoto ac calenti ingesto, generetur *Obs. 2.* jam docuimus. Hujus ergo cum prima jam posita fuerunt rudimenta; accedens copiosior vini potatio, adauxit humorum circulum, eosque celerius per cordis motus miculum: qui, debilitato naturali robore, à nimia sanguinis mole oppressus, & ad validum, palpitantemque incitatus fuit resistendum.

2) Increſcente ſensum polypo, non mirum est, si paroxysmus a quovis humorum orgasmis, per iram, terrorem, motum, vini potum, quin etiam frigus ac martialia, excitatus fuit & adauxit. Horum enim omnium ea est natura, ut partes externas confringendo, vel sanguinem nimium commovendo, humores majore nisu ad praecordia compellant, quam quidem cor illud repellere potest. Observamus igitur saepius, quod in hisce paroxysmis, extremorum & inferioris abdominis aulse quaelam consensio: hinc urinae tum tectae minguntur, & clystres pariter, ac

pedum frictions, horum spasmus relaxando, solentur misceri.

3) Quando in sinistro latere decubuit, paroxysmus eam ob rationem revocatus fuit, quoniam pulvis liber orificio arteriae magnae se tum opponebat, sanguinique circulum perturbando, malum excitavit. Neque dubium est, quin in fomo ex hoc situ fuerit suffocatus.

4) Omnis crassus, marinus, humidus ac frigidus aër, subiecti cordis palpitacione laborantibus infensus est: is enim confringendo externum corporis habitum, succos ad interiora magis cogit, & ad eorum spissitudinem ac dyserasiam multum contribuit. Neque vero calidior aër, qui humores nimis rarsificandi vim possidet, is convenit; sed ferrens, qui nec justo calidior, nec solito frigidior est.

OBSERVATIO VI.

Vir generosus, militiae praefectus, xxx. annorum, temperamentis sanguineo-choleteri, post vehementiorem per aliquot miliaria equitationem, paulo liberalius vino generoso indulsit, veneremque simul exercit immoderatam. Nox quae sequebatur erat inquietas, & gravi cordis palpitacione interrupta; quae per aliquot etiam dies graviter, & per intervalla perseflebat. Conqueſtus insuper de viribus proliis dejectis, & totius corporis delatitate, ex consilio Medici, aquam mellilae siccissimam, quam *ſean des Carmes* vocant, paulo majori copia sumxit. At malum validius, praeteritis noctibus circa horam matutinam tertium, summa cum molestia invadebat, ac per aliquot horas, cum copioso sudore, tantaque anxietate adhaerebat, ut lectum deserere, & discurrere coegeretur: ceterum alvus non rite respondebat, & hypochondria flatibus dilendebantur. Elapso mensis spatio, cum meam quoque flagitare: orem, inquiri in antealetum viae genus; atque sic percipi, ipsum ante decem annos, sicuti cruento, cum hypochondriaci passionibus laborasse; nec non cruorem per venas haemorrhoidales profuſisse; atque elapſo abhinc anno, nec tam negligui habuisse phlebotomiam. His exhortatis, cum insuper plenum deprehenderem pulsum, dedi consilium, ut detracta protinus ex vena in pede tusa, sanguinis larga portione, loco cerevisiae, aquam puram fontanam, cum quarta vini parte remixtam biberet; & cubitum iturus pulverem Marchionis, cum nitro, ac succino, *calſia* methodo preparato, ex aqua mellilae sumeret. Quibus recte adhibitis, egregie habuit.

Epijisi.

Ad generationem molesti hujus mali, plures utique in hoc casu conspirant causae: nimirum 1) nimia sanguinis ob vasorum corporis dispositionem, & omisſam venae sectionem generata abundantia, 2) vehementior corporis commotio, 3) immoderatio vini ingurgitatio, 4) veneris intemperantia, & 5) remediorum analepticorum abusus. Ex hisce vero momentis prudens Medicus, omnino venae medendi indicationes poterit invenire; quippe, quae in eo consistunt, ut imminuta sanguinis mole, illius nimia expansio ac turgescenza sistatur. Huic autem scopo obtinendo, nihil aliis venae sectione, ac aquae frigidae potu, nec utilius, nec convenientius est. Quanto pretio phlebotomiam

*Pulsus
cordis à
vortic
congit ſi-
ferentia.*

ſuo

suo jam tempore habuerit GALENUS in persanando hoc malo; testatur *Lib. V. de loc. affect. Cap. 2.* Etenim palpitatione cordis, inquit, pluribus integræ valetudine degentibus, tum adolescentibus, tum adultis, subito sine alio mensiſſo acciderit cœcitæ viſa eſt, atque omnes eos sanguinis detractione juvis; & hoc acciderit plane liberati sunt, qui post sanguinis miſſionem, tenui viliſſim, ſimulbuſque medicamentis uſi ſunt: quas vero huiusmodi acciderit rursus inſuſcepit, eadem cura ſanatos vidit. Quod ad ponum aquæ frigidae, fontanæ ſimplicis attinet; ego certe eximiam, & plane ſingularem ad levandum hoc malum, ſive à nimia ſanguinis exundantia, ſive ex nimio illius ac virium defectu obortum fuerit, ab ejuſmodi pota, moderatus & crebrius ſuſto deprehendi; eo quod exaſſuantem nimis ſanguinem deprimat, vires diſſipatas colligat, fibræque relaxatas roborat.

OBSERVATIO VII.

Palpitatio
in fine à
trementum
sani equi
tatione ex-
torta.

Dum hæc ſcribo, requirit meum per litteras iudicium illuſtris quidam Tranſylvaniæ Liber Baro, annorum LXIII. temperamenti cholericæ-melancholici, continuèque curis ac laboribus implicatus. Hæc ante aliquot menses, ceteroquin ſanus, ad vicinos iter facturus campos, equo inſedit ferociori ac inſolentiori; & furiori moleſtaque ſuccuſſatione, corpus ad ſinecſtrem vergens, vehementer conquaſſavit. Deſcendens equo, protinus in tantum incidit cordis palpitationem; que non minus ſilium pectori admotas valide ſeriebat, ſed veſtimenta quoque violenter vibrabat; virumque illuſtrem per integrum ac dimidium horam adeo premebat, ut loqui haud potuerit. Vena quarto abhinc die tundeſcitur: ſed niſi minus moleſta palpitatione, ut priori levior, per vires recurrebat, & adhuc vexat: paſſus animi, qui antea benignior erat, atque bilior, inſignis roſitate, continuis vigilis, & ſomno, ſi forſan accederet, multis terriſſimis, inqumertique phantaſiæ luſis interrupto.

Epicriſis.

Diſcimus ex hoc caſu, quantum detrimenti iis, qui ſpiſſis humoribus imbuti, aut polypotiſ rudimentis præditi ſunt, inferat fortior corporis motus. Quemadmodum enim hic, ſi placidior fuerit, ad reſolvendum humorum coagulum, multum conſert: ita ſane, ſi fortior ac immoderatio ſit, non modo ad generandoſ polypot contribuit, verum etiam illos læpeſtremo à firmitiori coheſione avellit, & agros viæ ſubmittit periculo. Idem occaſionalem præbuit cauſam palpitationi cordis, qua Vir illuſtris premitur: dum humores craſſos, viſcidoſque, quos ille, ob vitam laborum ac ærummarum plenam, ſibi contraxit, nimium commovit, vel rudimenta polypotiſ, que forſan obſederunt cor, avulſit. Optaſſem hæc ut ſtatim inciſa fuiſſet vena; quoniam tali ratione augmenta morbi præpediri potuiſſent. Interim conſendavi, ut eam adhuc, ſi ſanguis abundaverit, inſiluit, ac ſingulis binis menſibus terari curaret; non minus pediluvii tepidioribus uteretur; & quum in ea regione vino calidiori Hungarico animas indulgere ſolent, hoc vitaret, & potius aquam vel ſolam, vel cum cinamomo decoctam potaret: quibus non dubito, quin ſi curatiua

polypſi firmas egerint radices, morbi ſanationem, ſub convenienti victus obſervatione, & motus corporis moderationi exercitatione, firmus impetram.

OBSERVATIO VIII.

Illuſtris foemina, XXX. annorum, teneræ ſed vegetæ conſtitutionis, animi tamen ſenſibilioris, ſertia vice puerpera, quarto poſt partum die ad lac reprimendum, quod ipſi infanti præbere noluit, uſa eſt epithimæ, mammaſ lacte admodum turgentibus appoſito; & ex cicuta aquatica, deteſtabili obſetricis errore pro herba petroleſini habita, conſecto. Senſit mox inde ingentem cum dolore pungitivo, rubore & præcordiorum anxietate ardorem; poſſideſſe copioſe in mammaſ apparebant veſicæ, ſans laze; que remoto epithimæ acerrimam eſſuſerunt materiam; ſed inde peſſime habuit puerpera; ſumma enim ſpirandi anguſtia, & ingenti cordis palpitatione ac tremore vexabatur. Chirurgus ad eryſipelaceum tumorem & dolorem levandum adſcribat unguentum de ceruſſa; quo factum eſt, ut non priora modo ſymptomata, ſed corda etiam convulſivi motus ita invaleſcerent, ut accedente virum, & adpetentia, nec non ſomni totali defectu, corporiſque marcote increſcente, data jam à conſellario benedictione, ſæpius animam exſpiratura videretur. Alvus præterea valde erat adſtricta, ſitis inextinguibilis, ob apthas, ac puſtulas ardentes faucium ingravateſcens; que ſymptomata cum cordis palpitatione per tres inſtarebant menses. Tandem vero ſequuto moleſtiſſimo ſalſivæ, per quatuordecim ſere dies inſiſtente fluxu, & cordis palpitatione, & reliqua ſymptomata ſenſim ſenſimque evaneſcebant. Sed ab eo tempore per tres jam annos conſiſtata ſuit pathemaſiſus hypochondriaco-hyſtericæ cum melancholia junctis. Anque in hoc aſſectu meum deſiderata conſilium ex Luſitania inferiori hac acceſſit. Ego per ætatem ordinavi curam fontis Selterianæ, cum tertia lactis almini parte mixti; qua abſoluta, non ſine fructu uſa eſt balneo Lauchſtadienſi. Neque vero à pathemaſiſus hypochondriacis, autumno, hiemeque maxime adſiſtentibus plane libera, per aliquot annos magno cum emolumento adhibuit aciculæ Selterianæ cum lacte, & liquorem anodynum cum pulvere præcipitante, non neglecto decocti temperantis, ac elixiri viſceralis uſu.

Epicriſis.

I. Memorabilis hoc in caſu eſt pernicioſis cicute aquaticæ, extrinſecus applicatæ eſſectus, qui à tenuiſſimo ſale acri inflammante, nervæ cordis, & diaphragmatis fibras conſtelleſcente deduci debet: quippe quod tam firmiter iis inhaereſcit, ut perſeverantem per tres menſes cordis palpitationem produxerit. Quemadmodum vero omnium ejuſmodi venenorum viſ opime liquidis, & acrimoniæ demulcentibus inſingitur: ita & in hoc caſu, à maturo lactis & emulſionum uſu optimum ſperandum fuiſſe præſidium certiffime perſuaſum fuit.

II. Notatu, imo admiratione dignum eſt, quod venenum illud vegetabile in exſtandis apthas à largo ſaliſſe profluio, quaſi: gara ob ſuppreſſa via morbi eſt, ſimilem ſere inducant ad viam cum mercuriali veneno habuerit.

HL.

Cardi
palpitatio
in fine à
trementum
sani equi
tatione ex-
torta.

III. Noxia vero omni procul dubio fuit applicatio emplastrum, liberio rem veneni diffusionem inhibens, quo magis ad interiora conversum est.

IV. Foemina nunquam fuit antea in passionem hypochondriacam vel melancholicam propterea; quae ob summe debilitatum nervosarum partium, inque primis ventriculi & intestinorum, systema per tam immanem vim morbi demum producta est. Quare etiam ea remedia praecipua, quae blanda & demulcente virtute acrimoniam obtundunt, & nervosis partibus, temperatum motum iis conciliando amica sunt.

CAPUT II.

De Asthmate Convulsivo, & spasmodico flatulento.

THESES PATHOLOGICAE.

§. I.

Respiratio
tremor
esset.

Vetus, sed verissima, & Medicorum & vulgi est sententia, respirationem & vitam pari ambulare passim. Vitam, omnesque, quibus illa conservatur, functiones, magno illo ac universali sanguinis ex corde ad omnes partes, & ex his ad cor circuitu absolvi, certissimum quidem est: nihil tamen scius hunc, & consequenter ipsam vitam, absque particulari, ea, ac minori, quae sit ex dextro cordis ventriculo per pulmones ad sinistram, humorum circulatione, salvam esse ac subsistere nunquam posse, adeo verum deprehenditur, ut hac cessante, protinus vita, omniumque functionum expiraret exercitium. Quam vero hic sanguis per pulmones circuitus, absque libera respiratione fieri omnino nequeat; facile iudicare licet, quantum ad conservandam vitam momentum contribuat facilis, & secundum naturam se habens spiratio; & contra quanto sit damno eadem morbo, impedita, vel plane intercepta: cuius rei clarissimum documentum illi praebet morbi, qui spirandi difficultatem habent comitem.

§. II.

Asthma
dignetur.

Sunt equidem magnae, & quam plurimae aegritudines, quibus difficultas ac laboriosa, tanquam molestem symptomata, jungitur spiratio; maximeque tales, quae in pulmonibus fixam obtinent sedem, veluti pleuritis, peripneumonia, tussis, phthisis, scirrhi, tubercula, & vomicae pulmonum: atque multae insuper damnum tam intra, quam extra thoracem causas, quae respirationi, & vitali humorum circulationi insensae, sentium minantur periculum, & morbum producant, qui Graecis *asthma* nomine venit. Hoc vero secundum nostrum sententiam nihil est, quam impedita, & laboriosa admodum respiratio; cum inestabili anxietate, & praecordiorum angustia iuncta, liberum sanguinis per pulmones circuitum turbans, a variis causis suborta, periculi suffocationis non experti.

§. III.

Diffinitio
asthma
convulsivi
esset.

Quemadmodum variae sunt causae, ita varia quoque asthmatum occurrunt genera. Datur dyspnoea quaedam levior; quae subiectis succo-

rum plenis, corpulentis, atque pinguibus familiaris est, maxime si corpus valde commoverint; & nititur quoque difficultati sanguinis per pulmones progressu, & nimia valorum expansione, aeris ingressum sufficientem praepediens: sed hac periculo vacat, & transitoria est. Deinceps occurrit *asthma pituitosum*, quod cum tussis humida, ac reiectione pituitae viscidae conjunctum, noctu dieque sub quocunque corporis situ infestat, & copiosiori mucis viscidis, vesiculis pulmonales obdicens, & aeris liberio rem ingressum & egressum praepediens, ad praecordia aggressioni debetur. De hoc autem *satis sequenti medic. Syst.* differemus, & jam de eo potissimum agere constitimus, quod à spasmodica partium spirationis dictaturum strictura, à diversis generis causis, intra & extra thoracem consistentibus, oborta gignitur, & vocatur *spasmodico* flatulentum, atque convulsivum.

§. IV.

Hoc vero convulsivum asthma differt omnino à suffocatione convulsiva hysteriarum, quae non nisi spasmodica constrictione, ac veluti strangulatione summorum faucium, laryngis, atque pharyngis nititur; & arctato laryngis canale, aeri sufficiens libertatemque ad pulmones iter praecindit: cum in nostro adfectu transitus per arteriam asperam satis liber sit, & vitium in ipsis potius haereat pulmonibus, adeo, ut nunquam sola inspiratio difficilis, expiratio vero legitime succedat; testante casu in *Consil. med. Tom. I. Sect. II. cap. 91.* recensito. Differere porro oportet asthma convulsivum, à catharo suffocatione, quippe qui cum vultus rubore, stertoreque stipatus, paralytici quid involvit, & intra paucos dies solvitur, cum illud, stertore vacuum, ad morbos pertinet longos.

§. V.

Asthmatis incepturi notae optime ab ARTEO Lib. III. cap. 11. descriptae, haec sunt: gravitas pectoris, tarditas ad opus solitum, & ad aliud quolibet gerendum: in cursu, aut in acclivi itinere difficultas & agra spiratio: ranceusque, ac tussinis, flatus in praecordia, atque eructationes praeter rationem excitantur: vigilant, nocturnae parum & obscure incalescunt: nares aetiae & ad spirationem paratas habent. Si malum in pedes ruat; male rubens, oculi prominent, veluti in itinere strangulantur: stertunt dum vigilant, morbo magis cum dormiunt; humida, obfusa, sonoque carens vox est: multum & frigidum aërem cupiunt; sub dio ambulant, quolibet cum domus ipsi ad trabendum spiritum parva & angusta est. Erelli spirant, tanquam omni aëre attrito petiri cupientes; pro aëris autem cupiditate & os aperientes, patellaeque, tanquam eo ampliore indigentes. Ipsorum facies, praeter molli quae rubens, pallida est; super circa frontem & jugula emanat; effrida & aspera tussis infestat; rejiciantur pauca, tenuia, frigida, veluti quadam spuma efflorescentia; inflante spiritu collum intumescit, praecordia revulsa sunt; articularum pulsus parvi, crebri, atque depressi; crura exilia. Quod si haec ulterius incrementa acciperint, insitit coarctatus morbi nonnunquam hominem strangulanti. At si vertantur in melius, tussis longior & rarior fiet; plura excremur semiosa spumosa & humidiora; multa per ventrem aqua ex-

Differens
à suffocatione
hysteriarum.

A catharo
suffocatio.

Signa
asthma
convulsivi.

ur habentur; urina copiosa excrevitur, licet nondum quicquam in ea substat; vox sonantior, clariorque raddetur, summi longiores, quantum satis fuerit, efficiuntur; præcordia remittuntur; dolor interdum ad scapulas in remissione transiit; anhelitus raris, lenis, sed cum vocis asperitate sit.

§. VI.

Quo magis invaluit ac inveteravit malum, eo acerbiora ac vehementiora hæc omnia sunt. Alvus ceterum plerumque est adstrictior; & urinæ minguntur tenues ac aquosæ. Accedunt frequentissime pedum, dein manuum, faciei, ac dorsii tumores, brachiorum torpor; facies fit livida, plumbeoque colore notata, jungitur febricula cum typo irregulari, vespertinis exacerbata temporibus; supervenit cachectica corporis deoscedatio, cum tumore pedum oedematosis, hydrops pectoris, vel etiam ascites, ac anasarca; atque tandem associatur paralytica alterutrius lateris, vel saltem brachii resolutio; aut loco hujus, quod notabile est, amaurosis, quæ est oculorum paralytis, observata fuit a GOHLIO in Schediasmate, de *asthmate convulsivo à polypo cordis*. Et quoniam tantum non semper suffocatione finitur hoc asthma, dicitur quoque suffocativum.

§. VII.

Attenta vero experientia docet, eos potissimum homines, qui sunt temperamenti languinei, valis exilioribus, tamen copiosis instructi, obesos, plethorici, pectoris angustioris: post vehementiorem animi, vel corporis commotionem, quacunque de causa fiat, tempore præserim vernali, & autumnali in affectum asthmaticum esse proclives. Multo magis eo tentantur, si mensum ac hæmorrhoidum inordinatum fluxu, vel plane defectu laborant, aut congestas sanguinis massiones, per scarificationem, vel venarum incisionem intenuerunt: nec non si fuerint hypochondriaci, & ventriculus ac intestinorum canalis, ob turbatum vel pervertitum motum peristalticum, flatibus scatant, & spatium adligantur. Eo certius hæc incommoda patiuntur, si excretiones sibi acris per quascunque vias fuerint suppressæ, aut languide succedant.

§. VIII.

Si dispiciamus, eorum, qui hoc morbo perierant, anatomicam sectionem, deprehendimus plerumque fluctuationes aquarum in pectore, una cum polyposi in corde concretis; quales casus allegant CAR. PISO de morb. ex eo *livie serosa* pag. 214. SCULTETUS in *append. observ.* 31. pag. 252. ACT. MEDIC. BEROL. Dec. II. vol. VII. pag. 67. In quibusdam sola seri in pectore extravasatio, absque cordis polypo reperitur; qualis est observatio, quam ACT. BEROL. Dec. II. vol. VIII. pag. 21. referunt, ubi simul aorta fuit offesa. Contra in aliis pulmones sanguine atro, stagnante, extravasato infarcti reperiuntur, veluti WILISIIUS *pharm. rat. Scd. VII. Cap. 3. exemplo* ostendit; nonnunquam salvis pulmonibus, & bronchiis, polyposa duntaxat in corde concretamenta occurrunt, testantibus observationibus, quas PEZOLDUS *obs.* 58. pag. 115. M. N. C. Dec. III. anno II. *obs.* 185. & Dec. I. anno IV. *obs.* 11. memoria tradiderunt; ut aliorum,

de quibus infra passim mentio fiet, exemplorum historiam silentio prætermittam.

§. IX.

Quo vero eo clarius adpareat, qua ratione asthmaticus noster morbus generari queat, oportet citi pretium, pauca de respirationis negotio hoc loco præmittere. Ad respirationem itaque naturalem opus primum est, ut ingens illud pulmonum viscus, quod ex innumeris vasibus sanguiferis, arteriis & venosis, fistulis quoque & vesiculis membranaceis est contextum, à fluido atmosphærico, elastico, æreo-zithereo, ampliatæ per alleviationem costarum thoracis cavitate, ingrediente, sufficienter expandatur. Hac expansione fit, ut per ramos & arteriosos & venosus, qui antea valde erant complicati, jam expansos, sanguis libero, & minus impedito iinere per pulmones, & ad sinistram cordis ventriculum progressus queat; quoniam pressio vasorum sanguineorum, à vesiculis aëre distensis facta, hunc progressum faciliat. Quum vero aër intra pulmones humidis vaporibus repletus, & elasticitate sua orbatus, iterum exire, & loco hujus reccos, ac vi expansiva elastica animatus rursus ingredi debet; necesse est omnino, ut thorax concidat, factu ejus cavitatis spatio angustiori. Alternans ergo dilatio, & contractio thoracis, expansio & contractio pulmonum, sufficiens ingressus & egressus aëris, & cordis æquabilis motus, liberam & naturalem efficiunt respirationem, ad vitam sanitatemque conservandam summe necessariam. Quando vero cunque causæ quædam obveniunt, quæ sufficientem aëris in pulmones ingressum & egressum remorantur, vel musculorum thoracis item aldominis, squæque transversæ motum dilatatorum ac contractorum, atque ipsius cordis convenientem systolem, atque diastolem pervertunt; protinus morbus ille, quem explanandum suscepimus, allumatus præsens est.

§. X.

Quibus suppositis, facillimum jam erit, ætiologiam asthmatis spasmodici ob oculos ponere. Et quoniam varis illius existunt causis; primum considerabimus illam, quæ sanguinis vicio debetur. Atque hac ratione obicervamus, a sanguinis & humorum nimia mole, crassitie, & congestione ad præcordia, grave generari asthma. Quando enim sanguinis & humorum massa majori copia, & impetu ad cordis dextrum ventriculum irruit; majori quoque quantitate ad ramos vasorum pulmonalium congeritur, qua vis aëris inspirati elastica ob sanguinem nimium resistentem imminuitur; & ideo sanguis, qui non satis vegete propellitur per vnam pulmonalem, in hujus ramulis stagnat; atque novus ille, quem cordis perpetuus pulvis adfert, vasorum ramos distendit, dilatatque: unde sistandi difficultas, summa anxietas, cordis tremor, ac palpitatio, cum pulsu inæquali, parvo, celeri & frequentu vocis murmurantur natales. Hoc asthma sanguineum vocari quoque meretur spasmodicum; quoniam stagnantes cruor nimium distendit & vasâ, & nervorum ramulos & vesiculas membranaceas comprimit. Jam vero perpetuæ insular regulæ tenendum est, quod nimia tunicarum nervarum à copiosis stagnante in iis cruore expansio, causam præbeat contractioni spasmodicæ; & vicissim hæc ipsa ad stagnationem

Respiratio negotium expanditur.

Asthma spasmodicum sanguineum.

Uterior morbo hujus.

Subpelle asthmatis convulsivi.

Defunctorum sectiones.

tione & congestione humorum multum faciat. Huc pertinent exempla eorum, quorum pulmones post mortem, sanguine atro, flagrant, & extravasato infarcti fuerunt reperti: quale de sacerdote (quod hominum genus propter febrem, & fermentationem, humorem congestioni ad pulmones præ reliquis obnoxium est) allegat WILLISIUS *pharm. rat. Sect. VII. cap. 3.*

§. XI.

*Asthma
hypochondri-
ace*

Hoc genus asthmatis admodum familiare deprehenditur hypochondriaci; quoniam in his humores vitales, qui crassiores plurumque sunt, ob inferiorum partium stricturas, majori ad præcordia compelluntur quantitate. Complicatur vero in his subjectis tantum non semper flatulentæ ventriculi, primarumque regionum distentiones; atque malum reddunt longe deterius. Namque dum diaphragma proxime incumbit ventriculo; ab hoc flatibus dilento, protinus additur; ejusque liberior motus impeditur, atque hinc etiam pulmonum debita expansio coarctatur. Præterea sæpius fit, ut spasmo constringatur seipsum illud nervolum; quo constricto, oesophagus quoque, qui illud perforat, adeo coarctatur, ut nullas erupitur vaporibus patcat exitus. Inde angustia præcordiorum horrendum in modum exacerbatur; & solutis quodammodo vasis, ructus incredibili & copia, & sonitu exploduntur, malique levamen inferunt.

§. XII.

*Asthma
convulsivum
stricturæ
in
diaphragmate*

Quod strictæ convulsivæ nomen meretur asthma, & suis frequens occurrat, sit abque præsentia crasse materialis causæ, à spasmica partium spiratoriæ infervientium, maximeque membranarum cellularum pulmonalis intestientium constrictione. Dum enim tunica nervosa septi transversi, dum membranaeque musculorum intercostalium partes, dum sensibiles, quæ pulmonum cellularum quadrigingentæ membranae spasmico constringuntur: arctatur thoracis spatium, coarctatur pulmonum expansio, impeditur aeris sufficiens in cellularum pulmonales introitus, & cruoris per pulmones transitus, ac ex uno in alterum cordis ventriculorum circuitus mirifice retardatur. Quam vero constrictione pectoris regiones nervos suos mutantur à vertebraibus, atque dorsalibus, qui etiam ad brachia ramos mittunt; facile patet, cur totum pectus cum brachiis grave ac tensum sit, scapulae, dorsum, ac sternum dolore corripiantur, atque brachia torpore, quin tandem quoque paralyti, ob impedimentum à strictura liquidæ nervi infusum, adiciantur.

§. XIII.

*Causæ
asthmatis
convulsivæ*

Hæ spasmica constrictiones precipitantur à materia acri, subtili, caustica, quin sæpe virulenta, ad diætas nervosas præcordiorum partes incumbente: quæ generatur, atque originem suam repetit à sudorem, maxime in scorbuticis, repulsionem; nec non exanthematum, efflorescentiarum, & quarumcunque feri ac lymphæ acrioris excretionum, vel ad acutus exteriores depositionum, non sufficienti evacuatione, vel improvida adstrictione. Sic testatur multiplex experientia, malum nostrum exoriri, ab erysipellate, variolis, maximeque morbillis, purpura, maculis & pustulis quibuscunque scorbuticis, haud

satis ad corporis superficiem ulla, aut crasso adstringentium usque retroactis; à scælie, tinea, vel achoribus capitis, crusta lactea, per olosa, pinguis, aut linimenta sulphurea, præposuere exsiccatis; à pedum fetore represso; à transpiratione totius corporis fovea colubita; qualis casus reperitur in *Consil. med. Tom. I. Sect. II. cap. 90.* ab ulceribus chronicis, vel fonticulis inopportune consolidatis; qualis observatio de asthma convulsivo ab ulcere scrofi peripneumonia, aqua mercuriali exsiccatæ onno invenitur *Lib. cit. Tom. II. Sect. III. cap. 64.* à podagra vel arthritide partim ex defectu visum, partim male seriatis artibus retrocedente, uti quidem de podagra calus *Consil. med. Tom. I. Sect. II. cap. 93.* de arthritide *Tom. I. Sect. II. cap. 92.* interit testantur.

§. XIV.

Huc fere pertinet asthma illud spasmoticum siccum, quod à sanis metallicis, saturninis, sulphureis, venenatis, arteriæcibus, carbonum fossilium, ac exhalationibus aque fortis, his præsertim evenit, qui in metallis laborant, uti sunt metallicolæ, & quodam fabrorum genus; *Consil. med. Tom. I. Metallurgia morbifica; & in ACT. MEDIC. BEROLINENS. Dec. I. vol. VI. pag. 31.* casus recentior, de fabro ex attractis cineribus metallicis inter os malleo tundendum in asthma convulsivum delapsus. Terminusque & virulenti illiusmodi vapores, per inspirationem attracti, incumbunt nervosis vesicularum pulmonalium membranis, haliq; constringendo, libero ac intimiori aëri in eas accessus iter præcludunt, ideoque grave hoc machinantur malum.

§. XV.

Sola diaphragmatis strictura spasmotica, absque ullo pulmonum vicio, sufficiens est, totum respiratoris negotium perturbandi, & repentinam suffocationem inducendi. In recenti adhuc memoria mihi sunt viri notabiles, sed tristes simul casus, ubi subiecta antehac per omnia sana, ex gravi percussione scrobiculi cordis, & ejus regionis, cui adnexum reperiuntur septum transversum, subito perierunt suffocata; post momentum dissecata, nullum ostenderunt in toto corpore vitium, quam levem in tendinea diaphragmatis parte fugillationem, ejusque stricturam. Neque minus observatio constat, vulnera in idem diaphragmatis centrum, punctum inflicta, momentaneam insulisse suffocationem; ut tacite spirandi funnam difficultatem, quæ ex nervosis illius septi inflammatione percipitur. Neque obscura est ratio: constrictum enim diaphragma reinet convexum, qui sub inspiratione planus esse deberet, sum; quo thoracis cavitatem adeo coarctat, ut pulmones non suis expandi queant.

§. XVI.

Neque silentio prætereundum est asthma illud spasmoticum, quod in cachecticis a turre cedematosa pedum, quancunque de capilla intra corpus repulso, cum gravi pectoris oppressionem, & anxietate originem trahit. Ratio fere est eadem cum asthma sanguineo: namque fere illud ipsum ac vappidium, quod in pedibus stagnavit, dum indoluit ipsi strictura sursum repellitur, absorbetur à venis sanguiferis, & ad præcordia fertur. Itò ex dextro cordis ventriculo

*Asthma
convulsivum
stricturæ
in
diaphragmate*

*Asthma
suffocativum
a
stricturæ
in
diaphragmate*

*Asthma
sanguineo
cedematosa
pedum*

culo cum reliquis humorum massa, in arteriam pulmonalem; eoque ramulos pulsum, hoc tanta replet copia, quæ comprimendo simul vesicas pulmonales, resistit irruenti aëri, ejulque ingreditur, ad propellendum per venas cruorem sufficientem remanet. Ergo stagnat ille sero viscido repletus sanguis in arteriosis ramulis, hos graviter distendit, & sic futuram anxietatem, spirandi difficultatem, ac interdum repentinam suffocationem inducit: quæ ferè certissima est, si pedum oedemata repelluntur in iis, quorum corda polypis obiecta sunt. Et observavi in ejusmodi subiectis, quod, si febre intermittente correpta fuerunt, sub frigoris accessione pedum tumores subito evanuerint, ingentem spirationis angustiam, quin tertio semper paroxysmo repentinam sub ipso frigore post se traxerint suffocationem; qualem calum *Consult. med. Tom. I. Sect. II. casu 62.* inferui.

§. XVII.

Asthma suffocativum a polypis cordis.

Datur *asthma*, quod magis *suffocativum* dici meretur, & à polypis cordis ventriculos obfidentibus laboratur. Hoc non raro in repentinam definit suffocationem, & post mortem nihil in corpore ostendit præternaturale, quam polypus; si cui testatur observatio à RIVERRIO *Cenot. I. obs. 62.* TULPIO *Lib. I. cap. 27.* PEZOLD. *obs. 58. pag. 115. A. N. C. dec. III. anno II. obs. 185. allegata &c.* Dum enim polypus concrementis, maxime si similium cordis obfiderint thalamum, præcitant sanguini à pulmonibus redituro iter, accumulatur ille in pulmonum vasis, distendit ea, impedit accessum aëris; atque non remoto polypolo repagulo, in lethiferam proflus statim & suffocationem terminatur.

§. XVIII.

Asthma suffocativum à hydropis pleuritici.

Hydrops denique pectoris, quamquam pleuraeque sit perniciolosus asthmatis convulsivus effluxus, attamen & ab hoc, & ab aliis causis, v. g. pulmonum inflammatione, vel violentia extrinsecus illata dec. ortus, gravi asthmatis suffocativo suppeditat causam. Uti præfatio est, hæc fere sunt notæ: Tumor oedematosis non pedes solum, verum etiam manus occupat; harum enim tumorem, pro pathognomonico hujus affectus signo, solertissimus jam agnoscit BAGLIVUS, dum *Prax. Med. Lib. I. dicit*; quod illis, qui pectoris hydropis laborant, manus intumescunt, immo totum quandoque brachium ad cubitum usque. Observatur quoque in iis quarum in pectore fluctuatio, cin. *Gegnaddere*, præprimis si corpus ad latera inclinet, tremor cordis, torpor, ac paralysis brachiorum, tussis sicca, interdum serum pellucidum secum ducens, ac febris anomala. Quando cordis polypus complicatur, quod plerumque fit, adfuit cordis palpitaciones, & arteriarum intermittens pulsus.

§. XIX.

Hydrops pectoris generalis.

Est vero pectoris hydrops, fluctuatio & extravasatio lymphæ atque feri in cavitae pectoris; & sequentem in modum generatur. Extimam pulmonum tunicam copiosissimis vasibus lymphaticis repletam esse, eleganter describit ac delineat Clarissimus ADECRIGUS in *Adnot. curios. pag. 141.* Hæcce vas non minus, quam reliqua lymphatica, pectus nullis in locis obfidentis, revehunt: laicem suam ad ductum thoracicum, ut ex hoc per venam subclaviam atque cavam, ad dextrum cordis sinum ventriculum. Quando vero *Frid. Hoffmanni Oper. Tom. III.*

huic lymphæ itineri obex ponitur, ut ad ductum illum pertingere nequeat; vasa lymphatica nimium infarciuntur, tandemque ultra sphaeram elasticitatis distensa, rumpuntur, laicemque in cavum effundunt pectoris. Quam igitur spasmodicæ paritum spirationi dicatarum, maximeque pulmonum, stricture, quæ asthma convulsivum producunt, cubileant ac remouentur lymphæ ad ductum thoracicum iter: facile patet, qua ratione tandem hydropem pectoris pariant. Hæc vicissim aquarum in pectore collectio, dum totam thoracis replet cavitatem, & septum quoque adgratet transversum; nullum pulmonibus siccæ expandendi spaciū relinquit, ideoque & sanguinis, & aëris in illos ingressum, ac liberum circuitum remouendo, asthma inducit suffocativum; quia nimium suffocando tandem jugulat mîseros. Interim extravasata hæc aqua, immittens ipsi pulmones non modo colligat; venam etiam notæ temporis acriter reddit, eos ardit, ac putredine fere consumit, adnotante HARDERO *Lib. I. obs. 51. pag. 217.* Quod attinet pericardii hydropem; ille non solum eodem modo ex vasis lymphaticis, cordis superficie ambricibus, contingere potest; verum etiam à sero, per auriculæ, stagnante cruore infarctas, succedente adaugetur.

§. XX.

Neque vero negligenda est ea hydropsis in pectore species, quæ hydratidibus veluti lacculo inclusa continetur, maximeque intra ipsam pulmonum substantiam reperiunda est. Multæ occurrunt observationes de hydratidibus ejusmodi, non modo in pulmonibus, verum etiam pleura, septo transverso, & cordis externa superficie reperis; quales vide apud OTIONEM HEURNIUM *obs. 18.* BARTHOLOMÆUM *Cenot. II. obs. 61.* ACTA HAFENIENS. *vol. III. obs. 76. M. N. C. Cent. III. & IV. obs. 115.* In ipsis quidem pulmonibus hæc hydratides, a vasis lymphaticis, in eorum substantia oriuntur, ac laicem suam in cellulas ac vesiculas effundentibus, unde hæc in tantam elevarunt molem, generari videntur, & vero est similitudinem, quod ex rupta ejusmodi vesica, serum in pulmonum substantiam extravasetur, & repentinam inducat suffocationem: unde etiam derivatus materæ illius limpidæ, quæ cum tuili nonnunquam fit, reiectionem.

§. XXI.

Si quid ex causis occasionalibus est, quod asthma convulsivum inducere potest, certe est externum frigus, hostis ille nervoso generi inimicissimus. Unde hiemali tempore, flantibusque ventis aquilonibus ingraevet malum; & à frigiditate quoque potu exacerbatur. Imprimis observavi, illos, qui pectus non bene tegunt, illudque frigori, maxime nocturno exponunt, sæpius hoc malum incurrisse.

§. XXII.

Ex his adparebit, quam variis modis generetur, ac soveatur asthma convulsivum, ac suffocativum: jam pauca de prognosi trademus. Ubi malum recens est, & sola præcordiorum constrictione spasmodica nititur; spes est salutis; maxime si motus arthritici, podagrici, ulcera, & exanthemata ad sua loca revocentur. Quando supervenit excrementorum sanguinearum; et uterum, aut hæmorrhoides fluat, iis, qui ex earum sup-

Causa remota est frigus.

Prognosis

suppressione afflimate sunt correpti, & passione laborant hypochondriaci, levamen adfert; atque si res adhuc inaequa fuerit, perfectam convalescentiam. Quod si vero invenerit affectus, aut perversa tractatur modela; transit in pectoris hydropem, viscerum imi ventris obstructions ac infarctus, pedum oedemata, cachexiam, ac hydropem universalem. Namque constat, quod per diaphragmatis centrum tendineum feratur vena cava, quae ex imo ventre cruore ad cor vehit; nec ignotum est, quod liber septi transversus motus, circulum sanguinis per hepatis, naturae languidiorem adjuvet, atque promoveat. Quando igitur cunque liber sanguinis per venam cavam ascensus impeditur; tardior ejus fit in eoque circulatio; unde humores primum omnium in distitis regionibus, veluti sunt pedes, stagnant, serofasque portionem, oedematis causam, dimittunt; deinceps quoque per viscera imi ventris difficiliter progrediuntur, inque iis subsistentes, infarctus, scirrhus, cachexiam ac hydropem causantur; quem ligata prope septum transversum vena cava, protinus laboriori, praeter LOWERUM, experientia demonstrat. Generatim sciendum est, omne asthma convulsivum, vel praecipue exitum, atque repentinam suffocationem inferre, maxime, ubi subest cordis polypus; vel diutius inhaeret, atque hydropem parit agrotantes; quo in calu lethiferum est, si patientur febrem lentam, pulsum inaequalem, ac intermittentem, paralyin brachiorum, continuam cordis palpitacionem, immixtam mictionem, syncopem; tum enim in propinquo mors est. Qualem denique superveniente pulmonum inflammatione exsurguntur, quo gravius malum eo languidior fit pulvis. Asthma in senibus comitatur plerumque usque ad mortem, & quod ex dislocatione vertebrae sit, non sanatur, nisi haec reducatur. Quo majori impetu & vehementia accessio & diutius durat & crebrius recurrit, eo plus periculi subest, & suffocatione ne jugalat.

CURATIO.

§. I.

In distitis
partibus
curatio.

Gravioris nostri mali curatio, his fere indicationibus absolvitur, ut 1) spasmodicas pectoris, atque pariam spirationis nimis strantium strictiones consopiamus, 2) humores ad externum corporis habitum, infernasque partes derivemus, & eorum circuitum aequalem reddamus, 3) causarum, quae malum sistent, remotionem, pro eorum diversitate studemus. Et scilicet binis prioribus scopis in ipso paroxysmo potissimum satisficere; ita tertium extra hos explicare licet.

§. II.

Quae con-
sistent in
paroxysmo.

Ipse in paroxysmo, quoniam plerumque alvus stricior est, & humores una cum flatibus ad superiora regurgitant, non facile quidpiam praesentis auxilium fert, quam clysteres emollientes, simul carminativi; quos ex floribus sambuci, meliloti, verbasci, paeoniae, liliorum alborum, chamemeli vulgaris, feminibus quatuor carminativis, oleo chamomillae cocto, & una alteraque salis communis vel gemmae drachma, si mali loco adista, parare convenit; & exigente necessitate, bis vel ter iterare. Deinceps, incredibilem virtutem exerant, pedum, qui tantum

non semper frigidi sunt, frictiones, eorumque in aquam tepidam dimissiones. Ubi gravis praecordiorum vexat spasmus; iis foras calidiores, vel etiam vesicae, iscte calido repletae, ad mitigandum spasmodum adhiberi possunt; nec levem in his sedandis opem nonnunquam ferunt *linimenta nervina, quae ex aqua Anhalina unguis hini, spiritus salis ammoniaci, lumbricorum terrestrium, essentia croci, castorei ana drachmis duabus, olei nucis vel macis drachma una paratur*, atque collo, scapulis, musculis thoracis, spinisque dorsali adplicare soleo. Ex internis laudem merentur antispasmodica, cum blandis diaphoreticis juncta; quae discutiendo peccantem materiam, & relaxando spasmodicas strictiones, operae faciunt pretium. Talia sunt mixturae ex aquis analepticiis florum silae, paeoniae, primulae veris, lihorum convallium, acaciarum, ulmariae, pulvere Marchionis, cinabari nativi, spiritui nitri dulci, vel liquore anodyno minerali, mixtura simplici & syrupo papaveris rhaeodae; quae crebro repetita dosi ostendunt, aut cum liquore anodyno, qui nuptus sit spiritui bezoardico *Bussii*, vel cornu cervi succinato, alternande. Praeterea, quantum fieri potest, corpus in moderato calore conservare oportet: neque enim plura ipsis in paroxysmo nosari licet.

§. III.

Extra paroxysmum, ante omnia eo est respiciendum, ut stagnationes humorum in pectore discutiamus, eorumque circulum restituamus aequalem: simul vero causas materiales ac medias removeamus. Quod si igitur sanguinis nimis versus pectus congestio hoc malum induxerit; consopita ejus per pulveres ac mixturas temperantes ebullitione, immixtionis nimiae molis standum est. Quo quidem sine venae sectione in pede, praeteritum vinolae diaetae addictis, statim temporibus insitute, eximiam spondent utilitatem; quibus in consuetis interponenda sunt scarificationes; & iis, qui suppressum haemorrhoidum fluorem patiuntur, conferunt hircudines vetus sedalibus adplicandae. Non minus blanda laxantia, ad eliminandas primarum viarumordes, & ad promovendum sanguinis per abdomen, & venam portae circulum, motus corporis, vietus tenuis, potiusque levior, sed largus commendari debent. Et si hypochondriaci, & flatulenta praesto sunt symptomata; eo scilicet cum succello adhibentur lenia laxantia ac clysteres, conjuncto elixiri visceralis usu, & recta vietus ratione. In subiectis, maxime ex suppressione vel mensum vel haemorrhoidum laborantibus; nihil quoque est fructuosius, thermis, interne praeter ac externe usurpandis; aut acidulis Selteranis; quae tepescit cum lacte misceri debent. Haec etiam via est curandi asthma, quod a polypo cordis proficiscitur.

§. IV.

Quando malum a materia arthritica, podagrica, scabiosa, purpuracea, vel ulcerosa intra corpus retrocedente, ac repulsa ortum trahit; transit nemp humore acti, peccante, causifico, ad nervosas pectoris partes; non tutius consilium est, ac blandis diaphoreticis, liberam perspirationem promovendis, humorem istum ad corporis superficiem, vel ad partes, ex quibus repulsi sunt, relegere. Qui scopum cum praesentissimo commodo satisfaciunt liquor nosler anodynus, cum spiritui bezoardico *Bussii*

Cura asthmae
frenata
per
paeoniae
drachmas.

Asthma
ab acrimonia
frenata
per
paeoniae
drachmas.

mixtus, aut pulvis bezoardicus, ex animonio diaphoretico, nitro, pulvere Marchonis, succino præparato, & momento camphoræ compositus, mane potissimum sumendus; desuper bibendo aliquot vâcula infusi theiformis, quod ex herba cordii, veronice, floribus sambuci, tiliz, semine fœniculi, & aniso scillato concinatur, inde lenem promovendo sudorem. Ubi scabies, vel ulcera retroacta, vel præmature consolidata sunt; insignem laudem merentur remedia ex sulphure parata, quippe quæ has sordes ad cutem revocandi, magnam vim possident. Quemadmodum enim medicamenta ex sulphure minerali extrinsecus in ejusmodi affectibus valde aliena & noxia sunt; ita contra interne data tonum partium roborando, diffusionem & perspirationem heterogeneæ materiæ adjuvant. Neque vero negligenda sunt, leniora laxantia, nec blanda diuretica, sicuti tintura tartari &c. est; siquidem his & crassæ est prima vis, & reliquæ per vias urinarias, excernuntur impuritates. Speciatim pediluvia revocandi ad pedes arthriticis, atque podagricis nitibus adprime inferuntur.

§. V.

*Causa
asthmatis
non hereditaria.*

Ubi molestissimus hic morbus à tumore pedum oedematoso, per graviorem animi affectionem, vel terrorem subitum, vel nimiam refrigerationem, vel etiam febrem accellionem retro pulsio nascitur: tunc non leve negotium est, decubitus feri viscidum in pectore discutere, & ad extimas partes revocare. Vidi in tali casu cum fructu adhibitum pulverem diaphoreticum, ex cerussa animonii, cornu cervi usque ana drachma una, cinabaris medicinalis scrupulis binis, sulphuris animonii correcti grana quatuor parva, quæ ponderè duorum scrupulorum, desuper bibendo infusum theiforme propinare solitus sum. Fovendi præterea ac sedulo fricandi sunt pedes, ut spasmi eorum relaxentur, & sitigis expellantur; nec non injiciendi sunt clysteres, aut laxantia, quæ levissima.

§. VI.

*Causa
asthmatis
perniciosa.*

In asthmate sicco, quod à causis externis bronchia & pulmonales vesiculas excoriantibus, ut sunt vapores sulfuris, aer exhalationibus calcis vivæ repletus, vel vapor carbonum fossilium, nascitur; hæmectantia & acrimoniam demulcentia & fibras laxantia, ut sunt lac, cremor ejus, oleum amygdalarum dulcium, emulsiones, sparma ceti, pinguedines animalium interno & externo usu omne absolvunt punctum.

§. VII.

*Causa
asthmatis
perniciosa.*

Quod si pectoris hydrops jam præfuso fuerit, anceps est curatio. Unicum, quod restare videtur remedium, paracenthesis est thoracis, quam multi collaudant auctores, uti CAR. PISO, SCULTETUS observ. 31. pag. 252. & SYLVIVS oper. medic. cap. 50. pag. 316. Neque est, quod fugiamus hoc remedium genus; quippe quod provida manus adplicatum, periculi plane expertus est: verum quæ incidit questio, an semper curam inferat auxilium? Perite HIPPOCRATES Lib. II. de morb. monet, quod instituenda sit hæc operatio, antequam morbus invaluerit, aut labem visceris cuiusdam se cum traxerit. Et prospecto hoc in casu, si viscerum læsio, aut exulceratio præfuso fuerit, non temere ad hæc accedendum fuisse curam: iis

Frid. Hoffmanni Oper. Tom. III.

vero integris, non contemnendam pollicetur opem. Præterea conjungere oportet leniora diuretica, atque laxantia, maximeque ea, quæ per epicrasin agere dicuntur; nimirum si morbus in principio, & ab exacerbatione febrili vacuus adhuc fuerit.

§. VIII.

Ultimo loco non incongruum visum est, quæ CELSUS in spirandi difficultate Lib. IV. Cap. 4. in usum commendavit, remedia subnectere; Auxilium est, inquit, nisi aliquid præbuerit, in sanguinis detractione. Neque id satis est, sed lac caprinum calidum seorsim dandum; & si non febricit, venter solvendus est. Liguanda alvus, interdum etiam succida, quibus excernatur corpus incipit spiritum trahere commodius. Caput etiam in lecto sublimè habendum est, thorax fomentis, cataplasmatibusque calidis, aut fectis, aut etiam humidis adjuvandus est. Ex inferioribus addit: Præter hæc fortitionibus & lenibus cibis utendum est: interdum vino tenui austero, nonnunquam tannu. Prosum etiam, quæcumque urinam movent, sed nihil magis, quam ambulatio lenta pene usque ad lassitudinem, frictio multa, præcipue inferiorum partium, vel in sole, vel ad ignem, & per se ipsum, & per alias, usque ad sudorem.

CAUTELÆ, ET MONITA PRACTICA.

§. I.

Purgantia aciora, uti sunt ex jalappa, gummæ guaiacæ, colocynthide, elaterio, ciula &c. confecta; nec non emetica, maxime, quæ ex subio parantur, cane pejus & angue in hoc affectu sunt fugienda; quippe quæ genus nervosum magis ac spasmos disponunt. Verum enim vero in asthmate tali cachectico, ubi pectus humoribus ferofis, viscidis plenum est, cum insigni usu tartarum emeticum, relaxantiori dosi, cum infuso mannato propinare soleo; quo debilitatis pulmonibus aliquale robur instauratur, ut diagnosticis succis resistere possint. In tali quoque casu eximie utilitatis est sulphur animonii, probe correctum, nec non a Veteribus mire commendata squilla, provide data, quæ incidente non minus, ac resolvente virtute, desideratum edit effectum.

§. II.

Vulgaris, sed insignis error est, tumores pedum oedematosis, qui frequentissime junguntur affectui nostro, purgantibus drasticis profligare velle: neque aliud quidquam inde expectandum, quam ut ægri per compendium ad mortem deducantur: aliena quoque valde sunt emplastra repellentia & ulcera ac fluxiones pedum siccantia & consolidantia. Nec semper tuto sunt adhibenda balnea Laconica cum spiritu vini; quoniam efficiant nimium corpus, tumoresque repellunt. Proficiunt magis siccæ fomentationes, sacculi discutientes, conjunctis interne diaphoreticis cum antispasmodicis mixtis, nec non usurpatis diureticis, atque clysteribus paulo acrioribus.

§. III.

Sanguinis, quæ per venæ sectionem sunt, miliones, nunquam in ipso paroxysmo debent institui, quoniam malum inde fit deterius ac contumacius. Neque extra paroxysmum quidquam

*Circum
spem
pedum.*

proficiet in ullo asthmae genere, quam in eo, quod vel a nimia sanguinis mole, aut crassitie, conjunctio cordis polypo, vel ab excrecionum sanguinearum suppressione fovetur: tum sine praefervatorio circa aquinoctia tam decet institui. Monendum vero hoc loco est, majori semper cum fructu chyliorem, ad flatus dissolvendos & alvum aperiendum sanguinis missione praemitti.

§. IV.

*Circa the-
mas &
medicula.*

Thermæ si in morbi principio in usum transeant, vel etiam acidulae, quæ tepescit esse debent, huic malo & ejus generationi, praefertim si ex cacochymia scorbutica, viscerum infarctu, vel suppressione criticarum sanguinis missionum pullulaverint, miserrime opistulantur: contra vero si jam inveteraverit malum, costis polypi praesto fuerint, vel hydrops pectoris fixam occupaverit sedem, harum porus, mortem accelerat; quod variis comprobatum habeo exemplis. Namque in his subjectis reperitur partium solidarum miserrima laxitas, ac viscerum obfuscatio; quæ de causis minerales istæ aquæ haud rite transiunt emunctoria, sed hinc inde stagnantes, non modo extravasatum in pectore serum augent, verum etiam novos, variis in locis, excitant tumores.

§. V.

*Relaxationem
nervorum
dum agitur.*

Major fere spes salutis collocari potest in externo thermarum usu, praefertim earum, quæ non tam adstringentes, calidae & martialis sunt prospiciæ, quam potius, quæ valde subtilem de levitatem aquam foverit, & sale quodam alcalino imbutæ sunt: quo nomine egregiam vidi efficaciam a Theriacalibus, & Piperatis; siquidem virtute sua laxante ac emolliente fibras densas, rigidas & contractas miserrime demulcent, atque solantur, & simul libertatem reddunt per spirationem. Ubi vero vel polypi vel aquæ extravasate suspicio est, prout exalare hæc debent. Plus etiam conferunt balnea præservandi, quam curandi scopo.

§. VI.

*Circa diu-
resim.*

In statu cachectico, cui jungitur asthma, magnam operi ferre deprehenduntur diuretica; adeo, ut JOH. RHODIUS Lib. III. abf. 27. testetur, asthma, evacuatâ intra nycthemeron, 37. urinae libris fuisse sanatum. De hoc medicinae genere BAGLIVUS abf. pag. 103. perit hæc scribit: Pluries adnotavimus, in pectoris morbis, semper docendum esse ad vias urinae, natura id monstrante; necnon magnam consensum esse inter tibiae & pectus, pedibus & pectus. Diuretica ex salibus lixivialibus, & acidis parata in pectoris morbis non adeo ita sunt, nam tussim movent, & maribus exasperant; contra pulvis millipedum, therebinthinata, essentia succini minus spirituosâ sed probe alcalisatâ, item balsamum sulphuris antimonii nostra methodo præparatum, decolla radicem aperientium, Symplicum de abba Ferneli, urinam potenter movent, nec tenellum pulmonum membranis insensâ sunt.

§. VII.

*Circa æ-
thor.*

In asthma spasmodico cum cardialgia juncto, & quod a spastica sepi transversi fibræ prodit, linimenta, quæ ex axunginis animalium reocutibus parata sunt, demulcentia & anodyna,

pinguedinem quoque caponis per solis calorem subtilisatam, neque minus emplastrum Parthenianum, cum supone de cataportha nobilitatum, plus sæpe efflicite, quam spirituosâ & calidiora observavi.

§. VIII.

In curatime non minus ac præservatione asthmae nostri, aliorum remedium vim egregie secundat aër; qui quo lucidior, purior, atque serenior est, eo majorem asthmaticis fert opem. Et quem fugit, quod sola temperata mutatio, morbum hunc insigniter adaugeat? Veteres insignem acris habuerunt resistendum; quos inter allegasse juvat CÆLIUM AURELIANUM, qui Lib. II. cap. 3. ita scribit: *Obtinente structura, convenit agrotas facere loco lucido medietatem, aque calida, adhibita abstinentia, usque ad tertium diem, cum requie corporis, atque animi, appositâ lenis limpidi, atque mollibus, oleo dulci atque calido præstis, colla & thoracem circumdantibus &c.*

§. IX.

Neque minus ad inducendum paribus in pectore nervosis robur naturale, præservandi fine, mineralia præter potum aquæ frigida, sed purioris & levioris, confert acris ruralis usus; quem laudando sane Strazagente, BAGLIVUS oper. pag. 107. his verbis commendat: *In diuturno asthmae, sive humoralis, sive convulsivæ, aërem rusticatum agratissimum impero, & potissimum, ut campos habeat, quæ arant bubulci. Debet itaque asthmaticus sepi bubulicum, quando terram arat. & succedere per solum, sive viam ab arato recentem in terra factam, & aperto ore inspirare aërem, sive balneis nitrois salinis ac sulphureis, à recentem ruptis terra glebis prodentibus. Tanti pulmonum, longo morbo relaxantur, nitrosa salia centralia terra caloris substantia roborantur, confirmantur, & resiliunt; eoque resiliunt, circulus quoque liquorum per pulmonum velas in libertatem ponitur, morbusque proligatur.*

§. X.

Multum quoque ad levandum vel sanandum asthma id mali refert, quo potus genere ager utatur. Cerevisium fere, & quam maxime triticæum improbandum. Vinum meracum spiritus fortum est, ebullitionem sanguinis creans, congestionem humorum & gravitatem in pectore ac spirandi angustiam augebit, praefertim in sanguine abundantibus. Vinum naturaliter aequum, ut Mosellanum vel Neckarinum recens, fibras ventriculi minus roborando, concensionibus minus aptum, status producit praefertim in hypochondriaci. Optimum deprehendi vinum Rhenanum antiquum, cum paribus tribus vel quatuor aquæ purioris fontane vel Selterani fontis permixtum. Ceterum insula theiformis ex hyssopo, veronica, ranunculo hortensi, sive tragon, hedera terrestri, radice glycyrrhizæ, floribus bellidis parata, non suis laudare possumus, a quacunque etiam hoc malum subortum fuerit causa.

§. XI.

Saccharata, nimis dulcia, mellis in omni asthma, maxime omnium vero in seroso & hypochondriaco cane pejus & angue vitare oportet: nam tonum ventriculi laedendo, digestionem de-

defraunt, & statum generationi multum vellicantur.

ENARRATIONES MORBORUM.

OBSERVATIO I.

Astma convulsiva a morbo podagrico in corpore reprobato.

Vir xxxix. annorum, ante binos annos gravissima pectoris constrictione, ac coarctatione, cum dolore punctorio & lancinatio, thoracem, scapulas, & superiorem medullæ spinæ partem occupante, corripiebatur, & de cordis vehementi compressione, summaque spirandi difficultate, ac si per angustum duntaxat foramen spiritum ducere deberet, conquirebatur, adeo ut nec stare, nec sedere, nec laterum ulli incumbere poterit. Duravit malum per sedecim horas, & tunc quievit: sed ventente anno, circa idem, quod erat vernale, tempus recruduit hæc truculenta passio cum iidem symptomatibus.

Hæc autem vice dolor podagricus, cum tumore calcanei, pedes infestaverat; qui, adplicata in pulvere camphora, evanuerat, & brevi tempore post se traxerat asthmaticum paroxysmum. Redibat ille alioquin, & longe majori, quam antea ferocitate adflegebat, manus pedesque calore & frigore alternantibus tremebant, & nulla pars corporis erat, quin in malorum consensum raperetur. Exercebant insuper primam regionem perpetue anxietates, ac flatulentia; & quod notari meretur, ipse vir agrotans nunquam antea sanguinis evacuationis passus erat; Atamen in hoc morbo venam tundendam præbuit, eo efflata, ut cordis constrictione, cum pectoris & scapularum pungitivo dolore remitteret. Præterea externe spiritus vini camphoratus, interne vero pulvis bezoardicus nitrosus, præ aliis leviter sequebantur. Consultus ego in paroxysmo commendavi pulveres diaphoreticos, cum nitro, cinnabari, tantillo camphoræ, & extracti croci permixtos: extra hos crebra pediluvia, & vesicatoria cruribus scapulisque adplicanda collaudavi. Præservandi scopo ungue theriacum Trospicentiam usum suavi; & vere pariter ac autumnos, præmissa venæ sectione, sal meum aperitivum, pilulas ballanicas, decoctum temperatum, per unam alteramve hebdomadem usurpanda proposui, cum successu felicissimo.

Epietis.

Ægrotus noster præter nimiam, qua abundavit, sanguinis molem, & hypochondriacā passionem, & scorbuticā humorum diathesi laboravit: priorem testantur flatulentiæ primarum viarum distensiones, posteriorem podagricæ pedum dolores significant. Asthma igitur, quo pressus fuit, à materia podagrica, ob naturam languidiorem haud satis vegete ad articulos pedum depulsa; sed retenta in corpore, ac nervis præcordiorum paribus insidente, suam traxit originem: ab imi ventris vero flatulentia, majora cepit incrementa. Quare eo directi curationem, ut in paroxysmo motus spasmodicos mitigarem, & aucta transpiratione, hostilem materiam ad corporis revocarem habitum. Deinceps podagram per pediluvia ad pedes invitare volui; & anurcam acrem per vesicatoria expellere intendi; quæ in illis potissimum casibus, ubi scabiota, vel ulcerosa materia malum fovet, præstantis sunt usus. Quoniam autem æger scorbutico-hypochondriacus fuit: ad mundificandam humorum massam,

Frid. Hoffmanni Oper. Tom. III.

& corpus ab omnibus liberandum sordibus, singulo vere ac autumnos, cum hæc scopis adprimè convenientem ordinavi. Nec alienum in hoc casu fuisse thermis, vel acidulis, inique tepidulis uti; quoniam viscera à latione adiacere munia videbantur.

a) Dificilium præterea ex hac observatione, quod camphora vim moris podagricos repellendi possideat. Multoties enim observavi; eam, sicuti interne data, in discutendis inflammatoriis, ac expellenda materia acri, præclara pollet virtute; ita extrinsecus vel in yulvere, vel cum spiritu vini adplicatam, tumoribus inflammatoriis, ac erysipelaceis, præsertim in initio, & si persona sensibilibus ac calidioris fuerint indolis; pleniusque effectum repellentem exserere. Contra vero majori cum fructu in doloribus rheumaticis, & subiectis pituitosis hoc remedia genus adplicare licet.

OBSERVATIO II.

XXX. annos egressa mulier, temperamentum sanguineo-cholestericū, virgo adhuc illibata gavi-fuit sanitas. Postquam vero viro nupta parere cepit, variis generis febribus tam acutis, quam intermittentibus, nec non spasmodicis affectibus obnoxia fuit. Adhæc ictero constinabatur, qui cum summa virium dejectione, torpore ac gravitate totius corporis, horrore atque phlogosi, contabescencia, alvo mox fluida, mox adstricta, ac muletissimo præputa, per octo integros inhæsit mentes, omniumque remedium vim eludit; donec tandem ope thermiarum Carolinarum prorsus cessaret, & ægra optime habuerit. Brevis post vero asthma convulsivum incidit, quod cum atrocissimo contingente, ac reprimente circa regionem thoracis & diaphragmatis dolore, præcordiorum anxietate, & summa spirandi difficultate, ac suffocationis metu, exacerbata, oclatione continua, sinu inextinguibili, vomitu, astiduis vigiliis, virium collapsu, frigore ac tremore corporis dissipatum, per paroxysmos rediit; quibus finitis, ceterarum semper cum febricitis excrevit materiam. Quo in rerum statu, icterus quoque ter adparuit.

Epietis.

Asthma convulsivum, de quo in præfenti agitur casu, per consensum à calculo vesicæ fellæ ortum est: quale exemplum à WILLISIO de morbis convulsivis allegatur. Subesse calculum vesicæ fellæ, significat frequentior icteri recursus; quem BAGLIVUS pro signo pathognomonico hujus affectus agnoscit, cum Oper. pag. 413. dicit: Si videris icterum sanari, sed recidere, eos certe à calculo vesicæ fellæ prægnari prædicat. Namque calculum hunc, si per suos ductus descendit, æque gravem spasmodicam tormetur ipsa inferre, quam illum, qui renibus inhæret, non ignotum est: eum autem ductus biliferi nervos suos à plexu hepatico, à pari vago & intercostali oriundo mutantur; non obcurum est, cur hæc strictura ad vicinas quoque partes, ventriculum, intestinum colon, diaphragma, nervos pneumonicos, aliasque nervos pectoris partes propagentur. Tals quoque observatio reperitur in Consult. ac respons. medicis. Tom. II. Sect. III. Cas. XLIX. Quam igitur hæc affectus, more cunctis spasmodicis morbis consuetus, per periodos ac paroxysmos recrudescat: eum esse oportet

medentis intentionem, ut in paroxysmo violentos motus conspiciat, extra illum vero obstructiones, quas generant calculi, referare studeat. Priori scopo in nostra agrotante faustissimus: 1) clysteribus emollientibus, & oleosis, 2) vesica bovina, decocto emolliente tepidiori plena ad hepatis regionem admotis, 3) pediluvio circa somni tempus administratis, 4) pulveribus nitrosis, cinabari & extracto callosi nupri, & liquore anodyno interne datis. Neque omittenda tum sunt balnea aque dulcis, quippe quae in relaxandis spasmus, ac referandis humorum obstructionibus, mirifica gaudent virtute. Ad complendam vero posteriorem indicationem, non praestantius auxilium expectare licebit, quam ex thermarum Carolinarum recto usu. Quo absoluto, infundendum erit infusus aperientibus, interponendo lenia laxantia, ac denique, liberis vis, & quiescentibus spasmus, ad roborandas, quae sunt debilitatae, partes, martialia rite usurpata, vel etiam balnea martialia, omnem eurationis paginam absolvunt. Et ita sane graves, qui ex vino, & obstructione hepatis naucuntur affectus, averti, saltem insigniter mitigari possunt.

OBSERVATIO III.

*Asthma
spasmodi-
co-hypo-
chondri-
cum, ab
usu medicis
sanitum &
egri sub-
sequens.*

Vir quinquagenarius, flori haemorrhoidum olim obnoxius, sponte postea cessanti, vinum rubrum, nec non tabacum in delictis habens, animique affectibus indulgens, per multos jam annos de spirandi angustia, tussi sicca, & auditus gravitate coqueque fuit. Per novissimum vero trimestre adeo invaluit haec spirationis difficultas, ut omnem erigat somnum, nec agrosi in sella prono sedendi illum capere permittat; attem brevissimus est, & asthmate illo saepius interruptitur, cum metu suffocationis. Jungitur praeterea tumor pedum oedematosis, & per vices invadunt convulsivi motus; nihilominus minus appetitu fruiat integro, & quod notabile est, sub praesenti affectione, persicula gaudet auditus libertate. Sanguis ex vena missus, consistens fuit atrae, ac impuriore. Consultus Medicus suppressas haemorrhoides respiciens, varia ordinabat remedia, resolutiva ac discutientia, nec non leniora laxantia, atque pilulas Becherianas; & quarum prima & unica dosi, haemorrhoides prorsumpebant, & per decem dies fluabant. Neque vero levabantur inde pectoris affectiones; tantum aberat, ut appetitus plane languesceret, tumor pedum increveret, ad abdomen ascenderet, & mictio fieret impedita. In tali rerum statu, Medicus consilium inops, exhibebat tandem pulverem squillae, cum vinetoxico permixtum, ex jussulo quodam quo sumto, non modo libere per aliquot horas dormire, verum etiam in quocunque corporis situ, ubique ulla molestia decumbere poterat aeger, quin exasperatus ab omni tussi & asthmate immunit, optime valebat. Adhibita dicti pulveris tertia dosi multum muci tenacis, viscidis vomebat; & sequentibus diebus, continuato isto remedio, eundem mucum copiosius eructabat, sanoque videbatur similis. Verum elapsis aliquot hebdomadibus, eum iracundiae nimium indulgisset agrotans, recidit sensim in priora symptomata, & praeter leve cruoris ex haemorrhoidibus stillicidium, graves in sinistro hypochondrio patiebatur puncturas. Conclata remedia, clysteres, laxantia &c. in casum dabantur, adeo, ut oedematosa pedum intumescencia, abdomen quoque obideret; quin apople-

cticus insulset, cum lingua & dextri lateris resolutione, tandem accederet. Hic quidem medellam admittebat; at asthma insignes sumit vires; ut ideo ad usum squillae rursus deveniret Medicus; ex quo, portenti inflar, omnia symptomata protinus evanescerant, fomniisque ad appetitum redibat. Sed brevis erat valetudo; squillum post binas hebdomades, cuncta pathemata revertebantur. Tertiū data squilla, reliquis nihil proficientibus medicinis, omnia conlopiebat; & jam per aliquot dies, malorum vacuitate gavisus aeger, mentem ad praeservandos ultiores insultus, per Medicum requisivit opem.

Episcris.

1) Asthma hoc dici meretur hypochondriaco-spasmodicum; quoniam constrictione parium spiritalium spasmodica nititur; & ex hypochondriorum visio primam trahit originem. Testatur id punctura sinistri hypochondrii, neque dubium est, quin suppressio fluxus haemorrhoidalis multum ad generationem mali contribuerit; praeterea cum vini rubelli, quod constriciva vi agit, forsitan nimius accessit usus.

2) Non mirum est, quod haemorrhoidum fluxus, unica pilularum balsamicarum dosi revocatus, malo nullas suppetias rulerit. Quod si enim hac excretio morbo recenti supervenerit, illum levasset procul dubio: at quoniam ille per tot annos duravit, partes adeo debilitatae, & quasi motibus huius anomalis affloretae fuerant, ut difficile sit, iis, licet emendetur humorum vitium, prorsum restituere robur; tantum obest, ut motus vitiosi a qualibet causa, maxime pathematibus animi, facile corrigi poterint.

3) Attentionem meretur, auditus difficultatem, ingravescentem cum asthmate pedum tumore oedematoso, protius levatam fuisse. Namque dum illa a feri viscidis stagnatione in partibus auditui dicatis, omnino sustentata fuit; non mirum, si derivato illo sero ad pedes, organa auditus pristinam constitutionem recuperarent.

4) Observatione denique dignissima est mirabilis illa, ac fere stupenda squille in allevando asthmais immani paroxysmo efficacia. Radix haec a Medicorum antiquissimis, HIPPOCRATE, GALENO, CELSO, DIOSCORIDE, CAELIO AURELIANO, &c. in affectibus chronicis, maxime hydropicis, ob virtutem pinuitam lentam viscidamque dissolventem, urinam cientem, visceraque infarctis referantem, magni est aestimata. Fovet autem elementum valde subtile, acerrimum, ac fere causticum, atque majori dosi exhibita, nervoso generi omnino adversatur; ad quam acrimoniam obtundendam veteres variis usi sunt modis; quidam enim ipsam passim ex facina involvabant, in cibano exsiccabant, indeque trochiscos parabant, uti DIOSCORIDES Lib. II. cap. 202. vel cum aceto infundebant, uti GALENUS, vel cum aqua decoquebant, uti HIPPOCRATES de viscus rat. in morb. acut. vel cum vino, ut CAELIUS AURELIANUS Lib. III. Cap. VIII. de morbis chronicis §. 120. quo nimirum hac ratione sal tenuissimum causticum evaporaret. Praeterea vero habetur veluti pro specifico in chronicis pectoris affectionibus: unde JOUBERTUS Oper. pag. 376. dicit: ad explorationem omnium convulsionum est squilla; quovis modo assumpta, ut cocta & mille excepta, &c. quod ex ea conficiat mel & acetum, ac ex utroque compositum cyneol squillatum: quo ad crassum

et viscidiorum pulmonibus impalorum expurgationem haud quaquam esse praestantius aliud genus remedium &c. Ex FERNELII *Therap. univers.* Lib. V. cap. 20. *sequilla, inquit, pectus crassum et lenius humoribus insarsum expurgat, tussis veterem et asthma persanat, ac sanum et pectore elicit.* Certe meretur haec radix inter remedia heroica referri, & nostris etiam temporibus in frequentiore usum trahi: namque exister non modo virtutem potenter incidentem; verum etiam languentis motus excitat, & quod mirabile est, blande anodynum simul exhibet effectum. Scire vero licet, ante illius usum corpus blandis laxantibus esse repurgandum, illamque ad tria vel quatuor grana, cum radice vincetoxici, & nitro, quod mitigat acriorem ejus vim, exhibendam.

OBSERVATIO IV.

*Asthma
spasmodi-
cum a vi-
tiosi juu-
nis.*

Vir generosus, in dignitate constitutus, annorum xxx. constitutionis sanguineae, habitus corporis spongiosi, & succulentus, post vehementissimam iracundiam, ex qua totum contremiscebatur corpus, mox capiebat in convivio cibum, vini-que praeter liberaliori potu replebat ventriculum. Insequentem noctem transigebat insomnem, cum anxio praecordiorum sensu, vomendi conatibus, & totius corporis languore conjunctum. His per aliquot dies assidentibus, jungebatur sensim adpetitus prostrato, pulvis delitiosus & celer, tabes, febris lenta, oris siccitas, sitis, flavi faciei, albigue, quod oculis inest, color, mictio parva, urina valde saturata, sulco, tubicundo, pruniceo colore imbuta; & alvus dura, tensaque, flatus & stercorea difficultas transmittens. Adhibuerat in hoc rerum statu a variis Medicis cupisculisque generis medicamina, aperientia, emetica, amaricantia, stomatica, carminativa, maritima &c. quoniam hepatis obstructionem, & biliosam vitiosamque primarum viarum subitum suspicabatur. Verum cuncta erant frustranea; & malo per tres menses inhaerente, tandem accedebat asthma spasmodicum, quod nocturno potissimum tempore ita vexabat aegrum, ut in lecto contineri nequiverit, sed per aliquot horas in conclavi obambulare, spiritumque sentiens apertis anhelare debuerit. Sic ergo viribus exhaustus, totoque corpore consumptus, Dreſſa, ad me accessit, ultra octoginta remedium, quae usurpaverat, formulas secum afferens, meumque flagitavit auxilium. Ordnavi liquorem anodynum mineralem; pulverem praecipitantem nitrosam; infusum theiforme ex floribus chamomillae, summitatibus millefolii, floribus salviae, herbae veronicae, semineque feniculi paratum; pediluvium ex sola aqua dulci confecta; clysteres emollientes, ac denique elixir balsamicum viscerale: quibus per mensem usurpatis, pristinam, quae Dei est gratia, recuperavit sanitatem.

Epicrisis.

1) Exhibet hic casus, iterum exemplar asthmae spasmodici, ex constrictione viarum bilioferarum suborti. Causa fuit gravis iracundia; quae quod immediate est elum, in primas potissimum regiones, & praesertim vasa, bilem vehementia, ea spasmodice constringendo, exierat; observatione quidem comperimus habemus; Perniciosa iracundia est cibacea, si paulo post cibum vel potus capiatur, & quo diutius inhaerere cibus nodi

spasmus, eo pertinacior est, & ad vicinas extenditur partes. Quum vero pulmones, eorumque bronchia nervos adspiciantur a pari vago, quod cum ramo nervi intra-costalis etiam hepati, & biliferis ductibus, nec non seipo transverso, praebet furculos: unde pateſcit indignis consensibus, quo pectoris partes cum hepate gaudent. Pertinet huc observatio RAYGERI, quae exstat MISC.N.C. Dec. I. anno IV. obs. 11. cum foemina per triennium asthma periodico detenta & post mortem dissecta fuit, ubi nihil viui in pulmonibus, nec bronchiis observatum. Viscera etiam salva, sed vesicula felle magna, nihil bilis, sed lapidem magnum inaequalem inclusum quatuor drachenarum continuit.

2) Exacerbatum & deterius redditum est malum, a tanta remedium, maxime inconvenientium, copia. Namque notandum est, in his morbis, qui sola esque graviore partium nervosarum constrictione, ab animi afflictibus, inducta sustentantur, absente crassa materiali causa, perniciossimum & veneni instar esse vomitorio- rum, purgantium atque spirituosorum & incidentium acriorum usum.

3) Diuturnitas mali, maximam partem, minus rectae causae pervestigandi debetur; quae, quanta possit se relinquat damna, innumera pro dolor innotescit experimentis. Plurimi enim Medicorum ad solum humorum vitium, eorumque crassitiam, vel aliam quancunque qualitatem, & inde factam viscerum obstructionem reipiciunt; motumque partium solidarum perverſum, in quo saepius totum morbi fundamentum haeret solo, plane negligunt. Unde remediis suis, quae ad tollendam humorum labem alias non inepta sunt, plus sane damni excitant. Quare cum, explorata morbi causa, ad relaxandam spasmodicam strictionem, omnem curandi scopum direximus; & factum est, ut votis non sine singulari exultationis nostrae augescere possit salus.

OBSERVATIO V.

Senex septuagenarius, obesus, cachecticus, *Asthma
tense la-
tens a re-
pente pa-
dum ca-
nove.* ob pedum hemoragiae oedematosis tumorem, per quatuor jam annos sedentarium agere debebat vitam; & cum aliquando gelidissima hyeme, templum ingressus esset, ingenti per totum corpus horrore, aruum tremore, dentiumque stridore afficiebatur. Tum protinus tumor pedum, licet magnus fuerit, evanuit, & ejus loco erysipelacea inflammatio pedem occupavit, simul vero tantum accessit asthma, ut vix spiritum trahere posset, & de suffocatione timeret, cum pulsu intermittente, rubore faciei, ac perpetua in somnum proclivitate. Dabantur pulveres diaphoretici ex cinchonide diaphoretico, oculis cancrosum, nitro depurato, & camphora; qui, conjunctis laxantibus id effecerunt, ut tumor pedes occupasset, & cuncta reliqua conquiescent symptomata. Sed praeter opinionem regebatur scena; tumor oedematosis retrocedebat, & sequebatur asthma gravissimum: datus vero prioribus, redibat tumor, remittebant mala. Nihil minus tertia vice disparebat tumor, denique gravissimum post se trahens stridendi difficultatem; & jam iterato priorum remedium usum ad pedes reverti, contumaciter recusabat. Verum perperna accedebat ad matulam stimulus; & quoniam morbum per urinam solum in animadvertebam, hujus fluxum, data tinctura antimoni

acri, cum sale nostro volatili oleoso, secundare studebam. Unde factum est, ut urina copiosissima quantitate, & assumptorum proportionem longissime superaret, veluti in iis, qui diabete laborant, mingeretur, & ultra tres septimanas insisteret. Tandem vero, commendato alimentorum boni succi usu, melleo fiebat naturalis, & aeger perfecte convalescebat, ita quoque, ut nulus amplius pedum adpareret tumor.

Epicrisis.

1) Insignis est relatio five metastasis, quam tumor oedematosis pedum, cum morbo asthmae habet; adeo, ut illo disparente, hic protinus excutitur, & illo rursus adparente, hic vel plane tollatur, vel insigniter allevetur: cujus ratio supra jam fusius est tradita. Causa repulsi oedematis non alia fuit, quam frigus externum, quod confringendo partes exteriores, & occidendo cutis spiracula, flagrans intus serum, ad pectus ascendens repressit. Sub hoc vero partium exterarum, & musculorum spasmo, portio quam sanguinis stasis concepit, cui supervenit inflammatio erysipelacea.

2) Mira ac fere divina est camphorae cum nitro, antimonio diaphoretico, cinnabari, interne datae efficacia, in resolvendo, ac expellendo sero acri tam viscido, quum subtili ad externas partes; quam contra Medicorum communem sententiam, absque ullo damno, vel humorum assu existeret. Quare hoc egregium remedium genus, insigni cum fructu in inflammationibus, etiam internorum viscerum, discutendis; & exanthematibus, febrium malignarum, aliorumque morborum, è corpore procribendis adhibere soleo.

3) Notari dignissima est solutio asthmatis, ac oedematis pedum, per diuresin copiosiore, veluti diabetica. Hac omnino in tali casu pro critica habenda est, nec ullo modo sistenda, tantum abest, ut potius quacunque ratione eam promovere oporteat: nec obscura est ratio, siquidem serum illud impurum, acre, viscidum, quod flagrando in pedibus oedema, in pulmombus asthmae progesserat, ad renes depellitur, & per urinam è corpore penitus eliminatur. Quo in casu, ad promovendam mictionem, tinetura animonii acris, permagna est virtutis.

OBSERVATIO VI.

Asthma à morpulis per Ligat. Ichth.

Flagitavit aliquando opem meam vir quidam generosus, duobus ab hac urbe miliaribus habitans, habitu aliquin spongioso, lividoque colore praeditus. qui, cum podagra ac calculi faciem diu sustinisset, impatiens tandem dolorum, Medici ex vicina quadam urbe auxilium imploraverat. Ille ad suscitandos podagrae dolores, liamenno ex spiritu vini rectificato, in quo solutum erat fuis opii & camphorae, manuum atque pedum articulos inungere jussit. Inungit aeger totum corpus liberaliter, dolores remittunt, sed horum loco lassitudo, visum languor, & postremo asthma convulsivum corpus occupat: quod cum pedum oedemate, sumisque praecordiorum anxietate junctum, perpetuum minabatur suffocationem. Accedens ego, exploratis causis, praedixi incipientem statum, quin ipsam mortem, quae etiam non multo post, adhibitis in casum remedia, insequeretur.

Epicrisis.

1) Asthenatum illud genus, quod à materia acri ac fere caustica, nervis praecordialibus incumbente, & à podagra, anthraxe, aliisque malignis exanthematibus repulsi, ad pectus delata, suboritur, non raro brevissima est exitus: siquidem vellicati nervi, maximeque tunicae bronchiales ac pulmonales, tam graviter confringuntur, ut statim lymphæ in pulmonum substantiam extravasetur, atque repentinam inducat suffocationem. Quo in casu post mortem reperitur summa pulmonum restrictio, modo cum, modo sine aquarum extravasatione.

2) Summa itaque medentis cura sit, ut morus podagrici ac arthritici ad sua loca revocentur: sic enim protinus remittere asthma, perpetue est observationis. Dignus hoc loco est, ut allegetur, casus, quem his verbis recenset DODONÆUS: *Mercator pueris tam gravi, atque diuturno suspirio vexabatur, ut licet nullum remedium intus intumtum relinqueret, nihil tamen inde allevaretur. Idem tamen invadentibus postremo calculi, & podagrae doloribus ab orthopnea liberatus fuit, ita, ut cum antea in fœdli cibis, somnusque ipsi esset capiendus, jam decumbendi facultas morbi breviori ipsi concederetur. Adeo, quam frustra à remediis sibi promissat medicamina à morbo impetravit. Similem causam recenset ETTMULLERUS Oper. pract. pag. 184.*

3) Prudentis tamen est Medici, ut in tam ancipiti statu, neququam deierat agrotantem. Oportet nimirum ipsum, procius non insudendum curare clysterem: purgantia enim, vomitoria, quin & ipsæ venæ sectiones, nisi mortem accelerent, summe tamen perniciosa sunt. Oportet porro spasmos praecordiorum, adpositis pectori vesicis, decocto emolliente plenius delinire; & internis diaphoreticis & antispasmodicis pugnare. Nec alienum est, pedes in tepidam immittere aquam; aut si pernix adhæret malum, vesicatorium supra pedum admovere.

OBSERVATIO VII.

Quam aliquot abhinc annis, in Carolinis degere fontibus; accessit illos, vir quidam generosus ex aula Gothana, qui ex intemperantia potus, & frigore intensio, sub quo, pectus ipsi libere exponendo, iter fecerat, ab aeris inclementia, asthmaticum fibernet contraxerat morbum. Erat ipsi habitus corporis cachecticus, facies flava, & plumbea; tantum tamen ipsi visum suppetebat, ut thermas adire posset. Hausta ingenti aque quantitate, nihilo minus instabat malum, jamque incredebant symptomata, cum maxima anxietate, & suffocationis metu, adeo ut interdum paroxysmi ad octo vel decem horas exacerderent. Quibus compulsi, pulvis mucosus potum omitebat: interim alvus erat fluida, & augescere malo levior sinistri brachii paralysis, & insensibilis scapularum dolor infestabat; aqua in thorace ita incredebant, ut commoto corpore fluctuatio perciperetur in pectore; tumor autem in pedibus, & abdomine nullus; & pulsus in sinistra manu debitor, in dextra fortior, validiorque emicabat. Postremo cum nihil prodessent optima remedia, animi defectione oppressus, in ipsa urbe obiit.

Morbum erysipelat. cut. m. p. sub. cut. pect. nec indur. testat.

Epicrisis.

Epicrisis.

1) Discimus ex hoc casu, quam inopportuna sit aquarum mineralium usus, in asthma, quod jam inveteravit, & cum extravasatione aquarum in pectore conjunctum est. Plures sane ejusmodi casus mihi occurrerunt, ubi, ad fontes Carolinos degressi, hisce subiectis fuisti, ut abstinere a thermarum potu, & praedicti funestum eveniret; qui etiam in multis tandem evenit. Dum enim viscera jam sunt obstrueta, moles aquarum ea transire nequit, & in vasis subfistis, symptomata mirum in modum exacerbantur.

2) Quomodoque spiritus omnibus nervosis partibus inferendum est; ita maxime pectori deprehenditur inimicissimum. Quam plures mihi cogniti sunt casus, ubi ex eo solo frigore, liberatus atque diutius pectori admisso, tussis, asthma spasmica, & cardiacae atrocissimae propullulavit. Hinc non rarum est, eos, qui venatoris, aut aucilis manibus praesunt, & pectore, uti mos fert, minus tecto incedunt, ejusmodi affectibus infestari. Et si nostrum consideramus casum, non sane ex alia causa originem traxit asthma, quam ex frigore pectori admisso: siquidem ager venationibus indefessus vacavit, nudoque pectore sub gelidissimo coelo incedit. Quod cum forsan inconvenienti tractatum sit medela; omnino in hydropem pectoris tandem degeneravit.

OBSERVATIO VIII.

*Asthma à
respiratio-
nem erig-
piles.*

Laboriosus nostrae civitatis pillos, XLVI. annorum, robustae atque corpulentae constitutionis, iracundiae malum doctus, potus spirituosus non minus ac crassiori cerevisiae adiectus, nudis a puero per integros saepe dies pedibus incedere solitus, ante tres annos in dextro pede erysipelas habuit. Quo per spiritum vini camphoratum, à Chirurgo imprudenter applicatum, non tam difficile, quam in horrendum pedis tumorem commutato, ingentem pectoris oppressionem, cum spirandi haud exigua difficultate junctam, protinus expertus est. Neglectum ab initio malum, progressu temporis adeo increverat, ut ager nec corpus sine molestia movere, praesertim versus terram inclinare, nec scalas ascendere, nec quidquam portare, nec in lecto sine suffocationis metu jacere; nec nisi seorsum insidens noctes, scire insonnes transigere posset. Hinc, accedente utriusque pedum oedemate, majori autem dextri, qui olim erysipelate affectus erat, ab omnibus negotiis abstinere cogebatur. Jungebantur potius sensim ingens virium, & appetitus prostratio, aëlis internus, absque feri, qui vesperi potissimum invadens, & ab ultima dorsi regione incipiens, per spinam ad caput usque pergebat, ibidemque in frigidum erumpens sudorem; & cum summis praecordiorum anxietatibus, ac ingenti anhelatione spiritus, totam noctem molestem reddebant, somnoque privabat. Neque sub hoc astu majori quicquam fuit solatio, quam liberior aeris frigidi accessus, quem cupidissimus aperto ore hauriebat. Vacabat tussis, quoties autem cunque quid per os aut nares fecederet; sensit insignem levamentum. Alvus erat adstrictissima, & vix quovis quarto vel quinto reddebatur die. Abdomen flatibus fere targebat, & in eodem

fluctuantis quasi aquae ssepitum se sentiebat affluere; urinam vero satis copiose mingebat. Consultus ego, cum ex pulsu tanto, sed magno, & saepius mutato, sanguinis, qui diu non erat detectus, abundantiam coepit erigere, purgato prius ope pilularum balsamicarum, cum Libe Sedlicensi alternis diebus summarum, intestinorum canale, ex vena in brachio tusa septem cruciis uncias curavi detrahendas. Quo factum est, ut & abdomen detumescere, & spirandi angustia immineat coepit, accedente praesertim copioso acris materiae ex utroque pedum effluxu; qui externo sacculorum discutientium, ex floribus chamomelae, sambuci, camphorae, & farina fabarum &c. paratorum uso, frictionibus, maxime vero pedum in vas calefacto fursure repletum crebriori & diuturna ad genus usque immolatione adjutus, & affectum oedematofum minuit, & pectori insigni attulit solatium. Praeterea ad diluendos viscidos humores, ab omni cerevisia ipsum abstinere, ejusque loco decoctum imperatum, cum quarta vini parte mixtum bibere, mane vero in lecto insiduum ex herbarum veronica, hyssopi, rosmarini, salviae, scabiosae ana manipulo uno, cortice ligni fallasae, radicis liquiritiae, feminisque fœniculi ana drachma una fortillare jussi. Denique ad exertionem mucii, insigni cum fructu usurpavit hanc mixturam: *Recipe aquarum hyssopi, veronicae cum vino ana uncias quatuor, oxymeli squallidis unciam unam, essentiae gummi ammoniaci, phycorrhise, croci ana drachmam unam, syrupi de erythrae Lobelii unciam unam. M. d. de qua singulis diebus, quater tria vel quater cochlearia sumit.* Aëlis internus, quoties recruduit, vel adhibito cum aqua fontana pulvere nitroso absorbente, vel etiam emulsione, ex semina quatuor frigidorum, seminis papaveris ana drachmas duabus, aquae cerasorum nigrorum, storac aciarum, rosarum, cinamomi sine vino ana uncias duabus, syrupi papaveris albi uncia & dimidia confecta, insigniter mitigatus fuit, subiequenti somno tranquillo; & vires haud mediocriter restaurante. His itaque remediis per mensem circiter continuatis, ager non modo liberius, & sine omni molestia spiravit; sed & adpetere, dormire, & vires, miro spectaculo, sensim recuperare coepit, adeo ut & in publicum denovo prodire, & negotiis domesticis interesse consueveret. At immutato celeriter aëre sereno in pluviosum, & accedente ira gravius; omnia praesentiam inducunt faciem, vires nimirum fractae, adpetitus dejectus, somnus inquietus, & asthma forius revertebatur: sed aliquot circiter dierum intervallo, partim ope descriptae emulsionis, partim ope pulveris ex radicis vincetoxici scrupulo uno, squillae & nieri ana gravis sex concinati, subactis omnibus hisce symptomatibus convalevit.

Epicrisis.

1. Hujus affectus historiam, cum curatione, & adhibitis remediis, ob junioris Medicos tracticos, de industria paullo pleniorum exhibere constitimus. Ex his vero notatu dignis, perniciosissimis spiritus vini camphorati effectus, quem saepius in tumoribus erysipelaceis, arthriticis, podagricis &c. comperi, injungendus mihi videtur. Nam sicuti provida hujus spiritus in tumoribus & doloribus, à lento & stagnante humore obortis, applicatio non caret sua laude & usu:

usu : ita contra in naturis sensibilibus, & mobilioribus, serum visiosum ad interiora repellendo, vel magis incrassando, non minimam noxam infert.

2) Annotare etiam ex hac morbi historia licet, facilem omnium symptomatum, quæ plane quiescebant, à solo ita motu recursum, & exacerbationem. Unde apparet, causam huius affectus non tam ab humorum mole, & crassitie, sed à visio, & præternaturali nervosarum partium motu foveri; quem blande anodynis, & demulcentibus consiliis, quam spirituosos sopi- re, & delinire præstabit.

3) Præter hæc memorabilis squilla videtur effectus, aliquot etiam aliis exemplis notatus, in spasmodicis & convulsionibus partium nervosarum præsentissime sopiendis, maxime catarrho suffocativo, asthma convulsivo, quandoque etiam in ipsa epilepsia: qui effectus notius quidem sententia principio anodyno, sed subtilissimo discutienti ac resolventi intermixto debetur.

OBSERVATIO IX.

*Asthma
spasmodi-
cum à re-
trospira-
tione.*

Generosus vir, annorum XL. habens strictio- ris, sanguine pleni, temperamenti quæ sanguineo-melancholici, vita olim sanctus valde mobi- lis, iracundie desinus, & pro potu ordinario vino rubro, aqua diluto usus, ante aliquot annos cruorem ex venis scissilibus, sed semel tantummodo profudit, & paulo post insulsum podagricum, caraplasmaticis proligatum, passus fuit. Quatuor elapsis annis vitæ genus plane sedentarium subit; in quo asthma, quod jam diu utur levissimum sustinuerat, accedente præter- conjugii carissime mortis, & iode sub- onto vehementi motore, insigniter increvit, cum gravi cordis palpitacione per intervalla sit- patum. Prævia venæ sectione, adhibitisque variis medicamentis, ordinabantur aque Sedu- censis: quæ tanquam aberat, ut serena levamen, ut potius sequuto autumnus, ingentem in modum spirandi difficultas, fere suffocativa, in- valesceret, & maxime versus noctem cum ar- distima tussis infestare. Consultus Medicus, venam tunc jubebat, detracto sanguine aterrimo, cuticula subpingui invellito: ordinabatque varia resolventia, incidenda, absorbentia, laxantia, pediluvia, & quoniam status simul molestant, carminativa: à quorum usu per urinam insignis amuræ tartareæ quantitas reddebatur, & gene- rosus æget egregie habere incipiebat. Verum, cum satis longo interjecto tempore, diætæ regu- las transcidisset, & aeri humidiori sese ex- posuisset; recrudit anhelatio, priori fere gra- vior; sub qua urina rursus deponbat copiosum sedimentum. Adhibebantur venæ sectiones, fones Selterani, varique remedium genera, sed in cassum; quin tandem accedebat peri- pneumonia. Huic septimo die vehementis ortho- pnoæ, cum maxime in pectore strepitu, absque omni expectoratione, adeo vexatus jangebatur, ut per aliquot dies incurvato pectore, angustiam trahere deberet spiritum. Expectorationis exacer- bantur malum; ab antispasmodica vero & in- fusu calidâ solamen percipiebat; junctisque aliis remediis generibus, ab hac gravi primum scire, & subside ab asthma ita restituebat, ut in publicum quoque prodire posuisset. Ve- rum novissime, sub humidiori verisus aere, il- lud rursus incurrit, cum pedum oedemate, no-

tu discrepante, corporisque contabescencia spi- razum: & in hoc rerum statu meam flagitabat opem. Commendavi itaque præter rectam vi- vendi rationem, maxime studiosam ab aere hu- mido, frigidoque abstinere, & flatas venæ sectiones, pulverem meum præcipitantem, liquorem anodynum, & elixir vitæ balfamicum; vinum rubrum pro potu interdixi, & Selteranas conjunxi, atque pediluvia: quibus factum esse percepi, ut egregie valere coperit.

Epiresis.

1) Aëris diversâ constitutio, sicut ipsum asthma inducere valet, ita quoque varias asthma- tici insert mutationes. Quando enim mercurius in barometro, ob imminutam aëris, vaporibus aqueis infarcti, elasticitatem descendit; autum- nali præsertim tempore ventis ex austro & Ze- phyro flantibus, difficior semper est in asthma- tici spiratio; quod si vero mercurius in barometro ascendit, uti fieri conspiciamus flante Euro, qui valde est temperatus ac elasticus, optime habent asthma tici; hinc videmus, quan- tum ad liberam spirationem aëris conditio con- tribuat. Nam si ille nimium levis, tenuis, ac rarefactus est; quemadmodum in altissimis mon- tibus, vel hypocaustis calcfactus vel balneis de- prehensur: tunc oequit resistentiam sanguinis & aëris interni in vasis pulmonalibus contenti superare; neque ideo progrediuntur humorum per- pulmones ad sinistram cordis ventriculum pro- movere; quare etiam sub levissima atmospha- ra homines suffocari posse experientia docemur. Inde quoque ratio patet, cur ab aere vaporibus carbonum accensorum repleto, & certo loco in- cluso, homines suffocentur; quoniam videlicet hi vapores sulphurei, aëri demant vim elasti- cam expansivam, ut ille interni aëris & sangui- nis resistentiæ superande iopar fiat. Quare no- nitum, ab asthma tici studio observandum est, ut quemcumque humidum & nebulosum studio- se vitent aërem.

2) Scitilicet aquæ, sale amaricante, quod calcareæ indolis est, valde turpida & magna ac crebriori dosi hausta, in asthma tici & in om- nibus spasmodicis affectibus, nisi eos exacerbent, saltem sunt inefficaces; & potius profunt in mor- bis sic dictis frigidis, putridis, ubi multum muci, quem incidunt, resolvunt, ac evacuant, primas vias obfudet. Sal enim earum ob inge- nem vellicationem nervis, spasmo affectis, est insensum.

3) Asthmatici spasmodico facile supervenire po- test peripneumonia. Vi enim contrictionum, quæ membranas pulmonum ac bronchorum oc- cupat, sæpius sanguinem vel feri in vasculis mini- mis stasit, & accedentes inflammationes pro- ducunt, quæ peripneumoniam constituunt: & tum anctus sane est retum status.

4) Quam in nostro ægrotaente nulla fuerit nec viscerum obstructio, nec pectoris hydrops, non mirum est, quod meris antispasmodicis hic mor- bus percurari potuerit.

OBSERVATIO X.

Ante decem circiter annos consilium à me petiit Theologus quidam, vir quinquagenarius, temperamenti sanguinei, dolore ex calculo, at- que podagrigo per intervalla ab aliquot annis af- fectus, qui in gravem spirandi difficultatem,

*Asthma
spasmodi-
cum à re-
trospira-
tione.*

continuum quidem, sed sub aëris mutatione admodum inualecentem incidere. Sub aëre enim temperate humido debebat semper melius, quam nimis siccò & frigido. Mali primum causam tribuebat incuria, quod in camera calce viva recenter obducta somnum cepit; quoniam ab eo tempore aërius spiravit. Plures consuluit Medicos; sed à nullis remediis quidpiam opis perferenti. Ego lac asinum praebeundum suasi; sed ventriculum id ferre recusavit. Succellit tandem atrophica, & tumor pedum ordematofus, cum febre hectica, & inequuta morte. Aperto post obitum corpore, hepatis repertum est ingentis magnitudinis; pulmones mirum in modum inflati, distentique, & cor solito grandius adparebant; ut totam fere thoracis cavitatem replerent. Hæc equidem nullam, pericardium vero insignem extravasati serti fovebat copiam, & intestina erant inflammata.

Epiçrifa.

In asthmate demortuis pulmones valde inflatos & expansos fuisse repertos, plures docent observationes. Vid. RHODIUS *Cent. II. obs. 22.* COSTÆUS *de pœn. in morbis Lib. III. cap. 30.* DODONÆUS *observ. 54.* Præterea RUYSCHIIUS *obs. anat. chirurg. obs. 19. & 20.* in pulmone invenit acervum vesicularum pellucidarum, ab aere expansarum, & adeo obstruendarum, ut levi compressione aërem ex iis haud evacuare poterit. A vaporibus calcis vivæ bronchiales ramulos ita posse contrahi, ut aer atmosphaericus ob gravitatem & elasticitatem, quæ pollet, in vesicularum pulmonalium cellulas impelli, sed non adeo facile exire possit, vero est simillimum. Ex inde etiam factum est, ut æger aërem temperate humidum, ob vim fibras & tunicas confusas relaxantem, melius ferre potuerit, quam siccum & frigidum. Crediderim in tali casu, vaporem ex floribus emollientibus, cum lacte decoctis, ad interiora pulmonum admixtum, longe utilissimum fore; neque emplastra demulcentia, nervina ex auxungia, suo fructu destitui. Interne vero lacticia, & auxungiae animalium, sperma ceti, oleum amygdalarum dulcium, in ejusmodi asthmate siccò, neque minus in eo, quod metallurgica ex fumis saturninis, ore haussis, familiare est, optimam pollicentur opem.

Quam perniciosam & virulentam vim, in contrahendis faucibus, & viis spiritalibus, exerant effluvia, quæ ex locis calce viva obductis emanant, quotidiana edocet experientia. Ante viginti annos tres filii Consiliaria primarii, qui infra annum decimum erant constituti, in camera dormientes, recenti calce investiti, intra aliquot dies angina suffocati occubuerunt.

OBSERVATIO XI.

Aliquot abhinc annis, per litteras me consuluit, vir quidam generosus, æt. annorum, ex Livonia, vehemens asthma per biennium jam passus, docerique voluit, nam ipsi sint profuturæ thesauri Carolinæ. Conquererebatur vero non tantum de summa præcordiorum anxietate, spirandique difficultate; sed & de vehementi ipsius sterni spasmodica non minus, ac dolorifica stridura, atque thoracis & scapularum compressione, tanta violentia per periodos invadente, ut non raro animi deliquia, cum extremorum

frigore, sudore gelido, summaque inquietudine slipata jungerentur: qui paroxysmi ab ira, & à cibis inflantibus, maxime si alvus immixta sit adstricta, semper erant graviores. Contraxisse abimet hoc malum scripsit a vehementia frigoris, sub levioribus vestimentis ad præcordia atque pedes admissi, quos ad genus usque, venarionibus indulgens, sæpius in aquarum immixta flagna. Ceterum de hæmorrhoidalibus fluxibus, & hypochondriacarum passiorum vacuitate gaudebat naturæque robustioris semper fuit: de frustra multis remedium generibus, sanguinisque missionibus usus est. Ego igitur consultus, iussit utique thermarum Carolinarum internum, peractaque harum potatione, Toeplicensium externum usum. Paruit meo consilio, & corpore viribulque profusus extenuatus, accessit thesauri, canique cum tanto potavit levamine, ut sequenti anno eorum potationem iteraret. Conjunxit insuper usum elixirii visceralis cum tertia parte liquoris anodynici permixti; nec non essentia corticum aurantium bene preparata, eisdem liquori nuptæ; atque pulverem nitroso-temperamentum, interpositus pulvis balsamicus. Externe emplastrum nervinum temperatum præcordiis & sterni admotum, egregium tulit allevamentum. Quin brevi abhinc tempore per litteras mihi nuntiavit, se à malo suo penitus liberatum, athletice jam valere.

Epiçrifa.

Multa mihi cognita sunt exempla eorum, qui ex sola frigoris ad præcordia adussis vehementia, cardialgia spasmodica cum summa sterni stridura laborant; & insignis semper, vel ab emplastro *Barbette*, vel nervino, quod ex auxungia humana, seu cervino, croco, balsamo Peruviano, myrrha, misco, paratur levamen sine expertu. Vis enim intensi frigoris tanta est, ut non modo, occultando cuius poros, transpirationem impedit, sed potissimum, ut iis partibus solidis, membraceis & nervosis, earum internam texturam ac striduram immutando, labem inferat; quæ haud ita facile corrigi potest. Quomodo vero in omnibus parum nervosorum morbis, qui a frigore nascuntur, circumspicuum thermarum internum externumque usum deprehendi efficacissimum: ita quoque non dubitari, quin illud in præsentis morbo commendaverim, cum successu felicissimo.

OBSERVATIO XII.

Vir generosus, in dignitate constitutus, æt. Asthma rheumaticum cum Cerebri præfatione. annorum, plenioris corporis habitus, ex loco quodam, ubi laeo, inordinato, simul autem valde mobili usus fuerat vice genere, domum redux indulsit demum vice sine motu desidi, multique occupationibus plene: unde protinus de rheumaticis, atque catarrhalibus in pectore incommodis, coryza, tussis, rueridine, atque spiratione iusto difficiliore conqueri coepit. Ante annum vero, per domesticas calamitates animo non parum fractus, plures noctes inquietas valde, cum molesta hypochondriorum distensione, maleoque sudore slipas transiegit. His demum accessit ægerissima spiratio, quæ tanta erat, ut vir in lecto se continere posset; sed ad capiendum aërem liberorem in conclavi discurrere, & fenestras aperire debebat; adpetitum tamen semper salvo & integro existente. Progressu temporis, exhaustis viribus, corpus contabuit,

tauit, & spirandi difficultas adeo increvit, ut ad levem corporis motum, quando vestes vel exuere, vel induere, vel scalas ascendere, vel etiam alium cum nisu quodam deponere voluit, protinus suffocatorium fere pectoris compressionem, cum summa molestia passus fuerit. Quin memini, virum illudrem aliquando noctu in gravissimum eumque praefocantem ferme pectoris affectum incidisse, qui à quadam defluxione à capite ad pectus irruente pendebat, & cum tanta spirandi angustia inhaerebat, ut ob totius corporis tremorem, faciem rubicundam, extremorum refrigerationem, virumque lapsum, mori perquam vicinus videretur. Desideravit in hoc paroxysmo haustum aquae frigidae, quo summo mirifice recreatus, & liberiores expectorationem habere, & minus impedium spiritum ducere cepit. Ceterum aegrotanti nulla nec ad haemorrhoides, nec ad podagram erat dispositio; at patre, haemorrhoidum fluxui obnoxio, hocque cessante, asthma hydropico correpto ac devoto, natus fuit. Postquam igitur ordinatis à Medico varii generis pectoralibus, & antialthmaticis remediis, nec non sanguinis missione, exiguo, vel plane nullo fructu usus erat: me tandem accessit, meumque desideravit auxilium. Commendavi quam plurimum thermarum Carolinarum potationem; quam non sine multo levamine insituebat, & sequenti etiam repebat anno. Praeterea tam ante, quam post harum usum suavi, ut à cena vel prorsus abstineret, vel eam ter minimum quavis septimana intermitteret; non minus loco cerevisiae saturatioris, tenuioris, sed satis salubrem Lecegiensem, ac sonnem Scleratum cum quarta vini parte biberet; atque multa equitatione, vel ambulatione corpus frequenter exerceret. Ad haec familiariter utebatur essentia corticum aurantiorum, bene preparata, cum essentia camminativa permixta: vinum quoque medicatum, quod ex herba cardii benedicti, comis absinthii, herba ranunculi hortensis, corticibus citri, aurantiorum, agarico, thebarbaroque confectum erat, singulo mense, alterna diebus hac ratione assumebat, ut quatuor ante prandium horis, forbillat prius iusculum carnis, hauriret sex dicti vini uncias; quod multum mucum pariter, atque fluxum subduxit, cum exoptatissimo mali levamine.

Epietisi.

1) Quantum detrimenti mutatio vitae generis mobilioris in immobilis, servata eadem, quae antea fuerat, victus proportionem, asserere possit valetudini: quam plurimis in praxi compertum habemus exemplis; unde veritas aphorismi HIPPOCRATICI confirmatur, quo, *multis, inquit, morbi sunt, quando eibus superat laborem*. Hac enim ratione nimia ferè impurius copia generatur; ex qua rheumatismi, maxime pectorales gignuntur: & quoniam in tali vitae genere digestiva vis languet, cumulantur inde cruditates in primis viis, ex quibus generantur flatulentiæ, quæ affectus catarrhales, & asthma ticos insigniter augent. Quamobrem non sine ratione Viro optimo commendavi, ut, quoniam avidiori fruebatur adpetitu, parciore victu, frequentius corporis motu uteretur; & accommodato laxante, lentos viscidos humores ex intestinorum canale repurgandos curavi. Quum vero ejusmodi affectus, si vasa parentibus trahantur, vel in habitu degeneraverint, solis istis remediis,

non facile cedere solent; ad efficaciora descendere oportet, ex quibus, ob insignissimam, quam inde lapsum deprehendi, virtutem, thermæ Carolinæ, & postea Trospicenses, cunctis reliquis palmam eripiunt.

2) Debetur peculiaris animadversio illi effectui, quem aqua frigida in affectu pectoris catarrhali, ac pene suffocante, praestitit excellentissimam. Quando enim pulmonem totum adeo debilitatus est, ut irruens in illos pueritæ copia haud expectorari possit, tunc aquæ frigidae haustus, lenè his partibus addendo robur, adjuvat expectorationem; quia facta mitigatur, quin cessat reliquus affectus.

3) Circa potationem non modo acidularum, verum etiam insulorum vinorum, si frigida sint, notari meretur, quod quibusdam subiectis, stomacho existente jeuno, pota molestia creant. In tali casu hiisce personis fortiorum iusculorum calidorum injungere soleo; atque tum potum aquarum vel insuli purgantis concedo: quoniam hac ratione, frigus illorum fluidorum, fibræ ventriculi nervis non adeo molestum est.

OBSERVATIO XIII.

Vir quinquagenarius, corpore robusto, sanguine, fuscilico pleno infusus, largis epulis, & sub his vino adestu usi solitus; in aetate juvenili, narium haemorrhagiis, vinis vero dispositioni haemorrhoidali obnoxius, ante aliquot annos mollesio in osse sterni, circa regionem tertiae costae corripiebatur tuberculo. Quod, accedente gravi iracundia, inflammatum, tandemque suppuratum, scilicet quidem sectione exsiliabatur; sed insignem spirandi difficultatem, à tussis & excretionis mucæ vacuum, relinquebat. Hac vespertino possimum invalefcebat tempore; & sub inspiratione, in eo, cui tumor insedit, sternit loco, videbatur quoddam haerere impedimentum, quod libero aëris ingressui obicem poneret. Ceterum alvi est adstrictioris, neque raro dolores dorsi pergerant; & novissime coe adapaverunt haemorrhoides. Consultus commendavi venæ sectiones ter quotannis iterandas; cucurbitas cum scarificatione, dorso ac regioni renum quandoque admovendas; & si recruduerint coe hæmorrhoides, sanguifugas ipsis adplicandas. Deinceps, procurata, alternisque diebus ad tempus iterata alvi laxatione, dedi *pustularem ex lapidum cancerorum uncia dimidia, solutionis ocularum cancerorum, nitri purificati ana drachma una* confectum, ut ejus dimidiam drachmam mane ex aqua ranunculi hortensis, forbillatis desuper aliquot insuli veronice vasculis sumeret. Ordinavi quoque, ut recte vivendi rationi fladeret, maximeque elevatis capite ac pectore cubaret; & denique loco, quem tumor obsecerat, adplicandum suavi emplastrum, quod ex *gummi ammoniaci, myrris, bdelli ana drachmis tribus, terrebina veneta, avicula humana, cere uncia una, storum sulphuris, campbora ana drachmis duabus, croci, olei auri ana drachma una* conficiendum docui.

Epietisi.

Asthma hoc spasmodicum natales suos possitissimum mutatur, à tuberculi in sterno suppurati inopportuna excisione. Quemadmodum enim generatim ulcera, etiam arte condita, quæ

Asthma
spasmodi-
cum di ca-
brevalis in
osse sterni
excisa.

2.

que: appellamus soniculos, premature consolidata, gravissima spirandi difficultate stipari, frequentius conspiciemus habemus observatione: ita hanc eo facilius comitem habent ulcera, & lacerationes ossis sterni, male seriatis artibus tractata. Sternum scilicet, quod est os molle, ac valde spongiosum, in parte interiori, eaque concava, proxime investitur valde nervosa tunica pleura; ejusque medietate parti per longitudinem adnectitur mediastinum, productio duplicata pleurae, eique sensibilitate neutiquam cedens, subeclaque insuper arteria aspera. Quare vero est similem, exciso illo tuberculo, serum acre, quod illud ploravit, per porosam illis subtilitatem retro actum, mediastino protinus infusibile, ejusque spasmodicam indurabilem stricturam; quae renuissam illam sub inspiratione sensationem perficit. Hinc, testante ETTMULLERO *Oper. Pr. Part. II. pag. 565.* inflammationi mediastini jungitur tum molestus in inspiratione circa sterna regione renitit.

2) Praeterea vero ad generandum in hoc casu asthma contribuit, congestio ac infarctus humorum in pulmonibus. Huic primario etiam debetur tuberculi illius generatio. Namque dum aeger haemorrhoides fluentes habuit; illae vero posthac cessaverunt: vix fieri posuit, quin humorum flagrationes, in vasis imi venter, maxime intestinum, congerirent: unde reptenda est alvine obstructionis origo. Notum vero est, quod ubi circulus humorum in abdomine irregularis fertur, spasmus in hac cavitate protinus excipiant, & flatulentiae: hinc cruor majori copia ad praecordia cogitur, pulmones infarcit, spirandique graviores parit difficultatem.

3) Studio commendavi situm corporis cum elevato capite. Namque notari mereatur, quod asthmatici, maxime si a ni: in sanguinis mole tales facti fuerint, ex decubitu supino protinus incurant gravissimam anhelationem. Ex hoc enim situ, major humorum ad praecordia fit affluxus.

Plures de asthmate casus reperies in *Consult. ac Responsi. Medicin. Sect. II. casu LXXXIII. ad XCV.*

CAPUT III.

De Tussi, imprimis Rheumatica & Convulsiva.

THESES PATHOLOGICAE.

§. I.

Vix occurrunt morbi, qui tam propinqua cognatione invicem conjuncti, tantaque frequentia complicati sunt, quam quidem asthma spirandi mollitia, atque tussis; adeo ut vix fieri possit, quin unus alterum post se trahat. Explicato igitur asthmate, ejusque speciebus, de tussi jam agere constituimus. Haec vero, generationem definiendo, nihil est, quam violenta materie peregrinae, ex pulmonum bronchiis, per horum vim contractilem, intensius autem, sive convulsivam, cum vehementiori expiratione facta expulsio.

§. II.

Hujus historiam perinde ac pathologiam scripturus, rectissime a descriptione illarum partium *Frid. Hoffmanni Oper. Tom. III.*

incipere posse videor, quae ad tussim efficientiam proximam concurrunt; quo denum hujus motus, revera convulsivi, essentia patefacit, ejusque differentiae intelliguntur. Ex hujus quidem primariam sedem atque subiectum constituit magnus ille aëreus canalis, cujus ope spiritum trahere benigna nobis permittit natura. Dividitur ille in alveam arteriam, & bronchia; hac per pulmonum subtilitatem serpente, illa ad pulmonibus ad fauces tendit. Hujus nimirum principium, larynx dictum, est canalis a summis faucibus incipiens, ex quinque cartilaginibus, ope membranarum, externae nervae, mediae carnae, & internae glandulose connexis, fabricatis, & superius apertura, glottis adpellata, & operculo cartilaginoso, cui nomen est epiglottidis, obiecta, perforatus. Sequitur principio capaciore tubus, ex cartilagineo-membranaceus, quem alveam vocant arteriam; qui angustiori sensim sinere ad pulmones tendens, circa hos in binos primum dividitur ramos. bronchia dictos. Hi in minores, & minores, coeque innumeros, per pulmonum saticam distributos dissepiscunt, omnes ex segmentis cartilagineis, membranisque contractilibus contractis; & denique in vesiculas minimas, racemorum instar, bronchialibus illis ramulis adhaerentes, & praecipuum pulmonum partem constituentes desunt.

§. III.

Omnes hi pneumotici canales ab initio ad finem cinguntur membrana ex fibris tam longitudinalibus, quam annularibus contracta, & multis glandulis, ductibusque excretoriis ipse obita, quarum glandularum copiam, situm ac figuram exquisitissime delineavit MORGAGNIUS *Advers. Tab. I. t. fig. 1. pag. 42.* Fundant illae, in dictas spirales vias, humorum tenuem, roscedum, blande lymphaticum: quem etiam ex illis glandulis, quae extrinsecus epiglottidis, cartilaginibus arytenoideis, bronchorumque extrinsecus adherent, stillari, dubium quidem, sed vero videtur similem. Has ostendit HEISTERUS in *A. N. C. Cent. VII. & VIII. obs. 63.* Tribuit praeterea hinc ductibus varii generis vasa, provida natura: & quidem primum arteriosa, ab arteria bronchiali: Hac principium sumit ex trunco arteriae magnae descendentes, super arcu arteriarum intercostalium superiorum, & in tres dividitur ramos, quorum unus externe super aspera decurrit arteria, reliqui duo per totam substantiam membrarum tracheae, bronchiorumque pulmonalium multas dispergunt ramificationes. Venosa accipiunt a vena bronchiali, cujus ramuli, simili ac arteriae modo propagati, magni tandem rami in truncum venae caeve descendentes & arzygos abeunt. Utraque videri accurate detexit ac descripsit RUYSCHIIUS *epist. VI.* Nervolos denique ramos inquantur hae spirales viae a pari vago, nec non intercostali nervo.

§. IV.

Primarius horum canalium usus, atque functio est, ut aëri externo, ad faciendum sanguinis circuitum, & conservandam vitam valde necessarium, in pulmones ingressu pariter a. reditu, commodum iter praestet. Hunc in finem dant sunt iis ductibus t) copiosae glandulae, non ut secerant humorem excrementitium; siquidem hac locus excretioni sordium secundum natura

Functio
et
vires
spirandi
vires.

K. turti

ram minime cligatus est: sed ut effundant lym-
pham tenacem, quam membranas tracheæ, &
bronchiorum, ne ab aëre perpetuo illabente exa-
rescant, blanda continasque lubricatione fovet,
aque tum, luo perfuncta officio, in halitus res-
solvitur, & cum expirando aëre, in morem
transpirationis cutaneæ, exhalat. Eodem fopio
tribuitur hinc hifce viæ 2) tunica nervæ, ac ex-
quisitè sensibiles, non minus ac musculosæ, fi-
bris tam longitudinalibus, quam annularibus
præditæ: cuius opo motu gaudet tam conftrictio-
riori, quam dilatatori, quem sapiens natura
cunctis nervosa ac membranæis toxicis corpo-
ribus ductibus tribuit, veluti in uterinis, vi-
sibilibus, & ventriculo ac intestinis deprehendi-
mus. Neque suo insigni fructu vacat hic mo-
nus; quidem non modo ad promovendum aëris
ingressum, & exitum, verum maxime ad lym-
phæ ex dictis glandulis secretionem adjuvan-
dam, quin & sanguinis cursum per viâ bron-
chialis facilitandum permulsum contribuit. Sed
quoniam hi n. broncae ductus, ad spirationis ne-
cessum soli haud sufficientes, ipsi tamen 3) cum
reliquis partibus, quæ ad per-gendum hanc fun-
ctionem concurrunt, veluti sunt pulmones, pleu-
ra, septum transversum, muscoli intercostales,
& abdominis occ. tam artificioso fruantur con-
sensu, ut sere sit impossibile, quin agente una
parte, omnes simul agere incipiant.

£. V.

*Make for-
mative coffee
at 10:00 AM.*

His recte se habentibus secundum naturam fit respiratio: ubi vero cunque unicum dictorum momentorum a naturali flatu recellit, eadem flatum leditur ac pervertitur. Minimus flatus spirandi vitia, & de sola jam tussis loquitur, quae nunquam non dictorum canalium pneumoniconum praeaturali constitutione absolvitur. Vix profecto dubio, quin, quod in ventriculo est vomitus, id in bronchiis tussim, i. e. inveniunt eorum motum torquent esse dicunt. Namque haec motu tussis est idea, quod sub ea bronchiales ductus ab infusis ad superiorum partem vehementius constricti, contentum aërem cum impetu, & celeritate sursum agunt; infusum peregrini quilibet exhalum. Quam autem his male affectis, reliquis quoque i. cloritis partes, spirationi tributas, & quae cum his porro ardoris nimis cohaerent, in severum motum locustatum, vi interioris consensus, rapi oportet: facile patet, cur in tussi, tanquam praeaturali expiratione, quo ca ea vi vehementior, eo quoque violentius totum pectus, totum abdomin, quin & totum corpus concutitur. Vicissim autem ob eandem harmoniam iustissimae fit, ut, si septum transversum, venter, oesophagus, nervi praecordiales, & qui ab illis dependent, vel etiam membrana narium irritantur, a quocunque causa vellicetur: affecta simul fistula aërea, tussim post se trahant.

€ VI.

Ta₂S₅
See: *pr-*
pr-

Si igitur affectio dictorum canalium spinosodico-convulsiva, formalem tulla confinita rationem: et eorumdem vellicatio dictae convulsioni, hinc et tulla causam proximam praebeat, necesse est. Omnis ergo tulla sedem suam in pectore habet; licet causa non semper ibidem obhaereat. Et hae ipsae causarum, quae ad tullas contribuant, mediarum diversitas, tam varias ejus gerit species, quas omnes pertractare, noli non est inutile.

6. VII.

Neque enim agere constitimus de ea tussi, que tanquam molefium symptoma variis jungitur ægritudinibus. Talis est phthica, que à colligatione veficularum, & ramulorum bronchiorum per ulcus pulmonum facta luboritur, à leque continui lacionem pro fundamento habet. In hac non per pulmonales glandulas, sed ipsam bronchiorum cavitatem exfiam, lacera- tam, ac hiantem, peregrina ac ulcerosa eam sub- intrat materia, que vellendo nervosas mem- branas, tussientem producit motum. Deinceps ad symptomaticas tusses pertinet, que asthma- ti, peripneumonia, pleuritidi, scirrhi atque ver- mica pulmonum, inflammationi septi transversæ ac jecinoris superveniunt; que læto nervo vel tendine circa collum luboruntur; que disten- tem dentitionem comitantur; & que convulsivos, aut epilepticos moris, aliisque hysterics morbos consequuntur. Hæ maximam partem, à bronchiorum vellicatione, per consensum dun- taxat inducta, causa morbi in plus minus re- mota à præcordis regione hærente, & producunt, claque sunt documento, tussim pertinere ad affectus nervorum spasticos convulsivos.

6. VIII

Neque etiam ample tractabimus de ea tuffi, que prohibetur à peregrinorum tam soliorum, quam fluidorum infolio in alijarum arteriarum, per gloriandæ rimam deficiente, & vulgo exprimitur : *Es sey vns in der nurechte Koble getommen.* Tragici profecto, & sæpi, ob repentinarum, quam inducunt, suffocationem, functi sunt lucis, quorum notabiles h'lorias recenset MARCELLUS DONATUS in *hyster. med. mirab. Lib. III. cap. VII.* Huc spectant tuffes, quæ à tumoris, calculi, alijue rebus præternaturalibus, affeçtæ arteriæ, atque bronchi accretis subornantur : unde calculos, aliaque corpuscula, grandinibus similia, rufuendo rejecta fuisse, fide digni perhibent auctores. Videas ALEXANDRUM TRALLIANUM *Lib. V. PAULUM ÆGNETAM lib. III. cap. 28. & 31. & PETRUM BORELLUM obs. Cent. I. obs. 67.*

6. IX.

A nostro quoque scopo alienae sunt rustes gravissimae, quas excitant fumi faturni, metallici, inque primis acidi mineralis, cum aëre diutius infusati, & illi potissimum metallicolae experientur, qui argento per plumbum in magnis carinis depurando stantes, nec non figuli lythargio multum utentes: ut & caementarii, & qui cum calce viva multum fumi occupant. Evidens eorum est ratio: duci enim particule metallica, fere corrosivae ductus spiritalis, insigni sensibilitate praeditus ingredientur, itique intus infuuantur; gravem eorum inferunt conditionem, rustis sicce, cum assidue complicare causam.

6. X.

Nec denique nostræ considerationi pressius
subiacet illius genus, & leuius, & breuius:
quod à celubritate transpiratione, in sanis cetero-
quin corporibus evenire solet. Fit nimirum ea,
si subiecta præsertim pituitosa caput vel pectus,
quod antea in calidiori loco leni perspiratione
maduit, subito exponitur frigori, & repressum à
cute ferum aere ad tractatam & bronchia decum-

tur; aut si fenes inprimis noctu in loco frigidiore dormiunt, vel in frigido ac hiemali aere liberius obversantur. Inguitur quoque coryza; & vel calidiori regimine, vel fumen forsan diaphoretico, brevi tempore cessat. Huc etiam spectant delapsus mucæ e naribus ad fauces, & laryngem, qui matutino tempore facili conatu per siccum eliditur.

§. XI.

Tussis
rheumatica.

Sed de ea susus agemus tussis, quæ primarium confluit morbum, totumque graviter afficit corpus, & tam vehementia, quam diuturnitate est molestissima. Vocamus hanc rheumaticam, eo quod rheumaticis revera abolvitur affectionibus. Namque pro causâ agnoscit, humorem, maxime serosum interium, & à superficie corporis, extremisque partibus ad pulmones tendentem motum, atque decubitus; neque unquam à febrilibus commotionibus, vel periculo potissimum tempore conspicuis, ac horripilationibus vacua est. Hæc pro subsectorum, quæ invadit, varietate, vel humida, vel sicca est: illa evenit sanguinis, phlegmaticæque, qui præter partium fibrosarum, nervosarum ac muscularum molliem, serosâ ac pituitosis nimium scatent succis, veluti sunt foeminae præ viris, infantes, pueri, atque senes, præ iis, qui in juvenili, vel virili ætate sunt constituti. Sicca vero tussis magis corripitur hypochondriaci, scorbutici, cachectici, strictiori corporis habitu, & debili, & ad spasmodicos motus valde proclivi nervorum systemate, nec non sæto acri copioso præditi.

§. XII.

Hæmoptoe
sive hæ-
maturia
sive hæmaturia.

Summum tussis rheumaticæ gradum denotamus, per convulsivæ seu ferinæ nomen. Hæc tam effrata vehementia, tantæque totius corporis convulsione adstringit, ut ea non raro sufficere credas miseris: tuncque in infantibus vulgo dicunt: *Sie bleiben außen*. Modo, maximeque sub initio sicca est, & vel nullam, vel saltem parcellissimam feri tensionis, plus minus acrioris copiam elidit; modo humida, tuncque mucum subilividum, sepe tenacissimum, prævis laboriosissimum conatus, secum ducit. Retingens simul extrema, alvus est clausa, urinae mingitur tenuis, & succi vitales majori copia & impetu ad superiora, pectus, atque caput compelluntur: inde sub paroxysmo facies sanguine turgens, rubet, venæ tument, arteriæ fortius cæterisque moventur, oculi prominent, lacrymas eructant, palpebræ innumelant, & interdum ipsæ sanguis, accedente stertutamento, e naribus ejicitur: nonnunquam ipsa pulmonum valcula rumpuntur, spurientes suboritur cruentum. Non tam singulus jungitur, simulque ventriculus adfectus laboriosis vomitionibus, quicquidam stercorea, & urinae præter voluntatem fluunt; quidam, præsertim infantum, hæmuri tussiendo sibi contrahunt, aut adnotant jam HIPPOCRATE aph. 46. Sect. VI. gibbosi sunt: quin M. N. C. Cent. I. obs. 1. notabilem allegant casum, de corpore verberæ dorsalis, præ tussis vehementia, in medio disrupto. Neque ignorari oportet, à nimia tussis vehementia apoplexiam suboriri posse: & BOYLE de natur. philof. observavit, quod ex tali tussis subitanea memorie ac ratiocinii jactura, nec non manuum, aliorumque membrorum enata fuerit paralytis.

Frid. Hoffmanni Oper. Tom. III.

§. XIII.

Causa hujus tussis materialis refidet in humore tenui, acri ac fere caustico, ad sensibiles fistularum aëreas tunicas deposita, easque graviter vellicante. Hæc vel laryngi duntaxat, & arteriæ alperæ insidet, tuncque continuam, & molestissimam faucium titillationem habet comitem; vel profundius bronchiis pulmonalibus inhæret, atque tum gravissimum & atrocissimum parit tussendi conatum. Et generatur quidem hæc humor à sordibus impuris de acribus, ad superficiem corporis, aut aruis exteriores, vel haud satis vegete expulsi, vel quacunque de causâ, maxime frigore, retroactis, & ad pulmones decumbentibus. Hinc docetur, scabiem, tineam, achores capitis, guttam rosaceam, sudorem pedum, aliaque exanthemata repressa, ulcera præmature consolidata, & arthritidem, podagramque intus actam, tussim post se trahere convulsivam. Et quantum quævis alia est causâ, quod morbilli de præcursoribus, & comites, & pedissequas habeant, ejusmodi tussides diuturniores, quam quod materia acris, morbillacea, ad vias spirales retrocessit, easque graviter vellicavit. Conf. A. N. C. Dec. III. obs. 11. pag. 25.

§. XIV.

Non raro etiam hæc rheumatico-convulsiva tussis, ex communî causâ, aëris nimirum vitio suborta, epidemicam per multas regiones exte-
stragem. Occurrit autumnali, ac hiemali potissimum tempestate; si hæc, flantibus antea austris, calidior ac benignior fuit, & subito in frigidam, ventis aquilonaribus molestem, commutatur. Sed hæc causâ impuria duntaxat corporibus rheumaticam tussim insert, cum in aliis non nisi catarrhalem excitare solet. Quare epidemice hujus ferme tussis talem maxime aërem existere causam animadvertimus, qui nebula pernicialibus, maleque olentibus, aut aliis particulis acris, ac sæpius venenatis, febrium quoque exanthematicarum causis, prægnans est: hæc enim particulæ insipirant non modo gravissimam tussim, sed & aphthas, illam insigniter exacerbantes progenerant. Præterea vernali quoque tempore, grassantur interdum ejusmodi tussis epidemicæ, cum raucedine junctæ; tuncque ab exhalationibus salino-acris, in aëre contentis, & calore solis, ex terra hieme oclusâ, evaporantibus, glandulisque per vias spirales sparsis fermet insinuantibus, suam trahunt originem. De malis hæc epidemicis legas HIPPOCRATEM epidem. VI. Sectio. VIII. SENNERTUM de febribus Lib. IV. cap. 17. SYDENHAMUM, & HISTORIAM MORBORUM VRA-TISLAVIENSIIUM.

§. XV.

Hæc de summo tussis rheumaticæ gradu, cu-
jus causâ plerumque externa est, dicta sunt; dantur vero tussis, proprio rheumaticarum nomine dignæ, quæ internas potissimum agnoscunt causas; & sicut diuturnæ, ita maxime molestæ sunt, cumque rheumaticis capitis, ac pectoris doloribus, hemicrania, odontalgia, puncturæ laterum pleuritidem mentientibus, defluxione materie acris à capite ad fauces &c. complicantur. Eveniunt inprimis corporibus cachecticis ac scorbuticis, ex pressio pedum oedemate, alioque tumore; quem tanta ferocitate tussis æque ac spirandi difficultas excipiunt, ut suffo-

Causa ma-
terialis fer-
voris tussis.

Tussis con-
vulsiva cu-
m febribus.

Tussis rheu-
matica cu-
m febribus.

vatio inflare videatur. Familiares etiam sunt hæc tussis senibus, qui impuri scætent humoribus; & in his à frigore externo, dorso, præsertim in ea regione, ubi prima humorum verbera, & plexus infestentis major deprehenditur, admisso. Neque alia est ratio, quam quod serum acre ab externis corpora partibus ad pulmones deferatur. Eandem non raro in subiectis pituitosis, senilibus, qui victu lauto, viisque sedentaria delectantur, & neglecterunt sanguinis missiones, humide sunt, & effusam habent cuticem: tota enim sanguinis & humorum massa hac ratione à copia seri impuri, quamvis non sine molestia, egregie repurgatur, adeo ut, sedata tussis, prilline vires redeant, formisque cum appetitu, & integra sanitate instauretur.

§. XVI.

Tussis rheumatica hæc hæbetur hypochondriaca.

Ad censum tussium rheumaticarum pertinent quæque *stomachales* & *hypochondriacæ*; quarum illæ in ventriculo, hæc profundius in hypochondriis ac intestinis causam habent; & partim ob consensum nervorum, partim ob rheumaticum seri ad pulmones decubitus nascuntur. Et *stomachalis* quidem suis se prodit notis, quæ sunt nausea, cardialgia, adpenus prostratio, digestivis vitiis, sensus in ventriculo gravatus, & quod primus tussendi stimulus circa cordis scrobiculum sentitur. In *hypochondriaca* junguntur stultitiae, ipsius intestinorum; ac symptomata reliqua hypochondriaca. Prior, nempe *stomachalis* fit à saburra acri, biliosa, acida, ventriculo, &que superiori maxime officio, nec non oesophago inhaerente, harumque partium nervosa tunica, quæ archilline cum visis fibrillis necluntur, vellicante; unde creber conmutatur vomitus. Vexat cumprimis, ventriculo à cibis vacuo; & familiaris quoque est febre tertiana, præsertim continua, laborantibus; testante jam HIPPOCRATE *Lib. II. epidem.* Posterior, nimirum hypochondriaca generatur, ab humoribus crassis, impuris, serosis, & squamosis, ac statulentiorum abdominalium, ad pectus & pulmones compulsa; & eo magis infestatur, si agens singus, aut animi affectus, tanquam occasionales cause præcesserint. Generatio vero illud monendum est, quod omnis tussis, quæ est periodica, à saburra in ventriculo, vel potius intestino duodeno stibulante suas mutetur natales.

§. XVII.

Tussis habitiva.

Adhuc notari meretur ea tussis, quæ *habitiva* est, & *cathartica rheumatica* vocari meretur. Ea postillimum dependet à relaxatione glandularum in faucibus, palato, ac larynge fixarum; & per multos annos continua exicatione durat. Jungitur digestivis vitiis, & succelliva totius corporis consumio. Evenit subiectis senilibus, viæ sedentariæ, ac luctuantibus, nec non viciosis compositionibus deditis.

§. XVIII.

Prognosis.

Hic igitur excussis, deveniemus ad tradendam tussium prognosin. Sæcra tussis plerumque transit in humidam; hæc vero nimia vetustate habitum contrahit, atque ventriculi digestionem destruetudo; cachecticum statum, lentamque febrem producere valet. Quæ humida fuit, & in siccam transit, ut pectus tamen grave maneat: periculum febris vel putridæ, vel hæcticæ minatur, teste LOMMIO *obsero. medicin. Lib. II.*

pag. 120. Convulsivæ seu serinæ tussis infantibus periculosa, nam facile reducat suffocationem idque fit in difficili dentitione atque etiam in morbillis: inque pueris gibbos, & hemias, gravibus abortum, adultis hæmoptysia atque phthisin inducere possunt; quin easdem subia suffocatione stipatas fuisse, testatur WILLISIUS *pharm. ration. P. II. S. 1. C. 6. pag. 61.* & HILDANUS *Cent. II. obs. 68.* Quæ tussis pulmonum aut aliorum viscerum scirrhosis infestantur, omnem plerumque remedium vim elidunt: & quæ à repressis nascuntur exanthematibus, his revocatis cessant. *Omnis tussis mala, quæ semper auferitur; instillit etiam, quæ longo tempore frequens, gravissimè hancem exerceat, idque cum debilitatione, i. e. habitualis rheumatica, inquit LOMMIUS loc. cit.* Tussis denique hydroptic eventientes, instillit sunt præfagi, teste HIPPOCRATE *Sect. VI. apor. 35.* Contra moderatior circa tempus nodulum calor, cum aequabili per universum corpus sudore, vel madore, largiori unius fluxu, alvo simul reddita fluidiore, placidior somnus, & faciliior expectoratio, certa sunt morbi in gratiam jam rediuri indicia.

CURATIO.

§. I.

Curatio tussis rheumaticæ potissimum, quatuor absolvit indicationibus, nimirum, ut *primò* materiam peccantem corrigamus, ad exitum disponamus, atque expectorationem, si opus id fuerit, promovemus; *deinceps* adfluxum seri à præcordiis avertemus, & ad alia, magis congrua excretoria organa derivemus; *tertio* motus, si fuerit effrenes, consopimus; & *denique* debilitatum affectum partium rubur instauramus.

§. II.

Si igitur tenax mucis coagulum bronchiis obderit, incidendum illud, reolvendum, & emolliendum est, quod præstant radices resolvers: quas inter primas tenet, radix vel secula Aarons, inidis Florentinæ, & quæ insigni humores tenaces ac tenaces fundendi & expectorandi potentia pollet, radix squillæ, ad quinque vel sex grana, cum paucillo nitri data, item oxymel squilliticum, essentia gummi ammoniaci, spiritus salis ammoniaci assatus, lac & flores sulphuris, & sperma ceti.

§. III.

Humor admodum tenuis, falsus, acris incrementibus, & lymphæ acrimoniæ temperantibus ad exitum redditur apert. Conducant hoc sine decocto, quæ ex hordeo, rasura cornu cervi, radice scorzonæ, ac glycyrrhizæ parantur; cremor hordei, juscula sive decocta avenacea, vulgo *Haber-Grütze*, cum amygdalis, passillibus minoribus; aut decocto raparum cum saccharo; gelatinæ cornu cervi, & animalium; juscula ex carne cum lacte; looch pulmonum vulpis, syrapi de papavere, de susfura, diacodion *Montani*, sperma ceti cum lacte dani; & ante omnia oleum amygdalarum recenter sine igne expressum, vel solum, vel syrapi capillorum veneris, aut julepo rosarum nuprum: e.g. in hac formula: *Recipe olæi amygdalarum dulcium, syrapi capillorum veneris ana unciam unam, sperma-*

Spermatii cœli drachmas tres, croci grana quindecim. M. d. Egregiam quoque opem adferunt insula sic dicta theiormia, quæ ex herba veronica, hyssopi, floribus malvæ, sambuci, papaveris rhœadæ, salviæ, bellidis, radice glycyrrhizæ, semine feniculi, cortice ligni sassafras & ejus generis aliis paranda sunt. Ubi tussis catarrhalis in habitum degeneravit, cum adspersu dejectione, & tæbe, cura, quæ cum lacte asinino, vel fero lactis, vel cum fonte Selterano, aequali parte cum lacte permixto sit, præcipuum medendi cardinem absolvet.

§. IV.

Quando nimia congestio, affluxus, & decubitus feri in pectore est, ut sit in tussi valde humida, pituitosa, diutius persistente: præstat illud à præcordiis & viâ pneumatica derivare, æque pariter per alvum, quæ est propria sordium mucosarum latrinas pariter per cutim, quæ humorum subulorum est diversiculum, expellere. Alvi lubricitas, sicut in omni, ita præsertim in rheumatica, ac convulsiva tussi, magnam profecto fert opem: cui procurande, ex laxantium numero, ad acrimoniam denud evadens, & colluvies quoque sordium blande & benignè, copioseque, sine omni tamen molestia, ac vitium lapsu evacuantem, ego non quicquam de rebus præstantius, quam ipsam mannâ; si non ad drachmas, sed uncias duas, in insulo vel decocto præscribitur, ejusque usus, si res postulat, repetatur. Ego unciâs duas, in aquæ veronicae vel florum acaciæ uncis octis, hinc calore dissolvere soleo; adjectis pulve terræ foliatæ tartari drachma una, & aliquot guttulis olei de cedro, anisi, vel maris. Constatuentem habeo GABELCHOVERUM, qui *Cent. IV. obs. 7. C.* sequentibus eandem ad aliquot uncias pro sananda feliciter tussi commendat: idem etiam laxans, cum insulo veronicae, vel lacte præparari potest. Præterea lyruus rosarum solibus, calidè recentè extracta, decoctum laxativum Vienneis, pulvis rhubarbarine, sique ventriculus hæc ferre nequit laxantia, clysteres, ad copiosè sibi de mucis quantitate derivandam, & per congruum ejus emolumentum, quod in crasis postimum est intestinis, evacuantem profunt efficacissime.

§. V.

Deinceps æqualem sanguinis per totum corpus restituendo cursum, & feram maxime ad glandulas subcutaneas invigando, inhiabitur huic ad præcordia affluxus. Eo huc opere vacante pretium, insula calidiora præcordia, ex floribus malvæ, violarum, foliis hyssopi, salviæ, semine feniculi, anisi & cinnamomo coadjuvanda. Hæc mane intra lectum potare expediet, cum blando regime; & præterea in æquali calore corpus semper conservare decet. Scopo quoque huic satisfaciunt pulveres diaphoretici ac bezoardici, qui parantur ex lapidibus cancerorum, pulvere Marchianis, succino præparato, antimonis diaphoretico, vel loco hujus, antiseptico Poteris, cornu cervi sine igne; cinnabari, additis aliquot granis olei nucis molliatae expelli, vel etiam croci. Insule quoque flogus sulphuris addere licet; maxime si achoræ, vel scabies retropulla maium fuerit.

§. VI.

Tertia indicatio requirit efflatorum motuum
Frid. Hoffmanni Oper. Tom. III.

spirationem, quæ sæpius mox ab initio curationis, ob gravioris periculi metum, suscipienda est. Et ex remediis huc facientibus longe eminent crocus, pectoris amiculum, ejusque extractum, pulveribus bezoardicis admixtum. Laudant quoque mucum eucorum, & pulveribus, & decoctis addunt. Nec eo sine sunt insulæ pilulæ de styrace, alophanginis naptæ, & vespere datæ, conjunctis ceterum expectorantibus, oleo amygdalino, ac spermate ceti. Haud etiam commendanda est vitruis liquor mens anodynus, vel laudanum liquidum SYDENHAMII, cum spiritu cornu cervi maritimum; quem compunctis deprædicat BOYLE de *med. Philof. pag. 348.* Si his hand obsecundet malum, ad turiora deveniendum anodyna, quæ majoris sunt energię, veluti sunt pilulæ de cynoglossa, *Starkleyana*, *Widdowsoni*, & theriacina.

§. VII.

Neque ad sapiendam nullis vehementiam insuper habenda sunt externa; quæ in ætate plasticam tussim tussil laborantes, eripere solent, emplatrum diatylipharis *Rafaeli*, pectori impostum. Tussi convulsiva veritas insigniter possidet unguentum rubrum potabile, cum spiritu vini, præcordiis illitur; nec non unguentum pectorale, in PHARMACOPOEIA AUGUSTANA descriptum, si thoracis latera eo inungantur, in sedanda tussi, & sordibus pectoris mitigandis, & juvenda expectoratione, magnam præstat opem. Longo quoque usu in omni tussi rheumatica controbaculum habeo, sequens emplastrum: *Recept. secreta elæcti. bellidis, succini ana. unciam dimidiam, spermatii ceti, æneolæ humanæ, ceræ. vini ana. uncias duas, s. o. ut veniet drachmas tres, croci drachmam unam, emplatrum diatylipharis dimidiam. M. f. emplastrum, quod pectori, colli, spinæque dorso imponatur.*

§. VIII.

In morbi denique declinatione, quartam indicationem explere, partemque laborantis roburare, mollement oportet; quoniam si illud non est, reverti tussis. Commendo in tussi effluat succis, spiritum cornu cervi, cum tinctura tartari, & liquore ment anodynus mixtum, additis aliquot olei ligni sassafras guttulis; nec non essentiam castaniæ, & si quævis singularem animadverti effectum, quem exoptat balsamum vitæ meum, ad aliquot guttas cum extracto vel tinctura croci datum. In fine ad roborandum ventriculum, *eleazarium*, quod ex *conferva rosarum rubrarum melle dulcis, conferva auroræ mæia nna, succini præparati, uncis mellebat drachmis tribus & syrupo corticum citri vel aurantium* compositum est, præscribere & ad alium commendare solitus sum. CRATO *Lib. 37. consil. pag. 1092.* ambrem cum decocto psyllorum misce collaudat, nec sine ratione: vim enim & roborantem, & simul alvum liquantem possidet. Sed longe præferenda est essentia ambre gemina, cujus præparationem in *observatibus physico-chemicis lib. I. obs. 18.* communicavimus. Tum quoque utile est vinum vetus, generosum, Falernum; quod Veteres, & præterea PIINUS SECUNDUS admodum extulerunt. HIPPOCRATES *lib. de villis*, acutorem usum vini dulcis semibus ægrime laudet; neque minus aqua veronicae vel hyssopi cum vino do-

Quodlibet
vini, n. f. p. m.

do-

deffillata & edulcorata convenit: cui adharat cammillum croci. Externe ad roborandum nimum relaxatas glandulas faucium & bronchiales, ex quibus humor continuo ad laryngem, & asperam arteriam defluit; insigni cum fructu semper ulus sum pulvere, capiti inspergendo, qui ex succino, benzoe, mastiche, floribus chamomillae Romanae, & caryophyllis aromaticis compositus est. Os quoque gargariis frequentius colluendum erit, cui intersit vel spiritus vini Gallici, vel decoctum salviae, hyssopi, florum rosarum rubrarum, cum vino rubro paratum.

§. IX.

Dieta refrenata.

Ceterum in omni tussi, & curanda, & praeservanda, magna vis in recto vivendi genere sita est. Moderandus cumprimis aer, ut talis sit, qui nec frigore, nec nimio calore laedat, sed in quo corpus odore maleat perpetuo: vespertinus ac nocturnus praeter alios nocet; neque aer frigidus, nebulosus, pluviosus, aut praeservidus, maxime omnium vero aquilonaris, nisi noxam parit. Porro catarrhis & tussi frequenter obnoxii cavere sibi debent, à cibis valde salinis, fumo induratis, & aromaticis nimum conditis, nec non acidis, austeris, utpote qui sanguinem, ejusque serum acre reddunt, & impurum. Deinceps potus ratio habenda: nulla enim convenit cerevisia, multo minus vinum acidum. Majori cum fructu pro potu usurpabatur aqua hordei sive pitana, vel decoctum quoddam ex radice chinae, scorzonerae, cassilivae confectum; vel hydromel, quod GABELCHOVERUS hunc in modum parare docet: *Recipe mellis depressati metris quatuor, aqua fontana mensuras tres, liquoris drachmas quinque, serum anseris sex, leucini foveoli, radices pimpinellae ana drachmas duas, florum malvae manipulum unum, florum salviae, eularum, aua pugillum unum, cinnamonuli scrupulos duos, ut coquantur ad consumptionem mensurae dimidia. In scorbuticis pro potu conducit aqua sola, pura, fontana, non nimis frigida, & vel amygdalis dulcibus, vel pane firmilagmo diluente parata. Vulgus aquam fervidam assidue trinceis fursibus & induratum frigide non sine insigni fructu in gravi epidemia tussi bibit.*

§. X.

Præservatio.

Præservatio quoque ratio, maximam partem, in recto rerum non naturalium consilio sita. Qui à tussi convalescentes, vinosis compositionibus, corporis refrigerationibus, amiti fortioribus adfectibus indulgent: in eandem protinus incidunt longe graviores. Senes sibi caveant à pedum, maxime dorsi, refrigeratione. Et quia haec rigente rheumate adfectiones quam facile contrahuntur, & caput & cervix & regio praecordialis, lumbus & pedes in sensibus praesentem, quibus tussis admodum est infesta, lentis & inequentibus calicibus bombycinis maxime à frigore muniendi sunt, ut moderata & equalis scaturit perspiratio: nam quando unam ex hisce nervosis partibus frigus praetiarum aquilone foris tangit & penetrat, ob contentum, qui inter has partes viget, reliquae omnes p. n. adducuntur. Alvi libertas pariter ac expeditus transpirationis succellus nunquam non conservetur, necesse est: quare consuetud moderata, sed frequentes, & sub caelo salubri institutae corporis exercitationes. Qui succis sunt pleni, hos flatus temporibus, & omnino versus aquinoctia, ve-

nae sectione, vel scarificatione depleri curent. Eo magis vero recto regimine, tenui victu, conservataque excretionum libertate, à tussi se praecavere decet, quando epidemicam exercet tyranidem.

CAUTELAE, CUM CURA. SPECIALIORI.

§. I.

In omni tussi caute mercandum est cum expectorantibus, dulcibus, decoctisque intransantibus; ne more vulgo solito, nimis, & sola adhibeantur, sucque relaxando magis pulmones, nimum ad illos concitent adfluxum. Eo magis in tussi stomachali, & hypochondriaca ab iis, vel penitus abstinere convenit; pervertunt enim, destrumque ventriculi vim digestivam, adeoque viam ad cachexiam, & hydropem pandunt.

Caute circa expectorantia & diuina.

§. II.

Tussis serena, quae à retro pulsibus exanthematicis suboritur, indicat materiam peccantis ad sua loca revocationem. Hoc casu divina ferme est virtus arthiopis mineralis vel florum sulphuris, interne cum antimonio diaphoretico vel pulvere bezoardico, vesperti potissimum exhibitum. Nec praeter pedum frictiones, aut pediluvia, praesentius ad detrahendum à pectore serum est vesicatoris remedium: modo delicatior nostri seculi geotus eorundem usum permineret. In convulsiva infantum tussi, juyas quoque plantas pedum, azungia potius inungere.

Terre tussis a retro pulsibus exanthematicis suboritur.

§. III.

Quae à pedum oedemate in cachecticis retro pulsio generatur tussis: praeter dyssenteria, incidentia, diaphoretica, & quae motum à pectore derivant, insignioris usus sunt lenia diuretica v. g. tinctura tartari, succini tartarizati, elixir nostrum vitale cum elixiro à pectorali remixtum t. alia a. r. a. talia, & potentes quae urinam movent, quia detrahunt duxe serum, exulent; laudata vero serum acre per vias educunt urinarias.

Tussis rheumatica ex pectore derivat.

§. IV.

Tussim rheumaticam diuina, quae à scorbutica sanguinis & humorum diathesi originem trahit, non raro curatam vidi, datis interne scro lachis, pulveribusque ex lapidibus cancerum, pulvere Martionis, succino preparato, antimonio diaphoretico, extracto croci, calcariis aquosis, concinnatis; interposito laxante rhabarbano; propinata pro potu ordinario aqua frigida amygdalis diluente, vel Selterana vino Mosellano nupta; vel decoctum ex speciebus temperationis sanguinem depurantibus ex aqua ului erit exitio. Exhibui quoque vesperti pilulas aloephanginas, cum pulvis de styrae mixtas: nec non admodum tussis pectori emplastrum, quod supra descripsimus.

Tussis rheumatica ex pectore derivat.

§. V.

Si saburra accida, biliofque ventriculi tussim excitaverit; opera pretium facium abstergentia, lapides cancerum, succinum preparatum, arcano duplicato nequum, additis aliquot olei macis guttulis. Jungenda tum laxantia leniora manata, ac rhabubarina. Stomachali puerorum, si nihil est, quod prohibeat, succuriunt lenia emetica.

Tussis pectoralis curatur.

§. VI.

§. VI.

Tussi hy-
po-
chondriacae.

In tussi, ex vicerum imi ventris obstructione nata, quam vocant hypochondriacam, ap-
pripie conveniunt, quae excretionis sanguineae
suppressionis revocant: nec alienua pediluvia, &
antispasmodica. Omnium vero virtutem, multis
parafangis superant, aquae immetales sepefac-
tae, lacteque caprino, vel melius asinino par-
mixtae, si sub debito regimine potentur.

§. VII.

Tussi ho-
mogenea.

Quae diu duravit tussis, & ad tabem vergit:
cura lactis asinini, preparata ad eam corpore,
certo profigitur: eo magis, si longae peregrina-
tionea, aëris mutationes, & roborantia denique,
conjugantur. Nec, si nimis humida fuerit,
fructuosus est conveniens a cibis, praesertim
carnibus abstinentia.

§. VIII.

dyspno-
eae tussis.

Praestat semper anodyne, ut pilulas de cymo-
glossa, item de styrace cum laxante e. gr. massa
pil. aloephanginarum vel de succino *Cratonis*
aquali pondere jungere & circa horam somni
praebere: alias ab illis solis exhibitis, animi vici-
tudinem supprimi, succedente à nimia congestione
humorum & gravitate circa pectus asilante.

§. IX.

Frigor &
calor tussis
acutae.

Quemadmodum nimium frigus omnibus, qui
tussiuat, inimicum est: ita quoque praeservendus
calor is nocet. Quare insula quoque pectoralia,
quae dicunt theiiformia, si calidissima fuerint, ex-
asperant tussim. Omnes ergo potus tepidos sor-
bere convenit.

§. X.

Venae sec-
tionis tussis.

Venae sectiones illis profunt, qui sanguine ni-
mis turgent, venis praetumidis ac sum: ulorum
instar prominentibus, aut excretionis suppressionis
habent, maxime praeservatoriae, etiam in senibus
sepe, gestum iam annum transgressis. Nec in
superfedere possunt, si convulsivae essentia ve-
nent vehementia; ne rumpantur in quodam lo-
co vasa; in pueris etiam & juvenilibus aetate. SY-
DENHAMUS affirmat, se convulsivam epidemi-
cam, non nisi venae sectione, iterata cauterii,
& vesicatoria scilicet curasse.

§. XI.

Celsi me-
thodica.

Digna, quae allegetur, est tussi melendi ra-
tio, quam CORN. CELSUS Lib. IV. cap. 9.
sic exhibet: *Oportet hyssopum altero quoque die
bibere, ac sectione uti vehementi, qua primo im-
peditur à tussi, post eam vincit: tum ambulare:
deinde per manus quoque exerceri, & pectus diu
perfricare: post si quis pinguis edere. Prater haec si
humida est, profusum fricationes validas, cum calefa-
ciensibus, sic, ut caput quoque simul vehementer per-
fricetur: quum quoque fortile sulphure adjecto, for-
beatur; in potum vero aqua calida danda. Et ut
verum fatear, praestitit omnino Galeni in tussi cu-
randa monium sequi, qui levibus simplicibus
naturae maxime familiaribus utendum esse docet:
quam multis inique compositis activis è pharma-
cia petitis. Ita decocto raparum exsiccatum,
vel caulium rubrorum, vulgo *Braunkohl*, vel
etiam furfuram triticorum ex aqua cum saccha-
ro, percinacem & chronicam tussim in plebeis
sublevatam, quin etiam penitus sublatam memi-
nimus. Si flaxio tenuis copiosior & acris est,*

quod ex oculorum rubore, titillatione, & mor-
fatione oris in gutture, sapore salso cognosci-
tur, iuccus glycyrrhizae Hitzanicae, mel desqua-
matarum, massa, quae ex gelatina cornu cervi &
decocto glycyrrhizae inspissatur, oleum quoque
amygdalarum dulcium cum syrupo papaveris al-
bi mixtum & sensim paulatimque deglutum
praestans adferet levamen. Neque minus fa-
miliaris & egregii usus esse potest ovi luteum re-
gens cum saccharo cano & croco, cum poculo
uso vel alteri *Thee bar* leniter deglutitum, item
butyrum insulium cum saccharo, lac cum insula
veronicae & borum papaveris rheodas.

§. XII.

Quando à nimio humorum affluxu epiglottis,
quae est primum & primum vocis instrumentum,
valde relaxatur & aconium patitur, in-
deque vox rauca evadit: & gargarismata, quod
ex nervinis e. gr. floribus anthos, lavenderae,
chamomillae Romanae, summanibus thymi, ori-
gani, salvia, myrrha compositum & ex vino
coctum est, frequentius uti convenit. Exteriori
quoque laryngi sacculum ex supra dictis specie-
bus addito insuper succino & styrace cauteria
applicare, non sine egregio fructu conieci. Rau-
cos non purgari vult HIPPOCRATES, sed horum
frigidaem & humiditatem sanare consulit ca-
piti & reliquis membris, quae affecta sunt, topi-
corum uso extirpandis: *Vid. Lib. de villis aeu-
rophis.*

ENARRATIONES MOREORUM.

OBSERVATIO I.

Imploravit quondam meam opem Vir hone-
stus, cuius infans, quos plures habebat, circa
aëtiis exitum tussi gravissima, eaque suffocativa
ac convulsiva, laborabat. Quisidam haec tanto
invadebat impetu, ut facie ad nigredinem ulque
tincta, sine sensu, sine motu, & sine respi-
ratione jaceret. Recurrat in per periodos,
circa horam postillum maratum decimam;
junctis febre, pulsu celeri, & aphthoideis su-
cium viciulis. Noctes erant insonnes, appe-
titus, etiam humidi, dejectus, alvus clausa, cre-
bra sternutamenta, & non modo ipsa tussi mu-
cus cum sanguine elidebatur; verum per os quo-
que ac nares insignis pituitus copia reddebat.
Haec affectio jam per quatuordecim dies dura-
verat: & his debellabatur medicinis. Ano cly-
steres ex decocto avenae, oleo amygdalarum
dulcium, floribus chamomillae, & sale com-
muni insundi iussi: pro potu crebro dedi modo
decoctum ex radice chinae, scorzonerae, althaeae,
glycyrrhizae & semine feniculi paratum: modo
avenae cum, oleo amygdalino mixtum; mox ra-
parum exsiccatum cum saccharo Canariensi, &
croco permixtum; & pro insulo theiiformi her-
barum veronicae, ac hyssopi. Non minus bis terve
quotidie propinavi pulverem, ex antimonio dia-
phoretico, lapidibus cancerorum, pulvere Mar-
chionis, & nitro compositum, cum aliquot is-
quoris anodyni guttis. Et horum ope convales-
ruit.

Epierysis.

1) Tussis convulsivae epidemicae, in non
taro grassante temporibus, quibus diarrhoeae
vel dysenteriae sunt familiares. Tum plerumque
aëtem ferventissimam, frigida autem

sequi deprehenduntur iniria: unde, quæ afflicte hincior fuit transpiratio, hoc tempore subito cohibetur, & hinc acre impetumque ferum ad bronchia decumbit. Sed præterea in ipso aere observari solent exhalationes fere venenæ; quas in nostro quoque casu tristes & apbilurum causas fuisse, nullum est dubium.

2) In tali aeris constitutione infantes tussis & frequentius, & gravius infestantur. Debile enim ac valde sensibile est, quo possent, nervorum genus, quod ex facili causa ad motus spasmodicos, convulsivos, & ipsam comitalem morbum disponitur. Denique hæc tenella corpora parum curant aëris injurias, sed quæcumque occasione semet ipsi exponunt liberalius. Accedit & illud, quod circa æstivam æstivalem temperatam, ob avidius ingestos fructus heras, uvas &c. multas acidas, biliosas, & acres in primis viis suis collipant cruditates: quæ ad exasperandam tussis vehementiam non parum contribuant.

3) Quæmodum tussis asthmatis, ita hoc quoque illi, tanquam symptoma, tantum non semper supervenit. Duplex est causa asthmatis, quæ tussis symptoma est: minimam primam, constrictionem bronchiorum, altera congestio humorum ad pectus. Constrictio quippe bronchia, quæ tussis formide constituitur, remanentur sufficiens aëris ingressum, & liberiorem sanguinis per pulmones circulationem. Congestio humorum in me feri ad pectus in omni convulsiva tussis: siquidem instat regula perpetua est, quod ad debiliorem partem, quales hic sunt pulmones, tussis exagitati, semper majori impetu ruant humores.

4) Dicitur vix potest, quantum in omnibus spasmodicis ac chronicis morbis, qui foverant ab impetate humorum, necesse ut cerevitiis; utpote quæ actionem subtiliorem magis alunt, ac exagitant. Sæpe in harum locum exhibere decocta, quæ in tussis præteritam temperantia & demulcentia esse debent.

OBSERVATIO II.

*Exhibuit
me D. G.
B. 1788.*

Vir XXXVI. annorum, sanguineus, succulentus, in calidis, quæ sequens est, variis molestiis, aeris venorumque injuriis obnoxius, inordinate vivens, & frigidiore loco formum capiens, neglecta, cui ante fuerat, per biennium, vena sectione, incidit in tussim vehementem, acutè ac diuturnam. Pectus humoribus infarctum tardiusque, cum racho videbatur: *Es kochte immer auf der Brust, als wären alles voll stein.* Ejiciebat quoque laborioso ac vehementi pectus non minus ac abdominis conatu, ingentem maci viscidam ac flavescens quantitatem, quæ intra 12 ebullientem collectam binas adæquabat libras. Et hac molestia tussis per quatuordecim jam laboraverat hebdomades, cum meum quereret auxilium, corpus admodum contabescibat: appetitus tamen erat integer, alvus aperta, urina pauca ac rubicunda, pulsus post paroxysmum celerior, facies rubicunda. Neque ullum levamen perceperat, licet variis remediis generibus, decoctis, electuariis, essentis pectoralibus, ac dulcibus fuisse usus. Ego itaque, intendendo cerevitiæ potus, huius in vicem confusum decoctum dedi: alternis diebus exhibui pilulas balsamicas: mane pariter ac horis pomeridianis potui jussu infusum pectorale, ex radice comolide majori, equali, glycyrrhizæ, her-

ba sanctiæ, scabiosæ, scordii, veronicæ, apimonia, uricæ mortuæ, pyrolæ, floribus hyperici, summitatibus millefolii, femineque anisi ac fœniculi paratum. Ex hoc sumendum fuisse drachmam balsami pectoralis, quod ex olei hypericonis uncis duabus, spermatis ceti uncia una, balsami de Capiva, Peruviani ana drachma una, croci scrupulo uno, florum sulphuris drachma, olei macis, anisi, ligni sassafras ana guttis quindectim confectum erat. Exhibui quoque pulverem ex magnesia alba, oculis cancrorum, cornu cervi philosophice preparato, olibus lepiæ, & succino preparato concinnatum; ac denique emplastrum superius descriptum thoraci imponendum curavi. Quibus per duos menses usus, in tantum confescebat, ut nihil equidem esset, de quo conquereretur; attamen quoties vel acida comederat, vel vinum bibe-
bat, tussis denuo cum reiectione viscidæ materiæ prehendebatur.

Epilepsis.

1) Ad præsentem tussim generandam plures remotiores concurrunt causæ. Præter temperatorem enim sanguinem & corporis habitum, succis pinguissimis plenum, vena sectionis neglectus, ac frigidiore corporis regimen, omnino sufficerent ad inducendam tussim.

2) Quæ cum forsitan ab initio nimis dulcibus, ac expectorantibus tractata fuit: factum est, ut tonus & veniculi, & pulmonum magis desineretur. Veniculi labefactio debetur corporis contabescencia: languente enim digestionem, chylus iners ac inspissatus, hinc & lymphæ minus laudabiles, & ad nutriendas solidas partes haud idoneæ generantur.

3) Pulmonum atonia in acceptis serenda est tussis diuturnitas, cum coïosa macida materiæ reiectione. Namque hi tum sunt diverticulum humorum feroliorum, mucidorumque, qui ex tuo corpore eo deferuntur. Distinguenda talis tussis est à phthidica; quoniam reiectione materia nondum purulenta est, nec febris jungitur: pulsus enim celerior, qui paroxysmos lequebatur, dependet à validiori pectoris sub tussiendo concussione, quo sanguis impetuosius, celeriusque per cordis ventriculos, atque arterias propellitur.

4) Et in hoc tussis genere, minus conveniunt sola expectorantia; sed eo dirigenda est curatio, ut affluxus humorum à pectore deriveretur, pulmonumque ac veniculi robur instauraretur. His scopis dictorum remedium ope fecimus satis; & quibus adhuc commemorare juvat elixir nostrum viscerale, quod ad restituendum digestionem diu adhiberi iussimus.

5) Notabile adhuc est, quod si morbi, qui atonia partium suarum fuerant, ex levi causa, ut frigore, cibis acidis, vinosis &c. facile repullerent. Quare longa opus est diæte curatiois observantia, ac viscerum remedium continuatio.

OBSERVATIO III.

Studiosus quidam sanguine abundans, vita sedentaria, vicinque plethori vii solutus, meam aliquando implorabat opem, eo, quod sapius, simulac corpus exponeret frigori, ventisque borealibus, sanum converteret tussis, eoque gravissima, mox humida, mox siccæ. Suscepit propterea, ut vena sectionem, quam nunquam admiserat, influen-

*Exhibuit
me D. G.
B. 1788.*

instituentiam curaret, eamque ter quotannis iocurreret: dein singulis quatuordecim diebus pilulas meas balsamicas sumeret, & infuso veronice frequentius uteretur. Dedit aures confilio, simulque motui corporis frequentius studeret, eo effectu, ut à molesta tussi liber in posterum maneret.

Epicrisis.

1) Plethoricos, non modo senes, verum quoque juvenes, si utantur lauto victu, vitaeque sine motu desili, & sanguinis missines neglectui habeant, admissio liberalius frigore, catarrhis, coryza, gravedine, tussi &c. circa æquinoctiorum plerumque tempus infestari, crebra certaque testatur experientia. Cumprimis humidam pariturur ejusmodi subiecta, si serolis turgent succis; nuncque crises infire si habet hæc evacuatio; siquidem superata hac affectione optime habent.

2) In ciendis fluxionibus ingentem frigus exserit potentiam, in dispositis maxime subiecta; dum confringendo corporis superficiem, venosumque cornicem, humores magis ad interiora pellit; ex quibus serosa portio, pulmonales ingreditur vesiculas. Hinc CAR. PISO *tratt. de morbis ex calore, serosa observ.* 8. pag. 180. de se ipso testatur, quod hunc verticem capitis, sursumque coramale nunquam detegere debuerit, quin statim tussim pateretur.

3) Et in tali tussi curanda, testante eodem PISONE *loc. cit.* & suffragante experientia, non præstantius est remedium, quam ab initio statim sudorem movere. Interveniunt huic scopo insula theiemia mane intra lectum sorbenda; sumto precedente vespera, pulvillo diaphoretico. Neque enim hoc in casu convenit, statim ab initio laxantia propinare; nisi congestio ad pectus nimia fiat. Anodyna tunc exhibere, nihil est, quam oleum camelo addere.

4) Præservatoriam autem finem, nostra potissimum respicit curatio. Acque sic, præter rectum vivendi genus, præter cæteriorem corporis exercitationem, non efficacius commendare potuimus præsidium, quam statim temporibus repetitis venæ sectiones, quibus imminuta humorum mole, tanquam renouari causa, occasio, quæ est frigus, non adeo magnam obtinet efficaciam.

OBSERVATIO IV.

Tussi cum hæmoptoe.

Juvenis florentis ætatis & vultus, fervidi ingenii & sanguinis, tenerræ & macilentæ constitutionis, post variolarum morbum, quem ante tres annos perpeffus erat, sæpius incidit vere præfertim & autumnio in molestant tussim, plerumque cum hæmoptoe & interno aestu conjunctam. Ego ad hanc avertebam suavi, ut corpus, præcipue pedes à frigoris vehementia curatius inueneret; & quoniam paulo largius bibebat vinum, ut circa æquinoctialia tempora sanguinem emitteret, & insulsum veronice cum radice glycyrrhizæ singulo malle sumeret: hoc modo per duos annos liber ab hoc malo permanfit. Factum vero est, ut neglecta vernali venæ sectione & studis & lubricationibus immoderatus indulgens, & omnes aëria injurias spernens, in carathalem febrem cum vehementi tussi & immani hæmoptoe sinistra lateris, accurate circa horam vespertinam sextam redeuntem, & per totam noctem perseverantem incidere. Tussis

erat insio siccæ, post modum valde humida rediit. Reversabar fere omnia remedia; fontem vero Selteranum loco cerevisiæ bibebat; sed cum exipio levamine, ut potius & dolor capitis & rheumatismus pectoris invalescerent. Ego in consilium accessit, loci fontis Selterani bibendam suavi emulsionem, quæ ex decocto rarisæ cornu cervi & amygdalis parata erat; electuarium quoque præbui ex oleo amygdalarum dulcium, syrupo papaveris albi, spermate ceti, croci, vesperi dosim pulveris mei bezoardici & mane insulsum veronice cum radice glycyrrhizæ superbibendum ordinavi. Ad aperiendum vero alvum, & fordes viscidas à pectore averteudas, quia decoctum mannarum testatur, alternis diebus sumendum dedi pulverem sequentem: *recipe lapidem caucorum, cremoris tartari ana drachmam dimidiam, diargyri subtilissimi, cumbaris preparati ana per. sex, olei macis guttaram unam. Quatuor vel sex à quavis inflexione succurrunt sodes, & post ter reiterandum hunc pulverem & tussis & hæmoptoe permolesta sensim paulatimque conquiescent, ac penitus demum cessant.*

Epicrisis.

Plura mihi obvia sunt exempla, tussim primo catarrhalem, postea vero phthisicam rediitam post morbillos, imo variolas, quæ valde infestæ sunt pectori, insensum fuisse, præcipue si iusta vitæ ratio fuerit posita, & corpus non ab injuriis tempestatum, quæ catarrhos & tussis cire solent, præmunitum. Neque pauca mihi cognita sunt exempla; sola prudens sanguis è venâ missione una cum debito vivendi regimine in sanguine præservido abundantiis & catarrhales tussiculosos insulsum, & ipsam veram phthisin, fuisse averteudas. Et quia ex hæmoptoe periodice redeunte, vitiosam humorum colluviam prima in regione stibularem & tussis causam solventem judicavi, præbui pulverem egregie & sine noxa primam regionem expurgantem, non sine singulari fructu subsiguiente; dispoite ab ejus usu mox levamen symptomatum insignè egregius juvenis percepit.

OBSERVATIO V.

Vir L. ætatis, cholerice & macilentæ Tussi hypochondriacæ constitutionis, à tenera ætate ex diuturnis lubricationibus hypochondriacis factus, varia & frequentia ad fluxum hæmorrhoidalem knit molimina; qui cum per vasa scdis nunquam succellit, ante decem annos vomitum patitur cruentum, qui tamen instituta mox in pede venæ sectione, sanguinæque rhabarbarinorum & pulvum nitrosum ac abstergerium, nec non continuato per aliquot tempus fontis Schwalbacensis cum lacte mixti & calefacti usu, cubitibus exinde nunquam relit. Ante annum vero ex domestica calamitate valde contristatus, prævia repentina virium & appetitus, nec non homini prostratione, tussim incidit humidam hypochondriacam adeo quidem vehementem, ut per integras sæpe horas, præsertim nocturno & vespertino tempore, ingentem viscidi ac tenacis cinerici nucl copiam non sine molestissimo hypochondriorum & abdominis dolore excreando, æger desatigaretur. Ceterum, pectus omni coruit viro, nec spumam unquam sanguine apparuit mixtum; alvus autem non obstante statum, qui crebrius per os eructabantur, copia satis superge

perque erat fluida; sub cujus depositione vires aliquantisper decreverunt videbantur. Confusus ego in hoc affectu, cum ejus fomitem in primis viis ac imminuta ventriculi digestionem latitare conjicerem, ad hanc ipsam restituendam primo pulverem ordinavi stomachicum ex radice ari, pimpinellæ albae, fole absinthii, succino, pulvere corticum aurantium immat. viridium ad partes aequales sumtis, addidique aliquot guttulis olei macis & ligni sassafras compofitum, bis per diem capiendum, cujus loco intendum summo cum fructu adhibui effentiam stomachicam pectoralem ex effentia gentianæ, succini, cascarillæ, nucis, croci, cardui benedicti myrrhæ & spiritu salis ammoniaci anisato præparatam. Binis quoque vicibus per hebdomadem ad expurgandam leniter primarum viarum cruditates, pilularum *Crotæ* gr. quindecim cum duobus granis extracti croci, assumenda fuisti, & loco potus ordinarii aquam fontanæ simplicem cum quarta vini parte permixtam commendavi. Quibus effectum est remediis, ut observatio accuratori in diata regimine, absoluto mensis unius spatio, æger non modo molesta tussis liberatus fuerit, sed & cum appetitu ac somno quietiori, vires seorsim recuperare cœperit.

Epistola.

Hæc historia satis abunde docere potest, tussim & vehementem de diuturnam & cum magna viscidis humoris excretionem punctam, ex stomachi & primarum viarum, quæ alimentorum digestionem præstant, viis & dejecto robore, nulla licet pulmonibus inharrente labe, ortum trahere posse, præsertim in hypochondriacis, quibus stomachus semper male affectus est, accedente præteritum gravi tristitiæ affectu, quo nihil ad vim solidarum, imprimis intestinorum & nervosorum partium immutandam est potentius. Ex quo facile intelligitur, omnem fortius curandi rationem eo esse dirigendam, ut vires deperditæ & universo corpori de maxime ventriculo per convenientia remedia restituantur. E. hoc præterea annotare licet, quod hypochondriaci & hemorrhoidarii per graves & diu perseverantes animi affectus, nullis aliis etiam accedentibus causis, quam prompte & facile in multas & varias, etque longas corporis passiones delabi possunt.

OBSERVATIO VI.

Generosus vir,
et ultra
periculis.

Generosus vir, ampla in dignitate constitutus, LX. & ultra annorum, sanguineæ & vegetæ nunquam non complexionis, rarius afflictam habuit valetudinem, & parcius hinc Medicorum consiliis de medicamentis usus est, nisi quod bis quotannis circa tempora æquinoctialia venæ sectionem admiserit. Hic vir eruditus, si ullus alius, studiis, mentis laboribus, & occupationibus assiduus per longum annum spatium fuit immobilis vitæ genere districtus erat, & tamen satis vegete valuit. Ante anni dimidium cum autumno consuetam ex incursu venæ sectionem omiseret, & ob metendum fortune suæ detrimentum sub ingenti negotiorum & occupationum mole, animo valde perturbato & morbo esset; vigorem & animi & corporis paulisper fractum pensens cum somno parco, interrupto, & crebrioribus sudoribus, maxime frigidis, matutino præsertim tempore stipato.

Accidit præterea, ut sub mutatione & inæquali cœli autumnalis statu, auræ frigidiori corpus cum exponeret, prævia horripilatione in catarrhum & tussim incidere; quam etiam prodians in publicum neglexit. Inde vero factum est, ut fuscioribus viribus & ciborum adpetentia, aucto circa vespæram calore, pulsumque celeritate, in gravem pectoris rheumatismum fuerit coniectus; qui hoc modo se probebat: aderat nam violenta tussis sicca in principio noctu maxime infellans, ut omnem respirationem ad suffocationis fere periculum adimeret; cum maxima & intolerabili anxietate conjuncta, ut aliquod ipse decumbens, ad spiritum liberius trahendum è lecto surgere, non sine molesta sudoris suppressione coactus fuerit. Petiit à me consilium. Ego, cum hujus affectus originem ex primarum viarum & hypochondriorum ob stultentis abdominis distensiones, alvum strictionem & intermissam venæ sectionem derivarem; & non pro simplici catarrhali, sed rheumatica tussi habendam esse judicarem; sanguinis detractionem summopere suavis, & ut ut alius Medicus, forsitan ob præjudicia sua, quibus circa venæ sectionis usum in febrilibus insulubris imbutus est, hanc non ratam haberet; me tamen auctore ac fuisse, decem minimum uncias sanguinis tenaci mucro resecti fuerunt detractæ. Ex quo mox insignifimum in faciliiori respiratione periculum allevamentum. Tussis vero sicca transit in valde humidam; ita ut miram quantitatem crassi muci quotidie cum valida thoracis commotione egeret; quæ tussis maxime cum anxietatibus noctu affligebat, & omnem fere somnum adimebat. Ipse patiens pilulas Dr. N. S. assumebat, quas aliquot quidem sedes fuerant secutæ, sed postea vehementiores ad vi adstrictiones cum indigni anxietate perferens. Substitui ego igitur infusum mannatum ad averendum à peccare nimii humoris congectionem singulis tribus diebus sumendum; ex quo egregium percepit levamen. Mane infusum veronice, & de die præsanam amygdalinam, circa vespæram, cum pulvis & calor semper esset auctior, pulverem nitrosum cum antimonis & succino mixtum deli; quibus remediis per Dei gratiam intra duos menses, violentia illius rheumaticæ cessavit. Nihil minus hæc æger adhuc de noctibus insomniis, stultentis primarum viarum, & anxietatibus, morosis cogitationibus, & fractis viribus conqueffus fuit; & quia judicavi, horum symptomatum fundamentum in prava alimentorum digestionem, propter vim stomachi & intestinorum digestivam, à morbo, & animi affectibus fractam esse positum; sufficientem motum & excitationem corporis, conversationem cum amicis, potum aquæ simplicis cum quarta parte vini Rhenani dilutæ, & usum elixiri nostri visceralis cum bona corticum aurantium essentia permixti fuisti. Quorum remedium ope etiam integre vir longa vita dignus convaluit.

Epistola.

Tussim pure catarrhalem cum febricula quadam, à rheumatica probe ut distinguit Medicus, in praxi valde necessarium dabo; quia hæc longe alia remedia & modendi rationem quam illa postulat: catarrhalis simplex tussis dicitur hæc, quæ cum graveline capitis, & coryza fit à transpiratione ob inæqualitatem aëris, tempore maxime autumnali & vernali ad interiora prepressi oritur, & plures homines simul afficit, unde

unde dici solet *epidemia*. Rheumaticæ vero natura longe alia est. Nam licet à transpiratione habeat sæpius suam primam originem; possit tamen vitiosæ plethoræ & cacochymie, ventriculi præve digestionis & vicerum abdominalis vino causam suam debet, unde etiam graviora junda habet symptomata, diutius durat, & magis est individualis. Oæthralis scilicet transit, & solus naturæ beneficio, modo non error in dieta committatur, magno sæpius sanitatis commodò subsequente solvitur; nullo minus vero magnæ efficacis præsidia, uni est venæ sectio exigat; quæ tamen in tali tussi, quam nos vocamus rheumaticam, & jam descriptam, cæteris paribus, locum invenit commodissimum. Præter hæc illud in usum scientiæ velle, ex relata morbi historia & cura annotandum censeo, quod malum flatulento-spasmodicum, quod communis nomine affectus hypochondriaci venit, etiam in vegetioribus subiectis à studiorum intemperantia, vita motus experte, intermissa sanguinis copiosiora detractio, superveniente diuturniore animi perturbatione suboriri, & leviorum morborum vehementiam exacerbare possit. Denique in gratiam juniorum Medicorum non silentio prætereundum esse puto, ad restitendum robur ventriculi & intestinorum, medicamenta temperata balsamica, sed frequenti & moderata dosi sumta, & potum aquæ frigidiæ cum vino spirituosio permixtum egregie conferre. Dicit enim vix potest, quam salutare sit potus genus aquæ purior, simplex, cum majori vel minori parte optimi vini permixta, tum ad sanandas præsertim chronicas passiones, tum etiam ad eas avertendas, & robur per morbi vim amissum recuperandum. Illud adhuc ad complendum superiorem morbi historiam commemorandum est, quod, cum jam in declinatione erat morbus, n. iniori & nulli & pectoris oppressione rediit; ægroti nostro ex consilio alterius Medici, me qualem invito, duodecim sanguinis uncie per pedis venam sectant detractæ fuerint, ea repedens intentione, ut affectio molesta sic dicta hypochondriaca averteretur. Verum quam inconsulto id factum fuerit, eventus docuit. Vires enim jam tum à præcedente morbo, nimia humorum exspiratione & pectori somno unminuæ, & penitus collapsæ erant; & ciborum adperentia & virtus ventriculi concoctrix maxime vacillans, ingentem crudæritatem peperit proventum; quæ morbum intestinorum, per status & spasmos augendo inquietudinem & anxietatem, pectorisque oppressiorem, noctu maxime instantem, & vim imaginativam mentis acerbiorē reddiderunt; & curationem huius parum profecerunt. Ex quo intelligitur, quam noxia sit ex longo morbo convalescentibus largior sanguinis, in quo vis & robur solidiorum vitale possum est, detractio; eo quod ejus copia & spiritus alacritas jam ab ipso morbo tota immutata fuit.

OBSERVATIO VII.

Fœmina generosa sexagenaria, naturæ alias satis robustæ, gravi haud unquam laboravit morbo, præterquam quod ante duos annos de doloribus artuum vagis, tumida pedibus, & corporis languore fuerit correpta. Huic conjugis id infortium est, ut incuria ex alio per viginti scilicet præcepta delapsa fuerit in terram, ubi ex magna conformatione jacuit fere exanimis. Detectio

corporis magna in pedibus cunctis visa fuit, cum profundo in dextro pede crenato vulnere; cumque graviter terrore perculsa esset, cum ingentissimum lapsum, & internis & externis remediis satis superque ipsi fuit prospectum. Sed tertio mox à lapsu die in immensum tussim ferream & convulsivam conjecit, quæ noctu, præsertim quando claudendo oculos obdormiscere cepit, omnem admodum spiritum, insensationem minabat. Medicamentis contra hæc symptoma præscriptis nihil proficiētib; & ego vocatus sum. Ordinavi hoc medicamentum: *recipe massæ Pilularum de Syrace, alophragmarum ana drachmam dimidiam. f. pil. no. quinquaginta, de quibus decem alternis diebus circa somni tempus assumpta fuerint*. A quibus utaripatis optime habuit, & tussis rediit minori & evanescente omni suffocationis metu. Nihil minus cum continua pectoris oppressione, tussis eiecit insignem pituitæ copiam; languēbat diu appetitus, nec firmus adeo fuit placidus. Pedes vero, qui antea fuerunt tumidi, graciliores apparebant, & quod notabile, forma per totum fere morbi decursum de ingenti frigoris sensu in pedibus conquerebatur, adeo, ut lagenis fervida aqua repleta eos continuo fovete opus fuerit. Medicamenta, quæ insignem opem in hoc affectu tulerunt, fuerunt mixtura ex aqua hyssopi, veronica, oxymeli squillaco, lapidibus cancerum, antimonio diaphoretico, spiritui cornu cervi succinato, syrupo corticum aurantium debita dosi, & propensione consensata; neque minus pulvis ex spermate ceti, floribus sulphuris, saccharo, & paulillo balsami Peruviani & croci; insulum quoque ex hyssopo; veronica, & cortice ligni salsæ; præterea quoque elixir roborans pectorale & stomachicum ex tinctura tartari, essentia succini, croci, & corticum aurantium recentium; quorum opem intra sex septimanas convalescit.

EPISTOLA.

In hac morbi historia digna sunt, quæ præ aliis obveniunt, momenta: 1) quod immensis illa conformatio ac terror, vim suam non in totius corporis extremitates, ut ordinario fieri solet; sed tantum in pedes exercuerit: dum illi antea notabiliter tumidi profusus detumescente, ac resurgere coeperunt. Hinc per metastasim insignis iten impurioris, eo usque in pedibus flagrantis copia, ad pectus delapsa, vehementer pectoris rheumatismum, ac convulsivum fere tussim, quæ antea nunquam laboraverat, induxit. Tulus consensus pedum cum pectore, alii quoque exemplis mihi parquam ootus est: ex quibus hoc est valde notabile: laborabat quondam hujus Academiæ Professor, tumore pedum enormitudo, ad abdomen usque ascendente. Hic cum tertiana febte, epidemicam tunc stragem inferente corripere: factum est, ut per ingens cum horrore junctum frigus, sub accessione initio statim detumescerent pedes. Verum mox succellit summa spirandi difficultas, cum insigni pectoris oppressione, adeo ingravescens; ut frustra datæ variæ generis remedia, sub quarto paroxysmo, accedente catarrho suffocativo exsangueretur. Ejusdem tenoris casum, ante aliquot annos adnotavi in generosa quadam fœmina; quæ pedum edematæ diu afflicta, accedente demum tertiana, satis afflicta. 2) Confirmat quoque hic casus, quod salva ac integra pulmonum substantia exsistente, ex sola vitiata

materiæ translatione, gravis pectoris rheumatismus, & diuturna tussis suboriri queat: nostra enim ægrotans nunquam incommoda in pectore antea fenserat.

OBSERVATIO VIII.

Tussis
diuturna
indecens.

Vir annorum LXVIII. habitus corporis succulentus, constitutionis plethoricæ, lauto victu, vitæque seditaria utens, meum aliquando requirebat auxilium, eo, quod diuturna pectoris adfectionibus vesaretur. Renitit scilicet, se juvenem hemoptysin fuisse passum, & hac congruis medicamentibus sedata ac percurata, remissæ tussim humidam habitualet. Hæc quotannis æstivali ac hiemali potissimum tempore, coryza, aliique catarrhalibus defusionibus stipata infestabat, tanta sæpius ferocitate, ut suffocari non raro videretur. Novissime vero medio hieme accedebat tussis sicca; qua per aliquot dies insistente, horror atque calor jungebatur, tumque sequebatur liberior expectoratio mucii copiosi, sanguine grumoso submigrante permixti. Præterea igitur Medicus venam in pede tundi iusserat, qua siccat levatum fuit pectus, & æger, ulsurarius adhuc variis remediis à malo suo est liberatus. Quam autem huius recursum timeret; ad hunc præcavendum, meam desideravit opem. Quare injunxi rectum rerum non naturalium ulum; & præterea, ut humorum adfluxus à pectore derivaretur, fusi laxantia ac diaphoretica: illa quidem ex rhabarbato paranda, sæpiusque usurpanda; hæc in forma insulorum mane adhibenda. Cerevisiam quoque seu potu intendi, & in ejus locum decoctum ex radice scorzonæ, chinæ, rasura cornu cervi, radice cicorietæ, liquoriciæ, sensineque feniculi concinnatum ordinavi. Inde nunciavit mihi, se nihil, de quo amplius conqueratur, habuisse; sed si forsitan acicula inter prandium uteretur, recrudescere non nunquam tussim.

Epiptis.

Meretur attentionem in præmissa morbi historia, quod hamoptysis, quæ in juventute prorupit, post quadraginta idem annos redire possit. Causa in sola plethora accrescente querenda est, qua per commodam venæ sectionem imminuta, cessavit utique periculosa sanguinis per pulmones ejectione. Neque minus hic casus nos clare docet, quantum vitæ & labis, seu potius imbecillitatis in principiorum viciere à morbo diu illud infestante reliqui possit; adeo, ut sanguinis in sene hoc immodica redundantia non aliis interioribus partibus & visceribus, sed pulmonibus infesta fuerit. Valens etiam habitus & per multos annos durantem tussim, minus quidem periculosam, ex semel male affecto pulmone suboriri posse. Nam vitium, solidis partibus diutius inherens, non tam facile ex toto tollitur, minimum, dum debilitatem quandam relinquit, ad plures morbos corumque recidivas disponit.

OBSERVATIO IX.

Tussis in
sene salu-
taria.

Novi virum literatum septuagenario majorem, mediocri corporis habitus, & moderatioris animi, vitæ & victus, qui ob arctandam plethoram, quæ multorum etiam senilium morborum fecunda genitrix est, singulis fere annis bis vel ter sanguinem à pedis vena mittendum curavit,

& inde etiam quoad omnes corporis functiones satis bene habuit, præterquam quod per quindecim fere continuos annos molesta febre rheumatica tussiculosa, per aliquot septimanas sæpius perdurante afflicta; quæ ipsum interdum ex improviso, vento maxime regnante boreali, corripit; hanc similitudo corporis, gravitas in capite & pectore, dolor tenivus circa primam lumborum verberum, pedum refrigeratio, alvus strictior, urina tenuis, stertuatio, appetitus auctior præstant. Sequitur postea tussis primo violenta & sicca, cum calore præternaturali anxio, & cum alternata horridula & æstuosa extremorum alteratione. Elapsa aliquot diebus valde copiosa lenis de vici diu succellive fit excretio. Urina quæ primis diebus erat tenuis, jam crassa fit, pauca & sedimentum deponit. Tandem intra duas vel etiam tres hebdomades sponte vel per sudorem universi corporis vel per sedes morbus solvitur. Rediunt mox & animi & corporis vires, redit quoque ciborum appetentia; locusque fit quietior, & reliqui anni tempore à morbis, qui huic ætati alias familiares esse solent, immunis vivit. Remediis in hac tussis non nisi levibus & simplicibus utitur; præter regimen externum conclavis de lecti valde temperatum & abstinentiam à confuso cerevisiæ potu, insulium Thiciforme ex veronica, radice glycyrrhiæ, lacte, jussula quoque avenacea, cum saccharo candio; & aliquot cochlearibus olei amygdalarum dulciant bibit. Circa vesperam doim pulvisis boracoidis leniter nitrosi sumit; & quando urina incipit deponere sedimentum, intra quadriduum semel decocto manato, ad amurcam à pectore avtrendam & foras ejiciendam, lummo cum fructu utitur.

Epiptis.

Rheumaticæ ejusmodi febres si placide tractantur & decurrunt, critica & medicinales mentur dici rectissime. Tota enim sanguinis & humorum massa ab heterogeneis ipsi immixtis succis per congruam emunctoria depuratur; sed hæc depuratio, à natura, ut ita loquar, instituta fit per gradus, æquæ tempore, expectatione ac patientia, nec vult præcipitari multis aut minus congruis & validis medicamentis. Causam ejusmodi catarrhalium & rheumaticarum febrium, vulgo in transpirationem prohibitam tantum rejiciunt; ad quando perpendimus, raro hieme, licet frigidissima, sed vere plerumque & autumnæ ejusmodi febres, cujus generis etiam sunt, quæ variolis, morbillis, doloribus etiam arthriticis accellunt, corpora infestare; statuendum potius videatur, non solum cohibitam perspirationem causam esse, sed peculiare vitium in atmosphæra nostris succis & partibus solidis advertem, latitare; quod nos quidem in virulentæ & fermentativæ indolis materia, ex pravis exhalationibus oriunda, collocaamus. Præter hæc differere id oportet, venæ sectionem per se senili ætati prorsus non esse adversam; ut potius ad longam & sanam vitam multum conficere possit. De quo argumentum in dissertatione de venæ sectionis usu ad vitam longam proximè egimus. Illud adhuc subiungendum esse censeo, quod ægrotans sæculo observaverit nullissime & optime hunc morbum in latuente vergere, si mox à principio utique ad finem & plenariam restitutionem omni studio ac cura tractetur; contra vero, si primis diebus negligatur; nec accuratum regimen observetur, nec utrum

rerum non naturalium usu, vitando aërem frigidum & humidum sibi moderetur, non modo gravio- rem & diuturniorem fieri; sed etiam saepius magna cum saevitia & periculo reverti.

OBSERVATIO X.

Tussis con-
vulsiva in-
fantum.

Tussis convulsiva, si ullam infestant aetatem, idque non sine periculo, certe id in infantibus & pueris contingere, in praxi observamus; id- que maxime quando ex praeternaturali tempo- rum constitutione nascuntur, adeoque epidemi- ce grassantur. Vidimus id crebrius & maxime anno 1709. hieme post hominum memoriam, mense Januarii & Februarii intensissima. Nam principium anni Euro novo sparsae erat nebu- lae. Postero autem & subsequenter diebus Zephyrus vehemens pluvias, & noctu inter d. 5. & 6. Janu. plurimam nivem Eurus, verus aequonem inclinans, cum intenso frigore addu- xerat; quod in dies fere, inter matutinas praeci- pue nebulas diesque & noctes serenas, crescendo ea vehementia nos afflixit, de qua longe la- teque querelas multiplicare Europae conigit; do- nec d. 20. praegressa nivosa, vespere auster tem- perationem & pluviosam auram induceret. Quod intensissimum frigus aquidivum quidem remi- tens, medio tamen Februarii revertens totam ge- lu terram confinxit; eo tempore, & etiam se- quenti vernali pleuritides spurcae & verae, peri- pneumoniae, graviter affligebant adultiores; tus- ses vero serinae, convulsivae, cum suffocatione conjunctae multis & pueris & infantibus erant lethales. Et cum tum temporis in aula Berolinen- si in officio Regio ut Medicus versarer, saepius à me consilium flagitatum fuit. Curam eo direxi, ut ad spasmos pectoris & praecordiales sopiendos accommodata & interna & externa praescribe- rem. Intra externa unguento pectorali, quod in *Augustana Pharmacopoea* describitur, cum es- sentiae croci aequali portione & pauxillo cam- phorae commixto linteamina imbui, & regioni praecordiali frequenter imponi iussi. Clystere quoque domestico simplici carminativo venter solutus; interne vero nil nisi electuarium ex oleo amygdalarum dulcium, spermate ceti, item sy- rupo papaveris albi, in iulculo avenaceo datum fuit. Remittente hinc quodammodo vehementia spasmodum, sequenti mixtura ad colluviem vi- tiatos muci in ventericuli & intestinorum canale, neque minus in bronchiis flagrantem, tam per expectorationem, quam etiam per alvum extur- bandam usus fuit. *Rec. aquae hyssopi, veronicae ana unciam, essentiae croci, spiritus salis ammo- niaci, ana guttas quindecim, syrupi mauuae cum rhubarbo drachmas duas, tartari emetici soluti grauium unum.* Haec mixtura pueris duodecim vel quindecim annos natis, dimidia pars ejus il- lis, qui sex vel septem vel octo annos habebant, quarta trium annorum infantibus fuit data. Se- cutus est vomitus cum praesentaneo levamine, & expectoratio etiam melior facta. Alterius diebus repetita haec est mixtura; reliquo tempo- re mixtura ex aqua florum lilae, liliorum con- vallium, primulae verae, cerastium nigrorum, veronicae cum pulvere Marchionis, cinnabari, animonio diaphoretico, additis aliquot guttulis spiritus cornu cervi succinati, item essentiae croci datae fuerunt, & plerique ex his remediis optime se habuerunt.

Epicrisis.

Cum infantes & pueri potentiores habeant cu- tis poros & vias, facilius etiam aëris intempe- ratoris & asperioris in eorum corpora est ingres- sus, adeo, ut ex parte humores tenues lympha- ticos insipidet, & transpirationem impediendo, ad interiora ventericuli portillum & pectus eos compellat. Et quoniam infantes ob latius te- nerum, mobile, & tendibile genus nervosum, ad motus spasmodicos & convulsivos aspectu saepe horribiles sunt propendi, mirum non est, eos praeter alia aetatibus, quando ejusmodi tussis reg- nant, acerbiora experiri symptomata. Vidimus enim vehementissime moveri & contrahi pectus, cum omnibus artibus, sub collo & facie mirum intumescere & sanguine suffusa, oculis torvis existentibus, & ob spirationem difficillimam aegros saepe occluso pharynge pro mortuis haberi. Prima igitur Medici sit intentio, ut motus hos enormes quodammodo sopiat, & postea colle- ctam lenitatem & viscidam tam in pectore quam in ventericulo & duodeno harenem materiam blan- de per vomitum & alvum eliminet. Et certe con- cilia dosi tartarus emeticus solutus in mixtura comoda, ejusmodi in casibus si detur, longe optimum & desideratissimum praestat effectum. Id quod etiam in tussi convulsiva & suffocativa, quae in variolarum, item morbillorum maxime declinatione infantes insidare solet, summo cum levamine agrotantis saepius expertus sum. Vidi etiam non raro talem convulsivam in infantibus difficili denuntio laborantibus, quae nullo modo & medicina sopiri potuit, post dentium vero eru- ptionem sponte cessavit. Adeo ut, ex sola hac observatione recte colligere possimus, moras hos pectoris violentos, non semper pro causa mate- riam insignis morbi habere, sed a sola vellicatio- ne nervosa cujusdam partis originem suam tra- here posse.

OBSERVATIO XI.

Vir quidam aetatis consistentioris, conciona- toris munere fungens, hypochondriaci obvitam sedentariam passionibus per longos annos obno- xius fuit, nimirum alvi obstructione, dolore sub hypochondriis tensivo, adpexu vago, tinnitu au- rium vexatus &c. His tandem vernali tempore, accedente forsitan corporis refrigeratione, junge- batur tussis, & per integrum jam inhaeserat seme- stre. Vespertino praeteritum ingravecebat tempo- re, tumque essetata vehementia infestabat, donec post magnos conatus, muci admodum viscidis quidpiam excerneretur. Neque tamen manus pe- ctus grave, & spiratio erat difficilis; summis epu- lis magis invalecens.

Tussis hy-
pochon-
driaci.

Epicrisis cum Consilio.

Tussis chronica & pertinacior indolis est il- la, quae molestissimum intestinorum morbo, qui vulgo hypochondriacus vocatur, laborantibus in- fecta est. Atque ratio in promptu est: nam quia tussis a nimia congestione humorum ad pectus valde infirmum & atonia affectum accidit, & prima in hypochondriaci regio ob destruc- tam digestionem, viciosos multos crudos humores suggerit; non mirum est, ejusmodi generis tus- ses non tam facile sanationem recipere. Ac- cedit & hoc, quod illa convulsiva thoracis &

torius abdominis confusio, quæ sit per tussim, digestionis, quæ sit secundum naturam, negotium, in intestinorum canale plus adhuc labefactet & pervertat. Nam plura mihi cognita sunt exempla, quod diu malumque perseverante tussi ob viciatam digestionem, & canalis intestinalis tonum destructum, affectio hypochondriaca demum producta fuerit. Ex quo jam facile intelligitur, difficilem omnino esse tussis hypochondriacæ curam. Neque enim, quæ in simplici & catarrhali epidemia tussis idonea sunt remedia, hic sufficiunt; sed respiciendum quam maxime est, ad digestionem ventriculi iuvandam, & destructum intestinorum tonum restituendum, ac circulationem etiam sanguinis per viscera abdominis, quæ in hypochondriaci lentior est, promovendam. Ego itaque in prædicti casu, atque etiam in aliis similibus non sine insigni fructu, preparato prius corpore, ceteris pharmacæuticis alias satis efficacibus remediis nihil proficientibus, curam cum aquis mineralibus, acidulis vel etiam thermis temperatioribus, sine vel etiam cum lacte, pro diversâ subjeclorum & circumstantiarum ratione instituendam suasi. Ante vero, inter de post earum usum elixiris temperatioribus stomachicis & balsamicis, & ejusdem virtutis pilulis, subjuncto simul loco potus ordinari decocto temperato extradictibus & lignis totam curam abfolvendam statui; non neglecta etiam accommodata sanguinis vel per venas hæmorrhoidales hîndinum ope, vel per sectionem venæ in pede missione, modo post illam, præteritum autumno & vere patiens frigidum astralem aëris statum evitet. Nam dici vix potest, quam graviter ex hujus rei neglectu luet ager, & quam læviter inde tanto passio ingravescat.

OBSERVATIO XII.

Tussis in
gravidâ.

Generosissima foemina in vicina urbe quartum mensem prima vice gravida, anno 1732. tempore, quo & variolæ & convulsivæ tussis epidemice & sæviter grassabantur, vehementiori etiam insensibilior tussi cum febricula nocturna; appetentia ciborum penitus erat prostrata; sit vero premebatur, ad quam decedendum decoctum temperatum vino intermixtum bibebat. De liberatum fuit, cum venæ sectio ad abortum præcavendum locum habere possit, eo quod dolores quosdam spasmodicos & tenivos circa lumborum regionem & inguina generosissima femina interdum percipiebat. Ego, quia erat plethorica, & venæ præterit in partibus superioribus, maxime jugularis valde turgente sanguine, innoxiam eam minimum, sed tentandam potius in manu judicavi. Er sanguis mucro crasso tenaci valde oblitus detractus fuit. Tussis hinc & febris longe remissior facta est: Præter venæ sectionem in usum quoque rhabarbarum cum manna, ad lentam pituitam per alvum, quæ erat signor, subducendum cum fructu datum fuit.

EPISTOLA.

Ex vehementiori tussi, præteritum convulsiva abortus fieri posse, non novum, nec inauditum in præxi medica est. Hujus vero causam in sanguine & humoribus impuris & spissis, quia mensura cessat purgatio, ralicari pro statuto & certo etiam habendum videtur. Sanguinis itaque abundantioris ac impurioris per sectionem venam detractionem, ipsa sana ratio dicitur & experientia etiam abortum confirmat.

Plures de tussi casus legantur in *Consult. ad respons. medicin. Sect. II. casu LXXV. LXXVIII. & XCVL*

CAPUT IV.

De Singultu.

THESES PATHOLOGICÆ.

§. I.

Quemadmodum respirationis negotium binis potissimum absolvitur actibus, inspiratione videlicet, ac expiratione: ita utrique etiam ratione ladi potest. Expirationis quidem vitium, quod tussis nomine venit, superiori capite pertractavimus: ad inspirationis vero lesionem, illa pertinet affectio, quam Græci *σπασμὸς* seu *σπασμός*, nos *singultum* vocamus. Hic, si spectemus definitionem, nihil est, quam *sepi iterum-versi, & adnexarum quarundam partium convulsio spasmodico-convulsiva, interrupta, molesta, sub inspiratione facta, & cum sonora aëris per et explosione stipata.*

Definitio
Singultus.

§. II.

Hujus naturam explicari; quædam de fabrica partium, quæ ad id vitii perficiendum concurrunt, præmittimus. Sic nobis primo se sistit septum transversum, Græcis *διάφραγμα* dictum, quod omni circumferentia musculosum, fibra centro ad perihæriam tendentibus, in centro tendineum, medium corporis cavitatem ab infima, transversa, simul obliquo, anteriori, posteriori decliviori sui dissepens, versus thoracem convexum, abdomen versus concavum, nervis partim a venætrahibus colli, partim ab intercostali ramo, & vago pari oriunda, satis capacibus instructum; binis foraminibus, quorum dextrum in tendineo circulo cavam venam, sinistrum in musculosa parte oesophagum, ac parvenorum vagum transmittit, pervium, variis undique adhærentis partibus. Nimirum antica parte colli, sterni, & musculis intercostalibus; media per tunicam pleuram, convexam sepi superficiem cingentem, mediastino; ventriculo, non solum per nervos, ac exterioriorem tunicam, à peritoneo productam, utrique communem, ac concavam sepium investientem; verum etiam per stomachum Græcis *σάγος* dictum, ipsi firmiter adnexum; hepatis, ejusque gibbosæ superfici per ligamentum latum; & postica regione vertebræ lumbares per duas musculoso-tendineas appendiculas arcto connectitur vinculo.

Structura
diaphragmatis.

§. III.

Vi hujus distarum partium mutui vinculi necesse est, ut unus partis in loco mutationem sequatur reliquarum adherentium motus: quod in naturali statu respirationis docet negotium. Namque sub hujus prioris actu, inspiratione, partim musculis intercostalibus, costas sursum, simulque anteriorum trahentibus, partim ipsi musculosi sepi fibræ, à centro ad perihæriam contractæ, & abbreviatæ, hoc ex convexa in magis planam converterit figuram: proximus hunc motum amulatur vicinæ partes, & universum sursum antorsumque trahitur abdomen, stomacho per abbreviatas sepi fibras magis coarctato.

Diagramma
motus aëris
in respiratione
trahi per
gastri.

Om-

Omnia hæc pristinum subeunt conditionem, diaphragmate in expiratione ad convexitatem redeunt. Inde vero sequitur, quod ubicunque thorax & abdomen sursum, antrosumque tolluntur, & pectoris amplius cavitas, ibi sit inspiratio; si contra, expirationo.

§. IV.

Jam si ad singultum fiat adplicatio; hujus primum historiam, quamvis facillima cuius sit diagnosi, curatius attendentes, sic habere deprehendimus. Concutitur pectus celeri impetu, cum sono acuto; sub qua concussione thorax & abdomen attolluntur, pectoris cavitas fit amplior, loquentibus sermo intercipitur, quin tanta sapienter numero est vehementia, ut iuxta **DOLÆUM** *Encyclop. medic. Lib. III. cap. 2. pag. 174.* totum contremiscat corpus, & collæ frangi videantur. Ipse sonus, qui jungitur, tantus nonnunquam est, ut auris latus insillat à transiensibus in platea, & ædibus vicinis percipi possit. Conf. **LAZARUS RIVERIUS** *obs. 1. pag. 302.* **THOMAS BARTHOLINUS** *histor. anat. rarior. Crat. II. histor. 4. pag. 175.* **VITUS RIEDLINUS** *obs. 31. pag. 67.*

§. V.

Hæc cum phenomenis inspirationis collata, luculenter docent, singultum esse inspirationis vitium, silem sub ea connegere. Quemadmodum vero sub naturali inspiratione antecedere observatur motus muscularum intercostalium; sequitur transversus septi constricção, & tandem abdominis elevatio, hæcque omnia placido, ac leno procedunt gradu: ita è contrario in singultu tanquam præternaturali inspiratione, primum observatur septi transversus constricção, & vi consensus sequitur motus connexarum partium, cuncta vero vehementer, & velocissime fiunt. Concussio sic velocissime septo, concutitur quoque gula & stomachus citissime: hinc aeris, continuo à nobis deglutit, portio intra gulam comprehensa, magno impetu sursum per intestinum pellitur oesophagum, & tandem in fornicato palato, singultuosum illum efformat clangorem. Conf. **LANGII** *Pathol. animat. Cap. 36.* Concussio denique septum, productio singultuoso sonitus, plus minus lento progressu rursus convexum redditur: i. e. fibræ musculares iterum prolongantur: hinc quies fit, & per intervalla restit concussiva concussio.

§. VI.

Dum ergo singultus est convulsio diaphragmatis velocissima, sed mox remittens, & per intervalla recurrens: distinguitur solum ab ea spasmodica detensione, quæ diutius septum tenet rigidum, ac perpetuam spiranti causatur difficultatem. Conf. **CASPAR HOFFMANNUS** *Instit. med. Lib. III. cap. 86. §. 6.* **GALENUS** *de symp. Lib. II. cap. 2.* Hæc accedere observatur colicæ convulsivæ, aut paroxysmis hysterici vehementioribus; & à sonitu, singultuentibus familiari, vacua deprehenditur.

§. VII.

Ad hæc notanda omnino est differentia, quæ singultum chronicum intercedit, & acutum. Hic morbus acutus jungi observatur, ut febribus continuis, malignis, exanthematicis, pestilentialibus, inflammationibus nobiliorum viscerum &c. & non modo brevioris exitus, verum accipi-

Frid. Hoffmanni Oper. Tom. III.

tis quoque eventus est. Contra chronicus longas ægrotudines comitari solet, de sunt hysteriæ, cachecticæ affectiones, viriata primarum viarum condicio, mala partium spiritalium conformatio &c. & in hac sua indole ad plures dies, hebdomades, menses, quin integros annos perdurare potest. Sic **BARTHOLINUS** *Centur. III. Epistol. 61.* de muliere per biennium adeo graviter singultiente, ut à dæmone obsessa videretur; & *cent. II. hist. 4.* de singultu per quatuor annos insillante; alii alia exempla allegant, quorum numerus à **MARCELLO DONATO** *Lib. IV. hist. med. cap. 5.* & **SCHENCKIO** *obs. L. III. recensetur.*

§. VIII.

Quod singultus sedem attingit, variz Medicorum de ea semper fuerunt opiniones. Veteres, & horum antesignanus **HIPPOCRATES** *Lib. VI. aph. 39.* ventriculū solum accusant, & per ejus violentum motum, quo rem sibi infestam expellere conaretur, desciperunt. Verum, ne tali ratione illum cum vomitu vel ructibus confunderent; singultu agitari eaque superiori ventriculi orificio inhærescent, vomitu, quæ ejus fundum occupant, peribucant. Vid. **FORESTUS** *obs. 12. Lib. XVI. pag. 286.* Alii vero, quorum agmen duxit **FELIX PLATERUS** *Lib. II. de humil. lesion. Cap. 5. pag. 476.* sedem in solo septo transverso collocant; cum priorem opinionem non omnibus phenomenis satisfacere viderent. Alii denique media intercedentes, primario quidem os ventriculi superius adici, per consensum tamen semper diaphragma simul agitari autumant: quos inter nominandus est **DOLÆUS** *Encyclop. Med. L. III. c. 2. p. 174.*

§. IX.

Mea vero sententia principalis sedes, ac primarium hujus affectus organon in diaphragmate collocandum est: siquidem absque hujus musculi transversus ope, nulla inspiratio, cujus præternaturalis effectus est singultus, fieri potest. Erim vero cum superiori ventriculi orificio finissime adhærescit septo illi; impossibile est, quin simul una cum oesophago in hoc affectu pariat. Et hinc adparet fundamentum illius divisionis, quæ singultus in *idiopathicum* & *symptomaticum* recte dispescitur. Ille enim est, si causa ejus materialis, in ipsa transversus septi subtilissima hæret; hic, si causa in ventriculo residet, & hujus vellicatio ad diaphragma propagatur.

§. X.

Causa singultus proxima est irritatio vel stimulario aut diaphragmatis, aut stomachi, & hinc inducta harum partium convulsiva concussio. Quamobrem quo debiliori nervorum genere homines sunt præditi, eo facilis hoc affectus corripitur: hinc infantes, pueri ac senes ipsi præ aliis sunt obnoxii, adeo ut diætericum quoque ac transitorium illud singultum, de quo nos non loquimur, & qui vel ex stomachi refrigeratione, vel haultu avidiori aut frigidiori, vel etiam risu suboritur, facillime incurant. Sed & illæ mediæ ac remotiores causæ, quæ morbosum singultum, medentis auxilio dignum, suscitare valent, in his subjectis facilius vim suam exerant: quas jam ordine suo recensere, animus est.

§. XI.

Croffe si-
gnificat
1) in aër
frigido.

Aëri, eique frigido ac humido, præsertim subiecta antea calentibus admisso, princeps debetur locus. Qui nudo vel leviter tantum tecto pectore, quique nudis præter consuetudinem pedibus, in frigidioribus ambulans pavimentis, quo teneriores fuerint, eo facilius singultum inducunt; & infantes, quorum vertex adhuc palpitans non bene tectus fuit, eodem affectu frequentius corripuntur. De triduo singultu ex diuturniori in aqua mora, casum refert memorabilem CAR. RAYGERUS in M. N. C. dec. I. auct. VI. obs. 211. & majori attentione dignus est ille, quia meminit RIVERIUS Cent. III. obs. 42. quod quædam puella, per totum hiemem singultu graviter vexata, omni vero æstate ab eo libera fuerit.

§. XII.

2) in ali-
mentorum
nimia
quantitate.

Ejusdem affectus causam ipsa alimenta præbent, vel nimia quantitate fuenta, vel isimica qualitate prædita. Sola avidior ingurgitatio, qua bolus b. u. n. haustus haustum trudit, & in superiori ventriculi orificio commoratur; hoc vellicando, singultum, utur leviorum producit: & sic FORESTUS Lib. XVIII. obs. 12. singultum à frusto pulmonis bubuli in œsophago resistente commemorat. Cibi quoque nimia quantitate ventriculum onerantes, eandem pariunt mollescentiam: id quod pueri vocatores, & gulæ dediti testantur; & solum panem nimia quantitate ac aviditate ingestum, id vitii concitasse, notat EPIPHANIUS FERDINANDUS bist. med. 43. Potentia, major copia ingurgitata, maxime si externa accesserit refrigeratio, aut ipsa nimis frigida fuerint, tussim pariunt, exemplo belluorum, nudo inter pocula pectore versantium, & infantum lactentium, si in cervicibus frigidior exhibeat. TIMÆUS à GULDENKLEE exemplum hujus affectus allegat in viro, qui valde calefactus, tantum aquæ frigide cum nitro haurierat Lib. III. Cap. 5. pag. 115. & RIVERIUS de morb. infrequent. obs. 1. singultum semestrem, à frigido haustu vehementissimum adnotat.

§. XIII.

3) in ef-
fusionem
revertit
quantitate.

Quæcumque assumptorum vel per se nimis sunt, acia, vel ex variis causis intra ipsum ventriculum, in saburram acrem, vicidam, stomachum vellicantem debilitant, morbum nostrum plus minus gravissimum inducunt. Quem fugit lætis & lacticiniorum corruptionem in ventriculo, singultientes reddere infantes; quale exemplum finestum narrat BARTHOLINUS Ab. Med. Haffn. Vol. II. obs. 28. Idem tenendum est de acris, causticis, aut plane venenis. De singultu ex cicuta conestâ, GULDENKLEE Lib. VII. cap. 4. ex euphorbio ibid. cap. 7. ex cepis, alio, & zingibere GATINARIAS de cognat. & cur. agrat. pag. 81. ex oleo vitrioli loco balsami sulphuris iunxit BARBETTE præf. med. Lib. IV. cap. 2. pag. 136. ex nimio usu lapidorum acidorum, & emulsionum refrigerantium in acutis SCHENCKIUS Lib. III. allegant notatu dignas observationes. Neque minus huc referenda sunt vomitoria ac purgantia drastica, maxime belleborata, quæ rodendo, stimulando, & inflammando ventriculum ac intestina, ad singultuosum disponunt morbum.

§. XIV.

Citissimas & uspirumum fœnitias sepi transversi concussiones excitant humores acres, corrupti, multiq; salinis partibus repleti, si incumbant diaphragmati. Notum mihi est exemplum de homine, qui per decem & tres dies vehementissimo affectus singultu, tandem obiit: cujus in thorace aliquot sciri acrioris extra vasa natantis uncie post infinitum cadaveris sectionem reperta fuerunt. Ex hac fere pericinet singultus, qui à materia arthritica vel podagrica per metastasin ad septum transversum decumbente suboritur: qualem à retropulsu arthritide exitum adnotavit GEORG. HIERON. VELSCHIUS Hecatæst. Lib. 54. Idem morbus contingit, si dysenteriae vel diarrhoeæ, præsertim ab initio cohibita, & per opiatâ, vel alia adstringentia sufflaminata fuerint: quemadmodum observavi in nat. ad Peter. cent. II. cap. 47. Neque raro erysipelas retropulso, aut in senioribus ac imbecillioribus haud satis vegete expulso jungitur singultus. Quæ omnes causæ vitium materia acris, ac veluti muscosa, nervosis partibus transversis partibus, vel orificio ventriculi superiori sese infundunt.

§. XV.

Qui acutus audit singultus, jungitur morbis, qui sunt brevioris exitus. Ex his prius tenent inflammationes viscerum nobiliorum, sic malum illud sequitur vulnere ac inflammatione ipsius septi, ut in parapneumide adparet; nec non ventriculi & intestinorum, adnotante FORESTO Lib. XVIII. obs. 12. phlegmonem hepatis, testibus CELSO Lib. II. cap. 7. BARBETTE præf. med. Lib. IV. cap. 2. cujus pathognomonicum signum, dolor ad jugulum ascendens suppeditat. Ipsæ cerebri, ac meningum inflammationes, gravelque vulneraciones, vi consentias quem hæc partes per nervum vagum cum sepi stomachoque habent, emittunt hoc symptoma. Conf. HIPPOCRATES Sect. VII. aph. 3. & HEURNIUS comment. in buac apbor. pag. 469.

§. XVI.

Idem vitii genus sociari solet febribus continuis, malignis, & exanthematicis &c. ubi variæ remotiores concurrunt causæ. Aut enim junctæ inflammationis causa sit singultus; id quod cumprimis in febre pestilentiali à carbunculo, lepre aut ventriculorum obfidente, evenire asserit DIEMERBROECK Cap. 13. §. 5. & Cap. 15. auct. 15. aut si febrium legitimarum decursus præmaturis anodynis, opiatique turbatus fuerit, qualem memorabilem casum recenset RIVERIUS Cent. III. obs. 17. aut sudores repressi, & exanthemata resistantia, vel repulsa sequitur; aut acrem ventriculi saburram comitatur, cujus exemplum in febre hemitritata refert FORESTUS Lib. V. obs. 15. Hiis in casibus periculosa simul adstant signa, sitis magna, debilitas insignis, vigilie, delirium, impudentia, auditor inextinguibilis, morus maxillæ inferioris tremulus, nervorum dissentio, vocis interceptio, urina diluta &c. Contra vero si circa dies criticos occurrat, ac reliqua signa, maxime coctionis in urina, fuerint bona, nihil mali portendit; sed vomitum criticum, aut alvi fluxum futurum prænunciat, & his subséquens cessat. Sæpius quoque has acutas febres ita sequitur singultus, ut cum ipsis permaneat, & per totam febrem simul exacerbetur; quales

4) in ma-
teris a-
diaphrag-
mati co-
cumbunt.

5) in vis-
ceribus
nobilibus.

6) in fe-
bribus
continuis.

febres singultuosae, aut lyngodes Veteribus appellatur, earumque exemplum in M. N. C. *ausa IV. observ. 48. pag. 43.* allegatur: quorum etiam spectu memorabilis casus à POTERIO *Cent. II. cap. 47.* allegatur.

§. XVII.

Ad acutos & acutis eventus singultus referendi quoque sunt, qui secundum Veteres inactionem, seu nimias humorum excretiones sequuntur. Hyperemesis & hypercatharsis hoc gravi symptomate stipari, testatur praeter experientiam HIPPOCRATES *Sect. VII. apb. 3. & 41. & Sect. V. apb. 41.* & SYDENHAM *meth. cur. febr. pag. 61.* Eundem affectum post se trahunt cruoris vitalis nimiae ac inextinguibiles effusiones, vel naturales per uterum, nares, haemorrhysus, vel per vulnera graviora concitata; sicuti idem HIPPOCRATES *Sect. V. apb. 3.* significat. Quibus in casibus universales plerumque convulsionem, ac ipsum vitæ finem haec convulsionem singultuosae, tanquam ultimæ naturæ conatus antecedere solent.

§. XVIII.

Chronicus singultus natalis suus quandoque debet sanguinis & humorum viro: quando nempe illa, aut quadam acrimonia imbuti, aut retentis conductis excretionibus, ad vasa septi ac ventriculi copiosius congesti sunt. Hanc gravidis per ultimos gestationis menses, & sceminis hystericiis, quarum menses non rite fluunt, maxime familiaris est: quo nomine notabilis est casus à SCHURIGIO *partenol. pag. 213.* allegatus, ubi refert; singultum foetum quandam ante mensum eruptionem semper occupasse, hac vero facta protinus cessasse. Idem malum chronicum aequae ac periculosum adfigere solet cachecticos, & hepate affectos: ubi causa in bile, aciori redditâ, & tunica ventriculi ac duodeni nerveas vellicante, querenda est. Hinc talis affectum in cachectico tam diu durantem, donec vomitus sequeretur, observavit LENTILIUS in *Latrois. pag. 286.*

§. XIX.

Offensum denique, quæ pectus cingunt, partium, & male conformationis vitia, ad chronicum interdum contribuant singultum. Mucronata cartilago, si laxata, vel ob alias causas magis introrsum reflexa est, ut ventriculū stimulare possit, praesentem affectum producere, observationibus deprehenditur: qualem à depressâ hac cartilagine per tres menses durantem adducit FERNELIUS *Lib. VI. de part. morb. & sympt. cap. 3.* Eundem costarum luxationes, fracturae atque contusiones excipisse, docet experientia. Hinc idem FERNELIUS *loc. cit. pag. 568.* singultum ex luxata costa ortam, ea reposita conquiescente refert: & RHODIUS *Cent. II. observ. 61.* quidem ex compressione undecimæ costæ vertebrae nati ac continui mentionem inscit.

§. XX.

Quod singultus prognostice attinet: neutiquam periculosus ille, qui visciditates, cruditates, & acrimoniam primarum viarum excipit: nec qui hystericiis accidit, timeri adeo debet. Multo minus periculi habet, si ex refrigeratione vel potu frigido oritur, modo non corpori sudanti, nimis ingeratur: frequenter quoque est infantibus lactentibus & in his nil mali, plus vero in

Frid. Hoffmanni Oper. Tom. III.

senibus praenunciat. Novi foetum generosum XL annorum, quæ viginti annos quotidie adhuc singultu vexatur, sine sanationis incommodo. Idem vero minus talis per acutas febres, praeterim ardentes, ac pestilentialiter incidentes, grave portendit periculum: & si delirium interveniat, aut nervorum distensio, mortiferum est. Qui causa inflammationis maxime hepatis oritur, vix nisi lethalem praesagit exitum. Aequè perimenseculus ille, quem acriora purgania, inenitica, ac venena post se trahunt. Omnis ex inanitione singultus, post alvum citam, largaeque vomitiones malus, post sanguinis profusionem, & capitis vulnera, pessimus. Quem accersunt dysenteria, diarrhoea adstricta, erysipelas, podagra, arthritidis refulsa, periculo non vacat. Singultuosae senum hemiorum febres, cum nulli ferme medelae locum relinquunt, mortificae sunt, teste FORESTO *Lib. XV. Cap. 12. Schol.* Sternum tamen autem singultus, maxime qui ex repletionem oritur, accessisse utile est, & hunc cessaturum praenunciat.

METHODUS MEDENDI.

§. I.

Omnis singultus medelam non expostit; siquidem levior ille ac diæsticus vel inspiratione diutius protrahitur, vel animi quodam distractione, per dolorem in quodam corporis loco excitatum, aut sedulam aliquam rei meditationem, aut terrorem ex improviso excitatum, facile solvitur. Qui veni morbosus est, his non cedit; sed medica adgrediendus est manu: Tres vero potissimum in illo sanatio sunt indicationes, quarum prior motuum praeternaturalium, ipsiusmodi convulsivorum mitigationes; altera causarum materialium remotionem, & tertia partium affectarum & debilitatarum restitutionem indicat.

§. II.

Priori scopo satisfaciunt Veteres, opio & inde paratis urbanior medicinis, laudano opato; mithridatio, philonio, disacordio *Fracturæ*, theriaca &c. usque singultum de cursu hinc inde perhibent. Verum praeforo leniora antispasmodica, & anodyna: ex quibus sunt succinum, cinnabaris, crocus, calloraeum, quod vehementer laudant auctores adeo, ut ALEXANDER TRALLIANUS, bonus imprimis auctor, illud quoque sub amuleti specie singultum sanare, sibi persuaserit: *Lib. VII. pag. 387.* Ego crebra doctus experientia, liquorem meum anodyno-minerale omnibus longe praestantiorum iudico, eumque his in casibus vel solum, vel tunc castorei nuptum exhibere soleo. Nec minoris efficaciae est spiritus niri dulcis, cum refracta balsami mei vitæ dosi permixtus. Olei amygdalini unam vel dimidiam unciam cum aliquot olei anethi destillati guttulis quidam pro secreto habent.

§. III.

Cumprimis vero, juxta alterius indicationis tenore m, causarum materialium remotioni studere decet. Quando itaque sabura quaecumque ventriculo inherens, ejus officium superius stimulando, singultum produxit, ea corrigenda & blande vacuanda est. Si acris ac biliosa fuerit, absorbentia citrata, pulvis noster praecipitans, ex aqua frigida opere facient pretium: viscidâ, plicis ventriculi perniciatibus infusa, salibus

L 3

dispo-

ob inactionem.

Chronicus singultus natalis.

Offensum partium, aut male conformationis.

Prognostice singultus.

Indicationes curatio.

Quæ prior indicatio curatio.

Sabura perniciosa: salibus &c.

digestivis, maxime liquore terræ soliatæ tartari, & radicibus, quæ refovent, simulque roborant, ut est radix vincetoxici, quæ simul anodyni quicquam in recessu habet, angelicæ, calami aromatici &c. vocis satisfaciunt. Cocta materia vel per vomitum, vel per alvum erit evacuanda. Illo cuncto convenienti radice ipsecacanthæ, vel omnium optime pulvis squilla ad quatuor vel sex grana cum granis tribus nitri purificati. Alvum solvunt mannata, rhabarbarina, pilule aloë-phanginæ, vel marcosolinæ aut de succino *Crasomus* aucta succini dosi præparatæ: commodissime hujusmodi pilulis aliquot grana massæ pilularum de styrace vel de cynoglossa admiscuntur: ita duplici effectu satisfaciunt. Tutissima quoque sunt enemata, leniter carminativa, maxime infantibus, qui ex lacte corrupto id vitii genus incurrunt: quo in casu etiam sulphuris animonii correctum, vel aurum fulminans bene præparatum dosi concilia cum fructu adhibentur.

§. IV.

*Singultus à rebus trisphuris aut sub-ore car-
no.*

Si à frigore, vel quacunquē alia causa cohibita transpiratio foveat malum; huic revocandæ omne studium impendere oportet. Conveniunt hoc nomine, præter externum temperatæ calidum regimen, afflictorum partium fomentationes, potus tepidus, & largus, insula thesiformia ex herbis ac radicibus resolventibus, ac roborantibus confecta: ex quibus pulveres bezoardicos, ex succino, cornu cervi uto, animonio diaphoretico, cinnabari, tartillo extracti croci, ac castorei paratos sumere juvabit. Excellens quoque hoc in casu remedium, constituit spiritus bezoardicus *Bassii*, si cum liquore nostro anodyno, & essentia caloris permisceatur. In acutis & exanthematicis febribus suppressa transpiratio, præter rectum regimen, frictiones, & fixa diaphoretica vororum explebunt summam. In chronico singultu a refrigeratione suborto, admodum refractario, potus vini Hippocratici levamentum præstat: præter id divinæ virtutis sunt balnea tepidiora; quæ & diaphoretim revocant, & partes spasmus contractas emolliunt: quemadmodum exemplo confirmat *RIVERIUS observo. infrequent. 1.*

§. V.

*Exanthemata ex-
temporaria sunt circum-
scindenda.*

Eadem medendi ratio obtinet locum in singultu à materia erysipelacea, arthritica, podagrica retrocedente, aut non satis foras pulsa suborto: in quo scilicet, præter diaphoreticos per dicta §. præcedente remedia obtinendam promotionem, materiam acrem ac inimicam a nervis phrenicis ad sua loca revocare expedit. Hoc sine blanda laxantia & clysteris divinæ ferme sunt virtutis: non minus rubefaciencia, atque vesicatoria furis vel scalpulis adplicata, detrahendum acre, magnum ferunt levamen. Nec opera ludatur, si in podagra retrocedente pediluvia tepidiora cerebro adhibeantur: quare etiam *TRALLIANUS lib. cit. pag. 386.* atque *RIVERIUS præf. pag. 407.* manum in aquam calidiorē immersionem laudant.

§. VI.

*Singultus ab acris
diuturno
removendus
aut in
præstat.*

Quandocunque à dato emetico, purgante, caustico remedio, veneno singultus excitatur; ea sunt adhibenda, quæ vim veneni castrant, & enervant. Quæ inter nihil præstantius est pituitibus, oleis amygdalarum dulcium, oliva-

rum, macilaginosis, ipso lacte, ejusque tremore, tempessive, priusquam inflammatio locum occupaverit, propinatis; & sic involuto veneno, effrantes morus dictis superius anodynis compellendi sunt. Si vero malum à veneno per contagium hausso, uti in peste, vel etiam morfu canis rabidi, ictu, ita effervescenti infecti provenit: tunc theriacalis, ipsa theriacalis aqua, theriaca coelestis cum anisipalmotica, nitrosis, camphora, cinnabari, diaphoreticis mixta optimum pollicentur levamen. Quæ curandi ratio locum quoque obtinet, quando à materia caustica, exanthematica, maligna, ad interiora à corporis superficie repulsa malum incidit; quo casu pulvis ex camphoræ aliquot granis & nitro compositus, nec non emulsiones ex amygdalis & leminibus quatuor frigidis majoribus, & aquis diaphoreticis paratæ, præstantissimam ferunt opem.

§. VII.

Qui insignes cruoris vitalis effusiones insequuntur singultus, haud prius compelluntur, quam donec ipsa inanitionibus obex ponatur. Cohibere vero hæmorrhagias enormes decet intermis temperantibus, tonicis, adstringentibus, externisque prædiis: quorum in vulneribus commodo de lacte parvis deligacionibus pertinet. Sedato fluxu tutis anodynis insistentium, usque efficacissima antiepileptica jungenda, & denique anæmiæ analeptics, & alimentis resistentibus succurrendum.

§. VIII.

Nec insuper habenda sunt remedia roborantia, maxime sub morbi declinatione. Ex his eminent olea roborantia macis, menthe, absinthii cum balsami mei vitæ quibusdam guttulis combinata, ac in aquis spirituosissimis, tanquam commodo vehiculo exhibita. Tales sunt aqua spirituosissima cinnamomi, menthe, melisse, aquæ vitæ aromaticæ: nec non essentia carminativa *Wedellii*, aqua carminativa *Dornereilii*, & ipse vini generosi haustus. Hæc remedium genera in singultu, qui à flatuum retentione, & facta ab illis ventericuli vellicatione proficiunt, junctis clysteribus carminativis, utramque curationis absolvent paginam. Inter topica opem quoque pollicentur linimenta anisipalmotica, paregorica & anodyna, præcordiis admodum, quæ habeant oleum nucis expressum, axungiam humanam, oleum macis, menthe, absinthii, crocum, castoreum, camphoram &c. nec minus cerata ac emplastra nervina, scrobiculo cordis adplicata, ac ipse denique partium afflictarum per accommodata vincula constrictiones.

CAUTELÆ, CUM CURA SPECIALIORI.

§. I.

In singultu, qui ab acrimonia vel visciditate ventriculi subornatur, sepius solo potu tepido, copiose sumto, vocis potui licet: hic enim involvit acrimoniæ, diluit visciditatem, & causam stimulationis removet. Omnis vero frigidus potus malum exacerbat.

§. II.

Pessimi successus est singultus diarrhœis, vel dysenteris intempestive cohibitis superveniens: quare ipsi cito succurrendum. Tutissimum & effica-

*Singultus ex anæmi-
æ crueti-
tione.*

*Roboran-
tia opt.*

Potus opt.

*Singultus diarrhœis
supervenit.*

efficacissimum hoc in casu remedium præbent clysteres, ex emollientibus & leniter laxantibus, ipsa videlicet medulla cassia, vel extracto rhabarbari adjecto, & crebrius infundendi: laxantia creterius exhibere minus consultum est. Præstat potius biliosos acres humores contemperare, quod & magnesia, & alia absorbentia, & imprimis serum lactis dulce, potui datum efficiunt; tumque jungere convenit interna anodyna, externaque paregorica.

§. III.

*Singultus
færum a-
curatum.*

Februm acutatum singultus, morbi primarii curatione, quæ aequali diaphoretico promotione absolvitur, etiam curatur. Tum maxime cavendum ne adhibeamus remedia salina, multo minus laxantia, pilulas aloëticas: aut regimen iusto calidius, vel potum calidissimum concedamus: uti enim frigus, ita & excessivus calor, nervosis partibus, maxime si morbo affectus fuit, est inimicus.

§. IV.

*Singultus
inflammationis
accidentis
curatio.*

Pari ratione in singultu à viscerum inflammatione ducto, huc prospiciendum est; rursus protinus in pede vena, si recens adhuc fuerit inflammatio in corpore plethorico; tumque datis interne discutientibus, aliisque, quæ sudorem movent, stagnanteque succos resolvunt; quibus, urgente nimis dolore, blanda conjungere licet anodyna. Cum primis alvus injeclis clysteribus, semper lubrica servanda; externe camphorata, crocata, facculique discutientes adplicanda, & prudenti prognosi famæ consulendum.

§. V.

*Singultus
cachecticus
curatio.*

Singultus cachecticus, & hepate affectis superveniens, curatur remediis bilem acrem corrigentibus, infusis resolventibus, hepatis, attenuantibus, amaris & evacuantibus; hisque nondum satisfaciensibus, nihil est, quod vim theriacalem, aquarumque mineralium superet; de quibus notabilem casum allegat BONETUS *med. Sept. Lib. V. Sect. V. obs. 6.*

§. VI.

*Hypochondriaci
curatio.*

Qui accedit hypochondriaci, & ut plurimum suppreffis excretionibus sanguineis debetur: non celat, nisi hoc primario proffigato malo. Tum vero, si omnia fallunt, theriac cum primis Carolinæ, conjuncto ad roborandas partes balnearum Theriacalium usu, operæ facient pretium. Scorbuticis cura lactis asinini, acidulis Seheranis, hisque terefaciis nupti, egregium pollicetur auxilium: quod jam commendat PAULLINI *Onograph. Cur. Sect. IV. cap. 3. §. 1.*

§. VII.

*Singultus
curatio, ab
affectione
præteritis
partium
lesione.*

Si costæ fractæ, distortæ, luxatæque singultum produxerunt, laxationis reposicio, fracturæ consolidatio, ex chirurgico petenda foro, unicum spendent auxilium. Curilignæ ensiformi luxatæ, ac intus flexæ optime medebuntur, cicutitæ cæcæ, ferobiculo cordis adplicatæ: quas cum primis laudat VITUS RIEDLINUS *lin. med. anno 1695. mens. Aug. observ. 4.*

§. VIII.

*Anodynorum
usum.*

Anodynorum in compescendo singultu causum oportet esse usum: si multa materia pec-

cat, hujus ante omnia studendum correctioni & eliminationi: præsertim, si fuerit acris, causifica, virulenta. Hac enim nondum excussa, anodynis uti, nihil est, nisi oleum camino addere. Si cæpi in omni morbo, ubi anodyna & sapiente virtute opus est; ita quam maxime in affectibus spasmodico-convulsivis, cuiuscunque generis sint, opiata rarissime sola, sed cum accommodatis evacuantibus sociata de tutissima & præstantissima sunt. Et hoc arcanum vehementem opam vim cicurandi re vera est antiquissimum. Testatur id celebre illud medicamentum *Alepiadis*, quod recerbet GALENUS *Lib. VIII. de compos. medicam. Cap. III. & AVICENNA Lib. IV. Fea. XIII. tr. 5. c. 19.* & constat ex collo, croco, spica, asaro, mastiche, aloë, & opio; orque ad ejus imitationem confectæ sunt *plula Rondeletii, Poterii, Plateri, Riverii, Wildengansii, Starckii, Anglicana.* Nos in assu mate & tulli convulsiva, singultu & aliis dolorificis & spasmodicis morbis, pilulas aloëpharinas, vel etiam nostras polychordas, cum dysla vel tertia parte massæ pilularum de styrace vel de cynoglossa miscere, & cum fructu insignissimo usurpare consuevimus.

§. IX.

*Singultus
levioris
curatio.*

Singultus à leviori causa exortus sine medicamentis sapienter feliciter sistitur, quando videlicet sub motu thoracis magis voluntario ipsum diaphragma cogatur, aëre, ut plus hære ejus motrices tendantur vel relaxentur. Illud fit fortiori inspiratione, per cursum, per saltum, per vehementem equitationem; hoc vero per expirationem fortioerem, per vociferationem, & si thorax fascia, seu zona constringatur, quod simplex & extemporaneum sæpe est remedium. Eisdem generis est sternutatio, quæ uti spontanea, docente id *Hippocrate Sect. v. aphor. 13.* singultum tollit, ita naturæ bene operantis minister, medicus, arte eam provocare debet. Et maxime, quando vel lenta & in statu abiens materia ventriculi tuncis aut partibus proximis inhaerescit, ad eam ipsam per vehementem expirationem, dum viscera abdominis & imprimis ventriculus vehementer conquisitur, deprecanda; Minime vero sternutatio arte producta locum habet, ubi inflammatio vel subilis causifica virulenta materia, alius nervosis partibus sese insinuaverit.

§. X.

*Præservatio
curatio.*

Præservandi sine rectis rerum non naturalium usus, præsertim aeris frigidi evitatio, ex omni parte vois respondebant. Qui à longo morbo partes solidas debilitatas habent; sic præcavebunt, balnearum martialium prudenti usu, nec non remediis martialibus, conjunctis siquidum potatione, mœque corpora sufficiente, usurpanda.

ENARRATIONES MORBORUM.

OBSERVATIO I.

Virgo annorum XV. integro ciborum appetitu gaudens, & menstruum fluxum nondum experta, variis autem molestis illorum causa pressa, per tria anni semetipsa singultum patitur. Ille vero nocturno dunesat invadit tempore, & primum vix omni hebdomade semel recurrit. At novissime singula nocturna

*Singultus
ciborum
natura.*

L. 4 veh-

vehementia infestat, ut in vicino conclavi dormientes singulorum agitationem auribus percipere possint. Notum etiam dignum est, quod si ipsa ab accenditibus uinistris excitetur, & corpus ipsius in lecto loco moveatur, cesset singulus: neque enim per diem incidit, licet sepius nimium indulgent epulis. Ceterum sana vivit; & quoniam graviora inde perimebat pericula, meum flagitavit consilium. Ego rebus probe pensatis, causam huius peculiaris pathematis plenariam ex mensium defectu iudicans, primo omnium sanguinis per sectionem venae in pede missionem administrandam duxi; deinde ad salutarem medium fluxum procurandum laborem & motum corporis sufficientem & frequentem pediluviorum tepidiorum usum, & circa novissimi temporis pilulas nostras polychrestas, & alternative essentiam succini probe tartarizatas, praestantissimi ad hunc scopum obtinendum usus, semel de die assumendam commendavi. Quorum remedium ope & auxilio etiam, ut audivi, factum est, ut virgo ab hoc malo liberata optime valuerit.

Episcopus.

Singulus tale est vitium, quod plures & diversi generis agnoscit causas; & compluribus etiam morbis tam acutis, quam chronicis esse afficiat. Quapropter quando Medicus recte & circumspiceat vel de eius eventu aut effectu, magis vel minus periculofo iudicare, vel ad hunc morbum, qui tanquam scire non mali quidpiam possit se relinquat, amolendum accommodatam vult medicinam praebere; opus omnino est, ut in eius causis paulo accuratius inquirat. In casu praesentis secundum Hippocratis sententiam à repletione, per quam plethoram, sive potius nimium repleta, a copiosius congesto sanguine, diaphragma vasa intelligo, originem traxisse censui. Et haec quoque fuit ratio, quare & venae sectionem, & mensuralem, per accommodata medicamentum purgationem excitandam suavi; non sine subsequente egregio levamine.

Dignum praeterea, quod observetur, in hoc casu esse phenomenon, quod per somnum vehementioris huius insubus facta fuerit accessio, & confectum per vigiliam cessaverit, cum alias singultuose & convulsivae hae passiones in somno & quiete conquiescere, per motum vero & vigiliam exacerbantur consueverint. Sed cum in convulsionibus asthmaticis idem sepius evenire videamus, non sine ratione colligimus, humorum & sanguinis stagnationem, quam somnus procurat, pro vera horum malorum causa habendam esse.

OBSERVATIO II.

Singulus, excolidus per opium diarrhoea.

Vir quinquagenarius, temperamenti cholericum, a multis annis arthriticis obnoxius, vino satius aliquando autumnali tempestate peregrinationem instituit; atque domum reversus, praevius totius corporis horrore, ac lassitudine, ad penitusque prostrationem, incidit in diarrhoeam. Quae cum multis iam ventris torminibus stipata esset; accitus Medicus praescripsit pulverem, qui corallia rubra preparata, cornu cervi usum, & laudani opii granum unum habebat. Remissione equalem intestinorum dolores; at pressio pede sequebatur singulus molestissimus, & cum vitium insigni pectura, perpenisue vigiliis, per

tres inharebat dies; adeo, ut mox per dimidium, mox totam horam, miserime discrucietur ægrum, summo vero insulo tepidiorum per unum alterumque horae quadrantem semper conquiesceret. Spernebat quoque cuncta, utut praesentissima remedia: tandem vero, dato, quod ex hordeo & cornu cervi compositum erat decocto, clysterem ex decocto raparum & oleo amygdalarum dulcium ano infundi; & praecordia cum abdomine, linimento spirituosum, ex aqua Anhaltina, theriaca, callore, croco, camphora, oleo nucis, balsamoque Peruviano confecto iungi, atque ligaturis constringi iussi; eo effectu, intra quinque dies aeger convalesceret.

Episcopus.

1) Discimus ex hoc casu, diarrhoeas non solum a colluvie acris, pituitosa, biliosaque, tunicae intestinorum vellicante subori posse: verum eandem non raro colubizae transpirationis deberi: ubi conversus humorum, maxime feroforum, motus ad intestina potissimum virgit; id quod in nostro casu horripilationes totius corporis praecedentes sufficienter evincunt.

2) Male igitur egi Medicus, quod hanc criticam veluti, & salutarem evacuationem dato protinus opiato remedio conspiceret. Inde enim vix aliter fieri ponit, quin materia acris ac violenta per metastasin ad alias nervosas partes, maxime sepi transversi, transferatur, ibidemque singultientes motus excitet; qui pertinaces, haud exiguum periculum, aequalem sanguinis circum per partes male affectas impediendo, possit se trahunt.

3) Itaque non aliae sunt indicationes, quam ut primum alvus ad pristinas secessiones invitetur; deinceps liberius perpirationi refinatur, & denique morus convulsi diaphragmatis compescantur. Priori scopo satiascimus clysteribus, qui pute demulcentes & oleosi, minime vero salini esse debent, ne villos intestinorum nimis vellicent: alterum explevimus per decoctum tepidius, quo hausto aeger sudavit egregie; & tertium obtinuimus illo praecordii unguento nervino, & adplicatis subinde ligaturis; quas in hisce casibus veteres quoque insigniter collaudant.

OBSERVATIO III.

Vir annorum L. temperamenti sanguineo-phlegmatici, obesus, per longum tempus insigni morore confectus, & per anni fere dimidium, nocturno insomni tempore, magnam extremorum refrigerationem passus est. In hoc rerum statu aliquando sine causa manifestum, insolita virium prostratione, languore, cliborunque fastidio predebantur: & quam insuper comita vomendi detineretur, dedit ipsi Medicus lenem emeticum. Quo summo sepius vomuit; & protinus tanta corporis debilitate, perpetuis vigiliis stipata, predebantur, ut lectum petere cogere, & quando erigere se volebat, animi deliquium incidere. Nullo de calore conquiescere; at tamen magnum ardorem circa superius ventriculi orificium periculiscebat, extrema frigebant, & sitis erat inextinguibilis, & haec ad septimum usque diem, veram febrem ardentem notantia, perdurabant: quo singulus vehementissimus accedebat, & per nycthemeron, paucis intervalis intermissis, inharebat.

Singulus, excolidus, per opium diarrhoea.

Tan-

Tandem præter omnem opinionem totius corporis convulsi accedebant motus; hique vix horæ quadrantem explentibus, frustra datis bezoardiis, confortantibus, & antispasmodicis, ex hac vita discedebat. Dissecto calavere, totum hepatis, cum quadam septi transversæ, ac ventriculi parte, nigro colore tinclum, corruptum, & sphacelofum adparebat: in venis & arteriis parum cruoris reperiebatur, lien vero sanguine crasso turgebat, & cor penitus erat corruptum.

Epiçrifa.

1) Singultum in hoc casu ab inflammatione hepatis, stomachi & diaphragmatis subortum fuisse, extra omne positum est dubium. Testatur enim hoc dictarum partium sideratio post mortem reperta; quæ semper præterentem habet inflammationem. Neque enim febris ardens aliam agnovit causam, quam partium interiorum inflammationem; cujus symptomata fuerunt sius inextinguibilis, & insynus interiorum ardor, extremis frigiditibus.

2) Docemur ex hac observatione, neutiquam securum esse debere Medicum; quando ægri absque causa evidenti de virium prostratione, adpetitus pæctum, agrypsia, pullus debili conqueuntur: hæc enim symptomata plerumque notabilem visceris absque corruptionem, & vehementem indicant malignitatem. Quæ cum in nostro ægrotante præfata fuisse videatur; non dubium est, quin datum emeticum, ad excitandam prius inflammationem, & sequentem febrem ardentem permultum contribuerit.

OBSERVATIO IV.

Singultus chronicus.

Vir quinque & sexaginta annorum, temperamenti phlegmatico-melancholici, obesioris habitus, nocturno tempore corpus sæpius frigori exposens, cibis crudis, fumo induratis, potaque cerevisiæ frigido uti solitus, somno longius, mortui corporis vero parum indulgens, ante aliquot annos singultu per quatuordecim dies durante, atque per acidulas Egranas remoto laboravit. Abhinc de continuo in regione lienis gravativo dolore conqueffus, tres ante mentes iterum incidit singultum, primum continuum, ac cum vomitu, aliisque fluxu stupatum, dein intermittentem, & post usum clysterum, fontis Egrani calide hausti, anodynorum, maximeque laudanij opiat, & massæ pilularum de cynoglossa, nec non venæ sectionis, intra duodecim dies conspiciunt. Elapso octiduo rursus recruduit, itidem cum aliquâ diarrhœa, & vomitu junctus, & adhibitis antispasmodicis mox conquievit, remanente quadam inquietudine. Verum non ita multo post rediit; accidentibus præcordiorum anxietate, dolore ischiadico, pulsu mox debili, mox forti, & inæquali, urina sedimentum mucosum, ex albo & rubro mixtum deponente, suffocationibus cardiacis, atque tussis aliquâ. Ordinavit Medici acidulas Egranas, cum sale Sedlicensi acutatas; elixiria stomachica, incidentia, resolventia, diluentia, pilulæque Beecheri: nihil tamen minus malum eo usque consummacerit imaret; & inde meum quocumque consilium desideratum est. Ego hoc malum ex ingenti ventriculi & intestinorum atonia, & depravata alimentorum digestionem, indeque flatuum producunt copia originem traxisse arbitrans sum; & hinc conject, non adeo

feliciter anodyna & opia ad delendum singultum fuisse administrata; cum potius hæc remedia atoniam augendo, malum exasperent; neque etiam adeo opportunum de acidulis bibendis fuit consilium. Ordinavi itaque usum liquoris mei balsamici, vitæ dicti, cujus unam cum tribus liquoris anodynij partibus miscui, & exteriori eodem abdomen inungendum curavi; quo ægrum insigniter levatum audivi.

Epiçrifa.

In senioribus, & qui sexaginta jam annos transgressi sunt, eadem causæ, quæ alias in ætate juveni vel virili formaliter sic dictam hypochondriacum morbum pariunt, qui spasmus & distensionum vehementia hypochondria, & in his latis partes infestat, cum alvo strictiori, vum & robur ventriculi & intestinorum magis deservendo agunt, & harum partium atoniam efficiendo, ob congestionem viscerum humorum, flatibus, boerborum, ructibus, alvi nimia laxitate molestias creant. Et ob has etiam causas singultus senili ætati familiaris est. Nam uti omnes convulsiones, ita etiam singultus vel ex nimia spastica strictura, quam Hippocrates inanitionem vocat, vel ex nimia atonia five humorum præternaturali congestione & infarctu, quæ repletionis nomine venit, oritur; ex quo intelligitur, perperam convulsivum species, si in senes incidunt, narcoticis, & opiat tractari.

OBSERVATIO V.

Generosus vir triginta & aliquot annorum, macilentioris corporis & sensibilibus animi, patre natus podagrico & hæmorrhoidario, ante sex jam annos doloribus podagricis subinde vexatus, superiori ætate ex iracundie affectu & refrigeratione incidit in tertianam cum vomina & insigni æstu junctam; post quartam accessione transmissa pulvere, qui ex cortice fraxini & chinæ concinnatus videbatur, paulo largius per vices tamen sumto, febris ex toto fuit sublata. Sex elapsis diebus admisso sub venatione, cui nimium indulget, frigore; consueto die & hora accessione febrilem rursus habuit, sed sine siti, sine vomitu, sine singulari æstu, sed horripilatione precedente & de anxietate & dolore gravativo & contrictorio præcordiorum, nausea, cum extremorum frigore & magna inquietudine conquerebatur. Insuper crebri & molestissimi singultus; alvus per aliquot dies nihil reddebat. Post quartum insulsum à me petiti consilium, prostrato valde animo, Ego horum malorum causam, sentinam viscerum humorum in duodeno stabulantem iudicans, maxime quia nec ante, nec post sumtum pulverem anisefebrem & cessantem febrem purgatus fuit, clysteribus & infuso mannato rhabarbario, extrinsecus caraplastis emolliente & carminativo, præcordiis applicato & spasmus sedare, & alvum aperire necessarium duxi, non omittis balsamici & stomachici. Quæ methodo feliciter cura expedita fuit.

Singultus post febrim tertianam.

Epiçrifa.

Notabile in hoc casu illud fuit phenomenon, quod loco formalis febris tertianæ, sylvini tan-
nummodo sine subsecente æstu circa præcordia, fin-

singultu admodum molesto ejusmodi orti fuerant; à materia febrili pulvere ejusmodi terreo adstringente, quasi fixata & firmius duodeni & ventriculi tunicis impacta. Erratum in eo maxime fuit, quod silente febre post sumptum pulverem, per epistemon purgatio, quæ tum summe est necessaria, fuerit omissa. Nam spasmi febrilibus per ejusmodi artificia sublevis, si non accommodata evacuantur, ad fontem febris, qui tantummodo cicuratus fuit, fortas ejusmodi offerantur, necesse est, ut si non redeat ipsa febris, alia perquam molesta afflictiones inde sequantur. Quam observationem juniores practici commendatam sibi habere debent.

OBSERVATIO VI.

*Singultus
in febre
terreo dithio.*

Vir XL. annorum melancholico-cholericæ complexionis, ad animi motus inordinatos valde proclivis, post vehementiorem iracundiam, frigidum assumptis haustum, & extrinsecus quoque corpus nimium refrigeravit. Incidebat in tertianam continuam, quæ demum in hemitritæam desinebat; accedebat septimo die singultus, sed lenioris gradus. Vires valde erant prostratæ, adeo ut etiam animi quædam defectio subiret, præsertim si in erecta erat statura. Pulsus erat debilis & frequens, omnibus remediis & à me & ab alio Medico, quem antea consulēbat, frustra adhibitis, die decimo quarto obijt.

Epistemon.

Singultum febrilibus biliosis tam acutus, quam intermittētibz non raro supervenire, haud novum in arte nostra est observatum: Sed hoc forsitan non omnibus æque notum, ejusmodi singultuosas afflictiones leniter & non sine magna concussionē corporis succedentes admodum periculosas esse. Sphaceli enim circa stomachum & diaphragma præsentiam jam subdiciunt, qui etiam post sectionem in oculos incurrunt. Ita etiam multos observavi, sinitibus ex passione cardialgica, vel colica, aut marasmo, decumbentibus, singultum demum accedentem certum mortis esse prænuntium.

CAPUT V.

De Morbis œsophagi & pharyngis spasmodicis.

THESES PATHOLOGICÆ.

§. I.

*Definitio
spasmodicæ
œsophagi.*

Rumor equidem in libris Medicorum mentio, de afflictu, quem *spasmus œsophagi* dicimus, injicitur, ad ille admodum frequens est, & non modo graviorum ægritudinum symptomata, verum etiam principalem, & ut vocant idiopathicum constituit morbum, ut ipsi merito peculiaris debeat animadversio. Definimus vero illum, quod sit *inveia ac præternaturalis, vel ipsius cibalis sibilæ, quam Græci *œsophagion*, nos gulam* appellamus, vel illius principii, *pharyngis* nomine denotati, vel denique utriusque, & hinc totius *œsophagi*, late sumti, contractio, aut rigida distensio à muco irritante plerumque præsejens.

§. II.

Hinc mox adparet horum spasmodorum differentia. Quemadmodum enim totus œsophagus ab anatomicis in principium, seu pharyngem, & reliquum canalem dissecitur: ita consulta experientia deprehendimus, illius spasmodum ratione loci diversum esse, & mox pharyngem solum, mox reliquum ac inferiorē gulam oblidere. Quibus tertia species accedit, quæ totius lē canalē, una cum principio, ac reliquis vicinis partibus, gravi laborat distensione.

§. III.

Omnes œsophagi spasmi, quacunque in regione contingant, hæc & inter se, & cum reliquis partium superiorum distensionibus, communia habent signa. Præstilo sunt extremorum, maxime pedum, refrigerationes; exterorum artuum tremores, ac rigores; alvine excretionis suppressiones; stantium ad superiora regurgitationes; imi ventris stricturne, dolores, murmura; præcordiorum angustia, vomendi conatus, cardialgia, urinae tenues, aquosæ, pallidæ, pulsus duri ac magni &c.

§. IV.

Speciatim vero pharyngis solius spasmi hisce se produnt notis. Deglutitio fit difficilis, dolore stipata, aut plane nulla, & nec solida, nec fluida transmittens: partium pharyngis coherentium, lingue, laryngis, atque totius colli rigida contractio, impeditus motus, ac dolor urgent; vixat suffocantia molestia, ac sensatio palii faucibus infixi, ac si quicquam inde vellet protrahere. Vox perit & hæc omnia sæpenumero per intervalla ædificunt, nec raro in universi generis nervosi convulsionē terminantur.

§. V.

Spasmodorum gulæ inferioris signa propria hæc sunt: Alimentorum libere deglutorum, quedam veluti subfistenter percipiunt in ipso gulæ tubo, maxime circa superius ventriculi orificium; præterit positus frigida obex quasi in iidem regionibus videtur; olivus, majorque inequus observatur conum haustulū contractio; calidi vero potus sæpenumero absque ulla impedimento canalem illum pervadere, & ventriculum ingredi percipiuntur. Dolor lentior in spina dorsii inter scapulas; jungitur non raro anxius vomendi conatus, mox inanis, mox cum ipso vomitu stipatus; nec infrequens est nausea, ac ructuum molestia explosio; & denique sæpissime muci limpidi per os coniungit rejectio, ab ipsa vomitione penitus distinguenda. Quæ symptomata, si cum iis, quæ priori periodo recensuimus, concurrant, totum œsophagi canalem ipsismo contractum esse testantur.

§. VI.

Quomodo vero hi afflicti, cum aliis œsophagi morbis, ob similitudinem symptomatum facie confundi possint; explicanda erit illorum differentia. Primum quidem, ipsius pharyngis ab ejus atonia & paralyti sunt distinguendi. Namque in dicta atonia, deglutiendi perpetua vixat difficultas, ita tamen, ut solida liberius deglutorum, quam fluida: conf. FORESTUS Lib. XV. observ. 30. Schel. hæc enim sapientia in asperam delabatur arteriam, & per os ac nares, summo cum suffocationis metu, regurgitant. In per-

*Differentia
spasmodicæ
œsophagi.*

*Signa
spasmodicæ
œsophagi
superioris.*

*Signa
spasmodicæ
pharyngis.*

*Spasmodorum
gulæ
inferioris
signa
propria.*

*Differentia
spasmodicæ
pharyngis
ab
atonia.*

perfecta paralyti, qualem TULPIUS *Lib. I. cap. 44.* allegat, omnis deglutitio aboletur, ut ægri fame perire debeant; simulque faciei pallor, & partium vicinarum magna mollescit, ac flacciditas præstilo sunt. Contra vero sub spasmo pharyngis, æqualis & fluida & solida deglutienti est difficultas, quæ per intervalla remittit; valorem faciei conspiciuntur incrementa, vultus rubor, partiumque affectarum rigor, sæpius dolor sentitur.

§. VII.

Facilius pharyngis spasmus discernitur ab ejus & faucium inflammatione sub angina; ubi fauces interne tument, rubent, ardore percuto uruntur, sitis est insignior, & gravis plicumque jungitur febris. Non minus Medico imponere valet tumor, excrecentia, aut frustum quoddam pharyngi inhaerens, aut laryngis pæternaturale vitium, ut prognatum inde deglutitionis impedimentum ipsam tribuat: videas FORESTUM *Lib. XV. observ. 28.* Hoc in casu candela cerea fascibus intra, aut instrumentum ab HILDANO *Cent. I. observ. 36.* depictum, hæud raro rem manifestabit: & præterea in ipsa pharyngis cuncta signa, collectum sunt, ceruamdem parient.

§. VIII.

Præterea ipsius etiam gule inferioris conveniunt cum aliis ejusdem affectionibus, & subsistentiam ciborum cum his commune habent symptomata. Tales sunt obstructio gule à frusto cibi solidioris ipsi impacto: Vid. *Casus, med. Scd. II. cap. 63.* & FORESTUS *Lib. XV. observ. 28.* dein tumores, excrecentie, fungi, verrucæ in canale œsophagi suborientes; conf. A. N. C. *Dec. I. anno IV. observ. 47. Decur. II. ann. VIII. observ. 96.* non minus glandulæ dorsales circa quantum dorso vertebrae œsophago adnatae, in præternaturalem dolorem elevaræ; quemadmodum VERHEYEN *anatom. cap. X. de œsophago,* & HEISTERUS *compend. anatom. pag. 183.* adnotant. Hisce in casibus subsistent eodem solidiores cibi, & revomuntur; potulentia vero & calida & frigida plus minus libere gaudent transire. Verum, si subsit ipsa modica contractio, notabile est, quod liberior sit fluidorum calidiorum descensus, frigidiorum difficilior; dolor est in scapulis; & alia concurrunt signa, ab obturatione œsophagi per quamcumque rem præternaturalem facta, utique aliena.

§. IX.

Quo vero causæ & ratio mechanica horum symptomatum adpareant: non alienum erit, fabricam œsophagi paucis perstringere. Ab ultimis nimirum fascibus incipiens canalus, quem œsophagum adpellant, latus & amplius in suo principio sortitur cavum, quod græcis pharynx, latinis infundibulum audit, & anteriorum lingue radici, ossi hyoidei, laryngique, retrorium colli vertebra archissime connectitur. Movetur variis musculis & dilatatoribus, qui elevar, dilatantque pharyngem, & contractioribus, qui eundem claudunt. Horum unum revera per existit, quod tribus originibus ab osse hyoidei, cartilagine cricoide, & thyroide exoritur, pharyngem circum circa amplectitur, & œsophagi, vel sphincteris gule nomine venit. Illorum tria potissimum sunt paria, primum ce-

phalo-pharyngæum, quod ab infima occipitis parte, & prima colli vertebra ortum, recta via in tunicas laryngis expanditur; aliorum sphæno-pharyngæum, quod a processibus otitis sphænoidei alaribus in latera pharyngis abiit; & tertium stylo-pharyngæum, quod ab apophysi ossium temporalium styloideæ, lateribus pharyngis inferitur.

§. X.

Finito pharynge, incipit canalus, inter asperam arteriam, & colli dorsique vertebrae primum recto, circa quintam dorso vertebrae dextroriam, & circa nonam leviorum flexo iungere; atque per medium thoracem, & musculorum septi transversii partem progressus, à regione undecimæ thoracis vertebrae, cum orificio ventriculi superiori unitur. Ipse tubus ex quatuor constituitur tunicis: externa membranacea, tenuis, vasculosa, atque cellulosa pleuræ suos debet natales, gulamque vicinis partibus adnectit. Altera carnea sive musculosa, fibris orbicularibus vel annularibus, hisque super longitudinalibus prædita: tertia nervea, ori, fasciculique communis, ac intra ipsum ventriculorum, ad trium digitorum spatium extensa, glandulis spisse obfusa, ad quas averfa parte vala quedam tendunt, ex quibus accipiunt liquorem, saliva pinguiorem, in gulæ cavum filantem. Quarta denique ac infima, lubrica mucagine obducta, villosa, ac multis emissariis undique cribri instar perforata est. Præterea cibalis hæc fistula innumeras sortitur glandulas, partim illas, que bombycum ovis longe minores, nervæam tunicam obident, facile conspiciente, si nervea tunica divulsa, carnes luci opponantur, vel gula in aqua maceretur; partim alias extra tubum positas; & quibus notari mereant dorsales, circa quintam dorso vertebrae gulæ adherentes, & thyroideæ, inter cartilagineas thyro-cricoidæam, atque œsophagum sita. Conf. VERCELLONI *disser. de glandulis conglomeratis œsophagi.* Neque vasis delituisse est hic canalus: arteriosa enim superior ab internis carotidibus, media parte ab aorta & intercostalibus, inferior à gastrica accipit; venas superiori parte à jugularibus, media à ramo sine pari, & inferna à coronariis ventriculi mutantur; nervosa denique à pari vago adpiscitur.

§. XI.

Pharyngis functio est deglutitio: cujus hæc est mechanica. Dum dorsum lingue ope musculorum myloglossorum, stylo-glossorum, & stylo-hyoidæorum ad palatum adplicatur; radix lingue, os hyoides, ac larynx musculus huic actioni servientibus anteriorum premuntur; pharynx vero posterior à contractis cephalo-pharyngis elevatur, anterior à stylo, & sphæno-pharyngis dilatatur. His harum partium actionibus, ante membranas, colli vertebrae & pharyngem cingentes, sub velo palatino, uvula, tonsillisque, & supra laryngem, atque pharyngem, amplius redditur spatium, majusque cavum: tum vero deglutienda, dorso lingue imposita, inter eam, & palati fornicem premuntur; & sic pressa, supra laryngis rimam, operculo cartilagineo seu epiglottide clausam, veluti per subiectum pontem, in cavum illud faucium propelluntur. Tunc actio antagonizaturur exipit: namque hæcenus elevata, anteriorumque compressa lingua, larynx, os ypsiloides præstima

Fibrilla
gule capite
nervæ.

Functio
pharyngis

Servituta
pharyngis.

restituuntur figurae: laryngis maxime cartilagineae explicatae ad pharyngem premant, hacque actione deglutienda, in cavo haerentia, ulterius pellunt: quae laxatis simul pharyngis dilatatoribus, contractoque oesophago magis protruduntur, & sic contractio rursus pharynge, sub hoc in cavo gulae haeret.

§. XII.

Foras gula effluit.

Tum excipit actio fistulae cibalis; qua haec per motum peristalticum, vi tunicae muscularis ipsi proprium, & a parte superiori deorsum naturaliter tendentem, assumta jam deglutita, & sub pharyngis sphinctere haerentia, ad ipsum perducit ventriculum. Namque dum haec tunica & dilatatione & contractione alternante, illa vi fibrarum longitudinalium, hac annularium peracta, oesophagum magis coarctat, mox dilatat; accedente huius in hominibus perpendiculari situ, quaecunque assumta sensim deorsum premuntur. Descensus hic facilior redditur, rore glandularum, assidue in gulam stillante, eamque lubricante; nec non ciborum resolutionem adjuvante. Protulsa ergo hac ratione ad cavum ventriculi alimentis, caro muscularis inferioris diaphragmatis, gulam ibi transeuntem stringens, hac parte stomachum claudit.

§. XIII.

Ratio formae infusae pharyngis, quae quaeque symptomata sunt.

His praemissis facillimum jam erit naturam ac formalem rationem spasmus pharyngis introspicere. Si pharyngem primum consideremus; mox patet ex ante dicta deglutitionis fabrica, quod ejus muscularis contractio, ea fieri vix possit; quoniam laeso organo, ipse actus laeditur. Dum poro musculi dilatatores, qui posteriore potissimum insundibili regione occupant, praeternaturaliter convelluntur, & antrosum magis in conglobatam figuram trahuntur: reusult sensus infixi faucibus palii. Quando vero muscularis oesophageus, una cum coherentibus laryngis, linguae & ossis hyoidei muscularis contrahitur; loquendi fit difficultas, & suffocatoria molestia. Quum vero omnium spasmus indoles sit, ut mox gravior, mox mitius infleat; patet etiam, cur ipsius pharyngis per intervalla exacerbetur.

§. XIV.

Spasmus gulae inferioris, quae quaeque symptomata sunt.

Pari modo, quam spasmus gulae inferioris, in tunica, quae ipsam ambit, musculari, ejusque fibrarum orbicularium aequae ac longitudinalium stricture violenter ponimus; inde omnium, quae ipsam comitantur, symptomatum rationem reddere poterimus. Dum enim in loco quodam vel pharyngi, vel ventriculo propiori, contractio obtinet; omnino deglutita alimenta subsistunt in eo canale; eundemque aggravando, inverso motu peristaltico revolvuntur. Si frigidus affluat potus, thore frigori solemni, spasmus exacerbatur; & aequae ut solida, in ulteriores descensu praepeditur: contra vero tepidiora potulenta, demulcendo fibras spasmus strictas, libero in ventriculum gaudent minere. Porro oesophagus variis ligamentis, colli dorsique vertebrae connectitur; hinc illo contracto, dolor ad membranas dorsi vertebrae cingentes propagatur, necesse est. Inde liquet ratio doloris, qui inter scapulas in nostro affectu sentitur; de quo FORESTUS Lib. XV. observ. 31. scilicet, dicit: *Omnis oesophagi dolor in spinam*

dorsi invadit, in quam gula quoque reclinat & adhaerescit.

§. XV.

Quaecunque causae vel pharyngis musculorum, vel tunicae oesophagi carneae vellicare ac stimulare valent; illae bonum spasmus mediatum dicuntur. Quemadmodum vero illae causae, vel immediate in eas, quae sedem morbi constituunt, partes; vel in alias remotiores agunt, à quibus illae per consensum afficiuntur: ita spasmus ille sunt vel *idiopathici*, vel *symptomatici*. Quod si igitur ex larynge primario convulso, ex ventriculo, ex intestinis, aliisque partibus, spasmus ad pharyngem, atque gulae canalem defertur, audit ille symptomatikus.

§. XVI.

Ex causis itaque, spasmus oesophagi idiopathicos inducentibus, praecipuum locum sibi vendicant animi pathemata; itaque prius gravis exacerbatio, maxime si paulo post largior potus frigidus assumatur. Inde convelli pharyngem, & hinc laedi deglutitionem, observatione quadam inferius comprobabimus. Ex eadem vero, praesertim inter passum, gulam quoque inferiorem contrahi, atque deglutitionem bolum in ea obhaerescere, nec non vomitu saepius reddi; quotidiana innotescit experientia, ut hinc querelas audias: *Es ist mir vor Aergeris der Bissen in Halfe stecken geblieben.*

§. XVII.

Peculiarem in ciendis gulae, maxime inferioris, distentionibus potentiam obtinet salicidium; adeo, ut hoc absque dicto oesophagi spasmus contingere nequaquam possit. Quod si enim huius effectus, attentioni animo consideremus; docet observatio, sub ea 1) menti ideam rei alicujus ingratae suboriri; 2) ejusque aversionem; 3) hanc insequi vel deglutitionis impedimentum, ut dicant: *Sie möchten kauen, wie sie wollten, sie können es nicht hinunterbringen.* 4) Vel assuetorum in oesophago subsistentiam, & stricture sensationem, quam expriment: *Es sehe ihnen auf der Brust, und drücke sie.* 5) Deinde jungi nauseam, quam significant: *Es wird mir so übel, so vericklich, und bange ums Herze.* 6) Haud raro accedere vomitum, & 7) ipsius animi defectionem. Si ergo salicidium definitum dicere, quod sit adversa rei cuiusdam ingrata idea, cum spasmus oesophagi, & ventriculi conjuncta.

§. XVIII.

Ad pertinaces oesophagi spasmus, cum insigni aversione ligatos, sola sapientia imaginatio disponere solet. Notabilis hinc est observatio, quae in A. N. C. *recuer. VII. observ. 61. pag. 125.* legitur, quod mulier quaedam per omnia sana, atque robusta, nec hysterica, nec spasmoticis adfectionibus obnoxia, omnis quidem generis & eiculentia, & potulenta, absque ulla difficultate assumere valuerit; simulac vero hostiam capere vellet, non solum ab ea insigniter abhorreretur, verum etiam, licet summa vi interusa ac deglutita fuerit, eandem tamen in ventriculum non pertingentem, sed in gula persistentem vomitu reddiderit. Nec dissimilis casus exstat in iustem A. N. C. *dec. III. anno I. observ. 79.* de viro, qui ex nimio tabaci usu, deglutitionis ac descensus ciborum illud incurrit impedimentum, quod pro

Differencia spasmus pharyngis in idiopathicum, & symptomatikus.

Causa spasmus pharyngis sunt 1) animi affectus.

1) spasmus pharyngis.

2) Imaginatione foras.

pro ratione imaginationis mox fuit levius, mox gravius.

§. XIX.

Eundem affectum progenerare valent medicamina, ac assumta acris, planque venenosa; quæ vellicando eas nervosas ac mulculosas partes, eandem stricture inducunt. Sic HOECHSTETERUS mentionem facit adstrictiōnis gulæ ex potu vini Malvatici, in quo radix consolidaæ majoris infusa fuit *obf. der. III.* Eo magis hoc contingit, si assumta caustica fuerint, ut adeo non mirum sit, quod juxta FORESTUM *Lib. XI. obferv. 30.* puer quidam ex aquæ foris haustu, insignem pharyngis occlusionem, cum ipso suffocationis metu incidit. Præsertim mercurius sublimatus ejus est indolis, ut gravi faucium constrictione, sui assumptione prodac; vid. FORESTUS *loc. cit. pag. 150.* Vellicando quoque gulæ inferioris spasmus excitant insecta deglutita: id quod adfirmat, de sanguifugis cum potu assumtis RHASES *Lib. IX. ad Alimant. cap. 56.* & RHODIUS *obferv. enu. II. obferv. 72.* de laceris fauces irrepentes GESNERUS *Lib. II. de hist. anim. C. de laceris.* de pediculis devoratis HEURNIUS *de morb. cap. 7.* de anguilla viva deglutita PLATERUS *Lib. II. obf. &c.*

§. XX.

Præterea spasmus & pharyngis, & gulæ inferioris, produci potest, à cruce vitali in iis partibus flagrante, valaque dissendente; quarum distentionum, fidissimus comes est spasmus. Tali ratione huic morbo obnoxii non raro sunt hypochondriaci, in quibus vi spasmorum ac fluctuantium intestinalium, crux vitalis ad superiora compellitur, facileque stagnat in œsophago. Cumprimis ex universali humorum, maxime serosorum, dyscrasia id viti contingere potest, si nimium liquor ille lymphaticus, quem tot glandulae in gulam secretant, fuerit viscidus, & acris: quo in casu multum mucii viscidus excreatur, cum mali levamine. Quorsum pertinere videtur exemplum a WEPFERO *obferv. medic. pract. obferv. 117. pag. 531.* recensitum, quod viro cuidam septuagenario assumta in media quasi persisterint gula, & eo usque adfluxerint, donec vomitu fuerint reddita.

§. XXI.

Vi consensus, quem gula cum ventriculo, & intestinis fovet, ex horum vitio gulæ spasmus suboriri potest. Sic ex saburra acris, acida, biliola ventriculi & intestinorum, id mali facile generatur; uti de lacte in ventriculo concreto testatur FORESTUS *Lib. XVIII. obferv. 13.* Vermes in ventriculo, vel intestinis hospitantes, ad eundem affectum contribuere, auctores sunt HERCULES SAXONIA *præf. pract. Part. II. cap. 7. §. 4.* & HENR. AB HEER *obf. 16.* & THONERUS *Lib. II. obf. pag. 94.* In ipsa rubrum explosione, atque vomitu concurrunt spasmus œsophagi: nisi enim hic sua actione, & peristaltici inversæ, ejectionem humorum à ventriculo secundaret; fieri nulla ratione posset, ut tanta cum celeritate & impetu per superiora ingens sape humorum copia ex ventriculo, imo intestinis, exturbaretur.

§. XXII.

Per consensus quoque variis nervosi generis spasmodicis ac convulsivis affectibus jungi obstat. *Frid. Hoffmanni Oper. Tom. III.*

varius spasmus œsophagi. In suffocatione hysterica semper fumena colla ac faucium coarctatio, & constrictionis quidam sensus, non secus ac si laqueo injecto fauces præcluderentur, percipi docet experientia. Vid. ETTMULLERUS *Oper. pract. P. II. Sect. III. cap. 3. pag. 963.* & HELMONTIUS *tract. de asthma & tuss. §. 31.* Gulæ porro constrictionem viri colica convulsiva, quam *der Männer rechte Colique* vocant, laborantibus evenire, non rarum est; & notari meretur singularis casus, quem de colica gravem cephalalgiam ac maniam cum cæcitate & impedita deglutione inducente refert HOEFERUS *in Hercule medic. pag. 185.* Non minus ipsæ epileptica ac convulsiva accessiones hoc secum vehunt symptoma, ut vel difficillima, vel nulla plane solent esse deglutitio: quemadmodum præsertim in incubo observare licet, ubi præter strangulationis sensum, linguae impotentia & deglutionis impedimentum adiunt. Idem vitium opisthotono familiare est; quemadmodum ex casibus de his morbis à FORESTO *Lib. X. obferv. 112.* & 113. recensitis liquet. Nec denique omittendi sunt morbi acuti, præsertim febres malignæ, quibus non modo deglutionis difficultas, verum etiam gulæ inferioris constrictione jungi solet, quam exprimunt: *Es stecke ihnen im Halße, und wollen nicht herunter.*

§. XXIII.

Paucis adhuc meminisse juvat nausæ, quæ nihil aliud est, quam convulsio œsophagi levior, cum inverso ejus motu peristaltico, & hinc pendente vomituritione, quin vomitu, aut saltem lymphæ plus minus viscidæ ex gulæ glandularum reiectione sæpius stipata. Pro causa occasionali agnoscit omne id, quod vel ipsum œsophagum, vel tunica ipsius nervæam, in ventriculo prolongatam ibidem vellicare potest; ex quo hæc constrictione per consensus ad gulam propagatur. Deprehendamus generatim 1) nauseam, plerumque nunciam esse insipientis vomitus, 2) omnem vomendi conatum, ac cardiacalgiæ committari, 3) absque iis cum frequentu mucii limpidi, qui nihil nisi lymphæ ros ex œsophagi glandulis vi spasmorum expressus est, reiectione sæpius occurrere; & non raro ventrium in primis viis hospitantium præsentiam indicare. 4) Plerumque alias ventriculi cruditates consequi; quæ cum jejuno ventriculo sunt aciores, tunc potissimum nauseam movent, sumto cibo delinquent. 5) Antecedere graviores capitis affectus, vertigines, apoplexias, animi deliquia, maxime si per consensus ex ventriculi officio ortum trahunt: ubi quædam veluti aura ex stomacho ad caput adspirare videtur; ut has non raro audias quætelas: *Es wird mir auf einmal so übel;* & paullo post: *Mir wird so grün und gelb vor den Augen;* tamque attoniti consunt, sensumque privantur exercitiis. 6) Ex eodem fundamento nausea sollicitas, hypochondriaci, aliique morbis, quorum fontes in primis officiis existit, laborantes. 7) Denique in principio malignarum febrium accedere plerumque solet nausea; quam describunt: *Sie wissen nicht, wie ihnen sey, es wäre ihnen so übel und bange wie Herze.*

§. XXIV.

Quod prognosin attinet, haud insuper habendi sunt spasmus pharyngis idiopathici; quoniam accedente præsertim mala masticatione, in con-

M

turnus

tumorem degenerant habitum. Qui ab affluuntis acrioribus proveniunt, periculo non vacant, motumque faciunt inflammationis: & qui hystericae saepius invadunt praesagium apoplexiam. In vulneribus, si ex convulsione acida laesa deglutitio, malum, teste ETTMULLERO *Oper. pract. anat. I. pag. 57.* Notabilis quoque est HIPPOCRATIS aphorismus, dum *aph. 35. Sect. II. Si febre, inquit, detento repente collum interqueant, in vis deglutire quati, nullo existente tumore, lethale est.* Si affini gulae inferioris, ex iracundia inter epulas provocati, viam cholerae, febrilique biliosis facile sternunt: & qui, universali humorum dyscrasia, nervosique generis debilitate nituntur, chronicum malum constituunt, cum insequente corporis talem. Nausea in malignis sub initio accedens, robur naturae indicat: in posse vero maxime perniciosa existit, teste FORESTO *Lib. XVIII. obs. 14. Schol.*

C U R A T I O.

§. I.

*Inflammatio
non curatur.*

Quum spasmus oesophagi, sive in pharynge, sive in media gula obhaereant, neglecta temporis opportunitate, non modo in chronicum statum transeunt, verum etiam denegata alimentae capiendi facultate, facile tabem post se trahere possunt: digni omnino sunt, qui tempestive congruis adminiculis oppugnentur. Hae vero ex his positionum fontibus desumuntur, quorum alter remedia spasmum sedantia; alter vero talia, quae causis eo contribuentibus removere possint, praebent.

§. II.

Extemporanea curatio.

Prior finis obinetur per antispasmodica, & anodyna, diacurientibus iuxta, tam interna, quam externa. Quo autem gravior est constrictione, eo consiliis est ab extenuis curam ordiri: quoniam interna sine maxima difficultate, vix degluti possunt. Ex his quodam sunt, quae ad fluxum humorum ad inferiora derivando, & circulum sanguinis aequalem reddendo, spasmum frangunt: quosum pertinent hyssopus ac pedicularia. Illi ex emollientibus, additis mborantibus parati, & bis terve iterari; hae tepidiora, immixtis paulo profundius pedibus, adhiberi debent. Quae autem localia ad ipsam afflictam partem adhaerere possunt, sunt scire linimenta paregorica, finalique nervina: quae parari possunt ex aqua Anabathina, spiritui salis ammoniaci, essentia croci, nucis, castorei & camphora, balsamum quoque vitae, idque, vigente morbi impetu, liquore anodyno minerali permixtum est quoque egregium. Quod etiam paucis guttulis saccharo excoctum, & in ore detentum, aut lente deglutitum operae faciet pretium: quo etiam sine theriaca aliquot granis sub lingua detentumque rursus redita, laudem meretur. Nec denique in relaxando spasmum destituitur fructu vesicae bovinae, decocto emolliente calido plena, & affectis locis admota.

§. III.

*Interdum
non proficiunt.*

Ex internis antispasmodicis laude digna sunt, olea amygdalarum dulcium, olivarium, cum spermatum ceti remixta; pulvres antispasmodici, ex cinnabari, pulvere Marchionis, succino preparato, extracto croci & castorei parati; vel qui ha-

bent nitrum, & unum alterumque camphora prae-
num; nec non liquor meus anodynus vel solus,
vel cum essentia castorei, spiritu bezoardico Bulfii, aut comu cervi succinato remixtus, aut spiritus nitri dulcis, cum paucis guttulis olei chani-
meli veri, vel macis maritatus. Quobis in statu
magis chronico cum fructu alterius circiter dictis
inserponitur pilula antispasmodicae, quae ex
tracta millefolii, chamomillae, hyperici, mithrida-
tio, extracto croci, castorei, oleoque destillato
macis vel menthae parare solet.

§. IV.

Soporis paululum spasticis, causis materialibus
obviam iturus, circumspiciat, quanam earum in
culpa sint. Quod si enim assumpta acris, venena,
purgantia ac emetica drastica malum produxerint:
in principio statim eorum vis obtundenda mucila-
ginosis, oleosis, ipsique lacticinis: quare profunt
juicula valde pinguis, aquae tepidioris lautius ad
nauseam continuatur, ut subroto leni vomitu, ven-
enenum rursus expellatur. Interdum acida vim ven-
eni castrant; quibus gulae confractionem, a sum-
to vino Malvatico cum consolida cocto lubrotaria
curas se perhibet HOECHST ETTERUS *Idem
supra citato:* eandemque a potu aquae fortis natam,
mucilagine cotonaeorum feliciter sanavit
FORESTUS *loc. cit.*

*Causa
mali ab
essentia
venenalis
est.*

§. V.

Quando vehementior exandescens inter ip-
sum passum, gulae spasmum insens; bilis plerum-
que effusio in ventriculum simul contingit. Quo
in casu praeter motuum sedationem, bilis contem-
peranda est, ne corrosivam ac violentiam acquirat
indolem, tumore blandis emeticis, vel cholagogis
exurbanda. Temperant vero bilem aborbentia,
ac mucilaginosi, ut decoctum avenae vel hordei:
eliminant optime mannata, rhubarbarinis iuxta,
vel per vomitum, eadem cum uno alteroque tartari
emeticis grano acutata, aut radix ipecacuanhae.
Sed cavendum, ne mox ab his sumatur purgans,
aut emeticum.

*Spasmus
gulae ab
essentia
venenalis
est.*

§. VI.

Quod si vel totius humorum massae dyscrasia, sive
vel maxime primarum viarum colluvies acris ac
viscida, diuturniori gulae spasmum viam straverit:
earum impuritas & correctioni & evacuationi,
illi quidem per incidentia, resolutiva, dig-
gestiva, absorbentia, huic per mannata, rhubar-
barina, pilulaeque balsamicae peragenda, omnis
opera navanda est. Quam autem valde perni-
ciosa ac rebelles huic curationi saepius visde malum;
non praestantius aquis medicandis erit medicamen-
tas inter Sollicentes aquae per quatuor circiter
dies potae, & his subjunctae Egranae maximam
merentur laudem. Non minus in hypochondria-
cis, ubi simul sanguineae excretionis, per ute-
rum, vel haemorrhoides sunt cohibita: praeter ve-
nae sectiones, motum corporis &c. theriacae Ca-
rolinae decenter usurpatae omnem curandi pagi-
nam absolvunt.

*Spasmus
gulae ab
essentia
venenalis
est.*

§. VII.

Nausea, quae ab acerbis, acidis, viscidis pri-
marum viarum iordibus originem ducit, eandem
quam bevi ante recensimus, exigit curatio-
nem. Egregiam praesertim utilitatem praestant in-
sulsa ex herbis & radicibus resolutivis, aroma-
ticis, & evacuantibus parata vinosa. In nau-
sea

*Nausea
curatur.*

fea cum oris amaritie stipata, commendat GABELCHOVERUS *Cent. I. cur. 14.* radicem armoraciz cum vino Rhenano infusam, & omni mane haustam. Si ab assumpto foetido, fœdiorque cibonausica cum fastidio surrexerit, aut vomitum ciere juvat, aut cortices citri vel aurantiorum masticare, vel vino generoso uti. Quando inter grassantes febres malignas, quidam circa manifestam causam, nausea corripitur: tum flatum lenè vomitorium, ex radice ipecacuanhæ granis quindècim propinare convenit: quo sæpius fit, ut exturbato contagio, aut ipsa febris prævertatur, aut saltem in suo decursu reddatur mitior atque benignior.

§. VIII.

Cura spasmodicorum œsophagi chronicorum.

Curatio spasmodicorum œsophagi chronicorum, qui nervi generis debilitate niuntur, ac crebro recurrunt, magis dieteticis, ac alimentis, quam pharmaci potentioribus absolvetur. Seligenda scilicet pro potu ordinario tum sunt decocta, ex scorzonera, cichoreo & cinnamomo parata; vitanda cerevisia omnis; parce bibendum vinum generosum. Victus esse debet facilis, parvus; frequentior contra exercitatio corporis. Roborandum ventriculo inservient elixiria balsamica, absque spiritibus parata menstruo: sanguinis abundantia, flata ejus missionibus imminuenda; & sordium in primis officinis generatio, blandis laxantibus præpediendi. Cumprimis animi affectus, nutrices spasmodicorum, omni studio fugiendi; & denique fontes Carolini, subjunctis balneis Torpescensibus in usum vocandi.

CAUTELE PRATICÆ.

§. I.

Cautela circa pediluvia.

Qui in spasmo œsophagi sopiendis, ad detrahendum à superioribus humorum affluxum, pediluvia uti velit; videat, an pedes nimis sint frigidi: tum enim pediluvia ad tempus differre juvabit, atque pedes primum friccionibus, ac suppositis illis lagenis aqua calida plenis probe fomentare. Quod etiam de venæ sectionum usu tenendum est.

§. II.

Circa utrumne sectetur.

Si faucium constrictioni, rubor faciei, vasorum inflationes, & magnæ arteriarum capitis pulsationes junguntur, ob imminens apoplexia metum, vena est secanda. Ubi porro hysterica vel hypochondriaca symptomata, ac suffocationes veluti sunt præsto; iidem sanguis mittendus; sed neutiquam in brachio, potius vero in pede, siquidem paroxysmi inde exacerbantur.

§. III.

Circa repel-
lenda in spas-
mum gastrici.

Quando spasmus gulam magis inferiorem obfidet; linimenta ac externa cuncta non tam pectori ac præcordiis, quam potius spinæ dor-
si sunt applicanda: id quod præferunt JOH. LANGIUS *epistol. medic. Part. II. epistol. 43. pag. 178. ex Aëlio, Galeno*, & experientia demonstrat. Namque cum œsophagi canalis, immediate cum spina dorso connectitur; vis remediorum, huic illorum, eo certius ad illum penetrabit.

§. IV.

Topica in

In paroxysmis suffocativis hystericarum, ubi
Frid. Hoffmanni Oper. Tom. III.

semimortuæ jacent, ad eas excitandas, insignio-
nis usus fuit, præter clysteres, graveolentia, vo-
latilia oleosa, callosa &c. naribus applicata,
aut plumæ perdicam, aliaque foetida accensa:
quippe quæ motus effrantes consopendi, egre-
giam vim habent.

§. V.

Ad exasperandum, & magis confirmandum
tam pharyngis, quam gulæ inferioris spasmodum,
nihil magis contribuit, quam vehementiorum
purgantium usus. Præstat his semper blanda la-
xantia, mannata, rhabarbarina, balsamica; aut
concurrentibus flatulentis, clysmata oleosa &
carninativa subungere.

§. VI.

Quæ febribus acutis supervenit, faucium con-
strictioni, præter conveniens regimen, medicinis
antispasmodicis, & anæpilepticis sublevanda erit:
quo spectant pulvis Marchionis, nitrum cum
camphora mixtum, tinctura bezoardica Michaelis
cum mixtura simplicis maritata &c. Opiata
enim & crassiora adstringentia his in casibus, vene-
nenti instar se habent.

§. VII.

Idem symptoma, si vermibus, primas vas ob-
sidentibus, easque vellimentibus jungitur, non ces-
sabit, nisi his eliminatis. Tum vero cum purgan-
tibus caute mercandum est: & si mercurialis ex-
hibeantur, protinus superbibere juvat oleum
amygdalarum dulcium, ne intestina ab illis ni-
mium vellicentur.

§. VIII.

Quandocunque adstrictio œsophagi tanta fue-
rit, ut vel nihil alimentorum transmittat, & jussu
medicorum inhaerescat: tunc, ne conascant ægri,
ano infundere convenit clysteres lacteos ac nutri-
entes, de quibus videas LANGIUM in *epistol. medic. Lib. I. epistol. 80. pag. 361.*

§. IX.

Ad convulsivos œsophagi motus, cumprimis
pertinet pectoris clangoræ concussiones, quæ ter-
renis infantibus inter epilepticas affectiones even-
nare, & vulgo pro singultuosis commodioribus
venditari solent. Re autem vera nihil sunt aliud,
quam convulsivæ œsophagi, & vicinarum partium
concussiones; & plerumque tristes sunt nun-
ciæ, cum morbo ad extrema ventum esse. Medi-
co tunc nihil superest, quam ut blandis anæpilep-
ticis, anodymis, & anæstheticis pugnet, instan-
temque mortem præcuniet.

ENARRATIONES MORBORUM.

OBSERVATIO I.

Verbi quidam divini minister, ab obitu uxoris
tristissimus semper, cum hypochondriacis spas-
modicis moribus, caput potissimum in con-
sensum trahentibus, obnoxius, tanta subito pec-
toris, gulæ, laryngisque constrictione prehende-
batur, ut nec vocem edere, nec spiritum trahere,
nec deglutire quicquam valeret, insuperque
velut attonatus prostermeretur. Ab hac vero ac-
cessione media nocte invadente, per sponte se-
quutos copiosissimos sudores proflus liberatus;
eandem tamen sequenti mane post assumentum ca-
lidissimum Thee bois potum rursus incidit: &
M 2 quan-

quamquam variorum externorum usu adminiculorum, ad rationis integritatem mox rediret, retinuit tamen & loquendi impotentiam, & deglutendi, spirandi summam difficultatem. Adipiscitis venæ sectione, frictionibus, spiritibus nervinis, theriaca sub linguam posita, masticantibus, interneque, quantum fieri poterat, datis anodynis, tenacissimus, ac copiosissimus mucus non ore solum reddebatur, verum etiam non quidem vomitu, sed anxio tantum vomendi conatu, *mit einem erschrecklichen Würgen* eructabatur. Laxatis hiæc per septem horas confractionis lingue vinculis, sermone quædam rediit facultas, ipsaque pharyngis rigida detentio aliquantum soluta fuit, ut liberius deglutire valeret: spaciosus tamen gulæ inferioris, & pectus angustia adhuc adeo urgebat, ut deglutita in ipso œsophago stagnare, nec ad ventriculi cævum pertingere posse viderentur. Nec vero ulla medicinae, nec antispasmodici pulveres, nec anodyni liquor, nec pediluvia, nec sperma ceti in oleo amygdalarum dulcium solutum, nec alia quicquam opus adferre valebant. At enim vero, cum camphoræ dno scrupulū, in oleo olivarum soluti, ex errore uno haustu assumerentur: fontica quidam insequantur symptomata: æger vero ab omni confractione faucium, brevique post a toto morbo liberatus fuit.

Epicrisi.

Ferax est hic casus nullius observationibus; quarum has notabimus.

1) Morbus hic generatim apoplexiæ levioris nomen meretur: quæ pro causa nullam nec sanguinis nec feri extravasationem agnoscit, sed sola spasmodica ac rigida detentio, nervosum in cerebro, & circa nervorum principium situm, nec non vicinarum oris, lingue, faucium, laryngis, œsophagi, totiusque sæpenumero pectoris partium absolvitur. Hæc vero debetur humorum crassiorum, plus minus viscidorum ad dictas partes congestioni & stagnationi: quare relaxato spatio, mucus viscidus expulsi, ac è gula eructatur. Atque talis apoplexiæ species hypochondriaci admodum familiaris est; & hæc hypochondriaci spasmodica appellari meretur.

2) Confractione in hoc affectu fuisse pharyngem, musculos lingue, ossis hyoidis, ac laryngis, vel loquendi impotentia, spirandi ac deglutendi difficultas indicant. Confractione autem canalis gulæ inferioris, & ipsius superioris orificii ventriculi, ex assumentorum libere deglutorum in medio œsophago subsistentia patet.

3) Obortis sudoribus, remittunt spasmodicæ confractiones, à particulari humorum congestione factæ. Sub illis enim æqualis succorum per totum corpus redditur circuitus; qui nondum sopitis spasmis, fieri nequit.

4) Sumto potu calidissimo rediit paroxysmus. Quemadmodum enim magnum frigus nervos vehementer afficit, & ad spasmos proritat; ita etiam nimius calor, vellicando nervosa œsophagi ac faucium tunica, ad easdem dispositiones mollescit.

5) Adhibita remedia non contemnendi sunt usus: præsertim autem camphoræ tam inusitata dosi usurpata effectus est peculiaris. Illius virtutem antispasmodicam, tutam, & ab omni commotione, uti vulgo creditur, vacuam, peculiari dissertatione de usu camphoræ interno

jam demonstravi; & asseverare certa fide possum, quod id remedium generis granis circiter duobus cum nitro permixtum in distendiendis humorum stagnationibus, ad superciliem pellenda sudorilis, & extrinsecus, atque relaxanda internam partium confractionibus divinæ sere fit virtutis.

OBSERVATIO II.

Vir quidam admodum biliosæ constitutionis, *Spasmus* ex nimia iracundia, & perperam insuper datis *Pharyngis* medicinis, post præviis quasdam adflectionibus, in gravem demum incidit pharyngis confractionem, & præsertim diarrhoeam bilice possilum notis manifestam: Per intervalla accessit magna deglutitionis difficultas, & molesta palii faucibus infixi sensario, qua simul percepit, ac si quid ex ore foret ejicendum, ac veluti proferpere vellet, ut eam Medicus cum agrotante putaverit, vermem ita residere & sum asseverare exitum, atque ideo multa anthelmintica, & succum citri ordinaverit, quem æger insigni quantitate devoravit. In accessione partes extremæ, sub æstate etiam calidissima, valde frigecebant, & quandoque contremiscebant: malum ab admisso frigore semper ingravescebat; alvus ~~est~~ sicca & obstrueta, abdomen flatibus distentum, appetitus & somnus valde exigui, pulsus durus, urina limpida, insignis ad iram propensio; horumque omnium ab assumto quodam purgante summa exacerbatio. Consultus ego, morbum hunc, jam ultra tres menses durantem, oppugnatum, ordinavi per potu decoctum temperatum, & in illo nonnunquam cochlear unum olei amygdalarum dulcium forberi jussi. Tum pilulas præscripsi antispasmodicas, quas f. III. superius recensui, easque quotidie sumendas fusi: præbui etiam mixturam ex liquore anodyno, oleo chamæmeli vero, abstinui, & de cædro, bis quotidie capiendam; nec non pediluvia, & externam faucium & œsophagi cum balsamo meo vitæ inunctionem commendavi: quibus factum est, ut intra paucas hebdomadas æger convalesceret.

Epicrisi.

1) Spasmus pharyngis, quem & deglutitionis impedimentum, & palii faucibus infixi sensario producit, in nostro casu debetur vehementi exandescencia, & perversæ medicationi: siquidem purgantibus vehementioribus, ac spirituosius tractatum fuisse ab initio morbum percepit. Jam vero notissimum est, & iracundiam, & purgantia per spasmodicas canalos magni alimentarii, qui œsophago, ventriculo, ac intestinis absolviunt, confractiones suam edere effectum: qui in præsentis casu circa pharyngem præcipue sese exierit.

2) Hanc Medicus, vermem, quem subesse putabat, occisurus, cum multis irritantibus, anthelminticis, ac acidis, magis augeret, ac confirmaret; aniam quoque præbuit, ut per totum corpus propagaretur, & extremorum frigus, alvi adflectionem, urinae limpida mictionem, pulsusque durum post se traheret. Testatur quoque hic affectus spasmodicam suam indolem, 1) eo, quod per intervalla redierit, & 2) sub illo animus valde sensibilis, & ad iracundiam facillimus fuerit redditus: quæ duo momenta spasmodicis morbis semper sere sunt propria.

3) Mo-

3) Meretur hic pharyngis spasmus vocari idiopathicus; quem semper in constrictione musculorum dilatatorum pharyngis, quæ sensum globi in faucibus producit, collocandum esse putamus. Tum enim vicinæ partes, lingue, os hyoides, & larynx ipsius vacuitate plerumque gaudent; quare in ejusmodi casu, nec lingue impotentia, nec suffocationis ac laryngis constrictionis notæ adfunt. Contra vero symptomata vocamus, qui has vicinas partes, & in pharynge œsophageum item musculum tenet contrictum; unde quidem deglutitio æque ac in idiopathico difficilis est, at nulla pelli sensatio, quoniam dilataturæ à constrictione liberi sunt. Quomobrem si hunc casum cum præcedente conferamus, in hoc idiopathico, in illo symptomatico pharyngis spasmum offendemus.

4) Curatio solis antispasmodicis, & flagrantibus in pharynge humores discutientibus, ac derivantibus, adomanda est. Prioris generis remedia sunt pilulæ, & mixtura anodyno-roborans; alterius balsamum vitæ extrinsecus illitum; & tertii pediluvia: quorum ope in hisce casibus, ubi magis vinum motum, quam humorum peccat, tantum non semper voti potiri licet.

OBSERVATIO III.

*Spasmus
gulæ
superioris,
&
ventriculi.*

Vir LXV. annos natus, strictioris habitus, & valis capacioribus instructus, ex hæmorrhoidum suppressione, aut ad minimum irregulari fluxu, variis hypocondriacis molestiis, per aliquot annos sollicitatus, ventriculi post assumptionem parvissimi etiam cibi inflationem, alvi obstructionem, quandoque profluvium, ad potentiam fere caninam, doctisque cruciatus toleravit. His demum omnibus, ea supervenit adflictio, ut libera quidem deglutitione cibos potumque devoraverit: cum autem ventriculorum vellent ingredi, in œsophago quasi vinculis constructio hæreret, nec ulterius progredi possent viderentur: ea tamen differencia, ut calidius in canale intestinorum stagnatione, horum, ventriculi, & œsophagi spasmum derivandum esse putarem, ordinavi ad sanguinis progressum æqualem reddendum, infusum thesauri ex herbæ salviæ, veronicæ, summitatibus millefolii, floribus chamomillæ, semine fœniculi, & aniso stellato confectum, maneque bibendum. Præbui pilulas meas balsamicas, quovis tertio die capendas; acque pulverem, qui habebat radicem ari, pimpinellæ, cornicem cascariæ, cinnamomæ, succinum præparatum, sal tartari, nitrum depuratum, & oleum de cedro, circa prædandi tempus sumendum dedi, non minus liquorem anodynum, essentia callosæ nuptum per vices proximæ fluctuantis chyliferis oppugnavi, rectum vivendi genus, & pro potu decoctum temperatum commendavi. Et denique ad promovendas hæmorrhoides venæ sectionem, ac harudinum applicationem iussi, eo effectu, ut redeunte ab his hæmorrhoidum fluxu, sensum cum morbo in gratiam rediret ægrotans.

EPIGRIT.

Quicumque symptomata in hoc morbo præsentia, cum signis, quæ supra §.V. spasmis gulæ inferioris propria diximus, rite contulerit: facile deprehendet, pharynge à spasmis libero, inferioriorem gulam ipsi agnitam, quin constrictionem eam per totum ventriculum ac intestinorum canalem fuisse propagatam. Horum vero omnium prima origo debetur inordinato hæmorrhoidum fluxui: qui sanguinis per imi ventris viscera, maxime intestina, circuitus impediens fuit. Unde exceperunt spasmocidi motus; hisque legitima chyli depuratio, & humorum excrementitiorum eliminatio perurbata est: hinc accumulata in ventriculo cruditates acida, biliosæque, vellicarum præteritis tunicam illam nervæ, quæ ab œsophago, per trium digitorum spatium in ventriculi cavum protenditur: ex qua spasmus ad gulam usque propagatus, constrictionem itidem sensum procreavit, quo assumti cibi in ipso sustineri coguntur, & coarctati per os rursus expelluntur.

Tali igitur in casu sola antispasmodica ac anodyna mali quidem causam non tollunt; ad mitigandos tamen motus spasmocidos, multum inserviunt. Sed in tali subiecto, quod fluxum hæmorrhoidalem dispositum antea, & huic adjectum fuit, huic revocando, omnis impendenda est opera. Cui tandem scopo, & hirsuties, & venæ sectiones, & pilulæ balsamicæ adpræpe satisfecerunt. Præterea in eundem finem, licet remotius, & proximè magis ad resolvendas & incidendas ventriculi cruditates, & æqualem humorum circulum restituendum, collinearunt reliqua medicamina.

OBSERVATIO IV.

Fœmina xxx. annorum, pallido vultu, ac *Cremore
gulae
superioris,
&
ventriculi.* strictiori corporis habitu prædita, & chlorosis obnoxia, ante tres annos primum gravida, de capitis doloribus, præcordiorum angustia, & pedum tumoribus conqueffa fuit: quorum symptomatum priora duplici venæ sectione, hoc sola pedum ligatura debellavit. Deinceps aëre fixa gravida, itidem adflicta molestiis, itidemque liberata remediis, scilicet superavit partum, lochiisque rite succedentibus, per decem abhinc septimanas, ab omni morbo viat immunis. His elapsis accessere œsophagi diffentiones, quibus primum semel bisve duntaxat quovis hebdomade, & quidem post deglutitum ultimum bolum alimenta in gula hæreret videbantur, & multo demum potu ad ventriculum deprimi debebant. Sed aucta paulatim est hæc molestia, & sub singulis se exferere cepit epulis, adeo ut solidis vesici nequiverit, nec nisi liquida assumere poterit: quin lincibus, gargaris matibus, aliisque medicinis frustra adhibitis, res tandem eo pervenit, ut misera nihil plane nisi calidam cerevisiam deglutire valuerit. Videbatur enim ipsi tuberculum quoddam fauces obfideret, ac ciborum descensum remorari; quod tamen & per intervalla duntaxat, & non eodem semper sensu loco, dum modo in pharynge, modo in media, modo infima œsophagi regione hæreret observabatur. Juncti erant nectus, qui ex ventriculo ascendentes, & ad hoc fixi dictū tuberculum pertingentes, flammæ recitabant, neque eructari poterant, denique assidua vexabat nausea. Accitua Medicus, spasmum subelle ratus, propinavit interne potiunculam laxantem, & cremorem hordei cum oleo amygdalarum dulcium potari iussit.

externe cataplasma emolliens, atque discutiens, & linimentum ex balsamo vitæ nostræ, & spiritu vini applico. Nec irritis horum fuit effectus, siquidem non solum omnibus liquidis liberum reddebatur iter; verum etiam, postquam absque ulla tussi, insignis viscidæ pituitæ copia vomitu excernebatur; & tuberculi sensatio, & nausea, & ructuum molestia evanescerebant. Neque vero minus solidiores cibi adhuc subsistebant, & demum molesta oesophagi contractio iterum accedebat; cuius adeo concilia erant ægrotæ, ut non solum clarissime sentiret, nam oesophagus contractus, anne relaxatus fuerit; sed quoque evidenter perciperet, ipsum post assumptos tepidiores potus relaxari: *Es kam ihr vor, als wenn sich eine Falte aufhob.* Et hæc adflictio cum copiosissima mucii viscidæ excretionem, oris perpetua amaritie, & colli, dosique magno dolore perinaculissime iohabst; donec adhibitis ex meo consilio, interne aquis Sedlicensibus, & elixirio viscerali Egenis, externe balsamo vitæ applicato fuerit debellata.

Epietisis.

1) Quemadmodum omnis spasmus vel in uno loco fixus, stabilis, ac rigidus est, vel per totum membrum decurrit: ita hoc præsertim in oesophago observamus. Ad posterorem clauicam perierunt nausea, ructus, vomitus, quin etiam singultus; qui affectus cranes absolvuntur motu oesophagi peristaltico inverso, & spasmotice aucto, ubi scilicet spasmus ab inferiori parte incipiens, ad fauces usque decurrit. Contra vero rigida oesophagi contractio, in eo possimum morbo, quem nos spasmus gulæ *אֶרְפָּה* vocamus, & supra descriptum occurrit; atque reliquæ spasmorum speciei symptomatice sæpius junctæ deprehenduntur.

2) Talis morbus est ille, de quo præfatus agit observatio; qui pro causa agnoscitur, cruditates viscidæ, acres, biliosæ in ventriculo subsistentes, tellante ora amaritie, nec non viscidos humores in ipsa oesophagi vasis flagrantibus. Quod si vero & in horum causam remotius inquiremus, nulla se offert alia, quam depravata digestio: unde etiam factum esse credo, quod, licet Medicis, convenienti medela spasmus gulæ delectaverit, ille tamen recrudescit, quoniam ad roborandum ventriculum nulla fulinde cura fuit directæ.

3) Tuberculi in oesophago sensatio, nihil est aliud, quam tunicæ musculosæ spasmotica conglomeratio, quæ præsertim mox in hoc, mox altero loco sese exseruit, & per hanc vagam ac incertum circuitum se distinguit à præternaturali tumore, huic canali innato.

4) Videre etiam ex hoc casu licet, quam pertinax ac magna possit esse gulæ contractio, adeo ut ne vapores quidem halituoosi, per ructus à ventriculo elevati, pervadere poterint, sed ad locum sincluræ devenientes, nerum relabi debuerint.

OBSERVATIO V.

Vir quidam, LIII. annorum, valde pituitosus, victus exactissimum servans rationem, vitæ vero sedentariæ nimium deditus, nec unquam sanguinis missionibus, per venæ sectiones, aut scarificationes adjuetus, & flautentis

admodum onoxius molestus, ultra iam triginta annos tussi quadam cum levi assiduitate junctæ, sanguine mane multum pituitæ excutiente, laboravit; quæ vernali præsertim, & autumnali tempore exacerbata, per aliquot hebdomades, gravius adflicti. Hic ante quatuor circiter menses ex improvviso, tam incidit molestiam, qua summi cibi, utut minutissime concisi, in oesophago, circa superius ventriculi orificium, subsistebant, nec nisi haustu potu detrudebantur. Paulo vero post hæc adflectio ita invalecebat, ut cibi æque ac potus in gula veluti detenti subsisterent, ac coarctati, vomitus quadam specie rursus eructarentur: levida tamen, si tepida fuerint, parca quantitate alimere valebat. Insestibat hoc incommodum per periodos; adeo ut interdum etiam cibi ad ventriculum deserti ponerent; prorsus tamen, frustra adhibitis varii generis medicamentis, cedere recusabat. Verum tribus abhinc hebdomadibus, assumta caro iterum subsistebat, nec cum potu ad ventriculum perducere, nec vomitu reddi poterat, magnamque creans molestiam. Tandem capiebat æger, proprio insincto oleum olivarum, cum melle, & ab hoc ultra mensuram unam mucii tenacissimi una cum detenta carne eructabat. Inde quidem melius habebat, adeo, ut ad minimum iussulis vesici poterit; & ubi recidebat malum, eructato fronte mucus, cuius excretionem alibitus quidam spiritus anisatus cum saccharo mixtus adjuvabat, rursus remittebat. Verum paulo post gravius reddebatur status: siquidem contractio gulæ, ciborum & potuum descensum impediens, majores capiebat vires, adeo ut adpetitu integro gavisus, nihil fere comedere posset, ideoque corpus sensim contabesceret. Accedebat virum collapsus, frequens corporis tremor, atque frigus, maxime si vel atri librici se exponeret, vel in eructando mucus occupatus esset. Præterea noctu præsertim mox in gula inferiori circa stomachum, mox in superiori circa fauces, sentiebat tuberculum quoddam, instar oui columbini, quod emittis ructibus exasperare quidem videbatur, mox vero recurrebat. Verum plerumque nec ructum edere, nec singultire valebat: quod si autem hi motus succedebant, non solum levagien totius mali inferebant, verum etiam si assumtorum quidpiam in gula hærebat, illud vel per os reddebatur, vel in ventriculum descerebatur. Notabile etiam erat, quod quæ iam ingressæ erant ventriculum, vomitu nunquam rejicerentur; sed hoc dumtaxat mucus, cibus, vel potus in gula remoratus excerneretur. Adflegebat insuper, post assumtum nuper purgans, gravis inter scapulas dolor; nec molestia erat ulla ventriculi gravitas. Quando vel frigidi potus parum ceperat, vel frigidum ærem inspiraverit, protinus exacerbabatur omnia.

Epietisis cum consilio.

1) Quantum causarum cognitio, ad curandum morbum, præstet momentum, vel hæc docet morbi historia. Medici enim, quorum plures consulebat æger, in varias quidem abierunt opiniones; nulla tamen rei conformis erat. Quidam enim accusabant ventriculi atoniam; alii scirrhum oesophagi tumorem; alii nimiam pituitam ventriculum, & oesophagum obfidentem. Priores duæ causæ prorsus à veritate sunt alienæ; ut enim alia momenta, ipsis contraria

Spasmus
gulæ refe-
rentur, cum
repleatur
mucis mu-
ci.

taceam, vel id eas scellit, quod malum per intervalla reveratur. Tertia est tantum remota; cui in acceptis ferenda proxima, quam non aliam subesse iudico, quam ipsam aërophagi pertinationem.

2) Testantur huic cuncta symptomata. Primum quidem subsilensia ciborum in gula, potuum calidorum liber transitus, constrictionis remissio, & a frigore revocatio, dolor inter scapulas, sensatio tuberculi in gula, extremorum frigus, corporis tremor &c.

3) Notabile est, ructus salvisse constrictionem gulæ. Dum enim hæc in uno loco penitus inhaeret, ac fixa est, ructus vero non nisi inverio motu persilicito totius canalis absolvitur: facile patet, cur illa strictura vehementiori existente, & singulandi, & ructus emittendi potentia fuerit prohibita; item cur si ructuosi motus major vis fuit, hæc resistens fixioris stricturae superaret.

Cum hic affectus & huic similes somitem & materialem suam, à qua progignuntur, causam potissimum in ventriculo, five potius duodeno stabulantem habeat; videlicet viscosorum & crudorum acido-bilioforum humorum saburram, qui continuo pravas exhalationes in superjacentes nervosæ partes emittunt; curandi methodum ego ita insinuare solus sum, ut pulvere absorbente & salino detersivo, leniterque nitroso, convenienti dosi & tempore, præmissio vel blandiori emetico ex radice Ipecacuanæ, vel pilulis, quæ ex nostris polythrestis & extracto panchymagogo *Croliis* compositæ sunt, excretionem sufficientem materie peccantis promoveam, & demum convenientibus stomachicis robustantibus, digestionis negotium in meliorem & naturalem statum reducere annitar. Quæ remediis in genera, si intentioni minus responsæ sunt, quod fit, quando hypochondriaci vel hysterici sic dicta passio huius morbi fundamentum est; tunc omnino ad validiora, usum videbunt aquarum theriacalium vel acidularum, ad balnea quoque, ad prægrinationes pro mutando aëre & corporis motione consurgendum erit, quæ methodo etiam hic æger convaleuit.

OBSERVATIO. VI.

Vir illustris, amorum L. constitutionis satis robustæ, victui duriore, caribusque sumo induratus longo abhinc tempore adfectus, & viri, nec non spiritus vini potui valde dedusus, in animi exandescens proclivis, parum appetit, & excussio mane somno, magnam in faucibus & ore percipit ariditatem. Tum è lecto surgens sub cordis siniculo quandam persentit molestiam, ab humore glutinoso, ibi fixitèr impaço, qui tam vehementem causatur irritationem, ut illustris æger magno impetu ac labore illum excreando repere anitatur, non sine ingenti thoracis, atque totius corporis constrictione, rubore faciei, sudoreque totum corpus occupante. Tandem aliquot cochlearia, modo insipida, & mucosi, modo biliosi & acidi humoris eructantur, æque jam per aliquot duravit mensis. Consultus ego, primum ut à remediis stomachicis roborantibus, & aquis vine spirituosis, quibus se absque ulla salamine permulso fuisse usum scirebat, nec non omni spiritus vini potu prorsus abstineret, motui; & potius tui, ut victu molli; tenuique, ac acidulo Egranis, ineunte æstate uteretur; pro potu ordinario aquam thermalem

Piperinam, quam in promtu habebat, usurparet, cunctas intermitteret, atque pulverem nitrosium præcipitantem, cum haustu aquæ fontanæ, cubitum surus caperet. Ex quibus consiliis infigne percepit allevamentum.

Epicrisis.

Non pauca in praxi medica occurrunt eorum exempla, quibus noctu humiditas mucosa, five pituita in faucibus, ipsoque œsophago concredet, & intus siemiter inhaeret; quam deinde magno, & sæpe frustraneo conatu expellere moliantur. Humor hic non ex aspera arteria, ejusque glandulis, nec ex pharyngis, aut laryngis glandulosa tunica; nec ex pneumia, quæ basin varium involvit; sed ex glandulis ipsius œsophagi, quæ, tunica nervea abata, in confectum veniunt, & pressæ per vasa excretoria ac foraminula, quibus præditæ sunt, humorem sillant, suam ducit originem. Hæc igitur glandula, sicuti à vaporibus acerbis, acidis, vel etiam calidis, ex ventriculi vel duodeni sinu elevatis velliscantur, fundunt lympham, quæ facile concredet in mucum, qui tam mole, quam qualitate inimica tunica musculari-nerveæ ad ejusmodi spasmodico-convulsivum proritat motum. Hinc facile patet, tali in casu, nec calida & aromatica, nec spirituosæ proficere; quippe quæ lympham magis viscosam, & humores biliosos magis acres reddunt & volatiles: quibus temperandis longe majori efficacia potus diluentes, suntque moderati potius inferiunt.

Plures hæc de re notatu dignos casus legas in *Consil. medic. Jo. H. cap. LXIII. LXX.*

CAPUT VI.

De motu ventriculi convulsivo, five Vomitu.

THESES PATHOLOGICÆ.

§. I.

Vix quicquam in humana vita frequentius occurrit vomiti: namque nec ullus hominum erit quin vomuerit, nec pauci sunt morbi, qui vomitu, tanquam molesto complicantur symptoma. Nihil autem aliud est, quam *asphyagi, ventriculi, & maxime duodeni motus persilicatus, præter naturam inversus, & ad convulsivam contractionem usque actus, quo contenta ventriculi, vel intestini sinu duodeni per os rejiciuntur.*

§. II.

Non quidem obscurus est affectus, qui, ut diagnosticatur, lignis cgeat: attamen eo attentius concurrentia symptomata & affectiones observare convenit, quo magis causæ id visus genus producentes variant. Generatim sciendum est, quosdam ad vomendum valde faciles, a levissima causa disponi; alios vero minus promotos, atque magis inani, molestosque vomendi conatu urgeri. Illi à schola medica vocantur *emetici*, & sunt imprimis infantes præ adultis, senex præ viris, & viri laxioris habitus: hi dicuntur *dysmetici*, & sunt strictioris habitus corporis, brevioris collumæque robustiori nervorum systemate præditi.

M 4 §. III.

§. III.

Hicoria vomitur.

Vomitum antecedere & comitari sæpius solet molestissima nausea, et *viid ihnen erschrecklich abel*, cum tensione & gravitate in epigastrica regione, oris amaritudine, ardore, morbo, inappetentia: adell quoque magna præcordiorum anxietas, inquietudo; multum salivæ tenuioris in os stillat, multumque spuitur, *der mund läuft ihnen voll Waffer*, accedit vertigo, oculorum caligo, & obnubilatio, capitis gravitas, faciei rubor, tremor inferioris labii, & cumprimis anxia cardiagia; atque tandem post laboriosam, & inanem eruptionem, contenta in ventre extruduntur. Quæ adfectiones sat luculenter spasticam & convulsivam ventriculi & adnexarum nervosarum partium subversionem ostendunt.

§. IV.

Diversitas materia per vomitum accipitur.

Materia, quæ per vomitum rejicitur, dum varia est, diversas vomitus imposit denominaciones. Saburra mucosa, chymosa, ciborum nondum penitus dissolutorum reliquias rejectæ, vomitum pituitosum constituunt; biliosa colluvies biliosum exhibet; eadem ad admixtionem aliorum humorum, vel acidorum & corrodentium subnigrificantem corruptum, viridem, æruginosum, porraceum spargit. Interdum vernex & infecta rejiciuntur; nonnunquam stercorea materia ex imis revoluta intestinis expellitur; quandoque pus redditur & saniosa materia; quin carnosam instar polypi membranulam massam in ventriculo contentam, vomitusque expressisse me observasse testor. Eluctur non raro sincerus sanguis, & vomitus tunc dicitur cruentus; & interdum idem ater corruptusque vomitur, tumque morbus audit niger *Hippocratis*; cujus utriusque non faciemus mentionem: quia in *parte systematis nostri therapeutica II.* id jam factum est.

§. V.

Sedes vomitus.

Sedes materia, quæ evomitur, proxime quidem ipsi inhaeret ventriculo; cujus æque ac vicinarum partium præternaturali motu illa eliditur: ac vero ex aliis & remotis etiam partibus, hepate, pancreate, per ductus, ex hanc, ex ipsa quoque sanguinis & humorum massa, ex habitu corporis, ut in tumoribus per vasa & glandulas huc adducitur. Causæ quæ sensibilem nervosam ventriculi substantiam ad spasticum & compressivum motum irritant, non tamen in ipso, sed etiam in aliis vicinis & repositis partibus nervosis, querende sunt, cum libidine animadvertamus plurimis spasmodicis adfectionibus per consensum vomitum accedere. Quæ præcipua momenta ut clarius & rectius intelligantur; è re fore arbitror, ut accuratior ventriculi & duodeni fabricam secundum recentiorum & probabiliorum anatomicorum descriptionem præmittamus.

§. VI.

Fabrica ventriculi membranacea.

Primum igitur notandæ veniant tunice ventriculi, quarum quatuor ipsi tribuuntur, extrema est membranacea, à peritonæo oriunda, & cum tunica concavum diaphragma cingente continuat; altera est musculoia, quæ duplici constituitur fibrarum serie, externa quæ fibras habet longitudinales, longitudinem ventriculi abbreviantes; interna vero partim quædam, à cordia ad pylorum excurrentes; & utraque orificia ad invicem

coarctantes, partim alias circulares, latitudinem ventriculi amplectentes, hancque contrahentes exhibet. Tertia, quæ huic subiacet, tunica audit nervea, fibris tendineis, oblique per ventriculum decurrentibus prædita, priusbus amplior, hinc rugas formans, & glandulis multis repleta. Quarta dicitur villosa ex papillis nerveis, & extremis vasculis, villorum instar erectis concinnata, & mucagine, quam dictæ plorant glandulæ, obducta. Ceterum inter tunicam externam, & musculosam, hanc & nervam; æque hanc & villosam triplex conspicitur substantia cellulosa, vasa sanguifera copiosissima continens.

§. VII.

Fabrica ventriculi musculosa.

Deinceps considerari merentur vasa ventriculi. Arterie sunt duæ gastricæ, dextra, sinistraque & coronaria. Namque postquam arteria aorta inferior, perforato circa spinam septo abdomen ingreditur, protinus spargit arteriam coeliacam, quæ in tres ramos displicitur: prior est hepatica, à quo suborsitur 1) pylotica, 2) gastrica dextra, 3) duodena arteria: alter est coronarius, qui ventriculum innumeris ramificationibus amplectitur: tertius est splenicus, qui ad lienem tendens exhibet 1) arteriam pancreaticam, 2) gastricam sinistram, quæ cum dextra constituit gastroepiploicam. 3) ipsam epiploicam, 4) vasa breviora, quorum alterum est venosum. Per hunc arteriarum nexum patet, quantum sit humorum circuli per dictas partes confusus. Veræ sunt coronaria, gastrica dextra, sinistraque, & alterum breve vas. Omnes oriuntur à vena portarum, cujus truncus sub duodeno ad pancreas tendens, primum venas cylicas, pyloricas, duodenales; deinde tres, interdum duos ramos suppledit, quorum primus splenicus dat coronari in, gastricam sinistram, pancreaticam, epiploicam, & vas breve venosum; alter mæstasica major intestinales & gastro epiploicam; tertius hæmorrhoidalis internus, gastricam dextram, & duodenalem. Unde liquet, præpedito sanguinis in uno viscere circuitu, illam ad alterum regurgitare. Lymphatica vasa comitantur venas; nervi arterias. Hi vero nascuntur partim à pari vago, partim intercostali ramo. Per vagum duobus ramis ab utroque oesophagi latere descendens, toti ventriculo innumeras ramificationes tribuit, tumque ad formandos nervi intercostalis plexus concurrunt. Hic enim perforato diaphragmate, iuxta arteriam coeliacam format ganglia semilunaria; unde in dextro latere surgunt plexus hepaticus, & renalis dexter; in sinistro nascuntur plexus lienaris, stomachicus & renalis sinister: ex hepatico & renali dextro, nec non ganglio semilunari suborsitur plexus mesentericus superior; cujus interventu dicti in utroque latere quinque plexus adeo uniantur, ut partes ab illis suos nervos mutuantes, arctissimo gaudeant consensu.

§. VIII.

Fabrica duodeni.

Attendi porro meretur fabrica duodeni: quod cum ventriculo ratiote tunicularum, nervorum, vasorumque convenit; & à pyloro incipiens, tres format flexuras. Prior occurrit, dum à ventriculo oblique, deorsum, simul retrorsum tendit, circa cujus finem inferius ipsi ductus choleochus, bilem, succumque pancreaticum fecerens. Deinceps cum dextrum amittit rethem, alteram exhibet flexuram, quæ accumbit pancreati; tandemque iuxta spinam, rem sinistro appropinquans, tertiam suppediat, super qua feruntur &

& aetia, & plexus mesentericus superior: cujus constrictione prius hoc intestinum afficit. Ceterum illud reliqua intestina capacitas amplitudine, contra communem sententiam, qua angustius dicitur, longe superat.

§. IX.

Conferens
ventriculi
ac intestini
duodeni
cum alia
partibus.

Hæ binæ partes, ventriculus nimirum, & intestinum duodenum, quod ventriculus minor non immerito vocari potest, insigni nexu non modo invicem, sed etiam cum aliis nervo-membranaceis gaudent partibus. Connecuntur enim 1) cum oesophago, per ipsarum tunicarum, quæ utrique parti eadem sunt, communione, & hinc cum ipsa lœces, & os cingente tunica cohaerent. 2) cum toto intestinum canale, non modo per tunicarum earundem protensionem, verum maxime vi plexus superioris mesenterici, à quo cuncta intestina suos nervos mutantur. 3) cum omento, quod ventriculi parti anteriori firmius annectitur. 4) cum septo transversò, per ramulos à nervo vago & intercostali, nec non tunican exteriori & septi & ventriculi superficiei communem; & illius respectu cum 5) nervosis, ac membranaceis pectoris partibus; nec non muscibus abdominis. 6) cum ductibus biliferis, non tantum per choledochum canalem, duodeno inferum, verum maxime per plexum hepaticum, qui furculus dat duodeno. ac ventriculo, cumque flexu stomachico, intervallu mesenterici superioris communicat. 7) cum pancreate, cui firmiter adheret duodenum. 8) cum renibus, per plexum renalem dextrum & sinistram, qui cum stomachico connectitur; 9) cum capite & cerebro, nec non corde per nervum vagum, qui his partibus communis est.

§. X.

Motus per
reflexum
est.

Vi tunice musculo-æ, ejusque fibrarum §. VI. superius recensitarum, oesophago, ventriculo, cunctisque intestinis communium, proprius istis partibus est motus quidam vermicularis, quem etiam peristalticum vocant. Hic consistit in distarum partium alternante constrictione ac relaxatione; & à parte superiori deorsum tendit: in ventriculo, variis modis eum contrahendo, arctando, rursusque dilatando, diaphragmatis & muscolum continuo, qui sub respiratione fit, motu adjunctis, ciborum & digestionem, & per pylorum expulsionem secundat: in intestinis, humorum laudabilium per chyli fera vala resorptionem, & excrementorum ad inferiora protrusionem, & per anum eliminationem peragie.

§. XI.

Formalis
motus con-
vulsivus.

Quandocumque vero hic peristalticus motus, deorsum vergens, ad præternaturalem, spasmodicam vel convulsivam incenditur motionem: oriuntur intestinum tormina, dolores circa pylorum cardiaci, spasmus sic dictus ventriculi, colicæ passionis, & alvi profluvium. Quod si autem idem hic motus, præter spasmodicam contractionem inventiatur, & ad superiora tendat; cogit primum contenta ex intestinis in ventriculorum; aut si jam in ipso fuerint, ea sursum trahit, tumque fit vomitus. Sub hoc enim pylorus cum adnexo duodeno pariter, ac anterior & inferior ventriculi portio, contracta violenti fibræ longiueudinalibus, & circularibus, ad superiora officium contrahuntur; contenta ipsius ad hoc adpiscantur; coniungunt à tergo ipsius impetu,

in oesophagum coguntur; & motu illo inverso per totam gulam propagato, ad os feruntur, & eructantur. Adjuvant hunc motum violenta diaphragmatis, & muscolum abdominalium per contentum facta constrictione & parietu ventriculi facta inde compressio: hinc post singulas vomitiones, difficilem spirationem adhuc continentur, & abdominis regionem plus minus gravi dolore affici, in comperto est; quid quod in animalibus post devoratum emeticum dissectis, pressione ventriculi à diaphragmate ac muscibus abdominalibus rectis potissimum oculis intueri licet. Quidam ex Medicis Angliæ hac in opinione sunt, fibras stomachi nihil prius ad vomitionis actum conferre.

§. XII.

Verum quo debiliores sunt ventriculi fibræ, & quo mobilior, majorique copia rejicienda fabura præsto est: eo facilius fit vomitus. Quod si vero robustiores fuerint fibræ, ut in dylen-ctis; aut causa vomitus in humore tenaci, viscido, plicis ventriculi firmiter inhaerente, vel materia acri, caustica nervis insidente consistat; tum gravis fit vomitio, atque fonticis stipatur symptomatibus. Namque antecedunt primum gravilinae cardiacæ, immanes nauisæ, præcordiorum anxietates, inquietudines, laboriosæ, ac inanes eructationes, moxque abdominis, contentarum partium, maximeque diaphragmatis concussiones, hinc singulose agitationes; claro documento, magnam subesse ventriculi convulsionem, ad expellendam eosiam materiam haud sufficientem. Frequentissimum tunc est, ut convulsio ventriculi ad ductus biliferos propagetur, & hinc fiat effusio bilis ad duodenum, & ventriculorum; quæ eructata, nihilo minus continuat vomitio. Motus ille ascendit per oesophagum, qui lympham ex ipsius ac faucium glandulis exprimit; cujus multum spaiatur: *Der Mond hinfert voll Wasser*. Compressis porro per vehementissimas concussiones ventriculi, & adnexarum partium valis sanguiferis ibidem sitis: cruor majori copia & impetu ad superiores partes, atque caput compellitur; ejus vala insarci, membranas nervas distendi, & ad similem spaium proritat. Hinc fiunt faciei rubores, capitis dolores, oculorum caligines, vertigines, tremor inferioris labii, atque non raro totus nervos generis convulsivæ, ac epilepticæ commotio.

§. XIII.

Causa, quæ ad vomitum disponit, proxima est vellicatio vel stimulo fibrarum ventriculi ac duodeni nervarum: vellicans autem materia hæret vel in ipsis illis partibus, vel in remotioribus, vi nervorum cum istis connexis. Hinc resultat differentia vomitus in *idiopathicum*, & *sympathicum*; ille causam materiam in ipso ventriculo vel saltem duodeno habet; hic eandem remotius in inferioribus intestinis, ductibus biliferis, renibus, capite &c. hærentem agnoscit, & consensuali magis vitio motuum nititur. Idcirco facile patet, nullam esse monarchicalem illam potentiam, quam suo pylori rectori tribuit HELMONTIUS, à quo semper stridit, & inversi motus initium arceffendum esse putat. Quamvis enim nonnunquam illa fiat; attamen non raro ex infimis intestinis constrictionis principium laborari, vel stercorei testantur vomitus.

Symptomata
in
diaphragmate
& muscibus.

Differentia
vomitus
ad
patheticum
& sympathicum.

§. XIV.

§. XIV.

Causa materialis
fuit nimis
affluens
vires quatuor-

Inter causas itaque vomitus materiales, in ipso ventriculo haerentes, accusanda primum venit nimia affluentium quantitas; quae fibras ventriculi nimium aggravat, & ultra sphaeram elasticitatis distendit, donec, facto rapidiori fluidi tenuissimi & sanguinis affluxu, in convulsivum motum actae, nimiam sibi materiam expellere moliantur. Ex hac causa obnoxii sunt vomitibus 1) heiliones ob potum ramiis hauritis ingestum; 2) infantes teneri, ob lac copiosius sumunt, vel duros praemature solidiores cibos; quo in casu non sine ratione pylori angustiam, solidiora nondum transmittentem acculus KERKINGIUS *Spicileg. anat. obs. 20. 3)* homines à morbis, & tolerata sub iis inedia debilitati; in quibus parcius quoque ciborum, maxime solidorum, quantitas vomitum clere potest; unde dicitur: *Der Magen kann nicht seine Speise vertragen.* 4) Pueri voraces, qui & crebris vomitionibus, & frequenti singultu vexantur.

§. XV.

§) Sabura
veneris. aut.

Concitat deinceps vomitus sabura vitiosa in ventriculo contenta; quae non raro à cibis crudis, dyspepsia, fumo induratis, salicis, aliisque incongruis non bene concoctis resinguitur. Hinc sunt vomitus pituitosi, qui eveniunt 1) hominibus, qui debilitate ventriculi praediti sunt, si mulque voraces, 2) qui mollioribus cibis adfecti, victum subeunt crassiores, 3) qui gulae indulgent, simul vero distentioni somno, viresque sine motu desidi sunt dediti. Eadem sabura, mora temporis, acida redditur, & accedente ob iracundiam, aliasque forsan causas, ex duodeno bile, acrior evadit; unde ex ventriculo biliosi sunt vomitus.

§. XVI.

§) Humor
biliosus in
duodeno.

Omnis vero biliosus vomitus, maxime si vel chronici, vel periodici fuerint, fontem suum in duodeno habent. Apertissimum fovendae saburae hoc intestinum est, propter flexuras, quibus pollet; & quoniam in eo bilis chymoloso succo abundat. Hæc si iners fuerit, vel languente intelligentum tono, stagnaverit, nec rite cibis permissus, aut accedentibus acidis humoribus magis in sua crasi pervertatur, acris ac veluti caustica redditur; & vellicando parit vomitus biliosos, virides, argutulos, quam & nigros. Namque bilis ab acido forti fit viridis; & si diutius subsistat, nigrum inducit colorem. Inde etiam acidissima evomiti solet materia, quæ dentes stupefacit, atque pavimenta, vasque argentea atrodit. Talem vitriolacei saporis observavit HENRICUS AB HEER *observ. 29.* & ego in not. ad ROTHEIUM *Crit. II. casu 93.* recensui casum, ubi per vomitum materia instar aquae fortis corrosiva fuit rejecta, quæ cum limatura martis, in venam abiit vitriolum.

§. XVII.

Vomitum
hypochondri-

Ejusmodi vomitibus ex duodeno originem trahentibus vexari solent 1) hypochondriaci ac melancholici, in quibus ob languidum intestinum tonum, non modo crassitates acidae ac viscidae ex cibis in ventriculo & duodeno relinquuntur, sed bilis quoque adeo iners est, ut loco chylis generosioris, magnus fiat provenus humorum acrimum, acidiorum, cum bile corruptus, i.e. temporis mora nigra facta mixtorum, hinc nigrosum,

quos Veteres à liene proficisci autumant. Hi vero humores omnino vellicant duodenum, ac sensibilem pylorum: unde facile subvertitur ventriculus, maxime cum hæ partes ad inversionem motus peristaltici per se sint pronæ. 2) Scorbutici, quorum tota humorum massa spissa est, ac impura. 3) Cachectici, quorum bilis vappidæ existit, nec dissolvendis penitus bilis sufficit: unde in eis vomitus magis bilioso-viscidus fuit. 4) Infantiles, lac impurum, à matris exandescencia acidum factum, fugientes; quibus frequentissimi sunt vomitus praesini, aeruginosi, virides. 5) Febre quartana affecti.

§. XVIII.

Concitant porro vomitum affluente qualitate 4) effluvia noxia. Sic cibi nimium pingues, horæ, fermentescibiles, maxime si sabura quadam bibulosa in ventriculo scateat, acriorem fermentationem subeundo, vomitum movent. Idem faciunt cibi ingrati cum falsicio assumti; eo magis, si nimium pingues ac oleosi fuerint. Huc quoque pertinent acra, ac principio subtili caustico prædita; si cuius sunt omnia vomitoria; necnon subiecta venenata, ova herbi piceæ, de quibus conf. TILMAEUS à GULDENKLEE *lib. III. cap. 7.* nec non fungi venenati, quorum mentionem inicit HILDANUS *Crit. IV. obs. 34.* De venenis ipsis, arsenico, mercurio sublimato res notissima est; quippe quæ ob summe causticum principium, præter vomitus, gravissimam inducunt convulsivam totius corporis symptomata: id quod de vomitoris atque purgantibus actionibus etiam est statuendum.

§. XIX.

Non minus humor subtilis acris nervosa ventriculi partibus incumbens gravissimas excitat vomitiones. Transfertur ille nonnunquam per metastasin, à materia arthritica, erysipelacea, podagrica, scabiosa, ulcerosa, purpuracea, topicis intus actis, nec non à diarrhoeis ac dysenteris cohibitis. Sic nati ab ulcere præmature consolidato vomina exemplum recenset JOH. RHODIUS *Crit. II. obs. 65.* & de podagra retropulsa, ad id vitii genus dissonante calum allegari in *consult. med. Tom. II. Sect. IV. cap. CLXX.* Eadem ratio est, quod in variolis, morbillis, febrilibusque malignis, ac exanthematicis, atrocissimi fiant vomitus: siquidem miasma horum morborum acre, & causticum, obidendo nerveas ventriculi fibras, id mali insert. Hinc quoque accessenda est gravissima vomitus in peste causa; ubi dissecto cadavere HELMONTIUS *lib. quem inscribit cumal. pest. pag. 54.* ventriculorum esichara obductum; & DIEMERBROECK *de peste Lib. IV. hist. 15.* eundem carunculo occupatum, se vidisse perhibent.

§. XX.

Cruor vitalis ad vasa ventriculi, & adnexarum partium, majori copia congestus, ea graviter distendendo, vomitum producere solet. Hinc illum patiuntur 1) foeminae gravidae, primis gestationis mensibus; dum nimirum ob retenta menstrua cruor ad superiora regurgitat, qui grandescente foetu, in quibusdam post quartum mensem plerumque cessat: qualem notabilem casum allegat PETR. LOTICHIVS *Lib. V. obs. 7. pag. 442.* 2) foeminae, quibus non fluunt menstrua. Sic PANAROLLUS *Sect. I. obs. 22.* meminit puellæ, quæ nondum menstruat, per septem integros

4) effluvia
noxia
qualitate
affluente
ca.

§) Morbis
non per
metastasin
ad ventriculorum
clero.

§) Singulis
ad ventriculorum
regurgit.

tegro

De Motu ventriculi convulsivo, five Vomitu. 143

regres annos, simul ac cibos caperet, illos revolvit, prodeuntibus vero mensuris, ab eo male liberata fuit. 3) viis, quibus suppreffæ sunt hæmorrhoides, ubi sanguis ad venam portæ majore copia refluit. Quibus in casibus non rarum quoque est, vomitum cruentum suboriri.

§. XXI.

An cardias
totum
constricatur
prodicatur.

Ipse ventriculus præter naturam constrictus, vomitum ciet. Primum quidem orificium illius superius, vel spaismo, vel alia causâ præternaturali occlusum, similem porit affectum, qui vero non verus vomitus dici potest, & magis ad spaismum gulæ inferioris pertinet: siquidem cibi priusquam devenierint in ventriculum, cum mucos in gula contento reijciuntur. Similes casus videas apud WILLISIUM *pharm. rat. part. I. sect. II. cap. 1. pag. 17.* FERNELIUM *Lib. VI. patbol. cap. I. & COITERUM obf. chirurg. pag. 121.* ubi cardias scirrhus, & tuberculo duro obstrata fuit.

§. XXII.

Pylori
vomitus
sic causatur
prodicatur.

Aliiter se res habet cum pyloro, ex cujus præternaturali constrictione, ac obstructione, chronica, perpetuæque propullulant vomitiones: adeo, ut fere regulæ instar sit, quod qui diu, maxime a sumtis epulis, vomuerunt, simulque contabescunt, pylorum habeant male constitutum. Sic ipsam prædurum, ac ita incrassatum fuisse, ut nihil ciborum transiret, refert SANCHEZ *L. obf. p. 176.* Eundem scirrhum prolius describit SALMUTH *obf. 20. cent. I. WILLISIUS Pharm. rat. P. I. Sect. II. cap. 1. pag. 5.* ACT. MED. BEROL. *Dec. II. vol. III. pag. 45.* & nigricantem & atrosum MEIBOMI *obf. de vomitu §. 21.* à deglutito nummo obstructum KERKINGIUS *opusc. anat. obf. 1.* quibus in casibus ad finem viæ moleste vixarum vomitiones.

§. XXIII.

Sympathicus
vomitus
sic causatur
prodicatur.

Sympathicus vomitus oritur primum ab irritatione tam œsophagi, quam intestinorum. Hinc sæpius fit, ut à pluma vel digito, facibus tantum intruso, & œsophagi præhensum tiliatæ, statim ventriculus, præteritum humorum copia onustus subvertatur. Deinceps conversi motus per istud initium profundius ab intestinis ordini sequitur, & per consensum ad ventriculum propagari, docent vomitus à doloribus intestinorum cohes, torminosis &c. prognati: quo in casu ingens sæpenumero humorum varii coloris & consistentiæ copia eructat: Conf. HILDANUS *cent. IV. obf. 32. & 35.* & MARCELLUS DONATUS *opusc. mirabil. Lib. IV. cap. 3.* virginis saburæ libras, vomitu quotidie rejectas fuisse asserit. Ipse vidit in senibus berniosis, ubi ingens intestinorum porro prolapsa fuit, per plures annos insignem ac mirabilem ætate quantitatē quavis tercio vel quarto die, vomitu reditam fuisse.

§. XXIV.

Vomitus à
colica, id est
hernia
prodicatur.

Tali ratione intestinum vitio vomitus superveniunt 1) eorumdem distensionibus à flatibus & foribus, simile exemplum allegante DODONEO *obf. med. 17.* 2) pertinaci colicæ spasmodicæ, teste experientia. 3) contumaci alvi obstructioni, uti fit in morbo spasmodico vago, in quo clysteres injecti una cum stercorebus per os redduntur. 4) in morbo ileo & hernia, 5) dysenteria, arrostante PLATERO *obf. pag. 875.* 6) vermibus, intestina ac ventriculum rodentibus

Vid. AMATUS LUSITANUS, *Cent. I. curat. §. Cent. III. cur. 20.* Ipse novi puellam septem annorum, quæ de intra tribus cardialgis, convulsivis, continuisque vomitionibus conqueffa, tandem grandem per os eiecit verrem, & paulo post defuncta est. His in casibus sæpenumero universalis motus peristalticus est inverso, quæ ab intestino recto incipiens, ad fauces usque ascendit, cunctaque intestinorum contenta per superiora vehit, & expellit.

§. XXV.

Per consensum quoque gravis vomitus fit, à *Pomitus à vitio ductuum biliferorum in hepate.* Quomodo-
modum vero hi ductus, eodem ac intestina modo, & constricivis, & dilatatorio gaudent motu: ita eandem & præternaturali constrictione, ac nimia laxitate ad vomitum contribuit. Priori modo non modo ipsa bilis viulenter in duodenum, & ex hoc in ventriculum, retrogrado itinere exprimitur, hujus tunicas vellicat, & hinc revomitur; verum etiam ipse ductorum canalium spasmus, per plexus hepatici & stomachici consensum, ad ventriculum propagatur. Posteriori ratione per laxos rubulos bilis nimia copia in duodenum effunditur.

§. XXVI.

Respectu hujus causæ, vomitus movent 1) *Pomitus à vitio ductuum biliferorum in hepate.* ipsa enatica, atque purgantia fortiora, quæ tam ventriculum, quam ductus biliferos in spaismum agunt, qui bilem effundit in duodenum. 2) gravæ iracundiæ, præsertim inter ipsam pultem, quæ etiam ab iracunda matre, ab insomni infans, ubera trahentem, perniciosis elere valet effellum. 3) in ipsa febre tertiana, ob spaismum primarum viarum, vomitus biliosus cum euphoria fit. 4) nec non in cholera, febribusque biliosis. 5) in malo hyzochondriaco, ubi si affici viarum primarum urgent. 6) denique calculi vesicæ bilis, aut concretiones biliosæ in illa, spaismum excitant, biliosus vomitus producens: quales notatiles casus in M.N.C. *anno 1742. obf. 20.* & SCULTETO *armament. obf. 61.* exstant.

§. XXVII.

Nihil est familiarius, quam quod nephriticis *Pomitus à calculo.* & calculosis affectis comitentur nausea, vomitus, & tormina intestinorum: eo magis si calculi hæreant in sensibilibus uretribus, aut etiam renibus, quales observationes legi possunt apud BONETUM *spictebr. obf. 60.* Ita memini celeberrimum Medicum & Botanicum hujus loci sexagenarium ex calculo in medio uretris finis firmissime hærente & impaço, per trimesse spatium continuis vomitionibus cum ciborum fastidio perseverantibus, subsequente tandem virum collapsu & corporis contabescencia, ante quindecim annos mortuum: aliquot septimanis ante obitum de corrupto & foetido materie, quæ exiebat, odore & sapore querebatur, ipse existimans, urinofum laicem, qui parcius reddebatur, esse penuriam. Frequentissime etiam fit, ut à spaismo ventriculi & intestinorum silentes hæc nephritici paroxysmi resuscitentur. Ratio in promptu est: Namque dum ten sinister per suum plexum nervorum, intervento mensesenci superioris cum stomachico cohaeret; dexter autem per similem plexum immediate cum hepatico, & stomachico connectitur; & insuper duodenum hujus renis involucri firmiter junctum sit: facile patet, cur quidem utriusque renis, dextri tamen præ-

sinistro spasmus vomitus, sæpenumero biliosum, tamque vehementer movent, quantum vix præstiterit emeticum. Notabilis hunc in finem est observatio, quam MELBOMIUS *disq. de vomitu* §. XXVII. recenset, quod calculi renibus impachi primum horrendo induxerint vomitus, hisque cessantibus, tantum oesophagi concitaverint spasmus, ut ex ore quasi quidquam exsistere videretur.

§. XXVIII.

Vomitus à capitis lesionibus.

Vomitus quoque per consensum fieri comites affectuum capitis, docuit jam HIPPOCRATES, dum *Lib. VI. aph. 50.* Quibus, inquit, *diversim est cerebrum his febrem, & biliosum vomitum supervenire necesse est.* & in *Coac. præn. cap. 3. §. 3.* quibus cerebrum vulneratur, febri plerumque ac bilis vomitus accedit. Et notum est unicuique Chirurgorum, capitis ac cerebri, huiusque membranarum, inflammationes, vulnera graviora atque contusiones, vomitum sequi: neque minus idem accidit, gravioribus partium nervosarum capitis spasmis, uti cumprimis in atroci illo dolore capitis, quem clavum vocant hystericum; in rebus cephalalgia, hemicrania, vertigine, apoplexia spasmodica, &c. Quæ omnia per consensum, quem ventriculus, vi patris nervorum vagi, cum capite fovet, contingunt: cujus etiam cum pari quanto connexio in causa est, quod vomitus excipiant difficilem denitentionem.

§. XXIX.

Inter causas à causis externis.

Ad externas magis causas, quæ ventriculum contempnendo, ac irritando, vomitum movent, referri meretur mucronata cartilaginea depressio: quales casus BARBETTE *anat. Lib. I. cap. 4.* & DECKERUS *præf. Barbett. pag. 126.* recenset. Haec ob causam virginis etiam, quæ rigidis illis lignis, quæ *Planibene* dicunt, sua præcordia coarctare solent, ad vorandum sunt faciles. Huc quoque pertinet vomitus imaginatioris, qui ex visis, aut tantum auditu perceptis ingratissimis rebus suboritur. Non minus hoc loco commemoranda vomitio est, quæ a frigore extrinsecus ventriculo admisso nascitur: item quæ à motu corporis vorticoso, & in navi à non assuetis insiliens prohibetur.

§. XXX.

Vomitus criticus.

Datur vomitus criticus, quando scilicet causa materialis, quæ ipsum produxit, ipso vomitu eliminatur, qui valde salutaris est, & interdum observatur in iracundiis, & cachecticis choleticis: nec non in febribus & intermittentibus & acutis, circa dies postissimum judiciales. Hac enim ratione ventriculus, duodenum, vasa hepatis biliaria, pancreas & intestinorum canalus atque glandulæ à fœcis & humoribus vinose ibidem collectis expurgantur, qui alias massam sanguineam ingredientem, varia insere possent mala, quæ ab istis foras projectis timenda non sunt. De tali salutari vomitu egregia sunt, quæ habet CELSUS *l. 1. cap. 3.* vomitus, inquit, *utilis est plenus & biliosus omnibus, si vel nimium se repleverint, vel parum concoxerint. Nam, si plus est, quam quod concoqui possit, periclitari, ne corruptum, non oportet; si vero corruptum est, nihil commedendum est, quam illi, qua via primum expelli potest, ejicere. Itaque, ubi amari vultus cum dolore & gravitate præcordiorum sunt, ad hunc potius con fugendum est.*

§. XXXI.

Causarum diversitatem producit concurrentia signa. Prænotis vomitus, cum dolore circa ventriculum gravativo, cruditates in primis viis harrentes, indicant: biliosi chronici, & periodici, nimiam ductum biliferorum laxitatem significant: chronici per multos annos durantes, cibos semicorrosos simul eructantes, viscerum cujusdam læsionem ac fixum portendunt. A calculo subortum vomitum colligimus ex juncto in regione lumbi doli dolore, cum urinae imminuto fluxu, & sabuli excretionem. Complicati vero vultus palliores, intestinorum dolores ac rosiones, cum frequenti ipsatione, nariumque pruritu, vermium suspicionem movent. Ceterum iudicio oculus est, ut ex aliis, quæ concurrunt, symptomatibus veram vomitus causam exploremus: quoniam hac latente, palliativa tantum conceditur curatio.

§. XXXII.

Omnis critica vomitio salutaria; symptomatice, mala, & ab acrimonia subtili causata, nervos vellicante, pessima. Omnis vehementer vomitus, periculo non vacat: movere enim potest abortum, excitare hæmiam, & non sine noxa ad reimpulsionem materiarum arthriticæ, podagricæ, ac erysipelatice disponere. Inde rupeum esse omentum prohibent ACT. MED. RESOL. *dec. II. vol. III. pag. 31.* ipsi quoque ventriculum lacerari, auctor est SANCHEZ *obs. præf. pag. 376.* Biliosi vomitus, maxime virides, portæ, æruginosi, metu periculi terrent, & inflammationem minantur. Vomitus qui fit à vermium, ventriculum atrodentibus, plerumque perniciosis: lethum prænunciat, quando lumbricus mortuus ejicitur, & antea gravissima symptomata & atroces artuum convulsionones simul & semel cessant, quod evenit, si sphæcelus superveniat, à quo etiam vermes necantur. Omnis quoque sticticus vomitus, quia internam corruptionem indicat, mali omnis est. Sebæcis corrosivi acidi humoris copiam, qua pinguis coagulatur, in ventriculo generari & plerumque intolerabilem ardorem seu sodam parere indicat.

Ubi ingens crassi instar bovinæ bilis bruno colore tincti humoris copia ad libram dimidium vel unam vel sponte vel arte evomitur, quod non raro in lentis febribus accidit, primum à ventriculo intestinum magna atonia adfectum esse, ceterum est indicium.

Vomitum ultra senescentie spem vel amplius continuus cum lento æstu & corporis extenuatione haud incertam ulcerosi ventriculi suspicionem alit: qualem casum ante quinquaginta annos, cum Minda Westphalorum antem exercebam, vidi & observavi dissecto post mortem corpore.

METHODUS CURATORIA.

§. I.

Quemadmodum vomitus criticus, quo humores copiosi varii generis rejiciuntur, salutaria est, & nullam exigit cure curatiorem, ut potius promoveri nonnunquam debeat: ita symptomatice, qui removende cause sæpius est minus accommodatus ac sufficiens, tanto magis sollicitam & proviam exigit curam. Et hæc binis postissimum absolvitur indicationibus, ut scilicet primum convulsivam illam, ac effluviem ventriculi motionem provide consopiamus; & deinceps causas materiales oppugnemus, iniqua medeamur.

§. II.

§. II.

Quo ma-
gis venen-
culi con-
vulsivos
spasmi.

Præ indicatōne satisfaciunt antispasmodica, roborantia, anodyna à lenioribus ad fortiora ascendendo. Sunt ejusmodi remedia crocus & casoreum in pulveris, essentia pariter, ac extracti forma; theriaca coelestis, cum pulvere succini & abforbentibus, cornu cervi, cancerum oculis, & corallus rubris maritata. Ex his confecti pulvres, cum aquis spirituosus ac vinosis, quales sunt aqua florum tilia, liliorum convallium, chamomilla, melissa, mentha, ceraforum nigrorum, cinnamomi &c. non sine singulari fructu adhibentur. Inter roborantia laudem merentur nux moschata, flores macis, cardamomum, cinnamomum, costus verus, caryophylli, cortices citri, & autentiorum, radices gentianæ rubrae, calami aromatici, galangæ, herba majoranae, rosamarinii &c. & ex his parata olea pariter ac essentia. Omnibus vero in hoc malo appropriatis & specificis mentha crispa palmas præcipit: nam ex ea paratum gennium oleum misce & sedanti & roborandi sine omnibus fere medicamentis potest admisceri. Ex anodynis efficacem non minus ac perquam tutam virtutem liquori meo anodyno tribuere possum, maxime si cum balsamo vitæ meo permisceatur. Et si denique potentioribus opus fuerit anodynis; in usum vocari possunt pulvres de styrae, WILDEGANSII & laudanum SYDENHAMII liquidum.

§. III.

Externa-
mente aff.

Ubi hæc adhibentur, non sine fructu conjungi possunt, topica regioni epigastricæ admovenda, quæ motum ferocitatem aliquantulum coercendi vim habent. Quo nomine commendari merentur, olea destillata roborantia mentha, caryophyllorum, nucis, absinthii, macis, de cedro &c. cum balsamo Peruviano in unguentum redacta, nec non epithemata, ex spiritu natri, theriacali, aqua Regiæ Huogariæ, essentia croci, & cataplasma ex spiritu vini camphorato, fermento panis, aceto vini acerrimo, balsamo Peruviano additis aliquot olei macis & menthae guttulis confici possunt. Non levioris virtutis est emplastrum de crusta panis, cum balsamo Peruviano, & una alteraque olei cujusdam destillati guttula malaxatum: quibus denique superimponere decet sacculus calidos & resolventes & roborantes. Perquam utile etiam est nostrum vitæ balsamum, præcordiis & regioni epigastricæ illitum.

§. IV.

Vomitus
potius
curatur.

At vero ludetur utique omnis opera, si his solum utamur, nec ad causam materialem tollendam simul respiciamus. Vomitus itaque, qui dicitur pituitosus, & à cruditatibus primarum viarum, hisque impacto mucosissimo dependet, optime curatur ipso vomitu, maxime si ille ad eliminandum peritus faburam non sit sufficiens, & magis molestus vomendi conatu, nausea ac cardialgia vexat. Tunc enim præmissis incidentibus, ac digestivis, ut salibus neuris, radice ari, & cumprimis squilla, succurrendum est leni emetico, quale constituit aqua tepida, butyro insulso permixta, & copiose hausta; vel etiam radix ipecacuanhæ in pulvere propinanda. Instantibus vero ex hæc congruato, vel mercurio intra finem ventriculi contento vomituentibus, convenit oxymel squilliticum, cum syrupo de rhabarbato mixtum exhibere.

Frid. Hoffmanni Oper. Tom. III.

§. V.

Biliofus vomitus, qui à digestionē labefacta proficiscitur, & fontem suum in duodeno habet, præter absorbentia & blanda laxantia mannata ac rhabarbarina, perfectam admittit sanationem, ex insaturatione roboris ventriculi ac intestinorum: quam remota sensim faburra, elixir nostrum viscerale, diutius, & cum conjuncta recta vivendi ratione, & corpora exercitatione usurpatum, feliciter præstabit. Et uti hoc biliofus vomitus genus chronicum est; ita magis acuti, & sapius fontici eventus est illud, quod à vehementiori ventriculi ac duodeni bilidiorum spasmis, ab iracundia concitato, originem trahit. Tum convenit bilis acrimoniam diluentibus, aculidis remediis, spiritu nitri dulci, ac vitrioli, absorbentibus, chlore solis, cancerum lapidibus &c. contemperare; spasmodicos vero motus blandis antispasmodicis ac anodynis delinire; junctis evacuandi sine, potiusculis rhabarbarinis. Ubi vero subest coagulatum aut calculus fellis: ei resolvendo non est præstantius subsidium thermis Carolinis, aut aculidis quibusdam tepide adhibenda. Ubi nimia vasorum hilarium laxitas vomituum chronicorum causa fuerit; conducunt roborantia, ex quibus palmam obtinent cortex chinæ, cascariæ, essentia gentianæ, & tincturae martiales, in aquis viuos propinanda.

Cura vom-
itus bilio-
sus.

§. VI.

Qui ab acri materia, nervis ventriculi insidente suboritur vomitus, & à retropulsa podagra arthritide, aut intus a cilio erysipelas natales mutatur: præter blanda sedantia, & motus expulsiōis materiæ minus proportionatōis coercentia, exanthematicæ materiæ revocationem exposcit. Hanc obtinere licet, dato pulvere diaphoretico, qui sanguinis motum una cum peregrina materia foras educit, eo felicius, si refracta camphoræ dosi ipsi addatur, & externe clystere, frictions, & pediluvia conjungantur. Ubi venena, vel venenati cibi malum produxerunt, nihil certius auxilium præbet, quam largifusus lactis, & pinguium potus, mox ab initio porrigendus; quo & siquale veneni obundantur, & hoc una cum liquido vomitu rejiciat. Hinc multis etiam Medicis in more est passum, ut vomitum, qui in peste, febrisque malignis à miasmata, tunicas ventriculi stimulante concitatur, data cum potu tepidiori sufficienti radice ipecacuanhæ adgrediantur, tamque acida cum diaphoreticis maritata exhibeant; sed cave, ne vomitum hoc in morbo concites, si jam inflammatio ventriculi præsto fuerit.

Vomitus
ab acri-
tate, &
venenata
materia
suboritur.

§. VII.

Sapius faburra acris, acida, biliosa, ad intestinorum volumen devoluta cum colicis doloribus vomitum excitat: quo in casu cretenus exhibere convenit 1) diluentia ac demulcentia, decoctum avenæ, cornu cervi, serum lactis, vel oleum amygdalarum dulcium ad aliquot cochlearia; 2) antispasmodica, ex quibus liquor anodynus mineralis cum aliquot guttulis olei macis veri maritatus, & cum aqua frigida exhibitus, omnibus palmam reddit dubiam; potest quoque laudanum Sydenhamii in usum trahi; aque etiam spiritus vitrioli rectificatus vel solus vel cum liquore anodyno mixtus, & cum aqua frigida propinatus, idoneum in vomitu, si tempera-

Vomitus à
faburra co-
retentus
curatur.

N. mentum

mentum est cholicum, remedium exilia, 3) blanda laxantia, quæ inter clysters cunctis reliquis palmarum eripuit, junctis oretenus mannat, rhabarbarinis, vel etiam salibus theriacum solutis. Clysters ex solo lacte parati, in verisimum præsentia sunt convenientissima: quibus etiam obviam eundem effrefolventibus amaris, atque laxantibus mercurialibus, si modo sub horum usu sufficiens lac aut oleum amygdalarum exhibeatur.

§. VIII.

*Preſervativa
autem mor-
bida.*

Præſervativa methodus locum habet maxime, ubi ex nimia primarum viarum laxitate cruditas perpetuas fit proventus, & inde periodicæ eveniunt vomitiones. Tum regio ventriculi, pariter ac dorsi circa peimam lumborum vertebra, cui per ligamentum quoddam annectitur ventriculus, ab omni frigore munienda est. Cibi saluti, acidi, crudi, infumati, dyspepti studiose vitari; nec pro potu cerevisia, sed decoctum quoddam, conjuncto vini veteris generosi, potissimum Burgundiaci, usu, adhiberi debent. Necer quoque nimis somnus; magis vero utilis est moderata corporis exercitatio. Ad tempus sub epulis elixiris vulnerariis uri; nec non balnea martialia, & remedia liquida ex marte parata usurpare expedit. Et denique per vices blando laxante canali alimentarem purgare juvabit.

CAUTELÆ PRACTICÆ.

§. I.

*Cautela
circa fru-
da etia de
roborentia.*

Vomitiones, materia nondum remota, adstringentibus & anodynis sistere velle, perniciosissimum est; sopitis enim motibus, graviora succedunt symptomata, magnæ præcordiorum anxietates, cardialgie, inquietudines &c. Quamobrem roborantibus, etiam ante excretionem materie danis, plane non cedere solet vomitus. Locum hæc remedia tantum habent, ubi motum magis vitium subest; nec amplius peccat materia, sive inter motum & materiam nulla est proportio, vel si hæc paulo subtilior, parcaque mole peccaverit, & motus vomibundi sint vehementiores.

§. II.

*Vomitus à
nisi con-
tra præcavi-
am emittit.*

Hinc si vomitus in infantibus præsertim ac pueris a tussis furina convulsiva, ob consensum quo ventriculus cum septo transverso pollet, provocatur: tunc omnino expedit sedantibus ac anodynis illum coërcere. Cui scopo serviunt syrupus papaveris albi, & rhododæ, extractum croci, oleum amygdalarum dulcium cum spermate ceti permixtum; nec non pulvis Marchionis, cum succino, cinnabari, & uno alterove grano theiæ: coelestis datus utilissimus erit. Extrinsecus alvo infundi possunt clysters; & pectus atque regio epigastrica inungi linimento, quod habeat butyrum majle viride & rubrum, axungiam tauri, vulpis, pinguedinem castorei, & pauxillum olei hyoscyami.

§. III.

*Cautela
tamen à
excessu
ut singu-
laris adfor-
mationem.*

Vomitus gravidarum ex regurgitatione sanguinis ad ventriculum, qualis etiam in puellis, formisquæ à menstruum retentione, & in viris ab hæmorrhoidum suppressione oritur; temperantibus, blandis laxantibus, clysteribus, roborantibus, & optime venæ sectione, aut extre-

tionum debita revocatione, profligari potest. Emetica his in casibus data veneni instar sunt, & vel eruentem movere vomitionem; vel, uti mihi aliquoties videre licuit, inflammationem ventriculi causantur funeflam.

§. IV.

Biliosus vomitus, qui post iracundiam maxime inter passum moventur, cum spasmus præcordiorum, caute tractandus, & curatio potissimum ad relaxandum spasmodum dirigenda est. Multis in hoc casu familiare est, vomitoria vel purgantia propinare; sed etiam atque etiam omnes sicciores horum Medicos, ut ab his summo opere abstineant remediis. Funefla enim non raro ex illis observavi symptomata, ac lethalem sæpernumero ventriculi inflammationem: quod prolixius olim in dissertatione de medicina emetica & purgante post iterum veneno deduxi.

§. V.

Quando conatus ad vomendum, quin ipse vomitus, circa tempus matutinum invadit, qui frequens esse solet, qui nimis spirituosus potibus, præsertim circa somni tempus utitur: tum & pulveres præcipitantes, acidam cruditatem involventes & ea, quæ digestionem promovere, ut pulvis stomachalis BIRCKMANNI, conditi cortices vitri ac aurantiorum &c. conveniunt.

§. VI.

A diuturno morore si chronicus, quem aliquoties observavi, certis intervallis exacerbat vomitus: præstantissimum auxilium deprehendi in analeptis & maxime omnium in balsamo meo sic dicto vitæ, epusque interno pariter ac externo usu, præsertim si æquali portione cum liquore anodyno combinetur. Non minus proficit balsamum embyonum, aqua cinnamomi cydoniata, ac vinum generosius.

§. VII.

Quando vomitus, tanquam symptoma, paroxysmis febribus jungitur, quod pluries evenit in quotidiana & simplici & duplici: convenit, si nihil contraindicit, lenem emeticum propinare. In variolis & morbillis facta eruptione critica sponte cessat, & mixtura ex aquis destillatis, succo limonium vel citri, & sale abstinui concinnata egregiam quandoque operam præstat, quæ etiam in tertianis, suo usu haud caret.

§. VIII.

Ex calculi dolore abortum vomitus instar omnium, liquor meus anodyno mineralis, vel spiritus niri dulcis bene preparatus sicut ac consumit. Conveniunt quoque clysters oleosi, balnea aque dulcis, nec non oleum amygdalarum dulcium, interne sumuntur; atque antispasmodica. Vomitus herniosorum, ac iliacorum raro remittit, nisi emolliantur atque reponatur tumor herniosus.

§. IX.

Equidem HIPPOCRATES *l. VI. Epid.* vomitum vomitu curari scribit; quia vero alias contraria contrariis curantur, nonnulli Medicorum hoc dicto similia similibus curari posse existimant. Sed error est: si enim vomitus vomitu curatur, etiam per contraria fit sanatio: nam sæpe iste fit à viscoso humorum ibi stibulante saburra & male concoctis in ventriculo succis, quos

*Emetici
post re-
cursionem
pejorem
sunt effi-
caces.*

*Vomitus
morosus non
destituitur
curatio.*

*Vomitus
chronicus à
materia
causatur.*

*Vomitus
febrilis
curatur.*

*Vomitus à
calculi ca-
usa.*

*Ubi vomitus
vomitu
curatur.*

quos natura extrudere sua sponte molitur. Quod si non sufficienter valet praestare, arte adjuvanda. Quapropter monendi sunt tirones praestici, ne hoc dicto abutantur, vel illud perperam applicando obfist. Nam pessime peccare possent, qui ubi acris caustica materia ventriculi tunicis inhaerens, vel sanguis in vasis stomachi stagnans vomitus causa esset, eum vellet arte praeterit paulo activioribus proritare.

§. X.

Quies se-
dit vomit-
um.

Ad vomitum nimium sedandum plurimum juvat in lecto jacere & quiescere; nam corporis commotio protinus eum irritat & auget: quae observatio in praxi multum usus atque utilitatis adfert.

§. XI.

Vomitum
febrilem
exanthema-
ticum cau-
ere.

In febrim exanthematicam principio e. gr. pestis, erysipelas, variorum natura saepius molitur vomitum, qui nequaquam silli vel adstringentibus tractari debet: sum utilia sunt, quae leniter cuticularem excretionem procurant: nam ubi exanthemata in corporis superficie apparere incipiunt, sponte vomitus cessant.

§. XII.

Vomitum
hystericum
cauere.

Vomitum hysteriarum contumaces non repente debent cohiberi per medicamenta opiata vel adstringentia: vidi vehementes annuum convulsiones & miras praecordiorum anxietates successisse: quibus cessantibus vomitus redibant.

§. XIII.

Vomitum
a
ventriculi
debilitate.

Ubi vomitus frequentiores stomachum infestant, eumque infirmum reddunt, ciborum & diatae exacta est habenda ratio: praestat parum cibi & tantum idonei, concocti facili, sed crebrius assumere: quibusdam lac dulce cum pane candido confert, sed non omnibus: potum aquae fontanae purioris & frigidae ad firmandum stomachum & a vomendi consuetudine praeservandum plus, quam aliud potus genus conferre, experientia edoctus asseverare possum. Vinum Gallicum dictum Pontac generosum & adstringens, item Burgundiacum pra aliis & maxime vino Rhenano, quod hypochondriaci praeterit minus utile, eligendum est: iuscula ex carne assa meliora, illis quae ex elixis parantur.

§. XIV.

Vomitum
a
represso
aeris
cauere.

In morbis ubi natura motu quodam salutari critico in infesto humore ad corporis superficiem propellendo occupata est; sicuti evenit in arthritici, erysipelacis affectionibus; cautissime externa sunt applicanda, & inter haec praecipue camphorata. Vidi non semel a spiritu vini camphorato, certis in casibus utilissime applicato, corporibus infirmis podagra, hepeticide, pleuritide spuria, quae etiam rheumatismi species sunt, relegata inde materia nocente ad ventriculi & intestinorum nervos tunicas vomitus, & cardialgias singulofas summe anxias inde aborta fuisse. Quo casu si quis imprudenter adstringentibus & opiatis vomitiones silire, vel purgantibus violentam materiam per alvum depellere vellet, in profectio quam facile in corporibus infirmioribus lethalem inflammationem inducere poterit.

§. XV.

Cautio
vomitus
gravidarum
cauere.

Immoderatio & diuturnior gravidarum vomitus, qui prioribus maxime mensibus fit, praefid. Hoffmanni Oper. Tom. III.

fertur in iis, quae tum veneris usui nimium indulgent, & plethorice sunt, sanationem per spirituosam, stomachum roborantem, vel adstringentia, aut opiata minime recipit: sed iteratas sanguinis missionees in talo & quietem animi & corporis exigit. Ego potu aquae fontanae purioris frigidae, plus in eo, si nimius est, & abortum minatur, sopiendo, quam aliis remediis praestici. Quando vero analepsi opus est, unicum cochlear aquae cinnamomi cydoniatae a cibo sufficit.

ENARRATIONES MORBORUM.

OBSERVATIO I.

Vir xxx. circiter annorum, iracundiae supra modum indulgens, jam aliquot abhinc annis, magnis imi ventris torminibus, vomitione pleurumque stipatis agitatus fuit. Laxantia, & cumprimis pulule polychrestae consueperunt quidem semper hoc malum; sed ex levi causa iterum recruduit. Et per novissimum semestris faevi in umbilicali regione dolores, cum gravi cardialgia, atque acidis vomitibus quotidie ferme invaluerunt; adeo ut licet interdum per unum alterumque diem conquiescerent, paulo tamen post eo acerbius infellebant. Vomitu primum reddebantur ingesta minus digesta, post vero humores acidi, pontici, suporem decitum, ardoremque facium inferentes eructabantur: quid? quod niger interdum vomitus magna in quantitate exciperet. Cunctis vomina rejectis; levabantur dolores; hi vero, iustis iterum cibis, statim redibant cum borborygmis, & fluctuatione abdominis conjuncti. Alvus subinde semper erat laeva, nec nisi suppositoriis laxellata respondibat; de urinae parum mcebebat. Si vomino per aliquot succellide dies urgebat, lecto protius alius erat miser: contra vero vomitibus per quosdam dies silentibus, mox recuperabat vires, & magno fruebatur adpetitu. Tandem accedebant oedematosi pedum tumores, & abdomen infra umbilicum durum erat, tensumque. Quo in rerum statu me accedebat, mentemque anxius flagitabat opem. Ego nihil nisi suspicatus, praeter pulverem absorbentem, ordinavi blanda laxantia, & elixir viscerale balsimicum: quod, licet primum levamen ferre deprehenderetur, paulo tamen post jussio videbatur calidius. Hinc solum carationis abruptus, & mali sui majora indices perentificabant incrementa.

Epistola.

1) Quoniam in praesenti affectu urinae parcius reddatur, alvus obstructa est, vires consumtae, abdomen durum tensumque, & pedes tumidi sunt: iussuine accutior caechexia, in tympanitidem, vel hydropem ascitem vergens, & vomitus conjunctus recte vocatur caecheticus.

2) Tale malum suum originem a tono ventriculi & intestinorum prolixo defecto & inverso repetit; nec paucam laevi hepatis aut lenis solpitionem movet. Hinc coit fit, ut primum omnium languescat digestio, quae cibi assenti mox indigesti redduntur, aut in cruditates viscidas, acidas, & a permixta bile quae stagnando iners reddiunt, nigras delinquant: quae accumulata tormina intestinorum pariunt, tumque vomitu rejiciuntur.

3) Neque enim adpetentia, quae sub vacuitate vomitionum gavius est zger, a naturali ventriculi robore, atque vigore suos moratur natales;

natales; sed non nisi ab acidis primarum viarum cruditatibus derivanda est.

4) Si consilium experientiam, deprehendimus, rarius convalescere cachecticos, vel etiam hydropicos, qui omnia ingesta, sive sint alimenta, sive medicamenta ore rejiciunt. Namque ex alimentis nihil omnino retinetur, aut sane partim, & ne hoc quidem, quod in chylum commutatur, ob bilis ac liquoris fermentativi inertiam, motusque peristaltici debilitatem, in succos generosos ac spirituosos transire potest. Inde vitales humores acres redduntur, ac sicciores, motusque intestino assidue perennante magis attenuantur: quomobrem calor tandem hecticus, ingens languor, & debilitas corporis, tabes, ac ipsa denique mors sequuntur.

5) In tali rerum statu, est quidem omnino moleste locus, ubi nondum invaluit visum: quando vero atonia nimis jam cepit vires & viscerum quaedam lesio accessit, frustranea certe est ac irrita omnium medicamentum efficacia. Tum enim nec thermæ, quæ alias in ejusmodi morbis adhuc recentibus tollendis sunt efficacissimæ, tuto adhiberi possunt; tantum abest, ut earum usu hydropem, atque mortem magis acceleremus, quoniam debilitas partium solidarum impedimento est, quo minus hausta aquarum moles iterum excernatur.

OBSERVATIO II.

*Femina
post vomitum
alvi dejectionem.*

Virgo xx. annorum, vitæ sedentariæ addicta, & potu parciore more sequi solenni usâ, ob menstruum minus ordinatum fluxum, sumit aliquando per quosdam successives dies infusum purgans, quod sola semæ sine stipitibus, helleborum nigrum, polypodium, betæ uterina, cephalica, & species aromaticæ habebat. Inde alvum quidem copiose deiecit: at quum absoluta potatione, ita exardesceret, pauloque post fructus horreos ingurgitaret; prehendebatur enormi vomitu. Hic enim per plurimos dies contumaciter infillebat, & assumpta quævis, alimenta pariter, ac medicamenta eruebat; languentibus sensim viribus, & alvo exillente obstructa. Quare consilium ego injiciens curavi clysteres emollientes, cum liberaliori salis communis dosi, fluitu loci remissos; & regioni præcordiorum imponendum chartæ bibulæ balsamum vitæ meo imbutum frustum. Intrinsecus dedipulveres temperantes ex lapidibus cancrorum, nitro, pauilloque theriacæ coactis compositos; hosque cum liquore anodyno alternari jussi: quibus obtinui, ut pauco tempore hac adfectio molestissima cessaret.

Epigris.

1) Notari in hoc casu meretur, quod alvi dejectiones à purgante concitatas, enormes experient vomitiones. Fieri hoc solet in ejusmodi potissimum subjectis, quæ impuros succos, & præsertim copiosam in hepate collectam fovent bilem; quippe quæ, si vitæ sedentaria, potus parcior, ac quum defectus accesserint, ad vehementes tam per alvum, quam vomitum excretiones, valde sunt proclivia; longèque magis si levis irritatio, vel per sanctum purgans, vel vomitorium, vel exardescensiam, vel etiam cibos fermentescibiles facta fuerit. Tum enim fit, ut non modo contenta ventriculo & intestinis actu inæstentia rejiciantur; verum etiam colluvies viscerum humorum ex toto

corporis habitu, ad adfectam partem ruat, ibidemque subtiliorem serosam portionem dimittat.

2) Item consigit in nostro casu: postquam enim infuso laxante alvus nimium irritata fuit; hujus excretionis cessante, remansit utrique aliquis ventriculi ac intestinum debilitas. Quum itaque gravis paulo post accessit irascundia, cuius vis in spasmodica primarum viarum strictura consistit; ac subinde fructus horæ assumi fuerunt: hi, adaugendo motum fermentativum, stimulant nervos ventriculi tunicas. Unde non solum intestinum peristalticum, testante alvi obstructione, inversa; sed omnis fere ex toto corpore humorum motus ad ventriculum directus est: quare non potuit non contumax ac diuturna infestare vomitu.

3) Quod si igitur tali in casu, injectis clysteribus, & hinc procurata alvi dejectione, humores à ventriculo derivemus; bilis hujus saburram datis temperantibus obdundamus; effluens motus, exhibitis blandis anodynis consopiamus; & applicato extrinsecus balsamo vitæ debilitatum ventriculi robur instauramus: vitæ fieri potest, quin brevi tempore nostris votis potiamur.

OBSERVATIO III.

Vir obesus, L. annorum, corpore aliquando insigniter calefacto, frigidum copiose ingererat potum, ipsumque ventriculum frigidiori exposcebat aura: unde statim vehementer debilitatus, appetitu deieciatur, astu præternaturali trebatur, & assiduus torquebatur vomitionibus. Hos Medici coercere molientes, propinabant remedia adstringentia, opitata, & electuaria ex conserva rosarum, hæmatite, spiritusque virgii parata. Verum incredebatur magis malum, & per sex durabat hebdomades; tum enim vires proterebantur, corpus contabescere, frigoreque percelleretur, continuus circa ventriculum vexabat dolor; alvus contumaciter adstricta nihil ferme reddebat, & urina, quæ primum flammæ erat, clara limpidaque sine sedimento mungebatur. Data nervina & anodyna ad tempus silebant vomitum, sed mox sequebatur insignis præcordiorum anxietas, non nisi à recurrente rursus vomitu mitigata: injecti etiam clysteres hunc revocabant. Quare ad sudorem elicendum, exhibebatur infusum calidum herbarum menthar, masticis, ac cinnamomi: at ejus ne guttula quidem promanabat, licet antea magnam sudandi proclivitatem habucri. Adaugebat potius hoc infusum vomendi vehementiam; accedebat vertiginosa molestia, atque tandem mirum in modum emaciatus, transactis sub hoc malo duodecim hebdomadibus, animam expirabat.

Epigris.

Nihil est, quod tam vehementer & tam subitro naturalem ventriculi functionem, motumque & tonum valet destruere, ac valde frigidus potus corpori calefacto & sudore diffusum copiose ingessum; utpote qui sanguinem in ventriculi valis mox coagulat, ejusque liberum progressum sistendo, permulta de horrenda, quæ innumeris mihi constant exemplis, incommoda producit. Inde enim spastica & anxia circa præcordia stricturna & angustia, nausea, inappetentia, vomitiones, phlogoses, & exaltationes sanguinis moleste succedunt; quæ nisi convenienti medicina arceantur, vel cito in inflam-

*Femina
post vomitum
alvi dejectionem.*

inflammationem vel in exulcerationem, in hec- ticam febrem transeuntem, uti in nostro casu factum, terminatur. Ex eo jam liquido patet, quam imperie & imprudenter Medici illi agant, qui mali originem non attendendo, crebras vomitiones de dolore adstringentibus & opiatas compescere volunt; cum potius, ubi talis sub- est causa, que cruorem fundendo & resolvendo, liberiores sanguinis per vasa circuitum pro- movent, convenientia remedia & interne & externe cito admovenda sint. Tanta fuit in no- stro aegro spasmi in ventriculo potentia, ut val- de remotas etiam nervosas partes, vias nempe urinarias, ceterum corporis cutaneum & opit- cos in cerebro nervos in consensum five similem spasticum motum pertraxerit. Verissimum enim HIPPOCRATIS est dictum: *Ventriculi con- fusio omnium confusio.*

OBSERVATIO IV.

Vomitus à
bile in
duodeno
passus
me.

Generosus vir xxx. annorum, acutioris inge- nii & constitutionis cholerice, profundis men- tis meditationibus in mathesi & philosophia su- pra modum inherens, ingenem toti corpori contraxit imbecillitatem. In regione epigastrica per intervalla tensivas & spasticas contrictio- nes, & vomendi conatus periecit; que pathe- mata per excessum in vino non parum aucta fuerunt. Aliquot jam per annos de dolore ten- sivo & ardente in dextro hypochondrio verius scrobiculum cordis conqueffus est. Tussi quo- que catarrhali, hiemali præsertim humido tem- pore, crebrius est obnoxius. Per annum vero & amplius singulis fere mensibus, vehementi in dextro hypochondrio præcedente dolore & spa- smo, vomitus, quibus copiosa de viridit bilis eji- ciunt, experitur. Postea evacuatâ biliâ illa sa- bura appetit & melius habet. Interdum etiam circa regionem lumbarem periecit dolorem, & post largiorem vini potum multum sabuli per urinam secedit. Penit nuper hic eruditus vir, cum hanc urbem transiret, à me consilium. Ego suasi ut proximo vere vel acidulas Schwal- benses vel thermas Emfenses ipsi vicinas bibe- ret, & a seris ejusmodi & profundis mentis stu- diis abstraheret, & aquam per potu ordinario cum quarta parte vini dilutam biberet. Care- rum quia alvi erat adstrictior, frequentioreni passularum rhabarbarinarum usum commendavi.

Epirisus.

Causam hujus vomitus biliosi & periodici ego a bile in vesicula felles nimium congesta & stagnante deducendam esse existimo. Mea namque est sententia, in hypochondriacis, in quorum numero etiam præsens aeger est, bilem viscosiorem nimia sæpius in quantitate in vesicula felles colligi, ubi deinde mora acrior redditâ, motu peristaltico, quo etiam gaudet hæc capsula, inverso, copiose in cavitatem duo- deni effunditur; idque non tantum in vesicula felles, sed etiam in ductibus hepaticis biliosa fieri, ut nimis infarci & distendi à stagnante humore bilioso cum impetu & vehementia sese interdum exonerent, autumno. Cumque sæpe in similibus à copia stagnantis bilis in suis receptaculis enatis affectibus, non sine insigni fructu aquis medicatis mineralibus, utpote que hepatis obstructionibus referendis & expediendis aptissimæ sunt, usus sum; ita quoque hic

Frid. Hoffmanni Oper. Tom. III.

in vomitu bilioso periodico tollendo egregium effectum ab earum usu repetendum fore judicavi.

OBSERVATIO V.

Splendida persona, annorum L. constitutio- nis tenerioris à multo jam tempore ventriculi inflatimibus laboravit, adeo ut circa scrobicu- lum cordis tumor instat ovi gallinæ conspi- ceretur; & alvus ordinario esset pigrior. Hic vir magni nominis ætatis mensibus ob loci mu- tationem & peregrinationes frequentiores satis commode habebat. Cum vero autumnu fructi- bus horæ succulentioribus, præcipue pomis Per- sici, & uris maturis incredibili in quantitate veleretur, per totam fere hiemem aegrotabat. Aliquot enim à prandio horas tensiones circa præ- cordia cum vomendi conatu, extremorum frigore & corporis lassitudine experiebatur; postea vomitus successerant valde pituitosi, qui quando paulo largius vinum Rhenanum bibebat, erant acidissimi, ut dentes stupefacerent, & argentea vasa viridi colore inficerent. Nunquam autem vomitus vehementiores fuerunt, ac si alvus ad- strictior, & constitutio aëris aquilonaris esset, aut si cibos induratos, pingues, quibus delectabatur, supra modum assumeret. Vomitus interdum erant nigricantes, qui Medico & adflantibus suspicio- nem cruoris intermixti afferebant. Sed ego postea in consilium vocatus, cum tales vomitiones & amarum viscidum ex bruno-nigrum observarem, eam ab aëque phlegmate liberavi, & in cochleari argenteo, sacra evaporatione, exsiccavi; que flammæ admodum ardebat, minime vero foetorem falsi volantis, qualem sanguis accensus spargit, naribus exhibebat. Accurationis itaque sacra in- quisiitione, ante quatuor decosculum succola- dæ splendidum hunc vinum potasse intellexi. Quare ex hoc vomitus, qui putabatur cruentus, causam clarius aperui; præsertim cum cognosce- rem ex familiaribus, crebrius aegrum uti hoc de- cocto, & vomitus semper esse graviores, quando tussis catarrhali infestaret, alvus esset strictior, & ipsi ad forum conciliandum destinati uter- retur pilulis. Ceterum integer erat appetitus, sed vir splendidus non modo æteticas leges speme- bat, verum nec cuspis generis medicamina, utut ipsi proficua assumere volebat. Interim op- timum levamen a potu aque frigida, pulvere la- pidum cancrorum, & essentia corticum aurantio- rum cum julepo quadam sumta peresentebat; atque etiam à potu thermarum Carolinarum egregium experiebatur auxilium.

Epirisus.

Frequentiorum, quibus hic aegrotans adfec- tus est, vomitionum origo non nisi magnæ ven- triculi ac intestini duodeni atoniæ, ac debilitati, quam fructus horæ, insigni copia comestâ, ni- mium auxerunt, in acceptis est ferenda. Quan- do enim vinus harum partium peristaltica de- structa & labefacta est; flagrant in diuturnitas, ac biliosi humores, & ob eandem immu- tationem moram, corruptionem potissimum acidam subeunt; talis itaque mole pariter ac acrimonia novâ colluvies stimulat nervosas tunicas, eas- que ad motum præternaturalem, vomitus cau- sam proritat. Decernur præterea ex hoc casu, vomitus nigros non semper à sanguine, in ven- triculum effuso, suos natales mutari; nec quovis periculi metu terrere: sed sæpenume- ro ab alia causa proficisci, que hoc in affectu

N 3 potui

potui succoladz debetur. Quapropter opus utique est, ut ejusmodi amurcam vomitu rejectam, Medicus rerum physicarum atque medicarum probe peritus, per commoda experimenta rite examinet, tumque demum judicium de ea ferat.

OBSERVATIO VI.

Vomitus diuturnus à vomitu ali debilitate post febrem ordinem relicto.

Vir annorum XL. arti venatoriz deditus, naturæ robustioris, ante quadriennium, vehementi motu & cursu diutius continuato defatigatus, sudoreque diffusus, ad resurgendum litis incendium, frigida cerevisia hauritum largiorem ingurgitavit. Iude vero factum est, ut protinus cunctis visibus dejectus, prævia horripilatione, in continuum ardenssemque febrem, assiduus vomitionibus, præcordiorum anxietatibus, atque delirio slipatam incideret; quæ per sex integras perdurabat hebdomades. Quibus elapsis, naturæ magis beneficio, quam remediorum, quorum pauca assumerat, ope, divina favente gratia convalescit. Verum alibi tanta infirmitate affectus permansit ventericulus, ut huc usque crebris vomitibus, cum nausea junctis fuerit obnoxius. Hi enim priori biennio, singulis binis hebdomadibus infestabant; post hæc autem quovis mense redibant, & hunc morem adhuc dum servant, insilz febrilium semper invadentes accessionum. Namque primum circa epigastrium regionem & hypochondria tensum, ac gravatum perferat dolorem, quem horror & refrigeratio pedam manuumque, mox totius corporis excipit; hanc sequitur ingens cum vomitibus æstus, atque tum magna humorum, & interdum puræ lymphæ copia rejicitur: qualis paroxysmus per duodecim circiter horas adigit. Simulac ille invadit, lectum petere tenetur ager, seque quietum continere; quoniam ad levem corporis agitationem, cum crebrioribus vomitibus, majores junguntur præcordiorum anxietates. Reliquo tempore adest quidem aliquis appetitus, sed non nisi cibos coctus faciliores, jussula, ova forbilia, pulvis ex oryza, milio, & lacte confectos, aut fructus horaræ & varias olerum species cocta assumere potest: Contra carnes, cumprimis insumatas atque pisces non solum magno averfatur fastidio, verum majores quoque ex illis sentit molestias. Si frigus adveniat corpori, aut vehementiori animi indulerit pathemati, protinus revocatur mali accessio; quæ finita, satis bene habet, suoque commode fungitur officio. Quam meum peteret consilium, jussu, ut parum aquam simplicem cum quarta vini parte remixtam haberet, & ob alvi, de qua conquerebatur, signum, insusum rhabubarum cum pulvis interdum fumeret; præterea vero elixirio meo viscerali, cum extracto absinthii, & aliquot ballami vine guttulis permixto uteretur.

Epicrisi.

1) Gravia sunt, & innumera mala, quæ à potu frigido, improvide, & corpori calenti ingestio proficisci deprehenduntur. In hoc enim ægrotante inde pullulavit febris acuta, vomitibus slipata, quæ posthac, finita febre, certis paroxysmis redeunt, per integrum durant quadriennium.

2) Deinceps ex hac morbi historia adnotare licet singulare robustioris naturæ exemplum; quo noster ægrotus febrem acutam, cum delirio, & procul dubio ventericuli inflammatione

junctam, perque sex hebdomades inharrentem, adhibitis paucis medicinis superavit; quam vel centum alii, absque vitæ discrimine haud possident sustinere.

3) Notabilis quoque est, post hunc gravem mortuum relicta febrilis illa periodica affectio, quæ relictissime dici potest emetica. Nam originem suam repetit ex venterico, à subre dicta acuta, debilitato, & per periodos spasmodica constrictione, per totum corpus propagata, affecto. Ubi iterum peculiaris, & quasi individualis naturæ vigor est attendendus; quo, salutaris plane consilio, humores vitiosi, ob primarum viarum debilitatem in iis collecti, atque à sanguinea etiam massa ad eas conjecti, per vomitum expelluntur periodicum.

OBSERVATIO VII.

Vir annorum L. à continuis mentis laboribus, ac lucubrationibus valde defatigatus, & ad cachecticam fere deductus consumptionem, catarrhique & rheumatismis crebro obnoxius, novissime elapso autumno, post vehementiorem exacerbatum, prævis horripilatione, præcordiorum anxietate, & febrili æstu, gravi erysipelate, totam dextræ pedis tibiam occupante, corripiebatur. Vocatus Chirurgus pulverem ex farina fabarum, cerussa, bolo rubro, & cantharis paratum, pedi adplicabat; unde æstus tenuisvulque illius dolor evanescerebat quidem; ad anxietate præcordiorum constrictionem, summa spirandi angustia, vomendi molesti conatus, ac denique, prævio magno spasma, humorum limpidorum, ac pituitosiorum vomitionem, pressio sequelantur pede. Has accessus Medicus speciebus de hyacintho, cum terra Catechu, & aliquot extractis anodyni granis marizatis fopire studebat: sed paullo post accedebat summa virium prostratio, per assiduas vigilas, & inquietudines nimium in modum aucta; mox excipiebat singultus, per biduum inharrens, & undecima demum die mors vitæ finem imponebat.

Epicrisi.

Vomitus hic est symptomaticus à materia erysipelacea ad tunicas ventericuli retropulsa, easque ad spasmos irritante subortus. Quemadmodum vero natura in rheumatismis arthriticis, ac erysipelacis noxiis, & œconomiz animalis insensum humorem, maxime per corporis peripheriam evacuare annititur: ita quoque ad abigendas, quæ à repulsa tali acri materia proveniunt, molestias, nihil est convenientius, quam per antispasmodica & diaphoretica, eam ex loco, cui insidet, rursus excutere, & ad perspirationem disponente. Cui scopo obtinendo ego certe non præsentis liquore meo anodyno, liquori bezoardico nupto, unquam inveni auxilium. Contra vero nihil est perniciosius, quam ope adstringentium pugnare his in casibus, maxime omnium in corporibus, quæ impuria scætent succis, & virium insigni laborant imbecillitate: uni sunt fræces, & gravi ac diuturno quodam morbo defatigati. Complures profecto novi, qui per intemperativum externorum usum, præsertim si interne copiosa refrigerantia, salina, purgantia &c. fuerunt adhibita, citra suam & Medici opinionem cito occubuerunt. Eandem quoque censuram meretur campora, ejusque ipirius, in tumoribus erysipelacis discut-

Vomitus à vomitu ali debilitate relicto.

aiendis, tantis nominibus à vulgo Chirurgorum pariter ac Medicorum undique deprædicatus. Quamvis enim non omnem in ejusmodi affectibus camphoratis derogem virtutem; atamen vel centies observavi, quod si nimis mature, ubi in expellendo noxo humore adhuc occupata est natura, admota fuerint, vim extenuerint repellentem, infelici sapius successu. Nihilominus minus concedi optime eorum usum posse cenſeo, ubi ad exitum properat affectus, eo quidem fine, ut partibus per decubitus materię debilitatis pristinum reddatur robur. Quod discrimen ut probe observare discant omnes an naves operam, diligenter hortor.

OBSERVATIO VIII.

*Vomitus
ex angustia
duodeni
lethalis.*

Vir septuagenario major, nullis fere obſingulare nature robar per totam vitam aegritudinibus obnoxius, binis abhinc annis de dolore lumborum, inappetentia & lassitudine cepit conqueri. Hiemalis superioris anni tempore, ob causam coram judicio gerendam, Magdeburgum profectus; ob res ibidem non ex voto succedentes, non modo perturbato fuit animo; sed accedentibus etiam sub gelidissimo coelo crebris occupationibus, domum rediit, ingenti virium languore, ciborum fastidio, atque anxio & restrictio circa dorsum & cordis scrobiculum dolore, cum horridula & aestuosis, quæ alternabant, commotionibus stipato prehendebatur. Jungebantur intestinorum tormina, & contumax alvi obſtupatio; ac denique vomitus, quæ cuncta & alimenta & medicamina reddebantur, a cedebat. Dicebat enim æger, se intrinsecus infra ventriculum quandam perſentire angustiam, quæ liberum ingeſtorum transitum impediendo, eorundem ad ventriculum regurgitationem efficeret: quod si vero, ex liquidis quedam in intestina descenderent, protinus imi ventris sequi tormina. Præterea superveniebat inquietudo continua; nec ulla, utut alias efficacissima remedia, emollientia & antispasmodica, tam interna quam externa, quicquam ferebant levaminis; sed veniunt, singulis & apthia in cæli-hago & ore sensim invaleſcentibus, per quatuor fere menses pressus ægrotans, & tandem viribus carneque proſus exhaustus, dicim obit supremum.

Epigris.

Gravem hunc & immedicabilem affectum medici, vel ex calculo majori renibus inhaerente derivabant, vel calculo cyſtidi, ac ductui ſelleo finius impaſto attribuebant, eo potissimum symptomate ducti, quo æger spasmodicæ & doloris in dextro latere circa cordis scrobiculum percepit. Verum ego netus harum causarum, deficientibus, quæ illarum præſentiam indicarent, ſufficientibus ſignis, ſubſcribere potui; sed potius quandam interſtini duodeni circa flexuram in fine ejus angustiam ac coarctationem, liberum ingreſſus ad inferiora intestina transitum denegantem, malo causam præbuisse ætumnavi. Hæc autem angustia ingenti frigori, ad dorsum penetranti, non minus ac graviore exandeleſcentie deberi videbatur. Ubique enim continue & quotidiana ingeſtorum evomitiones inſeſtant; causam harum non tam in humorum intemperie, quam potius in vitio partium ſolidarum, & potissimum in angustia canalis, ſive in principio, ſive in fine interſtini duodeni, vel etiam

in ileo ponendam eſſe, multis rationibus convictus credo. Neque enim mihi, nec aliis auctoribus deſunt exempla, quod in duodeno, ileo, vel alio intestino, diſſectis corporibus, calloſa quedam obſtatio fuerit inventa; quæ dum tranſmittendis humoribus obicem ponit, & motus peristaltici inverſioni anſam præbet, atrocissima producti ſymptomata. Quemadmodum vero acre frigus ſenſibus corporibus generatim eſt inſenſibilem; ita præſertim ii, qui valetudinarii, & ſpaſmo obnoxii ſunt, à frigoris & venti aquilonaris ad lumbos acceſſu ſibi cavere debent. Ex anatomicis enim conſtat, quod circa initium lumborum ſitus & concaviſſus partium exquisitiſſimo ſectu præditarum reperitur; quarum læſio, totam omnino vitalem economiam turbare poteſt & pervertere. Occurrunt nimirum ibidem ſita oriſcium ventriculi ſiniſtrum, tendines diaphragmatis, ſinis & flexura duodeni, flexura coli, plexus meſentericus magnus, & ramus arteriæ meſentericæ: quorum omnium teneriori ſtructure frigus eſt inimiciſſimum.

CAPUT VII.

De Dyſenteria.

THESES PATHOLOGICÆ.

§. I.

AD ſpaſmodicos & convulſivos affectus ſummo jure etiam illa cruenta deſectio eſt reſerenda, quam, ſtrictius ſummo nomine, *dyſenteriam* vocant Medici, & quam per rheumatismum intestinorum cum ulcere CÆLIUS AURELIANUS, per ſibrium ad intestina converſam ſolentiffimus SYDENHAM haud ingente cognominatur. Ea enim reſpectu nihil eſt aliud, quam *motus intestinorum peristalticus*, ab inhaerente eorundem toxicis humoribus caustico, exulſerante, ad convulſivum uſque gradum auſcult, crebras deſiderans epidiſtatem, ſpaſmumque frequentem ſordidum mucoso-biliſarum, plus minus ſanguine, vel ſanie tuiſſarum deſectionem, cum vehementibus tormenſibus, ac febrili commotione ſtipatam inſerent.

§. II.

Diſtingui meretur hæc adſectio à aliis alvi fluxibus, unum torminosis, quos vocare ſolent diarrhoeas. Primum enim in his tormina tanta ferocitate in canalem intestinorum nunquam ſerviant, quanta quidem in dyſenteria ſoleo eſſe. Neque in illis cruenti reſiciantur humores, ſed vel picroſi duntaxat, vel biliſa colluvie permixti: qui à dyſentericis cruenti, ſaniſſi, putridi, ac ſordidiſſimi redduntur. Quæ deinceps ratione cholera diſcrepet à dyſenteria, ſequenti capite oſtendetur.

§. III.

Majori opus eſt judicio ad dyſenteriam à fluxu hæmorrhoidali, maxime torminosis, diſtinguendam: ſanguis enim, qui ſub hoc effunditur, ſincerus perſumque exiſtit, & ſtatorum ſæpernumero comitatur deſectionem; cujus excretionem tunc ſemper inſigne ſanitatis poſſe ſe trahit allevamentum. Contra vero in dyſenteria,

teria, sanguis inter atrocissima tormina, ac teterrimum molestissimum exprimitur dilator, raro sincerus, sed potius cum materia saniosa, spumida, ac foetida remistus, nec sui refectione ullum virium reliquit incrementum; tantum abest, ut in pectus sensim ruat valetudo. Raro etiam ab hac cruenta dejectione febris abest rheumatica: & denique peculiare, quo grassari solet, tempus, illam simul distinguit ab hemorrhoidali fluxu.

§. IV.

3) ab af-
fectu, &
mal de fu-
er dicta.

Convenire porro cum dysenteria videtur, atamen ab illa discrepat affectus ille, qui Lutetia Parisiorum endemius est, & quoscunque seire corripit advenas. Hic enim consistit in crebriori alvi dejectione, primum mucosa, deinceps cruenta; sed in eo differt a fluxu dysenterico, quod ei malignitate longe inferior, nec contagiosa, nec febre sipata sit; quolibet auti tempore invadat, & per longius tempus detineat aegrotantes, ita tamen, ut in publicum prodire, ac suis fungit queant officis: quae in dysenteria longe se habent aliter.

§. V.

Dysen-
teriae dispo-
sitis in be-
nignam &
malignam.

Ipsa vero dysenteria dividitur in benignam atque malignam. Illa diutius infestat, micus decurrit, & minus est periculosa; hac autem non modo contagiosa prae se fert, indolem, verum exitiosa quoque symptomata; ut febrem mali moris, summan virium jacturam, exanthemata maligna &c. habet conjuncta, & ad summum aegros perducit vitae discrimen. Non minus distinctio dysenteriae in rubram & albam notari meretur, & per longius tempus cruenti; in hac saniosa, filamentis carnosis, & ulcerosis lineamentis, ab intestinorum tunicis abradis, permixti rejiciuntur.

2) in ru-
bram &
albam.

§. VI.

Subiecta
dysenteriae.

Peculiaris profecto dysenteriae mortuus est, quippe qui transiit sporadicus, sed ut plurimum popularis exitus, tumque varios malignitatis gradus exhibet. Neque enim ulli sexui, nec aetati parit; sed tam feminas, quam viros, tam infantes & pueros, quam adultos & senes infestat, adeo ut nec teneri lactentes, in ipsis adhuc degentes in cubilibus, ab illius tyrannide sint immunes. Cumprimis autem malo huic sunt obnoxii plethorici, biliosi, & quorum ventriculus insigniori laborat debilitate; nec non eos gravius vexat, qui inordinata usi fuerunt dieta, fructusque horreos, immaturos praesertim ac fermentescibiles, larga comederunt quantitate. Prae aliis etiam dysenteriae ferocitatem experiantur, qui se calefactos per noctes potissimum frigidi exponunt aere: unde multibus in castris degentibus maxime familiaris est, & audit castrens; atque cum per Pannoniam oras, saepius & atrocius grassetur, quaedam Pannonica solet adpellari.

§. VII.

Tempus,
quo con-
suetudine dy-
senteriae.

Attentionem quoque meretur ea tempestas, qua dysenteriae stragem edere observamus. De qua si consulamus HIPPOCRATEM; ille Sect. III. aph. 11. hiemem plus iusto frigidare, & fieriorem, ver autem pluviosum & austrinum, astitit dysenteriae praecedere; & aph. 12. hiemem admodum austrinam, & pluviosam, ver autem siccum & aequilum, iisdem producentis,

maxime favere scribit. Aestas huic male opportuna deprehenditur severissima, sub cuius finem, & autumnus initium, mense nimium Augusto, & Septembris, ubi post summum solis fervorem, interdiu molestum, noctes frigidores, ventisque borealibus forte sequuntur, malum excipit. Quare etiam, quo calidiores sunt regiones, eo frequentiores & graviores sovent dysenteriae; unde eadem Aegypti, Indis & Arabibus dicuntur endemicae. Conf. BONTIUS Lib. II. hist. nat. Ind. orient. Praeterea etiam mali moris dysenteriae solent grassari, quando ingens muscarum, erucarum, arancarum, & aliorum insectorum copia in aere observatur.

§. VIII.

Habitus
morbis.

Qui hoc malo corripitur, ante plenariam illius eruptionem diu de corporis lestitudine, ventre tumido ac molesto quibusdam in eo motibus congeri animadvertuntur. Quin imo jam a CALIO AURELIANO Lib. IV. morbi, chron. cap. 6. olim observatum legitur, quod dysenteriae plerumque vel diarrhoea, vel cholera, vel venter tumor antecedit. Ipse morbus tantum non semper cum rigore febrili, aut saltem quadam corporis horripilatione incipit, quam calor, plus minus acris ac vehemens, cum pulsu celeri, ac intensa furi sequitur, totumque morbi decursum comitatur. Rigorens febrilem, aut antecedit, aut certe mox excipitur atrocis imis ventris tormina; tum alvus fit lubrica, atque primis contentis in intestinis faeces, cruditates, mucosae humores; paulo post adiposi, ac secrete oleaginosi fucci, & denique spumescens materia, cum sanguine, vel sanie colorata, ac pelliculis, filamentisque tunicae remota, mole saepius exigua repiciuntur. Quibus subitanea quadam onus est ventriculus, illi nauseam, vomendi conatum, ipsosque vomitus pariuntur, & multos gravis cardialgia, & praecordiorum anxietas discruciat. Omnes adhibet perpetua desiderandi cupiditas, & tentus ani tenemus, ut non raro tadem plena sequatur ejuldem praecidentia. Cunctas vero dejectiones, quae sunt numerosissimae, & antecedant, & comitantur, & sequuntur crudelissima tormenta, non in uno loco fixa, sed per totum intestinorum canalem vago itinere progredientia; & sub quavis fide sensient molestissimum omnium quasi viscerum descensus: aliis evenit altes, utas in Leibe ist, unten mit dem grössten Schmerze heraus vollen. Ad hac perit omnis appetitus, summa urget inquietudo, somnus praedejectionem fugientis oculis eripitur, atque vires mirum in modum prosteruntur.

§. IX.

Hac ordinaria sunt dysentericonum symptomata; quibus malo incrementum, nonnullis longiore graviora junguntur. Namque quibusdam extremis frigescitibus, interiora uruntur, ardorifque & pulsationis perpetuus intestina torquet sensus. Accedunt singultus, sudores frigidi, vultus pallor, corporis macies, & inflammationes ac apthodae saucium inquinamenta. Quandoque, sed raro indolentium dysenteriarum casus occurrunt, ut in A. N. C. det. I. anno 11. aph. 43. & ACT. MED. HAFEN. vol. II. pag. 138. Interdum, ubi ad extrema ventum est, omnis dolor finalis & semel cessat, sicut veluti extincta perit, alvus praeter voluntatem redditur, cum fetore excrementorum graveolenti ac cadaveroso, pulvis sunt exiles, tumque mors prope dubia.

Mor-
bus &
vari-
us.

dubio ſequitur. Notari adhuc circa dyſenteriae hiſtoriam meretur, quod ſaepe numero contagiola exiſtat: ſic enim ex ſolo ſordium reſectarum odore, malum ad alios propagari, praeter communem experientiam, inſigni caſu teſtantur A. N. C. *dec. II. ann. VI. obf. 25.* Quin lac etiam matrum dyſenteriarum infantibus eandem labem afflicare, perhibent eadem A. N. C. *dec. II. ann. VI. obf. 195.*

§. X.

Dum adhuc in hiſtoria dyſenteriae tradenda ſumus occupati; unſe erit, quaſdam obſervationes de ſectionibus dyſenteriae perentorum proponere. Omnes itaque ſcriptores teſtantur, in ejusmodi ſubjectis inteſtina tam tenuia, quam craſſa, vel inflammata, vel ſiderata, vel exulcerata, atque bile ſuſſula poſt mortem fuiſſe reſerta: quemadmodum apud BARTHOLI-
NUM *Crit. VI. hiſt. 2. & BARBETTE Lib. IV. cap. 3.* pluribus videre licet. Speciatim pylorum cum inteſtiniſ tenuibus inflammatum vidit JOH. DE LA MONIERE *tr. de fluxu dyſenteriae pag. 4.* Inteſtina tenuia exterius bile ſuſſula, atque livida, intrinſecus gangrenata, adnotant A. N. C. *dec. II. ann. VI. obf. 104.* craſſa vero pari ratione livida, & gangrena afflicta, obſervant PLATERUS *Lib. III. pag. 875.* & RIVERIUS *Crit. III. obf. 2.* Idem PLATERUS *manuſc. obſerv. pag. 25.* deprehendit, ſelleum cyſtidem bile proſius vacuum; eadem vero ſinſta inteſtina ileon, atque colon, quae intrinſecus multis ſcanturunt ulcuſculis. BONTIUS loco balis in ſellea capsula reperit liquorem chylo ſimillimum; bilemque porraceam & fere gramineam in perſunctis hoc malo fuiſſe, teſtantur A. N. C. *dec. II. anno VI. obf. 103.* Nec denique exempla deſunt, quod in quibudam inteſtina plane coacta fuerint, inſult eorum, qui ſummo perierunt veneno.

§. XI.

Ex his autem, cum morbi noſtri ſymptomatibus rite collatis, ſtatim adparebit, quamnam vera illius ſit ſedes. Hanc enim conſtituit amplius inteſtinarum canalis; quae, notante SYDEN-
HAMIO *ſect. IV. cap. 3.* ſeriatim afficiuntur, donec tandem omnis malis via in rectum decumbat inteſtinum. Nam hoc idem praeter reliquis, & dolore morſicante, & moleſtiſſimo teneſmo, exercetur crudeliſſime. Neque vero negaverim, quoniam partes, maximeque hepar u. biſleri ductus, per conſenſum etiam experiantur multum tyrannidem. Ipſa quod attinet inteſtinam; deſiderari facile poſſet, quamnam eorum poſſimilimum diſcrucientur. Quod ſi enim proxime circa umbilicum atrox ſentitur dolor; ſique hunc tardior ſequatur deſectio; certum eſt tenuia laborare. Quando autem ad epigaſtricam regionem, ubi colon ſitum eſt, aut hypogaſtricam, atque hypochondria torminum via incumbit, ipſaeque faeces brevi poſt reſeuntur; craſſa laborare, in apico eſt. Ac ubi denique aliſſima fere, inanitas tamen deſidendi vexat cupiditas, aut mucus ſere tenax, viſcidus, paucus, acer, & virulentus promanatur; ulcus in recto conſiſtere inteſtino, vero videtur ſimillimum.

§. XII.

Inteſtinarum quod attinet fabricam, non quidem noſtri eſt loci, eam ſuſius explicare, multo

minus eorundem varium ſitum, flexuras ac denominationes ample recensere; ſed quaedam duntaxat momenta, noſtro ſcopo convenientia adnotabimus. Illa igitur tam gracilia, quam craſſa componuntur, atque ac ventriculus, ex quatuor tunica, quarum muſculoſa binis fibrarum, una longitudinali, altera ſpirali conſtituitur ſeriebus, earumque ope motum perficit perſiſtenter. Nerva tunica vaſis ſanguiferis ſcatet copioſiſſimis, adeo ut tunicam conſtituere videantur peculiarem; interne vero quam plurimis obſita eſt glandulis, quae per ſuos excretorios ductulos, ex maſſa ſanguinea in cavum inteſtinarum aliſſide ſecernunt humorem ſetoſo-mucaginofum, non illam modo, qui glutinis inſtar villoſae adhaereſcit tunicae, eamque pariter, ac ſubſtratum nervum ab aſſumtorum acrimonia defendit; verum quoque alium, magis excrementicium. Notari enim probe meretur, quod humores, ſpeciatim ſeroſi, pro diverſitate conſiſtentiae, in hoc vel illo loco, qui ratione magnitudinis pororum magnitudini excrementarum particulatum proportionatus eſt, ſecernantur. Sic ſubſilior portio per cutis ſpiracula exhalat; paulo cracioſior ad renes deſertur; & quae ſpilioſior adhuc eſt, ad inteſtina, tanquam amplam craſſarum for-
dium latraman demandatur.

§. XIII.

His expoſitis, ſcilicet jam erit, verum dyſenteriae genium introſpicere, atque ſymptomatum eam concomitantium rationem ſuppeditare. Formalem illius rationem, motu perſiſtente, ad ſumum & convulſivum gradum aduſcto, & exacerbato abſolvi, nemo eſt Medicorum, qui negaverit; quoniam atrocillima, & horrenda, quibus eo morbo correpti homines agitantur, dolorum tormenta id teſtantur claſſicis. Neque ullus eſt, qui inſicias iſerit, quin cauſa dyſenteriae proxima, in humore quodam acerrimo, cauſico, tunicas inteſtinarum vellicante ac ſtimulante conſiſtat. Qualis autem hic humor proprie ſit, & unde generetur; obſcurum adhuc multis videtur, adeo ut in varias inde abierint opinio-
nes.

§. XIV.

Veterum quam plurimi humorem illum colocythidis naturam emulati perhibuerunt: nec etiam, ſi effectus, quos ſumma colocythidis poſſa in corpus humanum edunt, quoque recepiſſet STALPART van der WIEL *obf. 41.* cum ſymptomatibus dyſentericis rite conſulerimus, multum a veritate abluere videntur. Deinceps contraria plerumque ſententia eſt, materiam dyſenteriae cauſam ſemper in cavo inteſtinarum conſiderari, & eſſe humorem acerrimum, ex fruſtibus horreſis, maxime immaturis collectum, cum reliquis ſuccis, praefectum biſſoſa conſentmentarum, atque nerveas tunicas vellicantem, atrodentem, & excoſiantem. Verum, licet non negaverim, quin ſuſcipiente hac concurrat cauſa, eandem tamen ſemper & unice peccare, praeter contagioſam dyſenteriae indolem, & illi reſuſtant homines, qui nullis omnino aſſumtis fruſtibus, eo rapiuntur morbo & teneri infantes, ubera adhuc matrum fugientes. Quamobrem alii ad maſſam quoddam conſeuerunt plane ſpecificum, cujus ea eſſet indoles, ut in cavitate inteſtinarum cum bile poſſimilimum conſentmentaret, tamque atrodentem. At nec huic in totum ſubſcribere poſſum opinioni;

ſectio dyſenteriae perentorum.

Dyſenteria ſectio.

Inteſtinarum fabrica.

Formalis ratio, & cauſa proxima dyſenteriae.

Auſterum ſymptomatum dyſenteriae rationabilis.

si vel id consideravero, quod nonnunquam tam acris per intestina effundatur humor, qui argentea corrodit vasa; inde vero nec tunica intestinalium excorietur, nec tam atrocia, uti in dysentericiis, excidentur tormenta. Neque enim sufficiens est exceptio, ac si in dysenteria primum villosa abradatur tunica, tumque vellicetur nerva: siquidem id ipsum ab alio quoque acri humore pollet fieri, & præterea experientia docet, tormenta dysentericorum statim cum morbi initio, priusquam abradi potuit villosum involutum, invadere.

§. XV.

Causa dysentericæ intestini, & symptomaticæ ratione.

Quomobrem, meo quidem arbitrio, vera materialis dysentericæ causa, cui crudelissima intestinum tormina, & reliqua symptomata debentur, relictæ potissimum in vasis sanguineis, tunica intestinalium nervum obfidentibus; & est materia quædam serolo-lymphatica mucescens, & cum particulis falsis, acribus, ac sulphureis; in massa sanguinea fluctuantibus, in lentum ac causticum magna coalescens; & interdum cum miasmate quodam peregrino, ab extra corpori illato, permixta. Hæc enim motu quodam setulæ, à constrictione corporis ambui, ad nervum intestinalium canalem, valculis sanguiferis plenum delata, parit acrimonia sua tunicas sensibiles nimium vellicat, rodit, & ad torminosas constrictiones proritat, partim lentore suo vasa, quibus intesti, insigniter, & ad rupturam usque dilendit. Unde convulsivum patet osigo, atque torminum; quæ eo redunt atrociora, quo plus acris laburæ in ipsa cavitate intestinalium simul continetur. Sub tanta autem illorum contractionibus non fieri potest, quin, quæ intus hærent, omnia effundantur. Postquam enim, quæ ex cibis relicta adhuc resstant cruditates sunt eliminata, continuante ipsino, ipsa mucago, villosam obducens tunica, vi abraditur, & cum stillante ex intestinalium glandulis humore, plus nimis noxio, in subpinguis ac oleaginosi muci forma exprimitur. Dum vero hæc sunt, & per consensum ductus quoque bilis, cum cythide felles vehementer concutiantur: hinc omnem suam bilem effundunt in canalem intestinales, quæ cum reliquo mucro per alvum redditur. Præterea perseverante membranacei titius canalis distensione, comprimuntur vasa sanguifera, cruore eo compulso, jam turgida; impeditur sanguinei laticis per venas regressus; eisdem, pereunant in tergo adfluxu, fit flagratio; & denum vel peruptio, ac extravasatio in intestina, unde stercora cruore tincta adjacent, vel periculosa eorundem suboritur inflammatio, ardoris perpetui, ac pulsantis sensu doloris internoscenda. Hæc inflammatio aut in ulcus saniosum abit, ipsam villosam depascens tunica, tumque sanica ulcerosa cum canicis deiecitur filamentis; aut plane in gangrænam, & funesalem definit sphacelationem; quæ præstante omnis dolor perit, & dejecta factorem spargunt cadaverosum.

§. XVI.

Causa procatarrhicæ seu sanæ, & illæ symptomaticæ ratione.

Quæ cum ita sint, explorandæ jam veniunt procatarrhicæ causæ, quæ producunt noxio humori, dysentericæ causæ, sunt opportune. Atque tres earum potissimum classes esse statuo, quarum prior in ipsius tempestivitate consistit ratione. Si videlicet æstus antecessit serventissima ac siccidissima; sub ejus finem, ubi plerumque

post intensissimum, qui per diem est, solis fervorem, noctes sequuntur frigidiores, grassantur dysentericæ; quales à nimia aeris siccitate subortas describunt A. N. C. dec. II. anno IV. obs. 24. Tum vero malum ea potissimum invadit subiecta, quæ per diem julio vehementius calefacta, sudoreque diffusiva, noctu auram frigidiorum, corpori minus tecto liberius admittunt. Cujus rei clarissima quoque est ratio: per diuturnum enim aeris fervorem ac siccitatem, massa sanguinis insigniter resolvitur, colliquescit, & sudor promanat copiosus, unde tenuiores, fluxiles ac blandi succi dissipantur, quibus orbatu reliqui humores mucescunt, acres, impari atque sulphurei redduntur, & ipsa debilitantur corpora. Quod si igitur corpori, ita confuso, nocturnus aer, qui asperior est, liberalius admittatur; confringitur inde cutaneus cortex: distillatio ulterior sordium adhuc tenuiorum ac sulphurearum præparatur; & hinc illæ cum mucescente lymphâ coeunt, in lentum & acerrimum abeunt crama, quod seculi motu ad intestina, tanquam amplissimum mucidarum sordium colatorium, delatum, parit dysenteriam. Tali quoque ratione causticissimus generatur dysentericæ; & omnino absque miasmati quodam maligni æternique concursus evenire potest.

§. XVII.

Quando vero cunque recensitæ aeris constitutiones accedunt quædam virulentæ indolis exhalationes, quæ alteram causam procatarrhicarum classem constituunt: tunc nascuntur dysentericæ epidemicæ, plus minus malignæ, ac contagiosæ, quales descriptas lege apud BARTHOLINUM Cent. II. hist. anat. 65. AMATUM LUSITANUM Cent. III. cur. 90. WILLISIUM in pharm. rat. P. I. pag. 119. & la MONNIERE trall. de fluxu dysenterico, nec non SENNERTUM in praxi Lib. III. part. II. Sect. II. cap. 7. Ejusmodi lues epidemicæ longe lateque sæpius vagantur, & longum terrarum occupant tractum: quid? quod FERNELIUS de abd. rer. caus. L. II. cap. 13. meminit dysentericæ anno 1538. per universam Europam populariter grassantis. Generatur vero talis miasmata vel in ipso aëre, ex malignis terrarum effluviis, ac peculiari ventorum constitutione; tumque per inspirationem hauriuntur, & intra corpus suscipiuntur: vel etiam cum cibis, maxime oleosis, ac fructibus horæ, venenata rubigine, vel insectorum, quæ tum temporis copiosissima in aëre observantur, malignis oculis obductis assumuntur, & cum chylo massæ sanguinæ permiscuntur. Notari vero meretur, in tali aeris constitutione, suscepta quandoque contagia per aliquod tempus intra corpus delectare; & expectare dumtaxat causam quandam occasionalem. Quomobrem sæpiissime mihi adnotare licuit, quod tum temporis levissima intestinalium stimulatio, vel summo purgante excitata, protinus efficit dysenteriam. Debetur porro malignis istis effluviis, ex corporibus dysentericorum vel per stercora, vel lac, vel sudorem exhalantibus, contagi, causa atque origo.

§. XVIII.

Tertiam causam procatarrhicarum classem exhibent, largius comesti fructus, maxime si immaturi fuerint, vel potus fermentativi desuper ingeratur. Ex his vi nociva eminent cerasa dulcia, mala persica, pruna, maximeque

n) in mif
mate cur
cap. 65.

si) in per
verse de
miste for
tum bar
perum
a) 6.

flava

flava illa, quæ vocant die Spillinge, quantum frequentem noxam præter alios offendit FORRESTUS Lib. II. c. 27. Huc quoque pertinent potus fermentativi, minus defecati, ut mustum, vel cerevisiæ, quæ tum temporis ob nimium solis ardorem, plerumque male constituta, & vel recentes, impuræ, crassæ, multique scæbis reſerte, vel minimam acceſcentes sunt, & coſtiosius bibuntur. Namque ejulindi subiecta, acri fermentante succo prædita, si in duodeno cum bile commiſceantur, acriorem cum ea ſubeunt conſermentationem, ex qua non modo vapores tenuiores accerrimi, intra humorum maſſam rapti; verum etiam ſordes reſultant craſſiores quidem, ſed cauſicæ indolis, quæ intra canalem inteſtinoſum remanentes, nervoſam corundem tunicam acerbè rodunt, atque tormina mirum in modum exasperant. Huic poſſibilem ſaburram, in ventriculo ac duodeno ſtagnanti, debentur nauſea, vomendi conatus, ipſæque vomitiones, quæ junguntur interdum dyſentericæ: à quibus ſymptomatibus immanes ſunt, qui abſque hac concomitante cauſa hunc morbum incurrentur; ſicuti teſtantur dyſentericæ anno 1726. noſtris in locis graſſatæ, quæ cum menſe jam Junio, ubi nulli nec maturi, nec immaturi adhuc fuerant fructus, ſuam tyrannidem exercuerunt, à vomitionibus vacuæ exiſterunt, quemadmodum in diſſertatione de iſi conſcripta ſuſius offendi.

§. XIX.

Circa hæc vero cauſam, notanda adhuc veniunt quædam momenta, nimirum 1) quod omnino ſolæ ſufficiant ad generandam dyſenteriam, quando videlicet vapores aciores, ex fructuum dictorum cum bile in ventriculo facta conſermentatione reſultantes, in maſſam humorum abſorbiuntur, qui laudabiles ſuccos corrumpendo, ad producendam materiam, dyſentericæ generatricem diſponant. Hæc vero, concurrente, tantquam occasionali cauſa, inteſtinoſum à ſaburra iſiſ inſixa ſtimulatione, motu quodam ſcibili ex ambitu corporis ad dictum canalem membranaceum devolvitur. 2) quod tali in caſu ventriculi ac inteſtinoſum accedere debeat quædam imbecillitas. Hinc enim ratio reddi poterit, cur multi fructivora dyſenteria ſine immanes, curque è contrario alii, qui illis fructibus aut plane non, aut ſaltem parcius ſeſcuntur, eo rapiantur morbo. Quod ſi enim firmius fuerit primarum officinarum robur, commiſſiſ etiam errores facile corrigentur, & noxia ſaburra vegete proſcribitur: at, qui debiliſ earum partium tono, acidiſque jam laburra, iſius ſiduloſum comite, ſunt inſtructi, deliciarum ſuarum graviſſimas utique lucæ cogenitur penas. 3) ſæpiſſime vero fructuum horarum, ac potuum fermentabiliſum immodicus uſus, tantquam concomitans dyſentericæ cauſa venit conſideranda; ita ut principalis vel à prohibita tranſpiratione, vel ſuſcepto contagio repeti debeat. Tum vero mali ſymptomata, unita binarum cauſarum vi, mirum in modum exasperantur.

§. XX.

Quibus ita præmiſſis, ad tradendam graviam ac truculentam noſtri mali accedamus prognofin. Dyſenteria igitur puerperis evenientes, ſunt periculoſe; indeſequè ſenes ac pueri frequentius pereunt, quam qui in media ſunt conſtituti ætate. vid. HIPPOCRATES ſeſt. II. textu 30.

SENNERTUS L. III. pag. 243. Ubi malum cachecticoſ, ſcorbuticoſ, phthiſicoſ corripit, aut debilioſes, & qui diuturnis animi perturbationibus ſe macerant, plerumque conſultantiam de iſi eſt: iſi quoque periculum minatur, quorum inteſtina lumbricis obſidentur. Quæ dyſenteria cum vomitu ſe exiſtit, & cui ſingultus accedit; magnum metum incutit, & periculo inflammati ventriculi terret. Neque minus mali eſt ominis, ubi excrementa viridia, nigra, & admodum graveolentia obſervantur, & veluti carunculae depiciuntur, notante HIPPOCRATE ſeſt. II. aph. 26. nam ulcus inteſtinoſum delignare ſolent. Quo magis vero, vel minus exulcerata ſunt inteſtina, eo graviſ vel minor eſt affectus. Poſſimum poro indicium eſt, quando inſuſa clyſmata mox iterum relabuntur, aut anus tam acriter clauſa exiſtit, ut nihil poſſit ingeri: namque illud paralyſin inteſtinoſum, maxime recti; hoc vehementem ſpafmum ejulendi ſignificat ſtricturam. Nihil etiam boni expectandum, ſi pulſio debiliſori exiſtente, exteriora frigent, interiora uruntur, aut hiſ nullus inſit doloris ſenſus; mentis alienatio, ſaucium inflammatio, apthæ, aut paralyſis totius ceſophagi præſito eſt, ut aſſumta cum murmurè delabantur. Illud quoque ſcire reſert, malum hoc nunc celeriter moveri, & ſi febris maligna præſentim ingraſceat, itape intra dies ſeptem vel novem vel quatuordecim necare; modo in plures, & ad quadragintaſum, ac ultra produci; longoque tempore, cum inveteravit, aut tollere hominem, aut etiam diu biatur, excruciat, uti obſervavit CELSUS Lib. IV. cap. 15. nec non ſæpius in hydropem ac hæmorrhoidem abire, advertente HIPPOCRATE ſeſt. VI. aph. 53. quin & in cæſticam non raro, tubum ac hæcticam inſanabilem mutari.

METHODUS MEDENDI.

§. I.

Vix morbus eſt quidam, ad cuius rationalem curationem, majori opus eſt medentis judicio, quam quidem noſter dyſentericus. Quam plurima enim ſunt remedium genera, quæ in illo commendantur; quæ vero non in omnibus ſubjectis eandem exhibent utilitatem; tantum abeſt, ut quæ huic proſunt, illi graviter nocere non raro deprehendant. Generatim hæc ſere ſunt medendi indicationes, ut *primum* materia noxia, acris, cauſica, quæſcunque fuerit, attemptetur, ac per emunctoria ipſi convenientia proſcribatur; *deinceps* truculenta inteſtinoſorum tormina, ac feroces ſpafmi conſopiantur; & *denique* ipſi inteſtinoſum ſubſtantia, vel exulcerata, vel nimis debilitata convenientibus ſuccurratur præſidiis.

§. II.

Quod ad priorem attinet indicationem; circumſpicere oportet prudens Medicum, num craſſiores in alimentari canale ſubſiſtant cruditates, quas partim commiſſas antea in victu error, & ingella fructuum horarum colluvies; partim nauſea, cardialgia, & vomendi conatus indicabant. Quo in caſu multis laudibus radiſcem Ipecacuanhæ extollunt Medici; ſi in morbi initio ad ſcrupulum unum vel drachmam diſſiam, cum lapidibus cancerorum maritata, hauſta deſuper larga aquæ tepidæ quantitate, exhibeatur, & ejus ope vomitus ciat, interdum iterum-

Momenta
quædam
circa hæc
cauſam.

Prognofis
dyſentericæ.

Indicationes
medendi.

Evacuatio
alimenti
per vomitum
per opus.

iterandus. Neque vero minus per inferiora educere convenit saburram acrem & crassam; & quidem felicissimo cum successu, per rhubarbarum in pulvere datum, & cum absorbentibus permixtum: quippe quod post detergentem ac laxantem effectum, vi quoque blande roborante, & leniter tonica intestina solatur. Nec parum utilitatis exhibent pilule balsamicæ, ad BECHERI, STAHLII, vel meam mentem paratæ, cumprimis si cum extracto rhubarbari commiscantur.

§. III.

*Acrimonia terribilissima de-
mutanda.*

Præterea operæ est pretium, saburrae intestina occupantis acrimoniam, & rodentem causticam indolem delinire ac demulcere. Quo quidam sine intus exhibenda sunt mucilaginosæ, oleum amygdalarum dulcium recens & sine igne expressum, spenna ceti recens minus rancidum, decocta hordei, avenæ, rasuræ cornu cervi, radicis scorzonerae, chinæ &c. emulsiones ex amygdalis dulcibus, pineis, & aquis diapnoicis paratæ; atque etiam serum lactis dulce ad meam consuetudinem methodum, nec non fons Selteranus lecti nupus asinino. Hæc enim & acrimoniam involvendo, & lubricas reddendo vias, votis faciente satis: quæ etiam scopum explent, simulque sordes ex crassis potissimum intestinis educunt, chylires pene emollicentes, quos ex aqua hordeacea cum surfuribus decocta, ex sero lactis dulci, vitello ovi, oleo chamamelis, amygdalarum dulcium, ac sevo hircino parare decet.

§. IV.

Diaphoresis promota.

Infimus quoque ad impuritates subiles, plura minus malignas ac contagiolas, in massa sanguinis adhuc fluctuantæ, attemperandas, pariter ac per corporis peripheriam educendas, febriumque conjunctam mitigandam, multa impendenda est cura; quoniam hac ratione affluxus talium sordium ab intestinis revocatur. Et hoc nomine insignem laudem merentur absorbentia, cum fixis diaphoreticis mixta. Sic parari possunt pulveres ex cornu cervi philosophice præparato, ulso, ebore fossili, terra sigillata, bolo armena, antimonio diaphoretico, item martiali, succino, lapidibus cancrorum, corallis rubris, matre perlarum, & præsertim crystallis montana; quibus urgente nimio aestu ac siti, nitrum refracta dosi, & ad refracuendum dolorum impetum, cortex calcarillæ, aut unum alterumve theriacæ coelestis granum pro dosi unica adijci potest. Cumprimis vero in expellendo niâsinate maligno, per contagium admissum, camphora dinidni duntaxat grana pondere cum nitro & absorbentibus mixta, præclaræ, ac excellentem possident efficaciam.

§. V.

*Alvus effrenata post-
modum.*

Proinde dictis hisce remediis, ad explendam secundam indicationem, & coercendum motuum nimios tumultus, interponi debent tiora anodyna, & miora subastringentia. Ex his vulgarissimis sunt theriaca coelestis, aqua theriacalis, diazordium FRACASTORII, pilule de styrace, & cynoglossæ, & WILDEGANSII, nec non laudanum liquidum SYDENHAMII. Longe vero tiores & præstantiores effectum quam plurimis in casibus exhibuit liquor meus anodynus, cum refracta ballum mei vitæ parte remanens; quem ter vel quater de die ad guttas viginti, summo cum fructu porrigere sovi. Hac quo-

que ob antispasmodicam virtutem referri meretur, aquæ destillatæ liliorum convallium, florum sambuci, tilia, aurantiorum, mentha, cerasorum nigrorum, ex quibus commedat superius pulveres propinari possunt. Neque etiam extensorum paregoricorum usus insuper esse habendus, ex quibus, si essetata sit torminum vehementia, linimentum componi potest, quod v. g. olei liliorum alborum unciam unam, mentha destillatæ, absinthii quod est magnum anodynum, nucis, carvi ana drachmam semis, camphora scrupulum habeat. Quod abdomini inunctum egregia ac secura virtute sistit intolerabiles dolores: quo subinde reliquis medicaminibus causâ materialis eo commodius oppugnari, eoque felicius debellari queat.

§. VI.

Educta sic noxia materia, & conquelescentibus spasimis, succurrendum est læsi intestinis: quorum si quædam adhuc resisterint exaceratio, præter intermorum abstergentium continuationem inspicendi sunt crebro chylires ex sevo hircino, cervino, vitello ovi, terebinthina, & balsamo Locatelli commixti. Plerumque tamen superato morbo restat albus intestinum atonia; cui meliori licet exhibitione remedium roborantium: ex quibus eminent cortex calcarillæ in essentia, pulvere, & extracto aquoso datus, sive etiam cortex chinæ, cum extractis abstergentibus ac roborantibus in clecuarium reductus; aut elixir nostrum viscerale, vel essentia corticum aurantiorum, cum essentia gentianæ rutæ & succini permixta. Non contemnendum quoque prælabat externe utrum spiritus vini rectificatus, vel aqua Regine Hungariæ aut spiritus florum chamomillæ Romanæ cum oleo mentha destillato decenter mixtus.

§. VII.

Vix autem votis respondebunt allegata præfidia, nisi accuratum regimen, victusque pertinax accesserit observatio. Cumprimis æris calorisque æqualis semper temperies conservari debet: sicut enim omnis refrigeratio, sive per admissum ab extra frigus, sive per ingestos gelidiores potus, certissimum minatur damnum: ita quoque nimius calor & exsultatio, & per conclavia valde calefacta, & per multam lectorum, stragulorumque impositionem, æstum febrem & anxietates adaugendo, nunquam noxæ gravioris expertus est. Quamobrem dysenterici se quieros, animique tranquillitatis sedulo studentes, in temperato & lecti & conclavia calore continere debent. Potus oportet esse tepidus; nec convenit ulla cerevisia, sed potius decocta gelatinosa, infusa theiformia, serum lactis, & sub finem morbi, ad intestina roboranda, haustus vitæ generosi. Victus sit facillimus, cibique non nisi molles conveniunt, ex quibus oryza, ac vitelli ovaum merito suo extolluntur: nec laude caret juckula, ex carne vitulina, gallinarum, radicibus scorzonerae, cichorii, chinæ, succo plantaginis & capris confusus parata; qui à nonnullis ad consolidanda intestinum ulceræ, magnis extolluntur encomiis.

§. VIII.

Præservatio hujus mali, ubi illud est epidemicum & contagiosum, fit, quando quis excessus omnes & libitas aeris mutationes effugiat & provida eos qui hoc malo laborant evitet.

Certius

Certius ab eo, quod ex aliis originem trahit cauſis, ſe omnino præſervare poterit; qui aëris injurias viaverit, a nimio & perverſo fructuum horariorum, præſertim immaturorum uſu abſtineat, ac alvi perpetuam libertatem conſervaverit. Cumprimis eo, quod dyſenteria graſſantur tempore, noctu corpus in lecto probe tegendum, ne prohibeatur tranſpiratione: & ſi corpus purgandum eſt, caveatur probe, ne id fiat acrioribus purgantibus; quippe quæ, uti ſuperius dictum eſt, excitando contagio, ipſique morbo producendo, cauſam ſæpenumero præbent opportuniſſimam.

CAUTELE, ET MONITA PRACTICA.

§. I.

*Cautele
avere opor-
tet in
ſingulis.*

Omnia in dyſenteria ſumma cum cura à craſis opariis, adſtingentibus, & ſtypticis abſtinen- dum eſt; quoniam hæc in pejus malum prove- hunt, tantum abeſt, ut illud allevent. Namque ſi in morbi initio dantur, inſtus reſeque cauſa materia, ſummas præcordiorum anxietates, ſin- gultus, aphthas, & periculoſas inducunt inflam- mationes; in vigore morbi, & ubi nimium fra- ctæ fuerint vires exhibitæ, facile ſunt necroſi- ca, & præſentem inflammationem in lethalem commutant ſphacelum: conſ. THONERUS *obſ. Lib. III. obſ. 8. pag. 167. M. N. C. dec. II. anno III. obſ. 88.* Denique eadem morbo adulto, & declinante propinata, aſſectus ſpalmoticos, cedematofos, languores, atque febrem relin- quunt: GALENUS *Lib. II. ſimpl. 12. & 14.* au- ſtor eſt, dyſenteria intempeſtive cohibita ſucceſ- ſive melancoliâ, & quod HOLLENIUS in *ſeſſ. p. 353.* obſervavit, epilepſiam, pleuridem, & ut MARTINI *de morb. meſt. teſtatur*, inflam- mationes & abſceſſus meſenterii, ac plura graviora incommoda, mortemque ipſam accele- rare, ut multis oſtendi exemplis poſſe ſcribit CRATO *conſil. 22. Lib. V.* Quo quidem in ca- ſu operæ pretium eſt, inſuſus ano chlyſteribus, co- hibitis dejectiones revocare, & internis abſor- bentibus ac diſphoreticis huius inſimulente præ- cavere inflammationem.

§. II.

*Circa mor-
bum auto-
ratur.*

Neque vero intelligi debent ex animali regno deprompta remedia, quæ ſedativa & anodyna, eaque tunſiſſima virtute his in morbis ſe com- mendant. Ex horum numero ſunt ſpina & hep- par viperarum, ſaluſa dentis hippopotami, man- ſi, priapi ceti, pulvis ſecundarie humanæ ex- ficcate: quippe quæ ſi cum lenioribus bezoar- diciis combinentur, ad ſopientiæ ſpaſticas & convulſivas inteſtinorum ſtricturas, præclaros edunt effectus.

§. III.

*Circa do-
mum, &
purgantia.*

Quamvis blandi laxantia, & alvum lentitia in dyſenterico fluxu egregium levamen ſerre de- prehendantur: cauſiſſime tamen cum his merca- ri oportet. Namque primum acriora purgantia, ex jalappinis, ſcammoniatæ, colocynthide &c. parata, exacerbando ſpaſmodicas moſiones, vim veneni exſerunt; id quod etiam de mercuria- libus valet. Unde non mirari ſatis poſſum, quodam, & præſertim BOYLEUM *de S. M. V. pag. 52.* mercurium dulcem in dyſenteria commendare: quippe qui ejus eſt indolis, ut ab admixtione ſalium acriorum, quæ in noſtro mor-

Frid. Hoffmanni Oper. Tom. III.

bo larga præſto ſunt quantitate, cauſicus red- datur. Nec etiam laxantia, quæ dulcia ſunt, & facile fermentationem ſubeunt, hoc in malo con- veniunt: unde omnino à decoctis prunorum, ſoliorum ſennæ, ſyrupique laxantibus abſtinen- dum erit.

§. IV.

Quamquam pilulæ polychreſtæ, & temperate ballanica, leniter evacuando & corrigendo, pri- mis morbi diebus, pariori & ſerata doſi exhibi- tæ, egregiam afferant utilitatem: attamen ab iſdem, ubi morbus in plethora cum magno æſtu, pulſuque celeriori invadit, ſæpius notabi- lem obſervavi noxam. Tunc enim conſulius eſt, ab omnibus, quæ vel leviſſime humores commo- vent, abſtinere laxantibus; & potius decocto, quod ex ſero lactis, tamarindis, rhabarbaro & maſſa conſicitur, blandam moliri vacationem. Præterea, ubi morbus ſtatim ab initio, atrocio- ribus imi ventris cum torminibus incidit; ego ſol- lici ſum, anodyoum evacuant nupem exhibere; eoque nomine pilulas alopathicas, vel, quod melius, *Becherianæ* æquali pondere cum maſſa pilularum de ſtyrace rempſas, convenienti doſi his vel ter intra nycthemeron, ſummo cum fructu propinare.

§. V.

Neque raro obſervavi, inſuſum laxans manna- tum, ſinito jam penitus, qui diutius adſtitit, mor- bo, ſublatique gravioribus ſymptomatibus uſur- pantum, tormina & alia ſonica mala revocaſſe. Cauſa talis modi catatrophæ procul omni dubio in toni inteſtinalis, qui per violentos ſpaſmos val- de dejectus ſuit, diſtructionem collocanda eſt; qua eadem facile irritari poſſunt. Idcirco cœ- nœis roborantibus deperdium illud robur in- ſtaurare convenit.

§. VI.

Radix ipecacuanhæ, quæ pro ſpecifico anti- dyſenterico a multis habetur, vid. *M. N. C. Dec. II. anno X. obſ. 15.* non omnino ſuo caret uſu; licet etiam ſæpiſſime ſiniſtros producat effectus. Utilitatem adhibetur in ſubjectis robuſtioribus æque ac humidioribus, veluti ſequior eſt ſcixus; deinceps operæ pretium exhibet, ubi magna crudam illuvies premis inhaeret regionibus, vel niſaſſa contagioſum recoos ſulceſum eſt, & hinc nauſea, vomendi conatus, præcordio- rum anxietas, & dolor gravatius inſeſtant. Tum vero primis ſtatim diebus hoc remedium gen- uſque expediet; & ejuſdem uſui, ſi plethora & febris urget, phlebotomia præmutare. Quod ſi autem, morbo exiſtente adjuſtori, poſt jam factas crebro dejectiones mucidæ pariter ac ſan- guinolentæ exhibeant; ſiſtit quidem eas ali- quantulum, ſed majores parit circa præcordia anxietates; ut ſæpius chlyſterum emollientium ope alvinam excretionem revocare, necesse ſit. Præterea hanc radicem commodiſſime ad drach- mam dimidiâ cum decocto laxante, ex man- na, rhabarbaro & tamarindis parato exhibere licet, ſi magna cruditarum primas vias obſede- rit copia.

§. VII.

Summo quoque ſtudio ſugienda ſunt illa re- media quæ inteſtina magis ſtimulant; veluti ſunt cuncta ſalia, neutra ac digeſtiva, tartarus vi- triolatus, arcantum duplicatum, ſalia theſaurum

*Specimen
cura pe-
loris
per
chreſtas.*

*Circa mor-
bum auto-
ratur.*

*Circa mor-
bum auto-
ratur.*

*Circa ſalia
de 1700.*

Q &c.

&c. Nihilominus nitrum, nec non salprunella, quod præsertim RIVERIUS magnis extollit laudibus, ob vim refrigerantem atque temperantem quandoque commendari, & absorbentibus immisceri meretur pulveribus, utique, si æstus cum siti nimium urgeat, & subiecta cholericæ, bilioque sint constitutionis.

§. VIII.

Circa vena
fistulam.

Communis multorum Medicorum ipsiusque HIPPOCRATIS & GALENI i.e. MARTIANI comment. in libr. HIPPOCRATIS de ratione vietus in acutis pag. 415. est opinio, alvo fluente non detrahendum esse sanguinem; & pro generali quidem in nostris regionibus monito practico id ipsum haberi preceptum. Verum ego multiplici ductus experientia stans, quod in subiectis valde plethoricis, diætae vinoque adiutis, si dysenteria cum febre continua corripitur, omnino perquam fit necessarium, venam ab initio morbi secare. Nam vanus est metus, sanguinis missione vires imminui; & quum non modo plethorice dysentericorum ex inflammatione intestinorum moriantur; verum quumque plethorici, si continuis infestentur febribus, non nisi ob nimiam sanguinis molem, ad flaves, gangrenam, & sphacelum disponentes pereant: non certe convenientius in his pericula avertendi, venæ sectione reperitur præsidium. Neque defunt testimonia scriptorum probatissimorum, qui hoc remedia genus insigniter commendaverunt. Sic JULIUS CÆSAR CLAUDINUS Resp. VI. se plures dysentericos venæ sectione curasse perhibet: quales etiam observationes RIVERIUS Cent. II. obs. 37. & 41. AMATUS LUSITANUS Cent. II. obs. 38. ALTIMARUS de medicina hum. corp. malis cap. 74. BOTALLUS Cap. IV. SYDENHAM Oper. med. Cap. de dysent. pag. 111. & ex recentioribus PASCOLI in app. suis pag. 150. recensent notam dignissimam.

§. IX.

Circa diaphoretica
preservanda
diæta.

In dysenteria per calidam maligne grassante à perito castrensi Medico reclusa inibi est, præsentem contagii suspitionem, & non ambiguis illius signis, diaphoreticum ex cornu cervi ussi, & philosophice preparati, ætenuis diaphoretici, salis volatilis cornu cervi, & croci ana gravis decem confectum, & cum calido sumtum vehiculo, corpus ad sudorem disponendum, desideratissimum & incomparabilem edidisse effectum, adeo ut post repetitis aliquot doles, in prima uti dicunt herba, perniciosa mali vis fuerit suffocata. Quod remedia genus, ubi fœdibus primæ viæ scænt copiosis, post opportunum evacuans demum exhibere, mea quidem sententia longe securus foret.

§. X.

Circa col-
dum alexi-
pharmaci-
cum.

Communis clinicorum, isque pessimus hoc loco taxandus est error, cum ad atrocis nostri morbi curationem, remedia alexipharmacis & theriacalibus, veluti sunt electuaria ex discordio, theriaca Andromachi, mithridatio, pulvere panonico rubro concinnata, essentia alexipharmacæ, tincturaque bezoardicæ, immoderatus utuntur. Vidi sæpenumero à nimium exhibitis, in dysenteria populariter grassante, ejusmodi remedia cæciteribus, & exsiccantibus, symptomata fuisse exasperata, cum auctis interno æstus, febre & siti. Namque ipsa quoque diæta rationis, ejus generis sanguinem commovenia minus convenire in morbo, qui ab interno diuturniore

æstu, humores dulces ac temperatos in biliosos & fulino-sulphureos commutante, suam trahit originem.

§. XI.

Circa
clausura.

Plures porro Medicorum in dysenteria ad coercendam humorum acrimoniam, ulcerum pravitatem leniendam, & corrosam intestinorum substantiam consolidandam, remedia glutinosa & mucilaginis, tam interne, quam externe per dysseres potissimum nimium uti solent: Talia sunt lac vaticorum animalium, decoctiones capellæ vervecinorum, solutiones tragacanthæ, gummi Arabici, & gelatinæ animalium, sperma ceti, radia consolidæ majoris. Quamvis vero haud in totum improbi queant hæc remedia; monendos tamen esse duco Medicos, ut in illis adhibendis cauti procedant, modumque servant. Nam fluida hæc glutinosa per anam admittenda faciunt lentorem, ulcera magis sedant, & cicatrici resistunt; efficiuntque sapibis, ut compresso alvi profluvio, venis colluvies magis cumuletur, & fermentando graviores spasmos inducat ac tormina.

§. XII.

Circa le-
tem
et ferum
etiam, po-
tissimum
dysenteria
curantur.

Lac quod attriet, illud solum, maxime si acida in primis viis abundet sabbura, ut coagulatum quod ibidem facile subit, & inde metuenda symptomata non convenit in dysenteria. Verum idem coctum & cum aqua pura fluviæ vel fontana, vel etiam acidula Selæranis mixtum, aut serum lactis, quod jam HIPPOCRATES laudavit, ob vim suam & æstum temperantem, & acrimoniam humorum aliquantulum abundantem, multum meretur commendationem; id quod etiam RAYMUNDUS à FORTIS Confult. cap. II. pag. 245. & SYDENHAMII Oper. med. pag. 115. egregie sua sententia elogiis. Præterea etiam aqua pura fontana, cum unicorni, aut cornu cervi usso, aut boli quadam specie cocta, vel chalybeata, junioribus æque ac adultioribus, ad sitim & æstum extinguendum, & acres humores diluendos, potum præbet omnibus præstantissimum. Pertinet huc etiam decoctum SYDENHAMII ex aqua fontana, cornu cervi usso, mica panis simalaginis cum saccharo paratum. vid. Opus. ejus p. 228. Nec ignotum est, quam celebres, & multis experimentis in curanda dysenteria adprobatae sint aquæ in Italia, Terutianæ dictæ, item Villensis, Monistadinae &c. de quibus legi meretur FALLOPIUS de febribus, & CÆSALPINUS in quest. med. 21. l. II. de medic. facult. cap. 10. Præterea porro nostrarum usus est acidularum, quibus curatam dysenteriam vide in A. N. C. dec. I. anno II. obs. 213.

§. XIII.

Quam nullam morbi genus tam foetidum, quam nullam morbi genus tam foetidum, tam abominabile, quodque tam putridis exhalationibus altum indicat, & conspiceret, quam ipsa dysenteria sit, videndum est, ut non in ipso conclavi, in quo degit æger, verum potius vicino, si vires putiantur, moderate calido fiant dejectiones, hæque statim removeantur. Non minus suffragis est masticæ, & succino, noxia aeris corrigenda est qualitas; quo etiam sine in omnibus contagiosis morbis appendendum collo camphoram, modo ægrotaente ejus odorem ferre queant, admodum commendare solius sum. Ubi vero vires permittit & lectis surgere, consilium erit, vas quoddam, reci-

recipiendis ſtercoribus opportunum, lecto ſupponere, ſi prius decocto calidiore ex floribus malvæ, ſambuci, ſemineque ſonogræci imbutum fuerit, in quod decumbentes alvum deſiciant.

§. XIV.

Vix datur ſolus morbus, in quo pedum refrigeratio tam grave, imo moris periculum, confirmante hac ratione, injicit, quam dyſſenteria. Vidi hæc caſus brevis poſt inflammationem inteſtinorum, quæ in ipſam mortem tranſiit, eſſe ſequutam: pedibus enim refrigeratis, cutaneus cortex confringitur, & noxiæ humores majori copia ad inteſtina congeriuntur. Quamobrem operæ ſapientis eſt pretium, calidos lateres pedibus ſupponere.

§. XV.

Nihil gravius adſiguit dyſſentericis, quam perpetua deſidendi cupiditas, & theſimus moleſiſſimus, quo vel nihil, vel perpaucus, plus minus cruentus egeritur macas. Quo in caſu ex artis præſidiis eſſicaciſſimum eſt focus, qui ex lacte, floribus ſambuci, & chamæmeli incocto paratur; vel portio muſcaginis pſylli, aut cydoniorum; aut olei amygdalini & vini oſorum, croco permixti, frequenter ano inſula.

§. XVI.

Qui ex dyſſenteria diutius protracſa convaleſcere, ac vires ſumere incipiunt illi, ut priſtinum, & morbo laſeſactum, ventriculi ac inteſtinorum robur cum vi diſſeſſione recipiant, exquisita diæta ac victus ratio præſcribenda eſt. Quæ ſi neglectus habeatur; ſenteriam, febres lentas, tabem, alioſque chronicos affectus inſequi, plus ſimplici vice licuit adnotare.

ENARRATIONES MORBORUM.

OBSERVATIO I.

Juſcula xx annorum mulier, ſucci plena, animoque valde ſenſibilis, menſtruorum inordinato ſuccellit, & hinc pendentiſſis hyſtericoſpſmodicis ægriſtudiniſſus obnoxia, tempore autumnali præſcriptum à Medico in pilularum forma ſumebat purgans, quod præter alia extrahit colocythidis & diagridii ſulphurati aliquot grana habebat. Inde ſex vel ſeptem ſais copioſe ſequebantur ſedes, & paulo poſt crudeles imi ventris dolores, ac tormina excipiebant. Jungebantur quoque præter vomitiones, creberrimæ dejectiones, quibus excreta ſanguine inſtar loturæ carnis tincta, cum magnis anxietatibus, inquietudine, pulſique ceſſatori reddebantur. Ego conſultus, quum exacerbatos motus magis, quam ſordium craſſarum præſentium ſuſpicaret, interne non niſi pulveres abſorbentes, cum theriaca propeſſi, calidore, & nitro mixtos exhibui, & ce poſtea ordinavi decoctum ex raſura cornu cervi, radice ſcorzonæ, pentaphylli, & cinnamomi paratum: extrinſecus vero abdomini imponendum ſuavi ſacculum, qui ſpecies carminativas, ſpiritu vini cum oleo menthæ & chamomillæ vero ſaturato, imprægnatas habebat; quorum ope ægra convaleſcit.

Epiſiſti.

- 1) Præſens dyſſentericus fluxus, uti principa-
Frid. Hoffmanni Oper. Tom. III.

lem cauſam in contagio tum temporis epidemico agnoſcit; ita à dato acrici purgante, tanquam à procatartica cauſa, excuſatus fuit. Notari enim probe meretur, quod teſtante crebra experientia, ſuſcepta maligna miſtinata nonnumquam diutius ſine noxa in corpore poſſint tolerari, tumque quandam diſpoſitionem ægrotandi generare, quæ, accedente occaſione, in actum deducitur.

2) Cumprimis viæ hypochondriaci, formineque hyſterice ad affectum dyſſentericum valde proclives ſunt, & ex dato purgante faciliſſime illum incurunt. Quæſem enim eorum ventriculus ac inteſtina jam antea ſpſmodicis contractionibus obnoxia reperiuntur: eo magis ab acri purgante adeo irritari poſſunt, ut præſente diſpoſitione, humores noxi, conſtriſto corporis ambitu, ad ea compellantur, atque vera generetur dyſſenteria.

3) Vomitus dyſſentericorum non eandem ſemper præbet prognofin: mox enim ſalutari ac velut criticus exiſtit, ſi nimirum largior cruditas in primis regionibus copia præſto fuerit; mox vero male eſt noxæ, & periculofam inteſtinorum ſignificat inflammationem. Hoc poſteriori caſu ardens pulſantis dolor, enormes anxietates, & pertinaces extremorum refrigerationes comitantur vomitiones; à quibus immunes ſunt, ſi à ſolis proveniunt cruditatibus. In noſtro caſu non æque ſabarra quædam, nec inflammation ventriculi, vomitunde ipſius inverſioni cauſam præbuit; ſed ſpſmodicarum motionum vitium venit acculandum: idcirco nec aliis, quam quæ hos præternaturales motus delinire, & humores ad cutem revocare, perque ſudorem expellere valent, remediis opus fuit.

OBSERVATIO II.

Generoſa mulier, xl. annorum, corporis tenerrimis, diuturno morore ob ingens per incendium domus inductum damnum, agitata, tempore, quo dyſſenterie in pago, in quo debebat, ſævire graſſabatur, nullo quidem victus errore prævio, primum mucoſo, poſt cruento ac dyſſenterico alvi fluxu corripiebatur. Equeſtiſſimæ erant dejectiones, adeo ut intra nycthemeron tricesies & ultra alvum deponere cogeretur, non ſine graviffimis torminibus, inquietudine, pulſu febrili, & inſigni virium languore. Sordes excretæ per primum ſeptiduum mucoſæ, deinceps cruentæ, mox viridi, mox ex flavo pruno colore tinctæ adparebant, & ſic per quatuordecim dies large fluctabant. Sitis urgebat ingens, ſed ſanulac potus quidpiam aſſumſiſſet, ſtatum alvum reddere ſpæbatur: præterea tuſſis vexabat ſicca, & corpus abſque ullo madore ac ſudore aridiſſimum erant. Adhibuerat varia medicus, pulveres abſorbentes cum cryſtallo montana, elixiria ſtomachica cum eſſentia terræ Catechu mixta, nec non oleum camphoræ, quod ex camphora in oleo amygdalarum dulcium ſoluta conſtabat, ac decocta varia; ſed in caſum. Poſt hæc ad cohærendum quodammodo fluxum ordinaverat inſuſum theiſemæ, ex herbis vulnerariis, & adſtringentibus, conſolida ſaracenicæ, vinæ per vinca, ſaniculæ, ægromoniz, vetoniz, millefolii, menthæ, meliſſæ, &c. concinnatum: ſed ab ejus uſu peſſime habuit ægrotans, & ingentes circa præcordia anxietates, inflationem ventriculi, ruſus, extremorum frigus, animique deſectiones, non multum immanata

O 2 de

desidendi frequentia, passa est. Idcirco me vocavit in consilium, & anxia flagitavit opem. Dedit mixturam, quae habebat *aquarum florum acacie, sambuci, cardui benedicti ana uncias tres, olei amygdalarum dulcium uncias binas, pulveris mei bezoardici drachmas duas, liquoris anodyni guttas triginta & balsami vitæ guttas duodecim, syrupi cydoniorum unciam semis*: atque iussit, ut huius mixturæ, probe agitatae singulis binis horis vasculum, quo ad sorbillandum potum Thee utitur, assumeret. Tñi abdomini aquam Regiæ Hungariæ calefactum, in cuius unciae quatuor olei menthae, & viginti balsami vitæ solvebantur, pannis calidis inungendam curavi. Pro potu dedi lac vaccinum, cum infuso theiformi ex seminibus carminativis aquæ incoctis maritatum. Ab horum usu intra unius diei spatium, insigniter fracta fuit symptomatum vehementia, & imminuta dejectionum frequentia. Quare propinavi remedium anodyno-alexipharmacum, quod ex *liquore anodyni recta una, salis volatilis cornu cervi drachma, cydoniorum olei probe relictis guttis octo erat compositum*. Cupas cum quindecim guttas per aliquot vices assumsisset, recibat formosus, sudor per totum corpus erumpens, & ævus vis vitæ de die reddebatur. Hinc ejus usum continuavit, sumisque crebrius pulverem ex bezoardico meo, & sex corticis calcarillæ granis confectum: unde brevi tempore felicissime convaleuit.

Episcopi.

Cruentæ alvi fluxiones optimo jure cum affectibus catarrhalibus, & rheumaticis comparari posse videntur: quam plurima quippe sunt momenta, quæ hanc convenientiam demonstrant. Quænammodum enim primum in coryza solum pituitosum ad glandulæ faucium, atque narium tunicam copiosius defertur, ibidemque secernitur: ita in dysenteria serum sanguinis biliosum, sulphureumque ad primas regiones demandatur, atque intestinorum, & ductuum biliferorum peritæsi, evacuat: id quod, si absque læsione intestinorum fieri posset, in maximum sanitatis cederet emolumentum. Deinceps sicuti affectus catarrhales plerumque à communi aëris vicio, & prohibita transpiratione originem ducunt; & nunquam sere non febriculum quandam, unum mitem, & noctu præsertim exacerbant, habent comitem: ita quoque utrumque momentum circa fluxus dysentericos observari meretur. Ut porro in rheumate perniciosum est consilium, excitationem fieri vitiosi morbi ab initio morbi improvidè cohibere: ita illud idem in dysenteria exitiale est; & sinitica post se trahit symptomata; inter alia testante præsentis exemplo. Quænammodum coryza, si quæ jam adit dispositio, dato eribino, vel permico, facile excitatur: ita idem fit in cruento alvi fluxu post datum acie purgans. Et denique utrumque malum eandem requirit præservandi rationem; quæ in eo consistit, ut tempore, quo grassatur ejusmodi affectus, omnium cura æque studio salutaria transpiratio, noctu præsertim conservetur.

OBSERVATIO III.

Dysenteria Generosus juvenis, xx. circiter annorum, teneræ, ac macilentæ corporis constitutionis, Augusto mensis per quadraginta miliaria noctu

dieque cunctinatum scit iter, sub quo corpus diurno solis calore, qui erat fervidissimus, valde calefactum, noctu vero eximio frigore affectum fuit: simulque varios potus, mor cerevisius lupulatis, mor recentes, dulces, atque triticeas assumsit. Domum redire conquirebatur de magnis imi ventris torsionibus, varium languore, & inappetentia stipatis, quæ inter primo triduo parcius ac moderatas fides habebat. At quarta die, auctis mirum in modum circa umbilicum torminibus, copiosissimæ sequebantur dejectiones cum sincero permixtæ sanguine. Ille sibi solus consulturus, non nisi panem tostum, cum nucæ moschata, & vino calefacto, saccharo remixto capiebat; sed cum nihil inde commodi sentiret, necam invocabat opem. Deprehendi ipsum valde languentem, inquietum, miris tormentis obnoxium, pullumque debiliorem & celeriore: & quem obnoxie rogaret, ut quantoque profligarem molestum malum, hac usus sum medicatione. Præscripsi pulverem, qui corticem calcarillæ, cornu cervi philosophice præparatum, lapides cancrorum, matrem perlarum, antimonium diaphoreticum, & terram sigillatam habebat; eumque pondere unius drachmæ, una cum triginta liquoris anodyni mineralis, quindecim balsami vitæ guttis, & binis olei amygdalarum dulcium cochlearibus, ex decocto avenaceo pro una dosi capiendum curavi; utque singulis quatuor horis iteraret, suavi. Ventri præterea aquam regiæ Hungariæ calidam cum hœcisdia apicatis imponendam iussit: unde intra tres dies, imminuta torminum ac dejectionum frequentia, formosum, appetitum atque vires recuperavit, prorsusque convaleuit.

Episcopi.

Præsentis morbus citra contagii, aut miasmatis cujusdam concursus, suspensus sub itinere transpirationis, & usui potuum fermentescibilium unice debetur. Quænammodum enim ex illa impuritate sulphureæ, acris, biliosæ in massa sanguinis cumulatæ, & confusio corporis cortice, ad intestina compulsa fuerunt: ita ex hoc simili acris, caustica, ac fermentescibilis saburra in ipsa ventriculi ac intestinorum cavitate est generata. Jam quidem venustissimum est monitum, ut Medicus morbos non tuto & jocunde solum, verum quoque cito curare annitatur. Quod ultimum momentum licet non semper citra manifestum noxæ metum à Medico prægi possit: attamen certis in casibus locum omnino invenit. Et in præsentis quidem casu sic sum ratiocinatus: medendi indicationes in eo curando erant, ut acrimonia humorum acido-biliosorum corrigere, dolores ac tormina intestinorum blande conspiceretur; humorum affluxus ad ambum corporis revocaretur, & tonus intestinorum restitueretur. His vero indicationibus recessitum remedium, quod ex temperantibus, diaphoreticis, antispasmodicis & roborantibus confectum erat, omnino respondebat: quod cum primis morbi diebus, ubi nondum læsio intestinorum invaluerat, repetitis sæpe vicibus adhiberetur; factum unque est, ut brevi tempore morbi vis felicissime expugnaretur. Monendi verò hoc loco sunt juniores præctici, ut non putent, profligatum penitus esse malum, si forsan cessaverint tormina, dejectiones, ac æger melius habere videatur. Sæpius enim anguis sub herba albugine delitescit. Sed tum deum certa convalescentia spes foret post

teſt, ſi conſopis omnibus ſymptomatibus, ſomnus ac adipeus redeant, & vigor naturalis, viſeque cito reſtaurentur.

OBSERVATIO IV.

*Dyſenteria
cui curatio.*

Generoſa ſexima XIX. & ultra annorum, tenetia & macilentia ſed vegete conſtitutionis, in vicina urbe, anno 1719. quo in hiſce tractibus populariter graſſabantur dyſenteria, ingentia ſenſu & ſemel ventris termina cum magno virium lapſu, extremorum refrigeratione, iniquitudine, & alvi fluxu copioſo & per vices etiam cruento experiebatur. Summo à me petiti opere, ut, quam fieri poſſet breviffime ipſam ſanarem: quia Regia ſolemnia tunc temporis Deſidei, ubi pater mariti magno officio admoſus erat, celebranda viſere animo valde geſſebat. Ego opem omnem poſſibilem poſtuliſti, ita eam tractavi; præſcripti nempe hanc mixturam: *recipe aqua ſorum chamomille, milleſilli, cum cerviſia triticea deſtillata, ſorum ſambuci, mentha & cinamomi cydoniata ana uncia quatuor, liquoris anodyni, ſpiritus cervi bene preparati ana guttas quadraginta, pulveris bezardici drachmas tres, fyrupi papaveris ſibi drachmas ſex; de qua bene agitata, ſume ſuerunt uncia duo ſingulis tribus Theri.* Deſuper venter hauſus aliquot valculis inſuſi Theri, tamen carvi & cymini nobilitati, corpus in lecto ad æqualem & placidum ſudorem diſponendum ſuſi. Pro potu ordinario adhibuitur decoctum hordei cum emulſione amygdalina mixtum. Externe vero ſementum panis cum aceto forti & ſpiritu chamomille Romanæ ſubactum, calide regioni epigaſtrici ſuis applicatum. Inde optimus ſecutus eſt ſudor, qui continuata hac cura per bidduum & ultra probe ſuceſſit, & tertio die, ſymptomatibus ſere omnibus evaneſcentibus, vi morbi remiſit. Nihil tamen minus ſuaſi, ut non modo adhuc corpus à liberſori aëre domi deſcenderet, ſed & inſulſerit uſui mixturæ de elixiri mei ſtomachici. Sed hac die poſt convaleſcentiam tertio ſuſcepit iter, & neglecta diæta Deſidei recidivum cum cruentis fluxibus per aliquot dies perſeverantibus paſſa eſt, à qua tamen ope Medicorum præſtantiffimorum quarta deſum ſeptimana liberata fuit.

Epiſtola.

Optime nos docet hic caſus, tempeſtive & mature oblata convenienti medicina, grave hoc & periculi plenum malum cito poſſe ſupprimi, & huic ſcopo obtinendo medicamenta demulcentia, diaphoretica ac roborantia præ omnibus aliis velificari. Nam ſicut dyſenteria, ubi paulo ſubtilius ejus genium explorare volumus, non niſi rheumatismus inteſtinorum eſt, à decubitu & congeſtione feri falſi biliſi, ob tranſpirationem prohibitam ad inteſtina, eorumque ductus ac glandulas converſi oriundus; ita & in proſigando eodem rationi & experientia convenientiſſima methodus hac eſt: ut motum humorum ex interiore ventre rariſus ad peripheriam corporis & priſtinum ſubcutaneum emunctiorum congruis & naturæ amicis remediis revocemus; qualis curandi via in catarrhoſis etiam & rheumaticis affectionibus ſemper obſervata eſt optima. Sed ſi in ullo aſſectu, certe hic opus eſt, ut reſta huic medendi rationi juſto tempore per diæticæ æque ac pharmacæuticæ remedia inſiſtamus; niſi, quæ omnibus in principio neglectis rheuma-

Frid. Hoffmanni Oper. Tom. III.

ticis affectionibus familiaris valde eſt, hujus diſi mali recidivam, præcedente morbo, ſemper gravioſiorem, curatque longe difficiliorem velimus expectare.

OBSERVATIO V.

*Dyſenteria
ex ſanguine
autem.*

Generoſus juvenis XXII. annorum, conſtitutionis cholerico-melancholice, propenſus ad iram & animi affectus, inter ſtudia & lubricationes poculis interduſum deditus, anno 1726. cum populariter hic graſſaretur dyſenteria, ex terrore, cum conſpiceret ſunus juvenis hoc morbo ſubſiſi deſmo ſua deportari, eo ipſo etiam corripiebatur. Brevis enim poſt invadebat eum præcedente horripilatione ingens circa præcordia anxietas, cum nauſea & virium debilitate magna conjuncta; nox erat inquieta, & vehementibus venter torminibus cum ſtimulis ad alvum deponendam frequentioribus afficiebatur. Ego poſtero die conſultus cum ex pulſu ſanguinis nimiam judicarem affluentiam, ægrumque ſanguinis hoc tempore miſſionibus aſſuetum eſſe intellexerem, neque ipſe in principio, de morbo, qualis evaderet, ſatis eſſem certus; ut vena brachii ſecta ſanguis, qui ſatis erat craſſus, detraheretur, conſilium dedi. Mingæ inde anxietates præcordiales, & liberis tranſpiravit æger. Alvi tamen fluxus ſemi-cruentus ſequēbatur & in dies creſcebat. Cui vero nullis aliis remediis obvium ivi, quam pulvere meo bezoardico cum ſexta parte corticis caſſiarillæ & nieri permixto; quem ſingulis quatuor horis exhibendum juſſi cum decocto, quod ex radice chinæ, ſcorzonæ, raſura cornu cervi, ſantalio rubro & ſemine ſenſiculi paratum erat. Externe ſinimurum ex olei amygdalarum dulcium uncia una, olei mentha & camphora ana drachma dimidia conſtatim applicandum curavi. Clyſteres repulſabam; quos nec ego in hoc aſſectu valde neceſſarios judicavi. Et ita intra decem dies optime convaleſcit.

Eodem tempore in vicina alius ſtudioſus, ſanguineo-cholericus, iræ, ambitioni, & ſtudiis deſtitutus, ſanguine turgentibus venis præditus, in eundem ex contagio incidebat morbum. Conſultabatur hujus urbis Medicum non incelebrem, qui ſingulis tribus prioribus diebus bis pilulas polychreſtis ad exemplar Becherianarum conſectas ad uſum commendavit. Cum omnia in pejus ruerent, me quoque, ut conſilio ſuccurrerem, rogavit. Inviſi ipſum, & cum pulſum tangerem, illum valde magnum & celerem quadam duritie junctum deprehendi. Æger erat valde inquietus, ſomno penitus carebat, & de doloribus in epigaſtro & umbilicali regione ardentibus cum continua nauſea & propenſione ad vomitum conqueſcebatur. Dejectiones erant crebreſſimæ, eisque ſemper aliquo ſanguine permixtæ. Rebus ita conſtitutis nolui quidquam ad medendum proponere; nec venæ ſectionem, quam in initio morbi utiliſſimam habueram, admittendi jam tempus judicavi. Sed nono die, doloribus ſimul & ſemel ipſum deſerentibus, moriebatur.

Epiſtola.

Quam ſecurum & minus noxium venæ ſectio ſit remedium, ex priori caſu addiſcere licet. Ego tamen nolim hoc præſidi genus generatim in hoc morbo commendare. Sed credo potius plus detrimenti quam emolumenti ab hac promiſſe admittiſſe expectandum. Nam ubi vigens

succorum inspissatorum in sanguine abundantia, & intestinum canalis magna viscosorum colluvie humorum scaturit: insuperque corpora sunt humidiora & spongiosiora, neutiquam venae sectione opus est. Sed aliter sentiendum in praesenti casu, ubi ex animi affectu in homine plethorico, nullo notabili in primis viis exsistente vitio, malum obortum fuit.

In altero casu haec non omittenda videtur observatio, pilulas istas leniter balsamicas & ex extractis amaris cinnamatis, in alvi fluxibus etiam cruentis in principio praesertim exhibitis, non suo fructu carere; verumtamen in subjectis sanguine plenis, & calidioribus, ubi vidum plus est in sanguine, quam in succorum pravorum primis in viis abundantia, nullas video easuturpandi indicationes. Cum ratione potius & experientia ducere ea sint ipsi commendanda, quae intestinum sanguinis motum temperandi & transpirationem promovendi possint efficacia, & quae liberiores circulum procurando inflammationes, & interna, quae diutius hunc morbum trahunt, ulcera abarcent: in quorum censu tempestiva & acri natura conveniens primum omnino locum occupat venae sectio, quae deinde aliis idoneis auxiliis potest secundari. Ad liores vero mucklas & acres biliosas ex intestinorum canale leniter evacuandas, seram lacis cum manna, cum rhabarbaro & tamarindis permixtum & primis diebus decenter usurpatum omnibus reliquis evacuandis est praesertendum.

OBSERVATIO VI.

*Dysenteria
aure 1684-
epidemia.*

Quum sub primis praeseos medicae annis Minde Westphalorum Provincialis Medici munere fungeret, graviter anno 1684. ob plane insuetam & extraordinariam siccitatem & praecalam coeli constitutionem & quartana & dysenteria graviter grassabatur. Ver erat siccissimum, & tota aestas sicca & calidissima, adeo ut intra quatuor mensium spatium nulla pluvia observata fuerit. Malum vero his modis se predebat: praecedentem horripilationem dolores arores modo infra, modo supra umbilicum sequebantur. Depetiones interdum carniū locutae similes, interdum sanguinolentae, quandoque etiam pusulente erant, mucum & intestinorum ramenta secum ferentes, cum frequentissima & fere intolerabili ad locessum cupiditate. Plures in una domo serpente contagio aegrosabant, in tamen, ut pro diversis corporum constitutione, robore etiam & regimine, nonnulli facilius & intra quatuordecim dies, alii vero intra quadraginta dierum spatium majori cum molestia in periculo evaderent. Nam in quibusdam erag morbus acutus, in aliis valde longus. Memini enim septimo & nono die quoddam mortuus robustos viros, sanguine turgentes, & qui in vino ejusque spiritu paulo largius se ingurgitarent, praesertim quando sub ipso morbo corpus refrigeraverint, vel gravis quidam animi affectus accesserit. Qui ad malignitatem accendunt & stomachum roborandum alexipharmacis, theriacalibus & stomachicis calidioribus spiritibus atque etiam adstringentibus utebantur, ii rarius evadebant, vel gravius & longius aegrotabant. Remedia, quae tam desideratum ediderunt effectum, erant rhabarbarina, in principio duobus vel tribus prioribus diebus data, una cum clysteribus emollientibus & demulcentibus; deinceps potiones concinnatae ex pura aqua fon-

tana, menthae, chamomillae vulgaris, admixtis pulveribus ex cornu cervi usio, philosophice preparatio, bolo Armena, lapidibus cancerum & synipo cydoniorum, quales pulveres etiam frequentius usurpati fuerunt; quibus interdum quoque unum vel alterum granum theiaca coelestis admiscebatur. Rustici lacte cum aqua fontana mixto, vel sero lactis per totum morbi decursum non sine singulari fructu utebantur. Grassabatur etiam haec lux inter milites praedarios, quibus praerat Chirurgus, qui in India orientali per aliquot annos vixerat; cuius modus haec erat: plethoricus & robustus in principio, interdum etiam in statu morbi venam secabat: aliis quibus vitioforum humorum in primis viis colluvies isocilla erat, vomitorium exhibebat: aliis, ubi malignitas aderat, electuarium, quod arcani instar habebat, & cuius ingredientia erant robor sambuci, theiaca, pulvis pyris, cornu cervi usum, & quidquam camphorae porrigebat. Pro potu nil nisi aquam fontanā leniter frigidam concedebat. Qui non respuebant medicinam, & patienter sub aequali calore se continebant, in iis benigne & optime morbus decellit.

Epiptis.

Disturnas veris & aestatis siccitates & nimios calores, accendendo nimis sanguinem, & ex humoribus blandis intemperatis & sulphureos falsos gignendo, accedente postea aere paulo frigidiori & humidiori, liberam perspirationem intercepte, epidemice grassantes varii generis aegritudines, maxime omnium vero dysenterias & intermittentes anomalias, pleuritides quoque & alias rheumaticas affectiones producere, experientia per multa secula in historia medica confirmatum habemus: Id quod etiam ab ipso HIPPOCRATE l. III. ap. 16. observatum legimus. Ex hac inordinata & praeternaturali temporum constitutione, supra modum sicca & praecalida, Medicus rationalis, & qui non pure empirice una eademque methodo morbum tractat, facile peripit, ad epinodi dysenteriam epidemiam tum averendum tum curandam, medicamenta calidiora, sudorifera, & alexipharmaca minus proficua, sed magis noxia esse; contra diluctia, temperantia, demulcentia, blande laxantia, & diaphoretica convenientissima, non sine insigni fructu propinari. In eiusmodi morbis à vulgo saepius ex longa experientia meliora & commendantur & petuntur remedia, quam à magnifice famae Medicis, qui sufficienti peritia destituti & insufficienti morborum theoria instructi sunt. Cum anno 1726. hic & in vicinis urbibus maxime Altenburgi saeviret dysenteria, quae multi perierunt, grassaretur, ipsi rustici, spreis omnibus pharmaceuticis, quae maxima ex parte erant calidiora, sero lactis, item lacte ebuturato per totum morbi decursum utebantur; & pra aliis felicissime evaserunt. Est dysenteriae medendi haec ratio antiquissima: nam ipse HIPPOCRATES libro de affect. sect. I. tit. l. VII. epidem. §. 6. in quo historiam dysenteriae notatu dignam cum cura praeter morem prolixius recenset, lac bubulum, ejus serum, alinum quoque coctum & ad laxandam alvum & ad temperandos humores mirifice commendat.

Mentio quoque fit in historia nostra venae sectionis, & quod in pluribus robustis & sanguine plenis, ubi neglecta haec ipsa fuit, acutus & le-

lethalis fuerit affectus. Ego certe ſanguinis miſſionem cum iudicio & diſcrimine in hoc morbo & præcavendo & curando inſtitutam, tanquam remedium & neceſſarium & ſaluberrimum, certa experientia & ratione ſufficienti ſuavis cenſeo. Miror hinc indiſtincte à noſtri ſæculi medicis hoc auxilium genus in hoc malo ſperni & contemni; cum tamen peritiſſimi etiam antiquiores Medici, ut ſunt SYDENHAMIUS: vid. *opus opp. p. 111.* RIVIERUS *cent. II. obſ. 37. 44.* AMATUS LUSITANUS *cent. II. obſ. 48.* & plures alii de ſumma venæ ſectiōnis in hoc morbo utilitate poſteriori obſervationes reliquerint præſtantiffimas.

OBSERVATIO VII.

*ſyſtema
dyſenteriae
anno 1719.
epidemica.*

Quum æſtas anni 1719. per totam ſere Germaniam & ficciſſima, & calidiſſima eſſet; menſibus Auguſto poſtimum & Septembri popularem ſtragem dyſenteriae paſſet, ac ſævas intermittentes, incertæ tamen, & ad ſemiter-tianarum, quas hæmorrhæon dicunt Græci, naturam accedentes eſſederunt. Et dyſenteriae quidem ſic habebant: invadebant magis pueriliæ ac iuniora corpora, & ex adultis eos, qui inordinatum vivendi genus egorunt, fructibus horæis, atque cereviſiæ nimis delicatis nimium inſoluerunt, & acri veſtigio, qui humidus, nebuloſus ac frigidiſſus erat, ſe liberalius expoſuerunt. Deinceps in illa regione, ac urbibus, quæ multa ſtagna, paludeſque, ac flumina apud abſentia & pervadentia ſovent, veluti eſt Lipſia, Berolinum &c. maximeque in illis domibus, quæ proxime ad flumen ſitæ erant, majorem ac crudeliorem euecebant tyrannidem: Contra vero urbes ac regiones in locis altioribus, & montioſis ſitæ, vel prociſus immunes ab hoc duto malo fuerunt, vel ſaltem illud miſiſſimum ſunt expertæ. Qui præſervandi ſine acriori purgatione vel multa ſæpta ſtuebant remedia, prociſus iniciebant fluxum dyſentericum; qui plerumque æſtu febrili, tuſſi, quin & ſpirandi difficultate, inſtantibus præſertim, junctus obſervabatur. Non minus lombrici ſæpius cum ſiccioribus redebantur, & inſultum exhibebant omen: tenefus vehementer urgebat, & licet faeces cruentæ eſſe deſiderent, nihil minus moleſtiſſime continuabat. Quibuſdam croentæ quidem, & copioſiſſimæ, eaque ſumma virium proſtratione, continuæque vigiliis ſiſcipæ erant dejectiones; ſed omni dolore, cunctique torminibus ſi carebant, hæ præceps exitum, iſtiſque mors certe imminet. Data ſub morbi initium adiſtingentia, vel opiata, magnas inducebant noxas, & ſingultum, vel inflammationes oris, faucium & oſophagi, ſedato fluxu, movebant. Quoſdam malum per integrum imo ultra cruciabat menſem; & denique, cum Octobri accedet menſis, omnino ſuavire deſiit. In hoc morbi genere præſantiſſimum deprehendi hæc medendi rationem. Primis morbi diebus ad temperandam & evacuandam ſuburram biliſam acram cauſticam non ſine fructu dedi laxantia demulcentibus nupta, vel etiam radicem ipecacuanhæ, repetitis vicibus nonnunquam exhibitam. Ex laxantibus operæ pretium fuerunt vel rhabarbarina, vel etiam pilule noſtræ baſſamiſcæ; quas numero novem bis de die, inſperſas pulvere bezoardico nitroſo, ac juſculi avenacii uſu, propinavi. Non minus clyſteres oleoſi egregiam tulerunt opem, nec non pulvis meus bezoardicus,

corrici calcariſſæ æquali pondere nuptus. Quibuſdam cum inſigni, & ſubitaneo levamine præſcriptiſ mixtura, quæ ex aqua ſonana, chamomilla, menthæ, ceraſorum compoſitæ, inſuper continebant pulverem meum bezoardicum, corticem calcariſſæ, ſpecies de hyacintho, theriacum cœleſtem, oleum amygdalarum dulcium, ac liquorem anodynum. Abdomini adſpicandum curavi ſpirum vini, in quo oleum menthæ erat ſolutum; & morbo diutius protracto, ſecici cum ſuccellu, potiones aque ac emulſiones analepticas ſubjungi. Horum ope, ſi accedebat rectum & moderatum caloris regimen; plurimi convaleſcerunt: niſi quod ſæpius infernum ac mortiferum fuerit malum.

Epiſiſta.

1) Plura in hac epidemica conſtitutione occurrunt momenta, quæ aliquam omnino mererent attentionem. Primum notabile eſt, quod cum ineunte menſe Octobri morbus plauē exſpiraverit; licet hic menſis fructuum, pomorum, & uvarum ſit ſeraciſſimus. Ex quo adparet, cauſam hujus epidemici ſtragis in miſtimate quodam maligno, ex peculiaribus terrarum effluviis, ac ventorum conſtitutione generato, maximam partem fuiſſe querendam.

2) Docemur porro ex præmiſſa hiſtoria, nimium æſtum & fervorem ſolis mortalium corporibus longe majores & magis pernicioſas inferre noxas, quam quidem frigus, ut ut ſit intenſiſſimum. Hinc anno 1709. & 1715. ubi geliſſimæ erant hiemes, longe mitiores hominibus incumbabant ægritudines. Præterea vero dignum eſt obſervatione, quod ingens ſolis ardor in locis paluſtoſis ac humidis, majorem edat ſtragem, quam quidem in altioribus & montioſis; in illis enim eo ipſo calore multa eſſuvia, plus minus puriſa ex aquis & ſagnis generantur, quæ copiam miſtaturum malignorum inſigniter augent.

3) Occurrunt etiam in hac ſtrage epidemica exempla dyſenteriarum, quæ cum dolore careant indolentes vocare ſolent. Peſſimi ſunt illæ moris & eventus; ſiquidem ſphæcelam partium internarum, maximeque inteſtinorum ſignificant. Sic etiam WEDELIUS in dyſenteria, anno 1669. per regionem Gothanam populariter graſſante, aliquot caſus adnotavit, ubi agrotantes ab ipſo inſaſionis momento per totum morbi decurſum, non de minimo quidem dolore ſunt conqueſti, nullo minus ſtatim ab initio cruenta dejecturunt, & certiffime perierunt. vid. A. N. C. dec. I. anno II. obſ. 43. & dec. III. anno I. obſ. 60. His in caſibus maxima miſtinae contagioſi accuſanda venit malignitas; & inſuper ipſa agrotorum conſtitutio conſideranda, qui plerumque inſigni humorum labæ ac ſcorbutica dyſcracia laborare deprehenduntur. Unde fit, ut ſucci vitales prociſus et mortalem in inteſtiniſ ſubeant ſtaſis & corruptionem.

OBSERVATIO VIII.

Postquam in his noſtris regionibus anno 1726. Dyſenteria hiems antecellit ſicca & aſquiloſa, ver autem pluviuſum & aſtruum, & denique aſſas excepiſ ſiccior iterum ac calidiſſima; ſæculum eſt, ut hæc dyſenteriarum ferax fuerit, quæ vero binis poſtimum momentis à fluxu dyſenterico, aliis epidemico ſeſe diſtinxerunt. Primum enim

O 4 contra

contra morem solitum cum ineunte aestate mensis Junio invaserunt, & per sequentes Augustum, Septembremque saevierunt: deinceps etiam contra consuetum ordinem in montosis ac collisosis locis, majorem ac graviores, quam quidem in planis & campestribus exercebant tyrannidem. Ipse morbus sic habebat: acri statim adpetitus iactura, & summa virium prostratione correpti, atrocissima tormina, & acutissimos in imo ventre perstiterant cruciatu; quibus accedebant insignes praecordiorum anxietates, graves cardialgie, atque vomendi conatus: raro enim ipse incidebant vomitiones. Tum inter vagas horripilationes atque phlogos, molestissimum jungebatur tenebrum, & frequens descendendi cupiditas, siquidem quadagesies, quinquagesies, & ultra fiebat quotidie dejectiones primum mucosae, post sanguine paululum tinctae, dein carnae, tandemque cruentae. Adhaec tres potissimum mali classes vel gradus adnotare licebat: prior admodum benigna, nec nisi vagis horripilationibus & caloribus stipata erat, ubi aegrotantes non semper in lectis decumbere debuerunt: altera minus maligna comitem habebat febrem vel quartanam, eamque continuam, vel semitertianam: tertia vero maligna, cum acuta, & veluti inflammatoria febre conjuncta, efflata symptomatum ferocitate affligebat, magnamque in alius propagabat contagium, & tantum non semper brevi lethaliq; solvebatur eventu. Praeterea sicuti potius frigidus noxam inferbat in signum: ita praesentim cerebri, utur calida fuerit, majores anxietates & dolores, ac acerbiora in abdomine excitabat tormina. Refrigeratio quaecunque malum gravius, fomentationes vero, compressis regionis umbilicalis (*arme Magen-Deine offtern aufgelegt*) dolores reddebant minores. Adpeius porro dejectus gravem hunc affectum esse, graviorem vero, imo malignum, febri complicatio significavit: non minus virium cum prima mali accessione summa prostratio, ut plurimum funesta fuit. Illi, qui lauto dysenteriae contagio, atrocibus mox torquebantur cruciatibus, erumpente postea largissimo sudore, sub eadem torminum atrocitate, & excretionem per inferiora pariter successu, nausea vero, & vomendi conatu majori, vix evaserunt. Tandem quae dysenteria antea cum febre continua erat conjuncta, deinceps febri haemiritea, vel corrupta alia slipabatur, funestum ut plurimum sortita est eventum, vel saltem in lentam haecicodemque febrem, cum tumoribus oedematosis transit. Qui Medicorum, vel potius empiricorum, materiae noxae & contagiosae excretionem, datis improvide adstringentibus & opiatissilire studuerunt, in praecipis vitae periculum coniecerunt aegrotantes. Curationem quod attinet; ea prout vel benignum, vel magis malignum fuit malum, duplici ratione insinuita. Benignum dicta jam in praecedentibus observationibus ratione oppugnavimus; ubi autem oleum amygdalarum dulcium, aut olivarium, multo magis, si illud more communi cum spiritu vini, & aceto destillato mixtum fuerit, non sine gravi noxa datum meminimus; illud etiam solum adauxit intestinorum atoniam, cum spiritu vini maritatum, majores excitavit dolores. In maligna dysenteria, cum vehementi febre conjuncta, principissima cura febri tributa fuit, quam pulveres absorbentes, ac fixi diaphoretici, niro nupti, & vel soli, vel ex aquis diapnoici propina-

ti, non neglectis reliquis egregie mitigant: neque minus venae sectio sub morbi initio administrata, plethoricis minorem reddidit morbum; Vomitoria autem, & purgantia, ipsaeque polychrestae pilulae, ob alocum, quam sorent, magis exasperant. Pro potu ad sium, quae vehemens erat, exlinguendum, egregie interservit, vel emulsionem ex amygdalis dulcibus, cum juleculo avenaceo parata, vel serum lactis dulce, vel etiam lac cum fonte Seliterano maritatum. Denique declinante morbo roborantia, & ex his vinum Gallicum Pontac operae fecerunt pretium. Ad molestissimum illum tenebrum sublevandum foras & vapores ex decocto lactis cum floribus sambuci, malvae, chamomillae vulgaris ac posteriora admitti, & mucilagines feminis cycloniorum, psyllii, convenienti dosi ano crebrius inditae omnium optime profuerunt.

Epitaphia.

1) Quod si originem dysenteriae hujus epidemicae inquiramus; tam à vicio quodam in aëre obverstante repetendam esse, tam late grassans illius impetus significat. Verum non neglectui habendae sunt aliae causae, & quidem primum tempestati animadverso debetur. Namque sub hinc sicca & aequiliora fibrae musculares strictiores ac rigidiores factae, impuritatibus per cutis spiracula excludendis exitum denegant; quae insequente vere pluvioso nimium relaxatae, apertis iterum cutaneis poris, varias ex atmosphaera susceperunt impuritates. Haec demum accedente aestate calida atque sicca valde expansae, commotaeque, reliquos etiam succos in fermentativam indolem simul alituperunt: unde accedente quadam occasionali causa, vel stimulo intestinorum, facile fuit, suboriri dysenteriam.

2) Has vero inter procatae causas viciose ingestorum, ac fructuum horzorum illuvies nullum habet locum: quoniam hoc tempore, cum Junio jam mense, malum grassari coepit, eorundem nulla fuit copia. Sed potius quicunque menses tempestatem sorent dysenteriae opportuna; in his, quavis ratio, grassari etiam ille morbus. Sic ACT. VRATISL. *Trans. VII. pag. 288.* dysenteriam mense Martio, & DIEMER-BROECK *obs. med. VI. pag. 593.* eandem per Januarium & Februarium grassantem memorant. Nihil tamen minus haud à veritate me aberraturum credo, si potentiorum vicio in nostro casu multum tribuam. Quoniam enim per tempestates justo calidiores ipse fontium aquae putidae solent fieri; illae praebent cerevicias minus salubres & acedentes; quae ab hominibus, id temporis vehementer sitientibus, copiosius haustae, acrem ac biliosum in primis viis relinquunt saburram, mole sapienter pauca, eo vehementiori tamen stimulo intestina afficiunt.

3) Communiter dysenteriae locis in planis ac campestribus graviore esse solem, quam in montosis; eo quod atmosphaerae impuritates in planitie non acque ac in collis locis aëris liberioris transitu, & vectorum multiplicato spiramine dissipari & removeri possint. In nostra dysenteria contrarium observare licuit, nec obscura est ratio. Quod si enim verum est, aëri inesse, eoque inspirati contagium epidemicum, & pro varia venorum natura atmosphaerae insinuari; veritari quoque respondet ratio, quae asserimus, contagium recensiti mali epidemicum, ventis fuisse adductum, & magis collisosis, utpote venorum stati-

flatusbus admodum expositis, quam campestribus regionibus, eorum insulsi non ita subiectis, fuisse infirmatum.

4) Notari hoc loco meretur, dysenteriam interdum absque tempestatis vicio popularem flagrem edere, ex solo miasmate maligno per aërem obverianse. Tum vero certis terrarum tractibus quasi inclusis observantur affectus; tum quoque multa infectiorum copia in aëre cernitur; & cum in montosis magis locis malum suum exercet tyrannidem; quemadmodum, quod ex sola tempestatis subita mutatione suboritur, campestribus ac planis regionibus infensus est.

CAPUT VIII.

De Cholera & Diarrhœa biliosa.

THESES PATHOLOGICÆ.

§. I.

Dysenteria
cholera.

Valde conveniens cum dysenteria morbus est, quem à copiosa biliosa saburra per os pariter ac anum facta excretionem, Græci *cholera* vocant, CÆLIUS vero AURELIANUS per fellisiam passionem interpretatur, & WILLSIUS *Pharm. rat. Part. I. sect. 3. c. 3.* dysenteriam incurantem appellat. Ea autem est motus ventriculi ac intestinorum peristalticus, ab inbreuitate varii generis materiae acerrima & caustica, ad convulsivam contractionem proutur, ex parte præter naturam inversus, & cum immoderata biliosa saburra tam per superiora quam inferiora rejecta ambobus conjungitur.

§. II.

Dysenteria
cholera a
dysenteria.

Cujus ante omnia differentiam à fluxu dysenterico notare convenit. Illa enim ad acutissimos referri meretur morbos; & intra paucos dies, ad summum septimo, finiri solet; cum dysenteria, nisi fuerit summe maligna, diutius durare deprehendatur. Neque subinde dysenterico fluxui semper conjunguntur vomitiones, nisi fortassis in principio, aut vigente mali impetu, si accesserit ventriculi inflammatio, illæ nonnunquam occurrant: at cholera nunquam sine vomitu est; sed nec tam molesto, ut dysenteria, tenebrosius sitatur, nec tam frequentes cruoris dejectiones exhibet, nec denique contagium, ut dysenteria spargit.

§. III.

Dysenteria
cholera a
diarrhœa
biliosa.

Non minus discretas cholera à diarrhœa biliosa. Quamvis enim utriusque affectus eadem ferme dependantur causæ; attamen & diversa exhibent symptomata, & diversam præbent prognosin. Nam sicut diarrhœa biliosa nihil est aliud, quam copiosa saburra biliosa, vi motus peristaltici intestinorum in suo naturali, vel deorsum tendente itinere, spasmodice contracti per anum facta excretio: ita è contrario hæc diarrhœa nunquam in cholera quidem abest; sed præter eam adhuc inversio quædam peristalticæ, ventriculi potissimum & duodeni, accedit; & ideo conjunctæ semper sunt vomitiones.

§. IV.

Distinctio cholerae ipsius in *fecrem* & *humidam* non infusè habenda est: illa dicitur, si flatulentis vaporibus ventriculus ac intestina adeo distendantur, ut illi non sine summis anxietatibus, copiosa quantitate supra infrave eruantur; cuius nobile exemplum recensetur in ACT. MED. ROSELIN. dec. II. vol. III. pag. 73. de qua nobis sermo non est. Humida vero vocatur, qualem §. I. descripsimus; quæ iterum vel cum febre, easque gravi inflammatoria complicatur, quam Medici ardentem seu causam appellant, & nos Tom. IV. med. Syst. P. I. descripsimus; vel sine regulari febre, licet non sine omni horripilatione, ac incerto æstu deprehenditur. Hæc plerumque est idiopathica; licet etiam symptomatice nonnunquam accedat dentitionis difficilis iuxta SYDENHAMIIUM *prax. med. pag. 754.* febribus malignis, secundum RIVERIUM *Crit. III. obs. 78.* & febri leipytiæ, quæ abique superveniente cholera non cedere scribitur ab HIPPOCRATE in *Coac. aph. 123.* & DURETO in *Heller, de morb. int. L. I. cap. 31. pag. 235.* quibus etiam morbis, non raro biliosum duntaxat alvi probuvium jungi solet.

Distinctio
cholera in
fecrem &
humidam.

§. V.

Eadem fere utriusque morbi sunt subjecta, nimirum juniora, quæ biliosa, sicciora & cholericæ gaudent constitutione, conf. HIPPOCRATES *Sect. III. aph. 30.* siquidem succulentiora, phlegmatica, & sanguinea, alvi magis pituitosa laborare solum profluviis. Cum primis cholerae observantur expositi, qui succos vitales acrimonia quadam siccobuticâ contumaciter possident, aut laburram acidam in primis invenit vis, ut fere sunt hypochondriaci, scorbutici, & cachectici, indolis simul iracunda præditi. Ætivo quoque & fervidiori existente tempestate, morbus hic potissimum infestat; & quo calidiores sunt regiones, eo frequentior & gravior occurrit: unde incolis Indiarum, Mauritaniarum, Arabiarum, Americæ endemicis tribuitur a BONTIO *hisl. nat. Ind. Lib. IV. cap. 6.* & THÉVENOT *lincr. part. II. Lib. II. cap. 20.*

Subjecta
cholera &
diarrhœa
biliosa.

§. VI.

Quod morbi historiam atinet, scire refert, cholera plerumque uno impetu invadere. Quamvis enim sæpius ructus acidi, nidorosi, dolores ventriculi ac intestinorum pungentes, ac cardiaci, & præcordiorum anxietates antecedant: tamen paulo post uno impetu & tempore sequuntur vomitiones æque ac dejectiones. Et primam quidem ciborum ejiciuntur reliquia, post humores biliosi, plus minus mucos permixti, mox flavi, mox æruginosi, mox nigri, plerumque acidissimi ac fere corrosivi, una cum copiosis ructibus & flatibus, nec non ipso nonnunquam sanguine, repetitis frequentissime vicibus redduntur. Præterea acutissimi dolores, tensiones, rosiones, morificationes, inflationes, ac borborygmi sentiuntur in intestinis, maxime supra umbilicum; & vehementissime affligunt cardiacæ. Malo ingravescente, sitis accedit magna, extremitates refrigerantur, cor palpitare incipit, sæpe transversum singuliosus agitur succosiosis, urinae fluxus cohibetur, corpus gelidis persunditur sudoribus, & non raro graves animi defectiones, sæpius syncope, quin horrenda totius corporis conjunguntur.

Historia
morbi.

guntur convulsiones. Brevis quoque mali est exinus: interdum enim tertio, vel quarto, vel, quod rarius est, septimo die solvitur; nec unquam diutius protrahitur, nisi in alium transeat morbum.

§. VII.

Historia morbi parva tenetur.

Ex Veteribus choleræ passionis historiam accurate delineant **ARETÆUS** & **CÆLIUS AURELIANUS**: Hic enim *Lib. III. cap. 20.* ita describit morbum: *præcedit frequenter cholericus stomachi gravado, atque tempus; anxietas: jactatio: vigilie: tormentum intestinorum cum fœtus: ventris dolor; atque per pedicem ventris fluor nihil relevans; rillationes sinuosa; nausea: salivarum fluor; gravado thoracis. Surgente passione jugis vomitus, & primo corrupti cibi, & humoris aque stillis fluvii; debine virescunt ovarum similes; tum prælii ac aruginosi; ultimi nigri; ventris turbatio cum dolore, & egestio vomitorum similis, hoc est spumosa & acerrima, cum frequenti dejectione vomendi. Crescente passione aquare atque tenuis liquoris sit egestio, & aliquando latura carnis similis. Feruntur etiam cum his humoribus plerumque subalbida despecta; sequitur densitas pulsus; & articularum frigus, atque vultus nigrore suffusus; ardo, atque sitis insatiabilis; spiratio celerissima; contractio membrorum, cum nervorum tensione, ac siccitate & brachiorum. Præcordiorum ad superiora caput, cum dolore iliaco similis; aliquando egestio ventris sanguinolenta; vultus in maciem deductus, oculi rubri & in ultimo congesti &c.* **ARETÆUS** autem *Lib. II. Cap. V.* ita scribit: *Cholera est vitium acutissimum; supra enim per vomitum erumpunt, qua in ore ventriculi & gula congesta fuerant; infra deprimuntur humores in ventriculo, & intestinis natantes. Inprimis qua committunt, a qua similia sunt; qua anus effundit, stercorea, liquida, utrique odoris foetuntur: quod si per clysterem hæc eluantur, primo pituitosa, mox biliosa feruntur. Initio facili morbus, dolore vacans; postea vero venosus in ore ventriculi & gula; tormina in ventre nascuntur. Si magis feriat morbus, anima deficit, membra resolvuntur, cibis exhorret, animus consternatur: nervi tenduntur, tibi arum brachiorumque musculi convelluntur, digitus incurvantur, vertigo oboritur, singultus, ungues lividi, algent extrema, totum corpus rigore concutitur. Si ad ultimum venit malum, tum ægroto sudore perfunditur, bilis atra infra suprave prorumpit, convulsione impedita vesica loquimur cohibetur, voce privatur, articularum pulsus minuit. Mors demum sequitur doloribus plena & miseranda, per convulsionem, strangulatam & inanem vomitum.*

§. VIII.

Sectio anatomica choleræ peritiorum.

In cholera peritiorum cadaveribus post mortem dissectis, intestina, præcipue gracilia, speciatim duodenum, cum dextro ventriculi pediculo, intus gangrenata; extrinsecus bile suffusa ac flava, ductus vero biliferos nimium relaxatos inveniri, perhibent observationum medicarum scriptores; quos inter **BOLEUM** *cyclopæd. med. Lib. III. cap. IV. pag. 418.* & **BARTHOLINUM** *hist. anat. Cent. II. obs. 81.* allegasse sufficit. Præterit **RIOLANUS** *anthropol. Lib. II. cap. 20.* cystidem felleam amplam, distantem choledochum insignitè distentum ad-

notavit: & **A. M. KEROL.** *de. II. Fol. VIII. pag. 80.* ejusmodi lethalem choleræ casum allegarunt, ubi duodenum cum pyloro interne gangrenatum, ac materia ex fusco nigra (qualis vomitu rejecta, & examinata non nisi bilis sanguine permixta fuit) repletum; vasa venosa ventriculi cruce rigida, fellea cystis valde flaccida, & omentum versus ventriculorum revolutum, conspectui sese obstruunt.

§. IX.

Quis inde non videt, sedem choleræ, sicuti generatim in toto ventriculo ac intestinorum volumine, ita speciatim in duodeno, atque viis biliferis querendam esse? unde sæpenumero universum nervorum genus in triflem malorum rapitur societatem. Neque enim ratio aliam determinare potest sedem, si causam affectus nostri spectemus materialem. Nam vomitibus æque ac turbo quæ redditur materia, tantum non semper biliosa, licet non æque sincera ubi-vis bilis, existit; & modo humoribus acidis, pituitosis, salinis, aliisque peregrinis, nec non ipso cruce permixta cernitur: unde etiam varios colores, modo flavum, modo viridem, modo nigrum, & alios fortiter. Ejusmodi vero bilis commixtio non in alio loco, quam intestino potissimum duodeno fieri potest: quippe quod, partim ob sinuosum situm ac flexuras, partim affluentem ex ductu choledochi bitem æque ac pancreaticum succum, producenda & fovenda laborat istius modi acerrimæ est opportunitas.

§. X.

Ex inducta quidem ab ejusmodi causifica materia vellicatio nascitur, quæ ventriculorum & intestina cingit, nervæ, causam choleræ præbet proximam; siquidem hanc statim excipit convulsiva eorumdem contractio, qua morbus absolvitur. Hæc enim, accedente materie peccantis rosione, dolores tendentes, pungentes, lancinantes, rodentes, moficantes, ac cardialgicos producit; atque in ventriculo, ac duodeno contra naturæ ordinem sursum tendit; in reliquis vero intestinis deorsum procedit: unde vomitiones atque dejectiones simul fiunt. Quæ admodum vero perpetue instat regulæ habendum est, quod ad vellicatas in corpore partes, major fiat humorum affluxus: itæ quoque in nostro morbo succi vitales copiosius ad vasa ventriculi ac duodeni, tanquam primario affecta, ruunt. Dum autem hæc partes spasmo constringuntur; non possunt allati succi liberius per venas refluerè; hinc eas insarciunt, ac primum subtiliores particulas, quæ ut plurimum sunt acres, serosæ, sulphureæ ac biliosæ, in affectæ partis cavitatem plorant: unde mira excretorum in cholera humorum copia derivanda erit. Ulteriori mox ipsa vasa vel rumpuntur, crueremque exillant, cum salubra biliosa in nigrum crama coeunt; vel statim subeunt, ac lethalem inflammationem & gangrenam. Interim spasmodum tyrannus ad vicinas quoque regiones vi consensu nervorum propagatur; & sic omnium maxime ductus biliferi lævis agitantur motationibus, ut bilem suam effundant in duodenum, ac cessante cum monte spasmodum impetu, flaccidi ac relaxati adpareant. Porro si transeunt violenti motus ad cordis fibræm, ejus palpitatio; si ad diaphragma, singultus; si ad vesicam urinariam, nictus difficultas; si ad cutis ambitum, ex-

Sectio anatomica morbi choleræ.

Causa proxima, & effectus proximi.

ex

extremorum refrigeratio; si denique ad membranas cerebri & medullae spinalis, epileptici ac convulsivi suboriuntur motus.

§. XI.

Quibus explicatis perscrutanda jam mediate veniens caussa, à qua produciatur materia, tantis tumultibus excitanda opportuna: quae si ve mole pauca, five major fuerit, semper summe causticae ac acerrimae debet esse indolis, ut morbum delingat ab aliis excretionum per vomitum & alvum generibus. Atque hanc primum inferunt venena, quippe quorum perniciosus in corpora effectus, non alio quam cholera significari potest nomine: a teo ut cholera, & toxico interire, idem fere sit. Cuncta vero venena saepe caustica acerrimo operari, notum est; quod licet parvissima ingeniumque quantitate corpus iniret, vehementissimum tamen ventriculi ac duodeni, hinc & reliquorum intestinorum vellicationem ac convulsivum in inferit: unde non ex sanguinis solum massa humorum serosi ad eas partes secerantur, verum et illis quoque felles, violenter concussa, effunduntur bilium suum liquorem; qui prout hic vel ille humor in primis viis jam praesto sit, vario colore tinctus de vomitiones & dejectiones exhibet. Quam igitur tristissimam & plerumque fatali tragicordiam, à summo possimum athenico, quin etiam mercurio subtilissimo, ludi, quodvis proli dolor! obervamus; & praesertim HILDANUS, DECKERUS in not. ad Barbette, & SALMUTH Crit. I. obf. 3. exemplis illustrant. Et quae ab auctoribus de dysenteria à summis venenis excitata referuntur observationes; eas ad cholera omnes adplicandas esse puto.

§. XII.

Similem venenis vim possident purgantia & emetica acriora, majore dosi, aut minus opportune propinata, quippe quae sal quoque lovent acerrimum. Effectus eorumdem perniciosi vulgo hypercatharticos, vel hyperemesicos nomine exprimus; quae si conjungantur, uti plerumque fit, cholera omnino consuevit. Ejusmodi sunt efusa, cataplasia, semen Meserei, vitrum arimonii &c. Ex antimonialibus haud rite preparatis, cholera vehementissimam notavit RHODIUS Cent. II. obf. 71. ex helleboro albo FORESTUS Lib. XXVIII. obf. 44. ex colocynthide idem obf. 42. & STALPART van der WIEL Cent. I. obf. 91.

§. XIII.

Praeterea cibi nimium fermentescibiles, dulces, pingues, & qui facillioris sunt corruptionis, cholera excitare possunt, si vel cerevisia minus defaecata, aut etiam aqua ipsa superingeratur, & illi ab impuro corpore, cujus in ventriculo biliosa jam laet faburra, assumantur. Haec enim subiecta cum bile coeuntia, & consentanea, generant acrimoniam veneno magis causticam: quo pertinent melones, pepones, cucumeres, fructus Indorum ananas, mala persica, pruna, maxime cerea, uvae, cerasia, panificia cum multo butyro fixa, placentalia mellitae, fungi, ova piscis barba, mustum, vinum ac cerevisia recens, carnes nimium pingues &c. Sic cucumeres, post desuper cerevisia, à gravi comesti, lethalem peperisse cholera, testis est FONTANUS auct. Cap. 21. exemplum 12. eandem à malis persicis excitatam requirit GULDEN-

§. XIV.

Nec excludenda sane ex causis cholerae est ⁴⁷Gravis iracundia, quae cum primis ipsi progneranda potentissimam vim obtinet, si inter ipsum passum, comestis cibis fermentescibilibus, quia exarsit, aut statim post iram potum vel cibum, vel, quod pessimum est, emeticum, aut purgans aliquod sumserit. Namque neminem fugiet, irae efficaciam primis potissimum, atque biliosis viis esse infensissimam; utpote non solidas ac motrices has solum commovet partes; verum eo ipso organicae bilis cum alia, quae forsitan adest, laburra effervescentiae, ampliam praebet causam. Tali ratione cholera ex ira, sumta desuper bradica suborta exemplum allegant ACT. MED. BEROL. dec. II. vol. I. pag. 36. eandemque à vehementiori ira lethalem recensent eadem ACTA vol. VIII. pag. 80. nec non PLATFRUS obf. Lib. III. pag. 754. & BORELUS Crit. II. obf. 27. pag. 121. Atque non alius, quam cholera morbus est quem teneri infantes, ex matrum ira exandescens culpa, saepenumero patiuntur, nunquam sine vitae periculo: vulgo vocant ipsum *de Darm Gieche*. Provenit ille ex laete, per iram matris organico facto, & in sensibili infantis ventriculo cum bile effervescente, intestina aerodente, ac plerumque in lethalem inflammationem abeunte.

§. XV.

Quae quidem haecenus recensita caussa, si ^{Causa mediana diuturnior & depulsa} acrimonia gradu benignior fuerit, & profundius intestinis inhaeserit, solum diarrhoeam efficiens biliosam. Haec vero alia adhuc agnoscit caussa, quae quidem haud facile cholericam excitare solent passionem. Et praesertim illud notari mereatur, crise nonnumquam fieri biliosam alvi fluxionem, in subiectis biliosis, si vel levis in victu error, vel iracundia, vel transpirationis cohibiti praecesserit; quin eadem non raro sponte suboritur, idque aetivum potissimum tempore, & rite tractata in corpora vergit salutem. Non mirum sepius fit, ut ejusmodi diarrhoea biliosa, critico motu per febres intermittentes biliosa, quales sunt plerumque tertianae, incidat, corpusque insigniter sublevet.

§. XVI.

Sunt etiam caussa quaedam procatarticae, ^{Causa procatartica} quae si concurrerint cum medicis, & cholerae & diarrhoeae biliosae eo certius prognerant. Ejusmodi sunt primum aëris fervidior constitutio, quae uti omnes totius corporis succos, ita praesertim bilem in organica deducere valet commotionem. Hinc derivandum esse credo, cur India, & Arabibus endemicae dicantur cholerae; praesertim cum accesserit sequentior fructuum ananas usus, qui in locis repertus, & saepe fermentans noxiosissimo sunt praediti. Deinceps corporis quoque nimia refrigeratio, reprimendo serum acre biliosum, ad cholera disponit: unde SCHENCKIUS Lib. III. obf. cholerae meminit, quae ex pedum refrigeratione, accedente multo & fungorum usu, suborta fuit. Et denique cum SYDENHAMIO, gravi frigore, Oper. med. pag. 216. frequentes crapulas tam vinosas, quam cerevisiarum, tantquam occasionalem cholerae causam, in subiectis

Causa cholerae morbi sunt 1) venena.

2) Purgantia & emetica acriora.

3) Cibi nimium fermentescibiles, ut pingues ac fermentescibiles.

jectis cholerici; omni jure accusatus: quippe quibus robur ventriculi, & intestinorum debilitatur, varique cruditates acide in primis viis generantur; quae accedente vel leviore bilis commotione, gravissimas in oeconomia vitali producant turbas.

§. XVII.

Drugi.

Si denique prognosin recensitarum eo usque aegritudinum spectemus; ea in cholerica passione plerumque feralis est. Nullus enim, nisi forte pestem, & febres pestilenciales exceperis, brevior est exitus, tamque cito homines jugulat morbus, quam cholera; cum primis si vel senes, vel infantes, vel longo morbo debilitatos invaserit. Quo magis causifica est rejecta materia, quo intensior sitis & aestus, eo tertius periculum; & si bilis aëra, sanguineque atro permixta dejectur, praeflagit inevitabile exitum juxta HIPPOCRATEM *Lib. IV. aph. 22*. Non minus mortem significant, juncta animi deliquia, singultus, convulsiones, extremorum frigus, & sudores gelidi; nec boni quidpiam expectare licet, si compressis excretionibus reliqua persisterit symptomata. Verum salutis affulget spes, si conquiescant vomitus, cum insequente somno, & levamine; sique ultra septimum morbus protrahatur diem. Diarrhoea biliosa, si brevis sit, & sine magnis torminibus adfigat, salutariter decurrit; eandemque finiri, erumpentes denuo fluxus indicant: nec non in tuto fore est, quae fiti & aestu caret. Contra vero fusa sub alvo cibi cupiditate perire, malum; utique si acutiora simul urgeant tormina, somnus eripiat oculis, & vires insigniter proficiantur. Quodcumque siue dysenterica siue cholerica pallioni aut diarrhoea biliosa, vel biliosis vomitionibus fetris semestriana, quae Graecis hemitritia dicitur, & ex febre acuta inflammatoria & intermittente tertiana alternante sic paroxysmo est composita, jungitur, affectus non summi sunt expertes periculi; optimum vero dictis in morbis signum praebent flatuum per inferiora eruptiones, ex quibus motus intestinorum peristaltici quodammodo restituti non facile fallax indicium potest sumi. In dysenteria ructuum eruptionem jam tum suo tempore HIPPOCRATES pro coalescentiae signo cognovit.

THESES THERAPEUTICÆ.

§. I.

*Indicatio-
nes curati-
væ.*

Si in omnibus morbis, certe in cholera nunquam locum habebit cura per expectationem: siquidem juxta CORN. CELSUM *Lib. IV. Cap. 2*, nulli morbo minori succurritur momento, & secundum TRALLIANUM *Lib. VII. Cap. 4*, exigua levisque curandi mora in eo est pessima. Quo igitur citius, & in principio succurritur cholera, eo felicius evadit curatio. Hanc vero adgressuro tres potissimum occurrunt indicationes; *nimirum* ut autem omnia peccata & noxia materia corrigatur, attemptetur, ad exitum disponatur, & si opus fuerit, arte proficiatur; *deinceps* effrenes motus apte & convenientes sopiantur, & denique labefactum nervosarum partium robur instauretur.

§. II.

*Causa
cholerae ex
illius et.*

Prima igitur cura esto, noxii humoris attenuatio, & adjuvanda excretio. Prout autem illi

sunt varii, & vel magna crediturum biliosarum copia, vel pauca nonnumquam materie subtile, ejusque causae moles, tantorum tumultuum causa deprehenditur: ita paullo diversa exigitur medendi ratio. Quod si igitur ab assumptorum nimia quantitate, cibis fermentescibilibus, cum bile in acerrimum magna abeuntibus, malam propulsaverit, promovenda erit vacuatio, si impeditior fuerit, nec quod probe notandum, vires nimium proficiat sint. Neque vero emetica vel purgantia posita hoc sine propinare convenit; sed vomitum hausta copiosius aqua tepida, butyro infuso, vel oleosis ac mucilaginosi, large imbuta adjuvare; alvi vero successum, infusa ano clysteribus oleosis, & emollientibus, quibus serum lactis egregie inserviet, promovere expediet. Non minus egregiam meretur laudem julecula pulli junioris, copiosius hausta, quae à SYDENHAMIO potissimum commendantur. His oretensis jungenda absorbentia, terrea, noxiarumque acrimoniam temperantia: veluti sunt pulvres ex lapidibus cancerum, conchis citratis, matre perlarum, terra sigillata, corallii preparatis, succino, pulvere Marcionum, speciebus de hyacintho, terris bolaribus, cornu cervi ulso, spodio fossilis, crystallo montana, quam multo habent pro specifico, addito theriacae coelestis rutillo confecti. Ipsum quoque serum lactis, egregia temperandi, sitimque, quae crudeliter saepius vexantur, extinguendi virtute pollet. Et veteres quidem, sicuti CAELIUS AURELIANUS *morb. acut. Lib. III. cap. 21*. TRALLIANUS *Lib. VII*, multis laudibus commendantur potum aquae temperate frigida: de cujus utilitate recentius exemplum allegat BORELLUS *Cent. II. obs. 27. p. 131*. & ego multis observationibus convictus sum.

§. III.

Utà vero ex sumto veneno, vel mota hypercatharsi vel hyperemesis, in subiecto alias sano, cholericus emergit morbus; causae ipsius in pauca materie accerrimae fibris ventriculi nervis inherens mole consistit: non quidem cohibere, neque vero adjuvare decet vacationes. Omni potius studio in id erit incumbendum, ut causae ac tenuis humor involvatur: qui quidem sine larga quantitate oleosa, mucilaginosi, & pinguis sorbere juvat; veluti oleum amygdalarum dulcium, decocta cum rasura cornu cervi, avenae, hordei, ipsumque etiam lac, quod eo praestantior vim exserit, si cum absorbente quodam fuerit remixtum. Praeterea quoque pulvres absorbentes exhiberi, & cum acidulis remediis, quae ad castrandam veneni vim mirifice inserviant, alternari possunt: quae inter eminent mixtura simplex, spiritus vitrioli dulcis, natri dulcis &c.

§. IV.

His interponenda pariter, ac post evacuatam peccantem materiam subjugenda, praesertim si collabi nimium videantur vires, sunt remedia antispasmodica, imò antiepileptica specifica ex animali potissimum regno desumpta, cujus generis sunt, hepae lupi edicacum, rasura priapi cervi, crani humani, ungulae alcis, cancri ulsi fluviatiles, ossa humana calcinata, quae ad convulsivas spasticas nervosarum fibrarum constrictiones aequae in cholerica & dysenterica affectione mitigandas non carce dysesthoris suo fructu, plures Medicorum peritissimorum confirmant.

Et

Et ficuti femper, ita in hoc præfertim morbo anodynus tutiffime utitur, fi vacuantibus decenter funt nupta: quemadmodum funt pilule de Syrace, de cynogloffâ, *Wildegansii*, *Starchianæ*, quæ vacuum finit fovera ingreditur, & fi fufpicio de præfente adhuc materia fuerit, motus tamen efficitur nimis finit, illæ cum pilulis aloëphanginis, vel noftris quoque balzamicis permifceri poffunt. Pulveribus abforbentibus theriaca coëfles, extractum callorei, cinnabaris addi merentur; & cumprimis operæ pretium faciet, liquor nofter anodynus, quem cum oleo macis, vel etiam tinctura callorei maritatum vehementer laudat.

§. V.

Exter-
nae opes.

Neque fua laude carent externa paregorica, & anodyna; quo fine celebrantur emplaftrum de crufta panis, ceratum ftoemachale multichinum *Galenii*, balfamum embeyonum, fpiritus theriacalis, linimenta tri oleis nerjynis, abfinthii, nucifæ, menthæ, balfamo Peruviano, calloreo, camphora parata; cataplafmata ex fermento panis, aceto rutaceo, & fpiritu vini, nec non facculi difcutientes, & paregorici. Ubi quoque motus infigni ferocitate urget, nec molli materia ullo modo refpondet; non præftantius, nec efficacius, ad eos placide fufcendos, & reliquam curationem faciendam efl præfidium oleo nucifæ expreffo cum limpentis nervinis ad ventriculi regionem adplicando. Non minus commendationem meretur balfamum noftrum vitæ dictum, cum lineis duplicatis afflicto loco admovendum.

§. VI.

Tertia in-
dicatione
confuetudo
interdicitur
non facili
utitur.

Horum ope excreta, quæ malum fovebat, materia noxia, & confufus motus, eo fructuosus erit, partes lub hoc morbo labefactas convenientibus corroborare medicinis, quo magis eorundem tonus destructus effe folet. Et huic fcopo eadem convenienti fubfidia, quæ præcedente capite commendavimus; cumprimis vero fuperato morbo victu facili utendum, & ab animi pathematibus abftinendum; ne debiliore adhuc mellefinorum robore exiftente, nova producat cholera recidiva. Cuncta ciborum genera virtute præfanti longiffime fuperant jufcula, ex carnibus virulinis, gallinaceis, falicibus cichorei, petrofelinis, afparago, charefolio, caneris conculis, fucco citri parata; cum quibus etiam tinctura martiales roborandi fine futuri poterunt.

§. VII.

Quarta in-
dicatione
confuetudo
interdicitur
non facili
utitur.

Quod curationem diarrhoeæ biliofæ animet, ea, fi moderatio, viribus integris fuerit, vix eget medicatione. Si impeditur fuccellit, clyfterum externo, rhabarbariorum interno ufu, adjuvari defiderat. Si modum denique excefferit; ad acrimoniam temperandam pulveres abforbentes cum cryftallo montana; ad fpafmos fedandos liquor anodynus ex aqua menthæ capiendus, extrinfecus balfamum vitæ abdomini imponendum, operæ facient pretium.

CAUTELÆ.

§. I.

Quarta in-
dicatione
confuetudo
interdicitur
non facili
utitur.

Potus aquæ frigidae in paffione cholericâ, quo calidior tempellâs, regio, ipfaque ægrotantis conftitutio fuerit, eo falubrior exiftit. Præter *Frid. Hofmanni Oper. Tom. III.*

ejus internum autem ufum, gelidam quoque aquam extrinfecus ventriculo admovere velle; ficut à quibufdam Veterum factum legimus, minus tutum ac periculofum cenfemus; eo quod hac ratione præmatura vacationum cohibitio induci poffit. Ex hoc etiam fundamento derivanda efl vitium, quam acutiffimè in cholera potæ, præftant: de quibus lectu digna efl obfervatio in *SPINDLERI obfervat. medicæ. ut. ad 454. 42.*

§. II.

Quemadmodum lac, ita in cafibus, qui à Circa hoc
funt veneno, vel acri purgante natales mutantur, involvendo principium cauficæ, ac fecum educendo, infignioris utilitatis deprehenditur: ita illud, ubi vel nimis acida faburra præfuit, vel ejus excretio impediatur fuerit, caufitimo propinari, vel ad minimum abforbente quodam permifceri debet. Contra vero, ferum lactis vicinipotus ordinari & commodiffime, & utiliffime explebit; neque in fci tantum exigenda, verum acrimonia quoque tempus eranda ulum exhibebit defideratiffimum.

§. III.

Laxantia cretenu data rariffime in cholera Circa hoc
morbo expofcuntur; quod fi autem vacuandi per alvum fit indicatio, eam optime clyftericis, vel internis rhabarbarinis exple licet. Dulcia enim, inamata, fyrupi laxantes, utat alias leniffima finit, hoc in afflicto nunquam adhibere convenit.

§. IV.

Roborantia & fpirituofa ante peccantis materiar fufficienter factam excretionem, ad cohibendas forfan vomitiones ufurpata, fperni folent, tantum abest ut vomitus filant, ut eodem potius cum reliquis fymptomatibus exacerbent. De anodynus quoque, & fpeciatim oleo hyoffeyami notari meretur, quod ubi factæ nimis finit vires, ac inextingui inflammatio locum occupavit, neutiquam finit adhibenda; quoniam tunc lethalem foporem atque necrofum inferre poffunt.

§. V.

Sicuti venæ fectio in dyfentericis, fanguinis nimia finit mole laborantibus, ad præcavendam inflammationem, & mitiganda fymptomata egregium confert momentum: ita fubtillem circumflantis eadem in cholera quoque adminiftranda venit, præfertim fi virium fit integrum robur: multis enim illam commendat in hoc morbo, felix ille Medicus *RIVERIUS præf. mod. cap. IX. pag. 345.*

§. VI.

Diarrhoea biliofa, uti alia omnis, non flatim filiti debet, fed peccentem humores temperandi funt; quo in cafu rhabarbarum leviter totum ad fcrupulum unum vel drachmam dimidiam cum aliquot granis nitri perquam utile efl; dum humores vitiofos leniter educat, & poftea intellinum tunica roborando leviter confringit. Nam partibus fubtilioribus laxat, terreftrioribus adstringit, quæ prævalent in toto.

§. VII.

In cholera æque ac diarrhoea biliofa ad temperandam humorum acrimoniam oleum nucifæ expreffum ad drachmam dimidiam five folum five cum grano uno laudani opiat *Helmontiani præf.* permixtum & cum jufculo exhibitum magis

P efl

est efficacia. Emulsiones quoque ex amygdalis, semine papaveris alba, addito ejusdem syrupo, & aqua pura fontana paratæ dilutiones, eidem scopo obtinendo feliciter inserviunt.

§. VIII.

Diarrhoea vomitibus curatur.

Quando diarrhoea valde pertinax est, præmissis semper rhabarbato tosto per aliquot dies, sudorificum ex *iberiaca recens drachma una cum cornu cervi ussi, autimonii diaphoretici & nitri purificati granis duodecim* exhibere convenit. Extrinsecus vero calide appositum præcordiali regione cataplasma ex fermento panis, aceto & spiritu vini, additis aliquot guttulis olei menthae & caryophyllorum, egregie non modo subjacentes partes roborat, sed & motum humorum ad peripheriam convertit, & cuticularem excretionem secundat.

§. IX.

Cholera ab æthere curatur.

Quando cholera ab æthere excitata fuit, sine mora pinguis, ut oleum amygdalarum dulcium, oleum lini, butyrum insulsum, oleum olivarum cum aqua rapida exhibere oportet. Hæc enim præsentissimam opem ferunt; eo quod non modo vomitum procreant, quo ipsius magna ærenici pars foras ejicitur, sed quo etiam magna caustica acrimonia quæ fibras ventriculi nervas vellicat, obanditur, & spasticæ contractæ partes relaxantur.

§. X.

Vulnus fæculæ curatur.

Superato cholera vel diarrhoeæ biliosæ morbo expediat adhuc diæta emolliente ad tempus uti, ut nimium vellicatæ & læsæ ventriculi & intestinorum nervæ fibræ quodammodo demulcentur; quo sine lac dulcor, butyrum recens, hordeum excorticatum cum jure pulli aut lacte coctum, item serum lactis dulce optime conveniunt.

§. XI.

Lac in cholera curatur.

Quando cholera est cum febre conjuncta, non tam facile lac dandum est. Nam facile ex calore in casum coalescit, unde majores cruciatus, viscerum tensiones, capitis dolores & cibi fastidium excitantur. Quare ut citra noxam febricitantibus exhiberi queat, præsertim pueris, magisque juvenibus quem ætas præcedit, TRALLIANUS l. VIII. jubet lac in aqua fontanæ bonam partem, & ter quaterque ebullire, & tunc ab igne tolli. Atque ita lac dysenterici quoque febricitantibus non nocere ait.

§. XII.

Sudoriferorum cura.

In cholera & diarrhoea biliosa præsertim quæ ab ira excitata fuit, maximopere à sudoriferis, & regimine sudorifero, præsertim in principio cavendum est. Graves enim rheumatici vel arthritici inde oriri solent affectus.

§. XIII.

Cæcæ cura.

Perquam memoratu digna est observatio, quam RIVERIUS lib. I. obs. 33. tradit his verbis. *Vir robustus & biliosus imperperato prædixu correptus est diarrhoea biliosa valde urgente, cum sit intensissima: vocatus ad nos præscripsi sal pruella in potu ordinario: tum etiam in julepis ex aqua lactuæ & porulacæ paratis, ter in die sumendis, & intra 24. horas convalescit.* Ex profecto insignis est natus, aut saltem in ejusmodi affectibus efficacia, siquidem non modo æstum contemperandi, verum inflammationes quoque præcavendi, vi pollet excellenti.

ENARRATIONES MORBORUM.

OBSERVATIO I.

Vir quidam LVI. annorum, ad iracundiam proclivis, nec ullis præter eructationes acidas, & flatulentias obnoxius morbis, equo aliquando facturus iter, hora prius matutina quarta, paratum sibi à filia, quæ jussu familiaris cum servo vixerat, decoctum succoladæ, cum lacte, & cinnamomo sorbebat. Quo sumto mox de nausea conquestus, inceperunt prosequitur iter, sed hora septima revertis, viribusque prorsus dejectus, mortuo similis, in lectum decertat. Tum vero horrendis procinus cruciari incipiebat vomitibus, quibus inter summas præcordiorum anxietates, & ineffabiles in ventriculi regione dolores, primum maculam ac biliosam, paulo post viridescentem rejiciebat sabburam. Accedebant subinde frequentes dejectiones, cum horrendis imi ventris torminibus stipatæ; summum ciborum fastidium urgebat; extrema perfrigercebant, pulsuumque ictus sensim evanescebant. Tandem inter frigidos sudores, ac spasmodicas præcordiorum revulsionis, singultus, hincque junctæ totius corporis convulsiones jangebantur; vultus cruore turgidus rubeat; vox perit; ipsaque hora pomeridiana secunda, & a sumto potu nona, inter crudelissimos cruciatus mors sequebatur. Cadaver nequam intumescere, nec vultus colorem nisi vivo similem exhibebat; sed ungues coerulesco colore suffusi, scapulae ad dorsum lineis ejusmodi notata, pectusque in latere sinistro punctis hinc inde ex atro rubicundis distinctum, cernebantur.

EPIGRU.

Quæstio ex hac tristissima morbi historia resulat, num defunctus cholera ex sumto veneno, anne potius aliis magis naturalibus causis suboritur perierit. Ardua sane provincia ei imponitur, cui determinandæ ejusmodi quæstiones exhibentur, à quarum affirmatione, vel negatione fama, quin vita hominum dependet. Valde antiquæ enim plerique de veneficiis sunt casus; cum primis si anatoica defuncti corporis sectio deficiat. Hac facta, si venenum in substantia adhuc intra ventriculum reperitur, res est clarissima: ubi vero illud haud deprehenditur, res adhuc dubii plena existit. Inflammationes enim ac fæderationes intestinorum, in omni cholera, sive à veneno, sive aliis causis orta, quin & in aliis morbis, dysenteria, colica convulsiva &c. vix imponunt finem; nec ideo certi quidpiam ostendunt. Nec ex omni duodecim extricamus per intumescentiam externi cadaveris, aut maculas coerulescas ac livescences hinc inde in corpore efflorescentes: quippe quæ phenomena in plerisque corporibus, quæ sanguine turgent, ac subitanea abeipiuntur morte, videre licet. Quomobrem in tali casu præter symptomata, & externas notas, ad morales quædam circumstantias respiciendum est; unde BOHNIUS tr. de offe. med. dupl. pag. 652. rectissime scribit: *Si externa dati veneni indicia, adium subdolum, & veneni emio concurrunt, & cuncta veneni ad extra admissi signa, aut plura horum conspirant, hæc evidentem & certam veneni dati noticiam conciliare possunt.*

Quod si igitur præsentem curatui examinetur casum; vero sit similitudinem, distincto ex potu

Cholera ex sumto veneno curatur.

potu Succulatæ venenum quoddam, & quidem arfenicum fuisse exhibitum. Nam 1) valde imbecilla est assertio, ac si hac cum Succulatæ asfumatum, in ventriculo cum sabbura acida, qua illum fuisse occupatum eructationes acide significant, coivisset, & sic, accedente sub pluviosa tempestate equitatione, ideoque transpirationis cohibitione, causam materialem cholerae absque concursu veneni præbuisse. Cholera enim ex diætae vitio producta, nec tam cito generatur, nec tam subitaneum foritur eventum; & qualis hoc in casu intra novem horas accidit.

2) Adiant subinde ex symptomata, quæ datam arfenicum inoleantur, & hæc potissimum ab auctoribus perhibentur: 1) insignis post sumtum venenum nausea, 2) enomæ vomitiones cum fumina vultus pallore, ut videntur moribundis similes, 3) refrigeratio extremorum, & subita virium prostratio, 4) horrendi in imo ventre dolores tendentes, pungentes ac lancinantes, 5) pulsus cessatio, proxime mortem antecedens, & 6) convulsiones, quæ omnia brevi temporis spatio, & quæ nunquam ultra nycthemeron protensis mori excipiunt. Conf. ZACCHIAS in *anal. med. leg. Lib. II. Tit. 24. §. 2.3.* AMMANNUS in *praxi vol. p. 344.* & de *mod. crit. pag. 303.* FORESTUS *Lib. XXX. obs. 5. & dist. quæ de erroribus circa venena vulgaribus conscripsi p. 37.*

3) Quæ si ad præsentem casum adplicemus, simulque consideramus, quod siliqua potum Succulatæ paravit, uti relatam mihi fuit, odio parentum habuerit, arfenicum enterit, & familiaris servo illa fuerit: nullum est dubium, quin ea duo in potu Succulatæ arfenico patrem interfecerit.

OBSERVATIO II.

Cholera
siliæ a
venena
dote
viti.

Vir quidam consistentioris ætatis, hausto aliquando ab uxore parato jusculo incepit statim male habere, nauseare, spiritum difficiliter trahere, siquida averfari, intimo ardore cruciari, & inter summas præcordiorum anxietates, perpetuo vomendi conatu urgeri. Vomuit quique, sed parum æruginosæ bilis; & demum transacto inter dirisissima dolorum tormenta biduo animam efflavit. Tercio post mortem die sepultus, sed quarto ob veneni suspitionem rursus effossus cadaver, exhibitus foretorem intoleralibilem. Corpus insumefactum, & undique putredine fuit adfectum. Intestinum jejunum, mesenterium, hepatis ac pulmones siphacelo penitus corrupti, cor flaccidum, atroque cruore insartum; ventriculus undique inflammatus, prope pylorum siferatus, & intus materia viridicincta plenus apparuerunt. Unde vit veneno, ab uxore cum jusculo ipsi propinato, exitus judicabatur. Verum explorata curatio morbi historia, hæc adiutare licuit momenta: defunctus ille vir per integrum ante mortem annum morbofo corporis habitu, livido sædore vultus colore, & appetitus prostratione prædictus fueratque primis pridie ante sumtum jusculum de ventris torminibus conqueffus, ea ipse à gravi iracundia, eua aliquot ante diebus exarierat, & ab hausto deiper spiritu vini derivaverat. Quibus molestiis consultiura uxor, dictum cum mole confectura jusculum, ex quo popus habens defunctus, potu spiritus vini, phlono Romano, remediisque succinato calidiori se levare putabat. Verum exacerbat magis magnisque symptomatibus, supra recensitis, tandem diem obierat suppreum.

Frid. Hoffmanni Oper. Tom. III.

Epitriph.

Quum symptomata in hoc casu, præsentia ita quidem comparata sint, ut summi toxicæ effectibus confusio, mortales vero circumstantie refrigerent hunc suspitionem, nec in dilecto cadavere veneni ullius adjunxerit vestigium; minus æquum esset uxorem ventriculi reani agere. Vero potius simillimum videtur, quod affectus cholericus, quo vir ille extinctus fuit, ab aliis præter venenum extrinsecus illatum causa, suam reperiit originem. Bile in coagulato & acerrimam indolem converso, quam Vectes internam vocabant venenum, magis mole causam præbuit: de qua REYES in *camp. Elyf. puerod. quæst. 64. pag. 856. scribit: Quis ergo similis inveniri poterit aliis symptomatibus, quæ de veneno innoxio deferuntur? siquidem ea in cholera mortuorum à bile orio, ferè omnia observantur. Nam defunctus corpus in puris succis resecutum præle diutius tulit, testante malo habitu, sædore vultus colore. Juxta ZACCHIAM vero *cons. XII. n. 6. ex corporis impuritate facile evenire potest, ut tumores in tantum corruptantur, ut ex ipsis se corruptis prætereat in corpore vivente venenum ali-quod, affectus omnia symptomata veneni sibi et externi. Quum ergo nosset ita confusius, violentius exarierit iracundia; commota & in urgulum acta fuit bilis; quæ accedente vini adulti potu, nocivam subit acrimoniam, tormina imi ventris, quibus pridie ante mortem cruciatus est, inducentem. Hæc vero mala uxor sedatura, non intentione jusculum mellisum dedit; sed non sili oleum camano addidit; siquidem bilis commota, si cum dulcibus permiscetur, acerrimam acquirit indolem: quæ etiam in nostro casu inbuta, cholera induxit; cui jusculum illud præcoracicum præbuit causam. Excitata sic cholericæ passio, vomitibus potissimum crebris, ac alvi dejectionibus se extenere debuisse; sed is per datum phlonoium Romanum colubitis, insans tantum modo vomendi conatus, & summa præcordiorum angustia, una cum horrendis doloribus mæterum crudeliter affligerunt. Retenta insuper intus acerrima materia ventriculi aërofit, etique inflammationem produxit; quæ intolerabili interiorum ardore se prodidit. Hæc vero in putredinem denique ipsa cholera abiit, quæ ob impuritatem totius humorum massæ, citius ac lenius diffusæ, potiusque vitæ periculis siphacelo infectæ. Quæ cum ita sint; frustra minus evidentem ac magis dubiam quæramus causam (quæ in nostro casu esset venenum) nobis evadent & manifestare habemus, secundum ZACCHIAM *loc. cit. n. 6. & 9.***

OBSERVATIO III.

Vir quidam gregarius XXVI. annorum, robustus & siliuza temper sumptus gavius, sumto circa horam undecimam meridiana jusculo, vehementissimis subito corripiebatur vomitionibus; quæ procius atrocissima imi ventris tormina, nulla vero subsequente dejectione, excipiebant. Jugebantur insuper inestibilibus præcordiorum mæstetibus, ardore circa ventriculum acutissimi sensatio, inexplabile bibendi desiderium, ac perpetua inquietudine; quibus symptomatibus per triginta horas miserime cruciatus obit. Dissecto post mortem cadavere, ventriculus circa sinistram orificum inflammatus, tunica villosa atrata, & in ejus, ut & intestini

Cholera
siliæ a
venena
dote
viti.

duodeni cavitate ultra tres mensura feri viridefcentis biliosi, una cum pulvere albicante, & magna mercurii vivi quantitate adparuerunt. Resiqua intestina hinc inde gangrenata, & tribus in locis contorta convolutaque in conspectum prostruerunt. Uxor, venefici rea, se non nisi mercurium vivum ad excitanda tormina marito exhibuisse fatebatur: requisitus vero Medicus putabat, defunctum accepisse mercurium sublimatum, qui in ventriculo, ejus calore solutus, in sua rediisset principia; unde mercurius vivus, & pulvis albicans, tanquam salinum illud mercurio adhærens, in conspectum prodierat.

Epiçrifu.

Occurrunt in hoc casu momenta, insigni observatione digna: quorum primum est, num defuncti dato veneno perierit? Neque vero ullum hujus rei est dubium: si consideremus 1) virum juvenem robustum, per omnia sanum, repente forbillato jussulo, horrendis vomitionibus, torminibus, absque summo toxicum plerumque consequentibus symptomatibus correptum, ac intra triginta horas extinctum fuisse. 2) factam corporis sectionem, non modo eam ventriculi constitutionem, quæ exhibita venena sequitur, verum etiam ipsam in natura venenum ostendisse.

2) Deinceps, cum nullæ in nostro casu fuerint dejectiones, quæ ordinario ut ab omni cholera, ita præsentem ea, quam venena excitant, nunquam abesse solent; ipsa quoque sectio hujus phenomena causam præbet clarissimam, quæ nulla est aliâ, quam convulsio intestinorum tribus in locis facta. Hinc vero simul patet, quantæ torminum spasmorumque intestinalium fuerit in nostro defuncto violentia; quippe cui soli convulsio illa debetur, quæ facibus per alvum nullus exitus fuit permissus; & ideo symptomatum ferocitas acerbior redditâ.

3) Determinandum vero est, qualenam exhiberit assumptum venenum? mercurium vivum solum velle reum agere, absurdum est. Quamvis enim mercurius ille vivus, in subiecti quorum primæ viæ impuræ ac biliosæ starent succis, gravia symptomata, faucium erosiones, copiosiores salivæ fluxum, tormina intestinalium excitare, quibuscum observationibus deprehendatur: ex illo tamen ipsam mortem tam brevi tempore subsequutam esse, nemini hæcenus adnotare licuit. Nec in præsentis subiecti recensita incommoda inde expectari poterunt, quoniam illud per omnia sanum ac robustum fuit: & per experientiam constat, illo morbo laborantibus, mercurium illum liberum pondere citra noxam propinari.

4) Neque vero probabile est, mercurium sublimatum defuncto exhibitum fuisse. Hoc enim veneni genus, adstringente, quem faucibus inferi, effectu se facile prodit, & raro tam atroces vomitiones excitare deprehenditur. Ineptæ quoque est assertio, ac si ille calore ventriculi à salibus corrosivis liberatus, inque currentem redactus fuisset sonnam: hi enim effectus, non nisi per summam ignis toruram, & aliorum subjectionum additionem obtineri potest.

5) Quamobrem justissima remanet suspitio, defunctum non nisi arsenico viâ privatum fuisse. Posthæc facta est, se marito arsenicum, & paulo post mercurium vivum exhibuisse. Cujus rei Medicus statim certior potuisset fieri, si inven-

tum in ventriculo pulverem, quem pro salibus mercurii sublimari corrosivis habuit, recto subjecisset examini, illumque carbonibus injectisset: tum enim, sicuti posthæc factum fuit, fetorem alio similem sparsisset, qui arsenico proprius est.

OBSERVATIO IV.

Communicavit ante aliquot annos mecum notabilem de cholera casum, Arctiaster quidam celeberrimus, qui sic habebat: conederat soror quidam cum uxore, & binis infantibus pastillos, (*Klöße*) qui ab illius fratre, insperso arsenico, venenas fuerant, & cani posthæc exhibiti intra tres horas mortem inuenerunt. Exinde omnes protinus nausea, vomendi conatus, vomitionibus quoque ac dejectionibus violentis ac copiosis, præcordiorum anxietatibus, atrocissimis torminibus, animi deliquiis, tremore artuum, ac summa virium prostratione infestati sunt. Sumtis contra hæc symptomata, quas pharmacopœus enormes excretiones sedaturus dederat, medicinis sudoriferis volatilibus, cum theriacalibus maritatis, remiserunt quidem & vomitus, & alvi fluxus; sed reliqua symptomata, accedente summa spirandi angustia, eo atrocius insidebant. Uxor tandem efflorescentiam, purpuræ similem, cum insigni ardore prurituumque junctam, per totum corpus experta, una cum marito, & altero infante, uti longum tempore convalescerent. At horum natu major, duodecim annorum, in horrendas incidit convulsiones, & hæc inter vigesima quarta à comestis pastillis hora obiit. Secutum cadaver frequentia exhibebat: externum corpus undique turgidum, & colore cæruleo viridescente suffusum, inque dextro hypochondrio gangrenatum erat, ungues livefcebant, & fauces inflammatae adparebant. Pulmones colore cinereo imbuti, sphaceloque corrupti cerebantur: ventriculus mirum in modum expansus, tunica villosa profusè orbatus, tenuissimus, ac fere pelliculosus, & variis hinc inde fugillationibus notatus, continebat amurcam ex atro brunam, foetidissimam, eique intermixtum lumbicorum moruorum. Cystis fellea bilem fovebat æruginosam, & reliqua denique viscera omni præternaturali vitio carebant, nisi quod intestina aque ac ventriculus insigniter fuerint expansa.

Epiçrifu.

1) Ferax hic est casus utilissimarum observationum; quas ad illustrandum ulterius cholerae genium paucis proponemus. Primum quidem docet constat experientia, veneno perempto, brevi tempore insignem totius corporis sphacelofam subire corruptionem; quam celerissima ipsius post mortem intumescencia, unguum livor, cutis cærulea, viridescens & foetidissima color, & intolerabilis fetor significant. Neque obscura hujus rei est causa: venenorum enim, præsertim quæ ex minerali regno desumuntur, corrosivorum ea est indoles, ut non in ventriculo ac intestinis solum, sed aliis quoque partibus, ipsoque cutaneo ac musculofo corporis cortice vehementissimam excient constrictionem; qua fit, ut sanguis in liberiori suo cursu retardetur, hinc subdistat, flagnet, & more ipsi consueti in sphacelofam abeat putredinem. Quod plerumque in externis quidem; quandoque vero in internis quoque contingit partibus; velut in

Cholera
cærulea
petiolis
venenatis

in praesenti casu pulmones sphacelati offendunt.

2) Notari porro mereat, in veneno defunctis ventriculum ac intestina mirum in modum saepius deprehendi expansa. Namque quemadmodum omnibus spasmoticis morbis familiare est, ut partium, quas adhaerant, aetiam relinquant: ita fit quoque in cholera a veneno, ut finit per mortem ventriculi ac intestinorum convulsivis motuationibus, summa eorumdem relaxatio, ac velut paralysis excipiat. Quia quidem praesente, vapores ac halitus ex resistentibus ibidem humoribus pullulantes, liberam obtinent facultatem sese expandendi, simulque latera dictarum partium mirum in modum dilatant.

3) Venena varios elant effectus ratione doctores, quia assumentur: unde petenda quoque erit ratio, quod in nostro casu solus puer perierit, & reliqui evaserint omnes; quorum ille sub passillis mayreni forsan veneniquam hi accepit quantitate. Si ejus dosis ad necandum minus sufficiens, ac incompleta fuerit; atrocissima nihilominus symptomata, & diuturnam parit aggritudinem. Namque, nisi tempestive serantur suppeditae, rapitur venenum ad sanguineam massam, cumque hac per omnes nervos corporis partes vehitur: unde salutari consilio in foemina, cujus praemissa histio fecit mentionem, ad curam in forma exanthematum purpurae venenae devotum fuit. Quo in casu perniciosa sunt calidiora, volatilia, ac sudorifera remedia, quippe quae exagitando humores, & veneni vim exaltando, cuncta reddunt ferociora. Praestat tum potius ubi mirum venenum jam introivit humores, acidulis medicaminibus, quae virulentiam toxicam castrant, ut est mixtura simplex, uti, & cum his alterare fixiora bezoardica, blandi anodyni nupta.

OBSERVATIO V.

*Cholera
per peram
ante festum
de curata.*

Vir quidam robustus, xl. & quod excedit annorum, militae bellici, post vehementiorem aliquando iram unquam, insignem multum copiam, sub aere quidem nimis humido frigidoque ingurgitabat. Possidie de ciborum fastidia, vomendi conatus, & dolore totius corporis constituto querulus, habito vomitionibus & copiosis & vehementissimis, biliosis ac viscidissimis, inter fumus inquietudines & praecordiorum anxietates corripiebatur; quas dejectiones cum crudelissimis in ventris torminibus pressio pede sequebantur. Vocatur Medicus vari generis remedia stomachica, anodyna, roborantia ac diluents, sed in calium praescribebat: adeo ut zoe per quatuor jam dies violenti doloribus confectus, dejectis cunctis viribus, pro deplorato haberetur. Quo in rerum statu desideravit ad dremiam vehementem sibi ab amico aquam frigidam, eamque succitissimè hausitibus, magna assumentibus quantitate. Hac ad intestinorum delata caulem cum magnis primum tormentis per alvum secedebat; continuato autem illius potu, tormina sensim conquiescebant, dejectiones fiebant rariorae, & curis, quae antea arduissima erat, mollior reddebatur & humidior. Aeger quoque somnum capiebat, vires recuperabat, & sic unico hoc, quamvis simplicissimo remedio, à mortis faucibus creptus convalescebat.

Epitaph.

Veteres, quos inter CORNELIUS CELSUS, CAELIUS AURELIANUS, TRALLIANUS, ARETAEUS, GALENUS, & Frid. Hoffmanni Oper. Tom. III.

AMATUS LUSITANUS eminent, aequae frigidae circumspicuum usum in magnis morbis, nominatim cholera, dysenteria, colica biliosa, convulsiva & sanguinea &c. miris extulerunt elogiis. Acerbe vero dolendum est, quod recentiorum Medicorum plurimi, Veterum vestigia deserentes, simplicia ejusmodi ac domestica remedia, altis veluti supercilis spernant; hisque longissime praefertant exotica, specifica, pretiosa ac pharmaceutica praedia: quibus dictis in morbis plus damni afferant, quam adjuventi. Paucissimi enim sunt, qui agnoscunt, quantam de quam incomparabilem ad arcendos pariter ac sanandos graves morbos viscidissimis ac simplicissimis rebus, ut sunt elementa, maximeque aer & aqua, tum frigida, quam calida, divina clementia indiderit virtutem. Ego certe pluribus in aggritudinibus, ad eas rite debellandas, ad Veterum placita recurrendum esse statui; nec id ipsum tant singulari fructu me fecisse, candide teltor.

Quod praeterea utum aequae frigidae in cholera ac dysenteria attinet; audiamus Veteres, quos inter CORNELIUS CELSUS Lib. IV. cap. 15. in dysenteria, inquit, si pluribus diebus alia remedia non praeceperint, utique jam vitium est, aqua bene frigida potu assumpta adstringit, & initium secunda valetudinis facit. AETIUS libr. III. ferm. 1. cap. 45. scribit: in potu à principio quidem pluvia aqua utendum est, quod si pluvia optima non adsit, fontana utatur. Et AMATUS LUSITANUS Cru. II. curat. 56. copioso frigidae potu dysenteriam biliosam observari curant. Non minus unitatem aequae frigidae in cholera, egregie testatur descriptus supra casus; qui fasiliter mihi, olim Minda medicum facientem, licuit adnotare; quem in MED. SYSTEM. Tom. IV. recentissimum legas. Virtutes autem, quas aqua in nostro morbo exferit, in eo potissimum consistunt, ut per illam ingens ardor, qui à vehementiori attritu & motu intestino partium fulgurantem luboratur, attemperetur de extinguatur; deinceps in illa humorum in primis vis concenterum aratorum diluatur, & infingatur; & denique tonos, atque robur partium solidarum, à vehementi morbi insigniari labefacturarum, rursus erigatur, infusareturque.

OBSERVATIO VI.

Vir generosus, quadragenarius, bono & scabuloso corporis habitu praeditus, ad iram proclivis, sanguinis millionibus nunquam adfectus, sed vinosis comotationibus dia occasione supra modum deditus, & hinc febribus tertianis, bariumque haemorrhagiis frequenter olim obnoxius, per aliquot jam annos circa vernale aequinoctium vel febre tertiana, vel ad minimum erysipelaceo dextri pedis tumore ardoreque cruciari cepit. Praeterea familiaris ipsi per multos annos fuit passio cholericæ, quam aestate potissimum, si à tanto cito graviore exardesceret forsan iracundia, protinus silister contraxit. Hunc valetudinis statum mihi, fontes aliquando Lauch-fluantes frequentanti, quos ipse, dictos morbos praefervandi sine accesserat, referebat, simulque indicabat, quod cholera affectus, omifis tandem omnibus, à peritionibus passim Medicis commendatis remediis, cum velut seminatim jaceret, non praestantius, quam à sero lactis percepit auxilium; se enim hoc, ad finem tantum extinguendum laudatum, tam praesentem

*Cholera
per totum
diem curata*

fenti semper cum levamine potare consuevisse, ut misceantibus sensim per superiora ac inferiora vacationibus, ejus solius ope intra paucos convalesceret dies. Petiit ergo à me consilium, quo ab erysipelate, tertium, & hac cholericæ febri se præcavere posset: quod suppeditaturus fuisset, ut bis quotannis venam præberet secandam; potibus spiritibus, ipsoque vino moderatius uteretur, & loco cerevisiæ aquam puram, cum quarta vini parte mixtam biberet. Præterea auctor sui fuisse loque, ut dum serum lactis ipsius constitutioni convenientissimum judicaret, illud jam ad ipsum fontem per quatuor hebdomades, eare loco, interposito quavis quarta die pulvere ex duobus rhabarbati unoque tantari virololati scrupulis confectio, adhiberet, & vespere in balneum temperate calidum descenderet: atque hæc singulis annis continuaret. Cui cum aures dederit consilio, factum est, ut ab illo tempore nec febre tertiana, nec erysipelate, nec hæmorrhagiis amplius corripereetur.

Epicrisis.

Offensum jam in superiore est capite, quem incomparabili in fluxibus dyentericis ac cholericis, & serum lactis, & lac aquæ nupem, polleat virtute; quod eo nomine non solum à vetustissimo HIPPOCRATE, nec non ab Italici Medicis, maxime SYLVATICO, FORTIS, BAGLIVO, item celebri Angliæ practico SYDENHAMIO; verum etiam nostris temporibus ab illustri Batavorum Medico, BOERHAVIO, multis in gravissimis morbis, magnis commendatur laudibus. Optassem vero, ut nostræ quoque Germaniæ Medici id attendere velint; ita enim futurum esse sperarem, ut io sanatio & præcavendis chronicis passionibus, præsertim quæ a copia feri impuri scorbutici proficiuntur, & suspecta bilioze ac sensibilibus naturæ invadunt, plus inde levaminis experiremur, quam quod hæcenas ab aliis, ut ut magni nominis, remedia expectare licuit. Illi enim liquores naturæ nostræ sunt amicissimi, sed notari meretur, curam per illa institutam, conjuncto regimine prudenti, per mensem & ultra esse protrahendam: cujus rationem, qui amplius scire desideraverit, adeat binas dissertationes, quarum unam de *utilitate feri lactis*, alteram de *conubio lactis cum fontibus medicatis* conscripimus.

OBSERVATIO VII.

*Cholera per frigida ex-
cipiens effluvia
prodita.*

Quam ante quindecim annos in thermis Carolinis, Principem quandam Serenissimum comitatus degerem; accidit, ut illustrissima Comes, quæ ibidem commorabatur, ex improvviso in cholericam incideret passionem, tanta quidem vehementia, viriisque jactura adligentem, ut intra octo horas plus quam triginta per alvum dejectiones, & viginti vomitus, liquæ viridescentes numerarentur. Tum ego vocabar, qui cum in causam mali indagarem, percepi, quod præter mensuram defectum per quinque jam dies thermales potasset aquas; pomeridie vero fraga hortensia paulo majori copia assumisset, & inde statim nauseam, murmura imi ventris, & inquietudinem noctu perensisset, subsecuta, quæ præsertim adhuc erant, affectionibus. Ego ipsam, & illustrissimam maritum, qui valde doctus, bono esse animo jussit, & mox hunc ordinavi puerum: *recipe lapidem caucorum, com-*

eburum preparatarum, cornu cervi philosophice præparati, unicornu solis, succini ana drachmas duas, cinnamomi acini drachmam unam, olei nucis moschata expressi grana decem: cujus drachmâ singulis horis cum mensura dimidia lactis vaccini sumit. Ad sitim præterea, quæ vehementer premebatur, me inscio frigidam bono cum levamine potavit aquam: & extrinsecus ex meo consilio spiritum vini rectificatissimum cum oleo menthæ calide, quavis altera hora renovando, abdomini applicuit. Sub hujus curationis initium, invalescere primum anxietates videbantur, & ea evomebat humores viridi bile tinctos, & in mucum quasi coeuntes; sed continuatis remediis, sensim remittebant vomitus cum reliqua symptomatibus, & illustrissima Comes intra viginti quatuor horas recuperavit viribus perfecte convalescebat.

Epicrisis.

Sæpissime mihi licuit adnotare, ab affluenti sub potu acidularum, vel etiam thermarum Carolinarum, fructibus horis, & vehementissima symptomata, cardialgia, vomitiones, alvi fluxus cum summa virum prostratione sustulit subsequuta. Hæc omnia à flatibus per fermentationem inductis æque ac inde oriunda humorum in primis viis stibulum acrimonia, quam viridescentes etiam produunt vomitiones, suos mutuantur natales; quare his in casibus congruis demulcentibus, ac acrimoniam involventibus, quale est lac, & ejus serum, una cum absorbentibus acidum, & roborantibus interius & externis, vix inveni præstantiora subsidia.

OBSERVATIO VIII.

Quam ante aliquot annos in aulam Guelfæ-Baytanam pro valetudine Serenissimi Ducis restituta vocarer; accidit, ut generosus, & maxime reverendus Canoniconum Præfectus, sexagenario major, me in reditu ad ipsum invensum, consilium petitus invitaret. Laborabat enim gravi, eoque duplici morbo, uno oculorum, quorum hic gurgis serena, ille cataracta incipiente affectus erat; altero imi ventris, quo per intervalla, crebris ructibus, & dejectionibus sursum deorsumque vehementissima vexabatur. Ad sanandum oculorum affectum conquesta permulta peritissimorum & Medicorum, & Chirurgorum, etiam Gallorum, responsa consiliaque mihi monstrabat, affirmans, quod frustra per aliquot annos vari generis remediis, quæ maximam partem erant purgantia valde acia, mercurialia, cephalica, cinnabarina, nervina &c. usus fuerit, sed inde potius ratione morbi posterioris pejor habuerit. Hic vero in eo consistebat: tertia post prandium hora prævis hypochondriorum tensionibus, borborygmis totum abdomen occupantibus, lumborum dolore, & alvo adstrictiore, quæ familiaris ipsi erat, accedebat anxietas cardialgica, cum sudore frigido, & tumore circa pylori regionem eminente sispate: quæ per status magno cum impetu primo sursum, dein deorsum prorumpentes solvebantur. Interdum vero, quando vinum Rhenanum, aut quandoque rubrum Gallicum solito largius potaverat, & cibos duriores infamatos assumserat, aut animi affectus, tristitiae cum iracundia junctas, indulerat, in vomitus atque dejectiones tam copiosas simul incidebat, ut per viginti sedes, totidemque fere vomitiones, valde acidis ac viscidis, viribus misrice fuerit

foerit exhaustus. Ego candide mentem ipsi meam aperiens declaravi, quod adhibitis ad affectum oculorum penitus despectum tot variis, ventericulo ac generi nervoso insensu remediis, id grave malum sibi met accerferet, saltem insigniter auxerit; adeoque ad hoc potius vel abigendum, vel ad minimum sublevandum omnem curandū nervum dirigendum esse duxi. Inter alia ipsum potu vini rubri Gallici quod adstringens, & in ejusmodi affectibus valde noxius est facultatis, interdixi; à crassiori quoque victu cum abstinere, & cibis, qui essent facili concoctionis, & jusculis humectantibus frequenter uti iussi. Pro potu loco cerevisiae commendavi aquam fontanā cum quarta parte vini Rhenani mixtam, vel si hanc ventriculus ferre non posset, eandem cum semine anisi leviter coctam; & denique, ut inter prandium ac coenam elocium meum balsamicum viscerale; singulis autem septimanis pulverem ex lapidibus cancrorum, rhabarbato, & semine cymini confectum sumeret, suavi.

Epietis.

Morbis hic paullo rarior, cholera sicca cum humida maritata appellari meretur. Siccae equidem cholera ideam HIPPOCRATES Lib. de victu acut. §. 61. ita nobis proponit: quod nimirum venter admodum inflatur, strepitus insit cum laterum lumborumque dolore, & postea fluxus per os & alvum impetunt, & maxima vi erumpunt. Quando vero ventriculus, & intestinum duodenum maxime ac ileon crudorum & visinosorum humorum colluvie premittit, sicca tunc cholera in humidam transit. Noster quidem Reverendissimus aeger jam olim hypochondriaca passione infestatus fuit, quae ventriculum ac intestina pro objecto spasmodum potissimum habet: quare nihil restat dubii, quam remediis ad sanandum oculorum vitium ulteriores minus aptis, & vehementioribus naturale robur dictarum partium, à quo praecipuum valetudinis dependet momentum, magis labefactatum fuerit, atque destructum. In ejusmodi vero intricata aegritudine nihil aliud agendum statui, quam ut idoneis dieteticis ac pharmaceuticis subsidia, humoris blandi reddatur temperies, & peristaltica canalium alimentaris virtus roboretur ac confirmetur. Et quamvis vini Gallici, Pontac dicti, si bonae fuerit notae, ea est natura, ut parcius sumtum, & cum aqua dilutum ad conciliandum ventriculi robur admitti queat: attamen multiplici quoque edoctus sum experientia, ejus usum, ob principium quod fovet valde adstringens, largiorem ad graves & spasmodici nervosi generis disponere aegritudines, vel eas jam praesentes augere, adeo, ut cum magna cautione id vini genus in usum, praesertim quondam duci debeat.

OBSERVATIO IX.

Vir XXVI. annorum, per omnia sanus, binis abhinc annis post gravem exandescensiam in diarrhoeam incidit biliosam, per tres hebdomades cum copiosissimis dejectionibus, & magna virium prostratione insistentem. Consuluit Medicus dabat adstringentia; & quum eorum usum, cohibito alvi fluxu, vehementiora tormina, & pungentes praecordiorum dolores exciperent, venam in brachio tundi jubebat, promanante paucis, eoque aeterrimo cruore. Facta venae sectione, animi deliquium patiebatur aeger,

& ad se rediens, spiritum difficiliter trahere incipiebat: sed dato laxante, melius iterum habebat; nec nisi de prostrato conquirebatur adpetitu. Quem ut instauraret, ex praescripto Medici aciculas Pyramontanas per quatuordecim potare debebat dies; & ante pariter ac post earum usum pilulas purgantes, potenter alvum moventes assumebat. Verum abhinc cum sicca nulli, cruenti alvi prehendebatur profluvio; quo inter atrocissima circa umbilicalem potissimum regionem tormina, & ardoris sensationem, quoties sexagesies & ultra desidere coquebatur. Ex hoc sanguinea diarrhoea per integrum jam duraverat annum, nullisque obducundaverat medicamentis. Dejectiones enim frequentissimae, & singula die trigiesies, & ultra repetitae, semper sanguineae vexabant; tenebris simul urgebat molestissimus; adpetitus quoque avidissimus, & vix satiables erat, & corpus denique perpetuo frigoris sensu, sub calidissima etiam aestate, afflictebatur, sapuisse contremiscebat. Aeger itaque meam impioravit opem.

Epietis cum consilio.

Non adeo vulgaris praesens est affectus, sed paullo rarior, & diarrhoea haemorrhoidalis chronica, ab erosione tunicarum intestinalium, colli praesertim & recti dependens vocari meretur. Cuius si primos natales consideremus; illi à gravi iracundia, cui indulsit, sunt rependendi. Hac enim factum est, ut commotis biliosis humoribus, siliismodi quoque diarrhoea suboriretur; quae si remediis temperantibus, acrimoniam demulcentibus, & leniter evacuantibus fuisset oppugnata, facile pertransiri potuisset. At male administratae medicationes tam levem afflictam, in gravissimam & fere inmedicabilem conegerunt. Namque primum magnam meretur censuram data propter adstringentia; quibus factum fuit, ut intus reventa acri biliosa materia, spasmi simul ad superiora sint revocati, & hinc praecordiorum anxietas, atque punctura excitatae.

Deinceps perverso sane consilio languis ex nasa in brachio vena est eductus: unde evenit, ut praecordiales spasmi & angustiae, invitatis magis ad superiora humoribus, invaserint, & ipsas animi defectiones habuerint comites; id quod in cardialgicis doloribus, ubi vena in brachio tundiur, sapissime notare licet. Laxans subinde datum, revocando humorum liberam per alvum excretionem, operae fecit pretium: & cum sufficit facillimum, resistentem inadpetentiam, datis roborantibus, & continuato leniorum laxantium usu, profligare, sanitatemque restituere.

Verum hanc adhibere demum aquae Pyramontanae una cum forioribus purgantibus profluvium pessumderunt. Nam illae aciculae frigore suo ad spasmodicas tonus cutanei coracis constrictiones disposuerunt; & purgantia tunicas intestinalium nervosas violenter vellacarunt. Unde congesti ab ambitu corporis confictio, ad intestina humores, acres, biliosi ac impuri, vascula sanguifera intra tunicam nervosam laetentia ad rupturam usque impleverunt; illa perpererunt, & ipsam denique tunicam atrofuerunt; cujus erosioni, diarrhoea chronica cruenta cum tenebris debetur.

Si itaque quicquam auxilium in ejusmodi consumatae una cum forioribus purgantibus profluvium deliniente, & erosioni tunicarum intestinalium

Diarrhoea biliosa maritata medicatae in sanguinem chronicam permutata.

consolidandæ dicatæ sunt, consistit. Quam vero præterea motus sanguinis & humorum ab ambitu corporis ad intestina tendunt; non præstantius perpirationis restitutione erit subsidium, quam balnearum vaporosorum frequenti & convenienti usu obtineri posse confido. Interne olei olivarum cum spiritu menthæ equali parte permixti frequentem usum, neque minus pulverem ex bolo armeniaci papij. & corticis calcæillæ p. i. compositum, item insusum theiforme ex mentha crispâ: & pro potu decoctum cassiæ & tantali rubri usurpandum commendavi.

OBSERVATIO X.

Diarrhoea cum vomitu et syncope.

Est in nostra civitate matrona quædam honesta, xlvj. annorum, temperamenti sanguineo-phlegmatici, obesa, vasque exiliioribus instructa, quæ per octo jam annos menstruum inordinatum successus, atque hinc pendentibus hysterici & hypochondriaci labori affectionibus. Nata nimirum est matre nephritica; vixit longo abhinc tempore utitur lauto, ac pleno, ac præter aquam puram, cum pomis citri, & saccharo distemperatam, pro ordinario potu vino Gallico Pontac, venam ter secundam quotannis præbet, sed vitæ genus motus proliis expertus agit. Ante octo igitur annos suppressus primus per aliquot vices mensium fluxus, graviditatis suspicionem ipsi pariter ac consilio tum Medico movebat; sed mox evanescibat illa spes, & nascebatur febris intermitiens consumacissima, nullis celsis remediis, donec tandem summa per octiduum corticis chinæ largæ quantitate cohiberetur. At succedebant dolores lumborum & ossis sacri, ingens corporis languor, capitis dolores, aurium fulgur, atque tinnitus, oculorum caligo, & angustie præcordiales. Datæ purgantes, & infusiva venæ scëbone, anxietates quidem cum capitis doloribus remittebant, & menstrua rursus profluere incipiebant: at reliquorum symptomatum vehementia persistebat, & quovis mune largi promanabant sudores. Me tandem consuluit, qui præparato per laxantia & antispasmodica corpore, usum balnearum Tæpæicium commendavi: quibus usû egregium sensu levamen; sed gravi terrore commota, priorem & graviores incidit sanitatis labem. Domum rediit febre biliosa cum purpura alba pchendebar, qua percurata, ex inco consilio per duos successivæ annos balnea adhibuit Lauchladiensia, egregio cum fructu. Sed accedentes crebri animi adfectus finitatem, quæ imminerebat, semper iterum destruxerunt; donec ante scemestrum demum tempus, prævia excaecescencia, graviora incidere symptomata, dolores dorsi ac lumborum invalescerent, & sudores matutini magis increverent. In tali rerum statu sumsi ad referendam, quæ obstrucla erat, alvum, salis Sedlicensis unciam dimidiam: unde factum est, ut alvus vigesies & ultra deiceretur, & præterea graves præcordiorum anxietates, capitis & dorsi dolores, sanguinis ebullitiones, pulsusque celeres cum duritie juncti accederent. Quasi venæ in pede litionem; sed eam in brachio, detracta sanguinis parca quantitate, insinuatam, major effluis, tantæque humorum ad caput exceperunt congestiones, ut in propinquo essent deliria. Adhibitis igitur temperantibus, venam iterata vice in pede tundendam, & largam cruoris copiam detrahendam curavi: unde remittebant congestiones ac alvus, sed dolor in dorso invalescebat, & sepi-

mo morbi die vehementer accedebat diarrhoea, cum perpetuo sudore & languore stipata. Hæc adhibitis intus temperantibus, ac mixturis analæpticis, externe emplastro saponato cum oleo hyocyami & camphora malaxato, nono die conquiescens, undecimo præter opinionem recrudescere; & dato cum pulvere præcipitanti liquore anodyno, extrinsecus admoto balsamo vitæ dactylis, iterum feliciter expugnabatur. Sed dolores dorsi tantas sumebant vires, ut per viginti septem dies, omnem oculis eriperent somnum: qui tandem, continuatis interne anodynis & antispasmodicis, externe dicto emplastro, cum oleo hyocyami, nucis, camphora, & balsamo Peruviano permixto, debellabantur. Felicissimum etiam effectum in moderanda diarrhoea & mitigandis doloribus pulvis ex bolo Armeniaci, fuscino, & pulvere calcæillæ compositus, sed parca & repetita dosi, & cum aqua menthæ exhibitus præstabat: præterea consilium dedi, ut accedente vere lacte asinino cum forte Selterano permixto, interposito balneo aquæ dulcis, utatur.

Epiëris.

Omnia illa mala, quibus cum usque eo per longum tempus honesta illa femina consociata est, nullam certe aliam causam, si primam originem spectemus, quam immoderatam vini adstringentis Gallici, & potus dicti Limonadæ acidæ, & postea perversum ad longum & quotidianum scëbtem expugnandum corticis chinæ usum agnoscunt. Nam uti in totum, acida, quæ incrassant humores, & adstringentia, quæ minimos tubulos quam facile constringunt & obstruunt, vitalibus motibus, qui in libero per partes humorum progressu & convenientibus inde pendentibus se- & excretionibus consistunt, valde sunt inimica: ita insausum & noxium eorum effectum in sexu maxime sequiori, qui hinc rebus delectari solet, quotidie fere conspiciamus; dum mensium negotium minuendo & turbando ad innumeratas graves & diuturnas agnitiones disponunt, præsertim si feminae complexionis phlegmaticæ & sanguineæ fuerint, & plus jussu deside, vitæque sedentariæ atque inordinatæ affectibus deditur; quale exemplum præsens morbi historia exhibet: continuus ille lumborum primam vertebra, uli plexus magnus mesentericus situm habet, occupans dolor non oisî spâti, qui sese diffundit per totum intestinorum canalem, ejus functiones secundum naturam pervertentes species est. Crebrior ille & sepius recurrens alvi fluxus intestinorum motus naturalis destructi & humorum vitiosorum maxime acidorum ibi congestorum indicium est, utpote qui & mole sua naturam ad excretionem stimulant, & acrimonia mucilaginem, qua tunica nervæ intestinales tectæ sunt, detergendo, easque ex parte arrodendo malo diuturnitatem & consumaciam adjuçant.

CAPUT IX.

De Convulsione Uteri sive Abortu.

THESES PATHOLOGICÆ.

§. I.

ARVUM muliebre, omnium officina mortalium, non modo, si sterile, fructuque vacuum

caum existerit, spasmodum tyrannidi obnoxium est, sicut in malo videre licet hysterico: verum etiam foecunda prole praedictam, gravissimos saepenumero spasmodicos ac convulsivos patitur motus, vique horum non raro fructu schimmet conceditio spoliatur; quem valetudinis statum abortus nomine significare solet schola medica. Est enim abortus *spasmodico-convulsivus uteri motus, quo facti immaturus & mortuus, praecedente utplurimum enormi sanguinis profusio, violenter excernitur.*

Abortus definitio.

§. II.

Abortus differtur a partu septimestri.

Dum immaturum, nondumque vitalem per abortum excerni diximus factum, illum à partu septimestri, vel octimestri distinguimus. Hic enim utique vitalis existit, & ego ipse aliquot novi exempla, ubi edui fuerunt infantes, septimanis adhuc quinque vel sex deficientibus, imbecilliores quidem, sed qui convenienter per calorem, somnum, quietem & tenerius alimentum regimine, non modo ad debitum robur & perfectionem, sed etiam ad longam pervenire vitam. Notanda subinde haec abortum inter & partum septimestrem est differentia, quod in hoc uteri haemorrhagia factam demum sortis exclusionem sequatur; in illo vero antecedit, tumque embryo, ique mortuus excernatur.

§. III.

Abortus differtur a partu septimestri.

Abortus plerumque fit inter secundum & tertium, interdum etiam inter tertium & quartum, rarius inter quintum & sextum praegnationis mensem. Nam post quartum mensem, ubi foetus incipit moveri, ad verum partus tempus foetus dicitur mortuus, & majori semper cum difficultate fit; utplurimum circa id tempus, quo alias menstrua fluere consueverunt. Nota sunt mihi plurima exempla, ubi tertio mense circa tempus menstruum foeminae abortum passae fuerunt. Nunquam porro, sed rarissime contingit, ut circa septimum mensem à violentia externa placentae ab utero fiat avulsio, quam larga sanguinis ex utero profusio sequitur, sub qua infans moritur, & nisi naturae robore cito expellatur, ipsa mater in summo vitae versatur discrimine.

§. IV.

Signa abortus.

Signa imminens abortus, & legitimi partus magna ex parte sunt communia; nam in utroque casu cum quadam praecedente horripilatione, & partium extremarum refrigeratione, dolor praeflorius in lumbis, qui sese extendit ad anum ventrem, percipitur; postea ad os sacrum, coxendicem, & inguina descendit cum pulsu arteriarum auctiori; os uteri fit humidum, & relaxatur, & evacuatio aquae instar loturae cartium procedit. Speciatim vero in abortu ante expulsionem foetus sanguis purus cum grumis fac larga saepius copia cum summa debilitate, & frequentius animi deliquio ejicitur, & tertio denum die foetus expellitur. Praecedit utplurimum subitaneus corporis rigos & horror cum lassitudine, inappetentia, nausea, cordis palpitacione, lumborum dolore; circa pubem gravatius dolor atque in partibus genitalibus frigus: quo gradior autem & adusior est embryo; eo acerbiores spasmus, dolores ac majora symptomata non sine periculo observantur. Signa abortus futuri HIPPOCRATES *l. II. de morb. mulierum §. 6.* ita proponit *ruber fluxus fuit talis, qualis sanguis vitulina recens mollatus, & grumi pellucet. Ali-*

quando vero etiam fluxum rubrum emittit, & venter inani attollitur & attenuatur, & impotens fit & indurefcit, & ad contactum dolet, velut ulcere praesente & febris habet & denique frenitibus & dolor ad ipsa pudenda, & pubem & lateris molliudinem, & lumbos & tendinem & cuncta & pelvis & scapulae irruat. Et alias omnes partes dolet & impotentia ac pusillanimitas occupat, & color mutatur.

§. V.

Ab abortiva vero haemorrhagia probe ille cruentus ex utero fluxus, qui multis praegnantibus foemellis circa noxam, & ab ortu metum contingere solet, distinguenda est. Nam foeminae fit, ut quae sanguine abundant foeminae, secundo & tertio praegnatibus mensis sanguinem experiantur fluxum, circa dolores & spasmos in regione lumbi & abdomine, circa debilitatem, & praecedentem horrorem & rigorem panium extremarum. Hoc autem in casu sanguis non ex utero cruitur, sed potius ex vasis vaginae uterinae cum eujhoria profluit. Atque nota nobis sunt exempla, ubi à medio gestationis tempore usque ad ipsum partum sanguis ex genitalibus effluxe, salvo nihilo minus & vivaci satis prodeunte foetu. Quare saluti *aph. 40. Sect. V. HIPPOCRATIS* Si mulier gravis sit menstrualis, non potest sanus esse fetus.

§. VI.

Refert porro scire, non omnes foeminae abortiendum proclives esse; & quibusdam ne violentissimis remediis abortum provocari possit. HIPPOCRATES quidem *l. I. de morb. mulierum* asserit: *abortum fore medicamentum, sive potione vel cibo vel alia re quamvis contingere, & §. 42. sunt quae factum corrumpant, si acre quid aut amarum ederint aut biberint praefer consuetudinem, dum adhuc parvus intus est puerulus. Is enim moritur & turbatur gravis venies, & anxiosae concitantur.* Verum in nostris regionibus ubi corpora sunt robustiora & minus fenibilia, id ipsum non observatur; Sic GUARINUS *Consult. 636.* ait: *vidi multas viros perentes, foris misque medicamentum, & multas tenas scilicet cruciatus, & nulla fecit abortum.* PLATERUS *prax. pag. 113.* in mulieribus diarrhoea laborantibus abortum minime scilum fuisse testatur. ZACUTUS LUSITANUS in *praxi admir. obs. 43. 44.* refert, per vehementissima purgantia, per leues, imo odices repetitas venae sectiones, unguenta fortissima & pessaria utero adplicata, per longam evacuationem, nullos procuratos fuisse abortus. Speciatim huc quoque notabilia illa observatio D.D. SOMMERI, quam *Dec. I. anno VI. obs. 106.* M. N. G. inserit, mulierem quandam, centum guttas olei dissillati juniperi per viginti dies, omni mane ad mensa provocandos utaripasse, postea tamen filium peperisse. Qua de re lusus agit ALBRECHTUS *Dec. I. anno VIII. obs. 165.* & recenset, fortissima emmenagoga, ut olea dissillata fabinae, succini, myrrhae, crocata, aloetica ad factum expellendum frustra fuisse propinata. Singularis etiam observatio est, quam habet BARTHOLINUS *M. N. G. anno I. dec. I. obs. 52.* de geminis gravidis, quae venerat laborantibus, quae à Chirurgo, eas esse praegnantem, neciente, haecuriali salivatione curata, & nihilo minus salvos foetus enixa sunt.

§. VII.

§. VII.

2) Peris
abortionem.

Ipse ego non semel, sed aliquoties observavi, gravidas quasdam vehementibus acutis febribus, nec non variolis, morbillis, diarrhoeis, imo dysentericis laborasse, & factum in utero vivum saluumque retinuisse. Novi etiam aliquot exempla foeminarum generosi stemmatibus, quae, quia non putarunt se gravidas esse, ad mitiganda pathemata hypochondriaco-hysterica integram curam Carolinarum per aliquot septimanas absolventes, & postea Torpicensi balneo per septimanam & ultra usque, elapsis tribus vel quatuor mensibus, felici partu bene valentes & robustos excluderunt infantes, cum tamen ejusmodi curandi ratio gravidis minus tuta censetur. Neque pauca mihi prostant exempla, quod utero gerentes per accidia & declivia loca sine ulla noxa per dies noctesque fecerint ininera & nimis saltationibus immensus in modum se fatigaverint. Nec omnibus impraegnatis terror nocet: alias ob campenarum subito incendio fontium inopinatum plures in amplis civitatibus decesserunt abortire, quod tamen rarius accidit.

§. VIII.

Subje-
ctio.

Quibus praemissis, eas mox subiungere observationes consulem erit, quas de subiectis abortu, attenta praebet experientia. Sic adnotamus, mulieres succulentas, pinguioribus, mollioribus & subtilioribus corporis habitibus, otiosas, opiparum laetique vitae genere urentes, nativae imbecillioris ac sensibilibus, pathematis hysterici obnoxias, quae ordinario mensura vel copiosiora, vel in ordinata fuerint expectatae, quae semel abortum passi, aut quorum matres ad abortiendum proclives fuere, longe faciliores ac opportuniores ad abortum esse, quam feminas musculatas, duriori fibrarum compage donatas, robustiores, plebejas, minus pingues, & quae valido exercentur labore, neque terrore & aliis animi intemperatis motibus nigrum indulgent. Constat quoque experientia, illas foeminas, quibus per priores praegnationes menses sanguis ex utero vagina productus, quibus ciborum adpetentia languet, & quae odontalgias, & distensionibus tussiculosis, namque haemorrhagiis subinde expositae sunt, vel sanguinem semel blivae tempore graviditatis & vena mittunt, ad al. ortidun minas promtas esse. Ceterum de differenti mulierum natura ad uteri morbos & ad incliviatem abortus insignis locus HIPPOCRATIS qui exstat de morbis mulierum l. II. §. 5. meretur considerari.

§. IX.

Structura
uteri vix
cognita.

Hinc autem, cum in quibusdam vel levissimae causae abortum moveant, quoniam in aliis nulla aere excitare valet, certissima sequitur conclusio, peculiarem uteri in facili abortientibus esse debere dispositionem. Quae ut innotescat, de uteri structura de usu quaedam praemonere, haud alienum erit. Scire igitur refert, 1) quod nulla in toto corpore pari tam numerosa valorum copia sit instructa, quam ipse uterus, quippe quae, testante injectionum artificio, totus ferme est vasculosus: accipit enim vasa sua & arteriola & venosa partim à spermaticis, partim hypogastricis, partim etiam ab iliis. 2) quod in nulla corporis parte venae praeter ac arteriae tam copiosae, quam in utero, gaudeant anastomosis: nam inlatus per spermaticas venas mox in hypoga-

stricas penetrat. 3) quod vasa uteri in virginibus valde exilia, facta impraegnatione adeo distendantur, ut minimi coramdem ramuli acquirant eam capacitatem, quae majoreni admittit sylum. 4) quod non recto, sed valde anfractuoso, tortuoso, & velut serpentino fluxu per uteri substantiam discurrant. 5) quod venae arteriae longe sint capiores, ac 6) valvulis plane destituantur. His ex novissimis tribus momentis clarissime patet, circulum & comprimis refluxum sanguinis per venas uteri valde tardum in statu etiam naturali esse; & hanc uterum praeter aliis partibus, nimis humorum congestionibus, valorum infarctibus, distensionibus & haemorrhagiis obnoxium existere ac aptissimum.

§. X.

Id vero peculiare sibi servat exquisita vasorum uteri connexio, quod in plurimas cavernulas si-
De cellu-
lis, & fo-
raminibus
utero.
ve cellulas mutuo communicantes canalium alvei definant, & sinus ovals figura efforment, quae substantiam ipsius uteri spongiosam & fungosam reddunt, atque in gravidia mire ampliantur: quo fit ut uterus, praeterea praegnat, transverlim sectus, ampla & innumera fere exhibeat foramina. Hac sinuosa & cavernosa valorum commixtura efficitur, ut non ipse solum uterus in praegnantibus a sanguine contento minime dilatetur, ejusque testis & stricte quae compages laxior atque mollior redatur, sed etiam ordicis extremitatum vasculosarum, quae in cavo oblique sub membrana uteri liant, & per quae aer, canali eisdem inflatus, in ipsam cavitatem haud difficile transmittitur, magis diducatur, siquae perforata vasculosa chorii membranae filamenta excipiant, quo per illa sanguis, ex utero ad foetum, hunc nutriturus transire possit.

§. XI.

Deinceps notari meretur, uteri membranarum
Structura
uteri pte
fo. et pte
que elab-
en vasa.
fibris carnis esse praeditam, earumque ingen-
tem congeriem orbiculatam, imo inflat retis con-
textam, in uteri posticum fundo conspicui.
Harum ope peculiarem tonum, seu motum sy-
stematicum & diallaticum obtinet, quo sese con-
stringere, rursumque dilatare aeternis valet vicibus.
Et hoc motu recte, secundumque natu-
ram sese habente, liber & expeditus sanguis
per uterum fit circulus, omnesque illius functio-
nes legitime tuecedunt. Sed simul observatione
dignum est, quod uterus vi dicti hujus motus
miserica & vix comprehensibili potentia gau-
deat elastica, quae ejus fibrae & vasa incredi-
bilibus in modum distendi & explicari, sicut fit
in graviditate; ac excreta sarcina, siquae cessan-
te distensionis causa, sponte rursus contrahi, com-
muni, & ad primum statum ac spemum redigi possunt.

§. XII.

His expositis, porro haud ignorari oportet, Causa pr-
mationem
foetum libere in cavitate matricis fluctuantem, & ab umbilicali duntaxat funiculo pendentem, vi placenta uteris, quam secundinas vocant, cum utero ita cohaerere, ut illius extrema vas-
cula, tanquam manini villi in foraminula atque ductus uteri §. X. delapsos inferantur, & cum
illis laxo uniantur. Jam ex supra dictis reperimus, quod fortis in abortu fit mortuus, illamque tan-
tum non semper haemorrhagia antecedit. Mor-
tur autem foetus in utero, si succi vitales, uni-
cum illius nutrimentum, non amplius ex orificis
valio-

vasorum uteri ad villos secundinarum feruntur; quod fit, si placenta uterina, membranosa valde ac vasculosa ab uteri vasorum orificiis avellatur. Ergo praeternaturalis placenta avulsio perpetuum abortus causam constituit. Avulsio enim secundina non aliter fieri potest, quin vasa uterina cruore turgida dissentiant copioso, hunc per hiantes ductus & patula orificia in matricis effundant cavitatem; qui una cum cadavere, latera arvi mulieris premente & molestante, (mortua enim corpora semper graviora sunt viventibus) carnes ad mortus spasmodico-convulsivos pertrahit fibras, aut eos jam praefertes adauget; quibus contrictis, & ab omni latere pressis uterus, aperto interno orificio, expellit primo contentum cruorem & fluidum, & stagnando in gramis concretum, ipsamque tandem, ampliore facta apertura cadaveris, sarcinam deponit.

§. XIII.

Haec dicta vero secundinarum avulsio, spasmodum abortivorum immediata causa, à variis induciprehenditur mediis; quas inter primum locum occupant illatae extrinsecus violentiae; quippe quae graviter concutendo abdomen, rupturam cohaerentium laxae villorum facillime inferunt. Hinc per gravem imi ventris percussione, vel commotione, sive per ictum & lapsum, sive vehementem corporis exercitationem, saltationem, vecturam hat, vel nimiam abdominis in allevatione brachiorum, aut gravioris ponderis elevatione factam extensionem, provocari abortus, multis observationibus & exemplis habemus comprobatum. Eidem fundamento innititur abortus, quae per frequentem & immoderatam coitum excutitur, cuius mentionem injicit GUIL. FABRICIUS HILDANUS *Cen. II. obs. 80.*

§. XIV.

Deinceps dicta separatio fit ab inopia succi & sanguinis nutritii, per orificia vasorum uteri in apertos secundinarum villos insillari soliti. Nam si orificia vasorum uterinorum ob deficientem sanguinis affluxum exarcentur; fetus nutrimento destitutus perit & corrumpitur, qui hoc in casu saepenumero absque spasmo & doloribus ejicitur. Hinc disposuit 1) in mortis gravioribus, febribus acutis malignis, nimis diarrhoeis, maxime dysentericis, & quidem frequenter circa declinationem abortum; 2) ex eodem fundamento abortum provocare valent immoderate sanguinis missiones, in subjectis sanguine non adeo abundanter insitatas, cumprimis in regionibus calidioribus: unde HIPPOCRATES *aph. 30. sect. V.* recte dicit, quod venae sectio ad abortum disponit; siquidem eae tempore ad animi ulque deliquium sanguis mitti solitus est.

§. XV.

Frequentissimam autem abortuum causam exhibet nimia sanguinis moles, quam plethoram vocant. Constat nimirum ex supra dictis, progressum sanguinis per vasa uteri venosa in statu naturali esse difficilissimum ac impeditorem. Quod si igitur illa à copioso humorum affluxu ultra modum distendantur, & sanguis in sinibus stagnat; sequitur spasmodica fibrarum uterinarum contrictio, tanquam perpetuus dissensionis vasorum comes; qua fit, ut sanguis cum impetu ex orificiis arteriarum eructetur, uterus flaccescat, placenta secedat ab ejus filamenis & vasorum hiatibus, ac demum fetus uterinarum secundo vel tercio

ab haemorrhagia de excludatur. Hinc cum SYLVIO *Cap. VI. prax. med. observamus*, geminas gravidas nona decimaque post cessantem menstruum eruptionem hebdomade sextum subinde pati sanguinis sans magnum, & una cum ipso excremento aliquid coagulati carnicis; quae educto circa hebdomadem octavam post cessantia menstrua sanguine, nil simile in se animadvertunt, verum gravidae manent, atque circa novum mensem, vivum & vitale paritum sortemur. Unde recte concluditur, has prioribus quoque mensibus fuisse gravidas; posthabita vero redundantis sanguinis immixtione abortum fuisse passas, & hoc praesentem sementis largo mensium fluxui obnoxii event; nam quia fetus tenerior est, facillime cum uteri haemorrhagia profundatur. Hinc recte dicit HIPPOCRATES *Lib. de partu & timore*, plurimas primis quadraginta diebus fieri abortivos.

§. XVI.

Saeptis huiusque abortionum causis sunt omnes illae res, quae uterum ad spasmodicas contrictas valent stricaturas; quibus, si praesentem robusta illa fibrarum series, in fundo uteri obvia, afficitur, secundinarum inducitur avulsio. Hoc nomine abortum provocandi potentia possunt 1) vehementiores animi affectus, praesentem gravem iracundia atque terror, praesentem si haec graviora pathemata invicem jungantur, & unum alterum excipiat, maxime eo tempore, quo menses olim fluere consueverant. 2) remedia ad pellendum solum destinata, quae nimium sanguinis orgasmum incitando, & solidas commovendo partes, voris nonnunquam satisfaciunt; quo quidem fine omnia calidiora emmenagoga, ac diuretica celebrantur, cumprimis oleum succini, & sabina; radix lixis, conf. SCHROEDERI *pharmac. med. clym. Lib. IV. 3*) fortiora purgantia, scammonata, colocynthiaca, jalappa, aloetic, quae spasmodum intusortum & totius nervosi systematis non raro inducunt. 4) vehementiora emetica, siquidem sub ipso distentionis ac violento vomitu saepe sunt abortiones. 5) nullis feminis ac convulsivis, nec non omnibus convulsivis, ac epilepticis morbi. 6) fluor denique albus, qui non modo humore acri vellicante, verum etiam relaxando uteri fibras ad abortum disponit. Ex classe rerum non naturalium cibi & potiones adstringentes & maxime omnium, ex nostra observatione vina Gallorum rubra immoderatius assumpta, liberiores sanguinis cursum impediendo, ad largas haemorrhagias & abortum quoque disponunt.

§. XVII.

Verum enim vero, quam omnes hae causae à se quo multis impune ferantur, & hinc semper dispositio quadam ad abortum iam supponatur; quae sitio incidit; in quo potissimum consistat illa dispositio? Hanc vero in nimia fibrarum musculosorum, & vasorum uteri elasticorum relaxatione, remissione & atonia collocandam esse, statuo. Namque sub tali insigni toni deiectione libera sanguinis & humorum progressus intercipitur, vasa venosa à nimio sanguinis confluxu valde distenduntur, sunt varicosa, uterus ad spasmos enormes irritatur, quibus mediis extrematates vasorum aperiuntur, nutritio fetus perit, atque avulsio secundina, fetus praemature expellitur. Et haec omnia eo certius fiunt, si quadam causarum mediarum, brevi ante recentissimam, accesserit; quae, si debitum uteri robur, ac legitimas

Causae abortivae morales sunt 1) exterior violentia.

2) Defectus sanguinis.

3) Nimia plenitudo uterina.

convulsio
ad abortum
proclivitas

per illum sanguinis circuitum præsto fuerit, nihil ferre valebunt, testantibus §. VI. adductis exemplis. Hæc ipsa etiam humorum in relaxatis ac dilatis uteris vasis stagnatio causa est, quod foetus primis illico mensibus vitians atque corruptus in carneam sæpe massam variæ figuræ atque consistentiæ, quam molam dicere solent, degeneret, cujus ab utero avulsio & excretio cum magna symptomatum exacerbatione fieri observatur.

§. XVIII.

Confinementum Hippocratis.

Ad ejusmodi præternaturalem à copia humorum uteri relaxationem, tanquam veram abortus causam, antiquissimum nostræ artis Professorum respicisse, testatur §. I. *apud. 45.* ita se habens: *quæcumque moderate corpus habentes, abortum bimestres & trimestres, sine causa manifestæ, his uteri acetabula mure sunt plena, & non possumus fetum continere præ gravitate, sed abortimus.* *Confl. etiam aph. 52. ejusdem scilicet,* in quo uteri intemperantur, si nimis siccus sit, accussat, quod ad fecundandum & nutriendum fetum plane sit ineptus: laudat vero ejus temperatum & moderatum statum, quo nihil aliud, quam minus de robur uteri aquabile, moderatum, & ad liberum sanguinis circuitum apertissimum subintelligitur.

§. XIX.

Difficilis ad abortum uterum Hippocratis.

Hæc autem diffusio ad abortiendum variis acquiritur modis. Vel enim nativa fibrarum uteri debilitas subest, adeo ut matres, quæ frequenter abortiverunt, filias generent, ad idem vitium proclives: vel etiam consuetudo mereatur accusari, quia formine, quæ semel vel bis abortivere, crebrius in id malum incidunt, idque non raro eodem tempore: sicut non semper foetus, sed loco hujus infans in sanguine mucoso concreta massa, proleat. Per hanc vero consuetudinem nihil aliud intelligo, quam pravam valorem uteri laxitatem, & inde provenientem humorum stagnationem, ex abortiendi labore sæpius repetito inductam; ex qua subinde uterus in spasticum & convulsivum motum ex facili ac levissima causa conjicitur.

§. XX.

Abortum Hippocratis.

Relinquitur etiam utero abortiendi proclivitas, ex præpostero puerperarum regimine. Quod si enim post puerperium uterus non rite à lochiis & stagnante sanguine viscido mucoso liberatus, neque per convenientia remedia colluvies feri impuri è corpore per alvum vel alia excretoria detracta fuerit, neque hinc ad primum & naturalem tonum & constrictionem ipse pervenerit: relinquitur ingens atonia, & imbecillitas valorem, menses non procedunt legitime, non fiunt fecundi conceptus, foetus non debite nutritur, sed ante tempus ejicitur immaturus.

§. XXI.

Abortum Hippocratis.

Ipsa denique tempestatum vitiosa constitutio ad abortum disponere, & hunc epidemicum reddere valet. Unde HIPPOCRATES *scilicet. III. aph. 12.* asserit, per locum pluviolam ac clementem, si ver lequatur æquilonem, mulieres ex facili occasione abortire, vel imbecillos, ac morbosos pueros parere: quia scilicet plethora in gravida terosa, quæ sæpe ordinaria est, per præcedentem autumnum humidum & pluviosum, & succedentem epulæ naturæ hiemem, immensum in modum increvit; superveniente autem

ætræ statu æquilonari, quo à superficie ad interiora pelluntur humores, necesse est; ut ad ipsum uterum nimia & impetiosa fiat feri excrementi confluxio, secunda abortiendi generis. Cui quidem observationi hanc subiiciendam reor cautelam; quod talis ætræ status non omnes gravidas, sed eas potissimum, quæ sanguinei & humidioris temperamenti sunt, afficiat.

§. XXII.

Omnia abortus est periculosus, eo magis quo adultior foetus existit. Cumprimis ille periculo non vacat, si mola cum ipso foetu præfens est; quippe quæ, hoc excluso, utero firmiter alligata remanet, nec tam facile eliditur. Tunc nam dolor dorsi & ossis sacri semper urget, abdomen insumescit, vires consumuntur, lenta est febris, & pravus ex utero promanans humor, vitalesque universi corporis satifcere incipiunt functiones. Multum sane hoc vitium mendicibus facessere solet negotiis, præteritum, quando ipsæ foemellæ sensibilibus naturæ, ad animi commotiones valde proclives, & pathematis hysterici obnoxie fuerint. Pathemata quæ abortum sequuntur, HIPPOCRATES *scilicet. de morbis mulierum §. 5.* ita describit: *si fluxus ex utero abortus fuerit; sanguis multus fluxit, & grumi compacti exierunt; & dolor occupat lumbos, & laterum molli-tudinem, ac inum ventrem & durus est venter, & ad contactum doloris riget ac febris acuta corripit; debilitas oboritur; & omnia præter humores ad scapulas delent; & calor intus; & rubescit, & vena dura sum ac renitens.*

THESES THERAPEUTICÆ.

§. I.

Omne plerumque consilium & auxilium, quod in abortiendi negotio, à medente sperari & promitti potest, in eo duntaxat consistit, ut præcaveat imminuentem abortum. Quod impedire licet, si opo remedium ex dietetico, pharmaceutico, & chirurgico fonte petitorum, eas causas, quæ pravam abortiendi dispositionem utero inducere possunt, omni cura ac studio amovere nitatur; debetumque utero robur restituat.

§. II.

Quam igitur ex supra dictis perspectum habeamus, valorem uteri à copiosiori sanguinis affluxu insarctum primam & præcipuam abortiendi causam consuetudine facile patet, non certius, nec efficacius ad præcavendum id vitii genus tempestiva sanguinis missione dari præsidium. Hoc & experientia, & creber usus peritiorum Medicorum à longo jam tempore stabilium confirmatur: quæ dedit; & non eo solo complures foemellæ, quæ crebrius abortum perpessus sunt, ad statum parienti tempus deductas novimus. Sed primo quidem notari meretur, quod, cum creber abortus usque plurimum circa finem tertii ab impregnatione mensis, propter largiorem sanguinis ad uterum affluxum, quem foetus ad sui nutritionem tunc nec requirit, nec ferre potest, incidat, tutissime circa id tempus, præsentem abortui jam afflucens, vena in brachio secetur: ea enim hoc in loco, suffragante omni antiquitatis testimonio, securior, quam in locis inferioribus habenda est. Nihil minus in totum non negari potest, quin vena scellio etiam

in pede gravidarum, præsertim ultimis circa partus tempus mensibus, commo-dissime possit insitui. Deinceps vero circumspicito præsentis Medici iudicio committendum est, quantum sanguinis emittere, & quoties ejus missionem iterare conveniat. Nam eam pro diversitate plethoræ, majorique vel minori sanguinis ad uterum congestione ter sæpe, vel quater intra graviditatis tempus esse repetendam, crebra nos docuit experientia.

VI. AMATUS LUSITANUS *rem. II. curat. 95. it. MISC. NAT. CUN. Dec. I. M. VI. obs. 204. A. IX. X. obs. 48.* ubi refertur, Medicum foemina, quæ odiosè abortiverat, repetitis venæ sectionibus circa initium quarti mensis, item circa septimum ab ultiori abortu præservasse. Nec deficiunt exempla, ubi singulis mensibus ex venæ sectione petendum fuit auxilium: cujusmodi observationes apud STALPAKT van der WIEL, HILDANUM, BILLINGERUM, RIVERIUM *Cent. I. obs. 53.* VERSACHAM *Cent. I. obs. 82.* absque non sine fractu legi possunt. Cumprimis vero tunc opportunissime detrahitur sanguis, si naturam in movendo abortu esse occupatam, & doloribus medicis, humbos possimum infestantibus, & ad ossa ilechi, nec non os sacrum descendentibus, colligitur. Cujusmodi molimina ad abortum quoties occurrunt, toties, memento Clarissimo BOERHAAVE, sanguis è partibus superioribus mittendus est. Utulidum hanc in rem FERNELII monium, quod habet *I. II. meth. med. c. 12. inferiores præstantius venas, scribitis, incidere minime tuum, quod impetu dorsum converso menses præcedant, præcipiturque fitus.*

§. III.

Quum porro gravidæ, quibus alvi constipatio familiarior est, & quæ insuper pathematibus hypochondriacis, vel hysterics obnoxie sunt, ad abortiendum admodum pitoræ deprehenduntur: eo respicere debet Medicum, ut per totum gestationis tempus, maxime prioribus mensibus, æterum convenientibus remediis servet alvum. Ego non semel quidem, sed sæpius observavi, quod, ubi à sanguinis abundantia in gravidis, vasorumque ini ventris nimia replezione difficillime succedit alvine excretionis negotium; in eadem, subacta legitima sanguinis quantitate, ad pristinum mox redeat officium. Inter pharmaca vero, quæ hic alvinam excretionem tuto adjuvant, emineant passilata, mannata, inque primis rhubarbarina. Probate præ ceteris fidei est sequens electuarium: *re-cipe rhubarbari pulverisati unciam unam, manne unciâ duas, etemoris tartari drachmas duas, solvantur leni calore in aqua veronica libra dimidia; colature addatur passilatorum minorum libris una, & infundatur leni calore in vase flavo, adfecta sub furm pulveris cinnamomi drachma unguibus duo vel tria coelebrata circa prandium, vel somni tempus capiantur.* Ius vero, quæ magis sero, quam sanguine abundant, proficue porius sunt pilula Beckeriastæ, vel ad eorum exemplar paratæ; quarum eo tutior erit virtus, si ad infringendam, quam in nonnullis excitare solent ebullitionem, cum ipsa pulvis quidam absorbens, destitutus & nitrosus exhibeatur. His etiam commodissime substitui possunt pilule marocossine pariter ac de succino Crætesis.

§. IV.

Sæpius fit, ut neglecta uteri post partum à for-dibus ipsi inhaerentibus purgatione, remaneat ad

Frid. Hoffmanni Oper. Tom. III.

abortum proclivitas, quam quidem præcavere debet per convenientia laxantia, balnea & ionica. Ex laxantibus præter dictas pilulas, usurari potest infusum, quod paratur ex radicis aristolochie rotunde, zedoarie, pimpinellæ, rhubarbari ana uncia dimidia, herba melisse manipulo uno, liquoris cheiri, cubos, salvia ana pugillis quatuor, feminis levistici, cumini, cardamomi, corticum aurantiorum, baccarum lauri ana drachmis duabus, fibrarum bellebori nigri, agarici trochiscati ana uncia semis, passilatorum manipulo uno, tribus, quæ affusa vini Rhenani mensura una & dimidia, leni extrahantur calore. Deinceps balnea aquæ dulcis convenient, in quibus, ad roborandum uterum, lacculos specibus nervinis repletos ventri applicari jubabit, quales sunt herba rorismarini, pulegii, marrubii, artemisii, salvia, majorana, summitates origani, ferpuli, mentha, flores chamomillæ vulgaris & romanæ, & semina quatuor carminativa. Ubi vero balnea locum non habuerunt, summo cum fructu adspicuum vili emplastrum Rostgii, & suis commendatum, quod est lithargyri, oleo olivarum, cera, thebentina, oleo laurino, gummi galbano, opoponace, ammomacho, bdello, olibano, mastiche, myrrha, albe & camphora, debita dosi permixtis componitur, & ossi sacro, nec non regioni pubis, diutius applicatur.

§. V.

Quoniam denique secundum aph. 12. *scilicet III. HIPPOCRATIS*, australis, aut pluvialis diuturna hiems, epidemici abortus causam ac occasionem subministrat: providere oportet Medicum, ut non modo victus & vitæ regimen ejusmodi temporibus exquisita habeatur ratio; sed & corpus liberetur à sordibus copiosis, servata liberiori perspiratione, & alvo aperta: unde ne frigida æris tempestati corpus exponatur, nec acida aut adstringentia ingerantur alimenta, probe cavendum est. Abstinere etiam tunc præstat à coena largioris, carnicibus, placentis, omnibusque eculeis pinguioribus, quippe quæ gravidarum appetitui quidem, minime vero sanitatis integritati, tunc temporis respondent.

§. VI.

Quod si vero, post prævium terrorem, aut alias violentas causas, abortum imminere, ex dolore lumborum, spualis ad uterum tendentibus, extremorum frigore, & præcordiorum constrictione cognoscatur: vasa protinus in brachio secunda cili, utique ipsorum violentia demulcenda. Huic scopo intersunt: mixturæ analeptica, blande dia-phoretica & antispasmodica vinus præditæ; quales confici possunt ex aqua melissæ tartareæ, liquoris convallium, flosculi riliæ, primularum veris, aqua cinnamomi, pulvere marchionis, cornu cervi philosophice præparato, tinctura coralliorum, liquore nostro anodyno minerali, & syrupo acetosatis citri. Extrinsecus ballastum vine dictum, nec non embryonum, pani tosto infusum, umbilicali regioni admovere juvat.

§. VII.

Quod si porro enormis jam facta hæmorrhagia fuerit; illa nunquam adstringentibus ac narcoticis sistenda est; quoniam ea remedia vel adstringendo, vel relaxando nimis uteri fibras, ad abortum magis disponunt. Potius si ab ullo remedio auxilium sperandum est, id à venæ sectione in brachio insinuat, vel medicamentis narcosis

Q

leni-

Abor-
tus
procurari
debet.

post
partum
exiguit
tatem
capite
modo
sal-
tando

Abortus ad
tempus
tam soave,
quomodo
pre-
caveri
debet.

Emen-
tibus
abortus
quomodo
evitandus

De-
positio
ad abor-
tum ex
male

Hæmo-
rrhægia ab-
ortus cau-
sa modo
capite
trahenda

leniter papaveraceis, antiepilepticis, nec non liquore nostro anodyno, præ omniis aliis expectari possit. Præterea dantur etiam casus, ubi abortus, & ejus procuratio, valde salutaria, imo necessaria est, ad vitam gravidæ servandam: quando nempe enormis hæmorrhagia, mensis septimo vel octavo ex utero profluit, nulla ratione sistenda, cumque animi deliquis juncta, quam demum ipsa mors sequitur. Tunc est consultissimum, foetum, qui plerumque mortuus est, vel medicamentis, vel manuali operatione cito expellere; quæ de re perdocta BOHNII disputatio de *abortu salubri* legi meretur.

CAUTELE, ET MONITA PRACTICA.

§. I.

Quomodo abortus in morbis acutis sit procurandus.

Si morbus acutus, continua febris exanthematica, variolosa, vel morbillosa, aut etiam intermitiens abortum in gravidis minatur, insituta in principio venæ sectio magnam spondet utilitatem; adeo ut, si negligatur, dolores, spasmi, & vehementes sanguinis commotiones quam facile abortum provocare queant. Insuper summopere à nimis calido regimine est abstinendum, & ea præbenda remedia, quæ nimiam humorum ebullitionem depriment. Ne etiam in derelictione horum morborum, quod non raro contigisse visum est, foetus ob alimentum inopiam expellatur; consultum est, di. ficientes succos nutritios jusculis carniū juniorum animantium, præsertim vitulinarum, quibus mæocla sunt hordeum, radix *Korrozæ*, & vitelli ovorum, reparare; & pro potu aquam hordei, cum aqua cinnamonæ, succo citri, saccharo & vino permixtam exhibere. Hoc in casu, sanguinem velle detrahere, foret perniciosissimum.

§. II.

Cautio præcavenda purpurae.

Purpura, ad reputandum uterum, hac potissimum ratione tractare consuevi, ut præmissa, ac per tres dies continuata per pilulas balsamicas, vel infusum laxans uterum evacuatione, eas per triduum in balneo descendere jussim; tum rursus repetita purgatione, pari modo balnei usum subsunxerim; ac denique eandem methodum, si opus fuerit, tertia vice iteraverim. Ego profecto hac ratione plures, quæ ex abortu steriles fuerunt reddite, vel infirmes polyposas carnes massas, vel concretamenta ex sanguine & pinita coagulata, variæ figuræ in utero progenita aliquot vicibus excluderunt, per Dei gratiam ad præstinatam vigorem optime reduxi.

§. III.

Abortus, qui ex dysenteria, febribus, mucositate.

Quum in dysenteria abortus propter tenesum continuat ac vehementem potissimum sit; huic primum omnium apud remediis occurrendum, foibus nimirum emollientibus, vel injectione clysterum, qui ex meris mucilaginosi sunt compositi v. g. ex semine psylli, foenu græci, cydoniorum; vel suppositorum ex spermate ceti, sevo barchino, cera alba, croco, & tantillo olei hyoscyami.

§. IV.

Abortus in hysterica præsternu.

Quando pathemata hypochondriaca, vel hysterica frequentioribus causam præbent abortibus: non facilis restitutionis spes est per remedia pharmaceutica; sed omne auxilium à convenienti tam interno, quam externo aquarum thermalium

usu, quo etiam sterilitas nonnunquam sanatur, expectari debet.

§. V.

Quando post vehementem terrorem metus abortionis imminet, præsertim in sanguine plenis, & quæ jam olim huic malo fuerunt obnoxie, venam quidem scicare convenit; sed cavendum simul, ne venæ sectio statim à terrore infatuatur, si extrema adhuc refrigerata, & præcordia contracta fuerint; sed expectandum, donec natura remotis spasimis, inceperit, sanguinem citatori motu cordis ad extimas rursus propellere partes; alias constans docet experientia, sanguinis sub ipso motuum vigore factam distractionem, ad promovendum potius, quam coercendum disponere abortum.

§. VI.

Nonnunquam secundo vel tercio post partum mense fit, ut massæ informes membranaceæ, cum præcedente enormi hæmorrhagia & hypothymsi utero excludantur, idque decima vel duodecima septimana repetatur; unde omnis conceptionis penit spes: quomobrem opus est, ut post abortum balnea ac pilulæ balsmicæ per aliquod tempus adhibeantur, usque uteris à sordibus ipsi inhærentibus, quæ molarum generationi causam præbent, probe purgetur.

§. VII.

Quando gravidæ se ab abortu præmunire cupiunt, cavere sibi debent ab acidis, à frigore, à vino, nimique carniū copia. Fugere etiam debent adfectum intemperantiam, & præsertim subitum terrorem; nec non cuncta febrilia, maxime extinctarum candellarum fumos. Quæ alvi obstructione laborant, eam, viuis purgantibus, per supra dicta laxantia lubricare debent; quo nomine clystres etiam laudari merentur.

§. VIII.

Quandocunque jam facta est secundinæ ab utero separatio, testante id sanguinis ex uteri cavo gramoli profusio, imprudenter ad abortum præcavendum ageret Medicus, si interne adstringentia propinare vellet; siquidem foetus jam separatus vel etiam mortuus retento, & hinc ejus vel secundinarum orta putredo, atque etiam cruciæ retenti coagulatio & corruptio gravis & periculosa minatur symptomata. De quibus doctè egit B. SLEVOGT in *progr. de partu retardati necumtis*, dissertationi de *restitutione in vitam suffocatorum*, præmissa Jen. 1705. Sed præstat tunc circumspicere & prudenter foetus excretionem promovere. Quo nomine laudatissima efficacia pilulæ temperatæ balsmicæ, cujus generis sunt *Becheriana*, marocollina, aloephaginæ, item *Cræna*, modo alibi succorinæ dosi imminuta fuit, congruenter membrabilibus exemplis se usque eo commendaverunt.

§. IX.

Ego non semel, sed iterum foeminis sanguineo-phlegmaticis, à potu cerevisiæ spirituosæ & saturatoris valde nutrientis & nimias uteri hæmorrhagias & frequentiores abortiones cum observaverim, insigni cum fructu & felicissimo successu, potum aquæ simplicis vel pisinæ quotidianum ad præcavenda hæc mala suavi sumendum.

§. X.

*Abortus ob
ferventem
in utero
moleculam.*

Ubi ex nimia & orgastica sanguinis ebullitione in gravidis dolores in lumbis cum pulsuum celeritate, inquietudine, & vehementiori infans in utero motu, abortum indicare videntur, præter quietam corporis continentiam, cum tranquilla mente & tenui dieta junctam, pulveres temperantes, quæ matrem perlarum, pulverem Marchionis, nitrum purificatum, solutionem oculorum cancri cum acido citri factam recipiunt, & cum aquis leniter analeptica & antispasmodicis, cujus generis sunt aqua nucisæ, florum chamomillæ, liliorum alborum, convallium, melissæ, rubi idæi, cerasorum nigrorum exhibiti auxilium ferre solent promptissimum.

§. XI.

*Caerula
erectæ mo-
læ corp-
ris.*

Quamvis validior & diuturnior corporis motio de succussu e.g. per vecturam in non assuetis ad abortiendum occasione non raro præbet; atamen in assuetis id minime locum habet, ut potius frequentior & moderatior vectura circa oclavum mensem nunquam non proficua sit, etiam is qui in proximo parturiendi studio versatur; nam externo corporis motu motus sanguinis progressivi vitales promovenitur, humores evadunt fluidiores, & superflui ac impuri per actam spirationem excluduntur, obstructi quoque nulli referantur, ut deinde & facilius parvus & felicitis valetudinis in puerperio status inde fiat. Exemplæ etiam in vulgus nota sunt quod foemine, quæ laborioso motu vitam sustentant, semper fere felicitas & partum & puerperii tempus peragant præ his, quæ vitæ sedentariæ nimis deditæ sunt.

§. XII.

*De venæ
pulsu
in
abortu.*

Quoniam in fine tertii mensis solemniter fere foemine abortire consuevit, præsertim quæ extra graviditatem menses temporibus copiose per plures dies expurgantur; ad præoccupandum ejusmodi malum sanguinis missiones sunt utilissimæ. Neque ab hac sententia alienus est FERNELIUS qui l. II. meth. med. cap. 12. scribit: *Multa, nisi venæ circa quartum mensem referantur, abortiunt; sed tale remedium etiam circa initium tertii mensis, si abortum prodromi adfuerint, locum obinet commodissimum. Accedit, quod cum ratione & prudencia, in gravidis, quæ plerumque in statu plethorico verentur, administrata venæ sectio etiam saniores & vivaces fecit reddat. Quod si auxilii genus omittatur, & debiliores & ad epilepsiam & ventris convulsiva tormina priores sapienter infantes observavimus, cujus rei facilis potest reddi ratio, quia impuri lymphæ, quæ ex plethora salutaris excretionis impediendo gignuntur, eorum corpus nutriunt.*

ENARRATIONES MORBORUM.

OBSERVATIO I.

*Abortus
cum infan-
tibus ha-
morrhagis
intra
moleculam
erectæ o-
mni.*

Fœmina L. annorum, macilentæ ac tenerioris constitutionis aliquot liberorum mater, tertio novissimæ prægnationis mense ob vehementiorem retorem, & intensius cui se exposuit frigus, junctæ enormi hæmorrhagia, & insigni virum prostratione abortivit. Ab hoc tempore perenne sanguinis ex utero continuavit profluvium, quod, licet interdum conquiesceret, mox

Frid. Hoffmanni Oper. Tom. III.

tamen recurrat. Præterea ingens imi ventris intumescencia, molis palpitationibus ac volutationibus intus percipis stupata remanebat; quæ primum novæ graviditatis suspicionem movebat; dein vero, cum ultra annum inhaereret teporibus, ea spes evanescebat. Tumor ille potius mox tensus atque durus, mox vero mollis ac suppressus erat, pedes leviter, vespertino potissimum tempore intumescere, & in hypogastrica regione perpetuum gravitatis ac ponderis sensum percipiebat, persistente sanguinis continuo fluxu. Quo in rerum statu, cum varia carminativa, laxantia, clysters, ac leniter costringentia in cassum fuissent adhibita, thermas tandem Carolinas adit; quibus per triduum usurpatis, cruenta mox conquievit fluxus, & cum, continuo aquarum potu, copiosa viscidæ materia per alvum acque ac urinam redderetur, brevi tempore; abdominis subsedit tumor. Quomodo ad balnea descendebat, hisque vix semel utebatur, cum vehementissimis doloribus ac spasimis, parturientium similibus corriperebatur ac sub his aliquot concretæ carnes & membranæ, quæ molas dicunt, excreverunt. Ex quo perfecte convalevit.

Eplurisi.

Abortum naturali partu periculosiorem esse, & gravissimos ex utero morbos post se trahere, indubie constat experientia. Hujus autem rei hæc mihi videtur ratio, quod in partu ejusmodi immaturo, secundarium quædam portio, plerumque remaneat in utero; quæ ad varia mala, inflammationes ventris, dolores, mensium suppressiones, vel perpetuum fluxum, exulcerationes, molas, concretiones membranaceas, & polyposas, materialem causam subministrat & occasionem; quin & ipsam interdum insrat sterilitatem. Quod etiam in nostro factum fuisse casu, nullum est dubium. Quare ad averenda ejusmodi vitia, non præstantius est consilium, quam ut aliquot post abortum dietas, ex propinquantibus remediis, quæ facultate roborandi, & uterum, ab inhaerentibus ipsi foetui reliquiis purgandi possint. Hæc inter principem locum occupant pilule Becherianæ; quippe quæ continuato usu magnam in præcavendis uteri vitis, & abortitionibus præstant utilitatem. Ubi vero hæc negliguntur, & enata vitia diutius trahuntur; non certius ac præstantius illis tollendis præsidium, quam ex decocto interno parietis, ac externo theriacum usu reperitur; quæ eo insigniorem efferant efficaciam, si pilulis balsamicis secundentur.

OBSERVATIO II.

Fœmina adhuc junior sanguine plena, stature brevioris, habitus laxioris & spongiosioris, alvi ordinario adstrictioris, per quatuor jam vices, si gravis esset, semper inter tertium quartumque mensem passa est abortum. Cujus præcavendi causa, Medicus consultus, circa tertium quintæ prægnationis mensem, venam in brachio secandam, & quinque cruoris uncias detrahendas curavit. Quam ordinariæ abortiendi tempus, quartus nimirum mensis accederet; sensit spasmodicos motus, stantentias, & compressiones in lumbis & abdomine, adeo ut iterum immineret abortus. Verum datis interne analepticis cum antispasmodicis mixtis, & exterius regionis umbilicali applicato pane tosto, balsamo tunc meo imorato, reînscutur foetus. Accedente

Q 2

subo

subinde septimo mense, denovo atroces circa lumborum regionem percipiebant dolores; quos Medici à calculo renum derivabant, sed remediis ad calculum pellendum destinatis frustra pugnabant. Octavo mense pedes & venas tunc in modum intumescabant, & nono partus vivus excludatur felicissime, subsequente copiosissimo lochiorum & aquarum effluxu. Paulo post iterum concepit, duranteque graviditate bis, tertio nimirum, & septimo mense, iterum tundendam præbuit: unde factum est, ut licet dolores reverterentur, illi tamen mox conquiescerent, & illa legitimo tempore partum ederet felicem.

Epigris.

Spasmi, sicut generatim omnes, ita etiam illi, qui in gravidis, tanquam abortuum causæ occurrunt, momente jam HIPPOCRATE, vel ex repletionis, vel inanitionis proficiuntur. Priori casu abortus fit ex copia sanguinis in uteri vasis, & circa lumbos stagnantis; & subiecta tum plenumqueprehenduntur spongioso corporis habitu, venisque turgentibus prædita, bene adpetunt, sed parum moventur, & ex ipsa sanguinis in imo ventre stagnatione, alvi sunt segnioris. His, præsertim si jam passa fuerint abortum, ad hunc præcavendum, summo cum fructu vena, iterum secari potest; cujus operationis excellentem effectum, & præsentis casus testatur, & RAYGERUS in M. N. C. anno VI. obs. 104. illustri confirmat exemplo. Aliter se res habet, si ab inanitione, i. e. defectu sanguinis & nutrimenti producatu abortio; ubi corpus est gracilius, vasa minora, pulsus frequens & debilis, internus calor, appetitus jactura, viriumque imbecillitas. Hoc in casu minime secanda est vena; tantum abest ut proffit, ut potius inde ad ipsam abortionis provocationem multum contribuat. Præstat potius alimentis nutritivis & analepticis medicinas, & matris viribus succurrere, & fortui nutrimentum suppedinare.

OBSERVATIO III.

Præter spasmus post hæmorrhagiam abortivam.

Juvenula mulier, XXI. annorum, temperamentis sanguineo-cholerici, præter variolas sexto ætatis anno feliciter superatas, integra sanitas gavisa, obesa subinde sanguineque plena, menstrua ab anno decimo sexto jussu tempore copiosa reddidit. Viro nupta bis felici cum successu peperit; sed post primum puerperium corpore magis extenuata, post alterum mensium interdinatum, mox nimium, mox parciorem experta fuit fluxum. Paulo post mense Martio tertium utero concepit, testantibus mensium suppressione, nausea, vomitu, ciborumque fastidio; & circa finem Junii foetus motationem in utero sentiens, se ad dimidium gestationis tempus pervenisse putavit. Tertio post perceptum notum diem, nocturno tempore ex improvviso circa ultimum causam præviam uno impetu integra cruriorum mensura ex utero profluebat; quamobrem possidit vena in brachio scabatur conjunctio confortantium, temperantium, & præcipitantiurn interno, nervinorum externo usu, cum egregio levamine. Verum, novem elapsis diebus, eadem recidebat hæmorrhagia, & sic continuabat, ita tamen, ut per diem ab ipsa immunis existeret, noctu vero, prævio tensionis in capite & brachiis, atque formationis in pedibus sensu, dorsoque dolore, uno impetu sanguinis quidpiam permaneret; namque simul & semel usque ad futuram noctem conquiesceret hæc cruenta fluxio; & ceterum somnus pa-

riter ac adpetitus essent integri. Adhibitis pulvere antispasmodico, pilulisque ballamicis *Stæbii* intra aliquot hebdomades cessabat ea uteri hæmorrhagia, & ægra habebat optime. Sub finem Augusti mensis vero circa opinionem pedum spasmi, horridi in dorso ac lumbis dolores, hypogastrica regionis tormina, & adfirmante obstetricæ parienti tempus imminet. Nec spes vota fallibat; siquidem perseverantibus per aliquot dies doloribus, excludebatur tandem vivus partus; sed uni ex calculo ægrotantis pariter ac ipsa tenebatur debilitate adparebat, septimestris, qui post unam alteramque horam exspirabat; matre salva manente, & ad pristinum sanitatis vigorem redeunte.

Epigris.

Attentione certe perquam digna est hæc observatio, quod medio gestationis tempore, foetus manente vivo & sine abortu uno impetu, integra sanguinis mensura ex uteri cavo profluxerit. Quæ subita & grandis hæmorrhagia sine secundina ab utero minimum partiali avulsione & ruptura vasis sanguinei contingere non potuit. Quamvis autem idoneis ad abortum promovendum remediis inique præstantissimis datis foetus salvus manserit; tamen quia vas sanguineum ruptum, sub utero extenso non coalescere vel consolidari potuit, factum est, ut elapsis novem diebus hæmorrhagia licet non tam enormis iterum secus fuerit. Et quoniam ob profusionem sanguinis prævio nutrimento foetus fuit destitutus, septimo denum mense valde extenuatus & imbecillus excludus est, & post horam exspiravit.

Res est alias periculosa plenissima, quod multia possem confirmare exemplis, quando septimo vel octavo mense ex vase sanguineo rupto tam copiosa & effræns hæmorrhagia uterina fit. Nam nisi natura partum mox acceleret, vel circumspiciat arte, quoad fieri potest, foetus ex utero expellatur vel maribus extrahatur, de vita non modo infantis, sed & ipsius matris actum est. Ceterum in valde plethoricis feminis tempesta circa finem tertii mensis insinua sanguinis in utero ejusmodi periculosa hæmorrhagis præcavendis conventionalissima est. Cavendum vero in ejusmodi casibus est, à fortioribus ad cohibendas hæmorrhagias siccis tam internis quam externis; quorum ope reprimunt quidem cruent, quia ab in massam coagulata, sed horripitatio, dolor circa uterum & dorsum vagus, cum animi inquietudine, ac pavore succrebit, & nisi natura ipsa refulgens validior propulsione fortis molietur, exitiosa inde consequi symptomata, non minus videtur.

OBSERVATIO IV.

Fœmina XXVIII. annos nata, temperamentis cholerico-sanguinei, tenerioris striciorque corporis habitus, ante quinquennium prævia vehementi exandescencia leptemestrem enixa est partum. Lochia sub puerperio fluebant parciore, & hinc ab eo tempore hypochondriacæ accesserunt passionis, velut capitis dolores, vomitiones, vomendi conatus, gravativus in ventriculo feofus, tormina imi ventris, alvi segnitie, extremorum frigis, geliditas in certo capitis spatio sensatio. Hæc symptomata per intervalla invadebant, nec prius remittebant, quam donec biās zurginosa vomitu recideretur. Binis post anni utero rursus coepit gerere, atque circa medium

Altera cum fine prævia hæmorrhagie.

gestationis tempus recentiorum malorum vacuitate gaudere. Sed hoc tempore succellit febris tertiana, & per novem inhasit menses. Neque tamen minus sub ea ipsa partum feliciter debito tempore edidit, lochia sufficienter fluxerunt, & subinde menstrua quoque legitime promanarunt. Tandem sublata febre, pristina hypochondriaca recruduerunt parviter, cum perpetuis vigiliis, & mentis insigni consertatione stipata: & à commendato sub paroxysmo aquae frigidae potu, datisque pilulis aloëncis, magis invaluerunt. Neque remiserunt per infrequentem graviditatis statum; tantum abest, ut novissime tres menses gravis, post gravem animi commotionem abstineret, & posthac malo suo ad hunc usque diem vehementius adligeretur: appetitus ceterum iusto est avidior; & à suavolentibus male habet. In hoc rerum statu meum implorabat auxilium. Ego re paulo solertius expentia iussavi internum Carolinarum usum & postea balneum Tropicense utilissimum tum ad obstructions & infarctus viscerum, unde mali hysterici & hypochondriaci origo, submovendis, tum ad uteri tonum valde debilitatum restituendum; absoluta vero hac cura præter exactam dietam, & abstinentiam per aliquod tempus à coitu, elixir meum viscerale cum essentia succini & rhabarbari mixtam singulis diebus bis sumendum una cum decocto pro usu ordinario ex raspatu ligno sassafras & pulvis composito commendavi.

Epicrisis.

Parviter hypochondriaca & hysterica à fibrosa uteri quoad ejus tonum, robur, & elatorem substantia laesa, quae post partum & abortum sit, mihi congruis remediis cito resatur, originem suam subinde ducere, non novum est, sed quotidianis exemplis confirmatur. Nam naturalem sanguinem per vasa uteri circuitum inordinatum & laetum, per nexum qui est inter vasa sanguinea universi corporis, mox inordinatus & turbatus sanguinis motus per universas & maxime nobiliores partes subsequitur. Inde fit, ut affectiones hypochondriacae & hystericae sint systematicae, in quibus omnes partes à naturali sua functione deficiunt. Et inde etiam accidit, ut quae velentiori gradu hysterici & hypochondriaci mali laborant, fortan vivum & sanum debito tempore vix parere queant, & ad abortiendum valde sint proclives. Sed quoniam febris tertiana & quartana rite succedens & tractata, virtutem sepius medicinalem habet à multis impuritatibus, obstructionibus & infarctibus corpus liberandi, factum inde etiam est, ut praeterea foemina sub febre & secum retinuerit, & feliciter pepererit. Postquam vero febris in nostra agra fortan per incongruas artificia sublata fuit, non modo affectio hypochondriaca recruduit, imo exacerbata, sed inflammatione etiam fortis expulso secuta est. Dicit enim vix potest, quantum in curando prudentiam & iudicium interminantes febres, praesentis hic chronicæ in foeminis factae fuerint, desiderent. Quare si negligitur, statum perpetuo valetudinariam inde lapsum animadverti. Neque vero ego praesentis unquam auxilium quam in tempore & prudenti externo & interno aquarum thermalium usu me deprehendisse, ingenue profiteor.

OBSERVATIO V.

Triginta annorum foemina, robustior, & san-

guinea, præter binos infantes, quos sub conjugii auspiciis feliciter exclusit, bis septimestres, quater quinquimestres passa est abortus, qui hunc in modum tristem luserunt scenam. Graviditate ad mensem tertium protracta, in dorso & sinistro hypochondrio tendentes ac lancinantes perennes dolores, qui sensu ponderis cupulidam supari, ad regionem pubis excurrebant, cum ani tenefino, alvi obstructione & flatulentia. Tum copiosus, & enormis sanguinis ex utero fluxus exivit, qui per certa intervalla continuavit ad abortum lapsa dictæ usque tempus. Forti, qui plerumque sanguine totus suffusus fuit, exclusio, dolores in sinistro hypochondriaco nihilo lecius per aliquod adhuc tempus continuarunt. Quo in rerum statu novissime rursus concepit & cum tertium impregnationis mensem explevit, recruduit uterini fluxus: qui licet iterum evanesceret post natam in brachio venam, adligerant tamen dolores hypochondrii sinistri, decubitus pondera ad pubis regionem, obstructio alvi, flatulentia, tenefino, & mammae lacte turgebant. Ceterum extra prægnationis statum non habebat, de quo conquereretur; & quamprimum conceptio facta est, crebris vexari solebat stermentamentis. Uti igitur hac vice fecunda gaudere prole posset, meam petiis opem.

Epicrisis cum consilio.

Prima quam huic agra de sua valetudine me consulenti proposuit, haec fuit quaestio: Quo potius genere hoc usque usque fuerit? dixit, coqui in loco, ubi debebat, cerevisiam valde saturatam & spirituosam adeo, ut ex haustu duarum mensurarum homines inebriarent. Tetigi pulsum, qui valde erat magnus; conquereretur de perpetuis fere lumborum doloribus, & à gravi terrore primum abortum excitatum esse edixit. Ego aquam puram fontanam, quam maritus asseveravit ibi esse saluberrimam, pro potu ordinario assumendam iussit. Deinceps dedi pulverem ex conchis preparatis, cornu cervi philosophice preparato & nitro, singulis aequali pondere mixtis, cujus drachmam quotidie circa lecti introitum usurpandam commendavi. Dedi quoque emplastrum, quod erat saponatum *Barbæ* cum oleo hyoscyami malaxatum, lumbis dolore & spasmo affectis applicandum. Denum ut claspis mensis spatio rursus venæ sectionem adminiret suavis fui. Quæ præcepta & monita cum accuratius observavit, factum est, ut feliciter consueto tempore pepererit. Ex quo clarissime apparere arbitror, ad plethoram, si hæc vel ad vires vel ad vasa frequentioris causæ abortus fuerit, minuendum non tantum venæ sectionem in auxilium vocandam, sed & aliis remediis ex dieta desumptis præcipue congruo potu opus esse.

OBSERVATIO VI.

Fœmina recens nupta sanguinea & vegeta constitutionis, prima vice per duos menses gravis, inopinato eoque sat vehemenni percellitur terrore, quo fit, ut præmaturis gravibus abdominis correpta spasmi, fortum exclusit & per tres hebdomades ægre habuerit. Tempore quo menses fluere consueverant, loco sanguineæ excretionis fluxus successit albus, qui nullis obtemperavit remediis. Nihilo tamen minus iterum gravis facta, diu non modo ad terrorem & affectus animi proclivis, sed & de lumborum atroci dolore; qui

qui plerumque animi turbas sequebatur, conque-
sta fuit. Non ita multo post ex improvise valde
terrefacta iterum abortum passa est; qui nec ve-
næ sectione nec aliis convenientibus remediis ar-
ceri potuit. Ex quo tempore valde debilitata, le-
vi ex causâ in terrorem rapitur, qui dormientem
maxime exagitat, cum anxietate & interno ardo-
re molestissimo.

Epicrisis cum consilio.

Magna certe motuum & affectionum animi
cum ipso utero communicatio & mutua conspi-
ratio observatur. Cujus rei luculentum, quæ in
utero gerunt fœminæ, testimonium præbent. Ni-
hil enim frequentius contingit, quam, quod gra-
vi quadam in animo ex causâ externa oboriente
motione uterus cum annexis partibus nervosis ad
similes motus fortis & ejus nutritioni ac retenti-
oni in utero minus amicus proritetur; adeo ut ab-
ortionis etiam unicam causam ejusmodi animi pa-
thæmatum constituit. Vicissim etiam observamus,
quando viciium hæret in utero gravidarum, quod
liberorem sanguinis per ejus & infantis vasâ im-
pedit, animum ad plures inordinatos affectus, cu-
jus generis sunt miculolitas, pusillanimitas, ani-
mi defectio, ex levi causâ terror, frequentissime
disponi. Ex quo clarissime patet, Medicum qui
fœminarum ex utero morbos recte curare velit,
non modo ad corpora vitia, sed etiam ad animi
inordinatos motus conspiciendos curam dirigere
debere. Cum vero multoties experientia attentior
doceat, frequentiores abortionis recidivas inde
suum causam & originem petere, quod uterus
cum annexis partibus & vasâ post abortum à
sordibus stagnantibus non recte expurgatus, nec
pristinum robur ac tonus ipsi restitutum fuerit;
ideo Medico incumbit perito & solertissimè con-
venientibus & efficacibus remediis recte perficere.
Jam vero non diffidendum est, pilulas illas, quas
BECHERUS fortuito certe, quia artem medi-
cam vix calluit, invenit, & ex extractis amari-
cantibus & temperatioribus bullimicis gumma-
tibus, atque refracta gummatæ aloës portione
dosi composuit, & quæ ad harum exemplar à
clarissimis nostri ævi Medicis, inter quos primus
fuit IL. HERMANNUS, Professor omnium ex-
traordinarius, à CL. STAHLIO, nobis aliisque
præparatæ sunt, ad præcavendos ultteriores abor-
tus præ aliis specificam sibi efficaciam vindicare;
modo non empirice, sine habita subjeçti vel cir-
cumstantiarum ac causarum ratione, in usum du-
cantur. Atque ego plura innuera possem alle-
gare exempla, complures ad abortum valde pro-
clives, recto harum pilularum, neque minus post
factam uteri purgationem, convenienti therna-
tum & balnearum artificialium usu, sub legiti-
mo vitæ regimine felicissime fuisse resistitas.

OBSERVATIO VII.

*Abortus
peritæ nati
frangitibus.*

Judæa fœmina XXXIII. annorum ante ali-
quod tempus, tertio graviditatis expleto men-
se, ob vehementem terrorem abortivit; larga si-
mul uteri hæmorrhagia, violentis vomitibus, &
crebris animi deliquis sollicitata. Paulo post ite-
rum concepit, uterique per decem circiter heb-
domadas gerens, rursus abortum, pristinis sym-
ptomatibus sputatum, passa est. Quo exclusio ma-
le coepit habere; totum enim corpus insigniter
languebat, animus valde sensibilis, & ad pathet-
icas commotiones nimium pronus erat, omnem-

que graviores exandescientiam gravatius ab-
dominis lumborumque dolor excipiebat. Alvus,
quod notabile erat, suo nunquam non responde-
bat officio; digestiva autem ventriculi vis labo-
rabat vitio, & varia ad hæmorrhoides molimina,
nullo accedente fluxu, urgebant. Notatu porro
est dignum, ægram per quatuor jam annos per-
petuo ciborum fastidio fuisse sollicitatam; & præ-
cordiorum quandoque torqueri anxietatibus. Quo
in rerum statu meam implorabat opem, idque
auxilium, quo ab abortu præcaveri posset, desi-
derabat. Fœmina hæc, quia valde plethorica ac
admodum spongiosa & repletioris erat corporis,
parum levaminis atque emolumenti à pilulis tem-
peratioribus supra laudatis percepit, sed modera-
tiores & frequentiores sanguinis missiones & re-
petitum thernarum Carolinarum usum magna
cum euphoria ferre potuit.

Epicrisis.

Ut pilulæ sic dictæ *Becherianæ* insignissimè
in morbis mulierum sunt usus, tamen, ubi nimia
sanguinis, in corporibus præsertim quæ minori-
bus vasâ sunt donata, abundantia difficiorem
per totum corpus progressum efficit, & ubi si-
mul in fœminis ad fluxum hæmorrhoidalem dis-
positio adest, circumspicere adhuc oportet;
quia sanguinis & humorum massam in præ-
ternaturalem organum quam facile conjiciunt,
& deteriora reddunt symptomata. Tutores hinc
rhabarbarina cum salibus nitrois & deterisvis
juncta deprehendi. Et quia in hoc subjeçto in-
gens motuum vicialium & animalium, item ex-
cretionum in axia, præcipua symptomatum causa
& fons fuit, atque remedia obvia hiæc tollendis
non sufficiunt: tutum omnino & certum auxi-
lium contra ejusmodi morbos in prudenti & ra-
tionali thernarum Carolinarum usu sepius me
invenisse testor.

OBSERVATIO VIII.

Fœmina quadragenaria, sanguinei tempera-
menti, habitus spongiosi, ob menses duos de-
fectum, & abdominis inamefcentiam per quinque
menses habebatur gravida. Quibus elapsis præ-
ter opinionem corripiebatur doloribus circa lum-
bos & inguina, & mox sequente copiosissimo
sanguinis profluvio: cum quo secunda die concre-
mentum carneum, ex membranis conflatum, rubi-
cundum insignis molis excrebatur. Neque
tamen minus sanguinis fluxus, utraque parior, ad
aliquot perseverabat septimanas. Transactis men-
se eadem ludebatur scena: præviis enim & dolo-
ribus, & hæmorrhagiis, excretio molis carneæ
denovo sequebatur. Abhinc cruentum profluvium
ex toto non conquievit, sed modo parcius, modo
copiosius inhaesit; donec post sex hebdomadas,
iterum carneæ utero excluderetur moles, quæ in-
tra octo menses septies reddebatur. Notari autem
meretur, post quantam ejectionem loco sanguinis,
serum purum limpidum magna copia quotidie
effluxisse. Et hic lymphatici laticis fluxus jam ultra
annum dimidium perdurat; cui jungitur gra-
vatus dolor, tumor atque durities quadam in
sinistro hypochondrio; & ejus lateris femur cum
toto pede, oedematofum exhibet tumorem. Cete-
rum ægra expallescit, emacrescit, cibos aversatur;
pulsus siccus frequens & debilis, horror quando-
que corpus percutit, subsequente calore; & san-
guinis grumosi ejectionem plerumque antecedit
ejusmodi horror.

*Menses
defectus.*

Epicrisis.

* *Epicrisis.*

Mola, sub quarum nomine concrementa veniunt carnea, à Veteribus dividuntur in molas generationis & nutritionis. Hae suboriuntur ex vicia nutritione, & succi sanguinei chylosique flagratione intra extremitas uteri membranas; quae plerumque lochiorum vel mensesurorum per male feriatas artes suppressioni debetur. Rariores profecto sunt, & nisi statim ab initio congruis debellentur subsidis, incrementum in praegrandes tumores; qui supra intestina porriguntur, & impraegnationem vel hydropem mentientes, nullam admittunt sanationem. Talem casum videas in *Conspectu med. sect. III. Tom. II. Cap. LXXI.*

Contra vero generationis mola in ipsius uteri cavo producturum, ubi loco vero conceptus moles carnea indigesta, valculis, membranis, & sibi carnis praedicta generatur: sicut fere fit in foemina conjugata, cachexiae obnoxia. Simulat veram impraegnationem ejusmodi concrementum; siquidem mensesurum silent, venter grandescit, mammae turgescunt lacte, donec tandem circa quartum plerumque mensem cror ex utero prorumpat, secumque saepius vehat talem informem massam. Interdum haemorrhagia sola continuat per aliquot menses, ubique mola illiusmodi rejectione, quae longo demum post redditur tempore.

In nostro casu mola fuit generationis; quae prima reliquarum generationis usum praebuit. Ut plurimum enim haec concrectiones quaedam in utero relinquunt sui partes; quae facile in novam coeunt & attolluntur excrementum. Videtur enim in hoc casu quaedam laesio adfuisse, cui febris lenta est juncta, testante pulsu frequentiori. Ex quoniam circulus sanguinis per uterum, & vicinas partes simul est turbatus; compressis iliacis vasis, enatus est pedum oedematosis tumor: ex quo cachexiae metus imminet, & inauspicata refulsit prognosis.

OBSERVATIO IX.

Requirebat aliquando opem meam generosa mulier, XXXVII. annorum, quae abortum passa, utero subinde non rite expurgato, quater adhuc, quovis mente ab impraegnatione tertio abortiverat. Quam abortienti proclivitate ut tollerem, hac usus sum mendi ratione: Per triiduum quotidie quindecim pilularum balsamicaarum velperi deglutendas, mane sal aperituum, quod cremorem tartari, lapides cancrorum, tartarum vitriolatum, sal Epsumense, & antrum depuratum habebat; propinqua; deinceps, ut per quinque dies balneis ex aqua fluviali, cineribus clavellatis, mentha, melissa, salvia, floribus chamomillae paratis infunderet, & ab his leniter siccaret julli; atque hanc curationem alternando ter repeteret commendavi. Praeterea, quum utero rursus concepisset, alterius mensibus, venam in brachio tendendam curavi, hisque obtinui, ut valeret optime, & debito tempore felicem excluderet lacum. Verum enim vero post aliquot annos, neglecta venae sectione, rursus abortivit; & abhinc non modo hysterici obnoxia parthenaibus, verum etiam mensesurum primum parviora, deinde immoedia sua passu, quibus tandem animi deliquit, ac vomitus accesserunt; & denique mola carnea, membransacea, aspera, intrus cellulosa prorupit, quae excreta narium sanguineis profluvium conquevit. Quum vero majora in-

de mala timeret, me rursus consuluit. Ego itaque susci, ut commendata brevi ante curatione iterum ureretur, eamque ob inveteratam uteri malam dispositionem, ad ejus robur instaurandum, quovis vere & autumno per aliquod tempus repeteret. Ceterum dedi infusum theissone ex melissa, scolopendria, salvia, betonica, floribus millefolii, hyperici & aniso stellato paratum, singuloque mane fortillandum, & eisdem species cum cerevisia fermentata, ad potum ordinarium praescripi.

Epicrisis.

Concrementorum, quae utero excluduntur, varia sunt genera: primum audiunt mola, quae & generationis & nutritionis superioris petraeclavimus observatio. Alterum est cror congruatus, in magnis frustis, quae nollis *einen Schurz*, sive *einen Brand* dicunt, excretus; cujusmodi oblationem allegat RUYSCHIUS *obs. chir. 29.* Datur quoque concretum, quod licet improprie, serotum vocant molam, & nihil est aliud quam serosa colluvies peculiaris membrana inclusa; de qua & RUYSCHIUS *Le. obs. 33.* & HILDANUS *Cent. II. obs. 53.* incipiunt mentionem. Nostri aegrotos excludit tam molas veras, quam crorem congruatum, quem magnis in frustis conspiciere licuit.

Hoc loco vero adhuc commemorare juvabit, quod ad excretorum, quae ex utero fiunt genera, referenda sunt ossa & partes integre infantum intra uteri cavum putrefactum. Contingit id vitii genus, ubi avulsis secundinis focus grandior fuerit, aut ejus abortiva exclusio adstringentibus impeditur: & videtur foemellis, si sub alvi exoneratione egerantur ejusmodi frusta, ac si ex ipsa exsint intestina. Qui de his pura nosse cupit, adeat SENNERTUM *prax. lib. IV. part. 2. sect. 6. cap. 2.* TULPIUM *observ. Lib. IV. c. 39.* & THOMAM BARTHOLINUM *hist. med. 13. Cent. IV.* Mihi ipsi licuit ejusmodi casum haud ita pridem in foemina annotasse; cui & rati alij convenientes medicinas, pilulas ac balnea ex aqua dulci, nec non thermas subinde Carolinas commendavi fructu cum felicissimo.

OBSERVATIO X.

Foemina XXX. annorum, habitus corporis *Dr. f. p. 100* parvulus, mediocriter pinguis, septimo decimo aetatis anno viro nupta, peperit ut tempore foetuum vivum. Deinceps abortum passa fuit trimestrem; tuncque successively tres aut quatuor vivos foetus in lucem edidit, quorum quovis trium, aut ad summum quatuor mensium abortus subsequutus est. Hos abortus semper excepit admodum molesta per oclidium uteri haemorrhagia; qua cessante fluor albus accessit, ad hanc usque diem inhaerens. Praeterea supervenit nausea atque vomitus, tantaque inhaesi pertinacia, ut nulla hac usque remedia debellari potuerit, eoque non solum omnes cibi, maximeque solidi, prout nus rejiciantur, verum etiam sub jejuniis pinuit insipida quotidie eructetur. Quo in rerum statu per annum novissimum bis iterum abortivit; persistente vomitu, atque hypochondriaci symptomatibus subinde cruciata. Consultus ego commendavi primo balneum aquae dulcis, cum origani, calamintha, balsamina, merutha cattaria; melissa, floribus chamomillae vulgaris & romanae illis incoctis, eaque ut per aliquot hebdomades,

des, extra graviditatis tempus, in usum vocaret, fusi. Verum striduo ante eorum usum pilulas balsamicas propinavi; easque singulis septem diebus balneis interpnsi. Præterea vesperi liquorem meum anodynum; atque sub epulis essentiam corticum aurantiorum exhibui. Non minus vehementer laudavi rectam vivendi rationem, atque convenientes venæ sectiones; ac denique theriacum Carolinarum tam internum quam externum usum commendavi.

Epilepsis.

Præfens affectus spasmodico est convulsivus, qui eas potissimum nervosas partes, quæ ad uterum atque ventriculum pertingunt, occupare videtur. Quod si illius causas, & ex his remotiores, perscrutemur, ipsa se offert ægrotantis constitutio atque temperies. Ea enim habitum corporis præ se fert spongiosum, subpinguem; qui copiosus quidem, sed exilioribus instructus solet esse vas. Horum autem angustia, & fibrarum nativa laxitas id secum vehunt incommodi, ut humorum vitalium progressus difficilior sit ac languidior: cui si vel medicorum animi juncta fuerit sensibilitas, scilicet est, ut dissensio à mole sanguinis ductibus, spasmodici ac convulsivi accedat motus. Ejusmodi vero subiecta, si puerperis fungantur, & uterus posthæc non rite purgatus sit, ad convulsus sub nova imprægnatione uteri stricuras, abortuum causas proclivis esse, ex supra dictis patebit. Inde quoque ratio peti debet, cur in nostra tæx de puerperis & abortibus fatigata, fluor accesserit albus. Hic enim primario uteri atoniæ, & inde cumulatis in ejus cavo sordibus debetur; nec cessat, nisi restituo uteri robore, tantum abest, ut ipsæ posthæc fecunda conceptioni impedimento, & causa abortionum fiat. Sub tanto partium solidarum languore, san-

guinis & humorum dyscrasiam generari, testatur & experientia, & confirmat ratio: quam in nostro casu fuisse præfco, docent hypochondriacæ passiones, & vomitus. Hic nihil est aliud, quam venter convulsivus motus; qui sicuti à repletionem, id est, sanguinis in ejus vasibus stagnatione subiaci potest, uti videmus in gravidis, circa tertium vel quartum postillum ab imprægnatione mensem vomentibus: ita etiam ab inasatione suboritur, & ideo profuso copiosius sanguini supervenit. Causa hoc in casu non videtur alia, quam quod loco generosi sanguinis, humores impuri, fusi & acres ad membranas ventriculi deferantur, easque stimulo fibras nervæ ad vomibundam subversionem proritent. Neque enim inveniri hinc difficilis est ratio, cur tam vomitus diuturnior existat, quam abortus frequenter redierit. Quamvis enim ægrotans nostra multis variisque medicamentis us fuerit; ea tamen pleraque cognovi esse talia, quæ vel nimis calidiora ac spirituosiora, vel sunt vulgaria carminativa, vel plane adstringentia, vel saltem vivendi recta ratione nequaquam adjuva fuere. At enim vero istam firmius radicata partium solidarum atonia perpetue instat regulæ habendum est; quod quo magis diæreticis, micisque pharmaceuticis utamur subsidii, eo feliciori temper potiamur effectu. Et præterea opus est patientia: quo enim diuturnior fuit morbus, eo diuturniorem oportet esse blandam, naturæque convenientem curationem. Hæc igitur in præfenti casu vix alia, quam quas proposuimus, medicinas obtineri potest; adeo ut illæ, non in nostra solum, verum quoque pluribus, quæ nostræ se tradiderunt curæ, ægrotantibus, nunquam non optatum ediderint effectum.

Præter huc uique alatos, memorabiles de hoc adfectu adhuc invenies casus in *consiliis medicinalibus*. *sect. III. CXVI. CXVII.*



FRIDERICI
HOFFMANNI
MEDICINÆ
RATIONALIS SYSTEMATICÆ,

TOMI QUARTI,

QUO

SPECIALIS MORBORUM PATHOLOGIA,
& huic superstructa solida Therapia,
CUM MEDENDI METHODO,

CAUTELIS CLINICIS, ET MORBORUM
ENARRATIONIBUS, ADJUNCTA EPICRISI, EXHIBENTUR.

PARS QUARTA,

DOCTRINAM MORBORUM EX VISCERUM LABE
partiumque solidarum atonia perspicua & demonstrativa methodo tradens.

DEDITÆ
ARTIS SALUTARIS
STUDIO ASCLEPIADARUM PROGENIEI
STIPENDIUM HOC SEPTIMUM
CONFERT
OCTAVUM SI DEUS VITAM
VIRESCQUE PROROGAT
VOVET
FRIDERICUS HOFFMANNUS.

P R Æ F A T I O.



HERAPIÆ rationalis tomum quartum lectori peritiæ medicæ cupido jam exhibeo paulo tardius, quam promiseram, ob incrementos quotidie occupationes in senio, quo vires corporis non parum decrefcere incipiunt. Complectitur hic tomus aggritudines, quæ paulo longius protrahuntur admodumque difficilem recipiunt sanationem; unde etiam chronicarum nomine veniunt, & recte duplicis esse generis statuuntur, quarum aliæ à solidorum motu nimis adaucto nascuntur, ut fere sunt spasmodico-convulsivæ, in præcedente jam

tomos pertractatæ; aliæ contra à solidarum partium motricium imbecillitate tonoque ac robore dejecto, & abhinc dependente languidiori fluidorum motu oriuntur, quarum indolem & effectus jam describere propositum est. Scire autem licet, hos morbos iterum dupliciter esse considerandos: alii quippe, qui mentem ac sensus afficiunt, in suprema corporis parte sedem suam ac domicilium constituunt, quorum naturam, causas & medendi methodum in prioribus hujus voluminis capitibus paulo accuratius evolve te annisi sumus; reliquos, qui ex viscerum mediæ & infimi ventris, quæ vitalium humorum elaborationi ac depurationierviunt, atonia ortum trahunt, in posterioribus capitibus accuratiori tam pathologicæ quam therapeuticæ considerationi subjecimus. Atque hi morbi in universum ejus sunt naturæ ac conditionis, ut ob lentiores & vacillantem sanguinis & humorum circuitum stagnationes, quæ vitalium humorum elaborationes & indurationes, adeoque labem solidis partibus & visceribus inferant vitæ insensibilissimam, quæ profecto difficillime expugnatur. Quare etiam horum morborum sanatio summam medentis prudentiam & accuratorem appropriatorem summeque efficacium remedium cognitionem desiderat; siquidem in nullo morborum genere ars nostra magis se manifestat, ac in cura chronicarum affectionum, quia sub his parum potens natura haud facile vitium, altius insidens, suis viribus excutit, quum contra confiteri omnino oporteat, artem in acutis parum valere; utpote in hatum curatione plus sibi natura vindicet, & ibi Medicus sæpe spectatorem tantum agat. Neque hæc veritas antiquos rei medicæ scriptores latuit, ex quibus vel unicum CORN. CELSUM in tellimpnium vocare lubet, cujus verba, quibus libro III. præfatur, non alienum puto hic recensere: *In nullo quidem, inquit, morbo plus ars quam natura sibi vindicare potest, utpote cum, repugnante natura, nihil medicina proficiat. Magis tamen ignoscendum medico est parum proficenti in acutis morbis, quam in longis. Hic enim breve spatium est, intra quod, si quod auxilium non profuit, æger exstinguitur; ibi & deliberationi, & mutationi remedium tempus patet.* Ad hoc adsertum paulo clarius intelligendum multum juvabit, quando ad naturam, quæ ab antiquissimo artis nostræ parente in pluribus locis morborum medicatrix salatur, attentius advertentes quid possit quidque valeat in acutis & valde gravibus affectionibus, rite perferutemur. Naturæ autem nomine hoc loco non sapiens quoddam, corpori animantium insidens & functiones ejus dirigens principium; sed nos in felicioris sæculi medici luce constituti, nihil aliud, quam jugem ac perennem sanguinis & humorum per compagem corporis mere vasculosam in orbem motum, à cordis & vasorum omnis generis systaltica vi dependentem intelligimus; cujus beneficio corpus in se corruptioni expositum per continuam heterogenearum partium subtractionem à putredine vindicatur. Et hic motus vere vitalis, qui à rebus & causis mere naturalibus & externis, potissimumque ab aere & alimentis, recte id pronuntiant HIPPOCRATE, profiscitur, non modo sanitatem conservat, sed etiam ad sanationem morborum multum valet. Nam intensior & celerior in acutis redditus ipsam causam, quæ febrem inducit, brevi & certo tempore, per congrua emanationes periculi plenissimas, ipsam per se sponte, parum adjuvante Medico, abest in longis affectionibus, ubi morbos, accumulando materiam, thest, ut causæ morbi eliminandæ sufficiat, ut

omnino opus sit Medico, qui consilio & auxilio succurrens efficacibus remediis materiam valerudini insensam ad excretionem præparet, pertinaces obstructions solvat, & sanguinis segniorem motum augendo, per aperta emunctoria, quæ noxia sunt proscribere contendat. In morbis igitur chronicis, tum avertendis, tum sanandis & levandis, Medicus omnino artis præstantiam quam optime potest ostendere, & nominatim quidem in diurnis febribus, in morbo melancholico-hypochondriaco, cachexia, tabe, hydrope, scorbuto, lue venerea, asthma convulsivo, gonorrhœa & fluore albo inveterato, sphacelo, morbo nigro Hippocratis, hæmoptysi, cruento vomitu & hujus generis pluribus; quæ ope naturæ nunquam sanescunt, sed ætate desideratissimam Medici opem postulant. Quicumque itaque in ejusmodi morbis præ aliis laude quidquam digni efficere potest, is certe aliis præferendus & præstantissimus habendus est. Verum, sicut peritia Medici in hisce morbis quam maxime se prodit; ita etiam ignorantia & imperitia, si quis non recte eos tractare novit, se manifestat. Certe, si veritatem non dissimulare debemus, inter perpaucos eminent illi, qui in contumacibus hisce morbis, quid noceat vel prosit recte judicare valent: pauci quoque sunt, qui intimas eorum causas, ad quas tollendas omnis medentis dirigi debet intentio, & sedes, ubi consistunt & tyrannidem suam exercent, vere perspectas habent; multo minus appropriata & efficacia adversus eos remedia norunt. Surrexerunt nostra tempestate, qui ex plethora atque ex sanguinis excretionibus deficientibus & suppressis omnem chronicarum passionum originem derivare summo studio contendunt, quum tamen, re altius perspecta, magis à boni sanguinis defectu, feri excrementitii colluvie & copia, debilitate generis nervosi & viscerum labe, earum origo & symptomatum causa sit derivanda. Ex qua falsa theoria, perversa demum medendi ratio processit; siquidem sere omnis generis chronicos morbos per venæ sectionem in pede crebrius instituendam & per medicamenta, quæ fluxum sanguinis, præsertim in viris hæmorrhoidalem, promovent, & avertere & perfanare sibi persuasum habent, effectu tamen minus auspicio succedente. Nam ubi nec sanguinis est abundantia, neque natura ad istum fluxum est disposita, frustraneus est omnis labor, quin potius non semel, sed sæpius observavi, diu continuata hac methodo tractatos ægros in pathemata hypochondriaca, à quibus liberi antea fuerunt, incidisse, vel illa ipsa longe pertinaciora reddita fuisse. Quod si enim nimia sanguinis profusione robur partibus, quæ digestioni, sanguificationi & salutaribus excretionibus serviunt, subtrahitur, vis alimentorum digestrix imminuitur, & crudi humores abeunt in sanguinem, qui dein ad intestinum rectum plus justo appulsus & exitum ibi non inveniens dolentes cæcas hæmorrhoides, stagnationes & molestas in ossæ sacro dorsoque tensiones & spasmos proritat; ut hinc facile sit intellectu, hanc quidem medendi methodum non prorsus carere suo usu, minus tamen esse universalem, sed pro ratione corporum & causarum morbosarum valde limitandam. Quum itaque ex falsis suppositis hypothesibus & præjudicatis opinionibus ordinario falsæ conclusiones & perversa judicia nasci soleant, certe non subit mirari, quare qui supra commemoratæ pathologiæ favent, nullam nisi in partibus infernis & pede admittere venæ sectionem velint, rejecta prorsus illa, quæ in superioribus & manu instituitur, ex metu, ne salutaris excretio per venas sedis præpediatur: quum tamen ex Veterum æque ac Recentiorum & nostra quoque observatione per venæ sectionem in plethoricis in manu decenter institutam molestissimus ille fluxus per hæmorrhoides, qui summa circumspectione in regimine vitæ per omne reliquum tempus eget, saluberrime possit præcaveri. Plura mihi obvia recensere possem exempla, ubi in sanguine plenis & vegetis corporibus, in quibus nulla ad hunc fluxum dispositio nec proclivitas apparuit, repudiata sanguinis missione in manu, et tantum in pede fuit instituta, propter exiguas autem venas parum sanguinis effluxit, graves chronici morbi, ut sunt asthma sanguineum cum hydrope anasarca junctum, affectus soporosi, paralytici quoque & podagrici suborti fuerunt, qui per sufficientem sanguinis è secta in manu vena detractionem insigniter levati & convenientium remedium ope sanati fuerunt integerrime. Ceterum ingenue etiam hoc loco confitendum est, commune, quæ nostris temporibus viget, chronicis affectionibus medendi methodum maxima ex parte præposteram esse atque perversam; adeo ut inde non convalescant ægri, sed pejus potius habeant & diutius torqueantur. Plurimi in hac male fundata versantur opinione, in rebellibus hisce morbis vi quadam & multum validis medicamentis opus esse ad obstructionum repagula referenda, humores viscidos & in minimis meatibus subsistentes fortiter resolvendos eosque per excretoria ejicendos: quare

quare non temperatis, lenioribus & sic dictis Galenicis, sed astivis, fortioribus, chymico igne excocis & ex mineralium regno petitis ad averruncandos hos morbos remediis utuntur; cum tamen vera & confirmata satis experientia contrarium plane doceat. Nam si ullo in morbo sanando exquisita victus ratio, moderatum vitæ regimen & remedia leniora, temperata diætetica & pægorica usum præstant eximium, id ipsum certe de longis & diuturnis affectionibus valere arbitror. Ego hinc plena tessari fide possum, me, qui jam per quinquaginta & sex annorum spatium, annuente Deo, artem exercui & docui, præ multis aliis in vincendis chronicis morbis felicem fuisse, potissimumque operæ pretium fecisse per decentem aeris & locorum mutationem, corporis variam exercitationem, per aquæ puræ & aquarum mineralium tam frigidarum quam thermalium potum, per lactis ejusque seri dulcis & aciduli, pitæ, infusorum specierum appropriatarum ex aqua usum, per interna valde temperata corrigentia & evacuantia, item balsamica nervina, per balnea, infusus, pediluvia, fomenta & denum quoque per abstinentiam tenuemque victum; si modo patientia, ægrorumque obedientia & sufficiens ad medendum tempus accesserit. Neque vero dissimulandum est, inter causas, cur multi difficiles morbi ad sanitatem non reducantur, hanc potissimum valere, quod tam Medici quam ægrotantes ut plurimum, nisi statim auspiciatum remedium effectum conspiciant, ad crebram mutationem medicamentorum valde proclives sint. Et revera nihil magis valetudini officit, ac crebrior remedium variatio & copia. In universum quippe tenendum est, omnis generis morbos, maximeque diuturnos, non multa & varia, sed pauca, selecta, & simplicia magis quam composita, leniora, quam validiora desiderare remedia, sed eorum continuatione opus habere. Nam uti natura in omnibus est simplex & simplices quoque morborum sunt causæ; ita quoque in sanando & simplicitate & paucis apparatu gaudet. Et uti in magnis rebus expediendis tempore sufficienti opus est, sic pariter id valet in artis operibus. Ultimo loco inter causas a-græ curationis nec hoc recitandum puto, quod ægri, præsertim malo hypochondriaci afflicti, peculiari animi adfectu laborent, qui mihi nomîne pharmacomania venit, quo perpetuo medicamina urgent & omnes, qui nomen gerunt Medici, in consilium adhibent, eorumque medicamentis utuntur, inde vero efficiunt, ut nunquam valetudinem recuperent. Præfari hæc volui brevibus circa curationes morborum, qui ex atonia oriuntur & in præsentî libro explicantur, ut in limine quasi B. L. perspiciat, quam viam in iis pertractandis ingressus fuerim, quamque methodum artem exercentibus commendandam præcipue judicem, nullus dubitans, quin, si non præsens ætas, tamen posteritas veritatem & inlignem fructum ex scriptis meis sit petitura, præsertim si à præjudiciorum dura servitute liberatos animos lectores attulerint, & usu rerum tantum profecerint, ut à solida multorum annorum experientia mihi enata præcepta, experiendo intelligere & comprobare valeant.

C O N S P E C T U S

C A P I T U M ,

Quæ hoc Volumine continentur.

- CAPUT I. *De nervorum resolutionibus*
 II. *De adfectibus soporosis, comate, caro, & leibargo*
 III. *De vertigine*
 IV. *De gussa serena*
 V. *De visus imbecillitate*
 VI. *De auditus viis*
 VII. *De aptonia*
 VIII. *De delirio melancholico & maniaco*
 IX. *De virium lapsu & animi deliquiis*
 X. *De subita morte & morbis insanabilibus ex polypo oriundis*
 XI. *De adfectione ptybifica, sive tæbe*
 XII. *De cachexia ictérica*
 XIII. *De cachexia & chlorosi*
 XIV. *De hydropæ*
 XV. *De flatulentia & adfectione tympanitica*
 XVI. *De cachexia uterina, sive fluore albo*
 XVII. *De gonorrhæa benigna & maligna.*

Fréd. Hoffmanni Oper. Tom. III.

R 3

CAPUT

gradus, è quibus primum binos, tanquam generales notabimus: vel enim motus voluntarii, & actiones animales, omnes sensus, ipsiusque rationis usus preceunt, homoque velut fulmine percussus concidit: vel, sensuum ac rationis usu existente integro, motus saltem voluntarii ac animales actiones, vel ad summum sensus tactus languescunt, vel prorsus abolentur. Priori in casu morbi resultant apoplectici; posteriori vero paralytici.

§. VI.

Apoplexie tres iterum sunt gradus: quorum summus & nunquam non lethalis est, si cum sensibus, motibusque animalibus, vitales simul, omnesque totius corporis actiones uno impetu prosteruntur; de qua MED. SYST. Tom. IV. P. II. S. I. Cap. 7. sub titulo hæmorrhagiæ cerebri egimus. Alter gradus tollit sensuum, motuumque voluntariorum ac rationis usum; non autem vitales prostermit actiones, nec in mortem semper terminatur, sed plerumque in hemiplegicos transit affectus. Tertius denique, ac levissimus, qui etiam apoplexiæ spasmodicæ nomen meretur, ipsam ac secundas se prodit notis: differt tamen ab eo, quod breviori tempore penitus debellatur, & rarius in paralyticos abeat affectus. Et de hoc leviori apoplexiæ gradu hoc potissimum nobis agendum erit loco.

§. VII.

Ea hæc se prodit notis: antecedunt per satis longum tempus sensuum, vitus potissimum ac auditus inbecillitas, vertigo, artuum gravitas, tremor, actionum animalium torpor, & plerumque passiones hypochondriacæ vel hysterice. Hæc inter improviso contingit, ut homo omnibus sensibus, rationis usu, ac motibus animalibus privatus prosteratur; exhiæbet pedes, artusque inferiores frigidos, curim aridam, spasmodicæ contractum, faciem vero & oculos rubentes, sanguine turgidos, & arterias fortiter celesriterque pulsantes. In tali paroxysmo per aliquot horas constituti, vel vomitibus quibusdam sponte suboritis vicidat multum reddunt soboræ, vel sudores per totum corpus erumpentes experiuntur, tumque ad se redeunt, atque rationis haud fecus, ac sensuum motuumque recuperant integritatem. Multi narrant, sub tali paroxysmo contractis ipsis fuisse fauces, deglutienti vim abolitam, pectusque vinculis quasi coarctatum. Reperit ejusmodi insulsum, nisi medela feratur, sæpius, tandemque in mortiferam cerebri transit hæmorrhagiam.

§. VIII.

Contra vero hemiplegici morbi audiunt, si salvo rationis, motuumque vitalium usu, movendi tantum juxta voluntatem potentia, aut cum ea sensus tactus labefactatur. Talem hemiplexiam sive paralyfin dari universalem, quæ totum corpus afficeret, negamus, nisi forsitan sub ipsa apoplexiâ: nec credimus, dari paraplexiam, quæ totum corpus, salvo manente capite, resolveretur; nostræ saltem prædi nunquam se talis obulit morbus. Omnis potius paralyfis vel alteratur corpus latus, idque totum afficit, & movendi, atque simul sentiendi potentia privat; vel cerue tantum parti inherescit. Prior hemiplexia dicitur; si quando dimissum capitis ac faciei latus simul sit resolutum, alias non nisi paralyfis alteruterius lateris audit: posterior vocatur

paralyfis particularis, & est vel vera vel spuria. Illa sedem suam plerumque in signali medulla, ejusque mox superiori, mox media, mox inferiori parte habet, & movendi pariter ac sentiendi auster potentiam: hæc movendi saltem quandam impotentia se prodit, & humorem per metastasin ad ipsos nervos devolvunt, hoque comprimentem pro causâ agnoscit.

§. IX.

Hemiplexia vel prægressum insulsum apoplecticum sequitur; vel absque eo cum refrigeratione lateris passuri & præcedente vertigine incipit, & sensum in motus sensusque definit abolitionem. Sarum latus sæpenumero spasmodicis ac convulsivis agitur motuationibus; orisque canina non raro conspicitur tonura; & progrediente malo mentis quoque functiones, & cum primis memoria labacere incipiunt. In paralyfi particulari, annotatæ CÆLIO AURELIANO Lib. 2. Cap. 1. antecedit partis palliæ grædo, tardus motus cum stupore, palliæ, & torpedo: pars affecta laxa est, molli, flaccida, tactu frigida, & vel atrophica, vel tumore edematoso imbuta cernitur. Caveas vero, ne motus voluntarii impotentiam, quæ paralyfin comitatur, confundas cum ea, quæ rheumaticis arthriticisque nonnunquam jungitur affectibus: hanc enim partis affectu dolore, spasmus & sæpius convulsionem stipatam deprehendimus; quæ mollior ab affectibus paralyticis valde sunt alienæ.

§. X.

Paralyfis particularis varias afficit partes. Nonnunquam artus inferiores una cum inniventris partibus, integris illis, quæ supra diaphragma sunt, mox movendi solum potentia, mox sentiendi simul facultate privantur: tumque upinæ & alvus contra voluntatem redduntur, ac tandem tumor edematosis, lenta febris & mors succedunt. Interdum brachia & manus paralyfin patiuntur, quæ si spuria fuerit, & post colicam evenierit, dicitur paralis ex colica; ex aliis vero causis orta paralytice manuum nomen obtinet. Datur paralyfis palpebrarum, ubi hæc nequeunt attolli, & invitus lacrymarum fluor urget. Lingue resolutio dicitur aphonia, quam suo loco pertractaturi sumus. Si pharynx paralyfi afficitur, omnis aboleatur deglutitio; cuius differentiam à spasmo pharyngis videas in MED. SYSTEM. Tom. IV. P. III. S. II. C. 5. §. 6. Oesophagus, ventriculus ac intestina in moribundis resolvuntur, tumque assumta, maxime potus cum strepitu, munituribusque descendunt. Paralyfis splindenteris ani per intestini recti proidentiam ac fecum involuntariam excretionem se prodit; vesicæ urinariæ ex invito urine fluxu, judicatur; vesicularum seminalium ex perpetua seminis effusione cognoscitur; muscularum membri virilis a deregata concubendi & membrum erigendi potentia significatur. Cordis dari paralyfin, quam mors repentina absque ulla evidentibus causis eveniens innotuit, è veteribus jam Herapylæ credidisse refert CÆLIUS AURELIANUS. L. II. C. I. p. 348. & è Recentioribus adfirmat celeberr. BOERHAAVE Prax. med. P. I. pag. 13.

§. XI.

Proximam causam & formalem recentissimum affectionum rationem in plus minus intercepto

Resolutio
mot. de nervi
paralytici
notis.

Species pa-
ralytici
particularis

Apoplecti-
corum af-
fectuum
gradus.

Differe-
ntia apople-
cticæ
notis.

Altera-
rum para-
lyticarum
differentia.

Causa proxi-
ma resolu-
tionis
nervorum

cepto fluidi nervi in nervos influxu consistere, ex §. IV. & V. quibus poterit intelligere. Inde quoque statim adparebit ratio, cur alia vera, alia spuria sit paralytis. Hæc enim facilius fit, quam illa; quoniam sensus abolitio totalem fere fluidi nervi defectum supponit, motus autem impotentia imminuit saltem ejus influxum sequitur. Quæ vero causæ remoriari valeant hunc influxum, curatius indagari oportet. Plures medicorum obstruccionem nervorum accularunt; sed eam locum habere non posse, vel ipsa tam tubulorum nervorum, quam contenti in ipsis liquidi subtilitas docet; id quod fufius demonstravit BARTHOL. de MOOR *Path. Cer. C. X. p. 283*. Vera potius causa est vel solutio continui nervorum, ut in vulneribus, aliisque violentis contingit læsionibus, vel compressio aut nervorum ipsorum, aut principii eorundem, à quacunque re ipsi præter naturam incumbente facta. Quam vero unicam hanc omnium nervorum resolutionis statutuam causam; ea tamen diversos producere animadvertantur effectus: videndum, in quo diversitatis consistat fundamentum.

§. XII.

Sed et apoplexia et hemiplegia, cum solutio nervi sit morbi pericula.

Hoc nimirum unice in loci, qui fovet mali causam, diversitate, querendum esse, & ratio suadet, & sectiones anatomice his morbis peremptorem testantur. Omnes enim, qui observationes ejusmodi configurant Medici, ut WILLISIUS, BONETUS, WEPERUS, probe annotant, quod in apoplexia defunctis, vitium nunquam non in cerebro, ejusque ventriculis, nec non in cerebello obhaeret: Conf. bini notabiles casus de apoplexia lethali, altera ex hydrope cerebri, altera ex sanguine in illo extravasato, quos BRUNNERUS in A. N. C. an. I. dec. III. obs. 153. & 154. recensuit. Contra vero in hemiplegiis alterutrum medullæ spinalis principium, vel extravasato fero inundatum, vel tumoribus compressum fuisse, idem perhibent auctores. De seri ibi facta extravasatione, BONETUS *opusc. L. I. Sect. XV.* observationes recenset; tumorem tunicaeum ibi videtur WEPERUS in *auxilio hist. XIV.* de BRUNNERUS *L. cit. obs. 154.* Silentio prætermittimus abscessus, vulnera, ulcera &c. quæ medullam spinalem afficiendo hemiplegiam, cerebri penetrando apoplexiam producere observantur. Ad hæc si ex anatomia repetamus, nervos vitalibus functionibus destinatos ex cerebro; sensibus tributos ex basi cerebri; & motibus voluntariis fisque tactus dicatos, maximam partem ex medulla spinali propullulare: facile colligere poterimus, in omni apoplexia causam nervos comprimentem, intra cerebrum; in paralyti vero intra medullam spinalem; & speciatim in hemiplexia circa alterutrum medullæ principium consistere.

§. XIII.

Causa medulla apoplexia et hemiplegia, cum solutio nervi sit morbi pericula.

Inter causas vero, quæ compressionem nervorum in cerebro efficiunt, & tenuissimæ ac mobilissimi liquidi in eos influxum interceptant, principem fere flagratio de subsistentia sanguinis in vasis membranarum cerebri locum nactus; quæ ex valde impedito ejus per venas & sinus venosus libero circuitu de recta versus cor pronascitur. Nam cum sanguis majori rifu de impetu ad caput fertur, quam ut equali proportionem in venas recipi possit, ob vala nimium

dilatata & expansa subsistit, quod potissimum evenit in plethoricis, hypochondriacis, nephriticis & hysteris ob violentos inferiorum partium spasmos. Nascitur hac ratione interdum levior apoplexie species, quam spasmodicam nominare consuevimus, eo quod remittentibus spasmis & derivata sanguinis & humorum mole versus inferiora liberiorque sanguinis circuitu per vasa restituta vis mali mox remittere solet; quod potissimum fit mature scissa vena, & alvo per clysterem aperta. Sub hoc paroxysmo plerumque facies rubet, pulsus adest celer & plenus, motus & sensuum est abolitio, & sudore interdum corpus totum diffundit.

§. XIV.

Quod si vero hæc stagnatio diutius obhaerit, & in subjectis fero abundantibus congerit: succedunt sensum succi tenuiores serosi per porosulos valorum præter naturam expansionum, incurbant nervi, eosque comprimunt. Hoc si fit in basi cerebri nascitur apoplexia, ejusque alter gradus juxta §. VI. quæ delubene ad alterutrum medullæ spinalis crus fero post se relinquere solet hemiplegiam. Hæc ex eadem causa, sine prævia igitur apoplexia, si serum a stagnante cruore secedens protinus ad medullam decumbit spinalem. Et talis hemiplexia vocatur serosa, quæ corripit subjecta potissimum pituitosa, sanguineo-plegmatica; pulsus in ea est debilis, languidus, facies pallida, quædam somnolentia, & sensuum torpor. De ea venisum est, quod, annotantibus medicis, maximequæ CÆLIO AURELIANO *L. II. C. I.* præ aliis senibus, autumnali imprimis ac hiemali tempore fit familiaris.

§. XV.

Inter causas remotiores, quæ pro subjectorum varietate mox sanguineam, mox serosam producere valent hemiplegiam, primum locum tuetur sanguinis nimia moles in subjectis activioribus, laxoque & spongioso corporis habitu prædictis. Quæ quidem vis inducendis malis eo est opportunior, quo magis humores commoventur: hi enim ebullientes, expandunt nimium terrima cerebri vascula, ac nonnunquam plane extravasantur. Hinc explicari facillimum est, cur plethorici ex improvise dictis affectibus corripantur à nimio veneris usu, à largiori vini calidioris potu, à balneis nimis calidis, à fortiori sub celo fervidiori corporis motu, ab insolata (vid. PROSP. MARTIANUS *Comment. p. 102.*) à gravioribus animi affectibus, & à crapulis maxime si accesserit refrigeratio: mihi quoque in promptu sunt exempla eorum, qui vino, vel cerevisia bene sati, & subinde refrigerati, apoplexia subito perierunt.

§. XVI.

Deinceps nimia sanguinis moles ad nervorum contribuit resolutionem, si per spasmos abdominis & partium inferiorum, quacunque de causa productus, ad superiora, maximeque caput compellitur, & in eo flagrat. Hinc derivanda ratio apoplexie spasmodicæ & hemiplexiæ sanguineæ, quæ accidit subjectis hypochondriacis, ac hysteris: qualem notatu perquam dignum casum in CONSULT. MED. *Tom. I. Sect. I. casu XIX.* reperies. Hinc etiam in praxi medica sæpenumero licet observare, mensium & hæmorrhoidum excretionem non rite succedentem ad

Causa medulla apoplexia et hemiplegia, cum solutio nervi sit morbi pericula.

Causa remotiores sunt: nimia sanguinis moles.

§. Spasmi partium inferiorum, quacunque de causa productus, ad superiora, maximeque caput compellitur, & in eo flagrat.

ad nervorum resolutiones quamplurimum conferre; id quod patet ex observatione *loc. cit. casu XXX.* allegata. Eo certius vero paralytici morbi ab excretionum sanguinearum & actu fluxuum, subitanea prohibitione excitari possunt; adeo, ut eos, accedentibus sub fluxu menstruum, hæmorrhoidum & lochiorum, gravi terrore, vellementi refrigeratione, & incongruo remedium addringentium, repellentium ac opiatorum usu, sæpius accessu videat.

§. XVII.

1) Excretionum serorum excretionem.

Sic purpureus corporis nostri latex (sui stagnatione paralyticæ & apoplexiæ, plerumque tumen sanguineæ & transitoria; successu vero temporis etiam serosæ, easque diuturniores producit. Verum hæc immediate gignit serosa colluvies, majori, quam par est copia, ad caput congesta, nervorumque principis incumbens. Hinc fit serosæ excretionis, fiores critici, transpiratio insensibilis, salivæ nimius effluxus, sive qui sponte fit, sive à mercurialibus medicinis provocatur, serosæ emanationes ex auribus, oculis, naribus, ulculculis inveteratæ, fonticulis, foetor pedum &c. subito coercentur, exsiccantur & reprimuntur: gravissimas oriri paralytes, experientia compertum habemus. Hanc ob causam infansilis etiam ætati, cui alias parcent, insidiari solent affectiones paralyticæ: qualem observationem de infante bimulo, ex prohibita transpiratione paralytico legas in *cit. CONSULT. MED. Tom. I. Sect. I. casu XXVI.* Ex eodem fundamento diuturnior in locis frigidis humidisque commoratio & obambulatio ad nervorum resolutionem contribuit: quales notati dignos casus recenset *FORESTUS Lib. X. obs. 83. & 84. seqq.* Huc pertinet etiam, quam *A. N. C. dec. III. anno VII. & VIII. obs. 203.* de septuagenario post evanescentem subito furstatem apoplexia lateris dextri correpto allegant observatio: quæ non nisi sero, primum surditatis causa, dein per metastasim ad medullam dextri lateris devoluta debetur.

§. XVIII.

4) Excretionum serorum excretionem.

Hæc mala eo graviora machinatur serum ad caput congestum, si fuerit acre, purpureum, scorbuticum, & ab artibus externis, corticeque cutaneo male feratis artibus, unguentisque repellentibus ac sulphureis intus revocatum. Exstant hinc quam plurimæ observationes, quod achores, crusta lactea, tinea capitis, scabies, purpura &c. repulsa pressu per se pede traxerint paralytin. Eodem modo res se habet cum morbis arthrico-podagrico-rheumaticis, quos sero acri ad membranaceas artuum & juncturarum partes incumbente fovendi notum est: hoc enim si vel opiat & adstringentibus medicinis, fopito hinc dolore, intus agatur, vel ex naturali imbecillitate retrocedat: causa fit pertinacissima nervorum resolutionis. Sic observationem de hemiplexia ex rheumatico-arthrico affectu suborta legas in *CONSULT. MED. T. I. casu XXI.* Huc imprimis pertinet paralyticæ sic dictæ scorbutica, quæ nunquam non spuria est, & à sero acri scorbutico hæc vel illuc circa nervos stagnante, eosque comprimente suos mutuatur natales.

§. XIX.

5) Mercuriales in corporebus impuris & debilitatis ad moven-

Mercuriales porro medicinz ejus sunt indigis, ut in corporibus impuris & debilitatis ad moven-

dam salivationem minus recte usurpata, nervorum inducant resolutiones. Mercurius enim in corpore cum particulis salinis ac excrementis mixtus, vim obtinet fortiter stimulantem, quæ præsertim in glandularum substantiam nerveo-fibrosam agit, adque hanc majorem humorum salivalem & lymphariorum affluxum concitat. Horum effluxus per sputationem si quacunq; de causa sistatur: facile fit, ut perennante nihilo fecius affluxu, illi succi copiosius ad spinalis medullæ principia, ipsosque nervos ruant, ibidemque stagnando ac comprehendendo, influxum nervi fluidi in nervos remorentur.

§. XX.

Non minus spasmus membranarum, cerebrum & medullam spinalem ambienstem ansum non raro præbet hemiplegicis & apoplecticis affectibus. Non alia subest ratio, quam quod nervosæ membranæ per tam violentos motus agitate labefactentur, relaxentur, nec impedire queant, quo minus irrumpent succi, utut tenues lymphatici, in vasculis membranarum flagent, & medullarem substantiam comprimant. Hinc docet experientia, post epilepsiam non raro sequi hemiplexiam; & illam, si lethalem sortitur eventum, nunquam non in apoplexiam terminari. Et quamvis est causa, quod ex gravi iracundia paralytici nonnunquam nascantur affectus, nisi quod per illam fortior nervi, vasque inferatur strictura, eam humorum producent stagnationem, quæ influxui fluidi nervi interceptando exitum opportuna?

§. XXI.

Omnes hæc causæ eo certius, etoque facilius vim suam pernitiælem exercent, si prædicto jam fuerit cerebri flacciditas, generisque nervosi debilitas. Si enim laxiores sunt nervosæ partes, minus resistere valent irruptioni humorum, & sic bonum stagnationi pariter ac extravasationi minam quantum favent. Et colligitur quidem hæc debilitas nervorum ex causis antecedentibus: quorum pertinent ætas senilis, temperamentum languinum, & inde pendens habitus corporis laxus, mollis & spongiosus; vita sedentaria & otiosa, potus parior, vel ceretifia crassiora ac lupulata, atque vinorum largior usus, dieta lauta, multarumque epularum, somnus nimis pariter ac immodica vigiliæ, multæ meditationes, & lucubrationes, venæ sæpe repetitum exercitium, diuturnus moror, tristitia, habitatio in locis udis frigidisque, & hiemalis tempestas. Sic enim debilitata corpora vel levissima causa, quam vix attenderes, ad paralytes & apoplexias disponere valet, quemadmodum ex observatione in *CONSULT. MED. Tom. I. Casu XVIII.* recensita patet, ubi quis ex potu aquarum Selictanarum, licet eas rite & corpore bene preparato adhibuerit, nihilo fecius in apoplecticum insultum, & hinc relicta spuriam incidit paralytin.

§. XXII.

His de hemiplexia potissimum præmissis; restant quedam de paralyticis particularia speciebus dicenda. Ex his maximam metetur attentionem, quæ inferiores corporis partes, vel crura pedesque solum, vel abdomen quoque & omnes, quæ infra diaphragma sitæ sunt partes simul afficit, (salvis, quæ supra sunt, regionibus. Posteriori casu causa hæret in medulla ipinali circa priores lumborum vertebra: quod citus sectionibus hoc malo demortuorum *A. N. C. Vol. II. obs. 31.*

6) morbi cerebralis ac epileptici.

7) Flacciditas cerebri & debilitas nervosæ generis.

Arteria paralytica, quæ circa inferiorem accipiat.

§ 102. egregie monstrat. Priori medulla spinalis circa primam lumborum vertebra con-
quassata, & ultra medium crassitie soluta; in al-
tero à dicta vertebra per totam inferiorem spi-
nam tota flaccida, ac penitus exdusa fuit, adeo
ut inter eam, & ossium thecam notabile inter-
cesserit spatium. Oritur hoc vitium 1) à causis
externis violentis, fractura, luxatione, vel vulne-
re spinæ, medullam simul afficiente; quales bini
casus exstant in A. N. C. *Cen. X. obs. 8. &
dec. I. anno III. obs. 66. 2)* à causis internis, ma-
ximèque rheumaticis ac convulsivis dorsi affecti-
bus; ut testatur casus ex A. N. C. *vol. II. obs. 102.*
supra allegatus, lectu dignissimus.

§. XXIII.

Antilogia
paralysis
crurum.

Interdum causa hæret intra os sacrum, tum-
que morbus ambulandi impotentia, & crurum
pedumque resolutione se prodit. Hoc malum non-
nunquam est nativum, & præternaturali medul-
læ, intra os sacrum contentæ nititur continuatio-
ne: quales casus ex tumore intra thecam ossis sa-
cri comato, & tandem exulcerato lethales recent-
sent HIST. MORB. WRATISL. *anno 1701.*
pag. 68. seqq. Idem contingit post febres acutas,
male solutas, nec non intermittentes, si quis ma-
lo victu utatur, animique indulgeat pathemati-
bus: ubi causa est senum vitiosum, per metasta-
sin ad medullam ossis sacri deolutum, eam com-
primens. Eidem malo obnoxia sunt foemina post
laboriosum partum, abortum, & retenta lochia;
nec alia subest causa, nisi sanguis per spinas ad
os sacrum copiosus de latas, ibidemque stagnans,
& nisi medulla feratur, tandem feralem portio-
nem per valorum poros dimittens.

§. XXIV.

Antilogia
paralysis
brachio-
rum.

Notabilis porro est brachiorum paralysis; que
si colicam, anodynis ac opiatīs intempèrè cohi-
bitam sequatur, dicitur paresis ex colica. Causa
est serum vitiosum acre per metastasin ad nervos
brachii & potissimum carpi partes delatum;
& legere licet binos notabiles casus, unum de ta-
li paresi, post colicam opiatīs positam sequente in
A. N. C. *dec. III. anno VII. append. ad obs. 308.*
alterum de paresi ex colica per vini lithargyrio
dulcificati porum producta *ibid. anno IV. obs. 30.*
Familiarè cusprimis malum est metallurgia, fa-
taminas mineras tractantibus; & quarum inimicis
vapouribus in colicam, pertinacissima alvi obstru-
ctione stipatam, & ex hac in paresin incidunt, qui
morbus vocatur *die Hüften-Katze*. Eadem bra-
chiorum paralysis alias quoque agnoscit causas;
& interdum à scorbutica humorum diathesi liab-
oratur, sicut casus A. N. C. *dec. I. anno III. obs.*
334. infertus docet. Nonnunquam causa hæret
intra vertebra cervicis, & dorsi superiores; ex
quibus nervi tendunt ad brachia. Talem ab ichu
lapidis in cervicem subortam annotavit FORE-
STUS *Lih. X. obs. 95.* Eadem supervenit quando-
que pectoris hydropi; annotante CAROLO PI-
SONE *tr. de morb. ex serosa coll. Sed. III. C. VII.*
p. 243. ubi causa lymphæ intra vascula mem-
branam nervorum perperantia, ob impeditum ad
thoracicum ductum iter stagnanti, nervosque
comprimendi debetur.

§. XXV.

Prognosis
aff. morbi
paralytico-
rum.

Quod prognosin affectum paralyticorum at-
tinet; scire licet, apoplexiam spasmodicam & he-
miplexiam sanguineam curam quidem faciliores
esse; at, nisi præcaveantur, sæpius reverti, & tan-

dem in ipsum cerebri terminari solere hæmorrhagiam. Reliquæ paralytice species & sensa hemi-
plexia non libitum quidem inferunt mortem; ve-
rum difficillimam & eo intricatiorem reddunt
sanationem, quo major sensuum intemorum vel
exteriorum concurrens læsio, atque non raro mi-
seros per totam vitam discruciant ægrotantes. Si
infantes paralyti corripuntur, eos circa puber-
tatis annos ab illa nonnunquam vindicari animad-
vertimus; quod vix unquam contingit in senibus.
Hemiplexia lateris sinistri periculiosior est, quæ
dextrum latus occupat ob arteriam aortam, ejus-
que ramos in eo latere copiosius dispersos. Si pa-
ra adiecta adhuc dolet, sentit, non nimium frigida,
nec attenuata est; spes restat convalescentiæ, ta-
que certior, si formationis ac puncturatum in
ea percipitur sensatio. Paralysis abdominis & ar-
tuum inferiorum plerumque lethalis est, & oon
raro gangrenam resolutionum partium habet co-
mitem. Ceterum omnes paralytice affectiones
vere ac æstilate facilius quam hieme & autumnò
curantur.

§. XXVI.

Febri se sequitur paralytin, eam sanare dici-
tur: sed intelligendum hoc est magis de artificia-
li, quam naturali febre, atque de serosa potius,
quam sanguinea paralyti. Enim vero naturalis si
fuerit febris, tam vel continuam oportet esse, quæ
periculo nervorum caret, vel intermittentem, quæ
malum haud tollit. Per artificialem autem intel-
ligimus motum cordis & arteriarum auctiorem,
arte concitatum, quo vegetius circumactis hu-
moribus stagnantes circa nervos, vel eorum prin-
cipium succi nonnunquam discutiuntur, & velut
resorbentur. Talis febris provocatur per medica-
mina paullo acriora & caldiora, nervina, vola-
tilia, per fortiozem corporis, maxime sub solis
æstu motum, per balnea, & cumprimis Lauch-
fladense & thermarum Carolinarum. Verum
hæc in sanguinea, quæ jam febrili motu stipata
est, paralyti applicare nequaquam licet, sed in se-
rosa duntaxat, ubi humorum circulatio languet,
locum inveniunt.

At &
quæ fe-
bris febris
paralytica

THESES THERAPEUTICÆ.

§. I.

Paralyticos & apoplecticos curaturo morbos, *Indica-*
binæ potissimum occurrunt indicationes; quarum *ones*
prior est, ut causas, quæ tam proxime, quam
remotius ad intercipiendum fluidi nervi in ner-
vos influxum contrahuntur, removeat; & alte-
ra, ut partem affectam, totumque nervorum ge-
nus ita roboret, quo pristinum ac naturalem recu-
peret tonum. Multum vero scire interest, num
morbus recens, anne coarctatus sit; propterea
quod juxta hanc differentiam diversa insinui de-
beat curatio.

§. II.

Si mox post primam mali invasionem accer-
tetur Medicus, pulsantem celerem cum facie rubi-
cunda deprehendit: non præterens, nec efficacies
ad causam mali, quæ est humorum in capite sta-
gnatio, removendam occurrit subsidium, quam
venæ sectio. Hæc proinus vel in brachio vel in
collo insinuada, facta paullo ampliori incisione,
ut largo cruor exeat flumine; vel, si plethorica ni-
mium fuerint subiecta, in pede est præmittenda,
ne dato in superiori parte exitu humores ex infe-
rioribus

Frangit
esse aut
non esse
aff. morbi

rioribus eo ruant copiosius; tumque adhuc vel in brachio vel vemi jugularibus repetenda. Et opus interdum est, ut his, vel amplius hæc sanguinis mistio, larga satis quantitate iteretur.

§. III.

Deinceps, ad humores flagnantes revellendos, opere pretium faciunt clysteres paullo acriores & stimulantis, qui ex herbis nervinis rutæ, majoranæ, gauræ, thymi, ferpilli, floribus liliorum convallium, oleo chamæmeli, & adjecto stimuli causa sale gemmæ vel ammoniaco, vel etiam urina humana confici, & iteratis nonnunquam vicibus infundi debent. Non minus egregiam laudem merentur pediluvia ex aqua tepidiori, herbisque nervinis, nec non floribus chamomillæ, summitatibus mellefolii, cineribusque clavellatis parata; quibus pedes profundius immittendi.

§. IV.

Sæpius, tufa vena, adhuc supersunt spasmus partium interiorum, & humorum veluti febribus ebullitio: quibus temperandis conveniunt diaphoretica fixa cum precipitantibus & nitrosis combinata, velut sunt pulvres ex antimonio diaphoretico, lapidibus cancerum, matre perlarum, cinnabari, nitro & succino confecti, & ex aqua liliorum convallium, vel florum tilie exhibendi, addi etiam potest syrupus acetosissimus citri. His enim juvatur transpiratio, qua non raro insulset apoplecticos & paralyticos solvi deprehendimus. Nec præterea in demulcendis partium interiorum spasmis, ullum remedi genus superat viuentem liquoris nostri anodyno-mineralis, cum liquore bezoardico vel spiritu volatili tartari convenienti dosi remixto, qui cum diâlis pulveribus alternari, bisque quotidie propinari debet. Eodem fine absolvere decet ab omni cerevisiæ potu; nec nisi decoctis, aut aqua pura vel fomenta, vel Sclerana, cum modico vini nupta uti convenit.

§. V.

His tempestive adhibitis, disâta vitia, si sint recentia & iola adhuc sanguinis inflammatione nitantur, brevi poterunt depelli. Ubi vero ferè jam secessio facta videtur, ad illud discutendum ac derivandum omnis dirigi debet intentio. Atque hoc in casu, si ægri soporosi veluti sunt, atque stertunt, summo cum fructu adhibere solitus sum emeticum in forma diluitorii, analeptici junctum; quo excitanteur motus, & ad sensum rationisque usum redeunt ægroscentes. Ex usu mihi est sequens formula: *Recipe aquæ liliorum convallium vinosa, florum tilie, primula veris, cinnamomi, aceti distillati ana uncias binas, spiritus cornu cervi succinati drachmam unam, antimonii diaphoretici, cinnabaris, lapidum cancerorum ana drachmam semis, tartari emetici grana duo, syrupi corticum, amantiorum drachmas duas. M. F. mixturæ, cuius bina circiter cochlearia, quavis altera hora exhibenda.*

§. VI.

Deinceps ad discutendum, quod flagrat serum, illustrem ferunt operi volatilia urinosa, naribus adplicata; & quibus primum locum occupat spiritus salis ammoniaci cum calce viva paratus, & oleo majoranæ vel rutæ permixtus. Non minus suam merentur laudem sternutatoria, cumprimis si nervina simul fuerint; quippe quæ non modo motum nervi inferunt, verum etiam majoriam serosum per nares educant. Formula ta-

lis esse poterit: *Recipe herba majoranæ, florum liliorum convallium ana drachmas duas, herba mari syriaci, florum bræcæ, caryophyllorum, aromaticorum ana drachmam dimidiam, castorei pulverisati grana decem. M.D.S. Schnepf-Tobach.*

§. VII.

In rebelli affectu, ad serum flagnans derivandum efficacissima sunt cauteria, ut vocant, actualia, nuchæ inter secundam & tertiam, vel hanc & quantum colli vertebrae innuenda, quorum virtus sicut à vetustissimis Medicorum magni æstimatur, ita recentioribus etiam exemplis confirmata datur à Clarissimo ERNDELIO in *Wurfsia physice illustrata* pag. 185. At quum delicatior nostri seculi genius non permittat, tam terribili, quale videtur, uti remedio; solemus substituere fetaces, easque nuchæ admoovere; vel si nec ea ariserint, vesicantia remedia aut nuchæ aut pedibus imponere. Posterior locus in subjectis sensibilibus prior præferendus: eo quod a vesicatorio cervici adposito, convulsivus paries non affecte motus supervenisse, compertum fuit.

§. VIII.

Si magis inveteratum fuerit malum, præter dicta, convenientia evacuantia in usum sunt vocanda; ut iis humores a capite sensum revellantur & evacuentur. Et primo quidem purgatoria oportet simul esse balsamica; qua laude pilule gaudent ex *extralli colocynthis, aloes, belloninigris, resine ladani, ligni aloes, florum bentæ, salis succini, myrrhe, balsami Peruviani ana scrupulo uno, mercurii dulcis drachma semis, camphoræ, salis volatilis cornu cervi ana granis quatuor parate, si viginti quatuor ex scrupulo formantur, & quatuordecim pro dosi propinquantur.* Inter diaphoretica palmam obtinet spiritus cornu cervi succinatus, cum liquore anodyno minerali adjecta castorei essentia, & decocta lignorum ex ligno sancto, cassiæ, fantalo & radice chinæ parata. Non facis porro laudanda in morbis capitis serosis est virtus diureticorum, ac speciatim succinatorum medicaminum: è quibus essentia succini, cum antimonii tinctura acri principem tuetur locum.

§. IX.

Qui diutius morbis paralyticis detinentur, simulque generis nervosi debilitate laborant, roborantibus medicinis, præter rectum vivendi genus sibi debent prospicere. Et hoc nomine spiritus salis ammoniaci urinofus cum aqua liliorum convallium ita motus, ut una spiritus tres aque partes recipiat, magnam meretur commendationem. Parari quoque potest Elixir nervinum ex essentia gentianæ rubræ, corticis cascarillæ, tinctura antimonii acri, liquore anodyno minerali, & macis ac cinnamomi oleo; idque ex infuso mellisæ, quod citri sovet cortices, exhiberi. Qui adpetitus languente & stomachi debilitate vexantur, iis Elixir nostrum viscerale, vel Electuarium, quod cortex chinæ ac cascarillæ ingreditur, magnas feret suppetias. Nec, præsertim senibus, convenientius quisquam erit balsamo vitæ nostro, si ad aliquot guttas mane, cum infuso mellisæ sumatur.

§. X.

Inter externa sensum & motum excitantia, varia sunt quæ commendantur. Ab antiquissimis temporibus inclaurentur fortiores partis adhi-

Cauteris & vesicatoriis locum dantur.

Evacuantia sunt vocantur.

Roborantibus spiritus salis ammoniaci urinofus cum aqua liliorum convallium ita motus.

Clysteres & pediluvia.

Sympt. interni & humorum ebullitio demulcendi debent.

Vomitionum spiritus salis ammoniaci urinofus cum aqua liliorum convallium ita motus.

Volatilia & sternutatoria demulcendi debent.

De electo nio sensum excitantibus.

Et cum panis asperioribus frictiones; vel si sensus detorqueat, summam cutim vel urticis cadere, vel, præmissa fritione cum squilla per medium dillecta, siccas cucurbitulas applicare soliti fuerunt. Egregie etiam sunt resolutarum partium inunctiones cum spiritu salis ammoniaci, item vini camphorato: nec spern falset vinum vetus Rhenanum, cum roremarino, floribus chamomillæ Romanæ, spicæ, & caryophyllis aromaticis leni calore digestum, cumque linteis quadruplicatis spinæ dorii, ossi sacro, artuumque juncturis inunctum. Iisdem locis, prævis vel balneis vel frictionibus, magno cum fructu etiam linimenta nervina admoventur; quæ ex axungia humana, galbano, terebinthina, balsamo de Copaiva & Peruviano, oleo lavendulæ, juniperi, majoranæ, rutæ, anthos, succini, rosmarinis & rosæitæ expressio concinnantur. Sola enim destillata haud usurpare decet olea; quoniam nervos nimium edificant, ac velut indurando plus noxæ pariunt. Caput cingi solet cucuphis discussentibus ac roborantibus: temporibus balsama apoplectica, quæ ne nimis sint suasvolentia cavens, admovent: nabo capiti pulvis succini inspergi: & occupat spirituosus, quæ ex spiritu voluti cornu cervi, lumbricorum, aqua Anhalima, essentia balsami Peruviani, castorei, oleo nucisæ & caryophyllonum parantur, cum fructu lavari.

§. XI.

De aqua
balnearum
vitis.

Denique in affectibus paralyticis plerumque ad balnea, tanquam sacra solent confugere anchoram. Ex his prodeunt primum thermæ, decenti modo usurpata, inter quas quidem Tropicenses, Emmentales, Wisbadenses, Aquisgranenses, ac in Misnia Wolkensteinenses malo magis inveterato; Lauchstadenses vero, ob martiale adstringens principium, vel recentiori, vel jam superato, & non nisi motus debilitate semet excrenti conveniunt. Earum vim autem superant pene balnea arte parata, è quorum numero primum locum timent, quæ ex scoris metallicis conficiuntur, & vulgo *Schlacken-Bäder* vocantur: *Conf. habita hic de his dissertatio*. Succedunt balnea ex nervinis herbis & formicis concinnata. Commodè hinc scopo sunt herbe serpilli, fideritis, abrotani, origani, mentha, hyssopi, rosmarinis, majoranæ, flores chamæmeli, & id genus alia, quæ sacculo inclusa, inque tenui fixivo cocta, aquæ tepidæ immergantur & partes affectæ foveantur. Inter linimenta præstantissimæ est efficacia, quod fit ex sapone venoso, & spiritu vini camphorato, addita essentia galbani, & bellii.

CAUTELÆ PRACTICÆ.

§. 1.

Caute
circa san-
guinis resolu-
tionem.

Magna est utilitas, quæ ex venæ sectione in affectibus paralyticis, ex sanguinis mole subortis redundat, præsertim in principio. Veteres ARCHIGENES apud ÆTIUM, CELSUS, CÆLIUS AURELIANUS, ARETÆUS statim intendendum esse sanguinem experientia fida confirmant: nocet vero in paralyti inveterata serosa, ubi vires, ciborumque languet appetentia. Qua de causa BALLONIUS *Lib. VI. pag. 255.* monet, ne in paralyti ubi humor frigida in motu est, venæ secetur, ejusque damnum exemplo confirmat. TRALLIANUS in paralyti curanda nunquam intendendum esse sanguinem statuit, nisi manifestè

sanguinis abundantia apparent. In pede vena non tundenda est, si illi frigida, spasmoque contracti fuerint. Viris, qui ex hæmorrhoidum impedimento succedat, vel suppressio fluore in nervorum resolutionem inciderant, post præmissam venæ sectionem hirudines cum fructu ano admoventur: quoniam in A. N. C. *vol. III. Append. pag. 164.* exstat casus, de hæmiplexia, adpositis pons aures hirudinibus, admotisque suris pedum vesicatoriis, brevi curata.

§. II.

Quibus à paralyticis affectibus caput valde imbecillum, & sensus etiam interni, præsertim memoria, læsi sunt; abstinere debent ab improvido interno tam thermarum, quam acidularum usu. Namque hæc aquæ per minima capitis vascula nimium relaxata difficillime progrediuntur, & amplam majorem feroforum humorum stagnationem præbent occasionem. Neque etiam acidulas cum vino mixtas loco potus ordinari tum salutare esse deprehendi, quia vapore spirituosio nimis caput repletur. Verum si ætas juvenilis fuerit, & malum a passione hypochondriaca ortum traxerit, præsertim recidivas, operæ pretium faciunt thermæ Carolinæ, illæ nempe temperiores quæ à molendino nomen habent; vel etiam acidulæ, sed tepidæ: sub quarum potu, qui parior esse debet, à frigore, morore, multaque mentis laboribus cavendum, nimio non indulgendum somno, corpus sedulo movendum, medicinisque nervinis & balsamicis utendum est. Generatim scire licet, harum aquarum potationem, malo declinante, & in melius vergente, longe opportunior esse, quam ubi illud in suo fuerit vigore.

§. III.

Balnea, quæ arte ex formicis & nervinis herbis parantur, eo efficaciora sunt, quo leviores & tenuiores us conficiendis assumuntur aquæ. Quare optima censetur pluvialis, vel hæc deficienti, quæ post copiosas pluvias ex fluvio defumatur. Sed omnibus artificialibus præstant Tropicenses, quæ levitate pluviales adhuc superant, & insigni virtute discutiente, & diaphoretica affectis partibus totum & robur reddunt. Stiliacida quoque harum aquarum principio spinas medullæ allubita ad humores stagnantes dissolvendos, insignem nam raro opem attulisse experientia docuerit.

§. IV.

Ad affectus paralyticos, eosque potissimum inveteratos non sine fructu commendantur balnea frigida, item leniter adstringentia, & sursus, qui ex radice consolide majorem cum aqua decocta conficiuntur. Huc spectant quoque fontes medicati martiales, cujus generis sunt Freyenwaldenses in Marchia & nostræ Lauchstadenses, item artificiales, quæ ex scoris metallicis parantur. Sed hæc circa eorum usum observatio necessaria est, ut non nisi tepide adplices, alias nimium commovendo sanguinis & humorum massam, miras anxietates, cephalalgias, & cordis palpitaciones efficiunt. Hæc enim febrem artificialem excitando, suppetas morbo ferunt: quippe constringendo exteriores corporis partes, convertunt sanguinis & humorum motum magis ad interiora, inque prius ad cor, & quæ illud ambiunt, majora vasa: unde fit celerior ac vehementior cordis ac arteriarum systole, & ideo celerior etiam humorum per vasa minima circuitus. Hinc fieri potest facillime, ut obstructions referantur, visceri succi resolvantur, & stagnationes discutiantur. At

CAUTI-

cavendum probe, ne hæc balnea adplicesur corporibus sanguine turgidis, aut dyscrasia humorum, pariumque solidarum imbecillitate laborantibus, veluti sunt senilis.

§. V.

circa leviora capitis.

Capitis lotiones insignem in paralyticis affectibus habent utilitatem, maximeque in affluetis; quibus si quis haud adfectus fuerit, incipiendum à levioribus ex lixivio minus acris, incoctis herbis nervinis; dein radix asari, & herba rorismarini insuantur sacculo, inque lixivio coquantur; quæ vero remedia nisi prævia purgatione adhibere non licet.

§. VI.

circa paralyticam faciem.

In scorbutica paralyti, quæ plerumque particularis & isura exilit, parum externis proficiamus remediis. Opus est potius, ut decoctis infusisque diluentibus, tam calide, quam frigide in vicem potus ordinarii haullis, acrimoniam humorum temperemus, eandemque specificis antiscorbuticis, è quibus lumbici terrestres in pulvere vel succo cum sero lactis summi emittunt, infringamus, tandemque sordes è corpore proficiamus; & hæc quidem crassiores per alvum commodis in hunc finem laxantibus manatis ac rhabarbarinis; subtiliores autem & in sanguine fluctuantes per cutis spiracula ope pulverum diaphoreticorum. Nisi enim tota repurgetur humorum massa, perfecte nullus est curationis locus.

§. VII.

circa paralyticam palpebram.

Paralysis palpebrarum oculi per metastasin aut stagnationem humorum producitur, & nisi cito depellatur, immedicabile constituit malum. Observavi in ea efficacissimum balsamum viæ nostrum, calide mane velperique palpebris inunctum; nec non oleum cinnamomi & caryophyllorum, modo vera fuerint, cum axungia quadam permixtum. Non negligenda etiam est feri visui derivatio ac evacuatio; quæ per laxantia, diuretica, vesicantia, & id genus alia perficitur: unde de tali palpebrarum paralyti post morbillos suborta, & vesicatoris curata recensetur casus in A.N. C. vol. I. obf. 140.

§. VIII.

circa paralyticam faciem.

Paresis ex colica poscit remedia, serum vitiosum ex sanguine per transpirationem profcribentia. Externe operæ pretium faciunt pelles recenter maceratorum animalium calide affectis paribus adpicate; nec non axungia humana recens, si ejus uncie drachma olei caryophyllorum addatur, eaque pars affecta perfricetur. Hoc etiam in casu non frustranea est adpictio cœcarum cucurbitularum: quibus curatam talem paresin referunt A.N.C. dec. I. anno III. obf. 308.

§. IX.

circa aliam faciem.

In paralyticis affectibus usus aëris fereni & temperati valde utilis est: unde CAELIUS AURELIANUS L. II. C. I. p. 349. ægrum in lucido loco poni jubet. Hinc conclave nec nimis calefactum, nec nimis frigidum, sed temperatum oportet esse. Victus quoque facilis & tenuis esse debet, eo magis in principio, ubi paralyti acutus plerumque morbus est & ventriculi robur nunquam non est languidum. Nec ulla convenit cerevisia, nec ullo modo vinum, præsertim in principio, sed tum demum, quan-

Frid. Hoffmanni Oper. Tom. III.

do morbus jam diuturnus factus est. Tunc enim victus quoque plenior esse potest.

§. X.

Ad lavandas partes paralyticas, si aride & atrophicæ fuerint, spiritus salis ammoniaci neutiquam convenit; sed præstat eo uti, si partes tumore sint affectæ. Hoc in casu consilium quoque est, tumidas partes tenui sacculo includere, qui sequentibus impleri potest speciebus: recipe fursurum & milii ana manipulos quatuor, mista in scutella aut aheni aliquo supra cineres succentur, calefiant, calida includantur sacculo, quo decumbentis ægri pars affecta circumdetur.

§. XI.

Graviores affectus capitis, ut lethargus, apoplexia, hemiplexia, &c. sunt senili ætati perquam familiares, & sæpe immedicabiles. Igitur præservationis causa magna cum cura & sollicitudine ab omnibus iis, quæ systema nervorum debilitant & circuli sanguinis per caput impeditiorem efficiunt, cumprimis à frigore, præsertim ubi corpus ad sudorem dispositum est, à largiori vini spiruosi potu, moerore animi, terrore, venæ sectione conducta intermissa, neque minus à nimio tabaci usu, vaporosis abstinentiis, cerevisia crassiore, humido & vappido aëre senes abstinere debent. Quod vero hi dicti morbi rarissime in senilibus nodulum recipiant, hæc mihi videtur causa: quoniam eorum sanguis humore valde pituitoso & glutinoso scatur; qui ad regressum sanguinis per subtiliores venas cerebri, quas lentore obstruit, & sinus venosus impediendum plurimum consent. Ad ejusmodi vero obstructiones valorum, quæ aliis in cerebro, situm habent, referandas, non tam facilis & expedita respondendi ratioprehenditur.

§. XII.

Corpora paralyticorum quando pinguedine, & vitiosorum humorum copia abundant, non facile ad sanitatem redeunt, vel vires recipiunt, nisi diæta, & victu efficacitate utantur, qui in eo consistit, ut ægrotautes à jurelentis, elixis, & humidis abstineant, & ut parco etiam potu, præsertim consilientiori, utantur, atque non nisi decoctum ex radice chinæ, rasura sacchari citrini, falsifras cum passulis assumant, & portionem generosi vini; caribus quoque non nisi assa vecendum, passulisque exaciniatis, & corpus, ejusque membra, quoad fieri potest, motu exercenda.

ENARRATIONES MORBORUM.

OBSERVATIO I.

Vir quadragenarius, temperamenti sanguineo-plegmatici, per multos annos sub vix parum mobili largam quotidie cerevisiam Martisburgensis quantitatem ingerere solitus, adpetitu sensim defuncto, corpulque valde tumidum præ se ferre coepit. Quo in rerum statu molestam vertiginem, artuumque gravitatem per satis longum tempus sensit, & tandem circa vernum tempus ex impotenti in dextri lateris hemiplexiam, cum memoria sensuumque interiorum debilitate junctam incidit; pulsu existente magno, celeri, facieque tumida ac rubicunda. Quamobrem ex vena in brachio tusa non semel, sed aliquoties multum cruoria detrahebatur, pulsu nihilo minus in magnitudine & celeritate suâ persistentem; nuchæ cucurbitulæ cum

circa tumorem paralyticam faciem.

Præservatio præstatur per abstinentiam.

curatio per dietam.

Hemiplexia curatur dietâ sanâ.

cum scarificatione admovebantur, pulsus tamen magnus esse pergebat; alvo infundebantur enemata, ac intus dabatur infusum mannatum, nec non nitrosi pulveres. Inter horum usum pes movendi potentiam sensim recuperabat; ac manus resoluta manebat, quin lenta quidam febris, circa noctem semper exacerbata accedebat; & pulsus nunquam non celer erat. Tum, missa cerevisia, fontem Selteranum vino neptum, pro potu ordinario adhibebat; pedes quotidie pediluvio tepidioribus, ex aqua, floribus chamæmeli & trifolii fibrino paratis immittebat; brachium resolutum spiritum vini camphorato perficari curabat; ac intus liquorem nostrum anodynum, pulveres digestivo-salino-nitrosos, & pro sudore elicendo essentiam alexipharmacam usurpabat. Usus præterea est victu parco & esicicante: & hinc factum est, ut post aliquot menses prorsus convalesceret, sensuendique pariter ac movendi facultatem recuperaverit.

Epiçrîs.

1) Notabile est in hoc casu, quod post tam largam, sæpiusque repetitam sanguinis missionem, pulsus nihilo secius permaneret magnus & celer: qualem quandoque in nimis hæmorrhagiis observare licet. Testatur illæ, affectum ejusmodi pro causa plenitudinem sanguinis, ejusque vehementem ad caput congestionem agnoscere, & in vehementia ac diuturnitate à spasmoticis partium internarum stricturnis, quæ etiam hæmorrhagias comitantur, & pulsus magni duriq; sunt auctores, sustentari.

2) Ego non semel sed sæpius observavi, quando de ante acta paralyticorum vita interrogare solitus sum, eos plus iusto genio suo indulgisse, præsertim in assumendo potu spirituos, sive cerevisia inebriante, aut potente vino: nam ejusmodi potus, quando immoderatus assumuntur, frigidi morbos, ut tremorem, convulsionem, paralytin, apoplexiam, sopores excitasse, non modo experientia confirmatur; sed & à Veteribus Medicis, jam olim proditum est. Nam ab immoderato calore & densiores, & glutinosiores sunt humores, qui, dum per minora vasa difficiliores habent progressum, & circuitum, facile flagrant.

3) Podiluvia ex herbis nervinis & roborantibus concinnata, præsertim, si morbus est in declinatione, circumspicte & repetitis vicibus adhibita, non carent eximio usu & fructu; eo quod corpus noctu disponunt ad sudorem, & blando calore ac humore partes inferiores relaxando, majorem affluxum sanguinis & humorum ad caput præpediant, neque minus humores lentos ac viscidos tenuiores & fluidiores efficiunt.

4) De insigni victus esicicantis in paralyticis humidioris constitutionis virtute in quamvis consilat, jam abunde supra in cautelis prædictis §. 12. dictum est.

OBSERVATIO II.

Juvenis xx. annorum, sanguine & succia piens, cum meretricè aliquando in lecto decubens, & venero nimis percitus oestro, ob accedentem ex improvviso patrem, tanto percelleretur terrore, ut paulo post toto corpore debilitatus & languidus, neutrum movere potuerit pedum. Mox hi cum reliquis inferioribus artubus magno quæriebantur tremore, sequentique nocte largo corpus diffusit sudore. Expergestus

mane non valebat incedere; sed regio inferior ab umbilico ad extremum usque pedem omni privata erat sensu, adeo ut nec acus intrusæ vis perciperetur, nec sciret ægrotus, cum alvum deponeret, aut urinam redderet. Nihilo minus exhibebat resolutæ partes calorem naturalem, nec marcescebant, nec adpetitus, nec pulsus quopiam laborabant vitio. His per integrum annum affectus molestus, varii generis medicamina, thermas, balnea, nervinaque penetrantissima in & externe, sed in cassum, adhibuit; neque enim purgantes medicinae, nisi magna dosi datæ, alvum movebant, nec ulla concitabant tormina. Sensim adeo abolebatur sensatio, ut aliquando, quod notabile est, lapides igniti ægri sedentis pedibus suppositi, cum vehementer adulescent, ipsæ tamen præter anxietates præcordiorum nihil doloris senserit; donec tandem à fumo ex accensa cute exhalante certior, quid ipsi acciderit, factus, circumstantes in auxilium vocaverit. Et hanc miseram per biennium protraxit vitam; quo elapso præcordiorum anxietates, à fumis potissimum epulis, assilligere, adpetitus dejecti, calor lentus corpus depauperare & vires prorsus perire coeperunt, ipseque satis cessit ægrotus.

Epiçrîs.

1) Terrorem vehementem non modo convulsas & epilepticas in continenti producere posse motiones, verum etiam nervorum inferre subitaneam resolutionem, hæc docet morbi historia. Actio terroris autem in stricturna partium nervosarum, & speciatim membranarum cerebri ac cordis spinalium involvendum consistit: quæ in præsentis casu circa lumbarem contigisse videtur regionem, & eo perniciosior esse debuit, quo vehementiori veneris oestro inflammatum tum fuit corpus.

2) Ad rariores referri meretur hæc inferiorum partium paralytis; eo, quod cum movendi potentia, sensus quoque omnis deperditus fuit, adeo, ut nec acus vis, nec aditus per ignitos lapides perciperetur; quem tamen vis occuparet paralytin, in qua non aequalis supersit sensatio. Et hæc quidem paralytis non externas solum occupavit partes; verum interna quoque viscera & duo primis intestina; restantibus purgantium inertia, & sæcum urinaque involuntaria emissionem. Dum vero ex abolitione omnis motus ac sensus, totalem influxus fluidi nervi in nervos ex spinali medulla infra diaphragma prodeuntes cessationem, non sine ratione colligimus: atamen non omnem viscerum abdominalium, maximeque intestinis denegamus sensationem, quoniam purgantia majori dosi data alvum moverunt. Quod facile conciliabit, qui perpendit, intestina etiam à cerebriis nervis per intercostales ramos nervosus adipisci propagines; per quas aliquis relictus fuit sensus.

3) Medela tali in casu locum vix habet: vero enim est simillimum, medullam spinalem ab eo loco, ubi facta est stricturna, collabi, flaccidam, exsuccamque reddi; cui præfunctioni ansam præbet casus A.N.C. vol. II. obs. 102. inferus. Quare non mirum esse debet, quod lenta demum febris accesserit, finemque vitæ imposuerit. Nam hoc in rerum statu, languescens sensus sensimque humorum circui, pravi impurique per abdominis viscera succi generari debuerunt: unde virium defectus, adpetitus prostratus, & lenta sepsis suam traxerunt originem,

OBSERVATIO III.

*Parefis
manuum
et pedum
saturina.*

Vir xxx. annorum, frigida, & macilenta constitutio, metallurgiae addictus, aliquando in minerarum saturinarum calcinatione, caelo existente turbido & pluvioso occupatus, ingentem vaporum saturinarum copiam inspiratione hausit sub dulcis saporis perceptione. Postmodum de intolerabili capitis timbilicis dolore conquectus, pertinacissimam incidit alvi adstrictionem, quae omnem chyli infusionem, & laxantium exhibitionem rebellis eluxit. Jangebantur vomendi conatus, cardialgiae praecordiorum anxietates, gelidusque per corpus erumpebat sudor. Quo in rerum statu pugnatum est antispasmodicis, chyli oleosis, balneis, oleoque amygdalarum dulcium, carminativis nupto: unde remittebat dolorum ac reliquorum symptomatum vehementia. Verum enim vero brevi post nova succedebat adstrictio; quippe sinistra manus dolore pressior, cum movendi impotentia, absque tamen tumore prehendebatur, adeo ut nec flecti, nec ad os duci poterit. Adhibebantur varii generis sudorificae, balnea Laconica, sicut ac linimenta, sed in cassum: alvus simul adeo compressa erat, ut nisi chyli oleis, admonita, sui non remitteretur officii. Meo tandem flagitante consilio suasi, ut aeger abstineret ab omnium calidarum, acidiorumque remedium usu, loco cerevisiae decocta biberet, laxante ex manna, passulis, oleo amygdalarum, tartaroque tartarifato alvum moliretur, & adfectas partes assungia humana, oleo caryophyllorum acuta, calide perficeret: unde factum est, ut per Dei gratiam restitutus, diu salvus viveret.

Epicrisis.

1) Morbus quo post inspiratum, sub dulcis saporis perceptione, saturini vaporem, noster aeger est infectus, colica convulsiva, & peculiari cognomine saturina, *die Huten Katze*, vocari solet. Familiaris ea est metallurgis, Hercyniae montium Sylvae incolis, & plumbi venas scrutantibus, & debetur fumis saturinis, ore hausitis, & sensibilibus intestinum tunicis, quas graviter vellunt, indixit. Præter torsionem vehementissimam, & convulsivos fere totius generis nervosi motus molestissimum in hoc morbo genere symptoma est contumax alvi compressio; & ei summiariter jungitur parefis manuum.

2) Quo liberior ista in locis, quibus diætae tractantur mineræ, quoque ferentior est aer, eo rarius occurrit recensitus morbus, quoniam violentæ exhalationes commode dissipari queunt. At si gravis ac pluviosus fuerit aer, compedit vapores, & quo minus in auras abeant impedit: unde sub ea temperata constitutione frequentissimum est malum.

3) Curatio in parefi, ut recte monet C.R.A.T.O. *consilio* 72.73. non ad principium nervorum, sed ad musculos, ad quos humor vicius transfusus, ut ille discutiatur, & membra corroborentur, dirigenda est, non neglectis illis, quæ inactivorum tonum restituunt, & alvum lubricant. Cum ante aliquot annos in juvene gonorrhoea laborante, ab improvido tincturae antiphthoricae *Grammei*, quæ pro basi saccharum saturini recipit, usu, contumacissimam alvi adstrictionem cum parefi utriusque manus conjunctam observarem; oleum amygdalarum dulcium recens cum juleo avenaceo, additis aliquot gut-

Frid. Hoffmanni Oper. Tom. III.

tulis olei cymini destillati, crebrius usurpavi, non omnis pœionibus manatis, cum eodem oleo permixta, quæ tamen non ante apertionem alvi per chyliorem emollientem, & oleosum assintæ fuerunt. Alvo liberiori reddita, usurpata quoque sunt sudorifica, ut Spiritus cornu cervi cum Essentia Succini & Spiritu niri dulci. Adhibebam porro balnea ex semine lini, & herbis emollientibus & balsamo nostro vice, nec non essentia galbani saturata, manus resolute inunctæ naturale suum robur receperunt. Et cum à vini austeris, rabicundis, & per adstrictionem hythargieii malitiose adulteratis, idem morbus, eademque symptomata in Germania, & in provinciis, ubi vinorum est proventus, admodum sint familiaria; non alius, quam modo laudatis remediis, illum ipsum curatum fuisse à fide dignis Medicis, nobis relatum est.

OBSERVATIO IV.

Fœmina xxx. annorum, exilisioris stature, Hemiplegia morbo, faciem suam, nervos terrore, ut juba cordis, excipiens. Vasa capacioribus prædita & ob nimiam, quæ pollet, sanguinis abundantiam, à quatuor jam annis hysterica pathematibus cum vehementi capitis dolore, ac violenta vomitionibus tanta ferocitate fuit cruciata, ut sæpius, maxime post iram vel terrorem, suffocativis ac apoplecticis corripereur invasionibus. Anno elapso, vigesima post puerperium hebdomade, mensis motu soluto, licet ipsa infanti præberet ubera, fluere coeperant: qui cum, accedente gravi terrore, protinus supprimerentur, paucis post diebus, prævia spasmodica artuum lincinatione, incidit in dexteri lateris hemiplexum, oris rigore stipatam. Hanc transfusus aliquot diebus, febri quædam intermittens ex.icipbat, à meridie singulis diebus invadens, & per tres durans hebdomades: sub qua tandem in dextro pede alba, in sinistro rubra efflorescebat purpura. Qua per usum quorundam remediumum desiccata, redibat quidem aliquis movendi potentia: ut loquela adhuc erat impeditior, & magis lateris resoluti, maximeque manus resabat imbecillitas. Conspiciebat ergo ad fontem Lauchstadiensem; quem cum per quatuordecim dies in balneo adhiberet, erupant adhuc maculae scorbuticæ, & sanitas majora sensum cepit incrementa. Ego, cum meum exspectaret consilium, suasi ut fontem Scherzmann tribus horis ante balneum ad mensuram unam biberet, & quatuordecim dies cura adhuc infunderet; quo factum est ut præsensissimum levamen atque augmentum in partibus imbecillibus roboris experta fuerit.

Epicrisis.

1) Non opportuniore affectibus apoplecticis & paralyticis sunt subjecta, quam plethora, & simul hysterica: & certissime illos incurunt, si excretiones sanguineæ, superveniente, dum flant, gravi terrore, subito sistunt. Idem in præsentis consigit ægrotante, quam valde fuisse plethoricam, vel hæmoptysia iteratis sponte revertens vicibus testatur. Adhuc sanguinem ipsi fuisse impurum & scorbuticum, docent & purpuræ in uno pede rubrae, in altero albae, & scorbuticæ efflorescentiæ; quibus ad cutaneum corticem pulsus, levare plerumque solet malum. Quare etiam recte hic morbus paralyticis hysterico-scorbuticis appellari potest.

2) In cura hujus ægrotantis mulieris plethorica & hysterica in eo peccatum fuit, quod non tempestive satis per sectionem venæ detractus fuerit sanguis. Ita forsan fluxum paralyticum

S 2

affectio

affectio vel arceri vel tolli possit; atque in eo contententem habeo RAYGERUM clarissimum Hungaricæ Medicum, qui *obs. X.* scribit; paralytis & hemiplegia in foemina sæpe unica venaë sectione in brachio tolli potest.

3) Vix unquam paralyticum affectum, cum præter recentiore, vidi, quin febriçula quadam intermitteni simili fuerit stipatus. Sed nulli profluo folatio hæc febriç est: quamvis enim nulla paralytis sine febre curetur; uti monet etiam Clarissimus BOERHAAVE *Pr. Med. P. V. p. 15.* id tamen de artificiali intelligendum esse febriç, jam sub Pathologicis ultima thesi adnotavimus.

4) De balneis Lauchfladensibus, quæ valde adstrictivæ sunt indolis, notari meretur, quod in paralyticis affectibus vel ab initio, ubi adhuc mobilis, nec nimis impacta est materia, vel sub finem, ubi non nisi languor quidam nervosi generis restat, cum fructu possint adhiberi. In malo confirmato magis è re sunt aquæ Aquilgrancenses, quæ intimius stagnantem materiam penetrant, & resolvunt.

5) Lauchfladensium fontium pro balneo insignissimum usum atque utilitatem ego primus ante triginta annos invenit atque detexi, & peculiarem de eis conscriptis dissertationem, & bona fide testari possum, quod convenienti & circumspccta observatione si usurpentur, ad imbecillia corpora membra roboranda, vix sui similes habeant, adeo ut etiam in eo certis in casibus Toplicentium balnearum virtutem exsuperent. Horum operatio fit per febrem artificialem. Nam sub ipso balneo valde tepido subtiliores martiales molecule subcutaneis fibris & poris se paulo altius insinuando fluctuant curis efficiunt, & eo ipso humorum cursum ad interiora urgendo sub celeritate & magnitudine pulsuum & auditior calor & major transpiratio sequitur, cujus beneficio viscosi morbifici humores ex partibus exterioribus discutiuntur, & impuri salii ad habitum corporis protrahuntur.

OBSERVATIO V.

*Paralytis
dext. &
sinist. si-
m. & ex
transvers.
6974.*

Vir annorum XLIX. temperamentis sanguineo-cholerici, habitus spongiosi, potui sabbatum Caffee nimium addictus, nec venam nisi unquam secari passus, per biennium, ex quo matrimonium inivit, male habere, ac de spasmodicis passionibus, molestisq; alvi obstructione conqueri coepit. Quibus consulturis in manus Pharmacopæi incidit, qui datis medicamentis id effecit, ut abdomen tympani insisteret intumuerit, & fortan ipsa accesserit tympanitis, nisi medela fuisset lata. Brevis post rus aliquando tenuit, moxque ab itinere intravit conclave valde calefactum; cujus impatiens, apertæ fenestree adfledit, cervicemque acris frigidioris flatus exposuit; tum vehementi corpus commovit exercitio, & demum sub vesperino ac nebuloso domum reverfus coelo, loquace subito amisit facultatem. Quam, summo calidiori decocto fabarum Caffee recuperavit quidem, noctemque placido transiegit somno; sed expertus scilicet nec loqui, nec dextri lateris artus movere potuit. Tula proxima in brachio sinistro vena, adhiisitque nervinis, diaphoreticis, pediluvii ac frictionibus utraq; evanescere molesta, sed memorie quædam remanebat imbecillitas. Verum paucis post hebdomadis vehementi percellabatur terrore & abhinc protinus aphonis, & dextri lateris paralyti iterum prehendebatur.

Secabatur in sinistro brachio vena, adhibebantur diaphoretica, laxantia, nervina in - & externa, balsamica & id genus alia; sed malo nullum accedebat levamen. Lingua enim, utut satis comode moveri queat, articulum non valet edere sermonem; nec brachium ullo modo moveri potest. Consultus ego fuisti, ut vesicans emplastrum utrique furarum imponeretur; decoctum ex ligno salutaris, cinamomo & paffulis, loco cerevisiæ potaretur; passule rhabarbarinæ laxandi scopo per vices sumerentur; pulvis ex lapidibus cancrorum, antimonio diaphoretico, succino, nitro, cinnabari, sale absinthii, radice zaronis & cardamomo bis quotidie caperetur, & denique balneis Lauchfladensia in usum vocarentur.

Epiçrifi.

1) Potus Coffeæ abusus sicut variis morbis jamnam pandit: ita ad nervorum motibus corpori afficit quendam dispositionem. Fabre enim iæ Turcicæ principio expansivo & vaporoso pollet; quo humores commovendi, solidatque & nervosæ partes relaxandi, possident facultatem. Hinc occurrit quotidie, quod id decoctum paulo saturatius & largius bibentes de organo sanguinis, & tremore manuum consequuntur: quare etiam excell. BOERHAAVE *Pr. med. L. V. pag. 12. abusus, inquit, nimis Tice & Coffe paralytis induit, nervis flaccidis redditus nec amplius contineri possibilibus.*

2) Paralytis in præsentis casu debetur cohibita per subitam aeris mutationem transpirationi; unde humores retroacti, circa medullæ dextri portissimum lateris principium, & nervos sermoni dicatos stagnant. Et in tali casu si non fiat conclusio admodum noxia, sed mox accesserit Medicus, vena secetur, congruque medicamentibus regularis humorum circuitus promoveatur; facile superatur modus, qui his neglectis aut tardis admittit subsides, chronicus evadit.

3) Hoc notari debet, apoplecticos & paralyticos motus facile resistari. Nam, utut sanata videatur paralytis, relinquit tamen aliqualem partium affectionem imbecillitatem; qua præsentem terror, ira, & quicquid vehementes spasmos producendi facultate pollet, quam facile ad eadem loca humorum motum compellit; ut ibi flasin concipiant sensum & motum tollendo; ubi tamen sciendum, quod quo frequentius revertantur ejusmodi affectus, eo intricatorem & difficiorem adjuvant curationem, quæ non modo interna, sed & externa efficacissima remedia postulat, adeo ut sine balneis & linimentis spiritibus diuturnior affectus non leniri, multo minus expugnari possit.

OBSERVATIO VI.

Verbi divini minister, XLVII. annorum, temperamentis sanguineo-phlegmaticis, habitus corporis spongiosi, vitæ sedentariæ, & lucubrationibus valde deditus, adventu integro, ac sanitate illibata, sub venæ sectione bis quovis anno celebrata gavissus, nec ad animi affectus, nisi nimiam venerem pronus, per novissimos aliquot annos in valde calefactis, æstivo etiam tempore conclavibus commorari, largisque perpetuo sudoribus inuadebat. Qui cum per proximum remitteret biennium; de sensiva ac spasmodicis artuum doloribus sensu quodam frigoris in vertice & cervice percepti; nec non

Hemiplegia dext. & sinist.

de

de pedibus gelidis, licet tactu calidi essent, cepit conquiri. Sensim magno carminum fufidio capiebatur, cessantibusque demum doloribus, insigni totius corporis languore vexabatur, adeo ut vix incedere posuerit, & inde sibi mortem ominaretur: deinde lenis mentis alienatio, quia continuo loquebatur, aderat. Mittebatur aliquando & vena in pede incisâ crura satis larga quaminare, & ecce brevi post circa vesperam lingua subito resolvebatur, & vera accedebat dextri lateris hemiplexia. Nam artus sensu motuque carebant; dexter oculus videndi, dextra naris olfaciendi & auris dextra audendi potentia destituebatur; memoria labefacta erat; nec bene malicere & deglutire poterat; corpusque largo & perpetuo per aliquot hebdomadas diffusibae sudore. Frustra sulphuris vesicatoris, antispasmodicis, & balsamicis, adibat tandem Lauchladienses fontes: ad quos ipsum balbutiente lingua, memoria debili, lateris dextri resolutione, & pulsu in dicto latere vix notabili praedium deprelendi. Iussu igitur, ut mane in balneum descenderet, vesperi pedibus uteretur, atque elixir balsamicum sub epulis, vesperi pulverem antispasmodicum sumeret; exteme vero nucham & dorsum sibi in oleo calido, spiritu florum chamomillae Romanae inbutis perfundendum curaret. Balnea ingressus, large sudabat, dolores dextri brachii perstentibus, & frigoris sensum percipiebat; at lecto impositus, iterum incalcebat. Et continuata sic per mensem curatione melius habebat; movendique pariter ac loquendi poterat, relicta imbecillitate atque torpore recuperabat. Commendavi ad plenariam restitutionem victum cum abstinentia exsiccantem, cujus auspiciatissimum effectum ego in ejusmodi morbis aliquoties vidi.

Epigris.

Multa in hoc casu continentur momenta, ad usum practicum accommodatissima. Sibi ille vix ram hemiplexiam, in qua non modo alterutrum lateris artus movendi sentiendi facultate carebat, sed & lingua balbutire, alterque oculorum, narium, & aurium ladi, memoriae solet labefactari. Porro depletio laesi est, ut potum praesertim assumptionem suffocativa loquatur molestia, & acri assuta sapientia sanum verius fleclere debeant laus; testante exemplo CONSULT. MED. Part. I. Caf. XX. allegato. Non minus interna quoque viscera quandam habent contrahunt; unde haud raro observavi, hepar in paralyti defunctis insignem retulisse magnitudinem, ut notavi cit. lib. cap. XXII. Pulsus in affecto latere tam debilis est, ut digitis vix quaerit percipi, clari testimonio, imminutam esse arteriarum vim systolicam. Tali ratione differt hemiplexia perfecta à paralyti lateris alterutrum; in hac enim motus voluntarii, vel ad summum simul sensus abolentur, integra manente facie, ejusque paribus illis. Hinc patet, in hemiplexia vera causam simul in cerebro haerere, quae in paralyti non nisi spinalem afficere videtur medullam.

2) Causa praesentis hemiplexiae non nisi sudorum consuetorum cessationi debetur, quae in corpore per vitam otiosam, multas luctationes, nimiamque venerem debilitato facilius perniciem exferere potuit effectum, quam in robustiori. Eam ob causam curatio per balnea Lauchladiensia felicem unquam obtinere debuit finem, cum sic revocatis sudoribus subacta fuit materia nervos comprimens. Praeterea vero solius sum in

Frid. Hoffmanni Oper. Tom. III.

ejusmodi casibus Elixir meum viscerale propinare, eo quod ventriculus plenusque simul labefactus esse solet.

OBSERVATIO VII.

Illustrissima quaedam comes, L. annos emensa, succi plena, plethorica & cacochymica, per viginti jam annos fluxum haemorrhoidalem, statuto tempore promanantem cum levamine passa, nec non fonsiculum per duodecim annos in brachio gerens, ab incere aliquando ad familiaris facta, domum rediit, male coepte habere, & nihilo minus inter laetam diatam corpore pinguescere. Quo in rerum statu haemorrhoides parcius fluxerunt, & fonsiculus serum fundere protius desistit; unde habuit illustrissima, ut de insigni corporis languore conquireretur. Tandem crurum media hyeme per venas fedales erumpere conatus parvisime stillavit; postmodum alvum egrediendi stimulum sentiens, & ad locum secretorem tendens, in medio conclavi tanto prehebatur pedum torpore, ut protinus in terram concideret, & sinistri lateris paralyti, cum oris torura, linguaeque balbutie stipata corriperebat. Vena protinus secabatur, vesicatoria manibus admovebantur, & omnis generis remedia in & externa usurpabantur; sed in cassum. Movendi artus sinistri lateris impotentia manebat eadem; attamen eosdem dolor quidam per vices occupabat, maxilla sinistri lateris motu carebat, in dextro solum masticandi erant cibi, atque memoria paululum videbatur laesa, cum febrili commotione, omni vespera accedente. Alvus insuper magis compressa erat, urinam crebatur difficultas. Consultus fuisti, ut vena in pede tenderetur, dorsi spina linimento ex *axungia humana uncia una, olei nucis drachmis suis, rarisimarini, lavenderae, majoranae Effruti, singulorum drachma una* conficito iningeretur, probeque fricaretur; pro potu decoctum ex radice scorzonerae, chinæ, lasparillae, ligno lasparis, leucici, santali citrino, passillique paratum adhiberet; ter quavis hebdomade laxantem pulverem ex rhubarbaro, terra foliata tartari, nitro, & oleo destillato macis sumeret, & mane lactis serum dulce potaret. Adhuc pedibus cum herbis nervinis rarisimarini, majoranae, salviae, abrotani, floribus chamomellae, thymi & herbarum commendavi; urque ea egressa lecto se daret, paululumque sudaret; ac denique sub epulis quinque balsami mei vitæ sumeret guttulas, fuisti. Hinc percepi, paralytin maximam partem remissile, & per anum lividi seri penultimum cum levamine secessisse.

Epigris.

Quoniam excretionem tam naturales quam extraordinariae de consueta suppelle vel impeditae praecipuum gravium & difficultum morborum causam continuant, tum quam maxime id in paralyticis & alius capitis & nervorum affectibus observatur; de quo etiam praesens morbi historia testatur. Una illius causa est fonsiculi excoctio, quae factum est, ut serum copiosius in corpore retrocederet, & tandem ad medullam spinalem crurum sinistram decumberet. Altera, majoris ponderis, debetur imminuto haemorrhoidum fluxui; unde sanguis in tam plethorico corpore retentus, & superiora versus congestus, serosum demum dimisit portionem. Cui quidem eventui occasionalem causam dedit hiemalis tempestas, quae ob impedientem sub ea transpirationem, mirum quantum

Paralyti
ab incere
haemorrhoidalem,
passa.

his

his producendis faveat morbis. Et preservari hunc insulsum paralyticum potuisse extra dubium est positum; si eo, quo illustrissima comes ex itinere reversa, corporeque obeso facta fuit, tempore, vena tusa, aut ano admodum fuisset hirudines. Quibus omisiss, omnis unice curandi cardo in eo consistit, ut hemorrhoidalis revocaretur excretio: quam licet obtinere non licuerit; atamen satis fuit, feri lividi magnam per anum effluxisse copiam. Quam enim accessit demum sudoris per blanda pediluvia provocatio, & hinc facta feri vitiosi evacuatio, aufpicatur omnino, malo existente recentiori, evenire debuit eventus.

OBSERVATIO VIII.

*Paralysis
dextrae
inferioris
magis
notata.*

Vir septuagenario major, macilentus, vassique capacioribus praeditus, constitutionis sanguineo-melancholicae, in juventute ex vita sedentaria, multique lubricationibus contraxerat sibi melancholiam hypochondriacam, sed per congruam admodum, maximeque motum corporis illam debellaverat. Ab hinc sub venae sectione, bis quotannis repetita, & frequenti corporis exercitio, quo alvum lubricum servari dixit, integram ad senectutem usque conservavit valetudinem. Per novissimum vero biennium omni mane large sudare solitus fuit; & quum pronaque mensi Aprilis ras petisset; inminutus hinc sudoribus, de colicis intestinarum doloribus, & alvi conquisus est obstractione. Brevis propterea corporis lassitudine, dexteri lateris paralyti corripiebatur, lingua dextraque maxilla intumescere, sinistra extenuabatur, os torquebatur, loquela eras impeditior, movendique manum & pedem dexteri lateris potentia evanescerebat. Vocatus ego mox sanguinem & vena in pede rufa large detrahendum, clysterem adplicandum, vitaeque nostrum balsamum inungendum curavi; intraque vero liquorem anodynum, cum balsamo viarum remixtum propinavi. Factum est inde, ut melius haberet, & loquendi, ambulandi, scribendique facultatem, ut in languidiorem reciperet; sudores etiam largi per noctes rursus erumperebant, & somnus atque citiusque sibi constabant: sed alvus non nisi alternis respondebat diebus, & ager in dextro pede perpetuum semiebat frigus, quo etiam in toto corpore perfunditur, simul ac liberiori se tradiderit aeri.

Epilepsia.

1) Quanta mala ex suppressione excretionum consuetarum, sive fuerint sanguinea, sive serosa propullulent, vel praeter casus optime docet. Obvia enim in illo paralyti non nisi sudorem imminuto proveniunt debetur: unde accumulati in corpore, praesentem senili, humorum serosi distenderunt vala, medullae spinalis principium ambiencla, & per illorum poros omnino transfluxisse videntur. Quemadmodum vero ortum a prohibita transpiratione traxit morbus; ita non alia elidipari potest ratione, quam per abundantiam feri imminutionem, ac ad habitum corporis revocationem. Prius obsequium venae sectione, quippe qua una cum sanguine serosus latex subtrahitur: & dum ope liquoris anodynini stricture cutis relaxata fuerant, redit etiam consueti sudatio, cumque hac malum vehementem morbi subactum est.

2) Circa paralyticorum sudores adhuc scire licet, quod in affecto latere pleniusque copiosiores erumpere soleant. Quam enim humorum vegeta

circulatio in eo latere valde languet; sanguisque tarde moveatur: sit inde, ut serosus latex sub lento progressu a sanguine secedat, & per laxatos tubulos largius exhalet. Hinc etiam observamus, in artubus resolutis exanthemata, scabiem, purpurae &c. longe majori copia efflorescere, quam in sanis.

3) Membra paralyti resoluta ordinario frigida sunt. Quemadmodum enim corpora molli color a motu sanguinis vegetiori & rapidiori proficitur: ita quo hic magis languet, eo majus percipitur frigus. Quam igitur in partibus paralyticis languidior sit humorum circulatio: facile patet, cur illae tactu sint frigidae, carque intumescere soleant; quia nimirum irruptioni humorum serosorum nulla est resistencia.

OBSERVATIO IX.

Femina, xxi. annos nata, proceras, post enixum partum lochia bene persincta, absolutioneque puerperio in lecto surgens conquiri cepit de gravi ventris dolore, ad lumbos diffusio, & cum motus imbecillitate strigato; qui accessus adeo sensim invaluit, ut bis abhinc mensibus non solum non ingredi, sed nec pedibus absque fulcramento insilere posset. Quin imo tanto torpore manus etiam assedae sunt, ut nec pondus aliquod attollere, nec ipsas facile contrahere vel explicare valuerit, incolumi tamen manente sensu. Hic denique accedebat motus quidam convulsivus, & rigor partium infirmarum nec non sensus constrictionis in abdomine, ad lumbos usque irruentibus. Alvum non nisi sollicitatione depicebat, & rarius difficultateque urinam reddebat, lunare tributum, illo quidem tempore, sed parcius solvebat; somno existente longiori. Adhibitis variis generis medicamentibus, tandem Lauchlasiensem usurpavit, simulque meo iussu spinam dorsii spiritum ex foliis chamomillae Romanae destillato inungenduravit: unde sensum in aegrem movendi recuperavit potentiam.

Epilepsia.

1) Causa praesentis mali absque omni dubio haeret in ea medullae spinalis parte, quae intra lumborum & ossis sacri vertebrae continetur: & vero videtur simillimum, utrum a parte non rite fuisse expurgatum; unde resistentes sordes per metastasin ad lumbarem regionem medullam decubuerunt, eamque comprimens impediant, quo minus fluidum nervum in partes, quae a dicta medullae portione suos nervos adipiscuntur, sufficienti influere poterit quantitas.

2) Quam parcius effluxus fluidi nervi ex inferiori spinae medulla fuit; ille omnino in aliis partibus largior ac copiosior esse debuit. Hinc patet ratio, cur aegrotans nostra in partibus integris convulsivos motus, & in abdomine constrictionis sensum fuerit passa. Notabilis haec in rem est observatio, quam A.N.C. vol.II. obs.102. allegant; ubi miles quidam paralyti abdominis & partium inferiorum affectus, infra costas squaras constrictionem percepit, abdomen chordae inflat ambientem: post mortem dissecta spina, ejus medulla intra primam lumborum vertebrae sita, labe caruit, nisi quod succis turgidior paulo fuerit: ea vero, quam sequentes includunt vertebrae, tota flaccida & exsiccata adparuit. Et hinc clarissimus SALTZMANNUS dictae observationis auctor rectissime conclusit, constrictionem illam provenisse a succo nervoso copiosius quam

*Paralysis
dextrae
inferioris
magis
notata.*

par

par est, in nervos à prima lumborum vena procedentes influente.

3) In hac partium infarctum paralyti & mictionis & alvi vel involuntarius fluxus vel perniciosa retentio observari solet. Utrumque vitium à relaxatione vesicæ aut intestinorum provenire; contradiclorum videtur, sed non est. Involuntarium harum foridum excretionem debet partium relaxationi, nemo dubitaverit: at quomodo illius suppressio ex relaxatione provenire queat, multis videbitur dubium. Neque vero opus est, ut explicando hanc phenomenon diutius immoremur; quippe quod in CONSULT. MED. Tom. II. Sect. II. cap. 138. fulius demonstravimus. Res eo redit; omnes canales membranacei totius nostri corporis pollent motu confstrictorio & dilatatorio; ad excretionem vero justum partium robur requiritur; quo sub paralyti cessante, vel non sunt excretionis, vel contra voluntatem contingunt.

OBSERVATIO X.

Matrona honesta, LXVI. annorum, robusta, bis quotannis veram tundendam præbere solita, à senectis ferme integra valetudine est gavia. Anno novissimo neglectas fuerat venæ sectionem & hiemali tempore concionem in templo audiebat: hinc per aliquot dies de verigine, refrigeratione & languore corporis conquesta, levem quoque mentis alienationem passa, ex improviso omni sensum ac rationis usum prævata, incidit in hemiplexiam, sub qua dextrum capitis latus convellitur, sinistrum erat resolutum, & ægra jacebat insensibilis. Vocatur multum sanguis à vena jubeo detrahi, infundendosque curo chylifera: sed quam spes vna falleret, præteribo mixturam ex aqua liborum convallium, melisse, storacis tibia, cardui benedicti ana metris tribus, mixtura simplicis guttis quadraginta, aceti destillati uncia una, lapidum cancerorum drachma una cum dimidia, cinabari scrupulo uno, tartari emetici granis duobus, rosarum storacis uncia dimidia parandam. Hujus bina coelestia postquam binis lumetis horis, remittebat convulsio, redibat rationis usus, & ægra intra horas viginti quatuor perfectissime convalescebat.

Epietisi.

Sicut naturalium excretionum suppressio; ita artificialium neglectus ad vaicos morbos, ipsamque nervorum resolutionem, præsertim in senili ætate contribuit. Hemiplexici enim insulatus, quem matrona honesta toleravit, non aliam invenire possumus causam, quam stagnationem sanguinis, per neglectam venæ sectionem accumulati & per frigus versus caput commoti. Refellitur fasul inde vulgi valde noxium præjudicium, quo senilis non debere sanguinem mitti perhibent: non enim ulli ætati tanta noxa ex omnis sanguinis millionibus imminet, quam quidem senili, propterea quod vis & elater partium solidarum in ea sensim languescere incipiat, nec satis valeat humorum impulsus resistere. Hanc ob causam eo quoque in præsentis curatione respeximus, ut primum sanguinis depleretur abundantia per venæ sectionem. Et quando ab hac ægri ad sensum & rationis usum nondum redeunt; multo cum fructu exhibere solitus sum descriptam mixturam, quam tartarus emeticus ingreditur, non eo fine, ut vomitum excitare consilium fuerit, sed ut

torpidæ & languentes partes nervosæ subtilissima sibi acrimonia vellicatæ, ad motum & sensum recipiendum stimulentur. Nam in medicamentis ammoniacibus, quæ paulo moxiori dosi emetum excitant, si refracta dosi à perito Medico usurpantur, plane singularis & incomparabilis ad difficiles & chronicas passionis expugnandas virtusprehenditur, eo quod glandulas & nervosæ partes irritando, lympham siapnam & corruptam discutiant, & humores crassos viscidos attenuant, & fluidos reddunt.

Ad præcavendam recidivam & systema nervorum corroborandum præter sollicitam corporis & extremarum potissimum partium a frigore & ventis frigida præcautionem, conservam storacis anthos & storacis melissæ turcicæ, item elao-sacharam olei macis & olei melissæ veri, interdu quoque aliquot guttulas balsami nostri vitæ in decocto succolactæ vel Coffee vel etiam spiritum oleosum salis ammoniaci pro lubrico assumenda commendavi.

OBSERVATIO XI.

Vir quidam, ecclesiastico præfectus muneris, LX. annorum, temperamenti sanguinei, habitusque fucci pleni, ad quadragesimum usque annum integra sanitate gavisus, postea vero nephriticis afflictus infestus, ab his npe Amassianis fontis liberatus est. Diinceps ad aulicum promotus officium, ad vitæ genus solito magis lautum, diutiusque vinis pervenit, vinis potissimum rubicundis utens, & valde frigidum adeptus est habnacuulum. Sex albine annis podagra cliragraque cum spandis per ætas difficultatæ & tulli siliptæ corripiebatur; quæ mala sæpius repetebant, & tandem erumpente post usurpatam antikebotica purpura, indigniter remittebant. Ante biennium mense Novembri ex improviso apoplexia leviort incitatus, sensumque & rationis usum privatus concidit; sed tula vena, adhibitoque spiritu cornu cervi succinato, tinctura arimonii acri & essentia calidior, ad valetudinem reditè ubique, cum de podagra & purpura recrudesceret. Sequenti tempore multa tolle adversa, ideoque perpetuis coniectis maceribus, magis magisque suum debilitavit corpus; quin memoriz quantum sensit inbecillitatem. Tandem accidit, ut prævio pulsationis circa aures sensu, caput subito dextrorsum convelleretur, & æger paulo post sensu, motu, ac rationis usu destitutus, insar apoplectici prostermeretur. Ad se rediens, cruoris quidpiam naibus reddidit, adhibitisque venæ sectione & frictionibus, rationis integritatem recuperavit; sed tumorem dextri oculi inflammationem retinuit, qui cum malorum reliquis tertio demum post die, revertente podagra, penitus evanuit. Quam vero pulsantis pone aures dolor constaret, metumque reversuri mali injiceret: præter cucurbitulas cum & sine scarificatione juxta aures adpositas, quatuor circiter è brachio mittebantur sanguinis uncie. Nihilominus vires mirum in modum prostrata manebant; unde meum ad avertendam recidivam implorabatur auxilium.

Epietisi cum consilio.

Primarius, quocum hic æger consisteret, morbus est apoplexia, quam doctus spasmodicam; quæ humorum stagnationis in basi cerebri suam debet originem: hanc enim vel solus pulsationis circa aures sensus significat. Neque marum

est,

Insultus
hemiplexi-
æ huius
fuerunt.

Insultus
apoplectici
hæc corporis
podagra,
purpura
vel vena-

est, ægrum tanto corripit morbo: quum enim natura temperamento pollet sanguineo, ad sanguinis iussu maiorem generationem aptissimo, & præter consuetudinem in opitarum vinofumque devenit victum; præter modum omnino succi debuerant accumulari. Quæ etiam experientia teste plurimi ex nimia ingluvie & comestationibus, in paralyticos morbos incidunt. Deinde vina rubicunda, quia ut plurimum sunt austera & adstringentia, ad affectus nervorum inque primis paralyticos gignentes multum conferunt, & ob hanc causam etiam Moravia incolis paralytici endemium morbum esse *Jordanus* prodidit. Cavere quoque bis quam maxime debent ab ejusmodi austera vini podagrica, præsertim in senili ætate constituti. Nam ex remanente hac critica excretionis gravissime oriuntur afflictiones necesse est. Accedit habitaculum frigidum, in quo salutaris transpiratio vehementer interminuit. Hoc factum est, ut sordes in sanguine suborirentur salinæ, acres, tartaræ; quæ corpus ægri ad scorbuticam constitutionem, podagram & purpura disposuerunt. Quia in rerum statu, junctis insuper mororibus, meditationibus & vita sedentaria, accrevit nervosi generis debilitas; cujus ratione & purpuræ & podagricæ materiæ vestigia ad corpora superficiem expulso immixti capite. Unde abundantes pariter ac impuri succi ad caput sue compulsi, ibidemque stagnantes, apoplethicum produxerunt insulm; qui, vocato mox Medico, missique protinus sanguine, bis feliciter superatus fuit.

2) Cum ego vocarer in auxilium; nihil prius tentandum duxi, quam donec vires fuerint reconstitutæ. Hunc in finem præscripsi potionem ana-lepticam ex aqua melisse, sturum acacia, liliorum convallium, illis, rosarum ana uncis binis, cinnamonis sine vino uncia una, matris perlarum drachma una, spiritus niri dulcis guttis triginta, syrupi acetosissimi niri drachmis buns confectam, eamque ad duas vel tria cochlearia sapus sumendum suavi. Vespere pulverem ex lapidum caucorum, pulveris Marchionis ana drachmis duabus, succini niri drachma dimidia, cinabaris præparatae gravis duodecim, castorei gravis sex composuimus, & ad drachma pondus capiendum ordinavi. Juscula medicata mane sorbilla jussi: alvumque obstructam clysteribus aperiendam curavi. Sic collectio virulorum, suavi, ut ad corrigendam sanguinis impuritatem per potu ordinario decoctum radicis chinæ & cichorii cum passulis biberet, à cena abstineret, & victu attenuante ac leniter excitante & roborante uteretur. Cæterum non possum non hoc loco referre, me hemiplexiam à nimia ingluvie & desidia in corporibus maxime mollioribus ac spongiosis pinguiusculis enatam dicta emaciantie *Hunger-Cur*, & lignorum decocto, methodo, quam optime descripsit *VALLERIOLA* in obs. l. l. obs. III. p. 23, feliciter curasse. Vitebantur carnes bubulæ, porcinae, hœdinae, lactaria, legumina omnia & fructus, somnus meridianus, sed exercitium in rheda est utilissimum.

OBSERVATIO XII.

De pro-
prio
apoplethico
afflictum.

Comes quidam illustrissimus, ætatis lxx. temperamento phlegmatico-sanguineo, ier aliquando per fluvium Danubium in navi sub ære humido, nebuloso & valde pluvioso per tres continuos dies facies, incidit ex improvise in dextrâ lateris hemiplexiam; sub qua manus

pedesque dextrâ lateris immobiles, linguaque gravis & balbotiens evadebat, & æger delirabat. Incisa protinus vena, redibat valendo, & vir illustrissimus intra viginti sex horarum spatium perfecte convalescebat. Abhinc dieta & lex rebus non naturalibus optimeungebat; humidam frigidamque temperatam, tanquam ipsi noxiam fugebat, & quotannis semel venam tunderam præbebat. Quia in statu fixo equidem sanguis vivebat; at quum per intervalia marium stuporem, cum dolore & sensu fornicationis sentiret; metuens recursum gravioris mali, meum petebat pro eo præcavendo consilium. Ego, quum nockerem, ægrum illustrum multis mentis laboribus fatigari, fluorique hæmorrhoidali obnoxium esse, iussu, ut bis quotannis circa æquinoctia venam in pede secandam curaret, motui corporis plus, lubricationibus minus indulgeret, ab imo præsertim ventris & dorso frigus humidum arceret, & pro potu fontem Seltzerium, quarta vini Rhenani parte remissum, interposito nonnunquam vini Hungarici laustu, adhiberet. Ex pharmacis tria commendaui, pulverem nempe nervinum ex matris perlarum, pulveris Marchionis, succini præparati ana drachmis binis, cinabaris scrupulo uno, ambre gryseæ gravis duodecim & olei macis cinnamonique ana guttis tribus confectum, inque decem partes divisum, quarum unam alterius diebus ex aqua frigida sumeret. Ad ventriculum roborandum exhibui Elixir viscerale septuaginta guttis in cerpulas capiendum; & vitæ balsamum nostrum, ad inungendas manus & cervicem proposui.

Epistola.

Illustrissimus de quo sermo est æger vi temperat entis, quo pollet phlegmatico-sanguineo, ad languiditatem solidorum partium motum proclivis est; & accedentibus quamplurimis mentis laboribus ac frigiditatibus, indigenam utique generis nervosi sibi contraxerat debilitatem. Hinc facillime fieri potuit, ut in diuturniori sub ære pluvioso ac nebuloso commoratione, cohibita transpiratione, huiusmodi suborirentur insultus, tempeliva venæ sectione brevi debellata. Ex tali vero pluviosa temperare paralytica chronica & pituitiosa nasci posse, confirmat variis exemplis *FORESTUS* l. X. obs. 83. sepp. ad quas expugnandas commendat alia præ coctis, victum tenuem & excitantem, & ut ægri in aère secco, & cubiculo caryophyllis suffumigato versentur. Laudat quoque clystera, primo minores, tum fortiores; pilulas de hiera simplices & compositas; nec non cochias. Ad sudorem movendum decoctum bardanæ præscribit, & damique nucham, spinamque oleo nardino, collino, philosophorum, sambuco, rutaceo, de euphorbio inungendam suadet. Spectat huc quoque insignis locus apud *GALENUM* de locis affectis cap. IV. Quidam tempore frigido & pluvioso madido pallio collum duntaxat obvolvunt, unde in manus paralytici incidit.

OBSERVATIO XIII.

Vir quinquagenarius, temperamento sanguineo-melancholico, victu duriori, & crasso, nec non loco vini ob partimoniam spiritus frumenti, floribus papaveris rheodis rincto, cerevisiæque valde teoui & lupulata, & nimio tabaco usus, atque lubricationibus, anxii curis & iracundiæ deditus, sæpenumero ictero, à crebra ira inducto, satifque

Humilis
est
sanguis
et
mors.

petinaci laboravit. Aliquando factum est, ut mane sanus surgens, & jentaculum assumens, ob frustula placenta in asperam arteriam delapsa, validissima tussis, cum vehementi pectoris concussione, vultus tumore ac rubore, & lacrymarum profusione stipata corripereetur. Sedata moruum violentia, robur sinistri lateris labefactum erat, adeo ut nec artus, nec corpus movere, nec pedibus insitui potuerit. Deposcebatur in lectum stragulis obruebatur; sed malum increfcebatur citissime, & lingua non minus, quam totum latus sinistram resolvabantur penitus. Medicus vocatus sanguinem è brachio dextro detrahendum curavit; sed sine ullo levamine; æger potius gravi supore obrutus jacebat, sub quo ex dextrum brachium vehementer agitabat, expectefactus sinistram attollere nequibat palpebram, assumpta deglutit vix valebat, alvum cum deponerebat, & urinam per biduan retentam largiter emittebat. Nec finis prætermitti debet, sub invasione hemiplexie vocatus quoddam multæ pituitosæ ac biliosæ materię supervenisse. Vivit in tam misero statu per septem dies; quibus elapsis crevit sopor & memoria abolitio, & demum, frustra usurpatis variis medicamentibus exspiravit.

Epicrisis.

Distinus ex hac morbi historia 1) quod à valde pectoris per violentam tussim & concitiorum expirationem commotio, sanguis tam cum impetu ad caput urgetur, ut minus respondente ejus per venas regressu facillime in partibus capitis internis flagnare, & serum extravasari possit. Contingit hoc eo facilius in subjectis, quæ crasso, copiosiusque sanguine, & alvo segnior pollent; & quibus debilitatum est cerebrum, genitque nervosius. Quæ omnia in præfenti locum inveniunt ægro, quippe qui diæta crassa, & spiritus frumentis, papaveræ rhæoads tinctis, usu crassius succos, per graves vago meditationes ac ærumnas nervosi generis imbecillitatem, sibimet omnino contraxisse videtur.

2) Omnium malorum causa in feri stagnatione querenda est; quod sicut circa spinalis medullæ principium hærens, hemiplexiam parit; ita corticem cerebri inundans soporolum produxit affectum. Et pessima semper in hemiplexia præfagii est, si lateris sani convulsivæ agitationes accedant, & malum cum vomitibus invadat: tum enim gravior est præsumenda partium internarum læsio.

3) Quamquam tales morbi opem elusant, tamen religiosum Medicum non decet, ab eorum curatione manus subtrahere. Cardio autem rei in eo versatur, ut sanguis per venæ sectionem imminuatur, clysteres paulo aciores injiciantur, vesicatorum nuchæ admoveantur, spiritus volatilis naribus osificatur, capiti raso epahema ex aceto rosaceo, rutaceo & spiritu vini camphorato paratum imponatur; & spinalis medulla linimentis nervinis inungatur.

4) Denique moremque, ut omnes senes, plethorici, & qui sunt debiliore cerebri, sibi sedulo caveant ab omnibus rebus, quæ pectus in motum concitare & tussim ciere valent. De paralyticis & hemiplecticis morbis legi possunt CONSULT. MED. SECT. I. casu XVI. ad XXXII.

CAPUT II.

De Affectibus soporosis, Comate, Caro, & Lethargo.

THESES PATHOLOGICÆ.

§. I.

Affines apoplecticis & paralyticis, & cum his sæpenumero conspirantes sunt morbi soporosi: quorum tam confusa, tamque intricata apud Medicorum plerisque reperitur historia, ut cui credant, dulcis omnino relinquatur lectores. Hinc quidam Medici, velut HOLLERIUS & RONDELETIUS multas de ea confusione habuerunt querelas & ne eam committerent HARTMANNUS, RIVERIUS, & PAULUS BARRETT, de morbis iis generatim potius, quam de singulis speciebus agere maluerunt. Verum, quo magis eorum causas, & his innixam curationem variare, ex infra dicendis patet: eo curatius quoque signorum diversitatem esse attendendam putavi. Et quæ hac in te schola, ac diuturna me docuit experientia; ea mihi, BARTH. de MOOR *Pathologiam cerebri nuper perlegenti*, ita videbantur comparata, ut cum iis observationibus, quas clarissimus vir *Cap. VII. de affectibus soporosis* memoriz reliquit, exacte conveniant. Sequar igitur ipsius ordinem, & quæ nomina, quæ huic vel illi somnolentie speciei imposuit, omnino retinebo.

§. II.

Per soporosis affectus intelligo præternaturalem in somnum præpensionem, ipsiusque in plurimum soporem inextinguibilem, max sine, max cum febris stipatam, ab impedito fluidi nervi in medullam cerebri oblongatam, ipsiusque sensui monientis tributæ nervi sufficienti influxu præpullulantem. Plures horum morborum recensentur species, quarum præcipuas coma vigil, somnolentum, carus & lethargus constitunt. Omnes in eo conveniunt, quod in iis præternaturale circa somnum occurrat vitium: atque ratione gradus, causarum & curationis omnino differunt, adeo ut nequaquam sit alienum, cujusvis speciei genium præliis timari.

§. III.

Coma vigil hæc se prodit notis: ægri conturbantur de capitis dolore, magis tamen sentiente, & velut expansivo, cum sensu ebullitionis intra caput stipato; maxime opere in somnum propendunt, illumque anxie anhelant: atamen vel prorsus nequeunt dormire, vel si obdormierint, mox parum levati expergiscuntur, ab omni adhuc immunes delirio. Neque enim antecesserunt hunc affectum diu protraxerunt vigilie: unde iis, qui post longas vigilias a somno sibi temperare nequeunt (de quibus vulgus dicit: *Sie sind schläffrig, und können doch vor Manigkheit nicht schlaffen*): nondum comate hoc laborare censendi sunt. Differt etiam coma hoc à pervigilio, quod familiaris est in acutis febribus: hoc enim nullam ad somnum proclivitatem habet comam, (unde vulgo dicunt: *Er kan nicht schlaffen, klagt auch nicht darüber*) quæ tamen comatosis est.

De soporosis affectibus præter naturam comam debentem & differens.

Coma vigilie.

est molestissima. Malum hoc semper est symptomatiscum; siquidem acutus, ardentibus, malignisque febribus, & inflammationi matris duræ saepe tanquam symptoma jungitur, inque his non raro phrenitidem antecedit. Idem vero symptoma hemiplexiam interdum comitari, nonnullis mihi innouit exemplis, quorum unum in CONSULT. MED. T. I. Sect. I. Cap. XX. legere licet.

§. IV.

*Historia
Comatis
soporosi*

Somnolenti comatis hæc fere sunt signa: acri languentes, a febili incendio prorsus liberi, nec fere habentes, de quo conquirentur, nisi de assidua somnolentia, contra voluntatem semper dormiant, somnoque sæpius inter edendum, cum amicis colloquendum, vel munera obsequium obdurantur prohibendo: per intervalla vigilant, sed brevi post somnolenti rursus obdormiunt. Hoc malum senes potissimum, qui laeta diæta utuntur, sanguinisque negligunt missiones, corripiit, nec parci juniori ætati, si idoneæ concurrant causæ. Est etiam idiopathicum semper; & in eo à vigili simul se distinguit comate, in quo anhelantes somnum, ejus participes fieri nequeunt; quo comate somnolento affecti, abunde fruuntur. Hujus exemplum exstat in CONSULT. MED. T. I. Sect. I. casu XV.

§. V.

*Historia
Comatis
soporosi*

Carus est sopor profundissimus, ex quo ægroti nec per clamores, nec agitationes, nec si vel eos acu pupigeris excitari possint; aut quamvis sentire ac stimulum videantur, tamen vel non loquuntur, vel mox in priorem relicantur soporem. Jacent attonitiorum instar; ac spiratio ferme naturalis, & dormientium similis est. Malum vel idiopathicum est, vel symptomatiscum, & sæpius febree ipsam: sed hoc, optime monente BARTHOLOMÆO DE MOOR. Cap. VII. pag. 198. tres exhibet species. Prima est, quæ sociatur acutis febribus, circa earum principium, vel incrementum, cui nonnunquam convulsiones superueniunt ac singultus, viæ imponentes finem. Altera est, cum ægri post tolerantia vehementiores acutas febres ex insigni infirmitate hos incidunt sopores, inque iis per aliquot dies permanent, excitati ad interrogata respondent, mox vero iterum obdormiunt, & tandem exasperati, ad se redeunt, omniumque, quæ sub eo sopore loquuti sunt, inscii convalescunt: cuius mali mentio fit in CONSULT. MED. T. I. Sect. I. Cap. XIV. Contingit etiam talis sopor per febres acutas, maxime exanthematicas circa dies criticas; tumque sudore junctus optimum exhibet præsagium. Tertia species cari occurrit in mortis ex febre proximit: per anum enim alterumve ante mortem diem ægri febriili tyrannide cum cæcis exhausti viribus, sensu motuque destituti, ac alto sopore oppressi jacent, subque eo expirant animam.

§. VI.

*Historia
Lethargii*

Qui denique ἀνὸς ἢ ἀδωκ ab oblivione dicitur, lethargus, est gravis assiduusque sopor, quo ægri perpetuo sine vigiliis fere intervallis, tantum abeunt, ut hæc tam longa sint, quam in comate somnolento, obdurantur; Excitati respondent, sed eorum instar qui ab alto & tranquillo somno præmatore suscitantur, dictorum nescii, & obliviosi in pristinum mox relabuntur soporem: quidam matulam potius, manique tenent, minigendi tamen memoriam, mox iterum obdormi-

centes amittunt, vel oscitantes os claudere obliviscuntur. Sic à comate somnolento patet differentia. Jungitur autem, & quasi symptoma lethargo supervenit febris, quæ mitior est magisque pollium semet exierit frequentia, & spiratio rara seltisique. Hinc discrepat à caro, qui sæpius est febrium vel symptoma, vel consociarium, & sentiendi quoque impotentiam habet comitem. Dissert etiam ab apoplexia, quæ subito invadit, cum omnino & sensuum & motus voluntarii abolitione, ac steriore, cuiusque necar, quam lethargus; quippe qui ultra septimum non raro productus diem.

§. VII.

His morborum sopororum historis præmissis, addemus sectiones anatomicas, iis denotatum, atque tunc causarum per mutationem fidebimus. Pleraque nobis suppeditat solentissimus BONETUS, qui in anatomia practica, quæ *febrilem anatomicum* vocat, Libr. I. per tertiam etiam integram sectionem, soporosis affectibus extensorum anatomias exhibet. Ampla nimis foret recensio omnium, quæ adducit, exemplorum; sufficit, summa illorum allegasse capita. Sic invenit in plerisque serum copiosum per cerebri substantiam diffusum, ita tamen, ut pars ejus potissimum exterior, seu corticalis cum meningibus, aquis fieret inundata: & simul adnotat, quod in quibusdam interiora, ac penetralia cerebri salvo cortice, extravasato sro repleta videntur, ea vero subiecta per totam vitam soporoso nequitiam laboraverint affectu. Hoc diluvium cerebri, tum magis ad medullam cerebri penetravit, eo majorem soporis gradum per vitam fuisse animadvertit. Deinceps invenit quoque in sopore perennis abscessus, scirrhos & tumores in cerebro: sed hi quoque non aliam quam anteriorem & corticalem ejus regionem obduerunt. Et denique in nonnullis, cerebrum existente siccò, & a serosa collavie libero, deprehendit vasa pie potissimum meningis crasso crasso admodum suta densata, & vasa varicosa: cumprimis in lethargicis membrum cerebri inflammatas videri Joannes Faber Lynceus; teste HERNANDEZ L. IV. cap. 18.

§. VIII.

Indolem nostrorum affectuum illustrandi causa, addemus adhuc quoddam observationes huc spectantes. WEPFERUS & PEYERUS canbat, per plus minus graviores cerebri à cranio denudati compressionem, arte soporem conciliare docuerunt: & perquam notabile est exemplum cuiusdam mendici Parisiensis, cui casu quodam magna cranii pars deperdita & cerebrum denudatum fuit. Hic ex leviori cerebri compressione oculorum obtenebrationem, ex paulo fortiori, aurium tinnitum, ex adhuc graviore vertiginem & soporem passus; & cessante pressione, ab iis iterum liberatus fuit symptomatibus. Comf. BORETHII *diff. de epilepsia ex depresso cranio*. Cui quidem observationi majorem affundit lucem, cranii per trepanum à Chirurgis fieri solita terebratio; qua, in subiectis ex sanguinis inter cranium & cerebrum facta extravasatione, & hinc pendente cerebri pressione soporosis, educto ope trepani stagnante humore, rotinus sensus redire, omnemque soporem discuti per sile dignas compertum habemus observationes. Ex quibus certo concludimus, quod materialis causa affectuum sopororum intra corticalem cerebri substantiam primario & originaliter contineatur.

§. IX.

§. IX.

Causa proxima & mediana affectionis soporosis.

Jam ex physiologia (vid. SYSTEM. MED. T. I. L. I. Sed. III. cap. 6. §. 3. seqq.) repetimus, somnum naturalem ab influxu fluidi nervi in nervos sensibus, motibusque voluntariis tributos immunitati, ac languidiori pendere: hunc vero languidiorum influxum partim ipsorum nervorum relaxationi, partim fluidi nervi penurie, partim tardiori sanguinis per vasa cerebri & membranarum circulo deberi. His cum iis, quæ præcedentibus paragraphis dicta sunt, collatis, sequitur, causam proximam affectionis soporosis esse valde languidum ac immunitum fluidi nervi ex cortice cerebri in hujus medullam & inde in nervos sensus motique dictos influxum. Causæ hunc influxum præter naturam impediennes tres possimum esse videntur; nimirum vel nimia fluidi ipsius penuria, vel tubulorum illud vehemens laxitas, vel denique compressio cerebri corticalis, etque seu per sanguinem tardius per cerebrum & ejus involucria progrediens, aut plane stagnantem, seu aliam peregrinam, dicto cortici incumbentem materiam facta: unde medulla undique cortici adnexa comprimitur simul, & ideo non satis fluidi recipere potest.

§. X.

Coma cognita & febribus analogia.

Quum vero plures affectionum soporosis finit species; singulam periclitamur curantur. Vigil coma medius quasi inter pervigilium, & affectus soporosis morbus, ubi somni desiderium inexplabile urget, licet ipse capi nequeat, est symptoma vel hemiplexia, vel sebrum acutarum, maxime cum dura meningi inflammatione junctum, & sæpius antecedit phrenitidem. Causam ipsius mixtam esse debere, quæ in uno cerebri loco fluidi nervi influxus languidior, in altero auctior sit, quilibet pervidebit facile. Consideremus ergo, num talis causa in dictis morbis locum habeat. Quod febres acutas attinet, sic concludimus: si in iis coma vigil uplusimum antecedit phrenitidem, quæ juxta MED. SYSTEM. Tom. IV. P. I. Sed. II. C. 5. §. 1. seqq. ab inflammatione membranarum cerebri suboritur, & nostra in regionibus symptomaticæ ut plurimum febribus malignis exanthematicis supervenire solet; si etiam cum dolore ardente ac ebulliente complicatum est: vero videtur simillimum coma vigil in iis febribus pro causa mediata agnoscere, membranarum cerebrum involventium incipientem in uno loco inflammationem. Quum vero inflammatio supponit sanguinis auctiorem ad locum quandam congestionem, & plane stagnationem: necesse est, ut inde cerebri corticalis pars quædam comprimitur, & hinc introitus fluidi in medullam immittatur, cum insequente soporositatis effectus. Hoc dum in uno cerebri sit loco, in altero tamen à sanguine per sebrilem motum celerius agitato, jugis fluidi nervi petennas secretio; quæ, quo est copiosior, eo magis vigilas inducit, nec præsentem ad somnum proclivitatem in actum deduci sinit. Quicquid igitur in febribus acutis sanguinis orgasmum adaugere, ejusque copiosorem ad caput progressum adjuvare valet: illud remote ad coma vigil inducendum contribuit; veluti sunt remedia spirituosâ, calidiora, alexipharmaca, regimen jussu calidius, refrigeratio extremorum in variis.

§. XI.

Qua coma vigil ratione jungi queat hemiplexia, explicatu facillimum est. Si enim perpendimus, in eo affectu nervorum principium in uno latere tantum comprimi, & sic influxum fluidi mobilissimi in unum duntaxat latum impedi, altero immuni; mox quoque intelligemus, quod in uno loco & latere pervigili, in altero soporositatis, ex quibus componitur vigil coma, latere possit causa: eo quod succus nervosus denegata in uno latere secretionem ad alterum eo copiosior feratur; quod inter alia integri lateris convulsivæ testantur agitationes. Verum cur non omnes hemiplectici sunt comatosi? Legas, quæ §. VII. ex BONETO allegavimus, & invenies, solam principii nervorum compressionem non secum semper habere soporem, nisi simul corticalis cerebri substantia fuerit vitata.

Coma cognita & febribus analogia.

§. XII.

Coma soporositatis, frequentior protectio quam lethargus, & à febre semper vacua affectio, talem habere debet causam, quæ transitus fluidi nervi ex cortice in medullam non in uno loco, sed per totum impedi potest cerebrum. 1) Talis est nimia relaxatio canalium sanguinem per cerebrum vehentium, ob quam nec sanguis vegete progredi, nec satis fluidi fecerni potest: sicut sere sit in senibus plethorici. 2) Sanguinis præsertim spissius ac impuri difficilior per caput circulatio, & inde pendens cerebri compressio. Hinc plethorici sunt soporosi; hinc scorbutici, & hypochoiastici hunc frequenter incurant soporem, etque magis, cum per imi venter spissos humores eo copiosius compellantur ad caput. Et inde quoque petenda est comatis soporositatis ratio, quod, teste RIVERO, pueris lumbricis vexatis nonnunquam evenit; siquidem hoc in casu per abdominis spasmos vitales succi coeuntur ad superiora. Hinc valde plethorici, accedente causa sanguinem nimium commovente & expandente, ut ebrietate, profundo immergi solent sopori, etque plane necari. 3) Sero nimia per cerebrum ejusque membranas collectio ac plane extravasatio: unde aurium manationum, coryza, ulcerum improvidæ suppressiones & exsiccationes, ad id morbi genus contribuant; nec rarum est, ichthuriam seu plenariam urinae suppressionem presso pede coma sequi soporositatem, quod, restituito urinae fluxu, protinus cessat.

Coma soporositatis analogia.

§. XIII.

Cari prima species, quæ in principio, aut vi-
gore febrium acutarum maxime fynocharum nonnunquam, nec nisi in valde plethorici, occurrat, pendet à nimia sanguinis abundantia & ebullitione, quæ cerebri & ejus membranarum vasa adeo expanduntur, ut compriment mollem cerebri substantiam, & nervosi succi introitus in medullam per totum impediatur caput: unde succus ille per cerebellum in partes, functionibus vitalibus præfectas eo copiosior impellitur, cordisque systolem efficit vehementiorem. Hinc cognitu facillimum est, cuncta exstantia, ac commoventia remedia in iis febribus adhibita, nec non intermissam venæ sectionem; remotius vero narcoticorum, ad conciliandum somnum, inepet exhibiturum abusum proximum ad curam in febribus producendum, nullum conferre.

Cari, quæ febribus acutis analogia.

§. XIV.

§. XIV.

*Cari est
que sicut
de car-
nis specie
analog.*

Ad cari alteram, quæ post superatas sere acutissimas febres sequitur, speciem plures contribuant causas. Non enim ignorari oportet, per febrile incendium tam fluidas, quam solidas partes mirum in modum alterari: solidæ scilicet à naturali vigore & toni deiciuntur, fluidæ vi continui attritus resolvuntur, & transiunt in crasin œconomice vitali non iurum amicam. Namque humidior ac generosior succorum vitalium pars, non accedente novo nutrimento, dissipatur, perque varia loca è corpore proscribitur: & hinc resultat fluidi nervi penuria, lymphæ serique vappida, & quasi gelatinosa consistencia, ipsiusque sanguinis coagulum. Concurrentibus igitur 1) valorum debilitate, 2) nervi succi penuria, 3) cerebri compressione à sanguine difficilis per illud progrediente facta non fieri potest, quin sopor præternaturalis, cum sensuum imminutione laboriatur. Quod eo fit facilius, si per febrem potentiora pharmaca, solidas partes debilitantia, vel plane narcotica fuerint adhibita. Et si hæc fluidorum solidorumque vitia nimis invaluerint, uti sere in tertia cari tunc specie; subsistunt tandem coagulati inertesque succi in debilitatis vasa, extravaillantur, & sic vix evitabilem accerunt mortem.

§. XV.

*Lethargi
analog.*

Lethargi denique sunt eadem causæ, quas comati somnolento tribuimus, nisi quod in eo graviores sint, ac profundius corticalem cerebri substantiam penetraverint, adeo ut non sopor taneum inducantur, sed sensus quoque externi & interni elanguescant. Cardio rei in eo venit, quod in comate perinde ac caro nulla adhuc existat sanguis vel feri extravasatio, sed hæc deum tantum effluat producantur, & in apertis post mortem cranii conspiciantur. Præsto potius in his soporosis affectuum speciebus est circulus sanguinis per vasa meningum, & cerebri corticalis valde debilitata difficilis, ejusdemque plus minus serosi stagnatio: at lethargus pro causa agnoscit vel feri tenuioris per arteriarum poros factam secessionem, vel plane extravasationem.

§. XVI.

*Differen-
tia sopor-
is ab
aliis mor-
bis.*

Distinguitur vero lethargus à caro, dum lethargici excitati respondent, carocici vero minus. Est quoque discrimen inter apoplexiam & soporem; nam in illa respiratio est difficilis ac delinquit in paralyfin, quod non fit in caro. Differt quoque à syncope, in qua pulsus parvus vel admodum obscurus & languidus ac facies cadaverosa; carocici pulsus magnus & validus est, & color faciei potius floridus apparet. Neque minus differt à suffocatione uterina, quod præfocatae sive omni respiratione sunt, & postea intelligunt & recordantur; in caro autem in paroxysmo non intelligunt, nec recordantur; oculos semper clausos habent, & si aperiunt statim claudunt.

§. XVII.

*Contra re-
mittentis
quæ sicut
soporosis
analog.*

Quemadmodum ex dictis specialia & proxima affectuum soporosis causæ clarissime perspicuntur: ita generatim sciendum est, quod ipsi producendi aptissima sint omnia, quæ ad difficiliorem humorum per vasa cerebri & meningum circulationem, eorumque stagnationem

conferunt, & vim vasorum membranarumque elasticam labefaciunt. Quo nomine remotissimis causis accendi merentur corpora cacochymica, cachectica, scorbutica, viribus defraudata, à nimio moreore, tristitia, vel diuturno morbo & enormi sanguinis profusione debilitata: abusus potuum inebriantium, spiritus vini, cerevisiæ valde spiruosæ & lupulatae, frequens crapula, habitatio in conclavi humidio, ubi densus vappidusque aer est, nec non aeris humida ac nebulosa, Zephyri flatu prægnans constitutio, hiemalis tempestas, & Tabaci abusus.

§. XVIII.

Præterea quam sepiissime in praxi licet observare, in subjectis sanguineis, sanguineo-phlegmaticis, obesi habitus, sanguineque plenis ab hæmorrhoidum, mensium, & cuspis quoque hæmorrhagiæ solennis ac critica suppressione, coma somnolentum, vel etiam lethargum excitari. Nec rarum est, eosdem affectus à sudoribus, præsertim maturiorum, atque cricorum colibitione, nec non serosorum excretionum suppressione, œdematosorum pedum repentina gracilitate subito generari: quid? quod in iis, qui cerebri sunt imbecillioris, à nimia potus vinosi in corpus refrigerantur ingurgitatione, vel à corporis vino furi & calentis refrigeratione, repente sopor altus cum omnis sensuum stupore producat, brevi tamen tempore absque periculo transiit. Non minus comati & lethargici affectus introduci deprehenduntur ab arthriticis, podagricis doloris quantantem semel bisse antea redeuntis cessatione: & observavi lethargum in asthmate convulsivo, revocato ad articulos dolore, una cum asthmate fuisse debellatum. Huc denique spectat nimis ac intemperivus vaporosorum usus: unde ab abstinentia & opiatia læge datis, papaveracis, fumo sulphuris, vapore carbonum ardentium, intra archus spatium incluso, in subjectis imbecillibus, graves & plus minus periculosos produci sopores non raro animadvertimus. Nimis quoque suaveolentium usus nocet. STRABO *L. XVI.* narrat, Sabæus populus incidere in hunc morbum ex odore & fragrantia fructuum & florum in hisce regionibus producentium. Novi exempla, ex continuo suaveolentium usu amarem odoratum ex toto perditum fuisse, eo quod membranis cerebri & nervis narium atomam inferre videntur. Ad soporosis affectuum causas pertinent etiam violentiæ capiti illatae, sic GALENUS *L. de instr. odor. Cap. VI.* numerat inter eas cerebri compressionem factam à chirurgo, qui perforavit cranium, & membranam cerebri ambientem; & ego, inquit MERCURIUS *L. de præle. Batav. p. 22.* quandoque vidi ex importuna perforatione cranii à Chirurgo vulneratum quendam statim factum esse caroticum.

§. XIX.

Soporosis affectuum prognosis non adeo læta, sed pro causarum gravitate plus minus infusa est. Et vigil quidem coma pæsepe phrenidem ac convulsiones funestas prænunciat, inque malignis febribus non raro in emortualem transit soporem. Sive etiam somnus profundus, testante HIPPOCRATE in *Coac.* interdum in febribus significat firmam crisin & non est malum. Quando dolores caro conjuncti sunt, teste eodem Hippocrate l. c. convulsionem significant. Quo seniores sunt corpora, & quo magis debilia,

*Soporosis
est
morbus
per
gravi.*

debilia, impurique succis pręgnantia, eo majus portendit periculum coma, facileque, mox nente præsertim MARCATO L. I. C. 12. in mortiferum terminatur lethargum. Carus quoque gravior juncta est febris, & quo peiores ejus notę, urinęque crudiores, eo periculosior: attamen prima secundęque species non raro debellatur, tertia nunquam non lethalem exhibet eventum. Lethargus nuquam periculo caret; is tamen perfidius est, quem artuum tremor, & gelidus faciei sudor comitantur.

CURATIO.

§. I.

Indicatio-
ari curatio-
ria.

Morbos soporosos curaturo, tres generatim incumbunt medendi intentiones, quarum prior est, ut ægrum in sopore excitare amittat; altera, ut sanguinis & humorum difficultem per caput circuitum, stagnationem, vel extravasationem removeat; & tertia, utrobique membranarum vasorumque cerebri deperditum restitua-
re labores.

§. II.

Prima in-
di-
catio

Soporem discutiendi, ægrorumque excitandi vim ea possident remedia, quę principio subtili ac penetrante in nervosas partes, eas agitando, vellicando, tremulumque & oscillatorium per universum nervorum systema motum inducendo agunt. Huc spectant 1.) potentiora acida, & ex his palmam præ reliquis obtinet spiritus crystallorum veneris, qui nihil est nisi spiritus acetici concentratissimus, cum essentia castorei mixtus, narisque admodum, penetratissima agilitate cuncta superat. 2.) salia volatilia, velut est, spiritus salis ammoniaci urinofus cum calce viva paratus, qui vertici admodum, vel quod consultius est, naribus indius sternutamentum movet, ac torporem soporemque discutit egregie. 3.) graveolentia, ut galbanum, pennę perdicum &c. acensia, ut odor gravis nares feriat. 4.) Aqua frigida repente toti capiti infusa, quę membranas cerebri simul roborando presentem tonum excitat. 5.) cataplasinata ex aceto forti, ruta, foliis lauri, summitatibus fureje, semine sinapi, castoreo & camphora parata, raloque capiti, fronti ac temporibus adnota.

§. III.

Quę se-
cunda in-
di-
catio

Eorum vim secutant, & simul serosam, si peccaverit, è capite colluvium derivant 1.) sternutatoria, quę inter primas meretur sal vitrioli albi, si ejus grana decem in dimidia aque majorane uncia succini soluta, & naribus attracta. 2.) vesicatoria è cantharidibus paullo latiora, & pedibus, nec non cervici imponenda; quippe quę & solidis nervosis partibus irritationem inducunt, & serosos humores revellunt. 3.) cucurbitule vel cum, vel sine scarificatione tuchæ applicatę. 4.) frictiones valide parium infernarum. 5.) clysteres acrioris. 6.) Nec satis laudari possunt enemata paullo acriora, venę infusa; quibus sal gemmę vel commune, vel etiam squille radix stimuli loco commodissime additur.

§. IV.

Altera in-
di-
catio

Excitato horum ope a sopore ægro, restat, ut restituatur æqualis humorum per totum corpus circuitus; & subinde corroborentur debilitatę partes. Favet priori scopo sanguinis missio, in ipso
Frid. Hoffmanni Oper. Tom. III.

sepius sopore, si nurgent cruore vasa, insituentia, multoque magis, discussio somno, ad ejus præservationem admittenda. Tum quoque, si primę regiones fordibus onustę, vel lymphis sint oblectę, blando laxante alvum moliri oportet. Stagnationes humorum discutiendi, simulque partes infirmas corroborandi virtute gaudent nervina, nupta diaphoreticis: ex quibus magnam merentur commendationem essentia ligni aloes, succini, cum spiritu liliorum convallium, salis ammoniaci, & antimoni tinctura acri remissa; vel sal cornu cervi, cum sale succini, cinnabari antimoni, vel bezoardico minerali in pulveris formam redactum.

§. V.

Denique recurrentes soporem insultus præcave-
re licebit partim vicibus recta servata ratione, partim casualium eo inducentium remotione. Et quum sanguinearum excretionum, vel motuum arthritico-podagricorum, hæcenus consuetorum supplicio, ad id mali generandum, plurimum contribuat: haud ludeat operam, qui revocandis istis & fluxionibus & doloribus operam navabit, eorumque legitimam conservabit successum. In victu vitanda otium, ebrietas, cibi coctus difficiles & spirituosus: corpus moveatur sedulo: repletio omnis est vitanda; quemadmodum jejunare aut parce nutrire optimum est; a piscibus, lacte, casio prorsus abstinentiam, & inter fructus humidi omnes fugiendi; carnibus magis assis, quam edis vitandum; panis à solo, quod intermixtum esse solet, probe purgari debet: senes ac debiles generoso vino, tanquam eorum lacte utantur; somnum non diu nimis protrahant; ab animi allectibus caveant; amicorum confortiis intersint frequenter; commodis peregrinationibus delectentur; alvum, perinde ac cutaneam carent excretionem; nec sanguinis adfuetas missiones statis repetere obliviscantur temporibus.

CURA SPECIALIS ET CAUTELE PRÆCTICÆ.

§. I.

Quemadmodum causę affectuum soporosis-
rum, eorumque species valde sunt diversę: ita etiam illis medendi ratio non una est eademque. Quare quid auxilii per singulas species superfit, videbimus. Coma quidem vigil, uti plerumque in malignis febribus à nimia sanguinis mole, & imminente membranarum cerebri inflammatione subornat: ita exposcit ea omnino remedia, quę nec ipsi febrī sint præjudicio. Et hoc sine tenę sectio, si febris haud ultra tertium quartumque duraverit diem, larga debet institui: ut confirmant GABELCHOVERUS Lib. I. §. 8. & FORESTUS L. X. c. 34. Missio sanguine alvus, si sit obstructa, clysteribus, minus tamen acrioribus liquanda: tanquam exhibenda remedia, quę diluendo temperandoque humores, æstus illorum coercent. Quo quidem nomine præter pulvillos absorbentes, leniter nitrosos, cum antimonio diaphoretico & aquis diaphoreticis ac analepticis in potumculum reductos, nec non emulsiones leniter papaveraceas, magni usus in malignis sunt aciculata. Et placet bene mihi iulepus, quem ex rosb ribum tribus uncis, in aqua fontana libris duabus solvis, & cum spiritu vitrioli ad gratam aciditatem permixtis conficiendum

Proferri-
tis morbo-
rum sopo-
rosorum.

Coma-
soporis
causis
curatio.

dum docet LOTICHIUS. Spiritus niri dulcis ob temperantem pariter ac blandam anodynam vim, usus est egregius. Nec sua laude caret externa, velut cataplasmata cum aceto parata, unguentum alabastrinum, temporibus admotum, animalia viva dissecta, & imposita capiti: non neglecto quieto blandoque regimine.

§. II.

Cura comatosis vigilis in hemiplegia.

Vigil, quod hemiplegicis familiare, coma, ut diuturnius, ita curatu est difficilior. Parum præstabat, qui solum symptoma, neglecto principali morbo adgreditur: nihil superest, nisi ut hemiplexia ea, quam præcedente capite notavimus, ratione medeamur; tum enim sponte sequetur somnus naturalis.

§. III.

Cari carnis.

Carus, ejusque prima species, largam, si nondum elapsa fuerit commoda occasio, venæ sectio- nem exposcit: cui jungenda dormientis excitatio per clysteres squilla acutas, vesicatoria; aceti destillati in nares immisionem; tumque intrinsecus per temperantia, diaphoretica fixa, & acida humorum organikus componendos. Altera cari species, quum sepe sit critica, nihil sere opis medicæ exigit; sed sibi relicta, famitatem secum fert. Tertia, eaque periculosissima, vix admittit medelam: atamen tentare juvabit, an æger vesicatoriis quest excitari, tumque diluendis & analepticis dimicandum.

§. IV.

Cura comatosis somnolentis a frigore.

Coma somnolentum relictissime dividitur in serosum & sanguineum. Illud serolis excretiones vel naturales revocari, vel his artificiales substitui jubet. Urinæ suppressio accommodatis prædiis referenda; podagrici motus pedum frictione, vesicatoria, laxantibus, balneisque tepidis invitandi. Juvant hoc loco sternutatoria, educendo per nares serum, nervisque motum inferendo. Ubi pinna viscida obfudet ventriculum, operæ facit pretium vomitus arte concitatus: quo sine pulvis squillæ ad scrupulum dinodum vel unum, aut bina tartari emetici grana laxanti potiuncula, ut diluantur, intermixta, summo cum fructu poterunt exhiberi.

§. V.

Cura comatosis somnolentis a frigore calidi.

Contra vero coma somnolentum, quod à causa calida, i. e. sanguinis per caput difficultiori transitu, vel stagnatione originem trahit, uti sere fit in hypochondriacis ac scorbuticis, majorem requirit circumspectionem. Quæcunque enim calidiora ac spirituosiora sunt remedia, cane pejus ac angue fugiantur: hi que substituantur clysteres, venæ sectio, blanda laxantia, pulveres temperantes, simul nervini, & id genus alia. Et hæc quidem omnia circa lethargum quoque sunt observanda; nisi quod efficaciora sæpius requirant excitantia.

§. VI.

Cura affectuum soporosis extravasatione.

Quicumque soporosi affectus à sanguinis vel feri extravasatione intra meningis ac calvariam per externam violentiam injecta pendet: non prius sanari poterunt, quam humoris extravasati per trepanationem eliminatio. Artamen & huic operationi, si abundet sanguinis moles, præmittenda venæ sectio.

§. VII.

Sanguinis missionem in soporosis morbis per-
opportuna esse, facies rubens, oculi crasso-
turgidi, venæ tumentes, pulsusque arteriarum
magni indicant. Quæ administrata, si floridior
vultus color, pulsusque magnitudo continetur,
spes est convalescentiæ; sed simul opus erit ad-
huc semel secare venam; eo quod non suffi-
cienter facta venæ sectio plus minetur detrimen-
ti. Quo spiliore præsumitur sanguis, eo amplior
venis infligenda incisio, ut nimium ei solutio
pateat exitus.

§. VIII.

Post detractum crurum, alvus ducenda vel
laxante inus dato, vel enemate: neque enim,
nisi præmiis hujus evacuationibus, alia remedio-
rum genera, ut roborantia, diaphoretica, sternu-
tatoria &c. adhibere licet; quoniam major motus
& impetus humorum ad caput per ea concitatur.

§. IX.

In soporoso omni morbo sedulo cavendum à
balneis calidis, vaporosis, & quæ fragranti, oli-
doque vapore ad somnum contribuent. Multo
magis absurdum est, narcotica, sulphurea, opia-
ta, crocata, papaveracea in usum vocare; quor-
um etiam pertinent thesacalia, quæ Veteres his
in affectibus prescribere solent, quia his oleum
camino additur.

§. X.

Externa volatilia, naribus attrahi solita, non
nisi in soporosis à causa frigida, serolis subor-
tibus adhibere licet. Hinc ab his abstinendum in
omni sopore, febrem acutam comitante, vel quæ
à materia erysipelacea, purpuracea, exanthema-
tica &c. ad cerebrum devoluta proficiunt: ubi
potius acida fixa, simul tamen penetrantia, cum
fructu intersunt. Cujus generis sunt oxymetho-
disum, cujus usum AVICENNA & RHASIS
jam laudant: qui etiam majorana & ruta pos-
sunt addi.

§. XI.

Quamvis theriarum, multoque magis acida-
larum, potatio in morbis capitis idiopathicis, non
omnino sit suadenda: attamen in soporosis, qui
hypochondriacis ex suppressio hæmorrhoidum
fluxu, vel retroacta podagra cruciant, mirabilem
theriarum, quæ in Carolinis juxta molendum
securantur, & ab hoc dicuntur, virtutem, in re-
vocandis podagricis insulibus ipsique hæmor-
rhoidibus, & sugando hinc sopore prehendi,
cujus exemplum in CONSULT. MED. Tom.
I. Sect. I. casu XV. allegavi.

§. XII.

Cavendum maxime, ne ab initio hujus morbi
ad excitandum à somno sternutatorius utamur,
præsertim in plethoricis: eo quod ex intempesti-
vo hujusmodi remedio, major affluxus ad caput
fit, ut inde metus apoplexiæ imminet.

ENARRATIONES MORBORUM.

OBSERVATIO I.

Vir quinquagenarius, scarificationibus ad-
fectus, ex diuturno moreore & vigiliis contra-
xit sibi dolorem capitis gravatimum, vertigine, plicose.

ventriculique imbecillitate stipantur; cujus abigendi causa vinum abstinentes mane pariter ac sub coena per aliquod tempus liberalius fumsit. Interim accidit, ut verno tempore, quo febres tertianæ grassabantur, postquam gravi exarserat ira, in libero aëre, caelo existente pluvioso iter faceret, domumque redox in duplicem incidere tertianam. Hujus accessiones cum profundo incipiebant sopore, ad duodecim saepius horas durante; quo discussio calor satis iniis exipiebat, & hunc denum sudor sequebatur. Quam scenam paroxysmi leptici ludebant, & omnes, quæ ad somnum propellendum adhibita erant, medicinas volatiles, purgantes & excitantes spernebant; adeo, ut majora potius sumerent incrementa. Vocatus ego tribus ante paroxysmum horis lenè dedi emeticum, quod aqua mentha nanciam unam, tartari emetici grana duo, syrupi cinnamomi drachmam unam habebat: quo summo, miram colluviem puviae lentæ ac viscidæ, nec non bilis valde crassæ, oleaginose, &c. ut dicunt, viellens evomuit. Sequens paroxysmus longe fuit minor, & quod notabile, sopore casuit. Hinc idem remedium, interjectis aliquot diebus repetitum, una cum aliis antiseptilibus & febrim & soporem proflus fugavit.

Epieris.

Si soporis, qui febrem nostram comitatus est, nomen indagemus; illud ad eam titulum referendum esse, quis facile judicabit, qui soporose affectuum supra positas historias legerit. Carus autem hic non nisi symptomaticus est, & una cum ipsa febre saburram biliosam & pituitosam, primis in regionibus stabantem pro causa agnoscit. Quum enim in febribus intermittentibus, maximeque tertiana, omnes circa primas vias sine nervosæ ac membranacæ partes ipsaflice constringuntur: non possit fieri, quin succi vitales copiosius ad caput compellantur. Quod quia a prægressu morore, vigiliis, & vini abstinentiæ usu in præteriti agro nimis debilitatum videtur; flagnantes in corice cerebri humores facile potuerunt soporem conditare, qui, ressuente sub paroxysmo caloris à capite per totum corpus sanguine, sponte cessavit. Proflus igitur curaturo hunc affectum incurbit, ut ipsam primarum viarum causam, quæ est saburra biliosa viscidæ, removeret; quod ope vomitorii brevissima fieri potuit via.

OBSERVATIO II.

Vir temperamenti sanguinei, habitus spongiosus, in locis degens paladosus, & crasso crudoque utriusque victu, febre tandem intermittente corripiebatur: qua cessante, totum corpus admodum languiebat, crura magno dolore, tantæque lassitudinis afficiebantur, ut vix incedere potuerit, urinae abique fuit & molestia rufescebant, & arteriarum pulsus erant debiles. Brevis vero post in præternaturalem incidere somnolentiam, qua interdum per totam fere diem alto sopore obrutus jacebat, dein vero per aliquod tempus iterum vigilabat. Opposita huic malo remedia fuerunt succus nasturtii aquatici, cum jusculis crebro sumus, spiritus cochlearis cum spiritu salis ammoniaci mixtus; & per intervalla aqua visæ emetica, quæ fursum & deorsum copiosam eduxit saburram. Præterea à vino abstinuit, & pro potu ordinario decocto saturejæ, majoranæ & chamædrys cum

Fríd. Hoffmanni Oper. Tom. III.

passulis confecto usus fuit: indeque fugata somnolentia, pristinam recuperavit valetudinem.

Epieris.

Præfens affectus omni jure nomen comatis somnolenti scorbutici tætur; quod nimirum ab humoribus viscidis, lentescensibus, & impuris, per minutissima cerebri vascula difficulter progredientibus, ibidemque stagnantibus suos mutatur natales. Eadem scorbuticæ tæturum diathesi reliqua, quæ soporem antecefferunt, debentur symptomata, nimirum febris intermitens, urinae rufescentes abique fuit & calore color, corporis lassitudo, curus dolor, pulsusque debilitas. Quemadmodum vero hanc humorum impuritatem dixit crassa, cruda, & habitatio in utris palustribusque locis generavit: ita eandem magis adauxit febris intermittens, cujus calore tulplauræ & spirituosæ sanguinis portio dissipatur, & lentè vapescensque remanent succi. Hinc non sine egregio fructu oblata fuerunt ea remedia, quæ sanguini blandam reddunt spiritusascensiam, viscidos humores incidunt, & languidas partes ad motum resuscitant. Et hac quidem laude superbiunt antiscorbutica usæ recepta, ut sunt trifolium fibrinum, nasturtium, cochlearia, beccabunga &c. Neque tali in casu alienum est, blandum exhibere emeticum; quippe quo & saburrae primæ regionibus evacuetur; & nervosæ partes in motum eriguntur. Externis enim remediis in omnibus, quæ à scorbutica sanguinis diathesi proficiuntur, affectionibus parum proficiunt.

OBSERVATIO III.

Vir robustus LX. annorum, victus crasso adfuetus, alvi adstrictioris, per longum tempus morori indulgens, singulis ferme mensibus erysipelaceum in cruce sinistro tumorem poti solitus fuit. Tandem hyeme existente sicca idem exanthema, sed paulo languidius erupit, & perpetuo dormiendi junculum est desiderio: clausi semper erant oculi, pulsus magnus, facies rubicunda, & tertio post die pes niger tumidusque adparebat, adeo ut ipsæculi periculum immineret. Consulens ergo Medicus assecto pedi adpocuit epithema, ex floribus sambuci, myrrha, bolo rubro, cerussa, camphora, aceto atque vino confectum, cujus adplicationem cum profundior exciperet somnus, ad hunc discutendum præscripsit sal volatile cornu cervi. Verum auctus inde potius est sopor, facie tumida, rubicundaque existente; & quum artuum jactationes accederent, alter Medicus exinde mortem prænuñciavit, quæ paulo post est insequuta.

Epieris.

1) HIPPOCRATES, solertissimus naturæ observator, rectissime scribit, quod lentes, qui sæpius erysipelate tentantur, eo tandem moriantur. Erysipelas enim rarissime fuit sine febrili commotione, & quo magis plethorica vel ecocochymica invadit corpora, velut sunt senilis, eo gravioribus, quin sæpe funestis asipatum est symptomatibus. Ex his periculosum valde est coma somnolentum quod sanguinis majori ad caput propter insultum febrilem rapiti debetur; & eo majorem incutit metum, si materia erysipelacea vel ob imbecillitatem naturæ, vel per male factas artes retro-pulsa fuerit.

T 2

2) Er-

Causa somnolentiam febrem comitans.

Causa somnolentiam febrem comitans.

a) Erravit itaque Medicus, quod in praesenti affectu, qui nequam ab humore frigido, teneo, sed sanguinis ebullitione & raptu ad caput, testibus pulsu magno, vulnere robore, orium traxit, calidioribus medicinis, ut est sal volatile, pugnavit. Hinc enim factum est, ut sanguis magis commotus, & sopor profundior fuerit redditus. Consultus fuisset, cucurbitula cum scarificatione cervici appositis molem sanguinis imminuisse, & deinceps ad temperandum aestum, materiamque peccantem per transpirationem successive excutiendam, nitro cum paucillo camphorae & pulveribus bezoardicis exhibuisse, & externe cataplasma ex aceto rosaceo, camphora, siliis rosarum & oleo ligni rhodii capiti & temporibus applicuisse.

OBSERVATIO IV.

*Erthraea
post veni-
mentum
tremens.*

Vir LXVI. annorum, macilento corpore, va-
sque sanguine turgidis praeditus & venam bii
quotannis tundendam praebere solitus, huic per
novissimum annum superedit. Aliquando for-
tiori percussus terrore, de extremorum frigore,
anxia praecordiorum compressioe, spirandi-
difficultate conqueri coepit, facie existente tumi-
da & rubicunda. Paulo post capitis gravitatis
dolor, vertigo, & mira ad somnum propensio
cum oblivione accedebat: quae debellaturus sym-
ptomata, iter suscipiebat; sed exinde tam profun-
dum sibi contrahebat soporem, ut eo per quatuor
dies sepultus, nec oculos aperire, nec pedibus in-
sistere posuerit. Excitatus tandem, ingentem vi-
rium prostrationem, artuum languorem, & per-
petuam dormiendi proclivitatem pervertebat;
rite quidem respirabat, at pulsum depressum, al-
vum adstrictam, urinae fluxum pauciorum, adpe-
tibus prostrationem, & memoriae omniumque sen-
suum languorem patiebatur. Quo in rerum statu
ego consiliis mox largum sanguinis quantitatem
ex pede detrahendam, & clysterem ex anispa-
modicis ac nervinis paratum, multoque sale acua-
tum crebro iniciendum curavi: circa somni tem-
pus usum pediluviorum commendavi; naribus
applicandum praebui sal volatile salis ammoniaci,
oleo rutae majoranaeque nuptum; insusum ex her-
ba majoranae, fanaeae, floribus anthos, radice
farfaparillae loco Theae potari, & cum eo sal vo-
latile oleosum Sylvestri cum tinctura antimonii acri
propinari iussi. Unde factum, ut cum pristina
in gratiam rediret valitudine.

Epicrisis.

1) Praesens, de quo sermo est, sopor ad lethargi
classe pertinet, qui nunquam non cum oblivio-
ne sensuumque torpore stipatus existit. In suam
originem sero per vasa sanguinea ab humoribus
ibi stagnantibus dissenta & relaxata secedenti de-
bet; & pro remotiori causa sanguinis pulso ma-
giorem ad caput agnoscat raptum. Cui quidem vi-
tio in praesenti casu remotiorem occasionem prae-
buit intermissa, quae consueta fuit, venae sectio,
qua humores praeter modum accumulari, & in
corpore senili partes nervosae debilitate debue-
rant. Accedens terror efficit, ut contractis in-
ferioribus & externis partibus succi actu ruerit ad
caput, ibidemque stagnando, recensita produ-
xerint symptomata.

2) Motus corporis, sicuti ad roborandas solidas
partes, & aequalem sanguinis circulum juven-
dum permulsum contribuit, ita in morbis ex hu-

morem abundantia productis, antequam minus-
tur nimia moles, & excretionum libertas resti-
tuatur, magis commovendo, magnum parit no-
xam. Unde etiam inconsumulum fuit, quod nos-
ter agrotans ante praeviam venae sectionem & alvi
liquationem iter suscepit.

OBSERVATIO V.

Matrona LXIII. annorum, variis curis & a-
rumnis per aliquot annos agitata, nullisque post
mensum cessationem naturalibus vel artificiali-
bus adjueta haemorrhagiis, hiemali aliquando
tempore, praevia vertigine, spasmodico-convul-
sivis prehendebatur motionibus. Hae enim
primum in abdomine vehementissimis torminibus,
& alvi urinaeque retentione semet exercebant;
deinceps ad pedes excurrerant, qui attactu
gelidissimi magno tremore agitabantur; tum
manus exercebant, & denique caput occupa-
bant, illudque ab uno versus alterum torque-
bant lanus. Excipiebant demum omnium tam
internorum, quam externorum sensuum aboli-
tio, & sopor profundus; quo quum per triiduum,
spiratione liberiori existente, sepulta fuisset;
accedebat febris pulsatilis celer, sub qua aliquan-
do expirgebat, & delira loquebatur. Septimo
die largus erumpens sudor, quo & febris
solabatur, & sopor discutebatur, adpetitusque
cum perfecta redibat valetudine. Et abhinc per
novissimum triennium idem ille, jam recensitus
paroxysmus, iidem symptomatibus stipatus bii
quotannis circa singulum solstitium recurrebat,
febreque semper ac infesto sudore solvebatur.
Reliquo tempore optime valet agrotans,
nec ullis huc usque remediis a descripto malo vin-
dicari potuit.

Epicrisis.

1) Sedit praesens morbus peculiarem cari spe-
ciem. Describitur nempe casus, quod sit somnus
profundissimus, in quo respiratio libera est, &
agri nulla arte excitari possunt. Dissert igitur
a lethargo, in quo spiratio est difficilis, & agri qui-
dem excitantur, sed obliviosi sunt: dissert etiam
a comate somnolento, ubi non perpetuo dormiunt
agri, sed actiones suas peragunt, & sub his ipsis
obdormiscunt. Et si dicendum, quod res est; ca-
rus videtur infimus apoplexie esse gradus; siqui-
dem omnium & sensuum & motorum sub eo ces-
sat usus. Causarum etiam in his tribus affecti-
bus haec mihi videtur differentia, quod coma
somnolentum à sanguinis stagnatione in cortice
cerebri; carus ab ejus profundiori, medullam si-
mul & sensuum organa penetrante stagnatione,
& facta sub hac feri temeraria secessione; lethar-
gus vero ab actuali feri per vasa relaxata, aut
plane rupta & dilacerata extravasatione suos mu-
tuetur naales.

2) In praesenti casu notabilis est peculiaris na-
turae vigor. Quum enim agrotans tam provel-
dam attigit aetatem & nullas sanguinis habuit
excretiones, quarum tamen cessatio in senili aeta-
te & sequiori sexu est necessitissima; quum etiam
diuturnis mororibus nocentem prae se tulit cor-
pus: non fuisset mirum, si gravi subito perisset
apoplexia. Mirandus itaque est naturae vigor; quo
excitata febris, discussit stagnantem materiam,
eisque per sudorem excussit: id quod critico ve-
luti motu deinceps est factum.

OBSER-

OBSERVATIO VI.

Corus post
cessantes
hemor-
rhoïdes
aqua frigida
curatur.

Formina LXXIII. annos emensa, robusta ac firma constitutionis, post cessantem per artus rationem mensurorum fluxum, sanguinem è venis sedulibus flato tempore reddere siveit, & sub hac excretionè sana visit. Quum vero hæmorrhoides aliquando fluere desinere; prævia vertigine incidit in altum soporem, in quo absque ullis sensibus vel motus vestigiis, pulsus existente celeri & forti, immota per tres decubuit dies, nec ulla arte excitari potuit. Tula in pede vena insusculæ frustra clysteribus, arripiebatur confilium, ut aqua sigilla liberiore quantitate ori instillaretur: quo factum est, ut elapso trium dierum spatio non modo diarrhoea accederet, sed & hæmorrhoidum fluxus recurreret, & ægroians sopore difficulo, prius ad se rediret, omnium rerum ignara, ad hoc uique tempus sana vivens.

Epiçrifa.

1) Causam soporosam pariter hac paralyticorum affectum sapius quidem nimia humorum præbet moles, sed nec hac tanta machinari potest mala, nisi solidam & nervosarum partium accessit imbecillitas. Hoc ex fonte in præfenti casu egregius aquæ frigidae effectus potest explicari. Postquam enim per venæ sectionem moles humorum imminuit, & per clysteres coram raptus à superioribus derivatus fuit: curatio colophonem addidit aquæ frigidae potus. Huius ea est vis & indoles, ut ventriculo & intellibus robur addat: quo recuperata, hæmorrhoides rursum coeperunt fluere, & sic depleta sanguinis abundantia pristina rediit valetudo.

2) Id non semel sed lapsus à ambis observatum fuit, quod graves illi cerebrî affectus soporosi & semî apoplectici & paralytici post tertium diem seu dimidium septenarii motu quodam critico vel in melius vel in pejor mutati fuerint; & quod peculiare nature robur & vigor in vincendis difficultatibus huic morbis plus quam remedium ethærica valuerit; ut etiam verissimum illud GALENI l. X. meted. haberi possit: validas vires omnia sustinere, imbecillas à minimis ladi.

OBSERVATIO VII.

Corus post
multa re-
tentione fe-
bris erysipelaceum.

Vir generosus, ætatem LVI. temperamenti sanguineo-cholerici, habitus spongiosi, venæ sectioni aduersus, & intemperantiz tam vino-que, quam ciborum nimis indulgens, aliquando vino ferme satius tradit se iuicere, & sub eo horrore & tanta virium prostratione corripitur, ut dormum attingere non posset, sed in pago manere cogereetur. Lectum petens, profundo & gravi per noctem fruitor somno, & mane exprofectus insignem cruris tumorem cum macula ex bruno rubicunda deprehendit. Vocatus Medicus erysipelas adesse pronunciat, & mittit purgantes pilulas, quæ odies movebant alvum. Sed sequentur graviora symptomata, & æger subito omnî sensu ac loquendi potentia destituitur: unde suspicatus apoplexiam Medicus dabit mixturâ ex aqua apoplectica, confectione alhermes, oleo cinnamomi & caryophyllorum paratam. Pulsus, qui jam cum aucto calore celer aderat, magis augetur; & æger soporem incidit profundum, cum insigni calore, & nimium sensuum abolitio-

Erid. Hofmanni Oper. Tom. III.

ne slipatum, inque eo per octo dies jacebat, & à Medico, & ab aliis pro deplorato uique habebatur. Tandem accessit aliter Medicus quærit primum, an aperta sit alvus? respondent, illam per octo jam dies mox à datis pilulis perniciatissime clausam fuisse. Injiciendum ergo protinus clysterem curas emollientem, & hoc votis haud respondente, alterum paullo acriorem jubet infundi. Neque inde mota alvo ægrum in lecto hinc inde volvi & agitari præcipit: quo facto mox succedebant facies copiosissima, grave olens, & cum his globuli tam duri, ut vix contundi potuerint. Elapsis abhinc linis horis ad se rediit æger. Altorum infusus, & de dolore occipitis, corporisque debilitate querulus. Quare elixiria stomachica cum sale volatili oleo combinata, & externe spiritus vini camphoratus, ad nuclum inungendus, fuerunt ordinati; & æger convalescit.

Epiçrifa.

1) Quemadmodum vitæ genus inordinatum, multaque crapula, debilitando cerebrum & nervolum genus, remotius ad præsentem soporolum contribuerunt affectum: ita eundem proxime induxit male tractata febris erysipelacea. Hæc sese exterius horrore, cum inequata virium prostratione, & tumore erysipelaceo, slipat; & debetur corporis, vix facti sub iucere refrigerationi. Datum ad eam exiguam purgans non potuit non esse perniciosissimum: a purgantibus enim & vomitoriis retroactum sapius vidi erysipelas. Nam agunt purgantia vi stimulantia, qua & intestina, & externas corporis partes ad spasmodum proritant, quo repellitur aeris & caustica, quæ sub erysipelatis specie excussa fuerat, materia.

2) Peccavit demoreps Medicus, quod iusto calidius dederit remedium, quo humores in maiorem ætatem ac ebullitionem sunt acti: & facillimum inde fuisset, ut phrenitis & gangrena supervenissent, eo magis cum, ob alvum à dato purgante pernitiaciter strictam, omnis humorum motus ad caput convectus videtur.

3) Hinc alter rectissime egit Medicus, quod rejecta clysterum infusiope duras facies emolli-averit, inaque ventris fistulas conspiceret: unde, restituo per corpus sanguinis equali circulo, sopor discussus fuit. Inde discant prædicti juniores, ut in nervibus morbis alvi rationem ante omnia habeant.

OBSERVATIO VIII.

Vir quinquagenarius, obesus, plethorico-sanguineus, & cacochymicus corripitur aliquando erysipelate cum horrore & febricula slipato. Tercio die pedis tumido epizheia ex symphyto cum aceto decocto applicat quidam empiricus; unde mox in profundum soporem delabatur æger, ex quo vix poterat suscitari. Vocatus hinc Medicus protinus jubet venæ sectionem insilui, clysteres infundi & interne propinas pulveres nitrosos camphoratos. Unde discusso sopore ad se redit ægrotus; sed cum antea fuerit vir ingenii vivacissimi & incomparabilis memoriz, retinuit jam omnium mentis functionum notabilem imminutionem, tamamque memoriz debilitatem, ut, rateriarum plane ignarus esset rerum. Quo in statu, frustra usurpatis omnis generis adminiculis, per aliquot annos & ad vitæ uique finem permansit; licet ceterum & adpetitu frueretur integro, & optime nutreitur.

Superpro-
fectus
cum reli-
cta ætate
dehiscit.

T 3 Epiçrifa.

Epiëris.

1) Sensus internos, memoriam, ingenium, phantasmata, in homine vivo ope nervorum haud secus ac externos administrari; vel exinde patet, quod relaxato cerebro & nervis, aut à serola coluvie inundato, profusus hæc essent actiones. Et idem in nostro casu contigisse post discussum soporem, probabile videtur: scilicet relictæ sunt laxitæ & inbecillitas eorum, qui memoriæ & ingenio servant nervorum.

2) Quenadmodum camphoratorum remedium, & in pulvere, & cum spiritu vini solutum externus usus in tumoribus erysipelaceis repellentem & nocivam existit efficaciam: ita eadem, in repulso jam erysipelate, intus cum nitrosâ, post præmissam venæ sectionem & alvi liquationem exhibita, egregia pollet vi, materiam erysipelaceam è corporis penetralibus removendi, & ad cutaneum rursus corticem, cum magno sanitatis commodo, propellendi.

OBSERVATIO IX.

Come somnolentiam chronicam à reimpulsa podagra.

Verbi divini minister, quinquagenario major, obesi valde corporis habitus & temperamenti sanguinei, indulsit in juvenutis præteritum annis crebris compositionibus, maximeque vini calidioribus. Hinc podagricis pedum doloribus diu fuit excruciat; quibus ope cujuslibet emplastri profusus fugatus, retinuit tumorem circa pedum taleos, in quo per vices maculæ rubræ efflorescebant, squamam abscedentes. Præterea septem abhinc annis incidit in perpetuam ad somnum proclivitatem, & hanc ad hoc usque tempus retinuit. Obdormiscit sæpius nocte dieque, somnoque tam profundo obdormit, ut vix queat excitari; sub quo facies fit rubicunda & intumescit: attamen memoriæ judicii que nulla observatur immutatio. Consequitur sæpius de dolore gravatio in lumbis, calculum mentiente, & interdum præcordia adeo angustante, ut vix spiritum ducere queat. Multis ad depellendam hæc vicia usus est præstidii, nimirum crebris phlebotomiis, quibus intra spatium sex hebdomadarum ultra duodecim sanguinis libræ fuerunt detractæ. Utiurpavit decocta lignorum cum mercurio dulci, decocta viperarum, cinnabarina, volatilia, cephalica, similesque &c. a quibus involuntarium urinae subinet contraxit fluxum. Optinuit in potu aquarum Schwalbacensium invenit solatium; quas quandiu potabat, tam diu à sopore liber erat.

Epiëris cum consilio.

1) Omnes, qui soporosis ex interna causa affectibus vexantur, ejusmodi solent esse homines, quæ crebris indulsent crapulis, vinisque calidioribus aut cerevisiis lupulatis. Hæc enim sibi met contrahunt ad omnes qui ex cerebri atonia propullulant morbos, dispositionem, quæ in eo consistit, quod vasculose, nervosæ ac membranaceæ partes nimis distendantur & labefactentur.

2) Causa præsentis mali querenda est in podagræ retropulsionem; ex qua in debilitatis ejusmodi subiectis innumera provenisse vidi damna. Et hinc petenda ratio, cur tali in casu omnia frustra adhibeantur remedia, nisi podagrica materia discussa, aut ad pedem revocata fuerit

articulos. Venæ sectiones in plethoricis subiectis cum fructu quidem instituuntur: at ejus immoderatum in casu præsentis usum merito taxamus, eique majorem mali perniciam omnino tribuimus. In curatione hujus chronici mali vitanda sunt omnia, quæ sanguinem commoveant remedia, sudorifica, volatilia sic dicta cephalica, nervina aliæque; & ad roborandum caput interviunt potius epithemata ex aceto vini rutaceo, cum aliquot; utulis olei lavendulæ & rosinæ rini nec non camphora parata, & fronti temporibusque cum lincois applicata. Præterea magnum fructum observavi ab usu pediluviorum non modo ad revocandum podagram, sed & ad divertendos humores à capite, quod tamen à vaporibus est defendendum. Potus aquæ frigide etiam in paroxysmo nunquam fere non proficius esse solet; magis tamen ubi febris subest: utpote frigus motum sanguinis expansum coercet & nimium relaxatis fibris tonum & clatorem naturalem restituit.

OBSERVATIO X.

Vir dives generosus, annorum supra quinquaginta, temperamenti sanguineo-phlegmatici, obesi corporis habitus, in juventute multum semper pituitæ ex naribus excrevit, gulæ, oris, vino & veneri plurimum indulgens per aliquot annos tempore autumnali & vernali cum febricula catarrhali dolores mox in manibus mox in pedibus expertus est. Sed postquam æstivæ nimum fructibus horis refrigerantibus, frægis, ribibus, lacte ebulliato, & Pynnonianis quoque aquis usus fuit, loquenti autumnis, à conductis ejusmodi doloribus artuum plane fuit immunis. Præter modum vero de languore virium, membrorum lassitudine, dolore capitis gravativo, spirandi difficultate & continuo in somnum propensione conqueri cepit. Postea accessu venti frigidioris borealis simul & semel sopor ita invaluit, ut ægerime excitari, nec ad interrogata respondere posset. Pulsus erat magnus, molis & frequens, alvus obstructa; urina fecodebat tenuis & cruda, & mentis quoque levior ad rat alienatio. Ego vocatus in consilium reperi agrotantem in conclavi humidiori & demissiori jacentem in lecto. Quare mox eum in locum superiorem transportandum jussi: Proinde spiritus crystallorum veneris cum oleo rutæ destillato roboratus applicabatur naribus. Clyster aliquoties injectus fuit, qui consistebat ex decocto majoranæ, sativæ, sale ammoniaco, adjectis sex granis tartari emetici solutis, qui ingentem semper pituitæ viscidæ cum sordibus eduxit coagulum. Cucurbitule cum scarificatione primo dorso, deinde scapulis, postea occipiti applicatæ fuerunt. Interne per vices oblatus fuit spiritus salis ammoniaci urinofus cum essentia calidiori saturata mixtus; vehiculi loco adhibuit aquam fontanæ frigidam, quam etiam sumsi pro potu. Vesicatoria pedibus applicata nullas excitabant vesicas; in nucha vero, tanquam partem sensibilibi eas omnino producebant. Remissior quidem fuit morbus inde redditus; circa septimum vero diem purpura in superioribus partibus adparuit cum largo sudore universum corpus paulatim occupante. Ita sensim sensimque morbi vi depulsa & vires & sanctiones animales redierunt. Ad arceandam recidivam abstinentiam cum exercitio corporis, victum quoque attenuantem & exsiccantem, & insusum herbarum sativæ, majoranæ, &c.

*Letheus
a remissio
artibus.*

& florum atricæ, ac cardamomi singulo mane fortillandum plurimum commendavi. Tandem altero anno rheumatis Carolinis me suafore adhibitis, rediit dolor podagricus, ex quo optime convaleuit.

Epietis.

In hac morbi historia multa obveniunt notata digna. Morbus hic, qui nomen lethargi recte sortitur, in homine obeso, humidioris constitutionis, ab inordinata diæta, otio & abusu fructuum refrigerantium, per quem materia arthritica intus remansit, & spasmos in inferioribus partibus produxit, qui humores serenos ad caput propulerunt, natus fuit, ad cuius genesis malum quoque habitatio & dormitio in loco decliviori & humidiori consulti. Quod uti nunquam non insalubre, ita quam maxime ad morbos capitis & nervorum, qui ex atonia veniunt disponit. Ita HILDANUS *cent. IV. obs. 11.* ex fumo fornicis non ita pridem extructæ lethargum & mortem annotavit. Atque nos sapientius caput morbos cum deflexionibus, cum aacibus difficultate, vertigine, fornolotia, in foeminis quæ lavatione lineamentum operam dant, item quando circa fornices hyeme lineamina exsicantur, observavimus. Quare etiam balnea & pedum lotiones si caput inbecillum est, vel ad soporem aut paralyfin dispositum, non conveniunt. Denique non sine fructu emetica in clysteribus etiam dari possunt, & longe securioris sunt effectus quam actiora purgantia, cujus generis sunt colocynthiaca, ad humores a capite revellendos. Tandem neque hoc loco præterendum, quod crisis in affectus etiam soporosos, præsertim si cum febze conjuncti sunt, incidat.

CAPUT III.

De Vertigine.

THESES PATHOLOGICÆ.

§. I.

Definitio vertiginis. **H**Aud ultimum inter cerebri morbos locum tuetur vertigo; malum frequentissimum, quod omnes capitis affectiones nunquam fere non & antecedit, & comitatur. Ea est sensatio circumgyrationis & lapsus, vel cum vel sine corporis prostratione in terram conjuncta, à compressione nervorum opticozum, intra calvariam adhuc absconditorum, & hinc pendente vitio fluiti nervi in tunica retinam influxu originem trahens.

§. II.

Definitio vertiginis. **E**x improviso nimirum fit, ut agentantes omnia objecta, sequæ ipsos circumrotari sibi videntur, atque sub idea imminens lapsus titubent, pedibusque vacillant; tum vero oculi obfcurantur; quin ipsi prius nonnunquam instar apoplethorum concidunt. Junguntur sæpenuer capitis torpor, dolor, gravitas, aurium fulgur & tintus, oculorum maior, visio vitata & vel duplicata, vel dimidiata, faciei rubor, somnolentia; tumque si vel levis inclinatio capitis in terram, vel corporis circumgyratio ac-

cesserit, proximus oritur vertigo. Occupat subiecta potissimum sanguinea, edacia, senilia, viribus defraudata, hypochondriaca, hysterica, nephritica, & quæ alvi sunt durioris, imique ventris cruciantur spasmi. Interdum ea primum constituit morbum: non raro tamen graviorum capitis affectuum, velut est apoplexia, paralyfis, soporosi morbi, epilepsia &c. prænuncia, cumque ipsa complicata deprehenditur.

§. III.

Digni vero sunt, ut annotentur, tres potissimum vertiginis gradus; quorum levissimus, omnique periculi expers dicitur *atax*, quasi turbo; quoniam affecti se in orbem agitari, & omnia secum in gyrum rotari putant, neque tamen concidunt, nec caliginem oculorum experiuntur. Huic obnoxii sunt, qui navi vehuntur, qui se in orbem rotant, qui Tabaci fumum crebrius sugunt, aut crapulis liquenter indulgent. Alter gradus vocatur *Scotomia* seu *vertigo tenebrosa*, in qua præter dictam rotationem ideam, & pedum vacillationem, oculi caligine suffunduntur. Antecedit ea vomitus, alioque, qui ab inferioribus ad superiora adspirant, spasmodicus affectus; & exprimitur: *Es wird mir grün und gelb vor den augen.* Summus & gravissimus gradus adpellatur *vertigo caduca*, & revera est species levioris apoplexiæ, vel etiam epilepsia. Antecedunt enim ipsi partium infernarum, fornicationis sensum exhibentes; tum laboribus ideas gravissimi in præcipiti lapsus, & non solum objecta circumrotari videntur, oculique caligant, verum ægri etiam, nisi contineantur, sulato in terram prostrantur, quin sæpius omni sensum, motum, loquelæ ac rationis usum destituti, mortuorum instar jacent; quales notatu dignos casus reperies in CONSULT. MED. T. I. S. I. *cap. IX & X.* & in A. N. C. *dec. II. anno VIII. obs. 41.*

§. IV.

Omnis vertigo merito distinguitur in *idiopathicam* & *sympathicam*. Prior causam in ipso cerebro hærentem agnoscat, & longe gravior est posteriori: complicatur cum ea aliis capitis affectus, & raro est periodica. Posterior fit vitio ventriculi, acida & acri suborta prægnantis, & se prodiit per conjunctam nauseam, vomendi proclivitatem, ructuosam moleliam, ventriculique gravitatem. Plerumque est periodica, & jejuno existente stomacho gravissime urget, summo autem vel pauxillo cibi proximo conquiescit.

§. V.

Sedem vertiginis determinaturi observamus eam circa visionis potissimum organum hæere. In ipso quidem oculo, quatenus intra orbitam continetur, nullum nec extrinsecus cernitur, nec post mortem reperitur vitium; hinc non sine ratione colligitur, illud in nervo quaerendum esse optico. Jam vero in demortuis, qui per vitam satis gravi laborant vertigine, deprehendimus vel plexum choroideum, vel tertium cerebri ventriculum præter naturam fuisse constitutum. Sic enim SCULTETUS in *armat. chir. obs. 19.* plexum choroideum vidit rubicundissimum; BONETUS *sepulchr. L. I. S. XI. obs. 8.* tam in oculis vertiginosis, quam hominibus invenit sanguinem concretum, vel tumorem vesicularum, tertium cerebri ventriculum; occu autem, & ROLFINGKIU in *diff. anat. L. I. C. 13.*

Definitio vertiginis in idiopathica & sympathica.

Vertigo sedes.

Definitio vertiginis.

affirmat, se in vertiginosus ovis post mortem vesiculas aqueo humore plenas, & intra tertium cerebri ventriculum contentas, plus suppleri vice, in homine semel observasse. Nihil autem vili ipso in optico nervo deprehensum est; in quo tamen solum mali noster residere. Quo id ergo fiat pacto, mox explicabimus.

§. VI.

*Structura
nervi opti-
ci.*

Cerebrum difsecanti, & ad plexum choroideum, qui est congeries plurimorum tam arterioforum quam venosorum vasculorum, perveniens, hoc sublato sese sistant bina strata seu thalami nervorum opticonum, inter anum & vulvam sitorum, & per quandam fissuram, sub qua tertius cerebri ventriculus prodit, ab invicem distinctorum. Ab horum superiori parte oriuntur bini nervi, qui dicuntur optici, qui non nisi pia meninge investiti, & dictos thalamos ab utroque latere complexi, antotium progrediuntur, & arce infundibulum archilime conjunguntur; mox iterum secedentes tendunt ad oculi orbitam; tum ens ab utroque & externo latere transversim attingit carotis interna arteria; ac denique perforant foramen, eorum transit in posteriori orbitae parte desincentia, cumque matre dura, in illarum vaginam cincti, per oculos distribuuntur, & horum variis constituit partes. Si oculo recte constituto, nervus opticus vicio caret, & legitimus in illum fluidi nervi fit influxus, visio exercetur integra. Sublato penitus istius fluidi influxu, nascitur cecitas; eodem vero quocunque modo tantum immutato, varia visionis visa emergunt. Imminuitur influxus per dicti nervi compressionem: comprimi potest nervus a partibus vicinis præter naturam constitutis: partes vicine sunt plexus choroideus, arteria carotis, ventriculus cerebri tertius. Ergo ab harum partium præternaturali constitutione nervus opticus, licet in sua substantia integer, comprimitur, & ideo vertigo etiam laborari potest.

§. VII.

*Formalis
ratio verti-
ginis.*

Scimus ergo, immutationem fluidi nervi in nervos influxum producere varias visionis lesiones, velut visionem duplicatam, dimensam, obscuram & circumgyrationis sensum: sed quomodo ideæ in mente excitentur, & quantum influentis fluidi ad singulam producendam requiratur; determinari & difficillimum & inutile est. Sufficit, si ex hæcenus dictis cognoverimus, vertiginis formalem rationem in fluidi tenuissimi influxu in nervos opticos per eorum compressionem immutato consistere. At unde pedum vacillatio? Sensum circumgyrationis comitatur idea casus; hæc involvit metum; metus ideam sequitur pedum titubatio, quæ consilio fluidi nervi in traliculus suum erectum efficiendis influxu absolvitur; Ergo sensum circumgyrationis sequitur pedum titubatio. Hæc docet experientia; sed unde fiat, quod certi corporis motus sequantur certam in anima ideam, nobis adhuc obscurum est.

§. VIII.

*Quomodo
vertigo na-
da, cum ad
ebrietatem.*

Devolvimur ergo ad causas, compressionem nervorum opticonum producentes. Sitit se primum ebrietas, quæ plerumque vertiginosam perturbationem, pedumque vacillationem habet comitem. Vinum scilicet ebrietatem, & hæc pendem vertiginem duplici ratione causatur:

nam foret 1) principium subtile, vaporosum, quod majore copia ad cerebrum delatum, purissimum nervorum lympham inquinat, & ad sensus motusque rite præstandos iterum reddit. 2) Principium spirituosum, unde sanguis expanditur, & arteriæ carotides, valaque diffusa thalami nervorum opticonum, ipsosque nervos comprimunt: sicut id de vino MED. SYST. T. II. Part. III. C. 4. §. 8. & de cerevisia §. 12. fusius explicavi. At hæc vertigo transitoria est, & dilato principio vaporosi, fortitque sanguinis ebullitione transit. Quare nec de hac, nec de ea, quæ per vectionem in navi, aut corporis rotationem inducitur, tanquam non morbo nobis nullus est sermo.

§. IX.

Ex causis potius morbosam vertiginem inducentibus, principalis est sanguinis nimia in arteriis carotidibus, & vas plexum choroideum constituentibus, stagnatio. Hinc vertiginem patiuntur valde plethorici, cum primis si confusæ excretiones per narium hæmorrhagias, hæmorrhoides, vel menses in feminis tubiliterunt, aut imprudenter suppressæ fuerint. Non minus hoc malum incurrit, qui confusæ venæ sectiones, aut scarificationes neglexerunt. Eo magis huic morbo obnoxii sunt plethorici, si simul hypochondriaci, hysterici, nephritici, spasmodici, quæ imi ventris passionibus vexantur; quibus sanguis majore impetu ac copia ad caput fertur. Et novæ quidem juvenes hypochondriaci, sanguinisque miliones nunquam passos, qui vertigine uno impetu & ictu invadente rapti, perque aliquot horas detenti, secuto autem vomitu statim liberati fuerunt.

§. X.

Eandem vim obtinet serum, in debita excretionem collicium, ac intra cerebri linguæque vasa accumulatum. Quam ob rem videmus cachecticos sæpius vertiginem pati; eademque chronica ac pernaciissima adhiæ, quibus terrore manationes per aures, oculos & nates fuerint cohibite. Hinc de vertigine diuturna ex coryza suppressa in CONSULT. MED. Sæd. I. Caf. VIII. de eadem per retinatum lori è narium effluxum soluta ibid. Sæd. IV. Caf. CLXIV. & de ea cum fluxu auris rheumatico alternante Sæd. IV. Caf. CXXXIV. exempla leguntur. Inde etiam vernali ac autumnali tempore, quo repentinæ tempestatum mutationes contingunt, sæpius observamus vertigines. Has porro progredientes à loto temeroticis, inque primis solum illud instrumentum, quod ab effectu vocatur temulentum, sub pane aut pulle conestum: quales casus A. N. C. dec. II. anno VIII. obs. 173. & dec. III. anno II. obs. 127. allegant. Nec silentio prætermittende sunt violentæ extrinsecus capiti illatz, quippe quibus humorum stagnatio & extravasatio facillime inducitur: unde satis gravis ac diuturna fuit illa vertigo, cujus in CONSULT. MED. Sæd. I. Caf. XLVIII. mentio fit, & quæ a vehementi in caput lapsum originem traxit.

§. XI.

Sympathicæ vertiginis causa residet in primis viis, maximeque ventriculo, & non nisi hujus vehementiori debetur spasmo. Namque dum primæ regiones valide contrahuntur, cogunt vitales succos ad superiora, qui ibidem copiosius colle-

*Vertigo
causa a
serum
accumu-
lato*

*serum
collicium
accumu-
lato*

*loto tem-
eroticis*

*Rele-
vatio
primæ
regionis*

collecti, & intra plexus potissimum choroidei vascula stagnantes, venigenim pariunt. Hinc frequens vertigo est illa, qui primas officinas saburra acri biliosa occupat habent; qui confusos intermiserunt purgationes; qui leguminibus, & qui flatu movent, cibis largius vescuntur, qui vermes intra canalem intestinorum alunt, qui vehementi vomitu torquentur &c. Et hæc quidem vertigo, jejunio existente ventriculo, maxime urget; propterea quod nam actiones sint foedestiam ab adiunctis alimentis, & sic acrimonia per subcunctis cibi admixtionem temperata, statim remittere solet affectus.

§. XII.

Quum videmus in multis à causa levissima vertiginem produci, quam in aliis ne gravior quidem excitaret: supponenda in illis est majore cerebri & nervorum ad fovendas vertiginis causas dispositio. Et hanc cum MURALTO in A. N. C. dec. II. ann. VIII. pag. 26. in generis perivici, vasculosi, & membranosi debilitate collocandam arbitramur: qua fit, ut irrumpenti cruori non sufficiens sit vasorum resistens, unde facilis ille stagnare potest. Hinc omnia, quæ caput debilitant, aditum huic adfectui parant, velut sunt ætas senilis, vigiliæ diuturnæ, frequens crapula, vensus omnia & immatura, animi diuturnus moror, vita sedentaria, & id genus alia. Hinc etiam leves causæ eundem provocant; ut sunt capitis in terram inclamatio, terror, frigus, crapula, balnearum improvidus usus. Sic vertiginem à frigore semper recrudescentem adiunctant A. N. C. dec. II. anno VIII. abf. 5. eandemque à terrore in hypochondriaco suboritur recens in CONSULT. MED. S. I. Caf. XXXII.

§. XIII.

Vertigo, quæ à vitio ventriculi suboritur, levis est, & repurgato cessat ventriculo: quæ vero ex imi ventris spasmus, consequentia nervosi generis debilitate, natales suos mutuatur, altioris est indaginis magisque diuturnam portendit morbum. Semper gravior est idiopathica, quæ à sanguinis aut feri stagnatione in cerebro proficiscitur, & metu insequuntur gutta serena, paralysis, apoplexie, aut soporosi affectus terret, maxime in senibus. Qui jam passus est insultum apoplecticum, & corripitur rursus vertigine, habet curæ recidiva apoplexie sibi metus. Gravissima vertigo est caduca, quippe quæ causam profundius cerebrum penetrantem fovet, & revera nihil, nisi apoplexie levioris est species.

CURATIO.

§. I.

Ut promptum & expeditum huic malo adferatur auxilium; bimas potissimum indicationes respicite oportet medentem, ut nimirum sanguinis & humorum in capite stagnationem discutiat, eorumque raptum ad inferiora derivet; & demum ut systema partium nervosarum à tono suo dejectarum corroboret. Quum vero variæ sint causæ, quæ majorem sanguinis, quam par est, ad caput compellunt quantitatem, harum in curatione habeatur ratio, necesse est.

§. II.

In recenti malo, corpore existente valde plethorico, facie rubicunda, arterisque fortiter pul-

santibus, nihil est præstantius sanguinis missione. Quam ob rem, ut ad remotiores partes sanguis retrahatur, in pede secunda vena, multumque sanguinis mittendum. Deinceps si merdium vel hæmorrhoidum irregularis sit successus, opus est, ut per commodam medendi rationem hæc revo-centur excretiones. Hæmorrhoidarius hirudinum ad anum applicatio præsentaneam non raro tulit opem; sicut confirmat observatio CONSULT. MED. Sect. I. caf. VIII. inserta. Quando nam hæmorrhagia vel suppressa, vel sponte cessans malum induxit: præstans auxilium ferunt scarificationes cervicis & dorsu præstantius autem & certius eadem more Ægyptiorum naribus admotæ.

§. III.

Misso sanguine sæpius totum depellitur malum, quod si cedere recusat, insistentum est remedium sanguinem à capite derivantibus. Eminent ex his præsentemque virtutem exerunt clysters, iteratis injiciendi vicibus; vel etiam laxantia, quæ blanda & simul roborantia esse debent; quo nomine superbiunt pilule balsamicæ vel ad nostram vel Beati Stæbii mentem concinnandæ; aut laxans ex manna, rhabarbaro, & cremore tartari confectum, addito oleo de cedro. Utillissima porro sunt pediluvia crebro adhibenda; quæ tamen tepida tantum oportet esse; quoniam calidiora sanguinem commovent, & recursum mali provocant.

§. IV.

Ubi cruditates acidæ, biliosæ, acres, ventriculum obidentes, malum produxerunt: opus est penumero est, ut blando emetico evacuetur ea saburra; quo fine in robustioribus tartarus emeticus, in sensibilibus radix Ipecacuanhæ operæ facient pretium. Si præ his magis arideant purgantia, ea paullo validiora esse præstat; & eo scopo pilule balsamicæ extracto hellebori nigri permiscere. Quando acidum ventriculo insidet, præmittendi & subijungendi sunt pulveres aborbentes ac digestivi, cum oleo nucis combinari; vel etiam martialia cum pilulis balsamicis alternanda.

§. V.

Diuturnioris perinde ac difficilioris sanationis est vertigo, quæ hypochondriacis passionibus, cum generis nervosi debilitate complicatis focatur. Lemioribus in ea pugnandum est medicinis, quæ discutiant flatum in abdomine subsistentes, acrimoniam ventriculi obducent, sordes per alvum blande evacuent, ac spasmos imi ventris demulceant. Hoc nomine præstantissimæ utilitatis deprehendi pulverem, ex pulvere Marchianus drachmis duabus, coram cervi phlogopice preparati, niri depurati, cinnabaris preparata, lumbricorum terrestrum ana drachma dimidia, & olei macis guttulis tribus confectum, aque bis quovide cum aqua analeptica exhibendum. Conjugenda laxantia, pediluvia, ordinatæ venæ sectiones, ac recta vivendi ratio.

§. VI.

Sic subtracta mali causæ, studendum ut roboretur nervosarum partium systema. Adquem obtinendum finem amplam laudem meretur nostrum vitæ balsamum, quod & externe vertici infundi, & naribus admoveri, & interne in elosacchari forma propinari cum fructu potest. Adjuvat

Causæ ac-
cedentes
vertigini.

Remedia
sanguinem
à capite
derivantia.

Propter
vertiginem.

Causæ
vertiginis
hypochon-
driacæ.

In locutione
curatio-
nis.

Causæ
vertiginis
hypochon-
driacæ.

Adhuc
sanguinem
adhibere
velit.

Quum
perit
etiam
velit
adhibere

juvat etiam ægros spiritus salis ammoniaci inter cibos acceptos. In chronica vertigine ex vicio hypochondriorum soleo roborandi sine circa quadras lunæ per aliquot dies sequens exhibere ele-
ctuarium: *Recipe visci quernei, corticis chinæ ana unciam dimidiam, pulveris florum chamæ-
meli, lumbricorum terrestrium ana drachmas duas, succini præparati, extracti cardui benedi-
cti ana drachmam unam, caryophyllorum, cin-
nabarum nativæ præparatæ ana scrupulos duos,
sympi berberum uncias binas. M. F. electua-
rium, cuius drachma pro una dosi exhibeatur.*

§. VIII.

*Dieta re-
cta ratio.*

Omnis autem curatio erit irrita, nisi adjuvetur recto rerum non naturalium usu. Quare ci-
bos oportet esse faciles, quibus concoquendis suffi-
ciat digestionis officina; removeantur acris,
salis, acida, leguminosa, & que flatum pariant.
Qui debile ventriculum fovent, iis prodest
jejuno tempore cortices citri vel aurantiorum ma-
sticare. Nec quidpiam est, quod magis verti-
ginosus ledere valet, quam potus vinosi, spiri-
tuosi ac cerevisiarii; quorum in locum vel de-
cocta, vel fontem Selteranum modico vini nu-
ptum substituire juvat. Motus corporis sit cau-
tissimus, ac placidissimus; ne ex vehementiori
commotione novus excitetur paroxysmus. Aër
seligatur temperatus ac serenus; omne frigus,
maxime partium infernarum fugiatur; & ab ira-
cundia, terrore, morore, quantum possibile,
caveatur. Hæc qui rite observaverit, quique san-
guinis molem debito tempore imminuit & ex-
cretionum naturalium libertatem conservari cu-
raverit; habebit modum, quo ab ulteriori & ver-
tiginis, & aliorum cerebri morborum invasione
semet vindicare poterit.

CAUTELE PRACTICÆ.

§. I.

*Quid con-
ducit in
vertiginem
ex spâno
ventriculi
febris.*

Quando ex spâno ventriculi vertigo, ut sæ-
pe fit, oritur; utilissimus est pulvis Marchio-
num, cum pauca cinnabari, extracto castorei,
& nitro mixtus, & in aqua liliorum convallium
datus. Insignis etiam est efficacia pulvis ex cu-
bebis, nucista, & lapidibus cancerorum paratus:
neque minus desideratissimum in tali casu opem
ferunt pilule *Wildeganstii*.

§. II.

*Cancro
vertiginis
chronicæ
idiopathi-
cæ.*

Fit nonnunquam, ut ex diuturniori sanguinis
intra vasâ plexus choroidæ stagnatione, serum
secedat, & vel in tertium cerebri ventriculum,
vel alium locum, unde nervos opacos potest com-
primere, extravasetur. Quo in casu utilissimum
est, bregma sero candenti inungere; aut nuchæ
admoveere vesicatoria. In tali etiam vertigine,
quam à causâ frigida subortam dixere Veteres, si
molliori haud cedit medicinæ, cura per incediam,
conjunctis fonticulis & cinnabarinis remediis lo-
cum habet.

§. III.

*Uti ther-
mæ.*

Quemadmodum in vertigine idiopathica in-
ternus acidularum, thermarumque usus neu-
quam proficius existit; tantum abest, ut inde
status humorum in capite augatur: ita eadem
ab hypochondriorum vicio generata, præ-
missa convenienti medicina, opatum à bene

ordinato thermarum vel acidularum tepesctæ-
rum usu recipit auxilium: testante observatio-
ne CONSULT. MED. *Sess. I. Caf. X. in-
serta.*

§. IV.

Gravidæ sæpe numero vertigine affliguntur;
que non modo plethoræ quæ possent, verum
etiam alvi adstrictioni & statum retentioni, ip-
sis familiari debetur. Tali casu omne curatio-
nis abolivitur negotium, si administrata venæ
sectione, flatu subducantur & alvus aperiantur
vel infuso clystere, vel laxante passulato, man-
nato sc. rhubarbarino. Vidi etiam subito ortam
vertiginem in iis, qui per aliquot dies suppreffum
habuerunt alvum: ubi infuso clystere, datoque
intus oleo amygdalarum dulcium, omne pro-
ptius cessavit malum.

§. V.

Balsama roborantia, spirituosâ, nervina, co-
fortantia magis in hoc affectu proficua sunt seni-
bus, & infirmis corporibus; subiectis vero ju-
nioribus, floridioribus & plethoricis minus con-
veniunt, nisi antea vena tusa, ac alvus evacua-
ta fuerit. Tum etiam conveniunt infusa calida
ex herbis cephalicis, radice valerianæ, & cu-
bebis parata; nec non cucupha à Weyfero in-
venta, quam LENTILIUS in *Miscell. P. I.*
p. 74. & P. II. p. 314. describit. Vicando vero
cuncta sunt; quæ nervos debilitant, ut sunt
omnia vaporosa, narcotica, moschata & cam-
phorata.

§. VI.

Sæpissime fit, ut cum vertigine compliceatur
affectus nephritici; quo in casu bina notissimum
remedia efficacissima & velut specifica depre-
hendi. Unum est succus ex lauco hostensi te-
rens expretus, cui, mane ca quam octo coch-
learia capiunt quantitate assumto, infusum thei-
forme ex veronica, melissa, benonica, radice li-
quiritæ & semine feniculi superbibendum dedi-
alterum est pulvis ex lapidibus cancerorum, radi-
cis pimpinellæ nigre, & iridis *Saventinæ* equali
pendere composuit, & ad drachmam dimidiam
bis quævis hebdomade vesperi sumit. Ex quo-
rum remedium usu per aliquot hebdomades
protracto magnam vidi efficaciam.

ENARRATIONES MORBORUM.

OBSERVATIO I.

Vir XL. annorum meditationibus nimium in-
dulgens, & animi morore, curisque per lon-
gum tempus agiturus, tandem de insigni capi-
tis gravitate & levi vertigine conquirebatur;
quæ in eo consistebat, quod mane potissimum
& jejuno existente stomacho cuncta objecta vi-
debantur nigra, & ipse pedibus vacillabat, ut
sine lapsu metu vix ingredi poneret. Ingrave-
cebant hæc viâ, si tempestas ingrueret æquino-
ctia; & præterea sæpius pueriâ viscida acida,
interdum aqua limpidâ cum levi animi deliquio
mane per os eructabatur; alvo existente stric-
tiori: Implorato nostro auxilio ordinavimus pilulas
nostras balsamicas, alternis diebus circa lecti in-
troitum sumendas, & temperata quotidie pedi-
luvia. Mane & hora pomeridiana quinta dedi-
mus pulverem nostrum b.zoardicum; & sub
epulis essentiam corticis aurantiorum; cum bal-
samo

famo vix remittam. Eodem balsamo inungi tempora cum vertice, eundemque naribus admodum; & quandoque loco pulveris bezoardici ad decem guttulas cum infuso betonica, melissæ, salviæ & veronicæ intus exhiberi iussimus. Extrinsecus ad reprimendum humorem ad caput raptum capiti non sine fructu adipicimus epithema ex camphora in spiritu solarum soluta, aceto rutaceo, rosaceoque confectum; & mane panem butyro illitum, ut comederet, iussimus. Inde obtinuit, ut perfectam æger recuperaret sanitatem.

Epietis.

Est hæc vertigo sympathica stomachalis, quæ à crudinitibus acidis, ventriculunque vellicantibus origines trahit. Fovet enim ventriculus insignem cum capite consensum vi parvi nervorum vagi, per quod spasmus ac strictura simul ad superiora propagantur. Præterea præcordiorum strictura id locum trahunt incommotum, ut humores ad caput conflant, qui vel in carotidibus arteriis, vel plexu chorodeo accumulati, flagrant, nervosque opticos comprimentes, vertiginem inducunt. Quo acrior igitur est materia in ventriculo hospians, eo gravior & spasmus & vertigo est: qualis maturio præsertim tempore, ubi jejuni est stomachus observatur. Quare crebra etiam comperit habemus experientia, nunquam vertiginosis utile esse, ut jejuni permittant; sed magno ipsis esse levamini, si mane parum cibi, & vel solius panis butyro illiti allumant. Curatio eo dirigi debuit, ut sordes ex primis viis removerentur, & ventriculus una cum nervoso genere corroboraretur: qui scopi propostis medicamentis optime potuerunt obtineri. Nec enim opus fuit, in præserti per diuturnos morores ac mediantiones valde debilitato, venam secare; id quod in vertigine idiopathica nunquam intermiti debet.

OBSERVATIO II.

*Vertigo caduca non
solum
idiopathica
sed etiam
sympathica.*

Vir annorum LXVI. temperamenti sanguineo-cholericis, corporis obeforis, matre nephritide ac vertigine caduca defuncta natus, in juventute sua sanus vixit, nisi quod arthriticis quandoque & nephriticis motus fuerit perpeffus. Postquam vero per octo novissimos annos vitam magis otiosam sub diæta lauta vinosaque egit; sensit primum motus hæmorrhoidales, dein sub potu thermarum Carolinarum mixtum cruentum; & denique gravem nephritidis paroxysmum, alvi obstructione, vomendique conatibus stipatum, sed ope emulsionum & neuroforum semper superavit, aliquoties toleravit. Successu demum vertigo cum artuum imbecillitate, quæ licet usu venæ sectionum & laxantium mitigari primum videretur; paulo tamen post ex improviso vehementior cum vomitibus & sensuum abolitione recrudescere. Sopitis per pulveres antispasmodicos vomitibus, vertigo caduca adhuc per quatuordecim inhiarebat dies, leni febricula stipata, sub qua æger non incedere valebat, & pedes mirum in modum vacillabant. Anno abhinc elapso ad roborandos pedes descendit in balnea calidiora cum herbis radicibusque nervinis parata; sed brevi post in plenariam memorie abolitionem, cum lingue paralyti & summa extremorum debilitate conjunctam incidit. A quibus sensum liberare incommotis, tantum tamen pedum retinuit

imbecillitatem, ut vix incedere possit. Ab eo tempore nephritici motus plane silerunt, & magis magisque pinguefcit corpus: sed vertigo per intervalla revertitur, & cum stertoratione non modo invadit, verum etiam finitur. Consultus ego fuisti, ut pro ratione plethoræ bis quotannis vena in brachio secaretur; loco cerevini decoctum ex radice chinæ, farsaparillæ, santali citrino, rasura ligni aloes, pulvisculæ cinnamonomo adhiberetur, sumto desuper pauxillo vini: victum commendavi exsiccantem, abstinentiam à pinguibus, caribus coctis, & iustulis; nec non pediluvia ex herbis nervinis, sale communi, cineribusque clavellatis parata, & post horum usum unguntur & os sacrum unguento martiato, cum oleo rosamarinis, thymis & majoranæ mixto inungendis fuisti.

Epietis.

1) Præfens vertigo debetur congestioni humorum ad caput, à spasmis hypochondriorum hæmorrhoidales & nephriticis productæ: unde etiam ejus singulos paroxysmos vomitus sunt comitati. Pedum vero insignis vacillatio, non à sola vertigine derivanda; quippe qualis non nisi sub ipso vertiginis paroxysmo finem exferere solet: sed originem omnino trahit ab atonia membranarum, quæ medullam spinalem, inferiori spinæ parti includam, cingunt, & hinc ad pedes procedunt nervorum; quæ per motus nephriticos fuit relicta.

2) Quemadmodum plethoricis & sanguineo-cholericis calidiora & spirituosiora omnia, tamiam sanguinis ebullitionem concitando, sunt nocentissima; ita præsertim insensibilis in deprehenduntur, si jam capitis quodam morbo laborant. Hinc enim factum est, quod nosse ægrotans ex balnearum calidiorum usu (quæ alias tepida nil nocent) apoplecticum ferme initium contraxerit, qui lingue paralyti, memoriamque debilitate se prodidit. Dissimus ergo, & balnea & pediluvia in capitis affectibus usurpata semper esse debere tepida.

3) Annexa erat huic observationi questio: num thermæ Carolinæ ex usu ægroti essent? Dissuasi autem eorum usum. Aeger enim non solum sympathica vertigine laborare censendus est; sed omnino idiopathica, à primarum viarum spasmus & excitata, & exacerbata. Causa hujus jam in dispositione hæreditaria est querenda; quæ cerebrum & nervi insigni debilitate affecti videntur. Quo in casu omnes & thermæ & acidulae sunt fugiende; quoniam per debilitata vascula non rite progrediuntur, sed flagnantes majora pariunt damna.

OBSERVATIO III.

Litteratus quidam XLVI. annorum, spongioso habitu, vasis exilioribus, multisque succis præditus, vitæque nimium dedans sedentariæ, & per sedecim jam annos magno animi torpore, angore, morore, angustia præcordiorum, languore artuum, cephalalgia, borborygmis, & spasticis flatulentisque commotionibus valde distructus fuit. Hæc autem inter symptomata maximam ipsi crucem figebat vertigo tenebrosa & caduca, sub cujus accessione, nisi continetur, omnino concidebat, omniumque sensationum usu carebat. Post capitis ad terram inclinationem malum protinus invadebat, & interdum punctula

*Vertigo
caduca
hypochon-
driaca.*

feu scintillulae se oculis praesentabant. Nares erant ut plurimum siccores, & si post steruationem vel natura vel arte provocatam pituitam plorabant, malo sequebantur levamen. Alvus valde levis non nisi alternis diebus scybalis durissima reddebatur; sed somnus cum aspectu sibi confabulabat. Variorum Medicorum consilia contra haec mala experiri sibi ægrotans; sed a nullo scilicet auxilium. Quidam haud incelebris, causam in ventriculo habere ratus, emeticum ex tartaro emetico propinavit, idque cum non moveret vomitum, quater adhuc eadem die iteravit, nullo tamen effectu, nisi quod alvus inde duceretur. Inter alia praesidia unus etiam est thermis Carolinis, & tribus quidem vicibus, cum levamine tantum brevi. Non minus hæmorrhoidum, quarum tamen nulla adfuit molimina, provocatus fluxorem, hirsutines ano curavit admoventis; venam bis in pede quotannis præbet secandam; & novissime serum lactis curæ loco potavit. Præterea diartam servat strictissimam; cavet sibi à multis mentis laboribus; magis indulget corporis exercitio; loco cerevisiæ pro potu aqua leviori, vino nupta utitur. Sed quum ex his omnibus nullum levamen, nedum plenariam medelam reportaret; meum flagitavit consilium.

Epieris cum consilio.

1) Vertigo præfens rectissime vocatur hypochondriaca; eo quod fusi natales a malo hypochondriaco mutentur. Hæc autem vertiginis species, si inveteravit, longe perniciosa, curatque longe difficilior est, quam omnes reliquæ, ut ut idiopathica: quoniam omnes totius corporis nervosæ ac valculosæ partes simul a tono suo sunt dejectæ, omnes totius corporis functiones simul languent, & ipsa mens anxia, meticulosa & inconstans est; unde etiam diuturniorem non perferunt medicationem, sed mox hunc, mox illum adeunt medicum, & mox hoc mox illud adpetunt medicamentum.

2) Eo autem gravior est in nostro ægrotante morbus, quum jam omnibus, quæ his in affectibus adhiberi solent, usus fuerit remedia, & novissime tale vitæ genus selegit, quale ad curandos ejusmodi morbos admodum necessarium est: neque tamen minus valetudinem nondum recuperavit. Præterea ad majorem hujus mali perniciam multum contribuit 1) perversa medicatio, qua vomitorium uno die quinque, idque pessimo consilio fuit adhibuit; 2) alvi contumax, nec ullis remediis cedens segnitias; quippe quæ spasticam ini ventris stricturam, una cum majori humorum ad caput raptu sustentat.

3) Quamobrem angusta profecto curationis spes superest; quæ non alia ratione insinui poterit, quam ut ægrotus exactissimè victus observationi insistant; pediluvii tepidioribus, blandis laxantibus; & nervinis utatur; & demum molares Carolinarum thermas sub debito adhibeat regimine.

OBSERVATIO IV.

Vir juvenis, maritus, temperamenti sanguineo-cholericæ, sub regulari narium hæmorrhagia sanus semper vixit: ea vero ineunte ætate cessante, capitis dolor per totam ætatem perpetuo adhaerens sedit. Hic Decembri mense remittebat excipiebatur gravis vertigo cum tendente & lancinante musculorum temporalium dolore, som-

noque turbulento sopito. Juogebantur oculorum obnubilaciones, & ante illos punctula perpetuo obverabantur. Alvus insuper adstrictior erat; & flatulentia, ut ut cibi non nisi molles fumerentur, abdomen cum spirandi difficultate distendebat. Ipse ceterum æger corporis exercitio haud multum studebat, nec unquam sanguinem sibi curaverat detrahendum. Ego itaque consultus fuisti, ut ter quotannis ex pede mitteretur sanguis; vesperi adhiberentur pediluvia; post venæ sectionem emplastrum vescicans ex emplastro de meliloto uscia una, catubaridum drachma una, & balsami Peruviani drachma dimidia ouchæ applicaretur, & per quatuor gestaretur hebdomades. Commendavi etiam Elixir meum viscerale ad octoginta guttas sub epulis sumendum; laxans rhabarbannum bis quavis hebdomade capiendum; & cum recta vivendi ratione loco potus aquam vino permixtam ordinavit.

Epieris.

1) Vertigo, quam præfens ætate adhuc junior patitur æger, duplici nititur causa: quarum unam supprellit & intermisit sanguinis excretionem; alteram flatulenta & spasmodica hypochondriorum pathemata exhibent. Priora quod attinet, duplex ea iterum est; siquidem non solum narium hæmorrhagia per ætatis rationem cessans; verum etiam venæ sectionis, quæ succedere debuisset, intermissio accusari meretur. Alteram, quæ mali hypochondriaci initia significat, testantur alvus adstrictior, borborygmi & flatulentia intestinorum, spiratio difficilis, & digestio viciata.

2) Iisdem causis debetur catacra incipiens sive spuria, quam ægrotus patitur, quomodo significant scintillulae punctula oculis obverantia. Id vitii genus ex hypochondriaci passione generari novum non est: quum enim ob male constitutum ventriculum chylus generetur crassus & impurus; qualis etiam sit sanguis; & hic majori copia ob inferiorum partium spasmos ad caput compellatur, in oculis flagret, & dimittat particulas crassiores: hæ in aequum delapsæ humorum efficiunt eam sensationem, quæ punctula oculis obverari percipitur. Quo ex vino succellu temporis ipsa emergit catacra.

OBSERVATIO V.

Matrona generosa, 1. æ. annorum, temperamenti sanguineo-melancholici, à teneris proptu plerumque vino, & cibis crudis, coctisque difficilioribus uti solita, per mulos variolos morbos toleravit, sed scilicet semper superavit. Post menstruum cessionem hæmorrhoides eruperunt, & per multos annos magno cum sanitate emolumento fluxerunt. Quarum fluxor cum ante triennium sponte siceret; nihil tamen incommodi ad sanitatem inde pullulavit, eo quod venæ sectionibus ac scarificationibus moles sanguinis semper imminuta fuit. At elapso anno quam paucis post institutis circa autumnale æquinoctium venæ sectionem diebus, ostentum iusto majorem comedit quietatem: accidit, ut gravi vertigine, præcordiorum anxietate, nausea, & vomendi conatu corripere; quæ cuncta symptomata, redacta per vomitum multa pituita proterius conquieverunt. Sed interjectis aliquot mensibus longe vehementior redibat vertigo, excrementum frigore, præcordii oppressione, pulluque magno & pleno

Vertigo cum catacra spuria.

Vertigo cum catacra spuria.

spitata; quæ ope clysterum alium solventium, frictionum, & antispasmodicorum paullo mitigata; venæ autem incisione prius iuvata fuit. Neque tamen minus nausea adfligebat adhuc cum intercurrente levi vertigine; quæ dato blando emetico ita debellabatur, ut ægra per aliquod tempus sana videretur. Sed brevis erat valetudo: si quidem circa vernalæ æquinoctium recrudescerebat utique vertigo, cum dorsi & ossis sacri gravissimis doloribus, & per aliquot hebdomadas ægram lecto affligebant, donec prorumpentes hæmorrhoides felicem toti scænz imponenter finem. Circa solstitium autem vehementis terror omne revocavit italem; quod abhinc, suppressis plane hæmorrhoidibus, inque cassum adhibitis intus Egranis, externe Lauchflacidibus aquis, nullis expugnari potuit medicinis, quin per intervalla rediret. Ego demum consultus pro potu decocto cum vino, laxantia rhabarbarina & Elixir nostrum viscerales commendavi; ad firmandum nervorum robur pulvrem ex lapidibus cancrorum, pulvere Marchionis, nitro depurato, succino præparato, cardamomo, & cinnabari nativa præscripti; & venæ sectionem quater quotannis repetendam ordinavi. In ipso vertiginis paroxysmo fualsi, ut anodyli clyster infundatur, tum pedes immittantur pediluvio, & interne aliquot balsami vitæ cum quindectim liquoris anodynî guttis remixta exulcerant.

Eperisfa.

Fœminas, quibus post mensem cessationem hæmorrhoidalis fluxus flatu tempore contingit, easdem ab eo utilitates circa sanitatem sentire, quas ex legitimo menstruorum fluxu perceperunt, quotidiana docet experientia. Quod si vero utraque excretio ob quæcunque causas cessat; rectissime sibi consulant, qui earum vicem artificialibus sanguinis supplet misionibus. Quemadmodum vero hæc sub debito regimine administrata, incomparabilem inferunt sanitati ulum: ita neglecto regimine, multorum auctores sunt malorum. Et id in præsentî contigit etiam casu: immoderatus enim obstratum ulus mox a venæ sectione, ansum præbuit cunctis, quæ sequuntur affectionibus. Nam post venæ sectionem per aliquot dies ab omnibus coctu difficillioribus cibis abstinendum est; quia ventriculus iusto debilior, hisque discernendis impar exsistit.

2) Dilatus etiam ex præsentî casu, quantas & in producendis, & revocandis morbis vires possideat vehemens terror. Ægrotans nostra, si post adhibitam medelam, recte vivendi rationi statuisset, procul dubio ab omnibus libera permanisset symptomatibus. Sed terrore omnia rursus exacerbavit; quippe qui confringendo corporis habitum, ad interiora & superiora repellit vitales succos, qui accumulati in partibus nondum firmatis, præstulas habent scenas.

OBSERVATIO VI.

Vir generosus, LVI. annorum, temperamentum sanguineo-cholerici, viæ sedentariæ addictus, a prima infantia ad vicesimum circiter primum ætatis annum, variis efflorescentis scorbutis, asthmaticis affectibus & largis narium hæmorrhagiis laboravit. Etate adolescente arthritici artuum & dorsi motus accesserant; sed venæ sectione circa quodvis æquinoctium abhinc administrari solita mitigati, in fluxum tandem

hæmorrhoidalem deficerunt; quo per multos annos singulis ferme mensibus cruoris, una parca quantitas cum singulari sanitatis alteramento effluxit. Ante triennium parcius promanavit cruor, & per novissimum annum fluere prius desit: quo tempore sanus quidem vixit, nisi quod per intervalla efflorescentiæ purpuracæ, cum doloribus artuum tenensivis, flatulentis, cordis palpitantibus, & nocturnis pollutionibus cor, ut occuparent, hancque præsentem scenam Decembri & Aprilî mensis lustrant. Novissime accesserunt vertiginosæ molestiæ, quæ cum cordis palpitantione, inflatione abdominis flatulenta, & crebris ructibus, post prandium æque ac cenam gravius adfligebant; sed adhibitis congruis medicinis evanuerunt. Quam autem earum recursum, quin apoplexiam timeret, meum flagitavit consilium. Quare fualsi, ut sub convenienti diætâ, & acidorum, spirituosorum ac vinolorum evitacione, nec non debita venæ sectionum continuatione adhiberet pediluvia; sub epulis caperet Elixir nostrum viscerales, pro potu uteretur decocto ex bordeo, radice cichorei, semineque fœniculi; & quandoque pilulas balsamicas cum pulvere præcipitante sumeret.

Eperisfa.

1) Innumeris exemplis & observationibus confirmari potest, quod qui in juventute largis narium hæmorrhagiis obnoxii fuerunt, his progrediente ætate cessantibus, arthriticis ac hæmorrhoidalibus afficiantur patientiis. Quibus omnino medelam ferre licet, si vel hæmorrhoidium regularis fluxus provocari potest; vel convenientes instituantur venæ sectiones. Unde etiam nos ter ægrotans sanus vixit, quam diu fluxerunt hæmorrhoides.

2) Quod si vero hæc suppressum excretio; quam vel sola vita otiosa, crassos reddendo humores & excretionibus ineptos, suppressere valet: flagrant succi in imo venire maxime ventriculo & intestinis; quæ debilitantur exinde & officio digestionis rite perficendo minus sunt idonea. Hinc gignantur cruditates in primis viis: quæ ventriculi & contentinarum partium spasmodicas excitando stricuras, vertiginis in nostro casu causæ fuerunt.

OBSERVATIO VII.

Vir LXVI. annorum, robuste & sanæ constitutionis, aliquando circa vespertinum tempus vehementi exardescens iracundia, sanus quidem lectum petiit; ut mane surgens, tanta prehendebatur vertigine, ut iterum in lectum proflerneretur. Eidem etiam per aliquot menses affixus fuit; donec exhibita remedia id quidem efficerent, ut munis domesticis fungi, & obambulare potuisset; nihilo minus vertigo pertinax continuat, ægrotantque per vices subito in terram prostermit. Cui cum medelam quaereret, fualsi venæ sectionem bis quotannis celebrandam; dedi insusum theiforme ex mellissa, citricque corticibus; & pulvrem, qui cornu cervi philosophice præparatum, pulvrem Marchionis, lapides cancrorum, succinum præparatum, nitrum & cinnabarin habebat. Unde factum, ut conjuncto balsami vitæ externo usui haberet egregie.

Vertigo
perpetua
et m.

Vertigo ex
Stomacho.

Epicrisis.

Senes, quamvis illibata sanitate magnoque corporis & animi vigore fruuntur, accidunt tamen sepius, ut gravi animi perturbatione, subito terrore, vel inveniendi ira in ingentem virium defectum, quin etiam in affectus vehementer caput insensantes incident; idque eo magis, si sanguine abundant, vel critica huius evacuationes cessant & constricta venæ scilicet intermittitur. Quo in casu opus omnino est, ut sanguis mittatur & vehementes nervosorum partium commotiones blandis sedativis sopiantur, abstinendo ab omnibus his calidis nervinis, quæ sanguinem valde commovent. Est alias liquor noster balsamicus, qui balsami vice nomine venit, in affectibus senum, capitis præsertim, & accendis & sanandis efficacissimus & crebriori usu comprobatus, remedium. Cavendum tamen ab eo est summopere, ubi vasorum est plenitudo, & dispositio ad motus hæmorrhagicos & congelorios.

OBSERVATIO VIII.

*Vertigo
endit in
sanguine
explet, per
marcom
que videri
tota.*

Vir Reverendissimus L. annorum, temperamentum cholericum-sanguineum, obesum & procerum, in juventute narum hæmorrhagiam sub illibata sanitate expertus, nec ullis unquam morbis, nisi bis tertiana, novissime ictero diffusâ, fuscatus, ob insignem sanguinis & humorum copiam per viginti jam annos venam medianam quotannis tundendam præbere solevit. Neque vero minus per quindecim annos hæmorrhoides bis vel ter quotvis anno absque ullis incommodis, nec sine egregia valetudine fluxerunt; quæ vero quotvis abhinc vel quinque annis febiles commotiones nunquam non habuerunt præcursoræ. Sed per novissimum triennium mutata sunt rerum facies; siquidem per crebra intervalla vertiginosus accessit insultus, quem semper comitatur sunt hæmorrhoides cæcæ, adeo ut eo tempore non nisi bis fluentes fuerint. Hinc vertigo magis magnique increbuit, caducæ speciem omnino referens: etenim ex improvviso cuncta videntur in gyrum rotari, pedes vacillant, titubant, ægæque lapsum evitaturus, desidere tenetur; tum vero magnam capitis imbecillitatem sentit, maxime in cervice, ut caput erectum tenere nequeat, sed pectus illud adplicare teneatur; præterea auditus difficilis cum tinnitu auris sinistra infestat, æger appetitu fruiq; integro, alioque gaudet apertis; sed crebri vexant reclusi, & insignis mucicquantitas laborioso nonnunquam redditur creatu. Contra quæ mala cum plura pharmaca, nec non li-rudines frustra fuerint adhibiti ego consultus suasi, ut servatis recte vivendi regulis, venam bis terve secandam quotannis daret; crebris uteretur pediluvii; quavis hebdomada alvum pilulis meis balsamicis laxandam curaret; sub epulis Eliæ meum viscerales, oleo macis & cinnamomi nupum caperet, & vespere nonnunquam pulverem ex antimonio diaphoretico, succino præparato, lapidibus cancrorum, nitro, arcano duplicato, & cinnaburi usurparet.

Epicrisis.

1) Hæmorrhoides insignem cum ventriculo &

intestinis habere nexum, crebra docet experientia. His enim impediens fluentibus, vim concoctricem ac peristalticam dictarum partium admodum debilitari, passionemque sic generari hypochondriacam; & vicissim labefactato intestinorum tono hæmorrhoides produci symptomaticas, quam plurimis dâci exemplis. Idem in præsentî casu contigisse, inque primis ex hæmorrhoidum immineo fluore primas vias vitium contraxisse; vel crebri reclusi mucicque secretas testatur. Quem vero figis, ventriculo male habente, omnino generari vertiginem.

2) Sed huius in hoc casu ratio adhuc ab ipsius sanguinis copia, & ad caput facta congestione accendenda videtur. Scilicet dum fluxerunt hæmorrhoides; natis in abdomine spasmus, humores copiosius ad caput rapiti, disscenderunt vas, compresserunt nervos, turbant sufficientem liquiditatem in eos influxum, & sic produxerunt vertiginem, nervosarumque capitis partium debilitatem. Spasmus inferiorum partium sub paroxysmo significant frigus extremarum partium; quibus remittentibus, cæcæ adparuerunt hæmorrhoides.

3) Febiles commotiones, quæ hæmorrhoidum antecesserunt fluxum, significant, sanguinem jam crassiores & ad excretionem minus aptum fuisse. Observamus enim, spasmodicos ac febiles motus omnem fere antecedere hæmorrhagiam, & eoque vehementiores, quo hæc succedit difficilis.

OBSERVATIO IX.

Serenissimus ætatis annorum XL. à patre genitus podagrico per omnem fere vitam nunquam ægrotavit, nunc vero per quinquennium gravis vertigo subinde adeo eum invadit, ut vacillantes pedibus eum prostratus; ut plurimum periodice, circa octavam matutinam & vesperti circa quintam incidit, mox levior, mox gravior; accisionem tinnitus & auditus difficultas cum oculorum supore & obnubilatione antecedit, facie existente rubicunda & venis turgida. Ubi paululum affectus remittit, pronus pectoris cum ambelosa spiratione oppressio & dolor ac spasmus femorum, nonnunquam etiam vomitus vel conatus ad vomendum, neque minus dolor in reddenda urina adiunt. Solvitur malum ingenti matæ tartaræ per urinam secretionem. Pedes subinde frigidissimi, rævertunt circa malleolos, nunc per quatuor hebdomadam spatium tument cum dolore tensivo, torpore & debilitate, inprimis post pediluvia & tum levius malum exiit. Sanguinis vacuabones criticæ per omnem ætatem vixisse nunquam, ad vero circa æquinoctialia tempora sine incommodo sanguis creatu fuit reiectus, qui postea per annum ter incitâ venæ evanuit. Consultus ego suasi venam singulis anni quadrantibus in pede secandam & ut abstineret æcerevisia valde lupulata, venere, vini potu, cui paulo largius indulsit, aquam pro potu suavitatem pedes probe à frigore defendat eosque maneant pellime continere, non nudet, pediluvia vero frequentius adhibeat & ad vim ventriculi concoctricem confirmandam in prædico temperamentum balsamicum meum sic dictum viscerales ad sexaginta guttas assumat. Suasi quoque ut instante vere fontem Egranum cum debito regimine interposito pilularum balsamicarum usu biberet.

*Vertigo à
frigore pe-
dum &
incom-
modis tri-
bus notata.*

Epicrisis.

Hoc capitis frequentissimum vitium, ut sepius obier-

observatum à me est, à liberiori vini potu, extremorum frigore, sanguineæ evacuationis five per naturam five per artem defectu in sanguine plenis subinde oboritur & laborantem sæpe diu trahit, immo, nisi commodis auxiliis succurratur, in apoplexiam & mortem præcipitat. Ubi ex hæcæ causis nascitur malum, ego levissimis, facilissimis & promptis modo enumeratis remediis dieteticis plus præstari, quam generosis pharmacis. Sed opus est, ut ejusmodi victu & vivendi ratione diutius ægrotantes utamur.

OBSERVATIO X.

Illustrissimus Comes annorum LXIII. in juventute semper robustus & loric valens, temperamenti sanguineo-cholerici, corpus venationibus probe semper exercuit: ante viginti annos Silesiæ in continuum & acutam febrem ex abusu vini Hungarici incidit, quæ naturæ vires ac robur corporis adeo infirmavit & deliravit, ut vix intra tres menses functiones tam vitales quam naturales in ordinem redigi potuerint. Ab eo tempore imbecillitatem capitis cum vertigine per intervalla expertus est, quæ succedente tempore invadens ante quadraginta annis tam vehemens facta est, ut in terram Illustrissimum Virum præcipitaverit. Et licet crebriores hujus affectus accessiones per repetitas venæ sectiones, leniter purgancia & alia commoda remedia fuerint præparata, attamen adhuc ex vicio digestionis sub subtilis temperatis mutationibus incurrunt. Quod pessimum vero est, comitatur hoc vitium vires audiendo diffultas & visus obnubilatio. Vires præterea constant, somnus placidus, & major quam decet & laboris exercitacionique necessitas exigat, ciborum est appetentia. Inflantes vero cibos ac pingues, quorum ulum frequenter soda excipimus bene ferre potest. Pro potu sumit aquam & singulis diebus duas vini Moellani bibit mensuras, facies est florida, subcuncta. Per sex fere annos verno tempore fonte Egrano usque singulis fere annis quater, quique, imo sex V. S. admisit.

Epietisæ cum Consilio.

Infirmiorem, quæ magnos & diuturnos morbos sequitur, aliis gravibus morbis, qui inde prodeunt, obnoxia esse, & hæc història & multæ alie nobis cognite manifestò satis confirmant. In ejusmodi diuturnis visis ego vix aliud quam dieteticis remediis usum esse animadverti. Interdum itaque ex hoc fundamento liberalem vini usum; motum vero & exercitacionem corporis ad sudorem usque per viciationem aut equitationem, neque minus abstinentiam à cibis, præsertim mucilaginosi, stultitenti, pinguibus ac victum parvum & extenuantem imperavi, utpote cum ex sanguinis & succorum abundantia plerumque ad imbecillius caput congestio præciscitur. Et quia ventriculi imbecillitas id vini valde fovere & augere solet, semper omnino Medicum, ea quæ concoctionem juvant, proponere oportet; quo nomine Elixir meum vitæale, idem quod in usis in Pæterium præscriptum est, principem sibi vindicat locum. Postremo, hanc ceu perpetuam, & quæ meretur notari, observationem subnectere hoc loco volui, idque maxime in gratiam juniorum Medicorum: in capitis affectibus, ut in vertigine, auditus difficultate, ubi à sanguinis abundantia ortum traxerint, communia illa adversus ejusmodi morbos commendata cephalica, vel vina bals-

Frid. Hoffmanni Oper. Tom. III.

mica, ad quæ etiam pertinent balsama apoplectica, & balsamum nostrum sic dictum vitæale, nec externe nec interne, nisi cum maxima prudentia exhibenda esse, eo quod majorem motum & organum in humoribus excitando & consequenter stagnationem efficiendo pessimum esse vitæ producant.

OBSERVATIO XI.

Litteratus XXXIII. annorum, temperamenti sanguineo-cholerici, animi sensibilioris, crebris mox lucubrationibus & meditationibus, mox computationibus, mox animi pathematibus indulgens, nocte aliquando in frigido conclavi scribendo transacta, mane facturus iter ex improviso gravi corripitur vertigine, quasi caduca: quippe ultra horæ spatium instat attoniti jacebat, oculoque celeriter invitatus movebatur, tum facies instumescerebat, & paroxysmus sensim, relicto corporis languore, remittebat. Abhinc quavis circiter hebdomade redibat; & novissime sic se habebat: prævia insigni inacidia, cum mensæ præsens adscendere vellet, frigus pedum, tanquam regularem mali prænuncium, sensit; hinc dissipatur affectu discurrete per conclave nititur, sed vertigine opinione citius accedente præpedi, pedes aquæ tepidæ immergit, & ex aqua frigida trigena liquoris anodynæ gustas sumit. Unde factum, ut paroxysmus, qui alia per aliquot horas inhaerebat, non solum protinus cessaret, verum etiam minor esset, & non nisi levis lassitudine fere existeret. Verum cum nihilo minus per intervalla posthac reverteretur accessio: meum ad eam penitus abigendam implorabat consilium. Quamobrem fiscali primum, ut venæ sectionem, quam antea singulo tantum biennio admiserat, his quotannis administrandam curaret; deinceps corporis exercitio, & tranquillitatis mentis probe studeret; pediluvii tepidis frequenter uteretur; pro potu ordinario adhiberet fontem Selteranum; quavis hebdomade pilulas balsamicas cum pulvere præcipitante usurparet; & mane denique ex infuso theiformi guttas quadraginta mixturæ, quæ habebat liquoris anodynæ, stultura antimonij, acris ana unciam dividitane, balsami vitæ drachmam unam, sumeret.

Epietisæ.

1) Hæc vertigo rectissime vocari potest spasmodica; eo quod à spasmodis ac striculis partium infernarum, succops vitales ad caput compellentibus in singulo paroxysmo originem traxerit: id quod frigus pedum, quemvis paroxysmum antecedens testatur. Et tali in casu utique consilium est, pedes mox sub accessione initio tepidæ aquæ immixtere: nec sine fructu adsumtus sub ipso paroxysmo est liquor noster anodynus; siquidem hæc remedia non geocera, spasmus partium externarum relaxando, omnino avertere paroxysmum potuerunt.

2) Causa occasionalis, quæ hanc vertiginem introduxit, frigus quidem est; sed recte dicitur occasionalis, quoniam in corporibus, quæ non jam aliqualem dispositionem foverit, tam gravia non semper excitat mala. Noster autem ægrotans cum partim per crebras animi commotiones, partim etiam multas lucubrationes, & fluidorum crassitiam & solidorum debilitatem sibi contraxisse videtur: ex facili accedente frigore in vertiginem potuit incidere.

3) Quod sub paroxysmo vertiginoso oculi moti ac velut convulsi fuerint, id cum vertigine

Vertigine.

Vertigo cum cæcitate diffinitio & curatio.

essentia facile conciliari potest. Nam vertigo dependet à quasi-paralytica nervi optici relaxatione & motus oculi à pari nervorum tercio, seu oculorum motorio: qui omnino convelli potest, altero nervo existente paralytico.

§. IV.

Quum in gutta serena oculus externe ab omni vicio liber constituitur; haud sine ratione colligimus, causam mali non in ipso oculo, sed nervo potius optico esse querendam. Et hoc idem evidenter demonstrat incisio eorum, qui per vitam luminis usu caruerunt: hæc enim docet, nervos opticos fuisse nimium extenuatos, maridos ac duplo minores: Vid. BONETUS *Sepulchr. l. 1. Sect. XVIII. obs. 3. & 4.*: vel sero aut sanguine per cerebrum extravasato circumfusos & compressos, sicut adnotavit WEPFERUS *de apopl. hist. 4.*: aut tumore duriori obfessos, qualem circa eorundem originem vidit BONETUS *l. c. obs. 1.* PAWIUS *obs. anat. 2.* contexit velicam aqueo humore plenam, disclis nervis circa eorum conjunctionem insidentem; PLATERUS tumorem globosum prope nervos vitorios in gutta serena laborans post mortem deprehendit, & BONETUS *l. cu. obs. 5.* observavit arteriam carotidem, eo quo orbitam ingreditur loco, sanguine turgidissimam.

*Sectionem
gutta serena
in pinguetibus.*

CAPUT IV.

De gutta serena.

THESES PATHOLOGICÆ.

§. I.

*Gutta serena
descriptio.*

GRAVE malum est cœcitas, quam Græci ἀπὸ πύκτου, Latini guttam serenam, quasi gutta quedam obturasset nervum opticum dixerunt, & nos per visionem ab influxu fluidi nervi in nervum opticum prorsus intercepto, oculum illis existensibus, sublatam describimus. Sub ea, si exterius oculum inspicias, sanus & integer apparet oculus, neque in tunicis ipsius, neque in humoribus labe conspicua est ulla, tantum quod pupilla naturali amplior, nigrior, nimiumque dilatata compareat, & ad radiorum luminosorum illapsum rigida spectetur & immobilis: nihilo minus visio vel prorsus est abolita, vel saltem facultas restat tenebras à luce discernendi.

§. II.

*Diffinitio
gutta serena 1.) à vertigine,*

2.) à cataracta.

Distinguit ergo semet hic morbus 1.) à vertigine, in qua circumgyrationis sensus, & pedum ad eam vacillatio, fluidi vero nervi influxus nec prorsus est interceptus, sed saltem imminutus, nec etiam perpetuo talis. Differt etiam 2.) à cataracta; nam in hac crystallinus humor opacus cernitur, & pupilla ad lucis splendorem coarctatur, in tenebricosis autem locis dilatatur: contra in gutta serena per pupillam pellucidus adparet humor crystallinus, & pupilla, sive sit in lucido, sive obscuro loco, nec contrahitur, nec magis dilatatur, sed permanet immobilitas.

§. III.

*Historia
gutta serena
causa.*

Neque vero eadem semper ratione se noster habet morbus: mox enim subito & repente invadit, ut plerumque fit, si ex violentis & externis oritur causis, ut post caliam ab alto & gravem capitis percussione: Vid. HILDANUS *Cent. V. Obs. 8.* et AMATUS LUSITANUS *Cent. V. Obs. 64.* mox succellive visio perditur, quod in senibus potissimum hemiplexia vel paralyti affectis, aliisque languidis contingit corporibus: mox afficiantur capitis dolores, vertigo, somnolentia, tinnitus & sulsus aurium &c. mox vero vacat his symptomatibus, solaque cœcitate adfigit. Datur quoque gutta serena periodica, que subito invadens, & per aliquot horas vel dies durans, sponte cessat, sed sæpe revertitur, ut sere fit in pochochidricis, hylericis & parturientibus. Dividitur etiam in *perfectam* & *imperfectam*; in illa ulla nec visio, nec ullum luminis vestigium superest; in hac lumen adhuc à tenebris discerni potest, & videtur ad hanc quoque pertinere dimidiatus visus, cujus peculiarem speciem describit CHR. SIGISM. WOLFFIUS *diff. de amaurosi imperfecta* 1709. Trajecta habita; ubi quis non nisi truncum inferiorum cum pedibus in homine potuit videre,

§. V.

Multi quippe & tantum non omnes, accusant nervi optici obstructionem à lymphâ crassiuscula, qua tubuli hoc in nervo occiduntur, ut liquidi nervi ad retinam affluxus, vel sufflamineatur, vel intercludatur plane. Verum nondum ab Anatomicis evictum est, nervis inesse canaliculos & tubulos, per quos liquidum recto vehatur tramite. Neque etiam per cerebri & oblongaram medullam crassior & coherens lymphâ, sed longe tenuissimum & ad cohesionem minime aptum liquidum fertur. Hinc in nervos obstructionem cadere nequam videtur credibile, multo minus in optici nervis obstructio à materia ex cerebro advecta commodum invenit locum. Cunctis his in casibus nervorum opticorum ea debet fieri compressio, que omnem fluidi nervi in eos influxum tollere, adeoque paralytim illorum valet inducere: unde sequitur, causam gutta serena proximum esse nervorum opticorum paralytim. Jam ex anatomica oculi structura notum perspicuumque habemus, nervum opticum, simul ac ossam oculi orbitam & hanc investientem peristomium penetravit, atque exterius, quod à dura matre recepit, involucrium ad constituendam scleroticam deposuit, altero involucrio, pia meningis propagine, utramque, processus ciliarios, & pupillam formare, medullari vero substantia tunicam mollem & pulposam, que retina audit, continere. Notissimum porro est, retinam picturas objectorum visibilibus recipere, illas ad sensorium commune per nervum opticum propagare, tumque visionis ideam in mente excitare. Ad sentiendam vero externa objecta opus esse nervosarum partium tensione, que in legitimum fluidi nervosi influxum consistit, capite jam primo de nervorum resolutionibus fuisse demonstravimus. Quum autem in gutta serena adest paralyti nervi optici & per consequens tunicæ retinæ, utere ac processum ciliarium sequitur, has partes nec tenas esse, nec recipere posse radios luminosos, sed pupillam ampliatam & ob relaxatos processus ciliarios dilatam adparere. Nec aliud in oculo cernitur vitium; sed & motus humorum, & musculorum eorumque optime se habet. propterea quod & vasa succos vehementia & musculi non ab optico, sed aliis nervis, qui non sunt affecti, suas recipiunt propagines.

*Gutta serena
causa.*

§. VI.

§. VI.

Gutta serena tam perfecta, quam spuria ferat.

Causa igitur, quae comprimendo nervos opticos, horum paralytin inducit, haeret vel circa illorum principium, seu thalamus, vel circa eodem oculorum orbitam ingredientem. Sed haerere etiam potest intra ipsum nervum opticum, & quidem in vasa sanguinea; quae in ejus medullatio latent; & quorum praeterea non modo recentissimi anatomicorum, verum jam WEPFERUS L. de Cist. aquatica pag. 127. demonstrant. Haec vasa, quae carotidis propagines sunt, ut & alii carotidis rami, orbitam ambiunt, si crasso visci flagnatione infarciuntur, premunt disceduntque medullares nervorum canaliculos, simulque lymphae per vasa nervos cingentes reditum impediunt. Haec videtur causa guttae serena periodicae, quae discussa sanguinis flagnatione statim cessat. Porro etiam verisimile videtur, in spuria amaurosi nonnunquam feram intra tunicas oculi, maximeque scleroticam fecedens, opticumque comprimens nervum esse accusandum: ubi perennante à tergo fluidi nervi affluxu, ejus quaedam ingreditur portio, quae tantum relinquit visionis, quantum ad discernendam à tenebris lucem requiritur.

§. VII.

Subiecta & occurrentes causas ferat.

Quamvis morbus noster omni sexui & aetati sit incitissimus, si causae externae violentiae, quae gravem capitis percussione, cerebri concussionem, & humorum circa nervos opticos flagnationem provocant, accesserint: atamque si ex internis enascatur causis, familiaris potissimum est subiectis valde plethoricis, pituitosis, cachecticis, senilibus, & quae caput nervosumque genus à praecedentibus animi affectibus, diuturno moreore, anxia cura, nimis vigilis, ac capitis laboribus, intemperativis studiis, lectione minutarum litterarum ad lucis splendorem, frequenter ebrietate, diuturno frigore, & haereditaria dispositione imbecillum sibiinet contraxerunt. Et in eo quidem convenit cum reliquis cerebri affectibus, quod utplurimum cerebri atonia nitatur.

§. VIII.

Medicamentum vel iniectionem tam comode refertur possunt.

Si mediana spectemus causas; illae vel ad repletionem vel inanitionem commode refertur possunt. Ad repletionis classem pertinet gutta serena, quae à sola sanguinis, plus minus cralli in vasis cerebri, nervo optico concrementis, flagnatione proficiscitur; & non solum transitoria nonnunquam ac periodica existit; verum etiam, si recetus fuerit, medellae locum reanquit. Talis evenit 1) summe plethoricis, à vehementiori corporis motu, balneois nimis calidorum usu, fortiori iracundia &c. qualem casum in CONSULT. MED. Sess. I. cas. XLII. relatam legimus. 2) Parurientibus, vel in ipso partu, quae debetur vehementissimis imi ventris stricturis, humores ad caput summo cum impetu propellentibus, & à BARTIUS in Ophthalmod. p. 6. C. 2. der febricitante Weiber-Saar vocatur; vel post partum, si fuerit laboriosus, & comprimis lothiorum accesserit defectus; qualem casum in CONSULT. MED. Sess. I. cas. XLIV. Meminit quoque Frid. Hoffmanni Oper. Tom. III.

PECHLINUS L. I. obs. 42. gutta serena, quae cum cephalalgia singulis incitissimis, deficienter uteri purgatione, adhibebat. 4) Hypochondriacis, hysteritis, & qui gravioribus imi ventris torquentur spasmodis, quibus scilicet humores ad caput conjuntur: unde notabilis est observatio, quam A. N. C. dec. III. avo III. obs. 81. recensent de gutta serena, vehementem colicam cum alvi obstructione stipatam excipiente, & hac per clysteres curata, protinus cessante.

§. IX.

Quemadmodum vero gutta serena, quae à sola sanguinis flagnatione ortum trahit, est transitoria: ita è contrario haec si diutius obhaeserit, & subiecta pituitosa, cacochymica occupaverit, dimittendo serofam, quae ad nervos incurbit, portionem, diuturniorerit & saepius immedicabilem producit morbum. Novum igitur non est, à purpura, scabie, ulceribus, achoribus (vid. A. BEROL. Dec. II. Vol. VI. pag. 28.) intra corpora remanentibus id vitii oboriri; vel infantes imbecilliores, & qui humoribus abundant, eodem infestari; praeterea ubi non bene proderunt morbilli, vel ineffecta humicis obducuntur. Idem fit post morbos acutos, febres malignas, variolas, phrenitidem; humore videlicet per metastasin ad nervos opticos decumbente. Nonnunquam plethorici vel cacochymici ex fortiori vel purgatione vel vomitione coactum sibi contrahunt; sicuti de vomitionis observavit GULDENKLEE L. I. epist. 20. pag. 498. Comprimis vero mercurialia inepte, & in corporibus impuris adhibita, lymphae pertinacem flagnationem inferendo, ad hoc malum contribuant.

§. X.

Haec causae ad repletionis spectant titulum; sub inanitionis autem voce compiector nimias ac immoderatas succorum vitalium profusiones, quas nonnunquam guttam excipere serenam, experientia testatur. Praeterea id contingit post effluens haemorrhagias; & speciatim abortum excitatum observatur post vomitionem cruentam largiorem A. N. C. vol. II. obs. 52. post nimiam venae sectionem in grvida ibid. obs. 45. post detractum largiter e vena frontis sanguinem BONETUS L. I. Sess. XVIII. obs. 2. app. Dum enim humor vitalis exhauritur, collabuntur vasa cerebrum perreptantia, secretio fluidi nervi immittitur fit, & inde vertigo, gutta serena, animi deliquia, aliaeque propullulant incommoda. Praeterea vero notari meretur insignis consensus, qui hoc in casu oculos & partes genitales intercedit: siquidem observamus, ex immodica & intemperativa venere sapas oriri coecitatem, quam ego hystories adnotavi & CONS. MED. Sess. III. Cas. CIV. recensui. Fluidum scilicet lymphaticum feminale cum eo, quod in cerebro secretum, & per nervos distribuitur ejusdem ferme indolis est & essentiae: quare quo copiosior illius effluere, eo paucior hujus secretio, unde partium nervosarum atonia, vitium imbecillitas, & ipsa sequi solent coecitas.

§. XI.

Gravissimum & pernicissimum gutta serena est malum; & inprimis si perfecta, si inveterata fuerit, sique senes & claustra subiecta occupaverit, nullum medellae reliquit locum, tantum abest, ut graviore tandem apoplectici & paralytici superveniant affectus. Contra malum re-

2) in oculis ferat.

2) in oculis profusione succorum vitalium.

Proposita gutta serena.

cena, quod imperfectum est & in oculorum duntaxat tunicis hærentem agnoscit causam, præsertim in junioribus & robustis subjectis, interdum sanatur. Non minus curationi cedit ea, quæ periodica est, & à sola sanguinis stagnatione dependet: quæ vero paralytica, aliisque capitis morbis jungitur, periculum portendit vix superabile.

THESES THERAPEUTICÆ.

§. I.

Indicationes curationis.

Cutandi guttam serenam ratio admodum est difficilis; quippe remediolorum vis remittas has, ac in ossa, crania theca absconditas partes minus subire valet. Neque tamen minus incumbit Medico, ut quid valeant humeri, experiat, curationemque pro causarum ratione accommodatam instituat. Hæc vero bitis absolvitur indicationibus, quarum prima disquisitionem humoris stagnantis, & nervos comprimentis; altera affectuum partium roborantem respicit.

§. II.

Quando prima indicatio præcedenda sit.

Ad primum, qui difficillimus est, obtinendum scopum, generosiora, & quæ vocant heretica, in ulum vocare juvat remedia. Quod si igitur ferus humor in cerebro effusus stagnaverit, sicut fieri solet in subjectis pituitosis, cachecticis, cacochymicis, item post remanens exanthemata, & si affectus recens fuerit: magnam profecto præsidium est in caustero actuali, syncipiti vel nuchæ inlato; cui etiam substitui potest fetacum. Duplici hæc remedia operantur ratione, dum videlicet parim excitando dolorem, tremulam quandam & vibratoriam motionem tenuissimis cerebri fibrillis infundit, partim affluxum humorum, qui plenius vulneris inflectum sequitur, proritando, succos stagnantes à cerebro & affecta parte avocant. Et si quid sperandum auxilii; id sane à tali remedio in hoc affectu longe certius, quam a vesicatoriis vel fonticulis obtinetur.

§. III.

In gutta ferena à sanguine purganda.

Contra, si à sanguinis stagnatione ortum sit malum, uti fit in plethoricis, florida & rubicunda facie, pulsusque magno præditis, & excretionum sanguinearum retentione laborantibus: cavendum à tali remedio, & à sanguinis potius missione inchoanda medela. Utilis hoc sine est venæ sectio in pede; sed longe utilior incisio venarum frontis aut arteriarum temporalium. Et hoc quidem præsidium ipsa docuisse videtur natura; siquidem exemplis confirmatum habemus, cecos ex vulnere fronti inflicto, & hinc sequuta larga hæmorrhagia visum recuperasse. Neque alienum est, hirudines temporibus adnovere; aut in defectu fluxus hæmorrhoidalis, eisdem ano adplicare; aut si suppressa fuerit narium hæmorrhagia, has inserto stylo pertundare; ut citæ & efficax fiat sanguinis ventilatio.

§. IV.

Quomodo gutta ferena adhibenda sit.

Deinceps ut in omni oculorum valetudine, ita quoque serena gutta maximopere juvat, alvum esse fusorem; quo stagnans in capite humor ad inferiora ducatur. Eo sine adhibenda remedia non decet esse drastica purgantia; sed blanda laxantia roborantibus nupta, qua laude possent pilule balsamico-cephalicæ, quarum capite de paralyti-

exemplum proposuimus. In usum quoque trahi possunt pilule nostræ balsamicæ, cum mercurio dulci & extracto panchymagogo *Crestii* combinatæ: nec contemnendi clysteres, paulo efficaciores; quorum virus illuistris est, si imi ventris stricturæ concurrant.

§. V.

Quando malum valde est investitum, & à lymphæ pertinacis in vasis nervos opticos cingentibus stagnatione sustentatur: præmissis iis, quæ proposuimus, unica spes in validioribus discutientibus, iisque potissimum internis est sita. Quo nomine bina præsertim remedia reliquis palmam præripiunt; quorum unum est sulphur antimonii pro nostra methodo correctum; alterum cinna-baris. Confici ex his potest sequens pulvis: *recipe cinna-baris nativæ præparatæ, lapidem cancerum, succini præparati ana drachmas duas, salis volatilis succini, cornu cervi ana grana decem, M. F. pulvis div. in 12. partes, quarum singule tria vel quatuor sulphuris antimonii grana addi possunt.* Exhibetur pulvis talis quavis vespere; hauritur sequenti mane infusum, quod ex herba melissæ, semine fœniculi & radice valerianæ conficitur. Interponi etiam debent laxantia; jungi vietus tenuis & exlicans, & subjugari balsamica. Et si his cedere recuset morbus; confugiendum ad lenem salivationem, cujus ope nonnullos à cœcitate gravi sanatos novi.

§. VI.

Diētis hæc & interponenda & subjugenda sunt externa discutientia, nervina, balsamica. Ex iis illustrem discutiendi facultatem possident sternutatoria; & cumprimis sal volatile ammoniaciasticum, & cum oleo salviæ, majoranæ, balsamique Peruviano maritatum, nribusque attractum, vel longe adhuc efficacius extractum ligni Guajaci resiniforme, quod ab evaporatione decocti ex hoc ligno remanet & a me inventum est. Cujus unum vel duo grana natribus suscepta vehementer cum sternutamento pituitam ex intus capitis eliciunt. Imponi etiam oculis potest fœcculus ex radice valerianæ, semine fœniculi & floribus rosarum paratus, & aqua scopetaria, quam *Leau d'arquebuse* vocant, irroratus; aut iidem vapor ex recensito §. superiori infuso admitti. Omnium vero vim longissime superat balsamum vite nostrum, partim temporibus inunctum, partim aliquo guttulis saccharo exceptum & deglutitum: cujus usus me cœcitate inter initia non semel discussisse memini.

CAUTELE PRACTICÆ.

§. I.

Præsertim cœcitate vel fetaces adhibeantur; opus est, ut corpus tam à sanguinis & humorum nimia mole, quam ab eorum impetitate, & penne viæ ab omni saburra liberentur. Quo scopo præmittendæ sunt sanguinis missiones, blanda laxantia, & medicamina sanguinem dilucentia & depurantia. Eadem esse debet cautio in usu sternutatoriorum, ne scilicet, antequam corpus & caput iusta purgatione levatum fuerit, adhibeantur, quoniam alias humorum vehementiorem ad caput affluxum causantur. Verum eadem, corpore rite præparato, inter morbi initia desideratissimam ferunt opem.

Cautio circa gutta ferena.

Reverentia & discutiendi facultatem.

Cautio circa remedia.

§. II.

Circa bal-
simum
vitis.

Ex roborantibus discutiente simul virtute præditis balsamum vitæ rhenum excellenti contra guttam serenam pollet efficacia; cumprimis si ea à decubitu seroti humoris ad nervos opticos in sub-
jectis pituitosis ac phlegmaticis originem traxe-
rit; quo in casu novi balsamum illud inter initia
capitis fronsque cum linteis admodum omnino
fufillidisse cœcitatem. Eo autem cautius utendum
in corporibus sanguine plenis, ubi sanguinis co-
pia & congestio malum inducit; tum enim tem-
perantia potius atque tam molem humorum im-
minuentia, quam ejus organum componentia
sunt proficua.

§. III.

Circa cer-
viciam.

Externorum quod attinet usum; nemo non vi-
det, cum in vera & inveterata amaurosi prorsus
esse frustraneum; quoniam vi sua ad affectum
locum haud pertingunt. Quando autem vitium
non in ipso nervo optico, sed potius in oculo,
ejusque humoribus vel aliis partibus residet; tum
non de nihilo sunt topica: è quibus eminent vel
sunt ex decocto radicis valerianæ, cubebæ, et
seminisque feniculi cum aqua & vino parati,
per infundibulum oculis admissi; vel episthemata
hac ratione conficienda: *recipe radicem argeli-
cæ, imperatorie, valerianæ ana uncias binas,
herbæ charifoli, arnicæ, florum sambuci, la-
vendulæ, rosarum ana pugillus tres, seminis fu-
niculi, auribî ana drachmam unam cum dimidia.
C. C. f. species, decoquantur in equali portione
aquæ rosarum & foleptariæ, l'cau d'arquetulade
dicta.*

§. IV.

Circa cer-
viciam per
medicam.

Evellendæ, quæ contumax est, cœcitati per-
quam opportuna nonnunquam est curatio, quæ
per inmedium instituitur. Conducit ea potissimum
in corporibus impuris, cacochymicis, sanguine-
que & succis abundantibus, & requirit prægres-
sam elementem quidem, sed fatis efficacem alvi
subductionem. Ipsa hæc curatio consistit in eo,
ut ægri non nisi modico panis cocti, carnisque
assatæ cum passulis vescantur; vinum omnemque
cerevisiam fugiant, & decoctum ex sarsaparilla,
glycyrrhizæ, passulis, semineque feniculi bibant:
cui pro corporis ratione per tres & ultra hebdo-
mades insistendum.

§. V.

Quæ puellis, infantibusque post variolas, mor-
billos, aliosque exanthematicos morbos remanet
gutta serena; multam sanationis spem relinquit.
Accidentibus enim pubertatis annis menstruoque
fluxu aut sponte disparat, aut mirum in modum
emendatur; tumque opus est, congruis admini-
culis menstruum adjuvare fluxum; quæ de re no-
tabile exemplum allegavi SYST. Tom. IV. P. I.
Cap. 8.

ENARRATIONES MORBORUM.

OBSERVATIO I.

Circa cer-
viciam per
medicam.

Vir XXX. annorum, sex circiter abhinc an-
nis corpus fortiori labore & exercitio vehementer
commonem, subitanæ exposuit refrigerationi.
Unde dolorem quendam gravatum capitis, &
accedente oculi dextri consusione, magnam in
ipsis visus imbecillitatem, nullo externe adparen-

te vitio, sensit. Variis igitur usus est remediis i-
ustificatoriis, foveiculis, collyriis atque purganti-
bus; sed sine ullo effectu. Ance biennium acced-
ebat scabies, & posthæc ad sinistram quoque
oculum transibat vitium; dum non modo visio
valde imbecillis esset, verum etiam scintillæ
maculeque dicto obversarentur oculo, eidemque
omnia duplicata adparerent objecta. Præterea
aurium gravi tinnitu, stomachi magna debilita-
te, ructuosus ac flatus ventris molestus, alvi obstu-
dine, doloribusque artuum tractoris verabatur;
vultus lividum præ se ferebat colorem; &
vitæ genus sedentarium, multis ingenii labori-
bus ac scriptationibus implicatum continuare non
definebat.

Epicrisis cum Consilio.

Hic affectus vocari meretur gutta serena inci-
piens ac incompleta, & sedem habet in nervo
optico & cerebro: unde extirpicus nullum ad-
paret vitium. Natus suos à cacochymica san-
guinis & feri impuritate mutatur: quippe fre-
quens docet experientia, scorbuticos, cacochy-
micos atque cachecticos oculorum vitia ab interna
causa facile incurere, inque eis malum ab
uno ad alterum transire oculum. Cacochymicam
humorum diathesin in præfenti ægro testantur
scabies, prava digestio, flatulentia, artuum dol-
lor, & tinnitus aurium: atque eam cum vitæ ge-
nus sedentarium, tum corporis calefacti refrige-
ratio induxerunt. Hac etiam visiois imbecilli-
tati prima occasio data est; siquidem inde re-
presti humores copiosius ad cerebri partem ante-
riorem decubuerunt, & accedente oculi dextri
consusione, ad ejus nervos inde debilitatos peri-
nacciter fecerant. Fuisse etiam visiois imbecilli-
tatem adhuc recentem convenienti debellasse me-
dicina; at ea jam inveterata, difficilius omnino
est negotium. Neque tamen abjiciendum ideo
opinor animum, sed eo respiciendum, ut succi
reddantur temperati & benigni; ac deinceps par-
tes nervosæ, quæ sunt debilitatæ, corroborentur.
Primæ intentioni faciunt faris lignorum decocta,
tincturæ antimoniales, pulveres absorbentes &
diaphoretici, purgantia ex gummatibus confecta,
& vivendi recta ratio. Posteriori scopum ex-
pleant emplastra ex oleis cephalicis, aromaticis,
balsamis liquidis, & gummatibus resinosis, fronti
& temporibus applicata, nec non spiritus vini
fortiter camphoratus, & cum essentia balsami
Peruviani mixtus, & demique balsamum nostrum
vitæ. Quæ per satis longum tempus continuata
si votis nondum responderint, nec succi vitales
satis edulcorari fuerint: haud alienum erit, blan-
dam movere salivationem, quæ cum cinaburi-
nis vel æthiops minerali pericitur commodissi-
me, quandoque hic, prius probe perpurga-
tis primis viis per pilulas cephalicas aut aliud con-
veniens purgans, ad decem grana cum drachma
dimidia sacchari & olei Melissæ Turcicæ guttis
duabus per tres & ultra septimanas mane exhi-
beatur & potui decoctum radicis Chinæ cum pas-
sulis & cinnamomo detur, subjuncta simul dia-
ta & proba vivendi ratione. Novi hæc metho-
do, ob gravem capitis consusionem feliciter resti-
tutos qui in periculo cœcitatæ versabantur; non
tamen omittis externis.

OBSERVATIO II.

Puella VII. annorum, debilioris naturæ & Gælia, p-
V 4 tuncæ-
ræ p-
p-
p-

partem
deum co-
operari.

terremis corporis constitutionis, faciei livide & cachectica, flavescens sæpius colore tinctæ, incidit aliquando in febriculam, dorsi capitif- que dolore, & si corpus erigebat, vertigine sit- patam. Tertio ab invasione die, tota cutis punc- tulis asperis & rubicundis referta cernebatur; quo- rum ulterior efflorescentia remediis temperanti- bus, lenitque expellentibus, & temperato re- gimine adjuvabatur. Neque tamen minus hæ maculæ mox cum sensu horripilationis evanesce- bant, mox cum magno cutis ardore rursus pro- rumptentes. Conquererebatur insuper de magno capitis & oculorum, præsertim circa septimum diem, exacerbato dolore; & quon postea ali- hoc convalesceret affectu, subito omni privata visu, nihil prius videre valuit. In oculis ex- treme nihil videbatur vitii; nisi quod pupilla pau- lo amplior & magis dilatata compareret.

Epicrisis.

Affectus, qui post se traxit guttam serenam, est purpura; infantibus præsertim cachecticis, qui ob ventriculi inbecillitatem & bilis inertiam, ingentem feri impuri contrahunt copiam, admo- dum familiaris. Purpura enim ex sero impuro acri in glandulis ductulis stagnante, quod fe- bilis commotione ad habitum corporis protruditur, originem trahit: cuius feri copia si iusto ma- ior, & natura imbecillior est, seu, quod idem est, si corpus debilis moribus, illud expellendi desti- tutum fuerit; sit inde, ut partibus etiam solidis à succis visiosis hinc iode flagrantibus, easque vellancibus labe affricetur. Quare observamus, tussis diuturnas, phthises, febres lentas, diar- rhas, capitis dolores, hemicranias &c. illum affectum non modo comitari, sed eadem quoque supervenire. Ex quo facile colligitur, delapsam in nostro casu ad caput, & præsertim nervos op- ticos serum guttam induxisse serenam. Cujus cu- ratio in eo potissimum consistit, ut corpus a col- luvie serosorum ac purpura infectorum succorum liboretur, eorumque moles à capite derivetur. Quod scopo præter interna sanguinem mundifi- canda, ut coacta diluentia, diaphoretica & laxan- tia, mira virtus in vesicatoris reposita est, dum- modo tempestive adhibeantur: quæ revocando ad cutaneum corticem serum acre, illud capiti subtrahunt. Præterea, eo est amittendum, ut per balsamica ac temperata stomachica, ventriculo robur ac virtus digestiva restituatur; & sic ge- nerosus chylus, laudabileque succi generetur.

OBSERVATIO III.

Quæstio-
nem ex
pura, inde
vires co-
operari.

Puella IX. annorum, catarrhalibus desfla- xionibus, achoribus tumoribusque glandularum colli per totam vexata vitam, naribus aliquando præter morem sicca exsistentibus, corripitur ver- tigine, & doloribus dorsi ac hypocondriorum tantis, ut accedente vomitu & cephalalgia, lectum petere cogereur. Post aliquot dies melius paulisper habens, libero se rursus exponit aëri, qui tum erat gelidissimus: sed redux, gravi ver- tigine, tumoribus dorsi, febricula, & purpura, mox iterum retrocedente afficitur. Haud multo post, gravi mentis commotione agitata, incidit in af- fectum epilepticum; sub quo dentes valide com- mordebant, oculi rigebant luentes, sensus omnes erant aboliti, & pulsus ferebatur vehemens & inæqualis. Elapsa hora ab hoc paroxysmo ad se rediens, prius cæca erat, & inter vehementes

capitis dolores, multum biliosæ saburra vomitu reddebat. Insulo clysmate, atque danis remedia antispasmodicis, præcipitantibus, ac diaphoreticis remittebant & vomitus & dolores capitis: sed cæcitas eade in persisteret per quatuor dies, quo- rum singulo supra citatus paroxysmus epilepticus revertebatur. Quum urgeret insuper continuæ vigilie, & dolores vehementer recrudescerent; dabantur vesperti aliquot grana pilularum de cy- nologlossa: unde nox quiescit sequuta; & quum altero mane ex insulo theiformi olei Cajepum tantillum sumeret, largo per totum corpus per- fundebatur sudore, & cum hoc subito recupe- rabat visum. Sed elapsa hora, & redeunte ce- phalalgia, coactas plenarias recurrerebat; & altero demum die remittentibus cunctis doloribus & spasmis, iterum redibat, cum tam felici suc- cessu, ut ægra post sedecim dies inter continuos sudores, & visionem & sanitatem perfectam re- cuperaret.

Epicrisis.

1) Quanta serum acre, quod sub exanthemati- bus purpureis ad corporis peripheriam protrudi- tur, intra corpus retentum, machinari valeat ma- la: præsens quoque testatur morbi historia. Sæpius fit, ut illud per aliquod tempus in corpore deli- tescentia quieteat, & non nisi accedente quadam occasionali causa, suam extensio incipiat tyran- nidem. Talis causa in nostro casu duplex fuit, nimirum refrigeratio, & mentis commotio: qua utraque gravis ipsius nervo generi inductus, & hoc cutaneum corticem afficiente, humores mox à majore copia ad interiora, & caput potissi- mum compulsi fuerunt.

2) Meretur itaque, quæ hic occurrit cæcitas vocari spasmodica; eo quod a spasmo extema- rum & internarum partium, humores sursum commoti strictura foriori & cerebri membranas, unde epilepsia nata, non minus ac oculorum membranas nervas adficerent. Hinc factum est, ut postquam larga accesserat ludano, inde se- rum acre evacuatum, ipsius relaxati & ideo cuncta mala depulsa fuerint.

OBSERVATIO IV.

Infans trimulus, cum vix anni quadrante- m attingeret, variolis erat correptus; quæ non legiti- mum suppuracionem passæ, nec rite efflorescen- tes, tertio post die rursus evanuerunt. Albine va- cillans sanitas sæpius adflicta erat catarrhalibus mole- stis; & ante annuum tempus abdominis quæ- dam accessit durities. Contra hanc præter alia medicamina datum fuit vomitorium, adque in- tra unam hebdomadem bis repetitum: unde spon- tanci vomitus, & alvi fluxus exceperunt, perque decem inhaerunt dies. Tum conquiscentibus his excretionibus, abdomen quoque detumuit; sed virium summus languor succellit, & non ob- stante cum appetitu, tum somno integro diu continuavit. Novissime plenaria visus abolitio, ocu- lis illatis exsistentibus, supervenit; corpus, licet satis musculofum, aëleo tamen debile ac langui- dum est, ut si ex lecto attollatur, artus quasi col- labi videantur; sinistrum brachium frequens tre- mor occupat; caput est tumidum & loquels summa difficultas. Alvus satis libera & adpe- titus integer est; sed nares perpetuo sicca, & cre- bri urgent sudores.

Quæstio-
nem ex
pura, inde
vires co-
operari.

Epicrisis.

Epietis cum Consilio.

1) Adfectionem, quæ in præsentī casu variolæ subsistentes exceperunt, causā est plethora serola; siue feri æque lymphæ fissilæ ac impuræ magna per totum corpus abundantia; quæ plerisque infantum familiaris esse solet. Hinc catarrhales aurium, narium, oculorum, capitis &c. defluxiones in nulla ætate magis frequentes deprehendimus, quam infantili & puerili. In nostro quidem ægrotante variolarum subsistentia primam consequentibus malis dedit occasionem: excrementitii enim humores, qui per hoc exanthematis genus alias externi solent, pusillis ob naturam forte generis nervosi debilitatem non rite extrusis intra corpus retenti, inquinarent serolum & lymphaticum laticem. Unde originem traxerunt catarrhales affectus, abdominis durities, & facta materie serosæ ad cerebrum & medullam spinalem metastasi, variarum partium resolutiones paralytica, ut oculorum, lingue nervorumque ad brachia & pedes tendentium.

2) Curatio tanti mali solis ferme internis perficienda est remediis, & quidem talibus, quæ viciditatem lymphæ resolvendi, ejusque namiam molem consumendi facultate pollent. Consulimus igitur duco, ut sequenti procedatur ratione: purgato per pulverem Cornachini corpore, omni mane sumatur pulvis ex cinnabari optime preparata granis quinque, lapidem cancrorum granis octo, & mercurii dulcis grano dimidio confectusque per sex dies usurpato, interponatur iterum laxans; tumque per sex rursus dies sumto pulvere, repetatur laxans. Sub hac cura per poa inserviat decoctum, quod ex radicis saraparilla uncia tribus, cortice ligni cassiæ drachmis tribus, salis tartari drachma dimidia, cum duodecim aqua pura libris in vase clauso coctis paratur; idque etiam loco potus Theæ calidum bibatur: non minus victus sit attenuatus, ut non nisi carnes assatæ, & panis similagineus modi a tamen quantitate adhibeantur. Deinceps per octo circiter dies corpus omni mane immutatur balneo, quod ex aqua simplicis, fursiuribus triticeis, & cineribus clavellæ conficitur; & post illud nicta, & os sacrum linimento nervino inungatur. Interne continuatur dicti usus decocti, & sub epulis ad firmandum stomachum propinetur Elixirum ex essentia pimpinellæ alba, gentiane rubra ana uncia dimidia, spiritus natri dulcis drachmis duabus, & olei macis, de cedro ac cinnamomi ana guttis sex confectum: externe vero nictibus admoveatur sal volatile salis ammoniaci flocum, cum oleo majoranæ vero imprægnatum. Ex qua curatione non dubito, quin suspicatus sit consequentibus eventus.

Observatio V.

Puer XII. annorum, ante aliquot jam annos catarrhis, coryzæ, tussis, obnoxius, ingruentet empetate valde humida & aqualonia corripitur iterum catarrhali febre; quam nono die acerbis capitis & oculorum dolor excipiebat, & tandem plenaria sequebatur cecitas. In oculis nihil adparebat vini, nisi quod pupilla adhuc se contraheret, & puer lucem a tenebris distinguere poterat: ceterum vero & adpetebat bene & egeret rite. Postquam igitur per integrum semestrem, frustra usurpatis variis generis medicaminibus, hoc affectu laboravit, & nostræ curæ tradi-

tus fuit; nihil adhibuimus, quam pilulas nostras balsmicas, quavis semel hebdomadæ adsumendas, & externe linteum balsamo vitæ nostro madidum bis de die fronti & temporibus applicari curavimus; unde, favente divina gratia lachrum est, ut intra paucas hebdomades omnem recuperavit visum.

Epietis.

Præsens serena gutta videtur tantum esse spuria, quæ à defluxione feri, partes nervosæ vitii dicatas obfidente proficiscitur. Nervus enim opticus, quatenus intra cerebrum continetur, in tali casu ab omni fere liber est læsione; & adducit adhuc fluidum tenuissimum ad partes oculi nervosæ: quæ tamen a serola colluvie hinc inde compressæ, ad recipiendos solis omnes radios, & efformandam perfectam visionem haud idoneæ sunt. Ex hinc observamus frequentius, quod infantes ac pueri nimium picuoli & catarrhalibus affectibus divercati, ejusmodi imminutiones & visus & auditus pariantur. Quo in casu solemus quidem remediis anticatarrhalibus uti; sed cum hæc in præteriti puero sufficienter fuerint usurpata, nihil restitit, quem ut roborante ac nervino remedio, quale est nostrum vitæ balsamum flagnantes succi ductus, restituit, & infirmæ roborantur partes.

CAPUT V.

De Visus imbecillitate ex lippitudine & suffusione.

THESES PATHOLOGICÆ.

§. I.

Inter morbos oculorum, qui ex nervosarum partium atonia nascuntur, præcipuos, lippitudo, quam Græci *trivipnos* vocant, primas locum videtur. Est hoc falsa & æris laticis cum pruritu, dolore & rubore ex oculis fluxio, cum hebetudine eorum junctæ.

*Lippitudo
visu depri-*

§. II.

Levis hoc malum existit, si in oculi bulbo nullum quidem comparet vitium, palpebræ tamen tumet & rubent, fluxio lentescit inque lamas densatur, quibus palpebræ subinde noctu conglutinantur & sic hoc ipsum diutius durat.

*Lacrymæ
tumor, quæ-
nem sit?*

§. III.

Differt hic affectus à fugillatione, in qua oculi album, quandoque totum, per omnem sui ambitum, quandoque etiam ultra hunc & infra circum, rubrum apparet & omnia quæ adspiciuntur rubra videntur. Fit plerumque à causâ externa, ut contusione, & a stagnatione in minimis valculis sanguinis, epiphora vero à lymphæ stagnantis effusione. Differt quoque ab inflammatione oculorum, siue ophthalmia, in qua major dolor & ardor de ingens ad latus accessum exacerbatio cum febricula & metu suppurationis observatur; nec minus distat in eo, quod epiphora diutius daret, ophthalmia celerius dissipetur.

*Diffinitio
1) a fugil-
latione.*

§. IV.

Solenne hoc malum est infantibus & pueris, si asput

*Subiecto
que corrip-
git.*

*Quæ serena
in juvenis.*

caput auræ frigidae exponant, vel catarrhis, vel capitis tinea laborarunt, præposere ea sanata. Invadit dein maxime eos, qui tumoribus glandularum in collo, vel circa aures afficiuntur, neque prius discedit, quam sub lato tumore & reddito liberiore lymphæ per glandulas transitu. Frequens etiam lippitudinis genesis post variolas & morbillos, quod in his ob æthum & ebullitionem succi temperatam diathesin exeunt & impuram, viticidam ac salis contrahunt, quæ nisi morbo superato per convenientia depurantia corrigatur, non modo lippitudinem, sed & alios diu durantes morbos possit se trahit.

§. V.

Anni tem-
pora quæ
visum ex-
citant.

Datur præterea lippitudo, quæ epidemice infestât & insinuat ac inordinatas temporum anni constitutiones sequitur, maxime vernali & autumnali tempore: de atmospheræ, exhalationibus subtilis acrimoniae referre viam debetur, quo tempore etiam ex eodem fonte procedentes morbi, ut rheumatismi, gravedines, impetigines ac vitiliginis, pustulæque in cute ulcerolæ regnare solent. Circa solstitium æstivum ego quoque sapius idem malum occurri observavi.

§. VI.

Sedes crys-
tallini excre-
menti de-
monstrat.

Ipsa sedes mali potissimum est in glandulis, quarum variz sunt in oculo. Maxima harum lacrimalis dicta in orbita supra angulum minorem collocata est, & manifestum primum faciente STENONE, ex sex septemve ductulis inter palpebrarum membranas decur. erigibz & non longe a ciliis tonidem distinctis oculis hianibus, serum lacrimale salsum fundit, quod a punctis lacrimabilibus absorbeatur & per peculiarem ductum ad nares fertur. Dein in cantho oculi majorem plures acini glandulosi consistunt, qui glandulas sebaceas accedunt & serum lentescens plorant. Sub palpebris etiam delitescunt glandulæ, ab inventore *Meibomiana* vocatz, & a MORGAGNI in sebacearum numerum relatz, quæ juxta dorsum palpebræ eleganti ordine positz, ad limbum hujus oculis hiant, è quibus stillare videtur illa, quæ in oculorum morbis palpebrarum conglutinat materia.

§. VII.

Unde visus
esse efflu-
ens possit.

Jam, quandocunque excretoria hæc glandularum, ex nervis & fibrosis tunicis confusa organa, à sero subtili acri, vel etiam ab acribus effluviis arroduntur, nervæ glandularum membranzæ crispantur & spasmodice contrahuntur, ut sanguinis per arteriolas advecti refluxus, ob venas contractas, minus libere fieri possit, sed tubuli glandulosi à secedente sub mora hac tetro, plus jussu amplientur, & hac ratione ingens fiat seri salis lacrimalis effluus.

§. VIII.

Unde rubor
& dolor
est.

Ruborem & dolorem jungi, acrimoniae humoris effluentis tribuendum, cui sæpe tanta salis acris copia instat ammoniaci, præsertim in scorbucis inest, ut ex drachma una feri in lippitudine effusi, grana duo salis muriatici acerrimi, leni tantum evaporatione, obtineant, quod tamen ratione odoris & saporis multum distet a sale illo, quod post unius exhalationem restat, luculento indicio, peculiarem plane & mechanicam esse glandularum & oculi tubulorum excretoriorum structuram, ut serum salsum sine contagio sulphuris fortit, ut in urina & sudore fit, admittat.

§. IX.

Quædam notas, ex quibus quid evenitum sit colligere possint, quam optime tradidit CEL-
SUS Libr. VI. cap. VI. Si simul & lachryma & tumor & crassa pituita corporibus si ea pituita lachryma mista est, neque lachryma calida est, pituita vera alba & mollis, tumor non durus, longa valetudinis meus non est. At si lachryma multa & calida, pituita parva, tumor medicus, idque in uno oculo est, longum id sed sine periculo, futurum est. Idque lippitudinis genus minime cum dolore est, sed vix ante vigesimum diem tollitur, nonnumquam per duos menses durat, quandoque brevius fuit. Tumor magnus si sine dolore est, & siccus, sine ullo periculo est: si siccus quidem, sed cum dolore est, fore exulcerat: & nonnumquam ex eo casu fit, ut palpebra cum oculo glutinetur. Eiusdem exulcerationis timor in palpebris pupillifer est, ubi, super magnam dolorem, lachryma falsa calidior erunt, aut etiam, si tumore jam finito, diu lachryma cum pituita profusa. Pejus etiam tum est, ubi pituita pallida aut levida est, lachryma calida aut multa profusa, caput calet, à temporibus ad oculos dolor pervenit, nocturna vigilia urget. Eji etiam genus arida lippitudinis, quod *Exophthalmos* Græci appellant. Sub hoc neque inuenit, neque sunt oculi, sed tubum tantum & cum dolore quodam fere levi ac pruriginis graves sunt, & palpebra circa duritiem nullam tactu prægravi pituita inhaerescunt, quantoque minor generi hinc impetus, tanto finis minus expeditur est.

§. X.

Ad eas, quæ visum lædunt, affectionum species, referri quoque debet suffusio, quæ vulgo pro cataracta incipiente vel spuria habetur. Hac qui laborant de simulacris vagantur rerum, de nigris punctis, muscis oculis obversantibus, vel, quod pejus est, de nebula, de aranearum telis, de interiori rete, quibus oculi tecti sunt, conquerrunt.

§. XI.

Fit hoc vitium, ubi aquosus pellucidus humor ab admixtis corpufculis & moleculis opacis, propter nimis dilatare vasculorum adductum oscula, pelluciditatem ex parte amittit atque variaz & obocure, præsertim in chartis & parietibus candidis visus imagines sistuntur, adeo ut quo major sit hujus humoris opacitas, eo major objectorum obscuratio.

§. XII.

Ut horum vitiorum ratio & natura eo liquidius appareat, repetendum ex physiologica est, tres in oculo humores numerari, æquum, vitreum & crystallinum. Aquosus dicitur, qui utramque oculi cameram, tam anteriorem, quæ inter corneam & uvæam, quam posteriorem inter uvæam & lentem crystallinam, replet, quantitate est exiguus, sed admodum fluidus: hic subiecto candela igne sine spuma lenius exhalat, rebus valde exiguis & pellucidis moleculis falsis. Vitreus aquo densior est, posteriorem oculi partem retine ubique contiguus occupat: hic mole longe major priori cochleari argenteo inditus, supposita candela flamma, protinus in aquam limpidam liquatur & totus sine bullitione in halitus solvitur, relicta identidem massa spissa, exigua valde, salis saporis. Prunis ardentibus inceptus hic humor non ut aliz ex animantibus partes sordidum exhalat odorem.

odorem. Crystallinus reliquis solidior, eodem modo tractatus in liquamen non convertitur & igni injectus flammam concipit & graveolentem spargit odorem. Deinde vitreus & aqueus nec à rectificatione vini spirui neque à spini vitrioli mutatur aut coagulatur; crystallinus vero inde turbidus fit & pelluciditatem amittit.

§. XIII.

Ex his curiosi à me instituti experimenti clare apparet, vitreum & aqueum parum inter se ratione insolitis & mixtionis differre; crystallinum autem, qui edificatus in meras lamellas discindi potest, ex partibus longe solidioribus & salino quoque sulphureis esse constare; aliam quoque esse originem humoris aquei & vitrei, quam crystallini. Ille enim ex tenuissimis arteriarum & vasculorum lymphaticorum oculis in uvea & chorioidea tunica gignitur, vitreus vero ex tenerissima lymphâ, quam vehunt vascula arachnoidea, venit ac nutritur: Crystallinus in ipso utero producit, suum augmentum & conservationem à vasculis in tenuissima arachnoidea & propria membranula existentibus & tenuissimam lympham plorantibus nascitur. Neque dubium videtur, quin purissima, quæ nutrit oculos eorumque humores, lymphâ circulari motu per adductionem & abductionem vasa ferantur.

§. XIV.

Hic cognitis liquet, originem suffusionis in lymphæ ocularis vitio positam esse: Nam quum hic humor valde diaphanus, purissimæ & homogeneæ naturæ esse debeat, adeo ut cum liquido tenuissimo, quod nervi velunt, pene similem naturam habere videatur, qualis non modo nutriendis oculorum humoribus, sed & eorum membranis roborandis intersit, sit omnino, ut, quando ipse per morbosam diathesin, crassus, impurus ab heterogeneis & opacis terrestribus particulis redditus per ocula vasorum admodum dilatata & diducta ad interiora oculi transferatur, humores turbidi evadant & naturalem pelluciditatem suam amittant.

§. XV.

Ex hisce jam facile colligere licet, quare omnes illi qui, ob lymphæ spirituosæ subtilis in sanguine defectum, imbecillam virum sunt, ut senes, vel diuturno morbo afflicti; aut qui nimium sanguinis profuderunt, vel diuturna morbositas, anxii curis, assiduâ vigiliâ macerantur, vel etiam intempestia & nimia venere usi sunt, tam promptè & facile in suffusionem & visus hebetudinem atque caliginem incidunt. Neque minus hypochondriaci vitæ addicti sedentariæ, qui pigra alto atque ventriculi inflatione laborant, item cachectici, quorum corpus multis impuris succis abundat, maxime, quando purgantis, sudoriferi aut balnei calidi improvide admitti vehementia humores in motum acti ad caput pelluntur, hisce vitis subiectis fuisse non semel sed frequentius observavimus. Atque etiam si plethora nimium urget, in iis, qui confusæ sanguinis per scarificationem per sectionem venæ neglexerunt, vel qui solennes & criticæ salutares per uterum, per anum fluxiones, non amplius, aut deficientes experiuntur ejusmodi oculorum, de quibus nunc agimus, vitia, cecidit observantur: nam ex nimia sanguinis & humorum abundantia protinus eorum spissitudo atque impuritas suboriri incipit, quatenus, ob tardiorum progressum, nec satis hui-

di redduntur, neque ab heterogeneis & excrementis partibus depurantur.

§. XVI.

Memoratu prætere dignum est, hanc visus imminuti speciem, quæ omnia per nebulam cernuntur, statas suas habere periodos, ita ut pluries observare licuerit, certis tantum temporibus illam infestasse, postica vero sponte remississe atque ex toto commodi remediis fuisse sublatam. T. I. MÆUS à GULDENKLE Libr. I. Cap. 27. calum communicat matronæ, gravi febre intermittente laborantis, quæ ingravescente paroxysmo de oculorum caligine & obscurantibus ante oculos corpulculis conquerebatur, remittente vero febre cessasse hæc omnia, & illa ipsa retrocedente, tanquam symptoma iterum accessisse memorat. Nos recordamur quoque, maculas & alia quæ visui obijciuntur, crescente luna incrementum, decresciente vero decrementum cepisse, & mensè Martio potissimum hoc malum infestasse. Ex quibus signis simul dignoscitur differentia, qua suffusio maxime se distinguit à cataracta vera. Hæc enim non tam facile ratione temporis aut magnitudinis variat, sed pertinacius insistit & sit præcipue, quando irregulares opacæ atomi congregiantur & tunicam quasi solidam constituunt; aut ut rectius quidem cum recentioribus existimatur, si tunica crystallinoides prius densa sit & opaca, postica vero totum corpus crystallinum multis lamellis per naturam suam intrinsecum, aridum, exsiccum & opacum evadit.

§. XVII.

Oculorum vitia id habent cum morbis nervorum commune, ut quo diutius inhaerescant, eo difficiliorum sanationem recipiant & levissimis ex causis revertantur, interdum quoque in graviores morbum transmutentur, idque non sine ratione: nam solidiorum textura, structura & robur longo tempore ita invertitur & destruitur, ut tardo ac modum modo ac gradu curatio contingat. Atque hoc est, quod vulgo consuetudinem & habitum habere dicitur.

CURATIO CUM CAUTELIS.

§. I.

Recta spirituum sanandi ratio, utique potissimum in edulcoratione feri falsi ejusdemque derivatione ab oculo ad alia loca & in glandularum nimis remissarum robore restituendo, consistet. Nos quidem pro certo affirmamus, incipiens malum solo potu copioso infusi Theriacis, ex herba Veronice & semine fœniculi, ad aliquot libras, cum regimine diaphoretico per aliquot dies sumi, brevi & expedita curatione fuisse expugnatum. E contrario, certum patet, illud difficulter admodum sanationem recipere, si à diathesi humorum scorbutica invalens fuerit enatum, nec cedere, nisi accedat prudenter instituta cura lactis, vel vaccini, cum aqua Selteriana nupri, vel etiam feri lactis dulcis nostræ methodo parati, nec non fontis medicæ mineralis & marialis, interpositis idoneis laxantibus & diaphoretico-temperantibus pulveribus. Frustra enim omnis medicatio per alia remedium genera, præsertim externa, tentatur, nisi interna hæc prius fuerint usurpata. Opus tamen etiam est, ut exacta vitæ & vitæ ratio accedat, vitando salia, acida & actia, nec non frigus, & abstinendo à vino & spiri-

Hæc per
rines.

Differre à
catarracta

Progreſſu.

Interius re-
media ex-
ternis con-
servandis
ejusmodi
dant.

Cryſtallinus
ex parte
solidior.

Hic cognitis
liquet, originem
suffusionis in
lymphæ ocularis
vitio positam esse.

Interdum.

spirituosis, immo cerevisiæ potu, & sumto ordinari potus loco decocto ex rasura cornu cervi, radice leonzoneæ & semine fœniculi, usurpatis fluxu crebrius vesperi ante decubitus pediluvius ex aqua dulci.



Uzun et-
terimlerin

Extrema, ut in aliis oculorum passionibus, sic & in hoc vizio circumspicienda adhibenda. Hæc inter tamen non sine fructu frequentius usus fuit unguento, ex butyro infusillo, saccharo Saturni & vitriolo albo debita proportionem composito; quod ad magnitudinem pili cantho oculi majorem multum, efficaciter, si prius internis rite fuerit prospectum, huic malo medietur, diffinitur simulque corroborant qua gaudet virtute. Serio itaque monendi sumus, qui perjeram omnino & ophthalmium & epiphoram nimis refrigerantibus, diffringendis vel acerbis colliriis de vangeris excipere solent; quibus rubor, præsertim tili rubor & dolor oculum tenet, vix quidquam datur perniciosius. His enim oculi tæbent, corrugationem, suffusionem, nec non epiphoram chroicam, rubentem, siccam & asperam fuisse iudicam, quin palpebrarum exulcerationem concitantem experientia abunde satis docet. Si etiam sicca plane epiphora existat, abstinendum ab externis excipientibus, multo magis acerbis, de oculis potius cataplasmatæ ex mica panis tritici, lacte & croco tepide fovendis est.

6. III.

*Uşa fiv-
dy-uranti e
fiv-ur vol-
ranti d'
saliuati.*

Quid seraceis, fonticulis & vesicatoriis tribuen-
dum, in pertinacibus ejusmodi oculorum viitiis
migan-^{dis}, loquatur observationes Medicorum
& enormia de iis passim. Nos tamen molestis
his & incerte efficacie auxiliis medentes melius
posse superfedere censuimus, si tantummodo ex
inventione mea vesicatorum ex unguenta Em-
plastris de melioris & pulveris causticorum dra-
chima paratum, *gravi* magnitudine, nucha ap-
plicent, & quae quotidie recens imponendo, exo-
lam leniter cutem & apertam per aliquot men-
ses jubeant. Tum enim mira feri impuri effluit
copiae, & non tantum his, sed aliis etiam capitis
morbo, exinde levantur erecne.

6. 1 V.

Sufficiency
 relative per-
 centage for-
 frequency C
 lower
 frequency-
 not

In suffusione sic dicta spuria curanda, quam ipsa ab impuris ac crassioribus in oculorum humoribus, propter auctum sanguinis & humorum versus superiora impetum, & clavis moleculis proveniat, multum omnino auxili sumi est in vense sectione vel cucubitalis nuchae applicatis, hac tamen observata cautela, ut si fluxus humoroidalis aut mediū irregularis vel suppuris huiusmodi causam præbet, sanguis in pede mittatur, vel cras in superiorem & dein in inferiorem locum venatur, ceterum vero semper sanguinem in loco propinquiori detrahere & re erit. Possunt haud minus usui sunt leniter ex rhubarbaro & silis lenius evacuantia, nam nostra vel alia methodo confecta plura balsamica. Nobis in memoria sunt exempla, ubi ejusmodi visus obfuscationes per intervalla remittentes & redeuntes cum adpectu humorum in oculo turbidorum divina adjuvante gratia feliciter expugnavimus. Quod si enim humorum incurtus ac impetus à capite & oculis ad alia loca divertitur & humoris crassi impuri per convenientia remedia educuntur, sit omnino, ut per abducentia vascula, que HOVVS nervulo-lymphatica vocat, impu-

ri facci absorbeantur & per adducensia puri advehantur, atque hac ratione prillina humoribus claritas reddatur.

E. V.

At vero ut supra dictum est, ingenti virium
jaadura, vel deficiit laudabilis lymphae adhu-
mores oculorum nutrimento necesse, origo
plerumque hujus mali debetur. In ejusmodi ve-
ro casu anaprica & conventus visus rario, fu-
giendo omnia que prava & squalida ingunt
lucos, plus valent & praesent, quam ingens colli-
riorum vel aliorum medicamentorum apparatus.

ENARRATIONES MORBORUM

OBSERVATIO I.

Vir quidam septuagenarius, robustus & nunquam non sane confectionis, media hyeme dum mane a lecto surgit, de insolito virium profectio-
ne conqueitur, quam sensum abolito, ambu-
landi impotentia, & continuus mox exceperit
sopor. Vocatus Medicus impotens brachio vesti-
catoris, & onditus externis spiribus ac lini-
mentis, efficit quidem, ut disculo sopore ager
haberet melius, praesertim, quum subinde vena
in pede tunderetur, & fenticalis brachio infinge-
retur. Verum enim vero, graves adhuc nobis
superiunt reliquiae, quarum haec possitne obser-
vatur: visus tunc imbecillis est, ut litteras cog-
noscere nequeat; oculi perpetuis fundunt lacry-
mas, & dexter impius uocati adeo congestus
ut, ut mane vix aperiri queat. Praeterea dextrum
brachium spiritus paralyti resoluam; siquidem
manu nec arripere, nec tenere quid valet.

Epieralis caesa Cresson.

Nullex equidem manifestat hoc in casu occurrere videntur cause; que recensita mala generare possunt: at qui ad ætatem ægrotantis, & tempus, quo ægrotare cepit respectant, illos morbi sufficienter invenit rationem. Senes enim, licet dilabata gaudent senectute, per naturæ tamen necessitatem corpus debile tandem nanciscuntur, indeque notabili ad morbos acquiritur proclivitas. Cum cum accedat aeris frigida & hiemalis constitutio, que morbus paralyticus ac soporis præ aliis facit, ac facili potest fieri, ut ejusmodi affectibus præter spem & opinionem corripimur. Quo magis autem his in subiectis cause morborum sunt intermixtæ ac velut naturales: eo difficilius est curatio. Validiora enim & generosa cuncta exalare oportet remedia; & non nisi ea conducunt, que roborent ac nervina virtute delibritatis succurrant partibus. In præsentis ergo casu præter blanda laxantia, & Elixir nervinum, præscripti balneum vite meum, idque & externo, nucham & tempora inungendi, & interno usui, mane aliquot guttas ex insulo melisse capiendi, commendavi; atque hoc præstantissimo remedio per mensem & ultra usque, adfectus hie evanuit & vires extulsi, æneque recuperare cepit.

OBSERVATION II.

Scremifunus princeps, annorum LX. robusti & bene valentis corporis, per viginis & ultra annos, mense Junii, singulis fore annis, gravi & acri oculorum, fluxione cum rubore, dolore & vitio obnubilatione ad sex interdum septimanis molestie

mollesse perseverante torquebatur. Postea sponte cessavit malum. Ad averdendam hanc molliissimam passionem claros & peritos confuisti Medicos, qui multiplici medicatione usi sunt, quæ in sanguinis detractioe per venæ sectionem in brachio, in fronte, per hirudinum applicationem circa aures, & scarificatione in nucha & dorso consistebat. Apposita quoque sunt vesicatoria & fecacea nucha, sed omnia irrita plane effecta. Nam appropinquante solstitio assivo protinus malum celerrime oculos occupabat. Narrauit mihi Serenissimus hunc casum, eodemque malo denovo affectus consilium à me petiit. Quævisi ex eo, an nunquam usus fuerit prædiluvis; id quod vero factum esse negabat, prædictum quomodo non perferre possit, quomodo lætis oculis succurrere valeant. Ego vero in multis & permagnis oculorum visus moribilibus me adnotasse eorum effectum affirmavi, & ut eorum usum admitteret maximo opere suavi. Annuebat consilio, & postquam modum præparandi & applicandi illum qui ab ejus serviri erat edocui, bis de die mane & ante cubitum illis usus, intra trium dierum intervallum tam præsens & efficax levamen expertus est, ut oculis claritas, mox evanescentibus dictis incommodis, restituta fuerit. Quem auspacissimum effectum mihi nunciavit lætissimus.

Epitrisia.

Ad illustrationem hujus casus adhuc pertinet, Perioniam hanc Serenissimam mane à multis retro annis nudis pedibus, nec tecto suis abdomine per aliquot horas sub dio ambulasse; idque maxime æstivo tempore. Ex quo jam facile rationem adparere exillimo, quare hic affectus quam maxime circa tempus folstitialis afflicti, sub quo ingens æstus auctiori intensio agitatione humoribus particulis salino-sulphureas acres ingignit, quarum exitus per infimas & extremas partes frigore præclusus ejusmodi metallas ab exterioribus confilicis ab caput & oculos, jam ad receptivitate prompte dispositos, producit. Cum vero pedibus opportune adhiis indigrem transpirationem, quæ etiam interdum sudorem movendi vi polleant, ex eo jam utilissimus eorum effectus patet luculentissime. Constatum itaque meum fuit consilium, ut in posterum Sereniss. à prava illa consuetudine se retraheret & maturum frigus æstivo tempore quam sollicite caveret. Quo effectum est, ut sequenti anno ab hoc malo plane liber evaderet.

OBSERVATIO III.

Epitrisia remota glandularum in capite situm.

Puer annorum X. succi plenus, præcocius ingenu, sub primis statim ætatis annis varia in capite exanthemata patiebatur; siquidem & crassa lactes & postea tinea capitis illud occupabant diuque affligebant. Sequebatur dein tam acerbis cum dolore ex oculis fluxu eorumque noctu conglutinatione, ut lucem adipiscere propter doloris augmentum non valuerit, quare in loco tenebricolo semper se continere tenebatur. Tanta erat hujus affectus consummatio, ut nullis à celeberrimis etiam Medicis præscriptis internis & externis remediis cederet, bonæ indolis potum per integrum annum & ultra affligens. Quum parentes optimi etiam nec requirerent opem, curatori illustri examine, glandulas colli tumentes deprehendi & crebris vcnarum torminibus cum alvo adstrictiori potum tentari ipsique ab ineunte

Frid. Hoffmanni Oper. Tom. III.

ætate dulcibus delectatum audivi. Hic cognita, quæ sequuntur remedia præscripsi. Primo ad alvum laxiorem reddendam rhubarbarinis pillulis bis in hebdomade ante prandium sumendis suis. Loco cerevisie decoctum radicis chinae & altheæ, cichorii, glycyrrhiæ ex aqua bibendam præcepi, interposito pulvere absorbentium cum pauxillo cinnabaris usui. Ad discutiendū glandularum tumores emplastrum manus Dei, quod describitur in *pharmacopœia Domini Charar*, cum unguento dialtheæ permixtum applicatum fuit. Ultimū denique & præstantissimum remedium præbuit temperatum nostrum emplastrum vesicatorium, quod nucha applicatum, sine ullo dolore vitiosum serum in magna copia elicendo, intra mensis spatium tan copiosum pressit effectum, ut ex toto hic pernix affectus, oculis claris redditus, superatus fuerit.

Epitrisia.

Retulit mihi pater, Vir litteratus, temperamenti pure sanguinei, sese in pueritia oculum capitis vitii & oculorum palpebrarum diu fuisse obsessum, quæ, frustra omni curatione adhibita, superveniente demum narium hæmorrhagia cessasset. Ex succorum in infantibus & pueris abundantia, præsertim si nimium voraces sunt & fructibus vescuntur multiformis, ejusmodi capitis & oculorum vitia progigni, experientia satis confirmat. Sed frustra omnis generis remedia, inprimis externa adhibentur, nisi temperantia in victu tenuis, potusque præcipue dilutus & alvi laxitas accedat, qua tumores glandularum in collo, qui sœvent & sustinent ob vitium stagnantis lymphæ oculorum palpebras, commode resolvuntur. Ex omnibus vero optime proficiunt, quæ vitiosam lympham à parte affecta ad alia loca derivant & evellant. Quem in finem usi sumus emplastro nostro vesicatorio frequentissime & felicissime. Interim, siue ullis externis immediate oculis applicatis, quæ, nisi cautissime adhibeantur, nocent, feroces oculorum adfectus sanari posse, hac curandi methodo edocemur.

OBSERVATIO IV.

Serenissimus Princeps annum agens L. sanguineo-cholericæ constitutionis, naturæ alias bene valentis & robustæ, immoderatius vini potui & cerevisiæ valde saturatæ ac spirituosioris per omnem vitam adhiectus, multis jam annis circa æquinoctia fluxum cum euphoria hæmorrhoidalem expertus est. Evenit aliquando, ut per frigoris vehementiam subito hic fluxus subliteret. Sequebatur mox cum ventris dorisque doloribus & hæmorrhæa & cardialgia, quibus acris ad oculi fluxus superveniebat. Per venæ sectionem in pede remanebat quidem hæc mala, sed remansit dolorifica cum robore in oculis fluxio, quum Serenissimus pocula in seram usque noctem protrahere & mane sub tempestate aeris humidæ & frigida venationibus indulgere, quam immutato vitæ regimine conducto oculos à frigore defendere mallet. Hinc vero prohi dolor factum est, ut, malo subinde aucto, oculi naturalem suam constitutionem, colorem, figuram, magnitudinemque & claritatem indices magis magisque amiserunt, insequente postea plenaria visus privatione. Cui removere à celeberrimis undique Medicis & artificibus remedia, sed frustra, hæctenus sunt requisita.

Epitrisia per malignam vitæ regimen a glandularum in capite situm.

X

Epitrisia.

Epietis.

Graves & chronicae omnis generis passiones solis medicamentis sine convenienti vitae victusque ratione sanari non posse, abunde non experientia solum confirmat, sed & constanti antiquissimorum Medicorum, inque primis GALENI, assertio fuit. Si quis enim à quibus originem morbus traxit ea fugere recusat, quo modo valere is possit equidem non video. Quum vero non laudabilis, principum maxime, ea sit consuetudo, ut præcepta diætetica vel rarius, vel prorsus non admittant, sed medicamentis juctunde tractari velint; non mirum est, sepius morbos eorum, facillioris alias & promptioris sanationis, sanari non posse. In tali, qualis noster est, longo & difficili admodum affectu levibus diæticis quam pharmaceuticis remediis uti solitus sum: Jubeo, ut à vino, cerevisia crassioris, à carnibus, ovis, placentis, scribis, salsis & acidis ægrotantes abstineant; è contrario vero aquam frigidam, quin etiam calidum herbarum appropriatè insusum ea aqua, magna in copia pro potu sumant & alvum imprimis laxiorem lenissimis laxantibus servent.

OBSERVATIO V.

Visus he-
bre de ex
appetitu
ac vi-
sione
dum

Vir generosus, L. & aliquot annorum, temperamentum sanguineum, phlegmaticum, vitae aulicæ jam per plures annos inordinatus, inordinatum habebat vitæ genus: siquidem crebro excessum cominebat in potu vini dulcis, fructibusque horeis nimium delectabatur; in venatione quondam autumnali caput ventis fortiter spiritibus inopponere expoluit. Postero die de capitis dolore pressorio conquerebatur, quem fluxio in oculis acris ad speculæ lucis semper increfcentis cum rubore & dolore sequebatur. Quod malum, neglecta vitæ ratione, idemque mediis contentis, in dies majora cepit incrementa; & quia simul rei veneratæ deditus erat, nec à vini potu liberaliori abstinere, tam grave factum est, ut in utroque oculo pene visum amitteret. Multos ideo consulit Medicos de variis, quæ hinc inde commendabantur, collyriis sed inani plane effectus utebatur. Rarum per medium discissam interiori oculi parti superponebat, quod crebro usu ab aliis comprobatum ipsique commendatum oihil proficiebat. Per annum & dimidium hoc molesto afflictus malo petiit à me quoque opem. Ego propexi primo loco diæticis remedia, & ne potus assumeret cerevisiam vel vinum, sed aquam frigidam, suavi. Deinde pediluvium valde temperatis frequentius ex meo consilio usus est paulo longiori in iis mora. Tum interditiis omnibus externis simplex tantum & vulgare ut in usum vocet, remedium commendavi, ut videlicet saliva sua jejuna, antequam surgat & posita quoque oculos illinat frequentius. Quibus simplicibus cum diu usus fuisset, accidit, ut, discissa profus vitata materia, visus clarus cum naturali oculorum constitutione restitueretur.

Epietis.

Sicuti nullæ fere partes corporis tam variis vitis morbiisque subjectæ sunt, quam ipsi oculi; ita etiam vix ullæ partes ab improvida externorum, quæ collyria vocantur, applicatione gravius patiuntur damnum quam illi ipsi; siquidem inde graviter excoriantur & in deterius plane mutantur.

Cautissime itaque quod in ejusmodi affectibus, externis, alias maxime laudatis, utantur Medici, tanquam monitum summe necessarium experientia sit edoctus scribo. In præsentis morbo mirabilem sane saliva ægri jejuna oculis inuncta præstavit effectum, quod remedium vulgo etiam non ignotum. Nam subcili fuit sale alcalino volatili, quo relictus est peoctrans hic humor insignem dulcedinem spissescens humores facultatem habet, hinc non sine insigni fructu in phlegmibus acque tuberculis cutem desordantibus adhibetur. Ex quibus apparere cuilibet potest, gravia oculorum vitia simplicibus & promissis remediis subinderectius removeri posse, quam compositis & arte pharmaceutica vel chymica laboriose compositis. De utilitate aque frigide in hæc morbis egregie commentatur CELSUS Libr. I. cap. 5. *Neque vero his solis, quas capitis imbecillitas torquet, usus aqua frigide prodest; sed is etiam, quos assidua lippitudo, gravedines, defillationes, consilique mole habent. His autem non caput tantum quædæ persundendum; sed et quoque multa frigida aqua servandum est; præcipueque omnibus, quibus hoc vitæ auxilium est, eo utendum est, ubi gravius oculum Austri reddiderunt.*

OBSERVATIO VI.

Vir Generosus, qui jam LX. attingit annum, officio admodum principis, quod multum curæ, sollicitudinis ac laboris in mente, quæque minus ingentem per varia itinera fatigationem cum multa actorum lectione ad multam noctem producta requirebat, jam ab aliquot annis pathematibus hypochondriacis, frequenibus cardiacis cum vertigine, hemicranis, aliisque stipitatione junctis obnoxius, fonte fœtorio Pyramontensi cum insigni fructu aliquoties usus est. Nunc ante annum & ultra de visus hebrendis & dolore interni oculi pressorio neque minus de molesta circa præcordia sensatione, vulgo *Ubelkeit*, circa vesperam maxime, conquerebatur. Variabant hæc secundæ adverteque res. Mox enim hoc vitium evanuit, mox recruduit; sed ante anni dimidium incisus increvit, adeo ut nulla fere ejusdem fuerit remissio, dolore simul tum caput perpetuo affligente, qui tamen post somnum ex parte siluit. Præterea molestus circa præcordia sentus cum virium deflectione & dolore artuum tendivo genus & pedes præsertim torquente frequenter quum virum generosum afflicebat, à me petiit consilium. Ego fontem Egranum cum convenienti vitæ victusque regimine per tres hebdomades bibendum & singulis diebus circa decubitus pedes ad genua usque in balneum tepidum immergendos suasi. In praedio Eluxirio viscerale temperate balsamico Vir Generosus usus, loco cerevisiæ aquam Selternam potui sumit. Dein emplastrum nostrum temperatum vesicatorium sine incommodo per mentem & ultra nuchæ imposuit magnam feri impuri copiam extraxit. Quæ cura tantæ fuit efficacit ut oculis bene habentibus & legere & scribere optime potuerit, haud de ullo amplius incommodo conquestus. Verum scena non multo post fuit mutata. Nam ex improvviso quodam casu, qui ejus animam ingenti percussit dolore, protinus cuncta priora mala, ingens scilicet oculorum caligo cum dolore premente, dolor cardiacus & artuum tendivus cum magna virium pæctura revertebantur, quibusdam etiam usque eo conficitur & consilia sibi expetit.

Epietis.

Epietis.

Sicut complures capitis affectiones, ut vertigo, aurium tinnitus & difficultas, cephalalgia, hemicrania, ubi suas servant periodos, ex vitio stomachi & primarum viarum sapientius originem suam trahunt; ita & oculorum flatus temporibus recurrentes morbos, obnubilationes, caliginis, visus hebetudines, fluxiones, ex colluvie humorum in hypochondriacis provenire non modo praesens causus docet, sed & crebriori observatum habemus experientia. Genesim horum affectionum ita procedit: A colluvie visioforum humorum in tunica ventriculi nervosa spissata sunt structurae, per quas, quam liber sanguis per venas compressas transitus intercipitur, major ejusdem redditur adpressus ad caput ejusque partes, ubi in vasis minimis stagnans ejusmodi molestias producit. Neque vero oculi ab ejusmodi foriori appulsu & congestione sunt immunes, quam tumore eorum omnes tenuissimis vasculis lymphaticis & sanguiferis sunt repleti, in quibus facile humorum circuitus potest turbari. Ex quo fundamens nunc ex facili tam facile acidularum aliorumque remedium operationis reddenda est ratio. Ex hoc igitur casu id maxime dicere possumus artis nostrae tyrones, quanta vis & vehementia insit animi perturbacionibus, adeo ut etiam morbos jam quiescentes, imo sublatos, sine ulla alia causa accedentibus repente revocare possint. Denique cautionem quoque exinde deponere possunt, qui per fontem salutarium virtutem convalescere, ut praeter meliorem vivendi rationem, tranquillam quoque & ab afflictibus immunem, merent quantum licet, custodiant.

* OBSERVATIO VII.

*Virum
anorum
XLIII.
robustae
constitutionis.*

Vir anorum XLIII. robustae ac plethoricae corporis constitutionis, à primis jam annis laeto victu & largiori vini potu, nunquam autem venae sectione usus, nullum per omnem vitam graviorum morbum, nisi crebras in juventute sanguinis è naribus fluxiones expertus est, quae deinde cessantes haud redierunt prius, quam superiori anno magno cum impetu. Haud ita pridem longo timere per concitacionem equitationem confecto, ad convivium invitatus de binis diebus vino Hungarico obrutus breviter post tralulentis vexatur doloribus colicis gravi diarrhoea stipatis, inter quam stras quasdam deposuit cruentas, quas pro intuspestivis haemorrhoidum excretionibus habere nulli dubitamus. Praeterea venacionibus nimium delicias Vir generolus die aequae ac nocte ut totum corpus, ita oculos maxime aëris exposuit injuriis; hinc subito ante tres abhinc anni quadrantes hebetudinem visus sensu oculi dexteri, qua aciem ejusdem ita debilitatam conquererebatur, ut omnia quasi per nebulam videret, nec ab homine hominem, licet minori distantia remotum, rite posset distinguere, altero ceterum oculo illeso existente.

Epietis.

Sanguinis nimiae abundantiae & tenacitati primam hujus mali originem debere, nemo non videt. Omisssa enim tam per naturales vias, quam per arterem sanguinis detractione, facile ejusdem ab inferius partibus ad superiores fieri potuit metastasis; praeteritum quoniam, foelicia in primis viis

Frid. Hoffmanni Oper. Tom. III.

per inordinatam dietam cruditatibus, ventriculi vires debilitatae & humores cum flubus generati sunt. Sanguis itaque versus caput adpressus & circa oculum praecipue dextrum congestus ob tardiores ibi per minima vascula progressum stagnavit; unde denegato tenuissimis succi nutritii ulteriori affluxu humores oculi crassi turbulique reddituri videndi claritatem imminutam produxerunt. In insinuatam igitur cura eo respicimus, uti debita ventriculo vis & chylo subtilitas restituatur, ut sanguinis mole per ejus missionem & tenuem vicium imminuta excretionibus ejusdem naturalibus via aperiat, & denique, ut caput, inque primis oculis ad congestiones liberatus corroboretur. Id quod potissimum conveniunt stomachicorum & tonicorum usus, subiacentis simul pediluvii, quae miram habent à superioribus ad inferiores partes derivandi facultatem, efficere studuimus. Praeter ea hac observatione adhauc praesens confirmamus, vitiorum morborumque, qui oculos invadunt, causam nimis ita se in primis viis atque in ventre repositam esse & radicatam, atque ideo in curatione ad eam apicem praefectis tollendam respici omnino debere. Neque id profecto satis junioribus medicum inculcari posse existimo, in gravioribus morbis causam non tam in humorum dydcrasia atque intemperie, quam in motuum vitio & aberratione, quae humores & sanguis locum suum naturalem mutare coguntur, querendam & inveniendam esse.

CAPUT VI.

De auditu vitii ex atonia.

THESES PATHOLOGICAE.

§. I.

Auditus vitia, quae ex atonia partium nervosarum & membracearum aures constituentium plerumque proscribuntur, ad tres posissimum redigi possunt classes. Prior est, quando sonitus tinnientes, susurrantes, murmurantes, campanarum strepitum emulantes, alique innuunt, qui tamen nullam extra corpus habent causam, audiuntur; tumque malum tinniens & susurrans aurium appellatur. Alter est *Acousis* seu *Supercus*, auditus gravitas, quando sonus extra nos excitati perceptio ipsius magnitudine minor est; & tertia denique surditas, seu perfecta auditiois abolitio.

*De vitio
affectionis
auditus.*

§. II.

Cuncta haec vitia, si species originem, eodem ferme nituntur fundamento, gradu tamen diverso, & sunt vel transitoria, quae saepius, ut quidem videntur, accidunt hominibus; vel perpetua, nunquam non morbo si quidpiam secum habentia. Haec veto jure dicuntur vel idiopathica, quae ex lesione partium aures constituentium, & intra ossem cranii thecam reconditarum primario suboriuntur; vel sympathica, quae ex aliarum partium, ut ventriculi vitio illas suos mutantur, aliisque morbis accedunt. Illa ut plurimum infestant continuo; haec per intervalla redeunt; surdusque non raro vertigine, dolore capitis, oculorum hebetudine, ventriculi imbecillitate, ructuosis, flatulentis, aliisque symptomatibus stipata.

*Formam
de generis.*

§. III.

Quotum
causas
formalem
rationem
si ve-

linus pericrurari, opus erit, quadam nostro scopo interuentia ex auri structura, indeque explicanda auditionis ratione praemittere. Neque enim copiosi in tradenda auris fabrica erimus; sed distinxat notabimus, 1) internas ejus partes, cavitates, merandros, fornice, circulos, gyros, miro artificio fabricatos, investiti peristio, quod est membrana tenuissima, vasculis arteriosis quam plurimis, tenuem humiditatem perpetuo plorantibus, plena: 2) hanc membranam esse propagationem & expansionem portiois mollis nervi acustici, ex prouberantia medullae oblongatae transversali egredientis, & per foramen auditiois internam, petroso ossi insculptum, internam aures ingredientis, eademque ratione ac retina in oculo visus, hanc auditus verum organon constituit; quippe in ea soni colliguntur, per nervi continuationem ad commune sensorium pro distincta perceptione transferendi. 3) Eiusdem nervi, qui septimum exhibet par, duram, ut vocant, portioem cum ramo quinti pariter ac octavi seu vagi paris communicare, & chordam illam, quae membranae tympani sustentis est, efficere: 4) arteriolas in aure distributas nervos ramulos in suo itinere comitari; 5) tubum Eustachianum, primum ossis, deinceps cartilagineum, & denique membranaceum hauri in palatum, & non solum cum externo aere, qui ore & naribus hauritur, communicare, verum etiam tenuem humiditatem, quae in aure interna ex continua perspiratione colligitur, in oris cavitatem, ne auditum turbet, evacuare.

§. IV.

Quod si
ergo membra-
nae nervae in aure
reperundae iusto
tensionis, a debito
nervi fluidi
influxu pendens,
gradu gaudeant;
sanguinis per
arteriolas circulus
sit regularis;
ductus Eustachianus
pariter ac reliqui
rite constituti ac
aperiti sint,
& reliquae partes
aurem confluente
bene conformatae:
tum auditus, qui
est perceptio soni,
seu motus aeris
elastici per corpus
sonorum producti
tremuli ac undulato-
rii, sine ullo perage-
ntur vicio.
Hinc autem est
contrario adparebit,
auditum genera-
tim viciari, si vel
partes ac cavitates
aurem interne
praternaturaliter
sint constitutae,
male conformatae,
obstructae, ulceratae;
vel imprimis tuba
Eustachiana clausa
ac obturata; vel
humorum per vasa
curtus inordinatus;
vel denique mem-
branae nervae
nimis relaxatae,
aut ultra gradum
naturalem tensae.

§. V.

Sic auctus
difficultas,
& ipsa demum
funditas
datur nativa,
ex mala organi
auditorii confor-
matione
originem trahens,
& omnem respuens
curacionem.
Idem vitium
pariunt externae
capitis & aurium
percussiones,
contusiones, ac
violentiae;
unde colaphos
ita infligi posse
notum est, ut
tinnitus aurium
inde exonatur,
das enim die
O'Brien de
vitiis: ex bombardarum
forti explosione
auditionem immi-
nuimus, permixta
comprobat exemplis;
& eos, qui diu
inter tormenta
bellica versati
sunt, die Arterien-
stenose pro-
vechiori plerumque
fieri surdos docet
experientia.
Non minus
audiendi facultas
viciatur, a
meatus auditorii,
tympani, ossiculorum
auditus &c. arrosione,
& exulceratione;
nec non pere-
grinis aures illap-
sis, & tam aeris
ingressum im-

pedientibus, quam ipsas membranas cum dolore afficientibus, ut insectis, ipsis &c. atque mucis illius subpinguis ac flavi, qui glandulis tubulifugis minimis in meatu auditiois secerantur, & ceruminis nomine venit, induratione. Nec denique silentio praetermittenda ea auditus vicia, quae ex tuba Eustachiana, quacunque de causa obstructa, natales mutantur; hinc enim aëris recipiunt per os & aures aditus & reditus impeditur, atque tenuioris in aure secretae humiditatis excretioni obex ponitur, unde & tinnitus & obscuritudo propullulant. Sarpus id fit sub salivatione, si caput praesentem aures frigide boreali, quae reprimat viscidos succos, exponitur: qualem calum post caput mercurio inunctum recenset TIMEUS a GULDENKLEE L. I. ep. 29.

§. VI.

Varis quoque modis auditus laeditur a spasmo, nimia siccitate, rigiditate, & interdum velut occalescentia nervorum & membranarum partium, quae organon auditionis constituant; quo in casu aures interna & meatus auditorius plane siccus, omnique humore etiam pinguiori destituitur. Quamquam enim talis nimia membranarum acusticarum tensio illam laxius affectum producat, quo acutiores soni non sine molestia & dolore audiri possunt: atamen exinde quoque gravitas auditus cum susurrus tinnituum non raro proficiunt. Hoc vitium post phreneticos, maniacosque morbos crebro remanet; nec non a vehementi capitis, sudore madidi, perspiratione, nimis diuque protractis vigilis, dysuria capitis ad radios solares expositione, omnibusque causis, quae corpus exsiccant, & succos tenues, rosidos, lymphaticos consumant, suum trahere observatur originem.

§. VII.

De his autem affectibus nobis non est sermo; sed de his tantum agere conlinuimus, qui a nimia nervorum & membranarum acusticarum relaxatione vel plenaria atonia oriuntur. Quorum licet tres superius adduxerimus species; eas tamen ita comparatas deprehendimus, ut eandem originem, easdemque causas, licet gradu diversas, agnoscant; quae generatim in humorum ad aures decubitu, & inde pendente relaxatione partium distant consistunt. Quod speciatim tinnitum sursumque attinet; excitatur ille, si causae intra aures internam adfint, quae nervos acusticos in tremulum ac undulatorium, externam campinarum aut alius corporis sonori sonis similem motum abripere valent. Tales in malo recentiori, corporibusque sanguine plenis non aliae sunt, quam rapidiores ac fortiores arteriolarum, membranas aurium perrepantium, nervosque earum comitantium pulsationes; quae majorem sanguinis ad caput, aureaque congestione & in his saculum flagnationem sequuntur. Haec vero flagnationes si diutius persistunt, distendunt vasa, relaxant membranas, subsistuntque sanguis naturali majorem tensionis ferri quantitatem per poros vasorum dimittit; quod intra meatus internus in vapores resolvitur, & sic, accedente praesentem ductus Eustachiani obstructione, indeque impedito tam aëris, quam vaporum exitu, augeat tumultus, murmur, ac tonitruus aurium. Eadem quoque ratione flagratio sanguinis pariter ac copiosior ferri tenuioris exhalatio, comprimendo nervos, sufficientem liquidum tenuissimum fluxum remouet, inducit membranarum laxitatem; unde soni externi deui-

— si forte
et per-
tinnitum

— si forte
tinnitum
et per-
tinnitum

— si forte
tinnitum
et per-
tinnitum

debilius percipiuntur & generatur auditus difficultas; quæ compressis penitus nervis, cessante-que omni fluidi nervi influxu, in perfectam omnino mutam surditatem.

§. VIII.

Quicquid igitur congestionem sanguinis ad aures, viciniaeque iis partes, & celeriore atque rapidiore ejus per arteriolas acusticas circuitum producit: id ad tinnitum, fufurrum, aliasque audinas laesiones contribuit. Hinc frequenti confirmatum habemus experientia, quod ii, qui sanguine abundans, & quibus sanguinis motus ad caput directus est, quod si ab alio adstricta, spasmis abdominis, fluxu hæmorrhoidum & membrorum cessante vel suppresso, partium extremarum nimia refrigeratione, incurant doctorem capitis gravatum, vertiginem, atque tinnitum; qui continuante sanguinis stagnatione, accedenteque demum membranarum atonia, gravem pariter auditum, ac tandem surditatem, rarius in utraque simul aure locum habentem, sed ex una in altum progredientem. Ex eodem fundamento explicanda erit ratio tinnitus, qui inflammationem partium auri vicinarum, parotidum &c. comitatur; aut in febribus acutis continuus ex capite humorum ad caput evenit, delirique est præmonitum. Nec rari sunt eos, in quibus consuetæ naturæ hæmorrhagiae cessantur, inprimis si docentium munere fungentes, crebros alia voce sermones facere coguntur, corpori gravi ac pertinaci aurium tinnitu, cum auditus gravitate vix sanabili: qualem casum in huius SYSTEMATIS Tom. IV. Part. II. allegavi.

§. IX.

Quæ affectiones auditus viti sunt idiopathicae; ita sympathicae potius merentur appellari, quarum fomes in primis vitiis existit, quæ per periodos recurrunt, vel saltem suos remissionis & exacerbationis habent gradus. Causa nimirum in ventriculo, & prava alimentorum digestionem hæret; unde status copiosius generantur, qui distendendo ventriculum ac intestina, comprimendoque valia abdominis sanguinea humores majori quantitate ad superiores partes cogunt; quorum in aure flagratio ad tinnitum & auditus difficultatem contribuit. Quomodo vero pathemata in primis viti per certa intervalla ingravescent; ita quoque tristem & dolorificam in capite ac aures per periodos ludunt scenam. Hinc obauditioni ex hac causa provenienti obnoxii potissimum sunt hypochondriaci, & flatulentis morbus laborantes; in quibus sæpius citra omnem expectationem evenit, & brevi iterum evanescit, quod exprimentes dicunt: *Es ist mir auf einmal was vor die Ohren gefallen, das ich sehr nicht hören kan.* Hinc etiam observare licet, ejusmodi vitia solis sæpenu-mero stomachici, carminativi, & accuratori dietæ profus debellari.

§. X.

Imminuitur porro, vel plane aboletur auditus, à decubitu seroforum humorum vel ad principia nervorum acusticorum, vel ad internas aures cavitates. Prius fit in affectibus soporosis, apoplecticis, hemiplegicis, paralyticis, & si omnibus, qui à colluvie serofa, cerebrum inundante originem trahunt: post interduum difficultatem auditus & surditatem possit lethargum & insulsum apoplecticum sequatur observari. Posterius contingit t) si excretiones serimucidi consueque per nares, ut in

coryza, simul & semel cohibentur, vel sponte cessant; ubi serum illud ad aures decumbit, & membranas acusticas relaxat, præsertim in senilibus ac debilitatis corporibus. 2) critico quasi motu in febribus continuis, exanthematicis, maxime catarrhalibus malignis seu petechiaribus, Hungaricis, & quæ caput cum ejus dolore ac delirio afficiunt. In his furdaster ejusmodi status extra dies potissimum criticos evenit, bonique ut plurimum omnis esse solet: sed prospiciendum, ut talis obaudirio inter initia convenienti medicina debelletur, ne radicata vires medicas eludat.

§. XI.

Lento denique pede auditus gravitatem incur-
rit, qui per vitæ genus inordinatum ut totius nervosi systematis, ita speciatim membranarum acusticarum debilitatem humorumque simul impuritate sibi contraxerunt. Hinc iis vitiis obnoxios potissimum deprehendimus senes, cacochymicos, scorbuticos, qui veneri nimis indulsuerunt, potibus inebriantibus abusi fuerunt, aut diuturna tristitia ac morore vires corporis consumserunt. Non minus laxitatem membranarum auri, & infrequentem obauditionem patiuntur, qui in tempestate humida, nebulosa, vapida diu versantur, aut in locis palustribus, vel conclavi admodum commorantur, nec non, qui per longum tempus defensionibus catarrhalibus capitis & glandularum circa fauces sitarum laborant: tentionem enim nervorum membranarum nimia humiditate insigniter minui, multis constat experimentis.

§. XII.

Notatu præterea dignum, & aurium tinnitum, & auditus difficultatem pro diversitate causarum diversâ ratione ac tempore exacerbari. Qui dictis vitiis à sanguinis congestionem ad caput sunt obnoxii; eorum exacerbationem circa æquinoctialia tempora, vere scilicet & autumno experiuntur; quoniam eo tempore humores magis commoveri, & congestionem augeri solent. Qui autem ex ventriculi, primarumque regionum vitio auditum gravem patiuntur; male habens post sumtos coctus difficiliores ac flatulentos cibos; eo quod flatui, quo copiosiores generantur, eo magis humorum ad caput raptum efficiant. Qui denique ex ferosi humoris decubitu, laxitateque nervorum surdissimi sunt; mali sui insignem augmentum percipiunt coelo existente nebuloso, gravi, pluvioso; quod videlicet talis tempestas laxitatem membranarum acusticarum magis augeat; quæ vicissim iis est solatio, qui ex nimia aurium siccitate inciderant auditus difficultatem.

§. XIII.

Omnes auditus læsiones curatu sunt difficiles; Prognosis. nisi enim inter prima initia corrigantur; inveterate raro medelam admittunt, quæ eo fit intricatio, quo profundius causæ intra ossam auditus thecam, aut ipsam plane cerebrum sunt absconditæ. Qui in plethoricis, atque debilitatis corporibus capitis dolorem gravativum atque vertiginem sequitur tinnitus, aut auditus difficultas, sæpius insulsum apoplectici insulsum exhibet præsignium; quando vero in phrenitide, Hungaricaque febre, non sequente narium fluxu, contingit, delirium portendit: furditatem vero succedens delirium, juxta HIPPOCRATEM malum. At furdaster status in petechizante febre circa dies criticos, urina existente cocta, eveniens, bene omnino jubet sperare.

Causa morbi est tam-
en aud-
itiom.

Auditus
vitiis ex
tota tam-
en aud-
itiom.

Auditus
vitiis ex
tota tam-
en aud-
itiom.

Causa re-
mota est
et sub-
stantia
auditiom.

Quæ tam-
en tam-
en aud-
itiom.

CURATIO.

§. I.

Indicationes
curatio-
nis.

Quemadmodum vix ullus morbus curatur, nisi ejus causa removetur, & inveniendi artificium in eo potissimum consistit, ut iusta causa cognoscatur: sic idem in aurium adfectibus est cognoscendum. Neque vero in his causarum modo diversitas, sed etiam temporis, per quod durarunt, diuturnitas respicienda; quoniam aliam recentia, aliam inveterata auditionis vitia requirunt curationem. At cum nobis de his potissimum sermo est, quæ ex flacciditate & laxitate nervorum membranarumque & scilicet ad eas humorum decubitu suboritur: eorum curationem tribus recte consideremus momentis, quæ in eo consistunt, ut 1) impetus ruentium ad caput humorum deriverit, 2) flagnantes in aure succi discutiantur, & obstructions referantur, ac denique, ut 3) influxus fluidi nervi sufficiens restituatur, adeoque robur membranarum infiauretur.

§. II.

Quemad-
modum
affectus sit
a repon-
dendo.

Primæ indicationi satisfaciunt 1) venæ sectiones, quæ sanguinem imminuendo, æqualem ejus per corporis ambitum circulum promovere, raptumque à capite derivant. 2) Alvum laxantia, statumque excretionem juvenat; qualia, si malum in corporibus sanguine plenissimis, & spasmi tui ventris obnoxiis recens ostium fuerit, leniora marinata, rhubarbarina, vel clysteres esse debent. Ubi vero inveteravit affectus in subiectis serosis ac pituitosis; efficaciora ex usu sunt laxantia, ut infusa vinosa, quæ per epicrasio operantur, & pilulæ cephalicæ, quarum exemplar supra Cap. I. allegavimus. 3) Pediluvia tepidiora ex aqua fluviali, sursum ibi triticis, cinneribus clavellatis; quippe quæ humores effaciant à capite revocant, & in ambitum corporis exteriorum ac inferiorum invitant. 4) Veticatoria furis pedum admota, quæ in subiectis pituitosis, ubi serosa colluvies malum induxit, egregiè sunt utilitatis.

§. III.

Quemad-
modum
affectus
discurritur.

Alteram indicationem explent, quæ vim serum viscidum in toto corpore, ita præsertim in capitis recessibus discutendi, resolvendi ac evacuandi possident. Ex internis præter laxantia hæc spectant 1) diaphoretica, pro subiectorum & causarum ratione eligenda. Sanguinei enim, plethorici, & qui ex organico sanguinis vitio audinas patiuntur, possunt diaphoretica fixa, absorbentibus & nitrosa nupta; nec non infusa theiformia intra lectum cum blando regimine potanda: sic enim solo potu Caffee tinnitum diffusum novi. Pilegmaticæ & defluxionibus catarrhalibus obnoxii ex spiritibus bezoardicis, cum essentis catarrhalibus ac resolventibus junctis solamen percipiant, ut sunt spiritus bezoardicus Bullii, liquor cornu cervi luccinatus, essentia succini, pimpinellæ albæ &c. 2) diuretica, quorum in morbis capitis serosis excellentissima est efficacia; ex his reliquis palmam eripit tinctura antimoniæ acris, quæ cum essentia succini, & liquo cornu cervi succinato combinari potest. Scorbuticis vero, atque cachecticis interna resolutiva, attenuantia, & sic dicta antiscorbutica,

quorum princeps est serum lactis, fructum pollicentur amplissimum.

§. IV.

Quod externa huic scopo inservientia attinet; Quæ diff-
ex his, si congestio sanguinea, & stasis inflam-
matoria malum sustineat, principem locum tuetur
sacculi discutientes & camphorata, magis in
sicca forma, quam cum spiritu vini applicanda.
Ubi vero laxitas à seroso decubitu subest; in
Gallii præsertim inter arcana referuntur olea ex-
pressa, & in his infusæ cantharides, cujus liquo-
ris aliquot guttulæ auribus infillantur. Excitant
quidem sevilissimos, & tantos cum ardore dolo-
res, qui vix tolerari queant; sed intra paucas ho-
ras ea remittunt, cum redeunte sæpius auditu,
remitunt. Modus operandi in eo consistit, ut
acriusculus ejusmodi remediis dolorificis in rela-
xatis membranis sensus excitetur, quo illæ ad
spasticam contractionem provectantur, eaque dis-
cutiantur atque expellant flagnantes succos. Poro
hoc fine laudari solent pinguendo vitætarum,
oleum amygdalarum amararum, essentia ac tpe-
dulla castorei, gollypio auribus immittenda; nec
non sufficit ex decocto baccharum lauri, juniperi,
florum chamæmeli, sambuci, salviæ, verbenæ,
rosifmarini &c. & HARTMANNUS com-
mendat vaporem ex herba abstinii cum lacte
decocta auribus admittendum.

§. V.

Vi tertiæ indicationis ex usu sunt roborantia Quæ po-
tam interna, quam externa. Ex internis egre-
giè sunt usus Elixiria carminativa, viscerala,
stomachica, præsertim ubi vitium in primis hæ-
ret regionibus: ea enim dissipando flatum, juvan-
doque digestionem, humorum ad caput conge-
stionem præpediunt. Inter externa prærogati-
vam obtinet balsamus vitæ meus, qui nervis
partibus, tremulum spasmodicum motum in his
excitando, robur reddit. Prostant hoc etiam fine
vanè spiritus acutissimi, ut *Mundereri, Myrsiceti*
&c. aqua reginæ Hungariæ, Anhalina cum spi-
ritu salis ammoniaci, rosifmarini, liquore cornu
cervi succinato permixta, auribusque cum golly-
pio interusa: & inprimis motus & ambra auri-
bus amica censent, & in aquis cephalicis soluta
adplicari solet. In humidioribus subiectis, & quæ
frequenti coryza infestantur roborandi intentione
insuperandum raso capiti lusoque pulverem ex
succino, benzoe, caryophyllis, radice iridis flo-
rentinæ, rasura ligni aloës &c. Quod denique
dietam ac regimen attinet, tam ex superius
licebit repetere; nec est, quod monemus, nisi
ut caput & aurium confinia ab omni frigido &
humido aëre probe maniantur curiosque velen-
tur. Quem in finem, sub vehementiori præsertim
zephyri flatu, caput cucupha adversus aëris con-
tumeliam defendere præstat: Cujus hæc formula
esse potest: *Recipe radicis cyperi ratundi, femi-
nis nigellæ, succini, benzoes, styracis, iridis Flo-
rentinæ, singularum unciam unam, moschi drachmam
semis, serum anabos, lavendulæ, rosarum ana pug-
tres, serpilli, majoranæ ana unciam dimidiam.*
M. F. F.

CAUTELE PRACTICÆ

§. I.

Quemadmodum in oculorum vitiiis multas Cautelæ
gravesque noxæ ab externorum, maximeque
colly-

collyriorum incauso usu propullulant: ita in aurium affectibus idem fieri observamus: siquidem varia experimenta & tentamina per insuffillationes liquorum spirituosorum, oleosorum, pinguium & humectantium, vapores ex decoctis nervinis & cephalicis, suffimigia ex gummatibus & ejusmodi plura, plerumque cum damno adhibentur; nisi prius causa materialis, malum foveat, congruis instituta fuerit debellata administratio. Inprimis ut in omnibus nervorum, ita quoque auditus à debilitate vitii summopere cavendum à vaporosis & opiatis medicamentis; siquidem mali causam non tollunt, & laxatorem membranarum acusticarum magis adaugent. Cautius etiam cum cucuphis suaveolentibus, quas pro roborando capite solent adhibere, mercandum est, quoniam multis sunt adversa.

§. II.

Sanguinis missiones in tinnitu aurium, gravitateque auditus, quæ à nimia sanguinis copia, ejusque congectione ad caput originem traxit, commodissimum habet locum; maxime si suppreffio vel imminutus fluxus mensium ac hæmorrhoidum antecesserit: quo in casu venæ sectio in pedibus instituta fructum pollicetur amplissimum. At si narium hæmorrhagiæ cohibita tinnitus causam præbeant, eas, si opportuna fuerit ætas, stylo naribus intruso revocare multum juvabit: earum vero emanatio per ætatis rationem facta, rescindenda venæ sectionibus circa singula æquinoctia in pede institutis; siquidem harum opilio malum, licet jam sit debellatum, revocare valet.

§. III.

Quæ catarrhalibus fluxionibus stipata sunt, auditus vitia, efficaciora laxantia, insulaque vinosa, nec non mercurialia possunt; & præterea victus tenuis efficax omnem fere pharmacorum vim superabit: nec contemnendam eo in casu efficaciam suffimigia ex temperatis gummatibus præstabit. Sæpe etiam fit, ut achores, tineæ capitis, scabies, alique efflorescentiæ præmature consolidatæ & exsiccatæ auditus relinquunt gravitatem: quo in casu præter laxantia, & pulvres diaphoreticos cum floribus sulphuris permiscendos, vesicatoria atque fonticuli, derivando materiam exanthematicam operæ pretium faciunt. Si serosæ per nares excretionis cohibita auditus difficultatem exciterint; non est alienum, sal volatile ammoniaci siccum, oleo majoranæ imprægnatum crebro naribus admove-re.

§. IV.

Ubi auditus vitia sunt periodica, & hypochondriacum malum constitutionem pro causa agnoscunt; annuendum est, ut ventriculus à fordidis repurgetur, atque suum recuperet tonum; sicut præcedente Tomo Cap. de malo hypochondriaco docuimus: & observavi sæpius, molestissimum aurium tinnitum in hypochondriacis sæpius evenientem, unica absorbentis dosi fuisse curatum. Qui scorbuticam humorum diathesin, & vasorum minimorum obstructions patiuntur; bene sibi consulunt, si aquis mineralibus cum debito regimine utantur.

§. V.

Quæ auditus gravitas ex nimia siccitate membranarum nata fuit, possit balnea emollientia,

insula decoctaque lubricantia & humectantia, atque juvat tum omnino oleum amygdalarum dulcium auri affectu immittere aut pinguedinem anguillæ tepidam insuffillare. Præterea nocent vere olea auri improvide insula. Exterius profunt somenta emollientia & pægorica, quorum optimum præbet panis ex furno recenter exentus, cui balsamus vitæ adspersit. Ubi vero cerumen aurium coagulatum, & quo sæpius fit, insular gypsi est induratum; abstinentium à nimio humectantium & oleosorum, quæ vulgo solent commendari, usu. Optimum potius est consilium, si lac, vel quod melius, ejus cremor tepide ope syphonis insundatur auri, vel vapor ex pane calido, è furno extracto, & discisso eidem immittatur: hic enim blando vapore penetrat & emollit viciam tenacemque materiam.

§. VI.

Quando tuba Eustachiana interius obstructa tinnitui, surditatiq; causam præbet; præter intema succos viscidos colligantia & evacuantia, commendantur masticatoria, ut radix angelicæ, imperatorie, pyrethri, masticæ, zingiber &c. quorum vis proximè pertingit ad affectum locum. Laudantur hoc etiam sine sternutatoria, quippe quæ motum concussorium excitando sæpe expellunt inherentes materias; & eadem in hoc casu opem tulisse, testis est TOLMUS Lib. I. Obs. 35.

§. VII.

Cum à nimio sanguinis ac humorum motu ad caput & auditus organa nimiaque humiditate propter perspirationem insufficientem cohibita ibi collecta & sedecente pleraque auditus difficultates suboriantur, maxime omnium curandum est, ut caput in continuis & moderata perspiratione conservetur & ab iis omnibus, quæ eam sufflaminant, probe defendatur: cuius generis sunt balneum, conclave, in quo ager dormit, vappidum & declive, capitis post lodorem refrigeratio, maximeque omnium ejus lotio.

ENARRATIONES MORBORUM.

OBSERVATIO I.

Illustrissima in vigore ætatis constituta femina valde obesa, per multos jam annos in matrimonio vixit prole destituta & quoad animi corporisque functiones bene semper valuisse quod ante aliquot abhinc annos confestim vertigine cum gravi aurium tinnitu juncto correpta per intervalla fuerit. Contra hæc mala suavis Medicorum variis remediis & præcipue aquis Schwalbacensibus usa est, hisque posterioribus tam felici successu, ut vim mali fractam paulo sentiens, recidivæ metum omnem abjiceret. At vero, paucis abhinc mensibus non modo vertigo in caducam transit, verum etiam tinnitus cum gravi auditus læsione denuo invasit, quibus simul everfio complicatur ventriculi cum refectione multæ pituitæ, quæ modo gravius, modo levior sæpius recurrit. A medicamentis balsamicis & calidioribus pejus, melius vero à diluentibus & sanguinis organum sedantibus Illustriss. habere solet. Ceterum sat bene ipsi uterina succedit purgatio & ad minuendam propter hunc vitam genus plethoram ter singulis annis sangui-

X 4 nem

Circa venæ sectionem.

Quomodo res, causa abaudientia.

in hypochondriacis, ac scorbuticis.

in siccitate membranarum.

ad com-
mune in-
duran.

ab ob-
servat.
ductus
Eustachii.

ad tem-
perationem
prohibet.

Tinnitus
aurium à
plethora.

nem ē vena seclā detrahendum curat. In tali re-
rum statu mihi demum in consiliū vocato que-
stio fuit propoſita: An ab aquarum Spadanarum
interno & externo Aquigranensium thermarum
usu exoptatum sperare liceat auxilium?

Epiergus cum response.

Clarissime ex hac morbi historia elucere arbi-
tore, à sola temperati & boni sanguinis nimia
in corpore bene valente & plethorico diffuſa
vertiginem cum auditus labe posse suboriri. San-
guinis quidem detractionem ter per annum Illu-
strissima forma admittit; sed quam nimio sangui-
ne turgida sine prole vixit lautiorique diutius usa
est, plus superflui sanguinis generavit, quam per
V. Snem & mensium fluxum, satis fortasse par-
cum ac moderatum, fuit consumtum. Quæ cum
indecum perpendere, præter ternas V. Snes
consuetas, alternatim quoque scarificationes eod-
em numero instituendas & loco potius ordina-
rii Selteranæ vel communem aquam cum quar-
ta vini parte remixtam bibendam suasi. Præter-
ea à coena vitæque deside, quibus dedica erat,
abstinere iussi; & quæ salutare antea fuerunt,
Schwalbacenses acidulas iterum potandas, quam
experimentum cum fontibus Spadanis denuo
faciendum consuli duci. Balneum vero ther-
marum Aquigranensium, quæ ob minerale
sulphur, quo abundant, nimis calidæ sunt,
quum in morbis capitis, præsertim qui à plethora
sunt, nunquam salutare deprehenderim, re-
probavi.

OBSERVATIO II.

*Tinnitus
aurium in
hypochon-
driæ &
hæmipar-
etici.*

Vir annuū agens XLII. temperamento
prædictus cholerico-sanguineo, iam inde à te-
neris iuventutis annis à nimia lubricationibus
tinnitu aurium leviori cum continas aurium na-
riumque fucitate laboravit. Aliquot nunc efflu-
xerunt anni, quum tanta hic affectus incre-
menta sumit, ut in altera aure horologii pul-
sus, in altera tinnituum finitus perpetuo per-
cipiatur, qui omnem prope somnum adimendo
vires mirum debilitat. Quod peculiare sympto-
ma longe majori urget vehementia, si quando
iracundia, aut vehemens corporis commotio,
aut sanguinis quedam à vini generosi potu ebul-
litio præcessit. Præterea nec capitis dolor, nec
vertigo sollicitat, nisi quod autumnali nonnun-
quam tempore sub humida aëris temperie dolo-
res cervicis tensivi invadant, auditusque tum
temporis simul aliqua fiat obtusio. Cruentæ sed-
es rariis expertus æger per aliquot jam annos
hæmorrhoidibus cæcis affligitur, qui urant &
tument cum magno pruritu: quibus in ordinem
redigendis bina per annum V. Sne ad unciam
dimidiam utitur, quæ sanguis colore & consi-
stentia bonus detrahitur. Coria huc usque sem-
per maior fuit prandio, alviq; officium rite
temper consistit. Consuluit ego præter V. Snes
consuetas scarificationes quoque alternis mensi-
bus triduo ante & post novilunium fulcipiendas,
crebriusque pediluviorum usum cum hirudinum
ad venas hæmorrhoidum tumentes adpositione
suasi: tum vero, ut ab animi affectibus probe
sibi æger temperet, à coena abstinere optimeque
corpus contra aëris, præsertim autumnalis inju-
riam defendat & potui ordinario vinum cum
tribus aquæ partibus dilutum bibat, consului.
Aurium vicio specialius succurrendum duci ef-

fectia moschi cum spiritu rosarum, Liliorum con-
vallium & florum chamomillæ Romanæ parata,
quam bombaci infillatam auri sæpius indere
iussi. Quibus probe observatis & brevi noster e-
gregie levatum vidit.

Epiergus.

Quando cholericus & hæmorrhoidarum auditus
vicio obnoxius fuit, scarificationes V. Sne longe
efficaciores deprehendi. Insuper notabile in hac
morbi historia est, quod in juventute à nimia
lubricationibus vitæque sedentaria & exortai-
nde ventriculi imbecillitate malum originem suam
repetat, nec perfecte curetur, sed per plures an-
nos, maxime si diutius accedat vitium, affligit.
Incipit denique, aurium vicia, præsertim tin-
nitum gravem & pertinacem à sanguinis magis
& humorum vicio eorumque motu ad caput
& præsertim auditus organa visioso, quàm à parti-
um auditum constitutum læsione ortum tra-
here, quod tum maxime fit, si malum per tem-
pus remittit, postea revertitur.

OBSERVATIO III.

Fœmina XX. annos nata, macilentioris cor-
poris habitus vitæque sedentariæ admodum ad-
dicta alvi adeo constriçtæ est, ut vix sexto die
rite deponat, cui vicio simul appetitus magna
jungitur proſtratio, haud fallax digestioni læ-
sæ testis, ob quam fit, ut si forte in cibis adu-
mendis paululum excedit, nauseosum circa præ-
cordia molestum statim perſentiat, quam copio-
si ructus sequuntur. Jam per tres integros men-
ses gravi hæmiparicia cum vehementi aurium, in-
primis sinistri lateris laborat tinnitu, qui ex sum-
mo experietur ingentes creat molestias & ab hu-
mida frigidaque aëris intemperie nunquam non
intenditur. Accesserunt insuper aliquot abhinc
hebdomadibus dolores in nucha tensivi, qui in
brachiis, maximeque sinistro, ad digitos usque
proſenti misere nostram excruciant. Pedes, qui
plerumque frigidi sunt, summa tenet lassitudo,
neque, quod maximum est, recto modo & or-
dine procedit mensura purgatio; quæ cum vicio
capitis auriumque exacerbata plurimum orta
per quatuordecim dies durat, copiosa demum
muci alii excretionē subsequente.

Epiergus cum consilio.

Recte omnino ea, quæ ægrotæ nostra laborat,
affectio dici potest rheumatica capitis, cuius proxi-
mam causam in stagnatione & decubitu feri, cir-
ca membranas capitis & eas maxime, quæ au-
rem internam, præsertim sinistri lateris, inve-
ſtiunt, reponendum esse ducimus. Occasionem
huic malo præbuit ingens ob excessivam men-
struam purgationem motuum vitalium imbecil-
litas, quæ humores hinc inde in partibus nervo-
sis & muculosiis stagnantes dolores tensivos &
graviores cum insigni lassitudine inducunt;
in intestinis vero flatus & spasticas stricuras seu
pathemata hypochondriaci fulciant. Nam in-
star regulæ prædictæ probe tenendum est reor;
ab inopia & defectu boni ac temperati sangui-
nis pariter atque à nimia ejus abundantia & ca-
pitis & intestinorum morbos, qui mali hypo-
chondriaci consueto nomine veniunt, excitari.
In hoc casu primo omnium symptomatum urgen-
tiori, atroci videlicet capitis dolori succurrendum
duci,

*Rheuma-
tismus au-
rium à
sanguinis
defectu.*

duci, eo quod ea dolorum ac spasmodum indoles ac potentia est, ut universam tam functionem naturalem, quam motum vitalium economiam non modo turbet & pervertat, verum etiam genuinum convenientium remedium in sanando efficaciam impedit. Prescripti itaque linimentum nervinum ex quatuor liquoris nostri anodynii & una balsami visali parte compositum cum lineto duplicato fronti & temporibus bis de die applicandum, utpote quod discutiente roboranteque & anodyna virtute sua mitigandis capitis doloribus misce opitulatur. Deinceps ulum elixirii nostri sic dicti visceralis temperati, quod omnibus anthypochondriaci palmam præcipit, inter prandium ad roborandam ventriculi & intestinorum vim digesticem, interposito nonnunquam laxante rhabbarino, ordinarioque pro potu ordinario decocto radicis chinæ cum portione cinnamomi & corticum aurantium recentium, commendavimus. Quorum remedium frequenter ulu negotium mensium in ordinem redactum, vitiisque primarum viarum sublati conveniens omnibus solidis partibus robur conciliatum per Dei gratiam effecimus.

OBSERVATIO IV.

Auditus generosus per inordinatam famem.

Vir generosus, Consiliarius Aulicus, XL annum nondum ingressus, constitutionis, ut ex pleno corporis habitu floridaque facie apparebat, sanguine-phlegmaticæ, ob majorem paulo ciborum appetentiam à dimidio anni pinguior factus ab eodem tempore obtusum & gravio-rem animadvertit auditum, quem aëre præsertim pluvioso ita ingravescere conquerebatur, ut vix ullam vocem distincte satis percipere valeret. Multis quidem fœd frustraneo effectu usus admaniculis, me tandem ad aulam Principis sui vocatum consuluit. Tum ego hancce auditus labem sine medicamentis me curaturum promittens curam per inediam hoc modo instituendam suasi. Primo omnium, purgato probe corpore & sanguine per V. Snem evacuato, ab omnibus juleis, pinguibus, ovis, piscibus carneque cocta abstinere iussi, & nihil quotidie carnis præter eam, quam libra dimidia ponderat, portionem assare cum viginis aliquot passulis exacina- tis & prunis coctis admisi. Dein, loco panis panem bis coctum & pro potu consueto decoctum Chinæ, graminis & farlaparillæ bibendum commendavi; quo iidem singulis diebus mane ad aliquot patellas calide hausto corpus ad blandum in lecto sudorem componere deberet. Ut tandem vini potus sit modicus, motus insinuas frequenter, & vigilis potius quam somno Vir generosus indulgeat, consului. Ego quidem ex aula abiens vix ipsum hunc severæ medicationis legi obtemperaturum credebam; at ille nihilo secius parcam victus rationem tam curate observavit, ut mihi à Principe in consilium rursus adscito mirum plane videretur, obesitatem ad ulnæ dimidium imminutam pristinamque auditus integritatem exinde redditam fuisse; quod gravissimo animi adfectu nunciabat mihi lætissimus.

Epicrisis.

Abstinentiæ & inediæ tanta vis inest medicinalis, ut non modo in vitiis stomachi omnibus fere, in quibus eam CELSUS Lib. IV. cap. 5. commendat, colluviem crudorum humorum ablu-

mendo, calorem & tonum deficientem resiliat; verum etiam copiam feri evacuando solidiorum tonum intendat, totumque sanguinis circulum cum excretionibus promovat; ac adeo his adfectibus, qui ex nimia feri abundantia proveniunt, occurrat insignissime. Recte hinc HIPPOCRATES, *Sect. VII. Aph. 59.* corporibus præhumida carne præditis sanem commendat; namque sua hæc efficit sensum atque æqualiter. Et idem quoque *Lib. Epidem. VII.* æque ac CELSUS in morbis capitis per vionibus exercitium corporis & abstinentiam à carnibus, præsertim pinguibus & vino plurimum collaudat. Ut & ego plena fide testari possum, me in cachexia, ictero, exaltationibus scorbuticis & variis curis vitiis, neque minus in affectibus soporosis & paralyticis sola per inediam cura, quæ tantum fit carne pauca assata sine infantibus, sine pinguibus, & glutinosis, mirificam effectum vidisse productum. Quoniam itaque hæc auditus labe à sola humiditate in auditu partibus flagante originem suam daxisse mihi visa fuit, alia quoque abstinentia, quæ humidum nimium absorbuit, sublatam eam futuram bono omine judicavi.

OBSERVATIO V.

Matrona LX. & aliquot annorum, vegete alias constitutionis, & ob insignem vim ventriculi concoctricem, qualiacunque æque bene digerens esculenta; alio nonnunquam ficiore, tempestatque pluviosa existente, gravitatem capitis cum auditus difficultate perferentem dolorem, qui à summis cibis leniter subducens, ut dulcibus & salitis, vel etiam pilulis nostris polybreffis aut ab aliquot Balsami nostri vitæ guttulis cum bombace auri inditis feliciter cessat. Aliquot abhinc mensibus in sinistra aure audiendi facultatem penitus amisit, quæ imminuta tamen in dextra remansit. Suali hinc ut per intervalla rhabbari drachmam unam cum uncia una Cossæ in aqua leniter coctam solutamque biberet, & frustulum allii æternarum cum essentia quadam aulica, quæ essentiam Colocynthis & Moschi habebat, bombaci aut aliquot guttulas infusæ hæsi auri applicaret. Quorum remedium ulu laudabilem percepit effectum.

Gravitas auditus ab inordinata fami.

Epicrisis.

Quemadmodum, teste Hippocrate *Aph. 24. Sect. III.* pueri juvenesque ob nimiam aurium humiditatem; ita senes ob harum siccitatem secundum ejusdem gravissimam Auctoris placita *Aph. 31. Sect. III.* auditus vitiis valde obnoxii sunt. Nunquam tamen non, annotante pariter HIPPOCRATE *Sect. IV. Aph. 28.* salutaris observatur alvus in aurium vitiis liquida, dum exinde motus sanguinis à capite ad infernas partes egregie derivatur. Sed ut omnes sensibus tam interni quam externi sensus; ita visus quoque & auditus admodum debilitantur; & cum nervi membranaceæ sensoriorum in his rigidiores non facis rore imbuti sint subtilissimo nervo; auditus pariter organon ad motum aëris tremulum percipiendum minus existit idoneum. Quæ cum ita sint, externa spiritalia remedia; & quæ spiritibus resiliunt & subelli acrimoniæ suæ stimulantem vigorem & motum nervosis tunicis adstant, nunquam destituta bono effectu deprehendunt. Ideo quoque ab aliis frustulo auribus immisso, quod plebejæ & domesticum experimentum est, singula-

gularum saepius fructum animadverti. Quando vero paralyticam adfectionem auris unus aut utriusque comitatur vel sequitur audiendi gravitas, aliquot salis volatilis purificati grana cum pauxillo callores mixta auribusque indita, tonum & robur relaxatis partibus conciliando, eximie opulantur.

OBSERVATIO VI.

*Auditus
latus ex
vitiis
promi-
nuum
talem.*

Vir quidam LX. annorum, complexionis melancholico-cholericæ, jam à decem abhinc annis audiendi quadam difficultate ab angina maxime, qua cum saepius fuit confectus, laboravit. Ad abigendum igitur hocce malum suavis Medici cupisdam Balsamo Schauriano per aliquod tempus frequenter usus plenariam auditus in dextra aure abolitionem animadvertit. Cumque simul hæmorrhoides, quæ rite antea fluxerunt, penitus silerent, accidit, ut sinistram pariter aurem, post lenem corporis motum aut sub inclinatio pulvulum capitis sui vehementer suffusus fibrilisque afficeret, quem ex ventriculo citius repleto ortum ducere iudicans ira sermone exprimebat: *Es fickle recht, wie es ihm von unten hinauf als ein Wind hinein fahre.* Quæ cum ita sint, ne audiendi facultate in altera aure acque privatus plane furdus evadat, vehementer metuit.

Epicrisis.

Quemadmodum reliqua capitis & nervorum vicia ex pravis maxime humoribus oriuntur in prima regione flagrantibus, dum molesta partium nervosarum vellicatione spasmos concitant, quibus alienus cum sanguine minus puro humor ad caput delatus ibi stagnat motuque & sensum pro diversis locorum ac nervorum varium adigit: ita quoque in presenti hoc casu gravis aurium cum obauditione tinnitus ex prima regionis vicio suos mutari natales recte statuitur. Quod vero si incidit, nihil ducimus consultius, quam ut Medicus ad corruptos in primis vitiis humores & abhinc prodeuntes perversos sanguinis ac humorum motus mentem probe advertat. Crassissimus enim error est eorum, qui neglecta in capitis affectibus prima regione ad caput tantummodo respiciunt varique nervina, cephalica & nimis calida remedia adhibere solent, quibus tantum abest ut nervorum systema roboretur, ut potius humores stagnantes mirum exacerbentur, adeoque haud mirum videri possit, quare balsamum illud Augustinum in auditu difficili plus detrimenti attulerit, quam emolumenti. Memini me molestem aurium tinnitum crebrius infestantem in hypochondriaco, qui alvi erat adstrictioris, paulo majori dosi lapidum cancerum cum aqua frigida fumeorum presentaneo auxilio mitigasse; quod pariter in senibus, in quorum ventriculo ingesta facile coacescunt, à me observatum est. Ceterum, presenti huic aproposito consilium dedi, ut una cum pulvere nostro præcipitante quatuordecim numero pilulas balsamicas alternis diebus sumeret.

OBSERVATIO VII.

*Centrum
abscondit
fervore
purpure
capite.*

Vixit ante triginta circiter annos celebris in Academia nostra Professor, vir provecitioris ætatis, macilentus, qui cum per sedecim & ultra annos audiendi sensu in dextra aure privatus,

idem malum sinistram accidere auri deprehenderet, meum imploravit auxilium. Quare ego singulis ægritudinis momentis probe perpenis à purgatione per pilulas cephalicas initium curationis suscipiendum statuens hæc præscripti formulam: *Recipe Extralli panchymagogi Crollii, Mercurii dulcis, Ombabatis, alois depuratis singulorum drachmam dimidiam, salis succini, trichosorum Alkandali, resina gialappe ana grana duodecim M. F. cum Balsamo Peruviano ex scrupulo suo N. XIV. pilula,* quas bis per hebdomadam mare adsumat. Ipse vero profundis meditationibus implicius minime attendit præscriptum in capsula pilulis utendi modum, sed eas brevi intervallo obambulando deglutit omnes. Binis circiter horis elapsis trulcentis imi ventris cruciatibus, nec non nauseosa circa præcordia sensatione, crebrisque lipothymis correptus consensit me vocari jussit. Accessi igitur & interrogatis tam subitanæ mutationis causis ægrum mox lecto tradendum variisque externis analepticis reficiendum curavi: tum vero, ut copioso lacte & multis pinguibus utatur, iussit fui. Quibus effectum per Dei gratiam est, ut solus alvi constipatione quater alvum, licet inter acerbissima ventris tormina, deponeret. Proinde abhinc capitis dextrum laus vehementissimi occupabant dolores spastici, qui circa aurem maxime dextram tanta sæviebant atrocitas, ut somnum omnino admererent. Sed percepto dein horrendo, inflar bombæ explode, in hac dolente aure fragore remiserunt, & qui antea absuit audiendi sensus perfecte rediit. Posthæc in sinistra pariter aure priore plane finitis ludebatur scena, nec dissimili effectus; siquidem hac ratione pristinae auditus incolumitati nosse ex voto redditus superstes adhuc & integer plus minus sex transiit annos.

Epicrisis.

Notum perquam dignum & plane mirabile est purgantis acrioris in enormiori doli ad surditatem sanandam effectus, quo docemur, ad magnos, enique contumaces & inveteratos morbos tollendos non levioribus, sed magnis & efficacissimis opus esse remediis. Procul dubio hæc surditas in nervo auditorio à tenaci humore obstructo oborta à potenti medicamento vehementem nervolis partibus motum, qui impæctum humorem vecte quasi expulsi, inducente simul & semel remota fuit, quod ex sono fragoris interno cognoscere licet. Ne autem tanta purgantis acrimonia propter spasmos in intestinis excitatos languido & sensu corpori majus inferret damnum, hæmectantia & pinguis propinanda esse consuli, ex inductus ratiocinio: si virulentam æstheniam acrimoniæ hæc ipsa remedia in copia assumpta delinire & innoxiam reddere possint, multo magis ad acrimoniæ purgantium demulcendum, ne noxam inducant, idonea esse.

OBSERVATIO VIII.

Non adeo multo abhinc tempore misit ad me Serenissimus Princeps insignem militiæ præfectum, virum vigore & ætate florentem, ut ipsi auditum, quo penitus delituitus erat, relinquerem. Cum in acerbis huius mali causam quaerere originem inquirerem, ex salivationis mercurialis cura illud ortum duxisse ab eo intellexi, quod

*Auditus
absolutus
curatur
mercurio
salivatione
per se
curatur.*

ob insignie tedium & molestiam non totam istam sustinere voluerunt, sed corpus nimis cito frigido liberionque aëri commiserunt, à quo tempore caput gravari & audius sensus turbati corpilicet, ita profusus, ut per duos nunc menses audiendi facultate omnino careat. Perspecta sic mali causa curationem in instituendam duxi, ut humor viciosus interioribus ac sensibilitatibus auris partibus firmis impaetus accommodata medicina removeretur. Quo tunc omnium maxime exquisitè corpus purgandum decrevi medicamento, cui non infirma vis sit, prævium subsistentem humorem à supremis & infimis locis proliciendi & foras eliminandi. Id quod hacce formula præstare solemus: *recipe Gummi ammoniaci depurati, Extr. all. rhubarbari, aloes rosata, mercurii dulcis, cinabaris, singulorum drachmam dimidiam, trochiscorum Al-hambrai, salis fixissimi, croci, castorei ana gr. duodecim, M. F. La. cum Balsamo Peruviano Pilule ex scrupulo uno No. XX.* quas per dosi sex alternis diebus exhibuimus. Pro potu decoctum ex lignis temperioribus paratum, vino interdicto & pariori victu præscripsimus, una cum pediluvio quovis die mane & vespere tepide adhibendis commendavimus. Præterea externe gossypium balsamo nostro vitæ madidum auribus indendum nuchæque vestitionem, quod in usu habemus, blandum aque benignum imponendum suavisimus, subijuncto simul ad mucum & naribus efficiendum pulvere quodam nostræ præparationis sternutatorio. Quorum remediumque energia id Dei auxilio effectum est, ut malo in dies magis malignique decrecente longe meliorem audiendi facultatem nostræ adquisiverit & cum aliis sermones mactare potuerit, quantumvis malum non ex toto fuerit sublatum.

Epierisis.

Quam effectus & præstabilis ad magnos ac præsertim ex contagio venereo ortos morbos eradican-dos, cura est per salivationem perite & circumscripte tractata, tam nociva, imo pessima est, si ab imperito quodam homine, vel insuper habito convenienti regimine, lascipiatur. Tantum enim abest, ut levamen adferat, ut malum potius exacerbet & peiora sæpius difficilisque sananda accerit symptomata, quod longa experientia edocuit plena fide testari possum. Ego à decenari regimine, quod ad sanitatem recuperandam sub hac cura summe necessarium est, neglecto, cum caput nimis cito fingui exposuerunt ægri, jam terna vice in artis exercitio plenam obliervavi firmitatem, eamque, quod non inter nimia statim propædum malo fuit, immediate. Quod vero tam difficultis ex hac causa usque fundatis sit curatio, hæc mihi subesse videtur ratio: sub mercuriali cura à paribus extremis & infimis ad caput, maximeque ad glandulosas ac nervæ ipsas membranas seri viciosi copia magno cum impetu adpellitur, quas, uti in palato, naribus & gingivis videmus, nimium relaxat; hinc nihil dulci est, quin etiam ad nervæ illas tunicas, quæ interiora auditus ossis & concavitationes cingunt, humor viciosus delatus hæret; à quo dein à frigore insipilatus & impaetus ex locis ejusmodi magis abditis difficillime dimovetur. Balsamum nostrum spirituosum, sicut ad omnia nervorum vitia à nimia laxitate orta; ita quoque ad audiam, si ex eadem causa perit, restituendum, remedium multo pulcherrimum est & efficacissimum, quod humorem

discutiendo egregium paribus robor addit. Si rursus mihi ejusmodi obtingeret casus, suaderem salivationem; sed meliori vitæ ordine & regimine denuo instituendam. Id quod vero ut inter initia statim fiat, necesse est.

Piores de audius vitis casus legantur in *Consult. ac Respons. Medicinal. Scilicet. Casu XX. XIX. XL. & XLI.*

CAPUT VII.

De aphonia.

THESES PATHOLOGICÆ.

§. I.

Voce loquela vulgo intelligimus productionem vocum articulatarum, animi conceptus cum aliis communicantem. Vox autem non articulata dicitur sonus, & est aliter expiranti, atque per asperam arteriam, laryngem, bujuli que rimam, quæ glottis audit, vi quadam expulsi, ad cava oris & facium varie figurata facta illis & repercussio. Quamquam igitur loquela à sono diffinitur; tamen illa sine hoc fieri nequit, tantum abest, ut viciata, quæ edendo sono tributa sunt, organa, velut speciem aspera arteria, ejusque caput, larynx dictum, cum annexis cartilaginibus, musculis, & nervis, nec non foris palati sunt, produci possit; & hinc perperita sonum efficiendi facultate, loquendi simul potentia periret, necesse est. Hinc jam ex antiquis *ARISTOTELIS L. de præcep. post. b. c. 6.* multis evicit experimentis, quod nervum recurrentium, qui ex parii vago & nervo accessorio effluunt, & ad laryngem, nec non docente novissime *WESLEVIO Anat. P. III. §. 112.* ad linguam tendunt, uno abscisso animal semivocale, utroque vero resecto, plane mutum omnique & sonum edendi & loquendi potentia destitutum reddatur.

§. II.

Hoc vitium, ubi sonus cum loquela perit, quod in hysterici frequenter fit suffocationibus, vocatur à Medicis aphonia. Nos autem, aphonia nomine strictius sumo, per eam intelligimus, loquendi sive voces articulas produendi imparitiam, à sola lingue vitio procedentem: ubi soni quidem produci possunt, sed lingua vocem articulatam enunciare nequit, expressæque patius conatus conticefit. Huic valde astuta est lingua hæsitantia, quam balbutiem, *des Stammen*, & ea laborantes Piculos vocamus: ubi voces quidem articulas proferuntur, sed non satis distincte exprimentur; quoniam lingua ad ideas tantæ celeritate, quantæ in mente excitatur, enunciandas, impar & quasi nimium gravis videtur.

§. III.

Quoniam lingue potissimum vitium in aphonia accusamus, inque ea morbi sedem collocamus; *lingue articulus* operæ prebium erit, illius structuram, quantum nullæ tractationi faver, paulo rimari. Est vero lingua muscularis, omnium fere mobilissimas; qui ob fibras varie figuratas, longitudinales, transversas, perpendiculares, acuminatas, angulosas &c. nec non musculos mylo-hyo-hyo- & genio-glossos, æque ac illos, qui ossi hyoidei sunt tributi,

boni, in omnem plagam celeriter moveri potest. Dicitur hi musculus vim suam movendi nanciscuntur à ramo tertio, qui audit maxillaris inferior, paris quinti nervorum, quod totum ferme motum est; quemadmodum pars nonum ad gulsum efformandum destinatum esse videtur. Hac volubili & in omnem partem mobili lingua, si soni ope laryngis formati in certas litteras modificantur, oritur loquela. Quo vero difficilius lingue motus est; eo difficilius fit loquela: & illo cessante, cessat loquendi potentia; sicut soni facis clare produci queant.

§. IV.

*Sed et
vires, ut
apophysis.*

Quem motus alicujus partis imminuatur vel tollitur per imminutum aut interceptum fluidi nervi in nervos influxum; nervi vero lingue motui destinati à pari potissimum quinq. proficiuntur: facile patet, eadem aphoniæ in dicto nervorum pari querendam, ejusque causam proximam in plus minus imminuto fluidi nervi in illum nervum influxu collocandam esse. Et in hac confirmatur sententia, si consulamus anatomicas eorum sectiones, qui in vita fuerunt aphoni: sic testatur Boerhaave in *sepulectr. anat. L. 1. Sect. 23. obs. 7.* in vivo ex melancholia in furorem aberrante, & aphonia ad mortem usque manente, cerebrum scissimum, nervorumque originis scissilimas solenque gracilioris, lingua illæta, repertis; & *obs. 20.* casum allegat ex RIVERTO, de balbutiente mortuo, in cujus cerebro circa nervos linguales cystis reperta fuit, fontem habens, & coarctum serum plorans.

§. V.

*Aphonia
ex periculis
lingue.*

Quicquid igitur influxum fluidi nervi in nervos motui lingue destinatos remorari valet; id ad aphoniæ contribuit. Præcipua hanc consideratio debetur lingue paralyti, quæ vel antecedit, vel sequitur affectus hemiplecticus & apoplecticus. Talis nonnunquam occurrit in senibus; corporibusque valde languidis ac debilitatis; & si sola est, præagis plerumque hemi-vel apoplecticum effectum, si vero hanc excipit, cum torpore ipsius memorie ac ingenii complicatur, & prioris morbi recursum minatur. Lingua tali in casu ordinario est tumida, flaccida, semisquida, minusque mobilis, gustus imminutus, & in hemiplexia in altero tantum latere viciata.

§. VI.

*non sibi
circa ver-
tas signa-
tionem.*

Levioris præfagii est aphonia, quæ ex seroforum humorum stagnatione, vel plane scissione, nervos quinti paris ad linguam tendentes comprimente proficitur; neque tamen minus gravis est, curationique satis rebellis. Hæc fit post excretionem ac exanthemata serosa, inens ætate, fovente cum primis tempestate humida ac pluviosa. Sic observationes de aphonia post sudores cohibitos in A. N. C. *Vol. III. obs. 82.* post catarrhum non tunc tractatum in FORESTO *L. XIV. obs. 32.* & A. N. C. *Vol. II. obs. 67.* post variolas rescripta *ibid. Vol. I. obs. 112.* relatas legimus. Epistimodum fecisse feri ad nervos linguales per externam quoque violentiam, ictum vel casum produci potest: unde aphoniæ ex casu ab alto subortam describit POTARIUS *Cem. II. Cap. 2.*

§. VII.

*non sibi
pauca est.*

Oritur aphonia porro ex nimia sanguinis ad fauces, & linguam congestione; quæ vero immi-

nuta humorum mole protinus cessare solet. Sic de aphonia tali affectu per insequutam rariarum hæmorrhagiarum sanato casum videat in A. N. C. *Vol. III. obs. 113.* Idem malum sequitur etiam inopportuna venarum raninarum sectionem, si in valde plethorice, non præmissa in pede venæ sectione, instituitur: unde quoque graves sanium inflammationes excitari, frequens docet experientia. Cum primis vero ex hac causa subortum aphoniæ novi in feminis, menstruum vicio laborantibus, ac hysterica passione divexatis; concurrentibus nimirum in venter spasmodis, qui humores vitales ad superiora cogunt; unde virgines circa pubertatis annos constitutæ, mensuumque eruptionem primum experientes hoc non raro incurunt vicium. Coniunctum illud hoc in casu esse solet, cum tumore ac robore faciei & oculorum, vasorum turgescencia, articularum vehementi pulsatione, & deglutientiæ difficultate.

§. VIII.

Notabilis denique & satis frequens est aphonia, quæ veribus intra ventriculi & intestino canalibus hostitantibus debetur. Talis subito invadit, & exturbatis veribus protinus remittit. Cognoscitur ex imi ventris torminibus vel prægressis, vel adhuc junctis; aliisque symptomatibus, vermium præsentium significantibus: & originem trahit à spasmodicis partium imi ventris nervosorum contractionibus, quibus vitales succi valido impetu ad fauces & linguam compellantur, ibidemque stagnantes nervos motui lingue dicatos comprimunt. Ipse tales casus sæpe numero vidi, & feliciter curavi; nec aliorum auctorum delatæ testimonia: vid. A. N. C. *dec. III. anno III. obs. 147. Vol. II. obs. 52.* & ibidem *obs. 160.* exstat casus, de aphonia periodica, quæ torces invasit, quoties tormina à vermium fuerunt producta, hisque sopitis statim iterum cessavit.

§. IX.

Dantur adhuc aliæ causæ, quæ in dispositis ad aphoniæ plurimum contribuant. Tales sunt abusus potum spirituosorum, & frequens crapula, unde aphoniæ ex ebrietate oritur jam HIPPOCRATES *P. aph. §. meminit.* Porro huc spectat gravis terror, & refrigeratio partium præsertim inferiorum: quæ momenta eo magis pernecialem vim exerunt, si tempore, quo naturales fluunt hæmorrhagiæ, incident. Nec silentio prætermittenda tempestas pluviosa, & communio in locis humidis, maxime in subjectis pleurostis ac catarrhalibus. Prognosis aphoniæ pro ejus causis variæ est: quæ enim ex vermium vicio, vel in passione hysterica, aut mensium difficili eruptione accidit, curatu facilis est; quæ vero lingue paralyti pro causa agnoscitur, omnem fere respicit sanationem; aut sanata facile reddit affectumque cerebri graviolem præfagii.

CURATIO CUM CAUTELIS
PRACTICIS.

§. I.

Aphoniæ curaturus eo respicere debet, primum causas influxum fluidi nervi in nervos linguales, hoc comprimentes remorantes removcat, & deinceps robur earum partium confirmandum curet. Quemadmodum vero illarum causarum inter se differunt: ita varium quoque medicandi rationem exigi, quilibet peripiciet; facili- que

colligetur, eam aphoniam, quæ causæ intra ipsius cranii thecam reconditæ debetur, sanationem admittere non nisi difficillimam.

§. II.

Causa aphonia ex lingua paralyti suboritur.

Quæ igitur ex vera lingue paralyti suboritur aphonia, poscit feri ad nervos & cerebrum decumbentis disquisitionem & evacuationem. Repetenda hoc loco ea sunt, quæ capite de paralyti docuimus; & opus adgrediendum venæ sectione, clysteribus paulo acrioribus, diuretica, sternutatoriis &c. spectatim in usum vocanda & ipsi extrinsecus lingue sunt adplicanda nervina & balsamica, quo nomine commendari solent aquæ spirituosæ liborum convallium, primulae veris, spiritus rosmarini, serpilli, formicarum, effluvia ambæ, balsami peruviani, oleum cinnamomi, caryophyllorum, & nostrum vitæ balsamum, paucis guttis saccharo excipendum, & sub lingua detigendum. Interne etiam dictam vitæ balsamum cum tribus spiritus salis ammoniaci vinosi, & duobus tincturæ antimoniæ acris partibus combinatum, bis vel ter quotidie ad xxx. guttas summo cum fructu exhibebitur: nec erit alienum, blanda nuchæ adplicare vesicatoria.

§. III.

Aphonia catarrhica curatur.

Si sudorum suppressiones, aut excretionum catarrhalium inhibitiones ad malum contribuerunt: nihil superat diaphoreticorum & diureticorum rite usurpationem efficaciam; restituta enim diaphoresi, mox redireprehenditur loquendi facultas. Laudem hinc merentur quam maximam insula rheiformis, cum blando regimine potanda; spiritus cornu cervi succinatus, tinctura antimoniæ acris, effluvia succinæ, maxime si cum essentia balsami Peruviani, aut balsamo vitæ nostro permisceantur.

§. IV.

Aphonia sub phlogosione mercuriali curatur.

Fit nonnunquam, ut sub ipsa mercuriali salivatione aphonia accedat; quando scilicet serosi ac salivales humores nimia quantitate ad fauces & linguam redundant. Quo in casu eo dirigenda est curatio, ut humores isti à capite deriverent & evacuentur. Præstant hoc decocta diaphoretica, calide bibenda; & laxantia, maximeque pilule cephalicæ, acriori stimulo imbutæ, non neglecto convenienti regimine.

§. V.

Emplastrum ad aphoniam.

In aphonia, quæ post insultus hemi & apoplecticos remanet, satisque pertinax est, insignem usum emplastrorum, quæ ex terebinthina, seu pice, & gummatibus Carannæ, masticis &c. parantur, & nuchæ adplicantur, observavi: reliqua enim, utut generosa remedia, hoc in casu, ipsem omnino fallunt.

§. VI.

Aphonia ex sanguinis vitio curatur.

Si malum à nimia sanguinis visus caput congestionem proficiscitur; omne fere curationis punctum convenienti sanguinis subtractione absolvitur. Hanc oportet esse largam, & pro circumstantiarum ratione vel per venæ sectionem, in pedibus, brachio, & nonnunquam sub lingua instituendas, vel scarificationem ac cucurbitas administrare decet. Jungenda his pediluvia, quæ humores ad inferiora deriverent; nec non interna antispasmodicainferioraque, eo quod his in casibus infernarum partium spasmi plerumque sint complicati. Hinc operæ pretium faciunt pulveres tem-

Frid. Hoffmanni Oper. Tom. III.

perantes cum nigro cinnabarique mixti, aut liquor noster anodynus, cum effluvia callores maritatus.

§. VII.

Quamvis venæ sectio remedium sit generose & magnæ ad hunc affectum efficacis: attamen cavendum, ne ea promiscue utamur. In sibus enim, languidis, viribus exhaustis ac magis pituitosis subjectis plus adfert detrimenti, & præstivandi apoplexiam sine iusto liberalius adhibita, hanc potius provocat. Locum potius habet, ubi pulsus celer est & magnus, facies rubicunda, sanguineque turgida: quo tamen casu stricture infernarum partium clysteribus, frictionibus, ac pediluvii prius sunt demulcendæ. Ante talem venam in plethorici cavendum etiam est à medicinis calidioribus, spirituosius ac nervinis, earumque tam interno, quam externo usu; quoniam humores magis contumovent, eorumque raptum ad fauces augment.

Cautela circa venæ sectionem & hæmorrhagiam.

§. VIII.

Si spastica contritio faucium & lingue aphoniam produxerunt; uti fit in hystericiis & hypochondriaciis paroxysmis, in quibus deglutienti juncta est difficultas: plus juvant externa pægorica, quam interna remedia. Commendantur nimirum eo sine frustulum callores, vel nucis, vel theriacæ, vel salivæ sub lingue detentum, aut balsami vitæ cum liquore anodyno mixti paucæ guttæ lingue instillandæ. Præterea operæ pretium faciunt clysteres carminativi, lotus & infusus emollientes ac pediluvia.

Externorum anodynorum usus.

§. IX.

Quæ denique vitio vermium intra canalem intestinorum stibulantium fit aphonia: facile curatur anthelminticis, ac iis remediis, quæ stricture intestinorum demulcent. His enim quiescentibus, redit loquendi facultas; sed nondum sublata causa, quam vermes præbent, sæpius iterum aboletur. Quare sub quiete spasmodum opera est danda, ut ingrati hospites convenientibus è corpore proficiantur adminiculis.

Aphonia ex vermium causâ curatur.

ENARRATIONES MORBORUM.

OBSERVATIO I.

Virgo spongiosioris habitus, floridæ faciei, sanguinis & succorum plena, & XVIII. annos nata, aliquando cum mensium patiebatur profluvium in itinere coarctata, nimio semet exposuit frigori. Domum redux dolore capitis gravativo, turgidis ac rubicundis in facie existentibus vasis, corripiebatur; noctem transigebat inquietam, & mane omni loquendi potentia se destitutam sentiebat. Hæc per quatuor durabant dies; quibus nec cibum nec potum adpetebat, somno fructu turbulento; mens tamen & omnes sensus libi constabant, ac extreme quoque partes calore perfuse erant. Medicus, cum alvum strictionem deprehenderet, clysterem protinus infundit, deinde ex vena io pede tula tres cruoris circiter uocias detraxit iussu: sed aphonia magis invalescebat. Ego vocatus, & pulsam adhuc celerem ardorem magnum animadvergens, venam rursus incidendam, septemque sanguinis uncias adhuc mittendas curavi: & postea, pulsu satis valido existente, essentiam callores, cum spiritu salis ammoniaci & liquore anodyno minerali remixtam, triginta ejus guttas quavis quarta hora ex aqua liborum

Aphonia post mensium profluvium superest.

X com

convallium fumendo, ordinavi. Brevi post per totum corpus erumpit sudor, facies detumescit, formosus erat tranquillior, & continuata per nycthemeron medicina, loquendi facultas omnino redibat.

OBSERVATIO II.

*Aphonia à
pedum re-
frigera-
tione erit.*

Priorem casum illustrat alius, qui sic se habet: puella 12. annorum macilentia, ex refrigeratione corporis maximeque pedum noctu facta, mane in loquendi difficultate cum linguae tumore incidit. Præscripta protinus externa pariter ac interna cephalica & nervina nihil utique ferebant opis. Hinc vocatus ego, cum adhuc frigidos deprehenderem pedes, eos fricari & pediluvio ex aqua simplici, furfuribusque triticis bis quotidie imponi jubebam: quibus spem fallentibus, suadebam, ut binæ cucurbitulae cum scarificatione brachiis admoveantur. Quo facto post aliquot horas magnum sensit levamen; & adhibito subinde capiluvio, quod ex vino cum herba thymi, saturae, serpilli & majoranae confectum erat, perfectam recuperavit sanitatem.

Epierisus iurisperae casus.

In hoc utroque casu debetur aphonia congestioni sanguinis ad caput; quæ per partium inferiorum refrigerationem fuit provocata, & quidem majori cum periculo in priori casu, ubi simul cohibita sunt menstrua. Adplicata in hæc casibus mox ab initio specifica cephalica, volatilia & nervina plus nocent, quam prosunt, siquidem flagrantem sanguinem magis commovent, & calefaciunt. Ila potius opus est remediis, quæ derivant à capite congestiorem, & infernarum partium stricturas demulcent: quorum primaria sunt pediluvia & sanguinis missiones. Pediluvia non ordinare soleo, si pedes existunt frigidi, nisi per frictiones hi paululum incalescant. Sanguinis missiones in femur, mensura & horum retentionem pallis per venæ sectionem in pede; in tenerioribus autem, quæ lunare nondum perolverunt tributum, per cucurbitulas cum scarificatione brachii adnotas, quæ etiam in pueris & infantibus locum habent, summo cum fructu sæpius institui. Sed notari meretur, sanguinis detractionem sufficientem esse debere, quoniam, si parior fuerit, plus infert detrimenti: unde eam in priori casu repetendam putavi. Si pulsuum vehementia adhuc continuat, subijungendo antispasmodica; & denique blanda nervina.

OBSERVATIO III.

*Aphonia à
tumoribus.*

Requisivit haud ita pridem vir egregius & de nostra arte optime meritis meum supra singularem adfectum consilium, quem in conspectum dare operæ pretium erit: honesto loco natus puer, qui vegeta semper usus valetudine nunc 11. complevit annam, nec levissimi quidem loquelæ vitii per totam vitam suam meminit, ex improvi- loquendi destituitur potentia, adeo ut præter verbum *Mama*, quod sub magno nisu voceque submissa profert, nihil omnino articulata voce pronuciare queat. Accedunt insuper molestæ hinc inde tensiones spasticæ, quæ totum cervicis & dorsi tractum in consensum rapiendo insignem his partibus torporem movendique & stec- tendi impotentiam inducunt. Medicus tam acerbi mali causam in verminosam rejiciens progeniem

varia contra vermes alias efficacissima etque laxantia, roborantia, antispasmodica & præcipitantiâ adhibuit remedia tantumque profecit, ut dejectis quindecim lambicis, ciborum adpetentia cum vinum aliquo augmento redierit, formosus tranquillior & alvus quotidie lubrica sit; at vero grave illud sermonis impedimentum sine ulla in melius conversione per quinque nunc hebdomades pertinacius insidit. Ego igitur primo omnium verinum colluviei melius educendæ consulendum arbitrans, sequentes ob egregiam vermiumque contrariam indolem suam mihi frequentes pilulas præscripsi, quarum septem bis in septimana, maximeque circa lunæ mutationes propinare jussi, interjectis pulveribus ex *salis amari gr. xv. nitri purificati, Corallina ana gr. vi. compositis*. Formula autem pilularum hæc fuit: *R. Alæ fætidæ, myrrhæ electæ, extralli tanacet, rhubarbari, aloes rosatæ, mercurii dulcis, ana drachmam unam, extralli croci gr. sex, M.F. l. a. cum essentia castorei Pilule ex scrupulo No XX.* Denique, ut externe quoque suppeditas feramus, partes à spasmis nimium debilitatas roborando, per intervalla collo & cervicis imponendum suavisimam epithema, quod, ex aqua *Anhalina spiritusola uncia quatuor, bals. nostri vitæ uncia dimidia & bals. Peruv. drachma duabus* confectum erat. Quorum remedium usu per aliquod tempus protracto loquela indies melior redire cepit.

Epierisus.

Varia & terribilia subinde sunt, quæ à verminosa progenie in nervosarum partium systemate concitantur symptomata, quorum quidem causam ego non tam in ratiōe tunicarum intestinalium nervearum, quam potius in exhalationibus acerbis causticis, quæ ex vermium corpore & excrementis exspirant, quibusque omnis generis insecta scatens, reponendam esse statuo. Innumera sere sum, quæ adversus pergriosos hostes & virulentos corporis hospites habentur & venduntur remedia; sed ego præter mercurium dukem cum purgante, ut resina gialappe vel diagrydio sulphuratum mixtum nec præferentia inveniri nec securiora, quam asam foetidam, tanacetum, allium, semen santonici, camphoram & denique lupulum, quæ odore potius animalculis hæc adverso, quam alia quadam substantia suam exerant operationem.

OBSERVATIO IV.

Puer VIII. annorum annuo abhinc tempore corripiebatur variolis, quæ cum & rarissime adparerent & post eruptionem protinus subsisterent, accidit, ut variis exinde morbis fieret obnoxius, maximeque crebris fluxionibus sollicitaretur febris, quæ tussim, raucedinem & coryzam subinde inducere solebant. Hæc quidem symptomata congruis medicamentis sæpius fuerunt mitigata; at vero, quum proximè abhinc magna abdominis cum duritiæ quadam jungebatur intumescens, bis Medicus intra breve spatium medicinam exhibuit vomitoriam, sed inausulto plane effectu; siquidem coactas hæc vomitiones non adeo multo post excipiebant vomitus spontanei, qui cum gravi diarrhoea slipati per octo decemve dies misere nostrum divexabant. His dein compositis, cum subitanea visus obscuratio tanta lingue accedebat immobilis sermonisque difficultas, ut ne verbum quidem puer, licet anxie nitens, proferre

*Paralyse
lingue
emette
suscipere.*

ferre possit. Præter hæc insignis caput tumor omneque artus vehemens occupabat tremor & lassitudo, quæ adeo ingravescebat, ut viribus magis magisque dejectis tandem animam placide exspiraret.

Epiçrisi.

Nullus fere morbus est, qui tam dira tamque varia & per multos annos durantia in infantibus possit relinquere symptomata, quam ipsa variolosa febris, si aut variolarum eruptio & suppuratio non recte procedit, aut exanthlato morbo sanguinis & humorum massa per remedia sanguinem depurantia aptamque victus rationem, in convenientem temperiem & eucrasiam non redigitur. Hinc certe in praxi medica occurrit frequentissime, post variolam & morbillum à læsionibus pectoris morbos, ab affectibus visceribus abdominis tumores & indurationes cum alvi fluxibus, & à tumore glandularum melsaricarum scirrholi atrophiam reliquarum partium concitari. Nihil autem est absurdius & periculosius, quam citra ullam indicationem medicinam exhibere emeticam, quæ proli dolor! in nostro ægroto non modo alvi fluxus fuit proritat, sed etiam impurum serum ob gravesas phasmas ad cerebrum cum impetu propulsum primo nervi opprimit, dein quoque sublingualium paralyfin efficit, quibus mori tandem supervenit. Ideo vero maxime hanc observationem allegare placuit, ut probe consilet, quamquam medicamenta imprudenter adhibita adferant noxam, & quam frequenter medici, quod docere pudet, morborum imo mortis causam exstant.

OBSERVATIO V.

Vir octogenarius, habitu corporis ficiore prædicto, ter minimum in anno, ut Februario, Junio & Octobri mense sanguinem à vena tula emittere solitus, vitam ab omni morbo egre immunem, viribusque & animi & corporis probe semper valuit. Hac vero à state, cum regiones nostræ à servidissimo sole àflu præter consuetudinem incallescere, suavis alius Medici consuetum illud evacuationis genus neglexit. Sed subito inde insulsa correptus apoplectico, arteriis valde pulsantibus, oculis rubentibus totoque corpore ædruante omnem sensum una cum loquendi potentia amisit. Sub tali rerum statu ego consultus primo omnium venam in brachio aperendam, ventrique clysteres emollientes injiciendos & ballanum vitæ nostrum, non posthabitis aliis remediis, ori naribusque admoventium suavi. Quibus Dei auxilio id effecimus, ut mitigata morbi & symptomatum atrocia mente æger ad se redierit, præter quod hæsitantia lingue diutius permanserit; quam tamen frequenter oris cum vino, cui aliquot balsami nostri guttulæ infillatæ erant, collatione felici e ventis superavimus.

Epiçrisi.

Quam efficax atque egregium in plurimis senum morbis & avertendis & abigendis remedium sit V. Stio, vel sola hæc observatio evincere possit. Neque deficit ratio: in ætate enim præcædioribus, maxime si firmo adhuc stomacho & integra appetentia gaudeat, ob exercitationis defectum corporisque inertiam non tam facile, ut in juvenibus, superabundantis sanguinis con-

Frid. Hoffmanni Oper. Tom. III.

sumitur copia: & si natura ab hoc onere minus sese liberat, necesse utique est, ut arte subrahatur; quod venæ incisione periclitur commodissime. Perperam igitur & male fundata inductus ratione sanguinem inter dies caniculares evacuari prohibuit Medicus, quod tamen eo magis fuisset necessarium, cum ea tempestate sanguis nimis ob auctum expansionis & organum gradum facile hinc inde in partibus nobilioribus subfultere & graves admodum inducere valeat agriitudines. Nec dubitandum, quin in nostro casu à simili cruoris in capitis venis stagnatione levior ille apoplexie insulsa cum sermone difficultate originem duxerit; quo sine ego in curatione admodum primo omnium venam in brachio tundendam cum præsentaneo ægri levamine commendavi. Dein vero clysteres emollientes ventri infundere: & ad efficiendorem sanguinis motum compendendum aliquot per intervalla pulveris nitrosi doses porrigere iussit, subjuncto simul insulso theiformi, ex herba melsæ, betonicæ, cardui benedicti, floribus salviæ & anthos composito, quod cum paucis olei maciæ guttulis saccharo insulsa habere æger debuit. Ceterum hæc morbi historia confirmatur, nulli fere morbo quam apoplexie aphonia sociari frequentius, adeo ut etiam aliquod tempus post non raro remaneat & facillime generetur, si à stagnante intra caput sanguine serum secedens poros cerebri penetrat & radices nervorum relaxando sensum motumque eorum partium, ad quas nervi excurrunt, hebetat ac labefaciat.

CAPUT VIII.

De delirio melancholico & manico.

THESES PATHOLOGICÆ.

§. I.

Haud paucos fore arbitror, qui mirabuntur, me affectus, qui natura & symptomatibus plane dissimiles videntur, in uno capite pertractandos sumisise & ad unam retulisse speciem. Attentioni vero usæ & observatione discimus, utrumque morbum ex una eademque origine & causa continente, videlicet nimio sanguinis ad imbecille cerebrum appulsu, laboriori & nisi gradu ac invasionis tempore variare, adeo ut melancholia pro morbo primario, mania vero pro ejus exacerbatione & effectum accidentali habeatur rectissime. Id quod etiam quam optime Medicorum agnovimus veteres. Hinc TRALLIANUS *Lib. I. cap. 16.* nihil aliud esse maniam prodidit, quam melancholiam ad majorem gradum redactam, ut propter tam arctam connexionem facillime ex uno morbo in alterum fiat transitus. ARETÆUS *Lib. III. cap. 5.* melancholiam manie initium & originem esse, illamque incremento magis quam alia causa, in furorem probabili perhabet. Quam conspirationem etiam quotidiana & attentior confirmat observatio, cum melancholici, præsertim si morbus inveteratus fuerit, periclitæ in maniam incidunt, qua cessante melancholia rursus sese prodit, licet possit ea per certas periodos furor revertatur. Neque admodum diversa est ipsa medendi ratio: quicumque enim consilio & arte causam melancholiz propiorem vel levare vel tollere recte didicit Medicus, ad maniam quoque vel aver-

Y 2 tendam

*Melan-
cholia &
mania gra-
da utrum
differant.*

tendam vel sanandam admodum exilite idoneus.

§. II.

Signa
Ancholia.

Ante vero quam mediatio nostra in interiorum horum affectuum naturam, genesis & differentiam descendat, placet omnino, quibus phenomenonis, symptomatibus ac notis tam melancholia, quam mania sese prodant & dignoscantur, ex Veterum, maxime Græcorum monumentis proponere, eo quod hæc regionibus variis deliriorum species admodum olim fuerunt familiares. Nullus vero rectius & accuratius horum morborum descripsit historiam, ipso ARETÆO, qui Libr. III. inter notas melancholicorum has ponit: quod tristis, abjecti torpentisque sint absque ratione, ingenti pavore trepidant, male sunt animati, vigilantes, solitudinem ament, in iram proni atque mutabiles sint, de minimis quibuscunque rationem querentes, nihil largientes, sed non ita multo post simplices & prodigi. Addit deinde, alvum plerumque aridum esse, jam nihil deprecere, jam vero sicca, rotunda atque humore bilioso circumfusa; urinam paucam reddi, acrem & biliosam, multum flatuosi spiritus in præcordiis esse, natus putridos, gravescentes ex ore ferri, nonnunquam & humidam quoddam acre cum bile rejeci, faciem impalescere, anieriarum motus parvos esse, pigros atque invalidos, & ægros in fumendo cibo esse avidissimos.

§. III.

Signa
manie.

Signa, quæ maniam indicant, idem gravissimum Auctor ita describit: ad iram excitati maniaci furore penitus insaniunt, quidam magnum spatium decurrunt, nonnulli vociferantur; alii ab hominum conspectu in solitudinem fugiunt & secum tantummodo versantur; alii sua membra dilacerant. In summo ægritudinis impetu variis secundum quædam visis perturbantur, immoderate venerem concupiscunt & palam sine ullo aut pudore aut timore concumbunt. Cum vero inclinatus est morbus, stupidi, quieti, mœstique sunt: in notitiam quoque morbi venientes sua calernitate miseriamque tristantur. Et hæc sunt, quæ morbum aut præsentem aut declinantem comitantur symptomata; paucis nunc, quæ in anis exercitio diligenter annotavimus signa, maniam antecedentia nos suppeditebimus. Inter hæc vero præcipua sunt oculi rubentes sanguineque suffusi, palpebrarum inconstans vibratio, mutati a solito mores, superbia vulva, voce & gestibus se prodens, stridor dentium, odium erga hunc vel illum singulare, somnus parvus, cephalalgia, vehementis cum auditus excellentia auriumque tinnitui & sonitu musico: quo referri etiam macretur insigne illud, quo increscente morbo pollent maniaci, membrorum robur frigorisque tolerantia incredibilis, nec non in feminis collectio sanguinis in mammis.

§. IV.

Diff. remanet
de phrenitide.

Verum enim vero, cum hæc manie signa valde etiam communia sint delirio acuto, quod phrenitidis nomine venit, indicandum omnino est, in quo utriusque discrimen statumendum sit. Si quando igitur in acuta febre delirium est, vel in ejus vigore sequitur & levata febre mens redit, phrenitis appellari solitum est. Neque id genus morbi aliud desiderat remedium, quam quod curandæ febri idoneum est. Quod si autem furor longius recipit spatium nullamque febrem junctam habet & ex statu melancholico emergit, maniam dicere affectum in scholis medicis utique eo receperunt.

Neque silentio prætermittere oportet, dari adhuc insaniam seu delipientiam, quæ nec melancholia, nec mania aut phrenitidis nomine recte exprimitur, cujus generis est, quæ in homine etiam sano ab assumpto narcotico, ut solano fusioso seu ejus bacis, lilio temulento, hyoscyamo & ejus semine, datura, ut pluribus constat exemplis, excitatur; quæ tamen accommodata medicina adhibita brevi remittit penitusque tollitur.

§. V.

Ut vero propiores & proprias horum singulorum affectuum continentes causas, ad quas tollendas unice vera medendi dirigi debet methodus, eo accuratius dignoscamus, è re omnino erit operæ pretium, ut, quæ in sectione eorum, qui his deliriis perierant, inventa fuerunt, proferamus. Notata vero digna est observatio, quæ in M. N. C. p. 234. Dec. II. Ann. 6. de manico dissecto legitur his verbis: multas in cerebri basi ad infiar seitis complicatas vasorum carotidum & vertebrarum ramificationes observavimus: post exitum cerebrum in pelvi relictæ feri cruentati propemodum sex uncie fluitabant: elevata deinde digitis in basi cerebri medulla oblongata & detectis ventriculis à latere sitis in conspectum venit plexus choroideus prægrandis, ab utroque latere totam interiorem ventriculorum superficiem perreptans & ex multis insignibus vasis sanguiferis constans: ubique hic plexus vesiculis livida pisciformibus repletus fuit, quæ lanceola apertæ serum gelatinosum fundebant. Sic quoque *Henricus ab HEER*, Obs. 3. pag. 45. de maniaci anatomicæ hæc refert: inventum fuit cerebrum siccissimum, durum & in summa parte digitis friabile, flavedine citri æmula undique ad altitudinem digiti tinctum; observatum circa ventriculos mollius & humidius: nervorum origines conparuerunt sicca.

§. VI.

Singularis quoque debetur animæversio anatomie phrenitici, quæ in M. N. C. Dec. II. Ann. IV. obs. 162. habetur, ubi vesicula fella bile picis liquidæ infiar repleta inventa fuit & sinus saliciformis massam polypiformem continebat: pia mater multis vasis turgida accurate à cerebro separari poterat, tunica longe erat crassior & amphioribus instructa vasis. Similis se mihi obtulit observatio ante triginta & ultra annos in studio nobili extreme melancholico, qui delirio in fura variolarum accedente moriebatur. In sectione musculi totius corporis valde densi, compacti & robusti nulla pinguedine obdacti, (nam panniculo adiposo fere carebant), conspiciantur; vesicula fella tota repleta erat bile crassa & infiar picis nigerrima, quem atrum colorem etiam nunc in scriptis meis adservata exhibet: pancreas magnum, crassum & durum se fessebat. Vasa duræ & piæ matris sanguine crasso turgida & in hac varicosa apparebant, è sinu saliciformi concretis sanguinis atrii in polyposam substantiam concretis extrahabatur atque ventriculis cerebri livefcent serum innatabat.

§. VII.

Quibus recte & diligenter perspectis sedem & interiorum horum deliriorum causam jam clarius exponere atque ex his suppositis singulorum non nominalem, sed realem exhibere definitionem, in proclivi est. *Melancholia igitur est firmior cum mente alienata phantasia, certis obiectis*

Cap. VIII. De delirio melancholico & maniaco. 253

valide inberens, cum diuturno animi angore, inquietudine, metu & tristitia sine ulla causa manifesta juncta, à valde difficili sanguinis copiosis in cerebro congestis ac stagnantibus per vasa ejus progressu aborta. Mania vero est violenta insania cum temeritate & ingenti membrorum robore conjuncta, à vehementiori sanguinis crassi, copiosi & melancholici per cerebri vasa cum magno afflu transgressione proveniens. Phrenitis denique est insania cum febre, à fluxu sanguinis inflammatione in vasis cerebri orta.

§. VIII.

Sedem igitur omnis delirii in cerebro esse, clarissime intelligitur, quam etiam ipse HIPPOCRATES libro de morbo sacro probe agnovit, hac parte, inquit, sapimus & intelligimus & videmus & audimus, & turpia & honesta cognoscimus, & hac ipsa etiam insanimus. Nam cerebrum omnino est pars illa corporis nobilissima, in qua plane occulto & imperceptibili modo divina sapientia eminentis & valde sublimis mentis sive spiritus immortalis, neque minus ingenii, phantasie & memorie sensuumque exteriorum recondere voluit domicilium. Quamvis vero istius principii intelligentis & sensitivi natura & essentia, ex qua ejus effluus ac facultates profluunt, plane sit abstracta & menti humanæ incognita, id tamen per accuratam & attentam observationem didicerunt Medici, quod pro diversa sanguinis natura, conditione & motu per cerebri vasa eminentes illæ facultates animæ tam rationales quam sensitivæ mirifice variant, immutentur & pervertantur, adeoque morum, inclinationum & desideriorum differentia ex hoc fundamento explicari debeat. Id quod jam olim in dissertatione de temperamento fundamento morum & morborum suis deduxi.

§. IX.

Quod itaque ad causas deliriorum proximas attinet & continentes, Veteres, quibus sanguinis circuitus ignoratus fuit, varias & plane alienas in medium produxerunt. Ita borum alii atram bilem exundantem ejusque raptum ad caput, nec non nimiam cerebri ficitatem; alii ex recentioribus spirituum animalium in melancholia naturam ficcam & aquæ stygiæ æmulam, in furore vero inflammabilem & sulphuream accularunt indolem. Sed nostro jam tempore non modo corporis, sed & animi morborum causis longe rectius ex sanguinis conditione explicare novimus, à qua sententia nec vetustissimum AUCTOREM HIPPOCRATEM alienum fuisse ex libro de flat. intelligi potest, ubi sic dixit: sanguis multum confert ad prudentiam, ita ut hac permixtus & opiniones peregrinas mentem occupent animusque percellant, si in contritus & perturbatus fuerit, & eodem loco sanguis si in constanti habitu consistit, consistit etiam prudentia, eo vero permixto, hæc simul concidit.

§. X.

Et certe constanti observatione & experientia habemus comprobatum, omnes illas, quæ animæ adscribuntur functiones, ad quas sanæ rationis, ingenii & phantasie vires una cum inclinationibus referimus, secundum naturam & ordinem sese habere, si sanguis iusta temperie & quantitate gaudens ad cerebrum delatus per ejus vasa placido, libero & æquabili fertur itinere, adeo ut hac ratione sensus etiam externi, nisi vitium in

Frid. Hoffmanni Oper. Tom. III.

ipso organo sit, recto ordine succedant; hæc omnes vero nobilissimas functiones & immutari & perverti, immixti vel penitus deficere, quando videlicet sanguis & humores à naturali temperie & quantitate deficiente ad cerebrum defecti non æquabili & moderato, sed valde difficili, tardo & impedito, aut nimis celeri & vehementi motu progrediuntur.

§. XI.

Quæ cum ita sint, à vero nos haud aberrabimus, si causam melancholici affectus continentem in sanguinis crassioris nimio ad imbecille & flaccidum cerebrum appulsu, stagnatione & difficilissimo progressu; furoris vero originem & fundamentum in sanguinis crassioris & melancholici vehementiori & impetuoso per cerebri vasa & fibrillas motu collocamus. Cujus assertionis veritatem ex infra dicendis, ubi convenientem causarum antecedentium & remotarum nexum monstrabimus, rectius judicare licebit.

§. XII.

Quum vero jam supra satis clare & ad oculum per anatonem deliriosum demonstratum dedimus, in variis corporibus dissectis non modo sanguinis motum per caput immutatum & plane perturbatum fuisse, dum vasa nimio sanguine infarsa & varicosa se præbuerunt, ut propter stagnationem serum extra vasorum alveos effusum in basi cerebri sit magna copia repletum sit; verum etiam cerebri corticem & medullam suam texturam læsam maleque affectam apparuisse; nemo sane dubitare amplius poterit, & horum affectuum & morbis causam in hoc ipso præternaturali statu ponendam esse.

§. XIII.

His ita constitutis, sequitur jam ut discipiamus, quamnam ex reliquis casualium generibus ad anomalum illum & plane perversum sanguinis per capitis & cerebri vasa cursum symbolum suum conferant. Inter hæc primum locum peculiaris cerebri debilitas, quæ recte dici meretur mediata causa deliriorum, obinet, utpote sine hac præcedente non tam facile adeo grave motus sanguinis vitium in hac parte exoriri potest. Et hæc quoque præcipua fuit ratio, quare varias hæc deliriorum species in hoc Tamo nostra medicina systematica, ubi de morbis atonicis agitur, pertractandas consideremus. Ad illam vero ingignendam præcipue referendi sunt graves animi affectus, præsertim diuturnus moeror, tristitia, metus, animique angor ac terror, quorum magna est, sicut ad omnium partium, ita etiam cerebri robur debilitandum & vim vasorum systolicam imminuendam potentia. Ad quam classem etiam aciores mentis labores atque inopportune studiorum causa diutius protractæ lucubrationes pertinent, quibus ob dissipatos spiritus sic dictos animales, flammam, quæ in cerebro & medulla oblongata sunt, vis motrix & sensitiva mirum infringitur. Et inde quoque intelligi potest, quare literati & qui nimium meditationibus indulgent, plus quam plebei mentis alienationibus sint obnoxii.

§. XIV.

Deinde ex causis, quæ ad gravissima disponunt deliria visereque animi ac corporis destruendo & vasorum, membranarum ac flammam cerebri tonum debilitando plurimum valent, multum sibi vendicat vesanus amor, de quo observationes

Causa deliriorum proxima

que animi morbus

Causa morbi
1) cerebri debilitas, quæ causam mediatam deliriorum

amoris

254 Cap. VIII. De delirio melancholico & maniaco.

variones legi possunt apud FOREST. lib. X. obs. 29. & 30. BARTHOLINUM Cent. II. hist. 69. it. apud VALEBOLAM Lib. II. obs. 7. Maximam tamen noxam infert amor in feminis viri potentibus sed nondum nuptis, qui à genitalis liquoris, sub otiosa maxime & laeta vita liberalius in glandulis vaginalibus secreti, longiori mora & corruptione provenit, quod testantur observationes, quales existant apud PLATARUM Lib. I. prax. cap. 3. GREGER. HONST. T. II. op. Lib. 2. Obs. 8. & EPIHEM. Obs. 126. Dec. II. Ann. X. Cum enim lege commercii, quod animæ cum corpore ejusque fluidis & solidorum motu intercedat, ex copiosius congesto & stagnante in organis spermaticis femine imagines & ideas veneræ in phantasia excitantur, fit omnino, ut phantasia firmissime hæc ideas inharere usus rationis sapienter miramur & inveniat. Neque plane de nihilo est statueret, spirituosum feminale liquidum mora corruptum per vasa lymphatica redire ad sanguinem & quasi ex confusibilissimo fluidum illud, quod in sanguine, cerebro & nervis motibus & sensibus præest, consummare, ut hac ratione ingens virium oriatur defectio.

§. XV.

nimia frimur pro-
fuso.

Potero observationes testantur medicæ, à nimia feminis tam voluntaria, quam involuntaria profusione morbi tum melancholici tum maniaci profusibile originem. Ita *Heuricus ab HEER* obs. 60. exemplum hexagenarii producit, qui à nimia feminis sub diebus catenularibus profusione melancholicus redditus est, & FORESTUS in Obs. lib. X. obs. 25. juvenem quandam melancholicum media ætate juveniculum uxorem ducentem & ex effreni veneris usu in furorem eactum fuisse refert. Nam nihil notius est, quam quod semen delibatissima & agulissima sanguinis pars sit eandem fere indolem cum fluido nervorum habet; unde etiam fieri observamus, ut ab inmodica feminis profusione & sensuum functiones & ingenii vires mirum debilitentur, imo etiam alii, qui ex cerebri vitio nascuntur, morbi progignatur.

§. XVI.

heredita-
rio de-
feso.

Multum quoque nosse refert, deliria quæ diutius protrahuntur, certis familiis admodum esse solennia, adeoque ad morbos hereditarios, qui à parentibus ad liberos transferuntur, iustissime referri. Quorum morborum, ut ego quidem arbitror, vix alia subest causa, quam quod morbida & invalida partium solidarum & moricium natura ac textura per nativitatem propagetur, maxime si generationis tempore his affectibus parentes correpti fuerint.

§. XVII.

narctica
de regina.

Nihil vero tam celeriter & inopinato, etiam sine ulla alia causa precedente, sanum ceteroquin hominem in demantiam precipitare potest, quam narcoticum sive stupefactivum, inscienter adsumtum. Hinc res per experientiam satis nota est, quod à semine daturæ, hyosciamini, à bacis belladonæ &c. brevi tempore perfecta amensia induci possit. Si quis vero paulo curiosior fuerit in recentissima horum encrgia inquirenda, consulat observationes de his paulo diligentius conscriptas, quales reperiet in M.N.C. Dec. III. Ann. III. obs. 170. WILLISIO de anim. brnt. Cap. 17. p. 2. MATTHIOL. in Diop. p. 756. 988. LOBELLIO in novis stirpium adversariis, BORELLO Cent. IV. obs. 45. HELMONTIO lib. de ment. idea.

Neque exercitationibus Medicis ignotum est, eas medicinas, quæ opium habent, in delirio improprie datas illud magis intendere & contumacius reddere, tantum abest, ut componant, aut levamen afferant. Cujus plane peculiaris effectus rationem invenire non adeo obscurum est, si consideramus, hæc ipsa remedia sulphure quodam abundare valde vaporoso, naturæ adverso atque graveolente, quod calore resolutum in corpore in exhalationes explicatur, quæ minimis cerebri & nervorum poris profundius insinuatæ fluidi ibi purissimi vim moricem & fibrillarum nervearum elastem labefaciunt, adeo ut omnium sensuum & motuum notabilis fiat defectio atque inversio.

§. XVIII.

Ad destruendum cerebri valorem & staminum naturalem tonum ac tensionem multum quoque prægressi morbi, præsertim acutæ febres faciunt. Hinc quid observatione frequentius est, quam quod post febres ardentes, præsertim diutius protrahatas, post febrem sic dictam Hungaricam, synocham putridam, cholicam seu causum, interdum quoque post variolosum, phrenitides & ex hæc denum chronicas deliriorum species proficiat. Cujus effectus ratio ex facili inde potest repeti, quod sub tanto febris aestu, qui plerumque cum aliâ vigilia conjunctus est, nervum fluidum, quod tam sensibus quam motibus perficiendis speciatim dicatum est, dissipetur. Læditur quoque exinde non parum ipsius cerebri fibrilosa textura & structura, ut deinde nec secreto liquidum animalis rite perfici possit.

§. XIX.

Ultimo loco, ad cerebri imbecillitatem & fluidi Ebrietat. di nervi viciatam indolem immodicus spirituosorum potulentorum abusus & inde profecta ebrietas multum momenti adfert, quare etiam non minus eleganter quam vere ebrietas à SENECÆ epist. 83. dicitur insaniam, vinulentiam, inquit, crudelitas sequitur, violatur enim exasperaturque exinde sanitas mentis.

§. XX.

Ordine jam accedimus ad eas causas inquirendas, quibus sanguinis motus ex partibus inferioribus impetuosius ad caput urgetur, inter quas nihil omnino, quod tam subito melancholiam in maniam convertere, aut silentem resuscitare paroxysmum valeret, repentinum, quam vehementem iram, quæ majorem in maniacis causam vix ullam esse jam olim GALENUS lib. VI. ap. 23. reputavit, præsertim si vana superbiæ opinio & fastus, odium & vindictæ cupiditas jungantur. Equidem melancholici natura ad iram concipiendam difficiles sunt; quæ tamen ubi semel data occasione accensis sunt, tam effrato furunt impetu, ut nisi ægritus componi possint. Nocet vero ideo maxime melancholicis ira, quia sanguis eorum adfectus motum subtiliorem teneramque cerebri texturam graviter lædit nec tam facile sisti cursu suo potest.

§. XXI.

Hunc censum quoque subit frigus externo corpori, maximeque inferioribus ejus partibus improprie admissum. Cui quantum debeat in affectibus nostris suscitandis testari videntur ipsi melancholicorum paroxysmi & exacerbationes invasiones, quæ nunquam fere non horripilatione &

1) Sanguis
ni corpe-
bus ad ca-
put, quem
producent
ita.

extremum
frigus.

& frigoris sensu in externis partibus prægresso suboriri conspiciuntur. Nec adeo difficile erit, ex accuratiori horum pensatione sevilissimorum symptomatum, quorum luxurians in melancholicis progenies est, rationalem suggerere ætiologiam: quodsi enim sub tali horrore frigorisque sensatione extremus corporis habitus spasmo quasi constringitur, sanguis propter angustiora spacia minoresque vias majori ad interiora vi & impetu fertur, abhinc vero in vasis maxime, maxineque pulmonibus, corde & cerebro subsistens pro horum locorum varietate varias creat molestias. Ita circa præcordia anxietates opprèssivas, suspitiosus anhelitus, cordis tremorem ac palpitacionem, in capite vertiginem & gravitatem, oculorum ferociam, longas vigilias varique & uni rei infixæ insensibilis phantasmata.

§. XXII.

excretionem sanguinem tam naturalem quam artificialem in utroque sexu immittuntur aut suppressiones; quare ab omnia in plethoricis, quæ antea consuevit fuit, venæ sectione pariter ac ab irregulari hæmorrhoidum vel mensium successu, velius imprudenter cohibitis, aut narium hæmorrhagiæ impetuisse sedata melancholiam originem repetisse certa experientia fide constat. Nec dissimili ratione nec sese habet, si quando post exantlatos parvus labores parcius succedit vel plane suppressum lochiorum fluxus, vel etiam si circa pubertatis annos menses difficilis erumpunt. Exinde enim læpius & melancholiam & maniam subortam confirmant observationes, quarum innumere à probatissimis auctoribus prodite leguntur. Ita HIPPOCRATES, dicitur edoctus experientia lib. de *superiorat.* T. I. cap. 24. scribit: ordinaria sanguinis evacuatio intercepta furete facit. FORESTUS lib. X. obs. 23. & 24. item BINNINGERUS Cent. I. obs. 37. a mensibus suppressis maniam ortam adnotant & Zacutus LUSITANUS lib. I. præx. admirand. obs. 37. & 57. post hæmorrhoidum suppressionem melancholiam & maniam secutam retulit. Siquidem à sanguine stagnante & copiosius circa intestina congesto horum tunice nervæ compressæ ad spinales stimulantur motus, quorum vi sanguis congestus per metastasin ad superiora, maxineque ad caput transpiratur. De quo inverso sanguinis redundantis motu elegans apud HIPPOCRATEM lib. de *virgin. morb.* extat locus, qui dignus est ut hic transcribatur: *Virgines nobiles & matre a viro delirium, ut demones quosdam videre se putant, magis patiuntur, una cum mensium descensu, antea non valde in eis afflicta. Postea enim sanguis in uterum confluxit velut effluxurus: cum igitur osculum exiit non fuerit apertum, sanguis autem amplius influxerit propter cibum & corporis augmentum, tum sanguis non habens effluxum præ multitudine refluxit ad cor & ad septum transversum. Cum igitur hoc repleta fuerit, cor fatum sit, deinde ex satietate torpescit, postea ex torpescit delirium apprehendit.*

Neque minus referri hæc merentur excretionum sanguinearum tam naturalem quam artificialem in utroque sexu immittuntur aut suppressiones; quare ab omnia in plethoricis, quæ antea consuevit fuit, venæ sectione pariter ac ab irregulari hæmorrhoidum vel mensium successu, velius imprudenter cohibitis, aut narium hæmorrhagiæ impetuisse sedata melancholiam originem repetisse certa experientia fide constat. Nec dissimili ratione nec sese habet, si quando post exantlatos parvus labores parcius succedit vel plane suppressum lochiorum fluxus, vel etiam si circa pubertatis annos menses difficilis erumpunt. Exinde enim læpius & melancholiam & maniam subortam confirmant observationes, quarum innumere à probatissimis auctoribus prodite leguntur. Ita HIPPOCRATES, dicitur edoctus experientia lib. de *superiorat.* T. I. cap. 24. scribit: ordinaria sanguinis evacuatio intercepta furete facit. FORESTUS lib. X. obs. 23. & 24. item BINNINGERUS Cent. I. obs. 37. a mensibus suppressis maniam ortam adnotant & Zacutus LUSITANUS lib. I. præx. admirand. obs. 37. & 57. post hæmorrhoidum suppressionem melancholiam & maniam secutam retulit. Siquidem à sanguine stagnante & copiosius circa intestina congesto horum tunice nervæ compressæ ad spinales stimulantur motus, quorum vi sanguis congestus per metastasin ad superiora, maxineque ad caput transpiratur. De quo inverso sanguinis redundantis motu elegans apud HIPPOCRATEM lib. de *virgin. morb.* extat locus, qui dignus est ut hic transcribatur: *Virgines nobiles & matre a viro delirium, ut demones quosdam videre se putant, magis patiuntur, una cum mensium descensu, antea non valde in eis afflicta. Postea enim sanguis in uterum confluxit velut effluxurus: cum igitur osculum exiit non fuerit apertum, sanguis autem amplius influxerit propter cibum & corporis augmentum, tum sanguis non habens effluxum præ multitudine refluxit ad cor & ad septum transversum. Cum igitur hoc repleta fuerit, cor fatum sit, deinde ex satietate torpescit, postea ex torpescit delirium apprehendit.*

§. XXIII.

Ex quibus jam dictis & adductis facile reddi poterit ratio, quare & mali hyssericæ & hypochondriacæ melancholiam frequentissimum sit symptoma. Res enim in theoria medica pervulgata & satis perspecta est, ex atonia viscerum & impeditiori sanguinis crassioris ac copiosioris per hæc transita spasmos & status in abdomine progigni, à qui-

bus tanquam ex fonte omnia illa, quæ hypochondriacæ & hyssericæ obveniunt pathemata profluunt & derivari possunt.

§. XXIV.

Hicce expositis respiciendum erit ad ea, quæ ad sanguinis crassioris generis & stagnationem in partibus multum conferre valent, inter quæ primo loco otium & vitæ laboris expertem ponendum esse arbitramur, quæ tam ad ingignendum morbum hypochondriaco-hyssericum, quam ad subsequeus inde delirium plurimum omnino valet. Sicut enim conveniens corporis exercitatio egregium solidis partibus robur addit, humoreque fluxiliores reddit & vegetationem eorum circulum promovet; ita ex hujus defectu vires corporis cum omnibus suis functionibus labefactant, salubres & naturæ solennes excretiones imminuunt, humores subsistere ac mora crassiores ac lentiores fieri quotidiana observatione deprehendimus. Quæ omnia longe graviora sunt, si jungitur solitudo & homines ab omni conversatione remoti vivunt in se quasi conversi; tum enim variz menti inanes & minus jucundæ imagines falsæque idææ, cum quibus ægre colluctandum est, subsistunt.

§. XXV.

Neque ex causis remotioribus efculenta & potulenta excludenda sunt. Quodsi enim ob excessivam aciditatem in ventriculo progeniem homines voraces sunt, nimium appetunt, aut crassioris texture cibos, induratos minisque solubiles & stantulentos adsumunt, nec tamen sufficientem potum untant, crassiores inde compactioresque humores, qui materiam & pabulum nostris præbent affectibus, ingenerantur; à quibus in linguam ad ductis flamma & fibre carnes rigidiores, duriores & ad motum exercendum minus promptæ sunt & idoneæ.

§. XXVI.

Illud præterea ex meis observationibus ad naturam melancholicorum & manicorum explicandam adiciendum putavi, quod illorum sanguis è vena emissus calidior & ater observetur, qualem etiam ETIEMULLERUS in *colleg. Pract.* p. 993. invenit & LINDANUS adnotavit, dein quod tardius & parcius serum deponat atque in lance ponderatus gravior sit, lenius evaporet & plus crassi magnitudinis, quam serum sanorum relinquat. Fæces alvi quod attinet, hæc plerumque parciore ac durioris, coloris ex rufo obscurioris, quandoque etiam grysei, urinae vero, quæ sub accessione minguntur, tenuiores ac leviores observantur.

§. XXVII.

Quod attinet subiecta hicce mentis affectibus præ aliis obnoxia, notari meretur, homines non modo tardos, stupidos & obliviosos, sed sæpius quoque valde ingeniosos, poetas, philosophos, & qui profundioribus mathematicis & algebrae studiis nimium delectantur, melancholico affectu corripiti. Contra vero per experientiam liquidum est, eos, qui temperamenti melancholico-chole-rici habituque corporis macilentum præditi sunt, strictiores ac tendiores fibras cum celeriori articularum pulsû obtemet, nec non qui prompto in eam animo quotidiana fere domesticorum alteratione, præsertim inter cibum, facile fortiterque commoveantur, in furorem priores existere. Neque tamen prorsus excludendi sunt

modum hypochondriacum & hyssericum.

1) sanguis crassior & ater observetur.

2) Potulenta & efculenta.

3) Quæ se habent ad naturam melancholicorum.

4) Subiecta delirio.

natura languidi, debiles animoque timidi & humidi ac laxiori carne instructi, quod vel exinde clarius apparere arbitror, quum virgines & mulieres, maxime si menstruae aut in puerperio lochiahs excretionis vitio laborant, morbis cum mentis alienatione junctis valde videamus expostitas. Nec denique sanguineos, ut perite monet HIPPOCRATES lib. II. epid. 6. Sect. 3. & GALENUS lib. III. de locis affectis cap. 6. a melancholico & hypochondriaco malo immunes esse, iidem attenta confirmamur experientia.

§. XXVIII.

Prognosis delirii à causa morali.

At vero, quum ad specialem mentis morborum indolem ac genium rite discernendum & abhinc iudicium de ipsorum eventu & curatione recte formandum multum omnino faciat, valde diversas, quae se obstruant, circumstantias probe cognitas perspectasque habere; considerandum maxime omnium erit, num morbus à causa magis morali sive anienae, quam physica sive corporis vitio suam repetat originem atque fomentum. Nihil enim in artis exercitio occurrit frequentius, quam ut primam morbi causam scrutantibus nobis recedat, celestimas & subitaneas animi commotiones, iram, terrorem, diuturnum morem & angorem, vel etiam vesanum amorem occasionem malo & primam originem subministrasse. Quibus si cerebri & interiorum sensuum à parentibus accepta imbecillitas, vel notabile in dieta vitium, ut ebrietas, multa corporis refrigeratio, aut immodicus veneris usus accesserint, non novum certe & insolitum est, homines ceteroquin sanos & vegetos, nullo manifestato morbi chronici indicio apparente, in ejusmodi mentis morbos illabi, illapsos difficulter admodum, & nisi lento gradu ex eis emergere. Quod enim si incidit, morbum magis ichopathicum & essentialem esse, adeoque ipsam mentis domicilium insigni labe affici pro certo habendum est.

§. XXIX.

Symptomata ex morbo hypochondriaco, vel hysterico ori.

Verum melior convalescentiae spes apparet, si delirium melancholicum est symptomaticum & affectionem in viris hypochondriacum, in feminis hysterica comitatur, quod cognoscere licet, ubi ipsalms, flatus, borborygmi & ructibus prima infestatur regio, diaphragmatis cum anxietate sit compressio, alvi adest durities & molestia hypochondriorum cum renisu distensiones urgent; quibus haud raro lancinantes capitis dolores, vertigines, aurium susurri cum multis vigiliis jungi solent. Eadem facillioris sanationis spes est, si ex intermittente febre perperam curata, aut suppressio mensium, lochiaorum vel haemorrhoidum fluxus, aut etiam à summo narcotico insania sua sortitur inconabula; hae enim, convenienti medicina adhibita & excretionibus illis naturalibus iterum revocatis, egregie mitigantur aut prorsus depelluntur.

§. XXX.

Differentia & prognosia ratione graduum.

Præterea, sicut omnes cerebri ac spirituum morbi suos habent gradus vel remissiones vel intensiores suasque servant periodos, quibus per intervalla redeunt; ita pariter in singulis amentiae speciebus hoc animadvertere licet. Quando igitur leviores sunt accessiones & incipientes, non adeo difficile in curando est negotium; quo diutius vero incurrent & altiores egerunt radices, eo esse pertinaciores & curatu difficiliiores, itro, si pa-

rum habent remissionis, prope insanabiles, certissimum est. Temporis enim diuturnitate ipsa mentis & liquidi nervi sedes, cerebrum structura texturaque sua ita inveritur, ut nisi summo artificio reparetur. Quod vero tam rara delirantibus contingat curatio, hanc subesse purò rationem, quod maniacy Medicos plerumque respuunt & ipsa medicamenta vano veneni metu averfantur; melancholici autem, & praesertim hypochondriacy medicamentis nimium indulgendo nova quotidie à Medicina, quos sapissime mutant, adsumunt, adeoque in pejus res suas ipsi convertunt. Pessimum porro, quod auctiorem & desperatam maniae gradum indicat, signum est, quando maniacy post profundiores somnum iugiter delirant, nec validiorum remedium, ut purgantium & emetico- rum, nec intensioris frigoris vim sentiunt. Et si tandem plenaria virium ex somni defectu & longo ieiunio sit satietas, vel, si aëleptici, convulsi aut soporosi affectus supervenerint, mortem ante portas esse censendum est.

§. XXXI.

Deinde non ignorata perito Medico erit hæc peculiaris mentis morborum indoles & ab aliis differentia, quod longo interdum spatio plane sileant & intermittant, ita prorsus, ut homines perfecte sani mensisque composites interea habeantur; certis vero temporum periodis, maxime circa solstitia & æquinoctia, sub quibus exorti fuerunt, revertantur. Quodsi vero talis morbi genius est, nequaquam de salute desperandum est, si modo Medicus malum radicibus extirpare satagat & ipse ager observanda probe observet. Audiamus de hoc acutissimum ANATAXI iudicium, quod lib. III. his verbis expressum legitur: *furor & intermittit & diligenti curatione radicibus evellatur, sed intermissio non sincera est, quando per se furor definit, cum non congruenter aut medela, aut temporis anni clementia curatur. Nonnulli namque qui penitus soluti morbo videbantur, aut veris temporis, aut error in viâ, aut ira casu aliquo prorsus de novo ad furorem revocati.*

§. XXXII.

Singularem deinde meretur animadversionem, quod natura apud maniacy interdum optime suas tum naturales tum vitales observet functiones, ut ideo nonnulli raro alio corripantur morbo, ut plurimæ ad morbos disponentes externæ causæ non deficiant. Inde quoque delirantes non facile epidemice grassantibus morbis sunt obnoxii. Neque desunt exempla eorum, qui sub gravibus his mentis affectibus ad septuaginta & plures annos vitam produxerunt.

§. XXXIII.

Fit nonnunquam, ut solius naturæ bene valentis beneficio sine ulla remedium ac Medicorum ope dictorum mentis morborum, per criticas sanguinis sive per nares sive uterum, sive anum excretiones, salutaris fiat solutio; quæ eo certior evenit, si ab illarum suppressione originem malum duxerit, rectissime id observante HIPPOCRATE, qui Sect. VI. aph. 21. hæmorrhoides & varices insaniam solvere, perite proclitit. Nec mihi ignota sunt exempla, ubi nonnulli gravi melancholia hypochondriaci in juventute affecti, provectione ætate hæmorrhoidum fluxu accedente immunes manserunt. Ex quo etiam fit, ut alvi fluxus & dysenteria hisce morbis sæpe finem faciant, verissimo teste HIPPOCRATE Sect. VII. aph. 5.

Ratio diff. nro casu.

Prognosis delirii in ætate.

Maniaci raro alio morbo implentur.

Solutio delirii.

apb. 5. Quod ego pariter mea ipsius experientia confirmare possum, quam promper in juvene ex terrore in stuporem mentis delapso maniam subortam in diarrhoeam feliciter terminatam viderim. Præter hæc digna est, quæ probe teneatur, observatio ab eodem HIPPOCRATE Sect. V. apb. 65. proposita: quibus immores in ulceribus apparet, non insanunt; his autem decrepente dissolutis insania sunt. Cujus insignem fidem faciunt alie historię, quæ scabie & pustulis in cute subortis melancholiam decreville memorant. Ita puellam maniacam per ulcera in crure orta curatam refert FORESTUS lib. X. obs. 24. sicut è contrario ab occluso ulcere melancholiam coëpisse auctor est AMATUS LURITANUS Cent. II. obs. 47.

CURATIO.

§. I.

Indicatio-
nes cura-
tionis.

Quod ad rectam & securam medendi methodum attinet, hæc sicut unice causis morborum tum avertendis tum removendis debet esse subnixæ, quam ex causis cognitis indicationes curatorie & accommodata desumi debeant remedia: ita vix alia via in percurandis meoitis affectibus procedendum esse censuimus. Jam vero satis evidenter in superioribus demonstratum dedimus, causam delirii tam timidi, quam furibundi proximam & continentem in impetuoso sanguinis & humorum. ad imbecille caput motu, conunque vel difficiliore, vel nimis accelerato per vasa cerebri transitu, quem pressio potè variè turbatæ phantasie effectus subsequuntur, ponendam esse; quare curationis scopi, qui tum ad præcavendos tum amovendos hos morbos faciunt, præcipui habendi sunt, ut 1) sanguis in cerebro nimia copia congestus abhinc ad inferiora derivetur æqualibilibus ac liber ejus per caput & universum corpus propulsus procuretur, 2) ut causæ materiales de occasione, quæ naturalium sanguinis temperiem pervertunt ejusque metastasin seu palindromen efficiunt, removeantur & consuetæ, naturales & salutares excretiones in ordinem redigantur, 3) ut cerebri vasis ac membranis vis naturalis systolica, quæ nimis dejecta est, restituatur.

§. II.

Verum
optima de-
liriorum
cognosce-
re ratio.

Ante vero quam intentionem hanc feliciter & cum laude exsequamur, monendum esse dabo, antiquissimos artis nostræ antistites, maximeque Græcos, in affectibus hisce tam rectè dignoscendis, quam persanandis nostri temporis Medicis longe esse præferendis, eo quod non modo ex tanta deliriorum in suis regionibus ubertate & frequentia majorem sibi experientiam acquirere, sed ipsorum quoque remedium vires ac virtutes melius explorare poterint. Id quod vel solus suo confirmat exemplo HIPPOCRATES. Hic enim primum lib. de insania veram deliriorum causam ita delineat: *postquam, inquit, cerebrum decrepente calefactum fuit, sanguine in venis effervescente, insania videtur horrenda & facies flammescit, oculi rubescunt & mens aliquid mali operari cogitat. Cum autem sanguis rursus ad venas dispersus fuerit, quiescit.* Quibus peritis dictis dein præstantissima subnectit prædicta, dum in eodem libro V. Sæm, aquæ potat, & veratri potionem &c. plurimum comedat. Nec ab hac simplicissima medendi methodo discedunt

reliqui veteres medicinarum scriptores. Quod si enim monumenta ipsorum curatius evolvendo delirius medendi rationem inquirimus, simplicissimus certe remediis, ut sunt venarum sectio, balnea ex aqua dulci parata, aquæ puræ & mineralium fontium potus, lac & ejus serum, evacuationes tum leniores, tum pro circumstantiarum ratione validiores, ad fœtales istos affectus debellandos summo cum fructu eos frequentissime usus fuisse deprehendimus.

§. III.

Ex universa vero remedium classe nullum est, quod ab antiquis ad sedandos hos perniciosos capitis morbos magis celebratum ac laudatum est, quam venarum sectio, de cujus utilitate & administratione elegans existat locus apud TRALLIANUM lib. I. cap. 17. qui dignus est, ut commemoretur: *melancholia, inquit, ex copia sanguinis fit, si habuit corporis tenuis, atavis vigor, si hæmorrhoidum vel menium suppressio, si facies multo quam antea rubicundior est venaque magis turgescit, tunc ante omnem aliam curationem sine contestatione sanguis mittendus est & vena sectio, si vires robustæ sunt, satis generosa. Si vero vires talem non tolerant, necesse est his aut sapienter paulatim educere. Si vero humor sanguineus cerebro quasi impastus sit, tunc audacter venam in fronte secabis.* Sed cedro dignam & apprime utilem addit cautionem, ne ante conveniensem corporis vacationem id fiat: *nam, ait, si circa caput aliquid moliri cogites prius quam totum corpus recrementis liberum reddideris, offensus magis quam probatus, copiosiorum materiam ad partem affectam attrahendo.*

Quid de
V. Sæm
sanguis
mittatur.

§. IV.

Est quoque dein ex GRÆCIS ARÆTEUS, qui V. Sæm summum in curanda melancholia remedium, interpositis valde utilis cautelis, ita deprædicat: *Si crassus, biliosus & acer est sanguis, vena itaque secanda est; verum non eodem die, sed aliis diebus repetendo, quantum satis est sanguinis derivatur: eodem vero die modum sanguinis mittendi vires declarabunt: medio tempore corpus, quo aliam evacuationem sustinere valeat, liberalius nutriatur: si sitis graciles & sanguinis inopes, paulum sanguinis mittendum, quantum videlicet V. Sæm vires sentiant, sed nullam novam earum tenor accipiant: quocirca, si plures, quam decet, sanguinis effuderis, natara tibi penuria de propria se de dilabunt, hoc est, labescantur.* Neque aliud remediū genus ad pessimos animi morbos vincendo opportunius magisque necessarium existimat CÆLIUS AURELIANUS lib. I. cap. 5. ubi præter phlebotomiam maxime omnium simul scarificationem cum hirudinum. adpositione commendat his verbis: *cum status passivus apparuerit, detonsis capite atque raso cucurbitam instigimus, adjuncta scarificatione.* GALENUS quoque V. Sæm in ea melancholice specie præscribit, quæ sedem in venis habet & universum corporis habitum occupat, cum è contrario Arabes in ea curanda particulares sanguinis per venas jugulares, frontis, temporum, & evacuationes præ reliquis laudant, vel cucurbitulas cum scarificatione humeris applicant, vel etiam hæmorrhoides hirudinibus referant.

§. V.

Hanc methodum sequuti superioris seculi excellentissimi Medici FERNELIUS, RIVIERUS, NOSTRI de V. Sæm, MERCU-

sanitas de
adventu.

MERCURIALIS, HORNIUS, SYLVATICUS, JACON, FORTIS, BALLONIUS, ideum remedium tum ad avertendos, tum ad sanandos hos morbos efficacissimum omnibusque aliis longe anteponendum esse uno ore confirmant. Et profecto, si meam hoc loco interponere licet experientiam, inter præstantissima hæc morbis accommodata auxilia jure meritoque habendam esse sanguinis missionem censio, hac tamen observata cautela, ut, si sanguinis crassi & grumosi adse redundancia, primo vena in pede, dein, interjectis aliquot diebus in brachio, tum in capite, vel in collo vena jugularis provide secetur, aut stylo stramineo naribus intruso sanguinis proteritur profluvium. Tandem etiam venam in fronte hoc modo pertundere expediat, ut collo prius deligato faciei venæ inferuntur & dein lancetta non adeo acuta, ne pericranium lædatur, sed obtusa inciso fiat.

§. VI.

Balneo-
rum a ter-
toribus
commen-
datur.

At vero sunt adhuc alia, quæ tam in affectu melancholico, quam maniaco ob singularem, quam præstant opem à Veteribus summe commendantur remedia, quæ inter præcipue eminent balnea; quo nomine non modo universalia, ubi corpus totum, vel ad præcordia tantum in aquam tepidam immittitur, verum etiam particularia, ut femicupia & pediluvium debent intelligi. Videamus igitur, quid Veteres de hoc remedii genere in scriptis suis prodiderint. Primo vero omnium Alex. TRALLIANUS lib. I. Cap. 17. eximias ipsi laudes in melancholia tribuit: *Dulcium, inquit, balnearum usus, si quid aliud, melancholicis optulatur. Sed ægri in balneo immorantur diutius ac in calidam descendere cogantur; omnino etiam, si æstus fuerit, in eo diutius descedant.* Pari ratione ARETÆUS lib. VII. Cap. V. melancholicos in aquis sponte calidus sæpe commemorari jubet: *Rare enim, ait, & molles carnes ad aggravidius remissionem maxime faciunt: verum peccat ac dense melancholica laborantibus carnes sunt.* Ex Methodicis quoque est Prosp. ALPINUS, qui melancholicos tepidis balneis tum in universum corpus, tum præcipue supra caput futuram stillantibus perfecte sanatos memorat. Vid. lib. de Med. Ægypt. p. 115. Haud dissimili ratione ad maniam sedandam Veteres balnea præscribere, uti factum fuisse videmus à CELSO AURELIANO, qui usum aquarum naturalium, ut sunt nitrosæ, maniacis summopere suadet, idque eo magis, si odoris non terri fuerit, quo capitis membranae quætiuntur. Quod idem exemplo suo comprobat GALENUS, qui lib. suo de locis affect. cap. 9. solo usu balnei ex aqua tepida parati plurimos se melancholicos & maniacos persanasse gloriatur.

§. VII.

Operatio-
nis ratio.

Quod vero etiam tum balnea ob egregiam virtutem suam maximam mereantur commendationem, facile quisque agnoscere poterit, si ipsorum operandi modum accuratius paulo considerare velit, qui in eo consistit. Insanæ, quæ strabilaris per intervalla invadit, accessio vix ob aliam contingit rationem, quam quod per vehementiorem partium fibroso-nervæarum in extremis & infimis partibus constrictionem sanguis ad superiora cum impetu feratur; unde etiam suo jam tempore HIPPOCRATES Scil. I. aph. 56. in strabilaris morbis periculosis humorum à loco ad locum decubitus esse prodidit, qui vel paralyfin, vel convulsionem, vel insaniam porten-

derent. Jam vero, quum aquæ moderate calidæ duras ac strictas partes, præsertim in inscripibilibus locis, emolliendo ac relaxando impetum sanguinis ad caput non modo imminuant acque avertunt, verum etiam vasa ampliora reddendo humorum decubitus à capite inferiora versus deducant, ut dein, libero æquabilique humorum circuitu tum per universum corpus, tum quoque ad extimas ejus partes revocato, corpus perispirabile fiat; dubitare haud licet, quin in tali casu à balnearum usu multum sperandum sit auxilium.

§. VIII.

Quod ad rectam & optimam balnea præparandi methodum attinet, ex dictis facile poterit intelligi, aquas leviores ac subtiliores, quibus pluviales & fluviantiles annueramus, ad præfixum scopum rite obtinendum, aquis fontanis & durioribus longe esse meliores. Et in eo quoque ratio videtur posita, quare thermæ minerales, quæ præter tenuioris indolis aquam sal fastidit alcalinum minerale in suis fovetis, quales sunt Emfenses & Teunacenses, tam inteno, quam externo usu ad hos capitis morbos tollendos ceteris omnibus longe efficaciores deprehendantur. Quod si vero leviores ejusmodi aquæ pro balneis haberi nequeant, fontanæ ac duriores decoctione cum tritico & ejus surfuribus, bordeo, malva, femine lini, & radice abhæ &c. sacculo inclusis tum corrigendæ. Nonnulli etiam eodem fine lac admixcent, vel de cintribus clavellatis, quantum sufficit, adjiçunt.

§. IX.

Balnea ita præparata ne nimis calida, sed tepida tantum modo adhibeantur, serio monemus. Horum vero ad hos morbos vincendos energiam eo centior meliorque reddatur & sanguinis in venis cerebri stagnans derivatio longe auspiciosa succedat, opus esse putamus, ut ægri in balneo desidentis caput aqua frigida perfundatur, vel pannus frigida madidus capiti imponatur. Quam enchiretin nec ignotam fuisse CELSO ex cap. 8. lib. III. advertere licet, ubi super caput aquæ frigide infusionem, demisso corpore in balneum & oleum, suadet. Et lib. I. cap. 4. ita perhibet: *nil æque prodest ad caput infirmum roborandum, atque aqua frigida, quæ diutius caput quam cetera partes perfundendum, vel etiam largo canali quotidie aliquandiu subsiliendum est.* Idem quoque sentire ARETÆUM ex lib. ejus de morb. chron. constat, ubi, si ægri maxime insaniant, caput humore frigido irrigare jubet. Neque effectus hujus plane singularis ratio altius erit reperienda; quandoquidem ea frigoris est vis æque potentia, ut ad cerebri membranas & vasa à flagrant sanguine nimis dilatata & debilitata penetrando ea constrictione roboret, ut inde humorum ibi subsistentium melior discussio liberiusque iter promoveri possit.

§. X.

Dimissis balneis ad alia prædictorum genera progredimur, inter quæ non infimum sibi locum vindicant ipsa purgantia, quæ à Veteribus non minus quam Recentioribus ad abigendos mentis morbos magni semper habita fuerunt. Quorum tamen operatio quam non eadem, sed valde diversa sit, dum alia mioria alia fortiora existunt; indicandum omnino erit, quænam ex horum nimis ampla classe nostris indicationibus temp ad muniam,

Prepara-
tio me-
dica.

Forma ad-
datur aqua
frigida cap-
itatione
ad caput.

Solutio-
nis ratio
purgantia
quænam
aut.

maniam, tam melancholiam curandam facili-
ciant. In eo vero periti Medici quam maxime
consentiunt, quod leniora & mitiora alvum du-
centia, in quoniam selecta sunt manna, castia, rha-
barbarum, agaricus, folia fenae, polypodium, cre-
mor tartari, tartarus vitriolatus, lilius aquarum mi-
neralium neutra sub variis formis usurpata in af-
fectu manico & melancholico, praesertim qui ab
affectione hypochondriaca & stagnatione sangui-
nis in intestinis & venae portae raris ortum tra-
xit, sine omnibus aliis, etiam acrioribus propter
securum, placidum nimisque tumultuarium ope-
randi modum longe multumque praeferenda, id-
que eo magis, si in decocto vel infuso sumta non
simul & semel, sed iteratis vicibus & per epicra-
sin operantur.

§. XI.

Equidem, si Medicorum & in primis Veterum
monumenta evolvimus, ex purgantibus hellebo-
rum tam album quam nigrum ceu summum spe-
cificum ad utrumque affectum debellandum com-
mendant, cum tamen hic subtilissima, imo viru-
lente acrimoniae sit particeps. Ita HIPPOCRATES
lib. de internitiis ad praevocandam insaniam vete-
ro purgare & postea optimam victus rationem
insinuare jubet, atque lib. I. de dieta §. 33. in
melancholicis, formidulosis & tristibus eandem
purgationem per veratrum utilissimam censet. Cui
adhaeretur CELSUS qui lib. III. cap. 18. melanchol-
iam purgatione cum vetero ex magna parte le-
vari refert, & si hoc vel semel datum parum pro-
fecerit, interpositio tempore iterum dari jubet.
Verum enim vero, uti Veteres helleboro, elat-
eno reliquisque strenuissimis remediis perpetuo
fere uti fuerint, nos tamen mitiorum ob inopiam
id factum fuisse existimamus. Dein vero simili-
um est, eos ideo frequentius fortiorum purgan-
tium usum inivisse, quod turissimas ipsorum praeparationes, ut innotuit GALENUS lib. de articulis,
competas habuerint. Sed illorum prohi dolor
monumenta temporis diuturnitate interierunt,
ut pauca admodum remanserint, de quo HIP-
POCRATES de helleboro conscriptus liber, cujus
initium tantum exstat, satis testatur.

§. XII.

Porro, si loca, ubi HIPPOCRATES alique me-
dicinae patres purgationem per helleborum ductam
in morbis laudant, attentius paulo inspicimus,
eos hoc medicamentum non nisi sub certo modo
& vehiculo atque iis remediis conjunctis adhi-
buisse deprehendimus, quae magnam illius acri-
moniam cicurandi vim possident, ut ideo non
vehemens, sed plane mitior secura fuerit operatio.
Ita, teste DIOSCORIDE lib. IV. literis tradita fuit
à PHILONIDE Siculo Enneysi peculiaris corporis
ante usum hellebori praeparatio & victus ratio,
quae tamen ad nostram utique memoriam non
pervenit. Plura, quae idem confirmant exam-
pla reperire licet apud ipsum HIPPOCRATEM,
qui in lib. de dieta post sumenta deum & die-
tam purgationem per veratrum instituit & lib.
de veteris corpora ante ipsius usum uberiori ali-
mento & quiete humectanda, item lib. VI. populi
balneo & cibo praeparanda suadet: quo fine etiam
tam ante quam post usum fortiorum purgantium
sufficientem lactis asinini potum praebet.

§. XIII.

Quum vero notissimum sit, non modo drasti-
ca purgantia, sed & ipsa venena arsenicalia sine

ulla sanitatis noxa dari posse, si corpora prius be-
ne humectantur & alimentis demulcentibus, nu-
trientibus, oleosis & lacticinis praeparantur, vel si
postea ejusmodi adduntur; facile poterit intel-
ligi, nec Veteres in adhibendis remediis purgan-
tibus ullo modo deliquisse, sed ea valde cicurata
& ad meliorem mioremque indolem redacta
usurpasse. Quam medendi methodum ac cautio-
nem nec TRALLIANO ignotam fuisse ex ejus
monumentis apparet, dum in melancholia, in-
quit, blanda purgatione opus est & vitium humec-
tante, interposito balneo. Qui enim calidioribus
antidosis aut purgationibus uti sunt, praesertim hie-
ra, agros magis furiosos atque insanos reddiderunt,
dum sanguinem ad pectus & acutus converterunt.
Praestit igitur talibus simplicioribus adhibe
medicamentis, quae totum corpus non possint caleface-
re, repurgatos humectandi cibo permittere. No-
visis autem vos, me quoque pterofque ita labo-
rantes vultu potius quam medicamentis perfunctasse.

§. XIV.

Cui experientiae sana quoque consentanea est
ratio. Etenim in furore, ubi omnia in effreni
motu videmus constituta, nulla plane nervosum
systema acris irritandi est indicatio. Nec dein
humores attabilariis, sive melancholicis, glutinosis,
crassis, acidi & pontici vasis inhaerentes acriori-
bus opus habere moventibus, sed diluti, correcti,
meabilisque & ad exitum aptiores redditi facili
negotio ad excretionem stimulantur. Et profecto
si ulla in eo, certe in stuporantibus purgantibus
summa adhibenda est cautio. Nam, ut probe
annotavit Joann. HERNIUS lib. III. p. 289. in
usu magnorum pharmacorum nullus temeritatis
locus esse debet, alioquin, quod turpe dictum est,
supperas ferendo magis nocemus. Atque ideo
recte omnino atque perite à PLATONE dictum
esse legimus, morbos diuturnos, inter quos etiam
melancholiam refert, suos habere certos terri-
tios, ad quos ante quam pervenerint si medica-
mentis irritantur, acerbiores fieri. Ex omnibus
autem optime suo non exemplo erudire potest
providissimus ille artis parens HIPPOCRATES,
quippe qui Democritum curaturus helleboro non-
nisi praedens uti voluit.

§. XV.

Quum superiori loco inter causas & conditio-
nes, sub quibus veritibus helleboro alique fortio-
ribus purgantibus uti licuerit, hanc praecipuam
retulerimus, quod illi innoxium, qui nos jam la-
tet, praeparandi modum calluerint, non inusite
fore arbitror quaedam de eodem monere. Fue-
runt scilicet novissimis temporibus praeciani in ar-
te viri, qui in eo excitando multum & operae
& temporis consumserunt, quos inter eminet
LINDENIUS, qui Colleg. MSTO ad praxin elyoi,
ubi helleborisum commendat, singularem helle-
borum corrigendi modum tradidit, quo eos non
modo, qui insanire primum coeperunt, sed & ip-
sos maniacos se curasse adserit. Ipsa praeparatio
haec est: recipit radices hellebori albi a drachma
dimidia ad drachmam unam, eamque in vino,
donec mollescat, decoquit, decoctum eximit, &
rejectione pristina decoctionis vino, novo vino inji-
cit atque per noctem in loco calido relinquit. Post-
ea infusionis vinum nunc levius, tunc fortius,
prout validum esse debet remedium, exprimit,
expressi drachmam unam propinat, quae suffi-
cienter operatur.

§. XVI.

Dras-
pocibus
veterum
focibus
julianis.

Dras-
pocibus
veterum
focibus
julianis.

Venerem
modo, las
porpora
rubenda.

Curat
hellebori
à
LINDE-
NIO mo-
do.

Qua
venerem
focibus
amaria.

§. XVI.

De oculis
judicium.

Nos quidem de hac hellebori correctione ita sentimus: medentes fortioribus qualicunque ratione correctis & vi sua acri caustica privatis remediis commodè carere & majorem longe fructum expectare posse, si ea solum evacuantia, quæ supra recensuimus, selecta ora atque lenissima in usum rite vocare satagant. Cui autem speciatim helleboro uti volupe est, de convenienti ejus præparandi modo non dissuademus; siquidem vinum illam drastico-rum purgantium delecteriam, quæ in subtilissimo sale acris consistit, mediante coctione diutius instituta penitus emetvari posse certissimo constat experimento. Et quam per similem cum aqua vel vino adornatam cocturam tenuissima illa, quæ helleboro inest, acrimonia extrahitur, manifestum est, quod remanet, diastica virtute privari.

§. XVII.

Aque mi-
nerales &
fontana
laudantur.

Missa ulteriori purgantium disquisitione progredimur ad aliud remedii genus, quod solum aquæ minérales, vel pura aqua fontana, in quibus summum & præstantissimum adversus mentis morborum contumaciam situm est præsidium. Et enim, quam mania plerumque originem & fundamentum in melancholia, melancholia in affectu hypochondriaco habeat, atque hic ipse à sanguine & fœcis vitiosis ac impuriorebus, per imi ventris viscera & intestinorum volumen difficulter progredientibus, oritur & natales suos fortitur; ad obstructions vero viscerum refrandas liberiorerque ac faciliorem sanguinis circuitum reddendum, nulla hæcenus à multis retro sculis inventa & non modo à Recentioribus, sed etiam à Veteribus peritis ac scitis Medicis usu probata fuerit medicina, præter providum aquarum mineralium vel frigidarum, vel calidarum usum facile patet, quantum ab ejusmodi aquis in pernicatissimis morbis vincendis sperandum sit auxilii. Ego sane ipse integra fide & roboror, quod nolum esse Medicis, si aquarum, præsertim mineralium, virtutem ignorarem. Enim vero, quam boni ac periti Medici ars & scientia maxima ex parte in arcendis vel curandis chronicis affectibus versari debeat, hic certe parum vel nihil solidi sine prudenti aquarum naturalium tam interno quam externo usu præstare poterit. Quapropter ut Medicus harum salutarum aquarum, ratione ingredientium & virtutum accuratam sibi comparat cognitionem, serio monemus.

§. XVIII.

In pluri-
bus mor-
bis pro-
fuit.

Quodsi vero genuinam fontium salubritatem indolem scrutamur, obspiciemus sane, tantam à benignissimo conditore ipsis concessam esse facultatem, ut pluribus medendi indicationibus in omnibus fere morbis satisfaciant. Nam spiritus elastici purissimi & sale alkalino medio minerali prægnantes decentique copia adhibeæ non modo humores viscosos alterant, crassos incidendi, glutinosos fluidos reddendi, & obstructa vascula referandi potentia pollent, verum etiam in partea solidas energiam suam exerunt, cum duras & tensas fibras laxant & emolliunt, debiles & imbecilles roborant, emunctoria à tono suo dejecta stimulant, adeoque omnis generis salutares excretiones, sive per alvum, sive per urinam & cutim, sive etiam per uterum & venas hæmorrhoidales promouent.

§. XIX.

Lactis ali-
um usum
commendat-
ur.

Similis, imo fere ejusdem cum aquis mineralibus virtutis est lac asinum & serum lactis tam vaccinum quam caprinum rite confectum & depuratum, cujus usus ad expugnandas chronicas passionis ab HIPPOCRATE jam olim commendatur, & à peritissimis in arte viris, MERCURIALI, RIVERO, RAYMOND, à FORTIS, BAGLIVIO & celeberrimo nostri ævi Medico BOERHAVIO summis ob præstantissimam efficaciam laudibus extollitur. Id quod & ego bona fide affirmare possum: siquidem affectus valde chronicos, qui ex subtili & virulenta humorum acrimonia suborti in imbecilliori & virgato nervolarum partium systemate sedem suam fixam habent, sunt decenti lactis & feri lactis usu vix ex voto sanatos novi.

§. XX.

Nihil usum
commendat-
ur.

Ex universa vero medicamentorum serie remedium non scio ullum, quod ad causas horum affectuum eradicandas opportunius existat, & in quo, ceu sale simplicissimo, natura plus mysticiorum condiderit, quam ipsum nitrum ab heterogeneis partibus depuratum. Ejus namque usus tam universalis est, ut ad omnis generis morbos, si modo rite instituantur, lætissime pateat. Maxime vero omnium in ea melancholice specie, quæ ad maniam inclinat, imo in ipso furore, peculiarem plane & laudatissimum præbet effectum, dum non modo acrimoniam humorum biliosam temperat, sed & effrenes solidorum motus placando immoderatum fervorem sistit. Doleudum itaque sursumopere est, efficacissimum hocce remedium non modo Veterum temporibus plane ignotum fuisse, verum etiam à nostri ævi Medicis ratione suæ, quam exierit in morbis, virtutis, nec suis cognosci, nec in debito pretio haberi. Ex recentioribus tamen, qui ejus eximiam in nostris affectibus sanandis virtutem agnoverunt, laudandi maxime sunt SANNERTUS atque RIVERTUS, quippe qui in mania potissimum nitrum cum pauculo camphoræ maritatum ceu specificum in usum ducendum esse adserunt.

§. XXI.

Quid de
sporosis
dicamur.

Proposuimus jam ex his, quæ opulari his animi morbis possunt, generalia quidem, sed omnium optima remedium genera, quæ longo usu à peritissimis in arte viris probata fuerint. Superest nunc, ut de peculiaribus quibusdam & specificis medicamentis, quæ itidem magna à plurimis laude effertur, nostram in experientia fundatam dicamus sententiam. Jam igitur notissimum est, in scholis medicis & pharmaceuticis libris ex regno vegetabilium herbarum mellisæ, betonicæ, verbenæ, anagallidis, salviæ, absinthii, flores hyperici, tilisæ, camphoræ, & animalantium familia sanguinem asinum excitatum & cum potu exhibitum; ex regno minerali martialia, cinnabazim, saturum saccharum, calcem & tincturam luanæ præ ceteris commendari. Verum enim vero, utut remedia hæc singularia ex toto haud rejicimus, sed nonnullorum potius usum meliori explorationi committendum volumus; id tamen adieverare non dubitamus, parum ab istidem solis expectandum esse emolumentum, nisi prius causis morborum tam remotioribus, quam proximis corrigendis & abigendis per supra allata remedia generalia rite consultum prospectumque fuerit.

§. XXII.

§. XXII.

*Specificum
Riverto.*

Dantur, præter jam dicta simplicia, varia adhuc ex ipsis artificiose parata composita, quæ ob specificam virtutem suam summis prædicantur elogiis, ad quorum usum imprimis pertinet illud a RIVERTO contra maniam tantopere celebratum remedium, quod ipse pro arcano & gentilitio habere consuevit atque hoc modo paratur: *Recipe foliorum melissæ manipulum unum: inclendantur in spiritus vini incisi quatuor: dein adde margaritarum præparatarum drachmam dimidiam: Misce, dicitur ad duo cochlearia.* Quod quidem medicamentum, si ex æquo æstimem, non profus dampnandum iudico. Et licet ipse genuinam ejus virtutem usu non exploraverim, in ea tamen certo respectu assignanda nullus dubito, maxime quam multos olim maniaco, à passione quodam in pago Vinariensi degente, qui illud frequentius adhibuit, sanatos noverim.

§. XXIII.

*Decoctum
nigram
livens-
crojo.*

Probe dein animadvertendum esse arbitror, celeberr Brunsvicensium Medicum decocto quodam nigro, *febrerzer Narren Trank* vocato, quod, ut Pharmacopæus noster testatur, ex sanguine asinum cum aqua mellisæ & aceto vini cocto paravit, haud infelici successu usum fuisse frequentissime. Neque ego hoc remedium genus inutile censem; siquidem præter virtutem sedativam, cujus propter sanguinem animantis pariceps est, insignem etiam aceto vini discutientem & resolventem obtinet efficaciam.

§. XXIV.

*Decoctum
o. essentia
magistralis
muri B.
Juchæalis.*

Lautilissimæ porro virtutis esse creditur B. Michaelis decoctum & essentia ex anagallide marej, qui pheniceo colore splendet, parata; quæ bina remedia mille experimentis in melancholico & maniaco delirio à se probata esse asserit, de quorum tamen fide nondum satis mihi constare proficior. Pulverem vero, qui à Dno CHARLAS in Pharmacopæa Regia descriptus & contra insaniam à morfu canis rabidi seu specificum commendatus ex melissa, verbena, abimbio, artemisia, plantagine, ruta componitur, tum ob virtutem, qua gaudet, flagrantem humores discutendi, tum solidas partes roborandi, non omni effectu destitutum arbitramur.

§. XXV.

*Flores-an-
timoni.*

Ex chymicis medicaminibus spectant hac quoque flores antimonii, quorum utrum plurimi Medicorum commendant, ad experientiam auctæter provocantes. Cui nec nostra contradicit observatio. Quod si enim tenaces, viscosi & biliosi in duodeno stibulantes humores vomitu evocandi sunt, flores isti, qui præ aliis emeticis antimonialibus blando quodam & anodynæ virtutis sulphure pollent, egregium pollicentur fructum. De his, quæ opium ingrediuntur antidotis, quorum multæ magnæque apud Auctores laudes existant, infra plura dicemus.

§. XXVI.

*Bisnus-
porus est
operculis
periculis.*

Mibi denique si ullum remedium seu specificum, id est, quod singulari quodam & præcipuo effectu multosque hic comprobavit, in hisce mentis affectibus tum præcaveniis, tum abigendis commendare licet, nec certius nec efficacius decenti & ad vires corporis instituta exercitatione novi. Nam, modo siquidem in sanguine non deficiat,

Frid. Hoffmanni Oper. Tom. III.

hoc remedium viscidos humores resolvendo liberiorumque sanguinis per omnia vasa circuitum promovendo, corpus ab impuris sordibus per auctam transpirationem liberat, obstructions relaxat, adeoque omnibus aliis summe commendatis remediis antecellit longissime.

CURA PRÆSERVATORIA.

§. I.

Quam tutius factuque proclivius sit morbos præcavere aut recurrentes eorum incursum avertere, quam præsentis medela ad sanitatem reducere; in apico esse arbitror, quanti ad Medici pariter ac ægroti commodum interfit, curam præservatoriam probe intelligere, quæ sequentibus continetur momentis. Primo omnium necesse est, ut sanguinis abundantia habeatur ratio, quæ tempestiva, præsertim circa solstitia & æquinoctia consueta venæ sectione, vel salutaribus per hæmorrhoidales & uteri venas evacuationibus promotis, aut, si cohibita fuerint, revocatis minuenda erit. Ante vero quam venæ suscipiur incisio, valde utile est, primas vias à viscosorum humorum colluvie leniori medicamento deplere. Tali enim ratione post sectionem venam sanguinis per universum corpus distributio longe erit expeditior, ut per transpirationem depurari melius possit.

*Præserva-
toriam præ-
serva-
toriam præ-
serva-
toriam.*

§. II.

Præter hæc inter optima remedia præservantia prudens affectuum animi moderatio referenda est, quæ facile obtinebitur, si nobis ipsi non adeo indulgemus. Absint itaque stolidæ desideria, quæ mentem ullo modo turbare aut speculationibus anxiosque præfigurationibus occasione suggerere possunt; omnes etiam nimis & uni rei infixæ cogitationes æque ac profundiores studiorum causa susceptæ meditationes sedulo vitentur, vena sit parvissima & denique remota solitudine animus jucundo & amico reficiatur consortio.

*Præserva-
toriam præ-
serva-
toriam.*

§. III.

Neque tutum est ab omni cibo impleri, sed talem sere eligere, qui nec concoctu difficilis, nec ventriculo sua mole gravis est. Vitare hinc oportet carnes infumatas, suillas, bubulas, cochiliæ, pisces conosos omniaque vaporosa & cibos quoque cum cepis & alio paratos, utpote quæ singula ventriculum onerando crassumque ingignendo sanguinem mirum nocent. Ante omnia vero corpori quantum indiget, non quantum cupit impendendum est. A nimia enim voracitate, ad quam propter exundantem acidum in prima regione progeniem admodum proclives sunt melancholici, non leve redundare damnum observamus.

§. IV.

Potus quoque habendus est delectus, siquidem Ciceroni non omnis omnibus deprehenditur proficius. In genere tamen notari velim, leviorē semper, ut cerevisiam secundariam, vel puram aquam frigidam esse eligendam. Inter vina modicus vini albi & non adeo subtilis, ut Mosellani haustus sub epulis melancholicis omnino concedatur, utpote qui animi corporique vires recreando more ad hilaritatem adducit. Dulcia vero & potentia vina, qualia sunt Hungarica, Italica &

2

Gal-

262 Cap. VIII. De delirio melancholico & maniaco.

Gallica Secti dicta tum melancholicis tum maniacis nunquam non annotavi infensissimam. Nihil autem fere magis officit & ad maniae genesis contrahit, ac si post graviores iracundiae affectum ejusmodi spirituosus, vel etiam frigidi potus in copia ingurgitantur; qua propter, ut omnes de salute sua solliciti ea tempestate ab iisdem se abstinant, sincere monemus.

§. V.

*Tabaci
ejus moder-
atum.*

In eodem cum alimentis pretio habetur ea quae nostro zevo increbuit tabaci fumigatio, cujus nimium & perpetuum quasi ulum, qui digestionis inimicus spissos humores ingenerat coque in organum facile abripit, ex toto improbandum; cum è contrario consuetum & moderatum, ad alvum lubricam servandam, recte concedendum arbitremur.

§. VI.

*Mentis
ejus moder-
atum.*

Denique praeservandi sine summo periculo commendant aëris mutationes, & praesertim à regionibus nimis calidis vel frigidis ad temperiores susceperit peregrinationes. Hae ipsae enim non modo erroneis perversisque ideis emendandis apprime sunt idoneae, verum etiam motus, qui per vetustatem instituitur, viscerum obstructions impediendo aquabilem sanguinem per omne corpus cursum servat utilissime.

CAUTELE ET OBSERVATIONES PRACTICAE.

§. I.

*Cautele
altre curatio-
nem for-
mam ad-
parant.*

Quum ex acutis febribus usque praesertim biliosis cum phrenitide junctis, per opiatas & nimis refrigerantia perperam sanatis maniam haud raro subortam observaverim, boni omnino circumspicientis Medici esse reor, non modo febres ejusmodi cholericas rationali & prudenti tractare methodo, verum etiam, ubi inclinata in melius valetudo est, exactam vivendam rationem cum convenienti affectuum regimine praescribere; alioquin ex phrenitide facilis ad delirium chronicum sit transitus. Similem cautionem postulant febres intermittentes contumaces; siquidem ab iisdem per iteratas sanguinis missiones vel acres saepeque repetitas alvi evacuationes male tractatis, aut per adstringentia & opiatas nimis cito cohibitis, melancholiam hypochondriacam & exinde ipsum furorem concitatum fuisse constat. Sedulo itaque monendi sunt Medici, ut ab empiricis istis & indignis curationibus abstineant, ne forte gravissimorum horum affectuum causa dici haberique possint.

§. II.

*Circa P.
Sunt re-
sinae sub-
stanciae.*

Venaesectio licet praestantissimè in delirio utilitatis sit; multum tamen pro corporum varietate ratione loci, quantitate & temporis debet variari. Ita, quando maniacus furor plethorica, cholericus & in aeris vigore constituta corripit subiecta, sanguinis iterata missio, frequentiori per correctum helleborismum purgatione interposita, minus nocet, maxime si postea cardiacis, roborantibus & anodynis sedatis viribus rescindendis proficiamus. Ubi contra per diuturnam inedia assiduasque vigilias & contrarium corporis evacuationem furiosi viribus & humoribus temperatis exhausti fuerint, ideoque nutrientibus magis & blandis analeptis opus habent, sanguinis de- tractione in majorem incidunt debilitatem.

§. III.

Quam superiori §. V. curas praescriptissimas convenientem venaesectio administrationem, hic loci minus censemus repetendam. De Venae Sectione tamen in fronte haec habeo quae monent: eandem scilicet in paroxysmo, ubi propter spasticam inferiorum partium strictionem sanguinis ad caput directus est impetus, nunquam utilem, sed ob majorem humorum attractionem magis esse noxiam; è contrario vero tutius rectiusque adnari, quum aut primae viae ab impuris sordibus probe sint liberatae, aut si spasmus quiescente mali notabilis facta fuerit remissio. Docuit me utilissimam hanc cautela tentata simili remedio hemiplegiae curatio, in qua eandem venam plus quam decies infelici admodum eventu novi incisam. Hoc in passu ex antiquioribus Medicis consentientem habeo CELSUM, cujus lib. III. Cap. 28. de curatione deliriorum haec notata digna est animadvertio: *Remedia adhibere, ubi maxime furor urget, supervacuum est: simul enim febris quoque increvit. Tum itaque nihil nisi commendandus ager est; ubi vero res patitur, festinanter subveniendum est. Alcibiades perinde esse dicit, his sanguinem mitti, ac si trucidaretur: hanc rationem secutus, quod neque insania esset, nisi cum febre intensa; neque sanguis, nisi in remissione ejus, recte mitteretur.*

§. IV.

Quum, gravissimo teste HIPPOCRATE Sect. VI. aph. 56. melancholis laborantibus periculose ad cerebrum sunt metastases, quas apoplexia, epilepsia, coecitas, aut ipsa mania sequitur; omnia profecto cura adhibenda est, ut ne perversi ejusmodi motus translatorii seu feriales sanguinis ad caput congestiones procurantur, quale quid fieri maxime solet ab acerbis animi perturbationibus, aut largiori vini potentia inter dies caniculares potatione, vel denique omni medela, quae liquida nimium exagitando vires deprimere valet.

§. V.

Maxime vero omnium talem noxam fortiores inferunt purgantia, utpote quae intestina ad majores spasmos proritant sanguinem ad superiora magis propellunt. Quae cum ita sint, de purgationibus rite instituendis aurea tenenda est regula MESURES, quae ita se habet: *in aggritudinibus melancholicis non bis, non semel, sed per intervalla facienda est evacuatio ita temperata, ut natura regat evacuationem, non evacuatio naturam. Praestat tamen semper alvum lubricum servare, & si non respondet, sollicitanda est vel clystere, vel singulis septimanis leniori evacuante.*

§. VI.

Ubi ex infano amore virgines nobiles & maturo viro insaniant, conjugium efficacissimum praestat auxilium; cujus incomparabilem ad componendum furorem virtutem & ratio confirmat, & sae jam aetate rectissime agnovit HIPPOCRATES, qui ideo virgines quam citissime viris cohabitare jubet, si enim, inquit, conciperint, sanae sunt. Id quod ego ipse experientiae conformem habere nullus dubito.

§. VII.

Si quando furor à morsu maniaci, vel canis rabidi, ut talia exempla prostant, furoribus, non dissidendum est specibus illis, à GALENO, AETIO, RUTTO tamopere laudatis externis, cancris com-

*Circa fo-
litionem
venae sec-
tione.*

*Circa de-
lirium
phrenitide
maniam con-
mune.*

*Circa pa-
roxi-
smos.*

*Circa de-
lirium et
furorem.*

*Ex morsu
canis rabidi,
vel canis
rabidi.*

quotidie cubitum iturus pediluvium uteretur tepidis ex aqua fluviatili & tritici surfuribus paratis & quamprimum crurii per venam in pede secutam, aut hirudinibus ano adpositis liberum permitat exitum, unde statim melius habere coepit. Deinde mixturam ex essentia succini, tinctura tartari & antimonii acris confectam ex iofuso theiformi, quod herbas floresque roborantes ac antispasmodicas, filix, melisse, lilior. convallium, sambuci, anthis, characemeli &c. habebat, singulis diebus mane ad xl. guttas capiendam suscipimus. Tum quoque pulveres leniter diaphoretici & antispasmodici, ex pulvere Marchionis, succino preparato cinnabari, nitro purificato & pauxillo theriacae coelestis compositi, ante cubitum ex usu fuerunt. Denique, quum maximum in ejusmodi morbis curandis momentum in iusto affectuum moderamine & accuratiore rerum non naturarum usu consistatur, primo ingrata & excitandis adversis ideis opportuna objecta removere, tum vero a cibis salubris, acris & nimium conditis abstinere, corpus maximeque pedes contra frigoris injuriam munere & calidiores sanitati insensibilis potus cane pejus & angue fugere serio iussimus. Quibus per aliquot menses probe observatis id per Dei gratiam obtinimus, ut animo successu temporis ad se redeunte ager a furibundis paroxysmis immunis plane relinqueretur.

OBSERVATIO II.

Affectus melancholicus, maniacus, hypochondriacus.

Vir ecclesiastico munere fungens, annorum xxxviii. staturae mediocris corporisque inacilenti, sed multis vasis sanguineis inlrocti, patre natus hypochondriaco & ad melancholiam admodum prono, per multos jam annos haemorrhoidum fluxum singulis fere mensibus reverentem expertus bene admodum valuit. At quum studiis nimium intentus profundis meditationibus, neglecto corporis motu, plus iusto indulgisset, easque ad seram usque noctem nudatis pedibus protraxisset, concurrentibus simul curis domesticis, salutaris haec excretio sensim imminuitur facta penitus tandem desit. Non multo igitur post symptomata accesserunt hypochondriacae, ructibus, flatulentis, mollicisque imi ventris distensionibus & torminibus coli dolores & mulantibus cruciantur. Sed quod pessimum erat, ipsa quoque mens magis quam antea videbatur affecta; siquidem perpetuo nunc morebat, ab exigua vel nulla plane causa metuculosus expavecebat & singularis diffidens omne fugiebat consortium: quae mentis mala brevi intervallo tanta capiebant incrementa, ut ager noctu insomniis agitur, vise insidias timere, manus cum gemitibus complicare, alte mox vociferare & sermonem continuum sine nexu movere, mox cogitandum & quasi elingum obtinere inciperet. Neque tamen sine intermissione perpetuo ita fuit, sed malum ex parte minuitur atque tum praegressa frigoris sensatione pulsusque paulatim celeriori vehementiori que reddito recedit. Medici varia praescripserunt medicamina nitro, electuaria, confectiones tandemque binz circiter sanguinis unciae fuerunt detractae, sed sine singulari levamine.

Epistola cum consilio.

Docet nos haec observatio, ex affectione hypochondriaca melancholiam, ex melancholia maniam oriri, omniaque haec mala ex sola haemorrhoidum suppressione suam repetere posse origi-

nem. Ego consultus cum pulsum durum & plenum, urinam aquosam & tenuem, somnum inquietum multique stipatum insomniis deprehenderem, atque graves sub costis spuriis tensiones pressuras & anxietates praecordiales cum pertinacissima alvi obstructione urgere comperirem, à leni evacuatione curam inchoandam ratus potiusculam ordinavi mannata & thabarbarinam, denique sanguinem ex altera pedum vena tusa detrahendum & pediluvia ex surfuribus triticeis, sapone veneto & aqua fluviatili parata ante decubitus adhibenda iussi. Inter reliqua, quae opem tulerunt, praesidia fuerunt pilulae nostrae balsamicae bis in hebdomada sumendae atque pulvis ex lapidum cancrorū, tartari viridiali, crenoris tartari, nitri purificati ana drachmis duabus, cinnabari rite preparati drachma dimidia, electi cymini guttis sex compositus, qui una cum liquoris anodyni mineralis viginti guttulis ex aqua fontanae unciis octo alternis diebus propinari debuit. Dein quoque insulum Theiforme ex herba veronica, millesolii & radice glycyrrhizae confectum ad aliquot patellas mane fortillandum fusi. Pro portu ordinario decoctum chinæ & cichorei cum passulis subtilis, & ad promovendum digestionem elixirium nostrum viscerale balsamicum inter epulas, quas parviores esse injuncti, adsumendum commendavi. Gravate quidem haec omnia nosser admittentibus tamen paulatim adfuit fluxum bona pars ructibus multis & sonoris discussa fuit, angustiaeque cum mentis furore sedari coepit & aliquando haemorrhoidum excretio apparere, quae deum fonte Egrano insequenti veris tempore cum pulso regimine potato ex voto rediit, adeoque corporis animique integritati nostrum reddidit. Ad praecaveudas tamen recidivas commendatarum medicinarum usum diutius protrahi iussi.

OBSERVATIO III.

Vir xl. annos natus, natione Judrus, complexionis melancholico-cholericæ, multis laboribus cum meditatione ac vita sedentaria junctis diu vacavit, sed nihil inde incommodi persensit. Aliquot autem abhinc mensibus cum de inopinato filia obitu cerior factus insigni mentis perturbatione sollicitaretur, mox mororibus cogis magisque indulgere, circa praecordia angui, hominumque conversationem fugere coepit. Stipabantur haec mala continua pedum refrigeratione, somnoque inquieto & minus resistenti, nec non pertinaci obstructione alvi, quam nonnisi sexto septimove die rite deponere. Quomodo ita adfectus totos sex conflavit menses, & denique vehementi percelleret terrore, ipsa mania invasit rabies, qua tantopere furebat & in obvio quocunque irrueret, ut vinculis constringi deberet. Cui malo licet suppetias ferre amici voluerint, nulla tamen alimenta necum medicamenta adsumsit. Nihil minus vena brachii & frontis coacta incisa insigniter profuit: siquidem inde mens effusa paulo quiesior reddita ad tristes cogitationes pristinamque melancholiam agitudine rediit. Hanc contra dein variis pugnatum est remediis, thermæ quoque Carolinae potatæ alvum egregie duxerunt, sed malo praeterea vix quicquam detraxerunt. Ego igitur in consilium adiectus hanc praescripti medendi methodum. Primo fontem Selteranum, addita ad mensuram salis Carolinarum drachma una, per aliquot hebdomadam spatium bibendum suscipimus. Vim ventriculi concoctricem roborare studuimus

Melancholia hypochondriaca cum mania periculosa.

alicro nollro vifi. erali temperate balfamico, quod ad Lxx. vel Lxxx. guttulas inter epulas porreximus. Nec omiffa funt pediluvia, quibus alternis diebus ante cubitum æger pedes ad furas ufque immittere debuit. Denique fingularem præfitebantur opem pulveres leniter temperantes nervinis fpeciebus nupi ante lecti introitum exhibiti. Potui dedimus decoctum, cujus hæc erat formula. *Recipe Rofæ corus cervi, radices fcoronera ana uncias duas, cremoris tartari drachmas tres, Coquantur in aquæ fimplicis menfuris quatuor: adde fyrupi acetofatis citri uncias duas.* Præterea, ut abfisteret ab omnibus cibis fumo induratis, acerbis & flatulentis; è contrario autem tenuioribus cum aperientibus herbis paratis jufculis, interposito vini generofi haufu, feclulus uteretur, corpusque frequenter moveret, imperavimus. Quibus remediis per aliquod tempus ita continuatis optime convaleuit.

Epiergij.

Ex præcedente morbi hiftoria fatiſ perſpicue apparet, quanta aqua melanholico-hypochondriaco, qui vitam agunt ſedentariam & umbraticumnumque meudis fatigationibus indulgent, ad producendum ſurorem in iſtis animi alleclibus, maxime vero ſubacutis morore & hunc ſuperveniente vehementi terrore vis ſit atque potentia, quantaque opus fit cautione & prudentia, ut ejusmodi hominibus, ubi jam melancholia cum malo hypochondriaco juncla variis ſe ſignis prodit, omnis graviorum animi perturbationum ſubtrahatur occaſio. Docemur quoque ex hoc caſu egregie, melancholiam & maniam alternatim procedere, ita ut ex uno malo ad alterum facilinus fiat tranſitus.

OBSERVATIO IV.

Nobilioris generis femina, vix xxx. ætatis annum tranſgreſſa, temperamenti ſanguineo-melancholico, ob adverſos quofdam à ſua ſibi illatos caſus, in impendens incidit, poſtquam vix utero conceperat, animi triſtitiæ ad quam propulſandam quum haud modicum ſpiritus vini haufum frequentius adlitteret, accidit, ut non multo poſt in ipſam maniam ſurorem abrepta vehementiſſime inſaniret; ſiquidem à nemine laeſaſſa graviter ſubinde iracebatur, adſtantes ſaliva conſpurcabat, veſtes dilacerabat, nec uno conſiſtere loco poterat, quin miris ſe modis jactans corpus ſpectaculo exponeret. Et ſic habebat primis graviditatis menſibus; quum vero ad dimidium geſtationis tempus perveniſſet, rabie paulatim remittente perfecte ad ſe rediit & ſtato tempore ſcilicet excluſit partum. Lochia quoque dein rite fluxerunt, nec quidquam, ut ſolet, moleſtiæ puerperium reliquit; naſi quod poſthæc ſuſpectum valeudinis ſtatim menſtruae purgationes retentæ portenderent, quas tamen quum Medici ſaluſe novæ impregnationis ſpecie decepti promovere duliarent, ſacrum propter dolor l eſt, ut ſera iterum rabies animam occuparet. Varia binc inde præſcripta remedia purgantia, temperantia, ſpecifica nihil attulerunt opis; quare ut conſilio & auxilio succurrerem per literas amici me rogarunt.

Epiergij cum conſilio.

• In præmiſſa morbi hiftoria id maxime debet *Frid. Hoffmanni Oper. Tom. III.*

animadverti, delirium ultimis graviditatis menſibus ſponte evanuiſſe, partu vero excluſo iterum rediſſe. Cujus rei ratio ita me judice, debet explicari. Quo magis ſæctus in utero mole ſua creſcit, eo plus opus habet nutrimenti; hinc major ſanguinis quantitas ad uterum conſluit, quæ edito partu reliquis corporis partibus denovo impetitur. Quum vero in noſtra ægrotâ menſium acceſſerit retardant, non modo ſanguis copia increviſſet, ſed & valde ſpſſus & ad trajiciendum tenuiſſimos canaliculos ineptiſſimus evaſit; unde facile potui in primis viis & circa uteri regionem ſpaſtica ſtriſtura oriri, qua cruor ille tenax ad debile caput delatus rationis ulum denovo turbavit. Quod ad curationem attinet, eo poſſimum reſpiciendum putavi, ut ſanguinis circuitus per totum corpus, maximeque per uterum ſua reſtituatur libertati. Quo ſiſe primo uſui, ut ante decubium temperatiora adhibeantur pediluvia; dein per menſis circiter dimenſum ſontes Egraci decenti cum regimine & interpoſitis ſtomachiciſ medicamentis tepide bibantur; circa tempus vero, quo alias ex utero ſeri fuerit menſtrua purgatio, per aliquot dies ante lecti introitum doſis capiatuſ pilulatum balfamicum, & ſequentie die mane drachma una talis aperitivi, ex lapidibus cancorum, tartaro vitrioluo & nitro compoſiti, ſuperbibendo vaſcula quædam inſuſi theiſſormis ex floribus nervinis & antiſpaſmodicis tiliæ, primulæ veris, anthos & citri corticibus conſtatam. Qua methodo à per Dei gratiam acquiſivimus, ut ægra à malo ſuo ſenſim paulatimque liberata nunc ſanègerime vivat.

OBSERVATIO V.

Fœmina annum agens xlii. temperamenti melancholico - cholericis, animique à natura ad triſtitiæ valde diſpoſiti, nunquam à viro gravida, ſub regulari & ordinato menſium ſucceſſu illibatam ſemper præ ſe tulit valetudinem. Interim, quum odioſo fœcere convictis per aliquod tempus uti debuere, plena inde luctus & doloris, nulla vel ſane leviſſima data cauta, ſæpius acerbas proſundere lacrimas cepit, donec dein inter ipſum menſium fluxum poſt gravioſam iracundæ affectum delirium acceſſit maniacum, quod totas ſex hebdomadas inhærebat. Abhioc triſte hoc malum ſingulis ſex ſeptemve menſibus elapſis recrudescens hæc notas habet prænuſcias: ſentit ægra circa tempus cum menſtrua recurrit periodus, preſſoriam in pectore dextroque hypochondrio dolorem capitis denſiturnumque membranas in conſenſum rapientem; ſonitus imminuitur, & nunquam non venæ conatus vomendi, modo iræi, modo iſſi vomitus, materiam aque ſpumofæ & pinatæ flavæ ſimilem, eructantes; fluxu denum præſente iſte adortur paroxiſmus, qui variam ludit ſcenam. Mox enim demenſata, canilenis & tripudio exultans in cachinnos erumpit, nique verborum flumine delira proſert; mox triſtis demifſo capite ſolam terram inſpiciens ad obmutect; mox ab omni cibo potuque abhorret, mox collecto paulum animo de magna ſui conqueritur, imo nonnunquam tanta inſaniti vehementia, ut, niſi vi ſuorum cohibita, ſibi aliique manus ſit illaſura. Somnus præterea, qui admodum parvus eſt, terriſſica turbatur inſonniſſa, ſalvus eſt adſtriſtiſſima, nonniſi tertio quartove die dura ſcybala diſſicilliori expreſſione reddens, æcriæ exploratæ adnotas manus validiſſimo celerrimoque ſcietia pulſu, &, quod

*Delirium
iracundie
proſe-
dum ef-
fecit.*

*Delirium
maniacum
proſe-
dum.*

notari meretur, delirii post aliquot dierum intervallum circa vespertinum tempus semper graves solent esse accessiones, quæ ægra per extremorum refrigerationes, per dolores universi corporis tremulos & maculas sublividas in brachiis pedibusque subinde obvias præsentit. Ubi finita morbi periodo mens effrata ad se rediit, præter languores omnes artus occupantes nulla rationis memorieque labe per integrum intermissionis spatium animadvertere. Requisiti Medici pugnarunt vomitoriis, purgantibus, V. Sibus, foteris quoque fontibus Egranis, sed parum inde misera percepit utilitatis, nisi quod horum usu delirium serius paulo redierit. Ego igitur consultus quam maximum curationis momentum in præcavendis feralibus recidivis situm esse deprehenderem, primo omnium mentis tranquillitatem, reclamque vivendi rationem in hunc modum instituendam præcepi, ut ægra corpus frequentius, quam antea sub serena tempestate moderato exercitio moveat, parcioreque & leviori victu utens potui ordinario decoctum hordei exorticati, & Cornu Cervi raspati, cum pauxillo corticum citri vel cinnamoni substituat. Ad temperandam humorum acrimoniam infusum theiforme ex herba melissæ, floribus tilis & pauxillo corticum citri consecutum mane bibendum suasi. Nec ego deinceps irritum aquarum mineralium effectum fecere arbitratus, denuo per aliquot hebdomadam decursum fontem Egranum vel Schwallbacensem mane calide bibendum, atque balnea temperate calida ante decubitum applicanda sumen opere commendavi, quæ etiam circa instans mensium tempus, interposito pilularum balsamicarum usu, locum habere possent. Denique tam præservandi quam curandi sine egregiam præstitit opem mixtura quædam ex liquoris anodynii drachmis duobus, essentia castorei drachma una & spiritus salis ammoniaci drachma dimidia composita, quam in paroxysmo pariter ac extra ipsum sub lunæ mutationibus pondere x℥ guttularum bis de die vel somni vel cum pulvere antispasmodico ex aqua liliorum convallium sine vino parata exhiberi iussi. Pulveris hæc fuit formula: *Recipe Pulveris Marcionis, Cornu Cervi philosophice preparati ana drachmas duas, nutri purificati drachmam unam cum dimidia, succini preparati drachmam unam, cinnabaris serpulum.* Alvano denique victu potius lubricante aut passulis rhabarbariis, quam stercoribus purgantibus apertam servandam imperavi, adeoque Dei gratia effecti, ut paroxysmi rariores & mitiores accesserint. Nec dubitamus fore, ut sub horum remedium usu diutius protracto, ægra à misero malo liberetur omnino.

Epiëris.

Ex hac observatione illud notatu dignum occurrit, quod inter ipsum mensium fluxum, post vehementem iræ affectum delirii facta sit accessio: utpote experientia sæpius me docuit, graves animi perturbationes ante, sub & post menstruum fluxionem abortas pessimas passiones, imo deliria quoque, si caput natura debile existit, producere. Porro notabile est, quod recidivæ semper cum periodis mensibus in scenam producerent. Nam tota natura sexus æminini circa mensium fluxum ingentem patitur mutationem, dum motus vitales ad exteriora seu corporis peripheriam tendentes per spasticas stricaturas ad interiora potius convertuntur, ut exinde

totus sanguineus circulus inæqualis, & improporcionatus redditus, ad supernas & internas partes impetuose ruat; unde ingentium symptomatum origo. Quapropter, si in scæminis deliria, vel ipsorum paroxysmos avertere velit Medicus, netesse est, ut ad periodum mensium reflectat & circa id temporis opportuna remedia, quæ sanguinis circulum æqualem efficiunt & spasticas stricaturas conspiciunt, ut fere sunt balnea temperata & blanda diaphoretica cum nicrosis & antispasmodicis remixa, in usum trahat.

OBSERVATIO VI.

Militis præfectus, XL. & aliquot annorum, stature valde proceræ, sanguineo-cholericus ex familia prognatus, in qua plures mentis quadam alienatione laborarunt, in prima adolescentia strenuis compositionibus interfuit & vinum ad ebrietatem usque larga in quantitate ingurgitavit sed nihilo minus bene valuit. Jam vero dimidium effluxit anni, quum ob præmaturum uxoris formosæ obitum in summam conciperetur tristitiam, ut nullo admissio lamine omnem cibum recusaret & insomnis multas noctes transigeret. Sublequebatur perfecta mentis abalienatio, interdu cum summo furore, qui levi ex causa irriabatur, conjuncta, ita ut æger in vinculis contineri deberet. Amisso per venæ sectionem, ter intra mensem instituta, multo sanguine & datis nicrosis, hic fuit quidem remittebat, sed nunquam penitus cessabat. Missus ad me consiliis causa conquerebatur de pertinaci alvi obstructione & assidua vigilia, valde confusa sine ordine garriena, facies erat rubicunda & sanguine turgida. Ordinavi pediluvia temperata singulis diebus ante decubitum adhibenda & pulveres nicrofos aliquoties de die sumendos. Ad alvum apertam servandam præscripsi portionem mannarum & ut sæpius æger mane lac recens multum biberet. Loco potus ordinarii commendavi aquam puram fontanam, & caput imponendum suavi epithema, quod aqua rosarum, aceti rosarum ana unciæ duas, nutri purificati drachmas duas, & olei ligni rhodigutæ quoddecim habebat, tum felici eventu, ut intra mensis spatium æger perfecte convalesceret.

Epiëris.

Docet imprimis hic casus, quantum in hominum animis corporibusque sibi vindictæ morosis affectus, ob summum rei dilectæ desiderium in nobis abortus, ita prorsus, ut inde in insaniam ducantur homines, satis alioquin sanis & mentis composites. Quod quidem eo facilius evenire deprehendimus, si quis à parentibus natus est melancholicis, vel ipsa mania correptis. Sicut enim, experientia teste, mortis, quibus parentes conflictantur, plerumque traducuntur ad liberos; ita nihil dubii est, quin noster ægrotus naturalem quandam per navitatem obtinuerit cerebri debilitatem, & ad mentis morbos dispositionem, qua præsentem facile fieri potuit, ut data occasione, quæ in hoc casu diuturnus luctus fuit, in ipsam mentis alienationem incidere. Neque parum profecto ad capitis debilitatem contribuit potum spirituosorum abusus, quibus nihil est ad inferendam insaniam potentius. In curatione eo potissimum repleximus, ut sanguinis impetus à capite diverteretur, qui vero quum ab alvi obstructione nunquam non

fuſenſetur, primo omnium præſcripti laxans
mannatum & lac-reccus emulſum, quod in
præſenti agrotto inſignem alvum laxandi exſe-
ruit efficaciam.

OBSERVATIO VII.

Hæc illi hujus loci fœmina, xxx. & aliquot annos nata, vitæ otioſæ & libidinôſæ dedita, animo æque ac corpore optime ſemper valuit. At vero, quum marito per inopinatam mortem orbatâ fe coactam videret, ut propter rem anguſtiam domi parce nimis impoſſiterum viveret, plena inde luctus omne hominum confortium per longum tempus fugiebat. Sat diu itaque morore cum tacita iracundiâ juncto preſſa, gravem indecibat mentis alienationem; ſiquidem mox præter modum trifitiſ lucrymabat, mox ſumme hilaris ridebat & puerorum more vanis delectabatur ineptiis, mox effrenis & temerariâ cum adliſſimis alterari conabatur. In conſilium adhibebatur necum Medicus natione Gallus, & curatio in hunc qui ſequitur modum inſtuebatur. Præmiſſa venæ ſectiõe in pede ceteriſq; endavimus balnea temperata quovis die vesp̄i adhibenda, & epithema refrigerans in ipſo inſeſſu capiti cum lino duplicato adſpiciendam. Deinceps crebris dedimus, interpoſitis ad alvum apertam ſervandam lenioribus laxantibus, pulveres temperantes nitroſos, atque potiſſimam ſolam aquam fontanâ permiſiſſim. Et quum id anni tempus eſſet, ut occurreret matureſceret & ſale muriatico conficeretur, conſilium duximus, inter cibos crebris eodem commendare; & adjuſtiſ quoque ægra tam largâ quantitatē, ut nihil ſere amplius cibi ad ſuſtentandam vitam opus haberet. Inter hæc menſe circiter elapſo indices major aſſuebat ſpes convaleſcentiæ, quæ etiam brevi poſt, divina annuente grâtiâ inſuequebatur, ita, ut nunc integrâ tum animi tum corporis fruatur incolūitate.

dunt. Et profecto, si dicere debeam, quod res est, ego adhuc in diversis aliis mente perversis hos fructus deprehendi utilissimos, ut ideo adferere non pudeat, quod optimum sint inter cibos mente aegrotantium condimentum.

OBSERVATIO. VIII.

Juvenis, qui vix xv. l. ætatis annum attingit, temperamento prædicto cholérico - sanguineo, excitatus alias & prompti ad studia ingenii, per anni decursum profundiori meditatione in inveniendi machina, quam dicunt perpetuum mobile, dies noctesque defraudavit; à patre autem infideliatis ideo accusatus, & à proposito sub iussu studii admonitione avocatus, in tacitam mœstutiam incidit, quæ subitaneo incendii terrore adeo increvit, ut in furorem plane transierit; quædam varia nunc de inventis suis magna & præclara jactat, terrificis noctu insonantibus agitaturs mane horribilibus & inepta, quæ vidisse se ipse imaginatur, longa ferie narrat; jam se paralyticum, lumaticum vel à diabolo oblesum ipsumque dæmonem pronuntiat, & dicit admodum exaltationis evomit; jam mutatis in manifestum moribus ardentissimas ad Deum preces fundit perperuis suspensius ingemiscens. Præterea febrili puluum celsitate & admirando auscultu acume gaudet. Cibum & potum satis qualem bene appetit, nec officio suo alius deesse animadvertitur. Sed, quod male sperari jubet, est quod malum sine altera reque continuè seruat, nec insignem habeat intermissionem. In tali rerum statu ego consilium venam primo pedis, dein sublingualem aperiri, & polivius moderate calidum ascribi iussit iussu, unde furoris vehementia mirum composita videbatur. Dein operæ pretium fecerunt pulvères knitter rutrofi camphora remixti, quos circa somni tempus assumere æger debuit; nec dubio, quia vis morbi his denum remediis sit oblectura.

Debitum
 summi auge
 et munitur
 summi capite
 munitur.

Epicrisis.

Nihil potest magis sanitati esse infensum, quam subita quædam mutatio, qualem in nostra ægrotâ accidisse deplorandum est, utpote quum sanum vite genus simul & semel cum valde misero commutandi necessitas fuerit. In curatione ex voto obtinenda primo omnium studium, ut impetuosis sanguinis cursus à capite ad inferiora convertatur, quod optime præstimas venæ sectione in pede administrata, & balneis aquæ dulcis, utpote quibus nervosæ imi ventris partes spâsio confictæ emolliantur, & summa quoque cutis, quæ frigore testis, confictione affecta est, relaxetur, ut revocato sanguinis itinere ad habitum corporis, liber ipsi circuitus per universum corpus concilietur. Quod atinet peculiarem cucumerum sale conditorum effectum, de hoc ita iudicandum arbitror. Acidæ ejusmodi salita vegetabilium sensibiles & membranaceæ corporis partes facile irritant & vellunt, non sere videmus in tulli, ubi nervos pneumonicos ad tullum continuo stimulant; quæ veritati omnino videtur consentaneum, ut cursum sanguinis magis promoveant, quam impediant; qui vero quum in melancholicis nonquam non tardus & debilis, maxime per caput, observetur, opus omnino habet aliquo stimulo, quem dicta vegetabilia optime & sine noxa ad-

Videmus ex hoc casu, quantum profundæ meditationes ad caput debilitandum obtineant potentia, ut quidque graviorem exinde morbum, imo deliria quoque pertimescendi rationem habeat, maxime si aliæ et hæreditariæ causæ accesserint. Admissæ æger largum cibum, cui dissolvendo et in bonum chyllum et sanguinem transmutando menstrum illud salivæ, sine dubio nimis acre infectum, vix par fuit, ut nihil dubii sit, quomodo morbus, ut omnes aliæ chronicæ passionēs multum inde foveatur.

Plura exempla legantur in *Consult. med. Sect. I. Casus XXXIII. usque XXXVIII.*

C A P U T IX.

De virium lapsu & animi deliquiis.

THESES PATHOLOGICÆ

§. I.

Si ulla in disciplina medica doctrina clariorem meretur evolutionem, ea certe est, quae de corporis humani viribus agit & causis; siquidem, omne, quod naturae inest robur & ener-

Previous to
beginning any
excavation
work, the
owner.

gia, qua vite animique pariter ac corporis consistat integritas, qua morbi tum accensur tum sanantur, qua ipsa denique mors avertitur, unice in viribus, quæ determinata quadam motus efficacia se exerant, consistere animadvertitur. Sicut enim robusta natura corporisque firmum habendum est illud, quod integris viribus instructum, non tam facile à causis externis lædatur, læsum vero vel suo ipsius robore sine insigni medicinæ ope sanatur: ita è contrario imbecillis naturæ indicium est, si quis ob virium infirmitatem variis obnoxius aggritudinibus, ex lilem, à medicina non adjutus, raro admodum emergit. Quod si dein morbos inspicimus variisque eorum decursus, simili modo in solis viribus omnis salutis spes videtur posita; quæ enim ubi subito ditiusque succumbunt, de vita ægroti periclitari certissimum est. Quin denique ipsam, quæ morbos sæpe comitatur, malignitatem maximam ex parte in hoc virium lapsu consistere deprehendimus, ita prorsus, ut ex debili hoc statu ad ipsam mortem aditus pateat facilissimus, utpote quæ nil nisi plenaria virium, à quibus vitales in homine motus pendent, cessatio est.

§. II.

Optimam medicorum de causis ætiam.

Quum itaque tanta virium in nobis sit necessitas, ut in corpore tam suo conservando, quam morboſo perſanando nihil omnino sine illis Medici valeat; sæpenumero mirari soleo, cur in tanta bonorum auctorum multitudine, tantæque medicinæ luce, quæ novo quotidie splendore prodit, tam pauci exſtant, qui utilissimam hanc in re medicâ doctrinam paulo accuratius explanassent. Equidem plures hinc inde in Medicorum libris occurrunt de virium causis opinioniones, quas alii, qui omnes corporis tam voluntarios, quam involuntarios, vitales & mechanicos motus ad alius quoddam principium referunt, seu effectum animæ considerant; alii, qui robur & vim motricem solidorum, qua fluida reguntur, ab æthere-æthereo-clasſice indolis materia mobilissima in sanguine contenta deducunt, pro stabilenda sententia sua contraria plane argumenta proferunt; attem, quum nudis hisce nonnibus & sententiarum divortis rem ex merito nondum exhaustam evolutionem existimem, nostrum de eadem æquum rectumque iudicium in præſenti tractatione, ubi de virium defectu animique deliquiis acturi sumus, pluribus infra suppeditabimus.

§. III.

Vires salutares & præſentis ut de præſentis.

Ante vero quam specialiorum hujus theſis suscipiamus explicationem, è re fore putamus, primo omnium discipere, qualis virium ad naturam firmam æque ac infirmam constituendam debeat esse conditio. In quo quidem perſicendum, tenendum, quod, licet omnes in nostro corpore functiones tum animales, tum vitales & naturales unico solidorum ac fluidorum peragantur motu; minime tamen, sicut in ceteris rebus corporeis, ab ipsius efficacia & à magna movendi potentia ad insignem virium copiam & abſque dependentem fluiditatis integritatem concludi debeat. Etenim, quum à sapientissimo conditore Deo ita corporis humani constructa sit fabrica, ut varius ad sanitatem necessarius certus tantum motuum intersit numerus, certa mensura; facile patet, cum solum robustam & bene valentem naturam esse dicendam, ubi motuum nec nimis excellens, nec nimis deficiens,

sed valde temperata æquilibrisque advenit proportio, cum illa è contrario corpora imbecillibus sunt adnumeranda, quæ ex levi causa externa ad perversos motus facile concitantur. Cujus adſenti veritas vel exinde plenius poterit intelligi, si effrenes & ad convulsivum usque gradum auctas cordis & arteriarum, reliquorumque membrorum agitationes perpendimus; utpote quæ ob summam, quam arguunt, motuum efficaciam nulla unquam ratione pro salutari & sanitate firmandæ appropinquo apto robore haberi possunt, sed maximam potius virium jacturam, imo mortis periculum haud raro prænunciant.

§. IV.

His prælibatis ad virium naturalium subiti lapsus considerationem propius accedimus, cujus tria præcipua dantur genera. *Primus gradus* in notabili virium corporis remissione consistit atque his postillimum cognoscitur criteriis: si insignis & infueta corporis lassitudo membrorumque ad voluntarios motus subeundos observatur inertia, si sensuum torpor, appetitus proſtratus, inquietudo & circa præcordia anxietas, debilitas pulsuum & raritas extremorumque refrigeratio adeſt & gravitas. *Ather*, qui priori major est gradus ob majorem corporis animique virium defectum dicitur lipothymia, quæ cum faciei, labiorum & genarum pallore omniumque sensuum stupore, ut, quid cum ipsa agatur, plane non sentiant ægroti, adoriatur. Tum quoque oculorum claritas, obducitur quasi tenebris, obſcuratur, arteriæ adnotant manum exiguis feriant pulsibus, corpus proſtritur & partes extremæ naturali deficiente calore intensius frigent. *Tertium* denique, sed postillimum gradum consistit syncope, quæ homines correpti alicui animi corporeique viribus deficiunt, ut mortis imaginem ſilant; siquidem omni sermonis usu privati subito coeunt, alicui quasi sopore oppressi abſque convulsionis aut tremoris apparentia immobiles jacent; respiratio & pulsus intercipiunt, artus refrigerant & collabuntur, facies illi Hippocratica & copiosus sudor ad tactum frigidus circa tempora erumpere deprehenditur.

§. V.

Superatis tam lipothymia quam synopes accessibus sensus inter alta suspiria paulatim redeunt, cordis motus restituitur; ideoque pulsus, qui antea valde debilis aut plane absconditus erat, nunc vegetior erectiorque redditur, anxietates evanescunt, in partes extremas calor redit, facies contracta & pallida explicatio fit & rubicundior, imo & reliquæ functiones suppressæ sensim sensimque eriguntur, ut, qui pridie mortui habebantur ægri, nunc integra frui sanitate videantur, nisi adhuc de insigni artuum corporisque universi lassitudine & imbecillitate querantur.

§. VI.

Utut autem subito & præter omnium opinionem gravia hæc mala accedant, sunt tamen, quæ illorum adventum prænuntiant symptomata, quorum postillima sunt: totius corporis languor & insolens virium infirmitas, vertigo, aurium tinnitus & substantia coloris in facie permutatio. Præce sunt quoque in nonnullis oscitationes, pandiculationes & circa præcordia anxietates, cum pulsu inæquali ac horripilationis sensu; quibus nonnunquam abdominis

anims à flatibus distensiones & borborygmi jun-
guntur.

§. VII.

Ex dictis jam haud difficulter colligitur, quo
modo præceptis virium lapsus animique deliquia
ab aliis se passionibus distinguant & à medemi-
bus cognosci possint ac debeant. Differunt enim
primo omnium ab epilepsia, in qua quidem le-
viores animi defectiones antecedunt, quam cor-
poris moles convulsivis agitur moribus & con-
tractionibus, quæ tamen ad lipothymiam usque
nunquam adfcedunt. Differunt deinde ab opo-
plexia, ubi sub sensum tam exteriorum quam
interiorum abolitione arteriæ satis adhuc fuerit
pullant & respiratio, licet ægerima, cum fenore
remanet; quæ phenomena in simplici animi
deliquio non videntur. Discrepant denique à suf-
focatione hysterica. Io hac namque eximia qui-
dem sensum adveniens perturbatio, sed fau-
ces simul summe angustiantur & laqueo veluti
strangulantur, arteriæ foribus agitantur motibus
& facies vivido imbuta rubore conspicitur; quæ
omnia tamen contrario plane modo se habent in
anims deliquiis, uti videmus, si syncope, quod
sæpius accidit, prædicationi uterinæ jungitur.
Tum enim dictiorum symptomatum inopinata fit
immutatio.

§. VIII.

Quod attinet subjecta hæc affectionibus præ
ceteris obnoxia, attenta nos docet, experientia,
eos potissimum homines in eisdem incidere, qui
aut phlegmaticæ & torpidiorum obtinent natu-
ram, aut ob teneriorem vasorum & fibrarum
texturam habitus corporis sunt spongiosi sangui-
neque & succis pleni, nec non qui mollior in
otio educati labores nulli ægerime ferant & à
levi causâ externâ ab aëris vel frigidiore vel ca-
lidioris temperie, à medicamentis, quin alimentis,
vel solo ingrato odore facilius alterantur. Et quam
ingens semper corporis inter & animi functiones
à sanioribus Medicis adnotetur conspiciatur,
nec illos ab hæc affectibus immunes deprehendi-
mus, qui ad impetuosis & præcipientes animi
commotiones, ad iram, impatientiam, metum,
variaque confusas imaginationes proni existunt.
Unde jam in propatulo est ratio, cur respectu
ætatis præ juvenibus pueri & senes, & si se-
xum respiciamus, foeminae magis quam viri ma-
gno virium defectui & deliquiis sint expositæ,
quæ eo certius eveniunt, si foemina utero gerunt,
nimis tum per mensium tum lochiorum fluxum
hæmorrhagis debilitatæ sunt, vel difficili partu
laborant.

§. IX.

Quod si nunc ad ipsam causam animum ad-
vertimus, hanc in sanguinis ejusque motus vicio
ponendam esse, nemo saniorum Medicorum est,
qui in dubium vocabit. Quemadmodum enim,
si sanguinis temperati & sufficientis in singulas
partes liber æqualisque influxus & hinc debi-
ta liquidi spirituosique per omnes nervos distributio
fuerit, omne virium robur, per quod functio-
num, sive animalium, sive vitalium & natura-
lium vigorem intelligimus, quam optime con-
stat; ita è contrario, ubi virium, quæ per im-
minutas omnis generis functiones se manifestat,
insignis animæ & ventris dejectione, ibi liquidi tum
arteriosi tum nervosi virium subesse rectissime
concluditur. Jam vero rursus in physiologia me-
dica satis superque monstratum est, quod om-

nium fluidorum per corpus progressus & in or-
gana influxus à solo corde, quod primum in no-
bis movens ultimamque moriens, seu suprema
illa machina est, quæ motu suo omnes reliquas
animat partes, urice dependeat, quare nihil du-
biū est, quo & corporis prostrationis & animi
deliquiorum causâ ab ipso cordis motu vel im-
minuto, vel profus cessante recte deducenda ven-
iat. Quæ quidem in re plenius confirmatur, si
rite perpendimus, essentialē & characteristicum
lipothymia & synopes signum præbere pulsum
valde exiguum, vel plane interceptum, utpote
qui cordis motum indicat luculentissimè.

§. X.

Quum itaque à cordis motu tanta, si non *Cardis
structura
anatomica*
omnis, in nobis dependeat, haud supervacua-
neum erit, insissimum hunc motum secundum
causas suas naturales concinne quidem sed accu-
rate exponere. Cordis substantiam musculosam
esse non modo jam vetustissimi Hippocratis
sententia, verum etiam omnium, qui nostra æta-
te incluserunt, anatomicorum adiectio est. Quod
si enim ea, quæ ad musculosam fabricam ullo
modo pertinet, rite pensamus; omnia profes-
sio in cordis structura simili modo deprehendi-
mus. Adest hic tendo satis validus in basi cordis
vasa ciogens, qui uti in omnibus musculis, ita
& hic principium motus atque finis existit, cu-
jus progenies tum vena cava, tum inprimis ar-
teria magna rectissime statuitur, in quem dupli-
cis generis fibræ tam mirabili dispositæ ordine
inscuntur, ut musculum biventrem apissime
continuant. Fibræ enim exteriores in modum
cochleæ conum involvunt in oppositi lateris
tendinem dextrorsum, interiores inverso in-
feruntur ductu. Quid? quod præter hæc commu-
nerviculis veniculo propriæ sunt fibræ, qua-
rum internæ item contrario modo procedunt
aque pro validiori sanguinis in univerfum cor-
pus ejusque maxime remotas partes propulsione
sinistro ventriculo & copiosiores & robustiores;
dextro vero præ sinistro eique minori ventricu-
lo in vicinis tantum pulmones flaccidæ rario-
resque obtingunt. Harum præterea fibrarum
idem cum aliorum musculorum fibrarum motus est
atque contractio, quæ in abbreviatione consistit,
ut tantum in latitudine acquirant, quantum in
longitudine amittant, ideoque semper conus basi
fiat proximior; unde etiam non tantum externe,
verum etiam interne præcipue tumor observatur.
Hinc cum auriculæ ventriculorum contrahuntur,
parietes se invicem tangunt, & ita contentum
fluidum expellunt. Nervi quoque dein omnibus
musculis animam vigoremque largientes in ba-
sin cordis vasorumque radices, quas tendines
cordis esse jam ante dictum est, implantati
sunt octavi scilicet & intercostalis paris lursuli,
ut de arteriis venisque coronariis, quæ magna
copia per musculosam cordis compagem distri-
buitur cordis motum egregie adjuvant, nihil dica-
mus.

§. XI.

Moveri itaque cor ipsa ejus fabrica ipsique *Cardis mo-
tus duplex
systoles &
diastoles.*
sensu fidem faciat. Duplex autem est motus
dilatationis, quæ præcedit & à Græcis diastoles
nomine insignitur, quæ cordis ventriculi disten-
duntur, & fibræ parietes versus elongantur, ut
sanguis ex auriculis in eisdem influere possit, &
contractionis, sive systoles, quæ fibræ contrahun-
tur & instar machinæ hydraulicae sanguis in cana-
les

nales arteriales & ex his in venas, ex his autem rursus in auriculam dextram urgetur, ut hac ratione circulatio perficiatur.

§. XII.

*Diastole
aucta de-
greditur.*

Hæc dum medicamur, dubium quoddam non adeo exigui enascitur momenti: num diastole cordis a sanguinis illabentis vel dissidentis copia promoveatur. Neque tamen, a solo sanguine simplicem & spontaneam hanc dependere restitutionem, arbitramur, eo quod manus fortiter prementem æque ac systole eludat, quale quid a sanguinis impetu fieri haud suspicandum est, maxime quum etiam evulsa omni liquoris vacua pulsuum corda diastolen non minus quam systolen diutius adhuc exhibere animadvertimus. Multo magis illam tam à fibrarum hujus mirifici musculi diversis ordinibus quam à liquidi subtilioris elastici, quod nervi vehunt, sanguinique spirituosius influxu oriri probabile est. Quod vero nervum fluidum in cordis fibras infuset, vel notissimo WILLISII & LOWERI experimento constat, quo nervis in cervice oclavi parvis dissectis & his qui a flexu intercostali oriuntur ligatis, sanguinique in musculotum cordis substantiam intercepto cor omni motu destituitur. Ut adeo certissimum sit, quod tam ipse sanguis motu intestino calido & particulis æthereo-elasticis imbutus, quem liquidum nervorum hunc dilatationis ædipn egregie adjuvet. Id quod vel ex hoc experimento clarius elucescit, quod mediante calore pulsus cordis in animali deficiens, si aqua calida fovetur, ad momenta revocari possit.

§. XIII.

*Objectio-
nes contra
motum
cordis re-
soluuntur.*

Quæ omnia licet tam clare perspicueque pateant, ut in dubium vocari nequeant; sunt tamen nonnulli, qui hanc de motu cordis doctrinam, quæ illud primum movens statimur, impugnare audent, existimantes, embryoni jam prius quam cordis absoluta sit fabricatio, punctum quoddam siliens cujus cordis inesse rudimentum. At vero aliam longe rationem esse iudico animalis forasandi & adhuc imperfecti; & formati omnibusque suis partibus instructi & in lucem editi, ut ideo ab uno statu ad alterum argumentatione procedere vix liceat. Huic enim bullule cujus compendio inclusus est spiritus ille architectonicus, qui motui quidem per se citra multa organa expandendo & quaquaversum partes extra partes fabricando sufficit, in animali vero perfecto normali organorum beneficio perficitur.

§. XIV.

*Defectus
syncope et
apoplexia.*

Exposita sic cordis structura & naturali constitutione evolutoque genuino ejus usu & officio: facili nunc via est ad præternaturalem statum pernosendum & ad verum tam lipothymie quam syncope, quæ omnis avi Medicorum consensu cordis vitio totum nititur, definitionem sistendum. Est itaque *syncope motus cordis ad tempus suffraginatio cum ingenti virum & tam animi quam corporis facultatum defectu, ab impedito, vel minus sufficienti liquidi spirituosius per nervos & sanguinis probe temperati per vasa coronaria in musculofam cordis substantiam influxu dependens.* Neque multum distoremtem explicat d. Summo. em altera animi deliquiorum species lipothymia, utpote quæ nisi gradu, dum non in proflus sublatum, sed tantum ni-

mis debili cordis motu consistit, à syncope nihil distat.

§. XV.

His præmissis, videamus nunc, quæ ex causis mediatis ad similes hosc morbos inducendos suum conferant symbolum. Quum vero, ut satis ex superioribus liquet, proxima deficientis, vel plane cessantis motus cordis causa in denegato, vel minus recte se habente fluidi nervosi & laudabilis sanguinis influxu contineatur, sequitur, ut ad duo hæc momenta animum positum in adiicimus. Ita primo omnium certa experientia fide constat, eos, qui capitis nervosque generis imbecillitate laborant, qui dolores graviores, vertigines auriumque tinnus cum frequenti coryza, gravidine, oculorum caligine & somno turbulento patiuntur, ob liquidum, quod ex cerebro in nervos dispergitur, subtilissimam pravamque diastolen non modo virium summo languori, sed & ipsis animi deliquiis corripit facillime.

§. XVI.

Nihil autem prope ex omni causarum serie vehementius celsitudo nostros inducere morbos valet, quam graves animi perturbationes, præsentem terror panicus, metus, & tristitia. Quamvis enim motus vitales & mechanici, cujus generis sunt cordis & arteriarum aliorumque humoribus tum secernendis, tum excernendis dicatorem canalium, nec non ventriculi & intestinorum motus, à principio in nobis sentiente & intelligente, quod animæ nomine venit, directe & proxime non dependant, sed motus potius voluntarii ab eodem, licet modo nobis incognito, dirigantur; id tamen attenta nos docet observatio, propter eximiam, quæ voluntaria & involuntaria functiones intercedit harmoniam, miram animi affectuum in moribus nostri corporis vitalibus perventendis esse efficaciam. Hinc, si terroris, qui vitali motuum economie insensibilissimus est, agenda modum accuratius inspicimus, ita ipsum deprehendimus comparatum, ut partes externas confingendo nimiam sanguinis ad cor & adnexa vasa congestionem inferat; unde pressio, ut aiunt, pede extremorum refrigerationes, ingens artuum gravitas ac languor, circa præcordia anxietas, cordis palpitatio, & magna spirandi difficultas cum pulsu parvo & contracto sequuntur; quæ omnia eo certius accidunt, si abundans sanguinis copia peccaverit. Nec profecto minor formidinis & ob instans grave periculum tristitie in corpus nostrum potentia est; quandoquidem liquidi nervosi in singula motuum organa influxum minuendo æqualem sanguinis progressum maxime retardat, & quo minus spirituosius ejus portio recte evolvatur, impedit; ut ideo haud mirum videri debeat, si ingens animi corporisque virium dejectio inde emergat, quæ longe gravior est in subiectis languidis aut à quacunque causa, ut prægresso morbo, jam antea debilitatis.

§. XVII.

Posthæc haud pauca supersunt earum rerum, quæ non naturales appellamus, quæ ad affectus nostros contribunt. Ex quibus primum sibi vendicat locum incongrua victus ratio. Sicut enim alimenta bono succo referta & deceni quantitate assumta sanguini bono & lymphatico, qui viribus pabulam suggerit, penetrando aspi-

Causæ mediæ sunt præpositæ morbo.

Animi affectus.

Percepta vitiorum ratio.

apta existant; ita è contrario cibi crudiores & qui parum præbent nutrimenti, vel ipsa inedia diutius protracta ad virium defectum & animi deliquia plurimum affertur momenti. Præter vitium, aeris quoque temperies causam nostris malis præbet antecedentem: quæ si frigida nimis & humida, aut intensius calida multique impuris exhalationibus repleta est, corporis vigorem mirum in modum ledit. Pertinent huc pariter assidue vigilie diurnique & duriores labores, quibus ob continuam solidorum & fluidorum actionem spirituosæ & subtiliores partes dissipantur sanguinique massa intemperior redditur, ut exinde, experientia teste, omnes in nobis functiones languescere incipiunt.

§. XVIII.

Frequentissime porro animi commotio deliquia, si spachelosa in partibus vel externis vel internis adparet corruptio, qua vitali motuum œconomia nihil datur perniciosius. Id quod non modo morbi maligni & contagiosi, ut petechiæ, dysenteria, febresque pestilenciales, verum etiam chronici, quales potissimum sunt scorbutus, cachexia & hydrops suo comprobare exemplo possum, ubi, ingruente putredinosa corruptela, mox omne naturæ robur cum cordis motu valet. Nec dissimile edunt efficaciam opiata & narcotica improvide adhibita, quorum operandi ratio in eo præcipue versatur, ut effluvia sulphurea mixtionis & mobilissimæ fluidorum substantiæ inimicis hæc ipsa ita coartant, ut munere suo secundum naturæ leges amplius fungi vix queant. Sed præter hæc quoque, quod mirandum est, suavitentia, naturæ alioquin gratissima, feminis hystericiis, aut ab alio quocunque morbo debilitatis corporibus eo ulque adversa deprehenduntur & nociva, si ex eorum usu omnia in pejus ruant symptomata & ægri syncope correpti exanimis quasi in terram cadant. Cujus notabilis effectus ratio, nostro quidem iudicio, in eo videtur posita, quod fortiori ejusmodi odorifera vim fluidi nervi elasticam à prioris morbi atrociam jam suis imminutam, vaporosa indole sua magis magisque superimant, haud alio modo quam calidiora, quæ pro diversa succi nervosi & fibrarum constitutione valde differentem, & nunc bonum nunc malum producant effectum.

§. XIX.

Nec dein negligenda sunt ipsa venena, vel validiora causæque indolis purgantia & emetica, quæ ob valentiores, quos in univerto partium nervosarum systemate maximeque sensibili intestinorum canali crispando contorquendoque concitant spasmos, æqualem sanguinis & subtilissimi fluidi in singulas partes influxum impediunt adeoque ingentem, quin sæpius lethalem virium lapsum accerere valent. Et ex eadem causâ fieri observamus, quod insignis & ad syncopen usque aucta animi defectio morbos cum immensi dolorum ferocia spissos haud raro excipiat, quæ quid pariter possi graviores iracundiæ affectum minus insolitum est; unde hanc syncopes speciem veteres medicinæ auctores peculiari nomine cardiacum vocare consueverunt. Hujus namque affectus licet ex sit natura & indoles, ut exitialem vim suam in ductus bilarios præcipue exerat; fieri tamen non potest, quin ob exitium, qui hos ipsos cum ventriculo, pulmonibus & corde, propter par nervorum oc-

tavum & commune par vagum, intercedit consensus, simul omnes hæc partes sensibiles graviter spasmo afficiantur.

§. XX.

Sæpiissime non minus animi deliquis conflantur, quorum vires à prægressis nimis hæmorrhagiis & quibusque forsioribus excretionibus debilitate sunt. Tali ratione sæpenterum adnotare mihi licuit, homines venere immoderatus usum sensum in lipothymias, quin synoplicas incidisse affectiones. Et quid frequentius, quam à copiosis per sudorem & alvum evacuationibus, improvisis venæ sectionibus, cruentis vulneribus aliisque nimis sanguinis profusionibus, maxime si non præsentanea ope succurritur, eadem mala oriri. Nec deficit ratio: quum enim his rebus non modo sanguinis subtilior portio, quæ virium elementum constituit, exhaustur, sed & præcipue ipsa fluidorum moles immittitur; haud mirum est, si cordis ceterorumque valorum dilatatio, quæ cum systole alternare debet, inde impeditur, adeoque ipse cordis motus intercipitur; quo cessante formalis mentis defectio ratio adesse deprehenditur. Quod eo crebrius certiusque incidit in subiectis teneriori constitutione præditis, aut in sua erectio diutius repositis. Tunc enim sanguinis ad caput directio longe magis præcinitur.

§. XXI.

Pari ratione motum cordis debilitare summumque inducere languorem valet nimia repletio, quæ sanguini spisso & viscido in acceptis ferenda est, quatenus hic per angustiores valorum coronariorum canaliculos difficilius progrediens ibi coarctatus & cordis & valorum systolen imminuit. Nihil autem, quod per plurimum constet exemplis, ad lethalem syncopen magis disponit, quam polyposa humorum concretio cavitatibus cordis & contiguis valis adhzrens. Hæc enim concretamenta dum mole sua obstruente sanguinis per univærsu corpus circuitum suferunt; necesse est, ut, non remoto ejusmodi repagulo, lethalis fiat exitus.

§. XXII.

His expositis superest, ut nostrorum affectuum prognosin ad rectum de eventu salutari & noxio iudicium ferendum subnectamus. Hic notari maxime velim, pro naturarum & causarum diversitate & periculum quoque multum variare. Ita, qui teste HIPPOCRATE *apbor. 41. Sect. II.* sæpe fortiter & sine manifesta causâ dissolvuntur, repente moriuntur. Subest enim plerumque polyposum cordis & pulmonum vasis firmiter impactum coagulum, quod dissectis cadaveribus reperire licet. Lethiferam quoque ut plurimum syncopen observavimus, quæ post partum laboriosum, ut semine ab imprudenti obstetrice ad intemperatissimum parturienti conatus adhortate nimium delassatur, & immoderatum sanguinis per lochia patiuntur profluviu, haud raro subsequitur, quæ correptæ copioso sudore frigido cum extremorum frigore perfunduntur, auram frigidam expirant, pallido faciei colore imbuuntur & nullis plane remediis ad vitam revocari possunt. Neque periculo caset illa syncopes species, quæ feminis strangulatione correptis supervenit, unde ipsas sæpe pro mortuis habitas & sepulcræ traditis novimus.

§. XXIII.

Spachelosa
partis cor-
poris cor-
ruptio.

Omnia re-
proba
oponia
narcotica
&c.

Venena,
purgantia
& emetica.

Humor-
ring a &
quæque
intra ex-
creta.

Sanguis
crassus &
polyposus.

Sicut pro-
gnosis
multa &
sanguis.

§. XXIII.

Qua ubi-
mus recre-
fimus.

Porro quoque ingens virium in morbis malignis, ut acutis febribus, prostratio & inter initia statim facilis in animi deliquia, sub statione maxime erecta, proclivitas in discrimine vitam poni, signum certissimum est. Nec boni ominis est sola infusa animi defectio, diffidentia & menti altius infixa moris formido, licet animus præterea tranquillius beneque compositus sit, præsertim si in acutis jungitur delirium, & languida respiratio cum notabili pulsuum vel parvitate vel tremula palpitatione. In variolis quoque confluentibus ubi ab intolerabili ardore & dolore, suppurationis tempore lipothymia, quod sæpius fit, occurrat, ægri, præsertim sub situ corporis erecto in præsentissimo vitæ periculo versantur. Tum enim mox totum corpus refrigeratur, cutis constringitur, pulsus disparare & mox lethiferæ succedere convulsiones solent. Deinceps in homine ob alias causas jam debilitato post vehementiorem iram, aut fortius emeticum vel purgans exhibitum, syncope suborta, nisi in instanti convenientibus succurratur remediis, lethalis evadit. Quod si denique in pueris a vermibus nervosæ ventriculi tunicis lancinantibus syncope enascitur, plerumque functa est; & vidimus brevi ante mortem tempore vermes è ventriculo prædeuntes moriuntur.

§. XXIV.

Prognosis
salutari.

Animi & virium defectio, quæ hysteriis & hypochondriacis jungitur pathematibus, ubi a flatibus ventriculum nimis distendentibus sanguinis ad cor & pulmones fit regurgatio, curatio locum adhuc reliquit. Ubi etiam a causa externa, ut nimio conclavis æstu, balneo immensis calido, vel nimia linguinis a vena secta detractio, præsertim in foemina & pueris corporis insignis languor vel præcepsum animi virium suboritur lapsus, non adeo timendum est. Ex in genere notandum: quo levioribus causis & morbis animi deliquia succedant, eo minus alunt periculum.

THESES THERAPEUTICÆ.

§. I.

Indicatio-
nes curatio-
nis.

Quod atinet curationem, hæc duabus potissimum indicationibus absolvitur, quarum prima est, ut in ipso paroxysmo motus cordis, qui caloris vitalis omniumque virium fons existit, per convenientia & efficacia remedia citissime restituatur; altera, ut extra paroxysmum causis tollendis accommodata invenire remedia, atque recursum periculosa affectionis impedire studeamus.

§. II.

Quæ in pa-
roxysmo
propter ex-
acta.

Præmæ itaque indicationi ut satisfiat, in acceptione mali ægri in convenienti situ eoque nec nimis demisso, nec nimis elato in loco sereno, temperato ac spatioso servare decet; dein ad influxum spirituum invitandum remediis externis penetrante virtute prædictis partes sensibiles irritare & animare convenit. Quo fine præ ceteris prodest, si aqua frigida tota facies superfunditur, labia sale communi fricantur, naribus potens acetum cum balnatio viæ seu aqua apoplectica adplicetur, vel ipsis sal volatile Anglicanum, quod nil nisi sal volatile ammoniaci cum

oleis cephalicis rutæ, menthæ, lavendulæ imprægnatum est, adhibeatur. Nec quoque de nihilo erit oculorum palpebras cum aliquot aquæ spirituosæ seu balsami viæ guttulis illinire, totamque pectoris regionem & reliquas partes extremas panis calidis aqua quadam roborante imbuis foriter fricare.

§. III.

Quod si demum his adhibitis ad se redire incipiunt ægri, interna quoque remedia refocillandis viribus dicata exhibere convenit. Hoc nomine præclarus usus est vinum optimæ notæ, maximeque vetus Rhenanum, quod omnium fere virtutem superat longissime. Neque egregio effectu destituuntur aquæ spirituosæ & aromaticæ, ad quas præcipue aquæ cinnamomi liorum convallium, rosarum, melissæ, corticum citri, aurantium cum & sine vino parata debent referri.

§. IV.

Quicumque extra paroxysmum medela subvenire & novos mali insulas avertere cogitat Medicus, diversas causas probe prius cognoscere, iisque amolendis accommodare debet præsidia. Ita, si a særvia dolorum & graviori iracundia affectu syncope originem repetit, præstantissimum serviet levamen blanda anodyna, maxime si cum aquis anæstheticis, non adeo spirituosis, sed aliquid simul anodynæ in sinu foventibus propinquantur. Ex illis autem summæ efficacis est liquor noster anodynus mineralis aliquot olei macis guttulis imprægnatus, vel cum duabus essentia calidiori partibus remixtus. Spectant huc quoque laudanum Sydenhamii & pulveres anæsthetici, ut Marchionis cum uno alterove grano castorei vel theriacæ coelestis permixti; quorum remedium usum tutissimum deprehendi. Ubi ab humore acido bilioso in primis viis stabulante partemque nervosam arrodente, quod in hypochondriacis frequentius ulu venit, syncope cardiaca nascitur, in usum vocandi sunt pulveres absorbentes, qui ex conchis preparatis, matre perlarum, corallis, lapidibus cancrorum, unicornu fossili, crysallo montana, additis quibusdam olei de cedro guttulis optime consiciuntur, quibus, urgente æstu præternaturali, aliquot nitri purificati grana pro dosi adijci possunt. In syncope hysterica & hypochondriaca clysters & medicamenta ex galbano, castoreo, aliâ ferida, sagapeno & myrrha confecta convenienterque adhibita omne in curatione absolvent punctum.

§. V.

Quod si vero sub nimia per alvum & vomitum evacuatione a validis purgantibus & emeticis excitata animi invadunt deliquia; tum præter theriacalia, anodyna & anæsthetica lac calidum, vel decoctum hordei cum amygdalis, vitello ovi & croco paratum & sufficienti quantitate haustum virtutis suæ demulcente mirabilem præstat efficaciam. Ubi etiam a veneno caustico graviore periculi metus est, eadem remedia eximiam spondent opem, maxime si cum largiori olei amygdalarum dulcium expressi, vel olivarum copia propinquantur. In morborum malignitate, ubi ob occultam putredinem animi urebit defectio, mixtura, quæ anæsthetica & bezoardica pollent virtute, omnium fuit præstantissime: quales consici possunt ex aquis car-
dis

dui benedicta, scordii, cinnamomi sine vino, ro-
sarium, mellificatrat, mixtura simplicia, aceto
vini & syrupo acetosificati citri, quibus pulvis be-
zoardicus. *Semina*, vel coisler iusta proportione est
adificandus. Quod si vel sanguinis nimis inopiam
à nimia ejusdem profusione inducunt vires con-
sumae sunt, eisdem praeter temperatiora analepti-
ca, maxime omnium reficere decet alimentis nu-
trientibus & succos restituuntibus. Quo nomine
summam meretur commendationem juscula
carnium gelatinosa vitulina, bovinae gallicae
veteris per decoctionem cum raluca corvi, cervi,
tales citri, pauxillo macis & aliqua vini portione
in olla cooperta parata; quo etiam periculi potus
fucellae. Denique solum vinum generosum &
annorum parca manu datum in tali casu omne
absolvit nunquam.

CAUTELÆ ET MODI PRÆACTICA.

6. I.

Interest certe quam maxime ad curationem provide & ficure adornandam, ut inter lassitudinem gravatam seu oppletivam, quæ ab humorum plenitudine & expansione obtingit; ac inter debilitatem defectivam, quæ à boni sanguinis & succi nervi penuria proficitur, probe distinguat anisæ, ne sibi & eventu fallatur. In utroque casu alia subest causa; & ergo & alia præferenda decet remedia. Quæ enim in priori, seu repletionis statu salutaris est sanguinis è vena secta extractio, in posteriori, ubi sanguis jam deficit, ideoque magis restaurandum est, mirum in modum nocet. Possit hæc quoque probe discerni debet illa virum debilitas, quæ ab animi affectu, ut longior tristitia & diu celata iracundia, vulgo *Cægras* dicta, provenit; & quæ materiali casu hoc acceptis ferenda est. Prius enim hic incidit remedium maxime querendum est in moralibus, atque his omnibus, quæ animum lætum & tranquillum efficere possunt.

§. 11.

De venæ sectionis administratione hæc speciatim sunt monenda, quod ipsa quidem, ubi cordis motus à nimia sanguinis congestione, quam spasmus vehementior intestinum ipsius producit, supprimitur, & vasa in superioribus valde turgent, omnino locum invenit; nunquam tamen in ipsa tali accessione celebrari debet. Major enim exinde languor inducitur longiusque malum protrahitur. Pari ratione frustaneum non minus, quam periculosum est lithyria affectorum omni liquida spiritusosa infundere, quia facile in fistulam spiralem incidunt & suffocationem moventur.

§. III.

Quod si à mensibus suppressis, vel imminutis
liporhœmiæ oriuntur, funtana cum cautione adhi-
benda sunt emmenagoga, etque potissimum
impetuosius commoventia, ut balnea fâlinata,
crocata, & id genus alia; facile enim morbus ob
majorem, quam humilitis infertur, rarefactionem,
magis ingraveſcit.

§. IV.

Virium defectio, quæ gravioribus morbis, ubi ægri jam ex sua natura imbecilliores sunt, supervenire solet, malum plerumque portendit exitum; quare, ut tempestive convenientibus succurramus

Frid. Hoffmanni Oper. Tom. III.

remediis, monet quam maxime elegans illud Veterum proverbium: *principis obfla, fere medicina paratur.*

Multo magis autem cavendum erit, ne in acutis passionibus, maxime si in vigore sunt constituta, igit utamur remediis, quae ad purgationes aliaque excretionis stimulantia naturam ullo modo irritare & turbare possint. His enim necesse est ad morbum superandum vires magis confirmantur, quibus confirmatis nihil amplius opus, nihil artis in medico est. Ideo mihi quoniam maxime placet aurea illa regula FERNELII lib. II. cap. 10. exhibita, quae ut probe teneatur auctor sualorque sum: *Valde constantibusque viribus scilicet, quando morbus desiderat, etiam vacandum; minus validis viribus prostratis nihil profus molandum.*

 $\epsilon, \nu,$

Præcipua illa, quæ per tot sæcula pro summis cordialibus & specificis analæpticis in omni virium lapsu ad superfluitatem usque venditata fuerunt remedia, qualia sunt margaritæ, lapides bezoardici orientales, os de corde cervi, lapides quique pretiosi &c. virtutem aliorum diaphoreticorum fixorum & absorbentium minus sperant, ut potius ipsæ longa ex parte infera habenda sint. Idem iudicium effio de medicamentis ex auro paratis. Quæ enim auro tribuitur virtus cordialis & analæptica, nostro quidem iudicio, vana & superflua est iactantia, quæ f. plicissimam vulgi Medicorum & ægrotantium credulitatem arguit luculentissime. Ut silentio prætereamus, quod omnem fere superent fidem, aurum ad dulces & quintas essentias ulla arte chymica posse redigi.

§. VI.

Vinum, præsertim vetus Rhenanum, quod propter acidum spirituosum omnibus reliquis analepticis longe est præferendum, præter internum vltimum superiori loco præscriptum, exterius quoque caribus et præcordialis regioni applicatum, ad vires reficiendas præstantissimum est auxilium. Quin etiam animi deliquia, quæ subjectis sensibilibus inter venæ sectionis administrationem haud raro obtingunt, feliciter arceantur, quando ante operationem modicus optimi vini haustus adiungatur.

§. VII.

Refidet quoque in aqua pura frigida, oportune exhibita, fumma vis analeptica, maxime ubi ob nimium vel internum vel externum aestum sanguinique rarefactionem, pereunse virium robore, lipothymia accedit. Id quod suo jam tempore rectissime agnovit Celsus, qui ideo lib. IV. de medicina, cap. 5. frigidam aquam ad corrigenda stomachi vicia fummpere commendat; & PLINUS *Secundus*, qui stomachus natura imbecillis & frequenter intus aestuans erat, se aqua frigida cum infigni superius fructu usum testatur. *Vid. Epist. 17. lib. VI.*

ENARRATIONES MORBORUM.

OBSERVATIO I.

Juvenis quidam corpore macilentus, vultu pallido praeditus, a longo jam tempore, ob studio-
um intemperantiam, viamque sedentariam &
nimiam ciborum duriorum & flatulentorum ad-
petentiam contractum patitur malum hypochon-

Curtis
et al.
epidemiol.
infect.

*No other
affiliates
available.*

Control
area 1
Summ.

Copyright
1999
All rights reserved

Circa *Spe-*
thymiana *a-*
urethra *l-*
fungella

Синтез новых
полиамидов
и полиимидов.

diacum, quod multis ructibus, hypochondriorum distensionibus, in ventris torminibus, cephalalgia & insigni artuum lallitudine satis manifestat. His demum malis juncta est post præviam pectoris compressionem cordis palpitantem ipsa lipothymia, qua extrema collapsa refrigerant & pulsus parvus & debilis manum levissime vibrat. Ego consultus in mali accessione enematam ano injiciens & balsamum vitae nostrum externe naribus & præcordiis admoventum curavi. His ubi ad se rediit æger, essentiam carminativam ex essentia corticum aurantiorum, spiritui neri dulci & aliquot olei chamomillæ veri guttulis confectam propinare ejusque usum sepius repetere jussi. Tandem ut à cibis crassioribus æger abstinere, & largiori potu, quem antea neglexerat, impositum utatur commendavi. Quibus probe observatis animus non amplius liquid, maxime quam postea speculatiorem mali phrenodici stultenti curationem æger admitteret.

Epiçrifi.

Lipothymias viris hypochondriacis & feminis hysteriis admodum esse familiares, nemo facile, qui in artis negotio versatur, negabit. In utroque affectu ex solidarum partium atonia orto copiosa flatuum in prima regione progenies vera plurimorum symptomatum genitrix est. Flatus enim nimia membranarum ventriculi & intestinorum distensione liberam & æquabilem sanguinis & fluidi nervi distributionem non modo impedit, verum etiam sanguinem ad pectus & præcordia cursum dirigendo motum cordis vitalem quodammodo siliunt. Et vero admodum simile est, vaporosum ejusmodi aërem cum chylo ad sanguinem deferri, delatum nimia expansione cordis & arteriarum lypstolen sufflammare. Subit hac occasione recordatio, me adhuc juvenem Medicum ante quinquaginta circiter annos Amstelodami, ubi tunc temporis versabar, interfuisse sectioni feminæ cachecticæ syncope demortuæ, in qua cor paucis sanguine repletum, sed mirum flatibus distensum reperiebatur; quam peculiarem morbi speciem tympanitidem cordis rectissime Medicus vocabat. Simili quoque ratione postea in multis cachecticis æque ac hypochondriacis dissectis vasa sanguine crassata, sed flatibus turgida & amplius observavi; ut adeo ab aëre in sanguinem per ductum chyloferum delato varia hypochondriacorum symptomata haud inepte explicanda veniant.

OBSERVATIO II.

Observatio
tunc tunc
anxia dicitur
quæ ex jam
emittit.

Sæpius iterumque mihi artem facienti obtigit, in morbus acutis & exanthematicis, ut variolis, petechiis, febriculis purpurarum, circa morbi statum inopinato fatales accessisse lipothymias; unde mox omnibus, quæ antea placida erant, symptomatibus in pejus conversis, extrema refrigerare atque maculæ aut prorsus evanescere, aut livido tinctæ colore adparere coeperant. Quid? quod, ubi animus dein, dato intervallo, ad se rediit, laborantes de summa præcordiorum anxietate, inquietudine formique defectu conquesti sæpius in letalem incidit syncope. Ego ubi curatus in tantæ catastrophæ inquisivi causam, adstantes plerumque in frigida ægro extra lectum commorato admittum culpam transferre consueverunt. At vero, quum etiam sub temperato conditio calore eadem oriri mala deprehenderem,

tam subitanæ mutationis causam non refrigerio, sed rectius potius motui sanguinis ad caput propter situm perpendiculararem, an corporibus natura imbecillibus & vi morbi magis debilitata tardiori & ex parte intercepto adscribendam putavi. Qua quidem in re me plenius confirmavit exemplum eorum, qui inter largiorem cruoris è vena secta detractionem sub statione corporis erecta penes facile animo linquantur; cum contra in situm repositi horizontalem, collectis paulatim viribus pulsusque vegetiori reddito ad se statim redire solent. Dein quoque perplures vidi phthisicos & consummatos hæctica laborantes, qui si corpora languorem excipimus, animo adhuc satis vigeant, sed in lecto vel erecti sedentes vel extra lectum in situ erecto diutius detenti animam præter spem omnium expirant.

Epiçrifi.

Satis, ut arbitror, luculenter nos docet hæc observatio, quantum ex situ erecto in morbis acutis & cum exanthematum efflorescentia in cute junctis redundet damni. Quæ cum ita sint, omnes omnino ægri, qui vel ejusmodi affectibus decumbunt, vel quorum vires à diuturniori & chronico morbo, ut phthisi & hæctica, prostratas adparent, sedulo monendi sunt, ne in ipsius morbi statu decubitus deferentes extra lectum in sella erecti diutius commorentur, aut caput cubantes sublineæ habeant. Probe quoque sibi caveat Medicus, ne phthisibus stimulo salino imbutis, aut, quod pejus est, fortioribus purgantibus alvum sollicitet atque hinc crebrioribus dejectionibus ægro è lecto surgendi & in situ elevato se continendi occasionem præbeat; imo quoque, si alvus sine stimulo fluida existit, eam sub decubitu deponendam suadet. Denique, si forte ex improviso ægrum in ejusmodi morborum vigore in situ erecto collocatum deprehendat, consultum erit, analeptici & vires labefactas confortantes remedia protinus succurrere omnique adhibere operam, ut, quæ timenda sunt, funesta symptomata tempestive avertantur & agrorum saluti rite prospiciatur. Plura de hac re legi possunt in dissertatione mea de *situ corporis erecto nati*.

OBSERVATIO III.

Fœmina xxx. & aliquot annos nata, gracili-
ioris sed amplioribus venis instructi corporis habi-
ebat, ob vitam seclentariam & adversos quos-
dam casus flatulentias cum alvi adstrictione per
aliquod tempus passa, inopinato quondam circa
mensuræ purgationis periodum insolitis circa
lumbos, os sacrum & uterum spasticas persensit
stricturas cum ventris torminibus junctas, quæ
dein ad pectus usque præterea tanta sequebantur
atrocia, ut summam præcordiorum compressio-
nem & anxietatem cum suffocationis metu indu-
cerent. Sed, quod pessimum erat, crebriores simul
accedebant lipothymias, quæ tamen erumpente
parciori mensum fluxu cum reliquis symptomati-
bus reminebant, ægramque sui iterum reddebant
comptem. Reliquo tempore pulsus satis erat plenus
& subdurus; & quum novum mali incursum
alvi perpetua compressio cum cephalalgia stipata
minaretur, meum maritus auxilium imploravit.
Ego igitur, probe pensatis omnibus, primo
sanguinem è vena pedis tusa detrahendam suasi.
Dein ad alvum referendam mensumque negotium

tum in ordinem redigendum sal quoddam aperitum ex aquali siliis Carolinarum, niri purificati, magnesiæ albæ & tartari vitriolati portione compolitum ter in septimana, præmissis antecedente vespera xv. pilulis nollitæ præparationis balsamicæ, ad drachmam unam mane sumendum commendavi. Denique ad spasmos sedandos summa cum euphoria datus fuit liquor noster mineralis anodynus cum essentia callorei & croci remixta. Quæ methodo id per Dei gratiam consecuti sumus, ut ægra impotenter à gravi mali recurſu libera permaneret.

Epicrisis.

Reclissime hæc affectio lipothymia uterina spasmodica meretur appellari. Haud enim novum, sed frequentis admodum observationis est, feminas ante mensium eruptionem vehementibus circa dorsum & partes genitales doloribus & spasmus affligi, qui totam vitalium motuum œconomiam turbando & inaequalem sæpiusque largiori sanguinis ad superiores partes cursum efficiendo spirandi angustiam, præcoriorum anxietatem, quin ipsam lipothymiam concitare valent. Quod vero si evenit, eo potissimum medentis dirigendum est consilium, ut plicthora inminuta viciditateque humorum resoluta critice sanguinis excretiones per uteri vias promoveantur.

OBSERVATIO IV.

*Cachexia
lipothymia
in cachexia
dura &
hydrope
pericardii
dilatata.*

Virgula generosa L. antonium, graciliori corporis habitu plumbeique faciei colore prædita, post præviam mensesium & vitam omnis laboris expertem de magno pondere cor aggravante & respirationem impediende ægrius conquesta fuit. Artærix ad tactum exiguis ac languidis pulsabant ictibus, urinae paucæ reddebantur & albæ, atque dein crebriores accedebant animi deflectiones, quas non adeo multo post, præcedentibus dorsi & lumborum doloribus, ingens sanguinis serosi ex utero sequebatur profusio, unde ægra viribus mirum exhausta tandem diem obiit supremum. Sectione post mortem inliuata hepar deprehendebatur tumidum, subdum & subalbicante colore imbutum. Cor & reliqua vasa pauco vel nullo plane sanguine erant repleta; pericardium contra apparebat crassum & copioso sero, libræ potius superante repletum.

Epicrisis.

1) Affectus hic recte dici potest cachexia cum hydrope pericardii, morbo admodum raro, juncta; cujus causam prava & copiosa feri vicidit abundantia constituit, à qua pallidus faciei color, urina limpida & pauca, virum summas languor cum functionum vitalium læsione, obstructio vilerum & serosi sanguinis excretio derivari commode possunt.

2) pulsum valde diminutum & crebriora animi deliquia quod attinet, veritati admodum consonum est, quod hæc idem à nulla alia causa, quam ab humore in pericardio sensim incrementem & pressione sua contractionem cordis impediende dependant. Quæ vero complicata fuit respirations difficultas haud immerito sanguini vicidiori per pulmonum vasa segrius transcurrenti debitamque vesicularum pneumonicarum expansionem remoranti adscribitur.

3) non mirandum est, pericardium incrassatum. *Frid. Hoffmanni Oper. Tom. III.*

tum fuisse repertum; siquidem in omnium nostri corporis partium, quas hydrops invadit, membranis idem fieri deprehendimus. Nascitur vero pericardii hydrops hac ratione: Cor valis gaudet coronariis, & ut elegantissime monstravit Ruysschius, multiplici ac dadaleo flexu per exteriorem superficiem internaque musculorum substantiam ramificatis: gaudet quoque ipsum pericardium arteriis, venis & valis suis lymphaticis per superficiem ejus dispersis, quorum inventionem Cl. NUCKTO debemus; quibus disruptis ingens feri fit promanatio. Similem ferme casum habet BALLONIUS in Eph. L. I. ann. 1570. Joannis Platearii vidua, inquit, hydrope pulmonum, qua laborabat, interit. Per triginta annos de oppreffione prætoris conquisita difficultatem spirandi habuit. Pulsus erat intermissus & intermittens & in suisstrum latum inclinata ægrata facile syncope corripiebatur. In sessione cor aqua natans, nec facile movebatur & capacitate thoracis: aqua putrescentia libra sex educabatur.

OBSERVATIO V.

Illustris matrona, longæ sed macilentioris staturæ, primo statim tempore cum utero gerebat, de pectoris oppreffione & difficili respiratione cum alvi adstrictione juncta conquesta fuit. Ad quintum gestationis mensem quum pervenisset, frequentes incidit lipothymias, quibus abigendis circumstans muliercularum cohors multa spirituosæ & vires depreffas rescissantia propinabat, sed malum nihilo minus recrudescibat. Tunc ad ægram invisendam ego accessit alvum nimis durum statibusque turgidam deprehendi & nimium sanguinis abundantiam, quæ pulsu arteriarum satis pleno se manifestabat, in vitio esse putavi; quare consilium dedi, ut mox clysiere alvus subduceretur & dein sanguis à vena brachii incisâ detraheretur. Denique passulis rhabarbarinis alvum semper apertam servandam curavi, unde effectum est, ut femina à molestis symptomatibus sensim liberata tandem jussu tempore vegetum excluderet infantem.

Lipothymia præcedens à sanguinis abundantia.

Epicrisis.

Non tantum à defectu sanguinis & inopia, verum etiam à nimia ejus redundantia vires cum motu cordis sufflaminantur sæpiissime. Ad functiones enim rite peragendas natura certa gaudet proportionem, certa æqualitate ac moderamine, adeo ut vel parum vel nimium noceat motibusque inimicum sit. Et in eo quoque potissimum artis opus versatur, ut medicus causas æquilibrii excedentes convenientibus remediis ad moderamen reducere labores.

OBSERVATIO VI.

Vir quadragenarius, corporis animique sensibilibus ac debilis, qui diu jam ex ventriculi inflatione alvique obstipatione, quas mala diæta sibi contraxerat, laboravit; propter graves animi commotiones per aliquot hebdomadam intervallo quiete, appetentia & viribus privatus pæsus habuit. Varia hinc inde præscripta & adjecta medicamina nihil tulerunt opis, quare Medicus ultimum remedium in sanguinis missione sumum arbitratu venam secandam curavit, sed tam funesto evenit, ut non multo post æger lethali syncope correptus animam exspiraverit.

Syncope præcedens à P. Sui compressione ad melle.

Epicrisis.

Quid in nostro casu imprudentius, quid incon-
sultius potuit excogitari, quam in viro extreme
debilitato & ad incitias ferre redacto venæ scissi-
onem administrare, quæ virium reliquias una cum
vanguine simul subleat. Probe itaque monendi
sunt juniores Medici, ne, ubi vires diuturno mo-
rore, aut alia quacunque causa fractæ & enervatæ sunt, sanguinis vacationem concedant.

OBSERVATIO VII.

*Sensu & lo-
quacitate ab
opio de-
fecta.*

Vit annum ageta L. spongiosi corporis habi-
tus, per complures annos podagra divexatus, ob
infortunium quoddam in diuturnum incidit
maerorem, unde ciborum inappetentia, alvi
siccitas & virium languor originem sumserunt.
Accersitus Medicus propinabat aquam liliorum
convallium vinosam cum grano extracti opii fu-
mendam; idque remedi genus, ob vim suam,
quam exferere videbatur, somnum conciliantem
per aliquot hebdomadas continuare jubebat. Tan-
tum autem aberat, ut auxilii quidpiam ager inde
reportaret, ut potius, ingravescente virum lan-
guore, crebriores pateretur lipothymias. Præterea
perpetuo sudore madibat frigido, arteriæ exiguis
micabant scissis, & singulis demum superveni-
ente ex hac vita discedebat.

Epicrisis.

Quam inepte subiecto spongiosiori, cujus ro-
bur venericuli & universi corporis diuturnior
tristitiæ affectus jam mirum antea debilitavit,
opiatum fuerit oblatum, saniorum iudicio relin-
quo. Interim ad plenioris morbi & mortis hi-
storiam adhuc pertinet, quod hepar, apertum ca-
daver, quoad concavam partem suam nigrum,
corruptum & sphaculosum fuerit inventum & la-
tior macula subnigra in dextro ventriculi latere
panter ac diaphragmate apparuerit. Ceterum
vasa mirum erant exinanita & omni penè san-
guine vacua.

OBSERVATIO VIII.

*Lipothy-
mia cum
alvi motu
ab emper-
nigra de-
fecta.*

Virgo xviii. annorum, tenerræ admodum
constitutionis, ob fluxum menstrui, quem parcius
iusto vix bis antea experta erat, defectum multis
subinde malis, ut ciborum fastidio, insigni mem-
brorum gravitate atque motum valde impedi-
ente traxpedine cum virium prostratione juncta afflic-
ta. Ad tot mala debellanda Medicus & pharma-
copæus remedia præscribit sanguinem nimis
commoventia, cujus generis sunt pilulæ ex gum-
matibus confectæ & elixir proprietatis cum fabi-
næ oleo remixtum. Corpus quoque dimittitur in
balneum, sed nihil inde emergit commodi, ut
potius graviore excitatæ fuerint læsiones; sibi-
dem nunc ægra animo crebrius sinquitur, sangui-
nem cum magna præcordiorum anxietate expul-
sit, & intolerabili capitis dolore afflictæ bis vel ter in
septimana epilepticos & convulsivos patitur mo-
tus. His ita constitutis ad nos deplorata venit &
sub cura nostra sanitatem pristinam, mensum flu-
xu restituta, sic consequuta est.

Primo quidem omnium sanguinis missionem
in pede repetitis vicibus, sed parcius instituendam
præcepimus. Tum insulum theiforme ex herba
veronica, mellis & floribus chamomillæ ad

aliquot patellas mane forbillandum; inter epulas
vero elixirum nostrum viscerale temperate bala-
nicum adsumendum & per aliquod tempus
continuandum suscepimus. Denique cubitum ite-
ræ pulverem nicrosum & cinabarinum cum
pulvere nostro antiepileptico remixtum porrexi-
mus, & quæ antea nimis calida usurparat balnea
aque dulcis, nunc solum tepida & admodum
moderata adhibere iussimus.

Epicrisis.

Si ullo in morbo, certe in foeminarum affe-
ctibus sanandis multum curæ & cautionis Medi-
cus debet adhibere maximeque eo respicere, ut
cursum mensum recte prudenterque dirigat. Ad
quod felici cum successu perficiendum, opus est,
ut non modo corporis naturam, habitum & vi-
cium, sed & veras irregularis vel plane deficientis
fluxus pericruterur causas, & ad hæc singula
medendi methodum instituat.

Diffrimus præterea ex hac morbi historia & cu-
ratione, nihil esse perniciosius, quam balneis ni-
mis calidis, vel medicamentis calidioribus & vo-
latilibus sanguinem commovere ejusque excre-
tiones, obstruere adhuc & angustatis viis, moriri.
Sanguis enim nimium rarefactus, ob validam,
quam infert, vasorum distensionem seu diastolen
motu suo magis sistitur, quam promovetur; ut
ideo longe graviora concitentur mala, qualia sunt
in capite epilepsia, in corde lipothymia & syn-
opes, in pulmone suffocationes & id genus alia.

OBSERVATIO IX.

Sæpius iterumque mihi in artis exercitio ad-
notare licuit, puerperas haud infrequenter pericu-
lolas, imo funestas incidisse animi defectiones, si
per ingentes tempore parus perperis labores
valde debilitatæ ingentem sanguinis copiam post
partum amiserunt. Quod enim si accideret, lochia
dein parcius fluunt & circa septimum plerumque
diem omnis putridæ materiæ effusio cessat; unde
ex levi tantum causa, ut siu corporis erectio,
lipothymia origo. Venit quoque præterea fla-
tibz ut plurimum tumet & parum per alvum
excrementorum secedit. Sub tali rerum statu ego
præstantem tali operi per injecta enemata,
eque tantum domestica ex floribus chamame-
li, sambuci, semine anethi, cymini & paucis-
simo salis parata. Exterius callorem naribus suis
admotum & demum, ad materiæ putridæ ex-
tremo effluxum promovendum, pilulæ nostræ
balsamicæ singulis tribus diebus, interposito pul-
vere bezoardico cum uno alterove grano callorem
maritato, datæ fuerunt. Nonnullis etiam ad vi-
res anissas restaurandas modicum vini Rhenani
haustum concessimus.

Epicrisis.

Quando post partum immodica sanguinis con-
tingit profusio, vires inde nimium deprecitæ sa-
lutari lochiorum & feri impuri ex utero meandris
expulsionis minus sufficit; unde non mirum, si
subsistentes ibi humores putrescant viriumque
majorem defectionem efficiunt. In ipsa curatio-
ne cause omnino procedendum, & ut supra di-
ximus, primum clysteribus, dein benignis laxan-
tibus & irritantibus humoris putridi expulsio
promovenda est.

OBSER-

OBSERVATIO X.

*Liquor
muri &
muri a ch-
lorum pof-
morum
refolium.*

Vir XL. annorum, parvæ & gracilioris ſtaturæ, opifex ferrarius, ex febre acuta, qua ob graviorem iracundie affectum correptus laboraverat, convalſcens cibos ſupra modum adpetit, qui ipſi ab uxore magna in copia parantur; quos inter præcipue pulcrita ex ſimila & lacte confecta & caro aſterina nominari debet. His magna cupiditate ingeſtis non multo poſt ingenti premitur anxietate præcordiorum, inquietudine & extremorum refrigeratione: vires ſimul labantur & velut emortui jacent; accedunt crebriora animi deliquia & placida denique mors.

Epiſtola.

Egrege ſane confirmat memorabilis hæcce hiſtoria aphoriſmum HIPPOCRATIS 31. ſect. II. *Cui a mai bo cibum optime capienti non confirmatur corpus, malum;* &c., quod idem gravillimus Auctor alio loco urget, inter vires corporis & cibos ſervandam eſſe proportionem, ita ut, quo magis hæ languent, eo minori victu utendum ſit. Cibi enim nimis concocti & reſenti non modo mora conſumuntur & inde graviorum morborum caſus ſunt, ſed & ſola mole ſua vires deſtruunt potius, quam erigunt. Quæ quum ita ſint, omnibus infirmis & ex morbo vix convalſcentibus neceſſaria eſt cautio, ne corpus nimis cito alimentis replant. Et ideo quoque peſſima habenda eſt vulgi conſuetudo, qui vires valde exhaustas ciborum copia reſtituendas eſſe falſo ſibi perſuadet. Novi hinc plures à morbis mox liberatos, qui cibis, etiam optimis & nutrientibus uſi in priſtinum vel aliud morbum inciderunt. Et quum fugie, milites diuturnis vigiliis, inedia & laboribus deſatiſgatos, quando hiberna ingreſſi cibos nimis avidè ingurgitanti, gravioſibus inque maxime acutis morbos ſuccumbere.

Præter alios, adhuc aliquot notatu dignos caſus ſupplèdant conſultationes noſtræ neocinales ſect. I. Caſu XIV. & caſ. XXXI. ſec.

CAPUT X.

De ſubita morte & morbis aliis inſanabilibus, ex vitali ſanguinis per polypos intercepto circuitu utri prudentè præcavendis.

THESES PATHOLOGICÆ.

§. I.

Celerè ſubinde & inopinata morte homines in ætate flore conſtitutos bonoque & robuſto corporis habitu à natura donatos & vivis ſerpentum tolli, res eſt per experimentum exploratiſſima. Neque dein jejunum latet plebem, quin Medico obſcurum ſit, plures dari longas & graves diagnofi æque ac prognofi difficiles ægritudines, quæ omnem medendi reſponſes rationem vitam hominum auſurrunt. Quæ vero frequentius ſunt obvia, & quo major omnium cujuſcunque ætatis hominum animis inſita ſuit ſcindi cupiditas; eo ſane magis mirandum eſt, veras & ge-

Frid. Hoffmanni Oper. Tom. III.

nuinas horum effectuum cauſas diutius latuiſſe abſconditas: donec tandem noſtri temporis ſelicitate Medici corpora ejuſmodi morbis deſuncta cultro anatomico crebrius coeperunt diſſectare & interiores viſcerum luſtrare recessus. Duci enim vix poſſet, quantum ars noſtra debeat anatomiz ſtudio ceu primario ſuo fulcro, ita ut aſſimare haud dubitaverim, vel ejus ſolius ope atque cultura præſenti ſeculo plus tui medicæ accendiſſe ſplendoris, incrementi ac certitudinis, quam ea neglecta, reliquis retro ſeculis omnibus. Quemadmodum vero frequenti corporum diſſectione multiplices ſubitaneæ mortis & periculoſiſſimorum morborum detectæ fuerunt cauſæ; ita ex omnibus maxima & præcipua eſt, quam conſtituunt innumera illa ex fluidis in ſolidam maſſam concreta vaſculique majoribus cordis & pulmonum firmier impacta coagula, jam polyporum nomine nota; quæ dum vitalem & liberum ſanguinis per corporis canales circuitum interceptio omnis generis functiones una cum vita evertere valent, eaque propter curam diſſicillima exiſtunt, providem & de hominum ſalute ſollicitum artis peritum omnino admonere videntur, ut per idonea remedia genera ſonticas illas cauſas præcavere & in tempore ſtudeat avertere. At vero, quum perpauci, quod ſcio, Medici hæcenus fuerunt, qui hocce utiliſſimum in re medicæ argumentum in liberis ſuis ex merito pertracharunt; non alia re, ſed operæ utique pretium judicavi, id ipſum ſpeciali capite hoc loco proponere.

§. II.

Primo itaque, ut comprobemus, polypos illas concreciones, cum mortis & immediabilium morborum cauſas, in aperiis poſt mortem cadaveribus haud infrequenter deprehendi; placet ex immenſa obſervationum ſartagine perpauci tantummodo veterum æque ac recentiorum hunc in ſinem commemorare exempla. Ita apud BARTHOLINUM, in ſib. ejus de lacteis thoracis cap. XIV. relatum legimus, ipſum in iis, quos ſubita morte exſtinctos cultro anatomico ſubjeciſſet, majora cordis vaſa ſanguine concreto inveniriſſe repleta; quod etiam ipſiſſime teſtatur ſcit BONETUS anat. præſt. lib. II. ſect. 2. obſ. 5. ubi de morte repentina à corporibus extraneis in cordis ſinibus repertiſſis proluxus egit; & FRIDERICUS LOSSIUS obſ. 5. lib. I. qui mentionem inſicit pueri, ures annos nati, qui, quum omnibus vegetis ac integra ſanitate fruens videretur, præter ſpem omnium in ſinu matris exſpiravit. Diſſectione corporis inſtituta, viſcera perfecte apparuerunt ſana, ut præter ſanguinem in cordis ventriculis valde coagulatum nullam mortis cauſam ſuſpicari liceret. CAROLUS quoque FRACASTORIUS, cui multa corpora celerè morte perempta diſſecandi occaſo obtigit, nil niſi ſanguinem intra cordis ventriculos & vaſa pulmonalia concretum iſſiſſique tenaciter adhærentem vidit. Et quidem ex inſarctu vaſorum complures repente deſicere, vel unicum idque graviffimum PANAROLI teſtimonium probat, qui luculenter prodit, ann. 1656. ſeraci ſubitaneæ mortis ortum tempore, plures à ſanguine intra cor nimium retento fuiſſe ſtrangulatos, ideoque aperto corpore tam vehementis ſtrenuæque mortis vix aliam, quam inſignem vaſorum inſarctum, oſtendiſſe cauſam. Nec denique omittenda eſt egregia obſervatio Joannis Daniel.

Aa 3

HOR-

HORSTII, qui in *manuduct. ad med.* in sinistro cordis ventriculo se albicantem invenisse piuitam testatur, & RIVERII, qui *Cent. I. obs. 82.* materiam crassam, compactam & omnino albam, lardum coctum referentem, in sinistra cordis auricula hominis cito exincti annotavit.

§. III.

*Ratio de-
monstratio-
nis polypi.*

Ex dictis jam & adductis satis apparere arbitror, omni tempore in corde vasisque majoribus solida ejusmodi concreta ex sanguinis massa suis se progenita, quæ subitam mortem aliasque insensibiles produxerunt ægritudines. At, quum nulla plane in Veterum monumentis polyponum sic dictorum occurrat mentio, haud inique statuitimus, hancce denominationem antiquioribus Medicis ignotam, à recentioribus vero ideo maxime illis coagulasse impositam, quod plerumque multos emittunt ramos per canales adiacentes hinc inde dispersos. De qua vero interpretatione ut plenius rectiusque consilet, sciendum est, veros polypos ea solam concretamenta esse dicenda, quæ ex albicante & fibroso substantia firmius paulo sunt compacta & propterea à sanguine congruatum multum differunt. Hic enim licet variis corpora nostri partibus, maximeque utero & cordi, inhaerens multum magnorumque morborum causa existeret possit, genuini tamen polypi nomen minus recte meretur, sed pseudo-polypi nomine apud auctores ut plurimum venit.

§. IV.

*Quæ ratio-
ne polypus
morborum
et mortis
causa sit.*

His præmissis, non inutile, sed potius tractationi nostræ valde videtur accommodum, ipsam rationem exponere, quæ polyposæ massæ tantam in genus humanum edant stragem. Sunt autem polypi tum positissimi gravium morborum mortisque causæ, si quando mole sua aucti, vel, quod sæpius fit, à levi tam interna quam externa causâ de sede sua dimoti, libero sanguinis circulo ex uno cordis ventriculo per pulmonem vasa in alterum obicem ponant utrinque perventum, aut quando officia vasorum penitus occludendo motum sanguinis vitalem omnino tollant. Quamdiu enim coagulata ejusmodi massæ tantum tenuiores cordis aliorumque vasorum lateribus adherent, sanguinis circuitum non adeo vehementer impediunt, nec inde functiones manifeste lædunt. In quo quidem & experientiam habemus suffragantem, utpote quæ optime docet, concreta ejusmodi corpora in cordis auriculis & sinibus ob multiplices anfractus fibrillasque carneas, & circa vasorum divaricationes in aliis quoque partibus hæreæ, at nihilo minus adhuc liberum sanguini concedere posse iter. Cujus insignem fidem facit memorabilis & fere admirabilis observatio VESALII, quæ existit *lib. I. cap. 5. de corpora humani fabrica*, ubi probabilissimus hic auctor commemorat, se quondam in sinistro cordis ventriculo glandulose, sed subnigræ carnis reperisse libras propemodum duas, corde insar uteri extenso; & addit: ægrum, licet pulsus miris modis fuisset inæqualis & varius, nihilo minus multis ante mortem mensibus veluti sanum obambulasse; donec tandem postremis vitæ hebdomadibus pulsuum tantæ accidissent intermissiones, ut ex novem ichuum intervallo tres, vel duos solum tantum occurrerent.

§. V.

Proximum nunc est, ut per singulos morbos cundo fufius explicemus, quum ex illis sint, quos polyposa concreta proguunt, vel perniciousiter solent, vel etiam ad malum disponunt exitum. Hæc dum meditatur, primo se nobis offerunt varæ pectoris affectiones, inter quæ præcipue referri merentur, ex acutis pleuritides & peripneumonix, ex chronicis omnis generis asthma & ipse catarrhus suffocativus, rufus convulsiva, phthisis & hæmoptylis &c. Hæmoptysin quod attinet, crebrior nos docet observatio, hanc æque facile ob sanguinis viscidum nimium congesti stagnationem ad polypos disponere, atque ab his iterum progigni. Quod si enim polyposis illis repagulis æquabilis ac liberior sanguinis per vasa pulmonalia progressus ac transitus turbatur, fit omnino, ut sanguis in capillaribus arteriis pulmonalis vasculis accumuletur tandemque maxime in dispositione, rupto quodam ramulo, excernatur. Et ideo quoque plane non insolitum est, in hæmoptylicis post mortem dissectis ejusmodi concrectiones deprehendi, quod optime confirmat historia in *consultationibus nostris medicis, Tom. I. Sess. 2. case 73.* allata: Laboraverat scilicet juvenis, septendecim annorum, hæmoptysi cum febre lenta, in quo post obtinam in artura pulmonali visum se obtulit callosum concretum. Simili ratione BONETUS *autem. præc. Tom. I. lib. 2. Sess. 5. p. 654. de spuo sanguinis* recenset sectionem cadaveris hæmoptylicæ à Sylvio in ipso nosocomio Leydensi *ann. 1664. administratam*, in cujus utroque cordis ventriculo deprehenderunt materiam crassam, fibrosam & quasi carneam, quæ in omnia vasa ex corde eadem extendebatur. Præcipue vero talem massam ex jugulari fistula eduxerunt tres lithamas longitudine superantem. Erat autem illa materia, cui nullum graviosum adhaerebat sanguinis, in ipsis cordis ventriculis crassitie sit insigni carnosæ cordis fibris, quas suis fibrillis angustebatur, singulari modo annexa. Ceterum in medio apparuit sanguis grumulosus videbaturque minuscule vasa habere. Idem valet de phthisi, teste nostra & PHLEGIS. BAUHINI experientia, qui apud Greger. HORSTIUM in. *opp. Tom. I. pag. 134.* se in phthisicis & hydropticis semper fere polypos annotasse, expetitis verbis meminit. Plura quæ desiderat, consulere possit NEDHAMIUM *de formatione faciei cap. 2.* & MALPIGHIUM *de polyo cordis*, item HARDERUM *obs. 45. 46. 47. &c.*

§. VI.

Asthma, maximeque illud quod immedicabile existit, & qui ab ipso dependet pectoris hydrodrops, tantum non semper a polypos generatur & sustentatur. Hinc nos ipsi plena fide testari possumus, aliquoties nobis obfuisse occasionem hoc morbo defunctorum corpora dissecandi, ubi in corde pulmonumque vasis polypos, vel serum foetidum in thoracis cavo extravasatum deprehendimus. Nec desunt, quæ idem confirmant, auctorum Medicorum hæc de observationes. Ita Cl. D. GRÆVIUS, castrensis Medicus, qui ante viginti circiter annos, me præfide, dissertationem de asthma convulsivo habuit, se in quinquaginta militibus quos incidit, asthma & hydrope pectoris exinctis, polypos cordis ventriculos obidentes invenisse testatur.

*Polypus pectoris
causa morborum
et hæmopty-
sæ.*

Phthisis.

*Asthma
et pectoris
hydrodrops.*

fiatur. LANCISIUS quoque libro suo de motu cordis p. 38. notabilem refert casum, qui ita se habet: Juvenis xxiiv. annorum, gracillimus, prævoque aere & victu usus, creberrimis cordis apprehensionibus & lipothymis, cum gravi anhelu extremorumque refrigeratione junctis corripiebatur. Arteræ exiguis & inæqualibus pulsantibus ictibus & venæ jugulares una cum abdomine mirum intumescerant; donec tandem miser lenta febre decedebat. Dissecto cadavere cor mirum in modum reperiebatur flaccidum exiguaeque molis, cum polyypis utrumque ventriculum opplentibus & pericardium tenaciter annatum. Plures observationes notatu dignissimas de asthma, cui plerumque pectoris hydrope junctus fuit, legere licet in DIEMERBROECKII anat. lib. II. cap. IX. pag. 401. BARTHOLINI epist. 2. cent. IV. & ep. 56. cent. II. nec non in HARDERO obs. 56. seqq. LOWERO de corde cap. 2. PEZOLDO obs. 58. 61. RUYSCHIO obs. 19. item in M. N. C. Dec. II. ann. IX. obs. 174. & Dec. III. ann. II. obs. 185.

§. VII.

Neque vero alium pericardii & thoracis hydrope alhimati à polyypis inducitur frequenter junctus; verum etiam aliorum corporis partium hydrope intumescenz exinde suos repetunt natalia. Hinc in artis exercitio nihil occurrit frequentius, quam ut alhimati spasmodico-convulsivo, a diſta causa orto, status cachecticus, tumores pedum œdematosi, imo ipse ascites superveniant. Quando enim cunque sanguinis ex dextro cordis ventriculo per pulmones in sinistram progressus, obſecto ejusmodi repagulo, impeditur; heri non potest, quin univerſa sanguinis per venam cavam circulatio tardior, lenior impeditioneque fiat, & magnæ hinc inde stagnationes in locis inferioribus, maximeque in hepate oriantur; quo dein obſtructo, vel plane indurato sanguis subsistere incipit in mesenterio omnibusque venæ portæ ramis: unde iterum secedens ad valvæ regurgitat lymphatica, quæ nimirum distenta in hydatides diducuntur, quibus diſruptis exhalatis feri contingit extra vasorum alveos effusio. Quæ de re dignæ sunt quæ evolantur observationes apud RHODIUM Cent. III. obs. 4. PEYERUM in hist. anat. cap. VI. Speciatim vero WEPFERUS in cachecticis diu & frequentius ex morbis decumbentibus corpora fibrosa & pituitosa annotavit: Vid. ejus exercit. de apoplexia pag. 196. & 200. & SMETIUS in miscell. medic. lib. X. pag. 537. singularem allegat casum de œdemate in utroque crure, à polypo tenſo & subdaro, quod ad femora usque protensum tumorem pleum & durum in imo ventre, umbilicum inter & pubem effecit, qui tandem totam abdominis regionem occupavit. Ratione haud dissimili BONETUS ex BOYLEI tractat. de apoplexia obs. 9. polyypum refert in cordis ventriculo duarum mulierum, quarum altera hydropem, altera cachexia obit; & ALBINUS diff. de polyypis theſ. V. notabilem asserit hydropis speciem, quam observavit in vivo per aliquod tempus dyspnœis cordisque palpitacionibus & anxietatibus afflicto, qui tumores in brachiis, venasque valde tumidas & in nodos protuberantes, à polypo sat magno, ex auricula dextra in truncum venæ cavæ adscendente ramodique emittente, habuit. His vero ita

constitutis hydropem lethalem esse, pro habendum est.

§. VIII.

Sed missa ulteriori alhimatis &c., qui hoc sæpenumero comitatur, hydropis consideratione, reliquos pectoris morbos ex polyypis oriundos discipiamus. Ex his vero præcipue huc referendus est catarrhis suffocativus. Quæ enim anatomicen hoc morbo defunctorum sistent observationes, plerumque polyyposas concreciones, seu præcipuas mortis causas repetas fuisse confirmant. Testantur vero id maxime BARTHO LINUS cent. II. obs. 86. GREISELIUS in M. N. C. ann. 1670. obs. 74. & MALPIGHIIUS de polypo cordis pag. 170. quippe qui in omnibus apoplecticorum, vel catarrho suffocativo exstinctorum apertioribus tam in corde, quam in cerebro, imo non raro in utroque simul, corpora callosa, viscida & glutinosa observavit. Neque sicco, ut aiunt, pede transunda est cordis palpitatio, quæ ut plurimum, &c. si chronica est, tantum non semper polyyposis coagulatis in acceptis ferenda est. De qua tamen quum jam in priori Tomo Med. myſt. hystenat. ejusque Scil. II. cap. 1. §. 9. seqq. prolixius egimus, B. lectionem eo remittimus, transire ad inflammatorios illos ac valde acutos pectoris morbos, pleuritidem veram & peripneumoniam, qui ex inducta sanguinis, propter polyyposas concreciones, stagnatione sæpe sepius suam mutantur originem. Id quod satis superque testantur peritissimi in arte medica viri, quos inter nominare placet MALPIGHIIUM, qui loc. cit. affirmat, pleuriticorum cadavera non in præcordiis tantum, sed & in hepate & venoso genere frustula alba copiose continere. WILLISIUS de febr. cap. XI. pag. 130. agens pleuritide mortuis corporibus in cordis sinibus & vasorum circa circum cavitatibus sanguinem in frustula & glomeros longos concrevit fuisse memorat. PEYERUS quoque exercit. anat. memorias prodidit casum hexagenarii, qui pleuritide in peripneumoniam mutata obiit. Facta cadaveris inſectione, in corde magni ac tenaces apparuerunt polyypi, adipis frustula interrentes.

§. IX.

Sed non modo in corde & annexis pulmonum vasis, verum etiam in aliis, maximeque venosis canalibus polyypos seu immedicabiliū morborum causas generari, demeritorum ſectionibus & autopsia satis superque constat. Ita gravissimas & pertinaces cephalalgias, apoplexiam & deliria quoque à polyypis intra venas jugulares & in cerebri sinibus repertis concitata fuisse, observationes à WEPFERO, PEYERRO, WILLISIO, BLASIO, item in M. N. C. descriptæ abunde docent. Si quæ vero corporis nostri pars ad polyyporum generationem præ ceteris apta est atque disposita, certe uterus huc referri debet, in cujus vasis venosis, ob miram & tortuosam complicationem & abhinc dependentem impeditionem sanguinis circuitum corpora ejusmodi polyyposa ex sanguine viscido concreſcunt facillime; quæ postea frequentioribus abortionibus, immodicis uteri hæmorrhagiis, copiosis lymphæ & feri per uterum effusionibus, ipsique hydropi & sterilitati causam præbent amplissimam.

§. X.

Spes polyporum. Consideratis itaque insanabilibus curatque difficilissimis, quae ex polyphis pronascuntur, agnitionibus, non alienum esse iudico, quaedam suppeditare phaenomena, ex quibus cognoscere liceat, an polypus ejusmodi concretus in praecordia, ubi praecipuum sedem obtinent, lateant recondita. Sunt vero ex omnibus, quae id testantur faciunt, signis praecipua 1) distentione cordis palpitatio, eaque ex levi lapsus causa, ut animi affectibus & à cibis stans alvumque constipantibus recurrens. Harum enim rerum ea est natura atque conditio, ut aequabilem sanguinis circuitum perturbando majorem ejus ad cor impetum efficiant, ubi supra modum congestus de accumulatus, quum, propter positum à polypo obstaculum, haud amplum satis semet expandendi invenit spatium, cor atque ac vasa ipsius violenter distendit, & hinc insignem anxietatem & convulsivum cordis motum, quem palpitationem dicunt, inducit. Ex quo mox alterum emergit indicium, pulsuum scilicet inaequalitas & cum sphygmia saepe juncta intermissio. Pulsus enim sicut generatim cordis motum & universum sanguinis per singulas corporis partes progressum testatum facit quam optime; ita si irregularis, vel plane intermittens est, ceteris paribus, justum incipit suspitionem concrementi cujusdam polypsi, quod mole sua obstruente debitam cordis aliorumque vasorum constrictionem & abhinc dependentem sanguinis per ea transitum valde perturbet, aut ad tempus proflus interceptat. Nec denique ex signis polypum denotantibus excludi debet frequentius inspirationis, sine causa manifestae, impedimentum, praecordiorum, ob spasticam pectoris stricturem compressio, &c., qui huic plenaeque jungitur, dolor circa cor focus; utpote haec singula, si sepe perpetua sunt, de impedio sanguinis à corpore quodam peregrino circuitu testantur luculentissime.

§. XI.

Differentia. Sequitur nunc, ut nullis generalioribus, de polyphis paulo praestius agamus, ipsamque generationis modum subjungamus. Tenendum autem primo omnium est, non omnes polypos unius ejusdemque esse naturae, colonis & magnitudinis. Nonnulli equidem satis observantur solidi, duri & ex fibris ita compacti, ut tendines firmiores referre videantur; alii contra sunt molliores, ex pelliculis mucilaginosi & minus crassioribus coagmentati, membranaeque exterius involuti. Quodam, si magnitudinem spectemus, mole sunt satis grandes, ut aliquot uncias pondere aequent; quidam minores & multas interdum partes adiposas immixtas habent. Colorem dein polyporum valde esse differentem, fidem nobis faciunt variae ipsorum apud auctores, maxime antiquiores, obviae denominationes; quidam mox sub idea pinguedinis, quam alii albam & candela setaceae similem, alii ex albo flavescens & medullam ossium calefactam emulatem perhibent; mox sub specie carnis, mox vero alii designati veniunt vocabulis, quorum hic numerum inire nimis prolixum foret. Differunt porro quoque in eo, quod nonnulli in dextro, nonnulli in sinistro cordis ventriculo radicati vel plures, vel pauciores in adherentes arterias & venas emittant ramos; nec non quod alii per se, mole sua sit magna, alii vero nonnulli

vi quadam è loco suo dimoti, vasorum ostia occludendo, fatalem corpori humano inferant noxam.

§. XII.

Generis. Modum autem, quo polypus ejusmodi corpore generatur, sat gravis induci rationibus talem concipimus, ut existimemus: materiam ipsi praebere particulam chyli & lymphae graviores, viscidioresque & fiores, utpote quae motu facile coeunt & in unam compinguntur massam, ut fibroso-membranaceum corpus constituent. Quod quidem abunde satis confirmant tot physica circa polyporum generationem suscepta experimenta. Iustar vero omnium optime erudire nos potest RUYSCHIIUS, vir de re anatomica meritisissimus, qui in thes. anat. VI. fidem facit, se ex sui ipsius sanguinis sero, sola conqassatione pseudo-membranam, uti loqui amat, confecisse, quae plummis flammibus seu fibris fuisse texta veramque membranam ita representasset, ut eandem a natura productam omnes crederent. Id quod & alio loco asserit, quando thes. anat. I. n. III. p. 14. sola fortiori conqassatione, per horae spatium continuata se polypolam materiam ex cuore suis recenter sectam scisse refert. Hic ita demonstratis in promptu, nunc est distinctum polypum suppeditare ideam ipsamque definire, quod sit concretum quoddam solidum, fibrosum, ex viscidiori lymphae parte per fortiori motum sive impulsu factum.

§. XIII.

Polypus & eius generis in corpore observatus. Polypus licet in utroque cordis sinu, & tam venosis quam arteriosis generetur ductibus; attentioni tamen observatione cognitum exploratumque habemus, eosdem saepius & frequentius in ventriculo & auricula cordis dextra, quam sinistra, & in venis magis propterea, quam arteriis. Nec adeo obscura est hujus rei ratio: chylus enim, qui mediante vena subclavia in venam cavam & ventriculum cordis dextrum fertur, crassioribus referens particulis, motu accedente leniori, facilius partes depositi graviores, quarum amplexu complicatis cordis trabibus, unum quasi corpus efficitur. Dein, qui venis vehitur, sanguis, ob vim venarum contractilem nimis debilem, tardiori procedit gradu consistentiaque crassior exiit & ponderosior arteriolo, unde facile dimittit partes crassiores, quae, ubi praeterit non intus mixtae leviter cohaerent, vi gravitatis suae, ad fundum lateraque magis tendunt. Aliter vero res sese habet cum sanguine arterioso. Hic enim, quum non modo ab elastico arteriarum motu insigniter in cursu suo promovetur, verum etiam in pulmonibus subtilissima aëreo-anthera materia imbutus & per minima vascula transgressus intus miscetur, ideoque & pondere levior, & colore rubicundior redditur: facile patet, quare hic praevioso ad polyporum generationem minus sit dispositus.

§. XIV.

Polypus per praecordia. Aetatem si spectamus, non ii solum, qui praecordia, sed & qui in utero & non adeo maturae aetatis sunt, polypolis concrecionibus deprehenduntur obnoxii. De adultioribus equidem id mihi facile concessum iri confido. Placet igitur nonnulla ex auctoribus anatomiae praestare asserere exempla, quae certiores nos reddere possunt, infantes quoque monstrare ejusmodi polypos

sa inclusa sæpiissime gerere. Ita de concretionem polyposa, in puerulo, adiectionem in cordis auriculam obdurantem conscribit ALBINUS, *differt. de polypo cordis pag. 16.* & BONETUS *sepalchret. anat. lib. II. Sed. XI. obs. 6.* ubi de polypis sat magnis, in sinibus cordis filioles reperiuntur eleganter agit. Haud dissimili modo in juvenis sexennis atrophiam consummi utroque cordis sicut adnotavit polypum D. SNELL, *Vid. eius differt. de cordis polypo pag. 18.* & DORSTENIUS in *E. A. C. Dec. II. ann. III. obs. 153.* de quatuor corporibus in sinistro cordis ventriculo pucilli cuiusdam invenitis perpulcre differt. Portentosum quoque polypum in adolescente describit E. A. C. *Dec. III. ann. II. obs. 18.* quod & multis aliis exemplis probari posset, si his jam immorari liceret. Interim non negandum esse censemus, consilientis ætatis, homines natuque paulo majores, ad polypos generandos, præ reliquis esse proclives. Facilius enim, peracto jam nutritionis negotio, quam eodem adhuc vigente, sanguis & copia & temperie excedens accumulatur; idque eo magis, si quis, ob copiosa amplioraque vasa, & imminuta solidorum elatorem, ad plethoram producendam dispositus, vitæque fere motu deficiat & diutæ minus convenienti deditus fuerit.

§. XV.

Respectu sexus, nunquam fere non viros magis, quam feminas, polypis & morbis inde oriundis videntur expositos. Cujus quidem rei hanc subesse puto rationem; quod in sequiori sexu, sub debito menstruæ purgationis successu, non adeo facile sanguinis increvit copia, & ob fibrarum laxitatem, majoremque humorum fluiditatem, siue sanguinem multo siccior imbutum, ægrius sit, ut crystalline particule invicem coeundo concreant. Præterea & hocce momentum singulariter meretur animadversionem, in regionibus marium & septentrionalibus longe plures, quam in calidioribus terris observari polypis mortuos; quod, meo quidem iudicio, præter aerem frigidum & impeditius perspirationis negotium, præcipue victui crassiori, ut piscibus marinis, potiùs grossiori & carnibus sumo induratis atque salis, ex quibus tenacior multique particule terrestribus refertus chylus & abhinc quoque sanguis spissior ingeneratur, tribuendum erit.

§. XVI.

Progredimur ad alias, quas procatarticas dicunt, causas pensandas. Ex his vero principum suo jure obinet locum, nimia sanguinis redundantia. Etenim, propter auctam, sub plethorico statu, vasorum distolent fibræ suam amittunt elatorem; unde eorum minuitur systole sanguinifuge progressus mirum in modum sit retardatus & perfacilis particularum terrestrium datur cohesio. Emergit porro exinde vasorum obstructio; quæ quantum polyporum generationi favet, vel unicum illud confirmat experimentum, à LANCISIO in cane vivo institutum. Constrinxit scilicet laudatissimus hic vir filo cerato ramum quandam arteriæ iliacæ, in qua, elapsis 15. aut 20. diebus, secato circa ligamentum polypolum invenit concretionem. *Vid. lib. de aneurysmatibus prop. XXXVIII. p. 124.* Nec adeo difficile est, hujus phenomeni veram enutere rationem, utpote cum, facta ejusmodi compressione, tenaciores & ad resor-

xionem minus mobiles sanguinis partes invicem adglomerate lateribus vasorum seculum paullatimque adhaerere incipiunt; donec aucta earum mole densum & fibrosum, quod polypi nominem venit, constituent corpus. Verum enim vero, non minus nimia sanguinis abundantia, quam ingens ejus inopia ad obstructions & concretiones polyposas viam pandit facillimam. Hinc mihi à magnis crebriusque reperiitis hæmorrhagiis sæpiissime morbos ex polypis ortos advertere licuit. Dum enim fibræ, ob nimiam distensionem laxiores porique redditi sunt ampliores, omnis generis crassos viscidolose humores transmittunt, qui polypis progignendis apprime existunt idonei.

§. XVII.

Proceritas corporis nimia, sicut ad varii generis morbos; ita præcipue ad polyporum generationem & omnia, quæ hanc excipiunt mala disponit. In excelsis enim, seu longe staturæ corporibus difficilior fluidorum ad perpendicularum est ascensus; hinc circulatio per totum corpus fit tardior & facile stagnationes obstructioesque oriuntur viscerum, maxime vero pulmonum; ubi sanguis difficiliter progrediens in minimis vasculis subsistit & succedentes ponderosiores partes succellu temporis in densam compinguntur massam. Si cui hæc non sufficere, quantumvis clara satis & certa; hanc plenius convincere potest tum mea, tum aliorum hæc de re experientia, quæ optime testatur, andræ proceritatis corpora humilioribus ut plurimum alacritate viriumque robore multum cedere atque morbis ex lentiori sanguinis circuitu & stagnatione oriundis, ut polyposis concretionibus, phthisi, asthma & dyspnoæ, aliisque, longe magis patere.

§. XVIII.

Nihil autem prope magis corpus nostrum adeo lædere tantisque eidem noxas & ipsam præmaturam mortem inducere valet, quam frigidus potus, post intemperatam corporis commotionem & incalcescentiam largiter & celeriter ingessus, de quo GALENUS, *lib. de sanitate tuenda*, præclare non minus quam vere ita sentit: quod spirandi difficultatem & tussim inducat, cerebrum debilitet & fluxiones inde concitet, ventriculum imbecillum reddat nervisque lædat. Ea namque perniciosa frigoris est potentia, ut non modo intestinum fluiditatis inonum sistendo sanguinem coagulet, verum etiam partes terrestres & gelatinosas præcipiter; unde non mirum esse debet, si obstructions, inflammationes, &c., quod in rem nostram dictum sit, humorum concretionem oriuntur, quas quotidianò quoque experimento conspiciere potest, si sanguis calidus & vena secta profluens in aquam frigidam immittitur, vel quando aqua calida, in quam sanguis missus fuit, interjecta mora, refrigeratur. Tum quippe, fibrosam & graviotem partem decedere ac præcipitari, jucundo comparebit spectaculo. Possent nunc quoque plura, eaque tragica proferre exempla, quæ exitialem frigidæ potus noxam luce clarius demonstrarent. At quum multa jam sint alio loco à me & viis doctissimis studiosè tradita, nolo his tempus consumere.

§. XIX.

§. XIX.

*Aliterum
et spirituum
abusus.*

Quantum ex censu causarum ad nocivas humorum coagulationes acidorum & spirituosorum abusus contribuat, quotidiana proli dolor & experientia loquitur, ipsaque confirmat ratio; si quidem certo constat experimento, sanguinem fluidiorem à vena emissum, affuso acido quodam liquore, vel spiritui vini rectificato in duram mox coalescere massam. Jam quidem facile nemo, qui rem accuratius examinas, dubitabit, hæc pariter in corpore humano, licet non eodem plane modo & tempore, posse contingere: si quis tamen dubitet, memor modo sit, in quam graves & diuturnas ex viscerum obstructione pullulantes morbos, quales sunt phthisis, cachexia, hydrops, asthma convulsivum & nimiae hæmorrhagiæ, strenui spiritus vini potiores sua ipsius culpa incurant.

§. XX.

*Animi
affectus.*

Nec reticere licet animi affectus, maximeque iram, terrorem & tristitiam; utpote qui polytorum & abhinc dependentium morborum generationi sit gravem suppeditant causam. Nolumus jam curiosius inquirere in abditas tam peculiaris effectus rationes, sed potius memorabiles quasdam in huius rei fidem adducere historias. Ex his vero notatu digna mihi videtur observatio MALPIGII, qua refert: ægrum, alioquin satis robustum, ex sinore in magnam pulsus inæqualitatem & obcuritatem, præcipue in sinistro carpo incidisse, absque febre & recurrente spirandi difficultate; sed brevi tandem post, per sputa, quandoque rubicundi sanguinis portionem, quandoque copiosa alba quædam frustula, polyptis haud dissimilia excrevisse; postremo vero, turgentibus superioribus, ex coercita sanguinis copia suffocationem interisse. RIVERRUS quoque *Cent. IV. obs. 21.* notabilem recenset casum cupuldam nobilis, qui quam graviore quodam & inopinato percelleretur terrore, de summo conquevisse est cordis tremore, spirandi difficultate pulsusque intermittente & inæquali, donec non adeo multo post suffocatione interiiit. Aperto post mortem pectoris cavo cor cum vasis maioribus oppleta fuisse & in sinistro cordis ventriculo inventæ sunt carunculae rotundæ, substantiam pulmonis æmulantes; quarum maior ad avellanæ magnitudinem accedens arteriæ sortis præcludebat ostium.

§. XXI.

*Incurant
adstringen-
tium usus.*

Ultimo loco non prætereundum videtur, præpositas illas in nimis hæmorrhagiis & intermittentibus febribus, per adstringentia, opiota, martialia & peruvianum quoque corticem &c. carationes ad difficiles chronicas & plane immedicabiles ægritudines, quæ à concretis polyptis nascuntur & fovetur, non parum conferre. Et profecto certa adseverare fide possum, me in praxi mea medica quinquaginta & aliquot annorum, nullum majus ab ullo remediorum genere, quam ab his ipsis intempestive & improvide adhibitis, observasse damnum, ita ut non modo celeres & lethales morbos, quales sunt apoplexie, epilepsie, catarrhi suffocativi; sed & diuturnas & chronicas passionem, ut phthisim, asthma convulsivum, malum hypochondriacum & hysteriæ, enormes hæmorrhagias, lentasque & hecicas febres hac ratione productas novem. Si rationem quarimus, unde tantorum

malorum origo; sciendum ante omnia est, morbosarum affectionum causam in impeditiori ac retardato sanguinis & humorum per minima & capillaria corporis vasa circuitu potissimum querendam esse. Tali enim ratione naturales se- & excretionem, quæ iidem per minima & ex subtilissimis vasis conflata emunctoria fiunt, mirum quantum retardantur & variz hinc inde flagnationes, viscerumque infarctus & indurationes cum mille aliis symptomatibus propullulant. Jam, si quis in tali rerum statu, ubi jam sanguinis & humorum crassities lentiorque fluidorum per canales corporis circulatio præsto est, vel ubi graviores, qui vasa fortiter angustant, spasmi adfunt, medicamenta adstringentia & humores magis incrassantia, vel etiam sedativa propinare velit; non poterit non insigniter nocere, & leve tantum malum longe gravius efficere. Id quod eo magis certiusque eveoit, si perverfus horum remediorum usus diutius iusto prostrabitur, nihilque superest dubii, quin polypti, seu immedicabilium morborum causæ, hac ratione sit commode possint produci, quos etiam in permutis morbis ab empirica hac & detestabili curandi methodo subortis partim ex signis haud incertis augurari & prædicere, partim ex corporum post mortem institutis sectionibus ob oculos ponere mihi licuit.

§. XXII.

Et sic causarum, quæ ad ingenerandos polyptos concurrunt, vidimus potissimas; omnibus enim seorsim explicandis diutius immorari, non adeo necessarium putavi, tum quod rarius occurrant, tum vero maxime, quod ad dicta à nobis persfacile possint referri.

CURA PRÆSERVATORIA.

§. I.

Ea est perversa mortalium indoles, ut raro principis morborum obflare cogitent, sed tum demum Medicum & medicinam anxie querant, quam mala per longas moras aucta & mortem in propinquo vident; unde vero nihil aliud efficiunt, quam ut fatalem sibi diem, quem tempestivo remediorum usu avertere potuissent, maturius accersant. Peccant sane in hac re eo gravius ægroti nostri polypti, quo certius & multa experientia testatur est, nonnisi difficilem ac dubiam, imo, ubi longius malum invaluit, plene nullam ipsis contingere sanationem. Si quid enim in huius generis morbis, qui impediunt sanguinis ob polyptum repagulum circuitu minuantur, auxilii; si quid opus expectare licet, maturum opus, eoque à Medico respiciendum est, ut concretamentorum istorum generationem in tempore impediatur, vel eorum, si jam adfunt, augmenta de noxiis effectus præscindat. Equidem jam, qua ratione hoc perfici debeat & quid utilissime hoc sine fidei possit, candide proponam.

§. II.

Et primo quidem, ut polyptorum generationem prohibeamus, omnis curatio dirigenda erit, ut sanguis ipsius diluatur & resolvatur, commodeque in is, qui ejus copia abundant, immixtuatur. Ad quod præstandum præ ceteris ineunda est recta vivendi ratio, quæ his fere momentis absolvitur: Victus eligatur parvor, tenuis atque humectans, remotis cibis, duris, acidis,

*Polypti
quæ præ-
sentant,
quæ re-
solvunt.*

*Polyptum
generatum
præcurre-
do con-
cretum de-
bet.*

salicis

falsis multumque alimenti præbentibus. Potus sit naturæ conveniens & bene dilutus. Quo sine commendanda est cerevisia levis & probe defæcata, vel pura aqua fontana, tum sola, tum ad vinum temperandum adhibita, vel etiam decoctum ex speciebus blanda aperitiva virtute præditis confectum, quas inter præcipue radices chinæ, korezonæ, sarsaparillæ & cortices ligni falsifursi &c. referre, lubet; tali enim ratione effectus diluens & resolutivus belle impetrabitur. His jungantur labores & frequentia corporis exercitia, quibus sanguinis fluiditas & æquabilis per singulas partes circuitus egregie juvatur. Sed probe sibi omnes, maximeque plethorici & obesi vitæ otiosæ dediti, cavere debent, ne motum repentino initio vehementiusque inficiant. Nimium enim exinde sanguis ad pulmones propellitur, ubi progressu suo impeditus facile coagulatum subit. Ad quod impediendum, mox aliquid calidi bibere præstat; quod eo magis necessarium est, si corpus ab intensiori commotione calidum postea refrigeratur, vel, quod pessimum est, frigidus porus in copia ingurgiat. Ad præterea sit purus, serenus ac temperatus, ique nec nimis calidus, nec nimis frigidus & humidus. Hic tamen si vitari nequit, idem consilium erit, insula theiformia nonnunquam calide adsumere, quæ transpirationis negotium promovendo egregium attenuantem molecularique coæstantes disjungentem spondent effectum.

§. III.

Exulent dein graviore animi affectus, maximeque moror, ira atque terror. Si quando vero ab istis alteratum corpus fuerit, mature in usum vocetur, quæ effrenis motus compescant & valde turbatum sanguinis circuitum aequabilem de novo reddant. Ita, si contra subiti terroris noxas pugnandum est, maximum mereatur commendationem medicina resolventes blandamque perspirationem moventes, quia hac ratione id, quod forte in humorum massa coagulari cepit, optime resolvitur. In hunc finem lummo cum fructu semper à me datum fuisse memini pulverem Marchionis, sive solum, sive cum aliquot liquoris mei anodynii guttulis ex aqua cinnamomi, vel melissæ citrate vineosè sumtum, cui non male aliquot infusuli calidi patellæ superbibere iussu; quam methodum etiam in iis, quos diuturnus moror is affectus confecit, utilissimum deprehendi. Præter hæc in vehementiori terroris affectu summo opere commendanda est moderatio corporis exercitatio, quæ cor adjuvat se facilius à sanguinis nimium congesti mole liberare poterit, ut eo minus dein mali quicquam timere debeat. Pellime itaque sibi consulat, qui statim à terrore quieti se tradunt vel somnum profundum capiunt.

§. IV.

Prospectatur dein, ut alvus bene respondeat, quæ si forte obstructa est, clysteribus mature applicatis, vel pilulis balsamicis solvenda est. Nec minori prudentia opus est, ut & reliquæ humores tam fecerendis, quam excrementis dicatæ viæ aperte liberæque servantur, ne, quod facile evenit, his oculis sanguinis massa impura reddatur. Inprimis autem curæ sit, ne quæ excretio sanguinis naturalis, ut in viris hæmorrhoidum, in feminis mensium, suppressatur, aut retento longior insuper habeatur. Tunc enim perficile periculose sanguinis ad alia loca sunt congestiones, quas providus artis peritus convenienti venæ sectione, pilulis & aliis medicamentis blande bal-

famici ac temperantibus quam optime poterit avertere: Nec denique artificiales sanguinis evacuationes sunt negligendæ, quæ eo strictius debent observari, si quis multo sanguine turgens ipsasque diuturna consuetudine quasi naturales reddiderit.

§. V.

Præmissis hæc diæta regulis, ex remediis classe, ad sanguinem spissum incidendum ac resolvendum, subiungenda sunt salia mediæ & alcalinæ naturæ, ut arcam duplicatum, tartarus vitriolatus, niterum, sal digestivum Sydenhæ, sal aperitivum nostrum, oleum tartari per deliquium, terra foliata tartari & liquor nitri fixi &c. Ex spiritibus hæc pertinent essentia pimpinellæ albæ, tinctura antimonii acris, & id genus alia. Nullum autem, quod scio, extoto medicamentorum penam datur remedium, quod in dissolvendis fibrosis & ad concretionem prunis in sanguine partibus tantam præstaret efficaciam, quam aquæ mineralis, præsertim illæ, quæ alcalino sale imbutæ temperaturique indolis sunt, quæ nomioe laudem merentur acidulæ Emisensæ ac Selteranæ, thermæ Aquægranensæ, præcipue vero Carolinæ, quæ sale suo omnia corporis emunctoria aperient, impuras sordes ablauit & evacuant, sanguinemque crassum & viscidum resolvunt ac diluunt utilissime.

§. VI.

Hactenus quidem modum, quo præcavenda sit polyporum generatio, satis, ut arbitror, dilucide monstravimus. Videamus nunc, quid faciendum sit, si jam signa quædam emicant, quæ polypum cordi vasique majoribus inhaerentem testantur & quæ ratione præcaveri debeat, ne majora capiat incrementa. Sciendum itaque est: ubi polypus adhuc incipiens est ac pueritiosus, non omnem abiciendam esse spem ejus resolvendi: quod salibus alcalinis & duplicatis, quæ exoptata tenaces humores resolvendi vi possent, diæta tenui, sufficienti & sanguinem diluente potu, omninoque maxime aquis Carolinis poterit præstari: quæ utrumvis prudenti administrato ego perplures, qui non vanam polypi intus latentis suspicionem incutebant, sanatos novi. Quod si vero jam in fibrosam & duriorē abijt substantiam polypus, omni studio contendendum erit, ne aut majora sumens augmenta, aut è loco suo dimotus vasa penitus obstruat itaque homines interimat. Ad quod efficiendum opus maxime omnium est, ut sanguinis nimia abundantia impediatur, ejusque fluiditas iis rebus probe conservetur, quibus id commode fieri posse superiori loco diximus. Sed cavendum, ne ubi spirandi à polypo difficultas est, vena in brachio secetur, quia tum major, imo suffocatoria fit congestio. Fugiant præterea omnia spirituosæ, nimis motus animique perturbationes, quæ singula sanguinem partem coagulando, partim nimis commovendo malum deterius reddunt.

§. VII.

Ultimo loco non inutile erit, quasdam cautiones, quæ sanguinis fluxus & motum febrilium tractationem concernunt, subiungere. In utroque casu quantum à Medicis diligenter, plurimis prohi dolor exemplis comprobatur & à nobis jam supra susus evicim est. Quapropter sincere monito, ne forte Medicus in hæmorrhagiis silendia curationem solis adstringentibus absolvere fatigat, sed potius convenienti sanguinis detractioe, &

V. Sicut
fac.

Medica-
menti
resol-
ventis.

Polypus jam
tutus inhae-
rentis quo-
modo res-
olvendi.

Certe
etiam
cum hæ-
morrhoi-
dum &
febrilium.

Animi af-
fectus
moderari.

Si ex-
crementum
libere fac-
esset.

temperantibus leniterque anodynis medicamentis, nec non inferiorum partium frictionibus aequabile sanguinis iter restituere laboret. Februm curationem quod atinet, summa adhibenda est cautio, ne nimis cito supprimantur. Quo scopo tunisimum erit, blandis aperitiuis & evacuantibus remediis decenter uti; quibus dein medicinae resoluventes ac temperantes cum roborantibus commode possunt inserpi atque subjungi.

CAPUT XI.

De affectione phthifica, five tabe pulmonali.

THESES PATHOLOGICÆ.

§. I.

*Pulmonis
natura
& usus.*

NUlla, si cordis machinam exceperis, in universo corpore nostris pars est, quæ ad vitam & tuendam & sustinendam præstantior sit usus, quam ipsi pulmones. Hi quippe sunt genuina sanguinis fabrica, in qua lymphæ chylosæ & nutritiæ cum sanguine minime miscetur ipseque assimilatur; hi sunt egregium illud vilicium, quo spiritum vitalem, seu fluidum æreo-aethereo-elasticum, quod conditi solidique partibus omnibus suum robur & vim systematicam præstat, intus hærimus. Quanta autem pulmones præ reliquis partibus utilitate gaudent & prærogativa, tanta è contrario, imo fere graviora sunt, quibus ipsi hinc inde patent, mala, quæ ego quædam à peculiari eorum textura deducere minus dubito. Hanc enim, ubi agere discipimus, ex meris veliculis membranaceis, quæ ætrem recipiunt, ex nervis, qui subtilissimum fluidum recondunt, & diversi generis vasculis, quæ sanguinem & lympham vehunt, deprehendimus constructam, ut usque eo non mirum esse debeat, si ob tot minimorum vasculorum myriades frequentes inibi sanguinis congestiones, stagnationes & obstrukciones; ex his vero varii generis oriatur ægritudines. Has inter præcipue referenda est pessima ista affectio, quæ in Medicorum scholis dicitur phthifica, de cuius origine, progressu & curatione in præsentem hoc capite strictum, sed utiliter disserere propoluius.

§. II.

*Phthisis
definitio.*

Est autem phthipsis, corporis contabescencia, cum lenta febre, spirandi difficultate, molesta & continua tussis atque copioso phlegmatico materiaeque corruptæ ac purulenta spatio juncta; ab infirmi pulmonalis substantia lapsæ, per scirrhosam vel ulcerosam corruptionem, vel abscessum indurata, ætium decur.

§. III.

*Differentia
est alius
modis.*

Equidem dantur variae, quæ iidem cum febre & nonnunquam molesta tussis ac viscosa materiae rejectione signatae sunt, tabis species; quas tamen, ob prognosin & curationem multum differentiam, cum vera phthisi non confundere debet Medicus, utpote sine notabili pulmonum labe contingunt. Ita, certa observationum fide constat, non raro tabem ex gonorrhœa simplici & pollutione nocturna, diutius infestante suam mutare originem, de qua jam olim HIPPOCRATES lib. VI. epidem. Sect. VIII. Text. 47. mentionem facit. Neque plane insolitum est, à nimio venenis usu, à caco-

chymia & depravata sacci nutritii indole in scorbuticis corporibus contabescenciam oriri; saluo tamen adhuc & integro pulmonum parenchymate. Idem fere animadvertimus in morbo isto, infantibus tam infesto, atrophis, ubi ob scirrhosam glandularum metastasauram indurationem succi chylosi & nutritiosi intercurrentibus liberum ad sanguinem iter prohibetur; unde superiores partes marcescunt, venter inflatur, lenta adest scabies, difficilis cum tussis spiratio urget, & alvus nimis fluida existit. Nec deinceps pro phthisi semper habenda est illa morbi species, ubi cum corporis extenuatione lentæque febre tussis & dejectionibus minus saniosa adest. Sæpiissime enim accidit, ut salva pulmonum compage, ex remotioribus partibus, ut mesenterio, utero, vel renibus, abscessus vel ulcere obiectis facies ad pectus transferatur. Denique etiam probe distinguenda est phthipsis à tussi valde chronica cum ejectione copiosi phlegmatis juncta, sequente tabe viriumque prostratione & calore præternaturali; quæ quidem mala autumnali & vernali tempore subiecta ad catarrhes morbos proclivia sæpe sepius corripuit diutiusque vexant, sed nihilo minus naturæ & artis beneficio feliciter cedunt.

§. IV.

Ne cui vero vel minima in cognoscenda phthisi seorsus ab aliis morbis differentia supersit delinquendi occasio, opere præsum arbitror, certa quædam signa, ex quibus vera phthipsis cognosci possit ac debeat, hoc loco recensere. Placet autem ex Veteribus, qui in hiis morborum conscribendis longe sæpe accuratioris esse solent recentioribus, locum CÆLI AURELIANI, qui lib. II. cap. XIV. legitur, huc transferre, qui ita se habet: *Phthis five phthoe si frequentius antecedente sanguinis fluxu, aliquando etiam longi temporis tussibus, five catarrho, quo thoracis profunde & intima partes lacerantur & primo lenius: Sequitur agrotantes febricula latens, sæpe quæ initium declinante die accipiat, atque veniente luce levetur, attestante tussibus pluribus initio hostis, si quæ fuit, cum spiritus sanies ex parvulis primo, deinde autem plurimus. Ita vero, qui ex fluxu sanguinis in istam veniunt passionem, primo sanguinolenta spuma effluunt, tum feculenta; dehinc livida, vel præcina: & in ultimo alba atque purulenta, dolida, vel falsa, cum voce rancia, aut clangosa, & difficultate inspirantis, atque genarum rubore, & cæteri corporis cinereo colore. Cibi satidum sequitur & major sitis; quibusdam gravis doloris sensus est vulnerati pulmonis, ut etiam quæ fibræ expuant, pulsus debilis, durus ac dris formiculis. Sequitur præterea inflatio pedum & præparata passio ventris efficiunt fluxus & phlegma carbonibus injecta tetri sunt odoris. Meretur deinde hic adduci HIPPOCRATES verba, quibus imminens phthificos signa eleganter tradit. Sunt autem in lib. I. de morbis text. 9. fere hæc: *Fu phthisis, si pituita à capite in pulmonem destillet, & primus quidem ut plurimum lateret desinit tussis, quæ tenem exhibet, & spiritum paulo amariis solio & aliquando tenuis adest calor; temporis autem progressu exulserant pulmo & intus ulceratur à pituita inbarente & putrescente, & gravitatem exhibet pectori & dolorem acutum ante & retro, caloresque acutiores in corpus incident. Quanto vero majus tempus progreditur, tanto magis pus sincerum effluat & febris acutiores sunt & tussis fortis ac continua, & iordina venat & tamen alvus inferne turbatur.**

§. V.

§. V.

Propositis itaque genuinis nostri affectus characteribus, videamus nunc, qualem tantorum malorum causis in disiectis phthisi defunctorum corporibus reperire liceat. Quo fine potissima quæ mihi ex innumeris auctorum observationibus & autopsia anatomica innotuerunt momenta paucis suppeditabo. Primo autem in omnium fere, qui phthisi ceciderunt, pulmonibus lobum vel dextrum, vel sinistram, vel utrumque simul pleuræ & costis, vel etiam in dorso vertebris adeo firmiter adhaerens deprehendimus, ut eum difficillime possit separari, plerumque etiam locus iste purido-fero, sive ichore scaturit. Deinde in nonnullis, præsertim emphysematicis, unum lobum à prægresso longo abhinc tempore pleuritico morbo, penitus absorptum, alterum inflammatum fuisse observavimus, qui mortis causam constituit. Tum quoque utplurimum in altero pulmonum lobo vomicæ, sive ulcera clausa, diversæ magnitudinis & numeri, adnotavi, quæ difficta partim pus crassum, partim fluidum continebant. Ubi in eodem vel altero lobo, maximeque superius ejus parte incisio facta fuit, cavitates præ amplæ pure & phlegmate, ejusdem fere generis ac coloris, quod per os antea rejectum fuit, sepe in conspectum venerunt. Fit porro nonnunquam, ut in pulmonibus nodosis & scirrhosis ulcera serpentina, fistulosa & instar cancri vicinas partes excidentia, quæ ichor foetidum & sanguinem recondunt, ostendantur. Nec defunt exempla, ubi tubercula scirrhosa & instar acinorum dura reperiuntur, quæ materia tophacea, calculosa & purida scaturit. Post ea non prætereundum esse existimo, quod cor plerumque flaccidum ejusque vasa polyposis concretione sunt infarcita, de quo phænomeno memorabilis exstat observatio in M.N.C. Dec. II. ann. IV. obs. 55. In pericardio quoque, imò non rari in ipsius pectoris cavo, ingens seri impati & foetidi dissoluti coagula. Quod denique ad abdomenis aliaque partes attingens, vasa utplurimum sunt exsanguia, hepares magne molis & pulliati, melenarii glandulæ tumefactæ, ovarium absolum tum & omnis in quædam tam intemæ quam externarum partium conspectui se offert. Qui paulo curiosior pura de phthisico rum sectionibus exempla legere cupit, consulat in M.N.C. Dec. I. ana. I. pag. 52. 63. Item ann. II. p. 15. ann. 3. pag. 190. Dec. II. ann. IV. obs. 30. & 31. ann. VIII. pag. 214. ann. IX. 245. Cent. II. & IV. obs. 118. Cent. VIII. obs. 105. Cent. IX. obs. 16. 26. Cent. X. obs. 133. VERZACHAM obs. 100. LOSSIUM obs. 11. PAWIUM obs. 22. PLATERIUM lib. III. obs. 189. 690. PEZOLDUM obs. 63. 64. 74. & 92.

§. VI.

Ex hisce satis apparet, quam gravis & demum exitialis pulmonum, seu viceris vitalis, sit læsio, quæ mortem inducit. Nunc erit inquirendum, quænam causæ ad tantam læsionem in exquisita phthisi contribuant. Has inter primo omnium referri debent læsæ scirrhosæ, substantiam pulmonum mere vasculosam, vesiculosam & membranaceam absidentes, quæ, si invalescunt, ob continuam & reciprocam aeris transitum aliaque causis, difficillime tollantur. Quæ de re dignus est, qui hic insensar, locus HIPPOCRATIS, qui exstat in lib. de intern. aff. cap. IV. in hunc modum: *Quum pulmo sanguinem in se ipsum traxerit, aut pituitam salsam, & non rursus* Frid. Hoffmanni Oper. Tom. III.

dimiserit, sed in ipso coacta & compacta fuerint, ab his tubercula sunt in pulmone & suppurantur: ab uno & per totum morbum tufo acuta sicca obtinet, & rigor & febris, & dolor in pectore & in dorso incumbit, aliquando etiam in latere & crella cervicis spiratio vehementer incidit, deinde corruptus pus & multum expuit. Nec possim, quin hinc HIPPOCRATIS verbis comparem: fere similia ARÆTI, quæ in lib. III. cap. VIII. exstant; phthisis, inquit, ante quam manifestis signis, præsertim spito purido & purulento & prædi morbus, in pulmonibus fuerint tubercula, sive nodos scirrhosæ, à materia viscosa lentescunt atque in duritiem abeunt, & ita tabidi per plures annos vivunt, aut quam in alium corruptionis vel abcessus transiunt. Hac si adit, in pulmonibus tufo sicca, valida, semper cum acuto vel purgativo feno in pectore spirandique & ficalitate indicium facit, & a præindiori aeris attractione & inspiratione aeris quædam & ventus in pectore percipiunt tui sine vehementior feno, maxime etiam post validum corporis exercitium.

§. VII.

Verissima quidem sunt allata HIPPOCRATIS & ARÆTI verba: nobis tamen nonnulla, quæ sint meliori illustrationi inferendum, adducere licebit. Tubercula ista materia viscosa repleta plerumque initium continent vomicarum, quæ nil nisi diversæ magnitudinis ulcera sunt, membranæ ambiente cincla. Ejusmodi vomicæ, si adhuc minores sunt, tui interdum ejiciuntur. Quod si vero mole sua in recessum interiusque punpunt, abscellus inde sunt & cavitates cum spito purulento, copioso phlegmate mixto, & tunc vera abest phthisis. At vero, quandoque ipsi hi nodi scirrhosi, qui diutius se na celant, ut præter siccam tuticulam vix ulla præbeantur indicia, ob materiam intus retentam & acrem factam in ulcus abeunt cancerosum & fistulosum serpens ac foetidum, quod ita vias partes confurit & in putrilaginem convertit, ut testis FORESTO lib. XVI. obs. 14. & 53. aspera arterie frustula ejeda, & juxta SVLVIUM in obs. lib. II. cap. 12. venæ pulmonalis furculi tui excreti fuerint.

§. VIII.

Verum adhuc sunt alia phthisens initia, maximeque hæmoptysis, ubi necesse ad mentibus tractatur, aut si paulo major cruoris portio est, quæ eadem amissa fuit. Tum enim si de sanguine ex pulmonum vasis lura velut aëreas extravasatur de si concepta putrefcit, partes vicinas corrodit ac demum sinuositates effundit, vel in nodos & tubercula cit. Et profecto, si vel meam unius hac de re experientiam adhibere liceat, certa asserere fide possim, dissimili fieri partem phthisicorum, qui se quæ meæ tradiderunt, ab hæmoptysi prægressa & male curata pyrami mali sui originem accepisse. Quibus dein quoque annumerari debet secundum Veteres catarrhus salus longo tempore pectus infestans, quem pressus, ut aiunt, pedes phthisica affectio non raro excipere solet. De quo in sequentiis plura dicemus.

§. IX.

Jam vero non immeriti quæri posse video, unde causæ hæj præpositæ originem suam habeant: nostra hac de re sententia hæc esto: sanguinis & humorum in valis stagnationes, vel si minus in infusum, sicut plurimum morborum, ita etiam phthisicos sunt genitrices. Fluida enim Bb quando

Sectio anatomica phthisicorum.

Phthisis a viceris & pulmonum læsione & tuberculis.

1) hæmoptysis 2) diarrhoea cum phthisi causa est.

quando extra motum progressivum constituta in circuitum non aguntur, pristinam suam temperatam naturam mora amittunt, & valde alienam, impuram, falsamque & acrem induunt; vel etiam minima vascula nimium oppendo obstructions, indurationes atque scirrhecentias efficiunt. Has vero perniciosas sanguinis & humorum in pulmonum vasculis stagnationes non aliunde fieri deprehendimus, ac si fluida in nimia copia & cum impetu ad partem, per se vixile languidam & à tono dejectam compulsa, congeruntur, ut, quantum venis ab arteriis receperunt, non possint reddere.

§. X.

Causa morbi a sunt dicta in hereditaria.

Verum quamplurimæ dantur causæ, quæ perniciem sanguinis & humorum in pulmonibus stagnationem inducere & ad phthisin removere conserre valent. Inter quæ præcipua debetur animadversio hæc editariæ dispositioni, quæ liberi à parentibus phthisicis progeniti, data occasione, in eandem labem incurrit facillime. Consensientem hæc in re habemus experientiam, fidissimam rerum testem, tum auctores probatissimos. Ex his audiamus saltem doctissimum FERNELIUM, qui in *patholog. lib. V. cap. 10.* hæc eleganter prodit: *qui tabida de stirpe facti sunt, quasi hereditario jure omnes necessario tabe marcescunt; locque malum sepius vidimus in ejusmodi familiis ordine grassari.* Et ratio quoque in promptu est. Etenim, quam illa à parentibus accepta ad morbum proclivius possidendum in prava partium soliditatem conformatione, siue tali fibrarum ac vasorum laxitate consistat, quæ humores appulsi non debito modo ac nisu ulterius possunt promoveri; in aprico est, cur illi, quorum pulmones natura debiles exsunt & flaccidi, præ ceteris in variis pectoris morbo maximeque phthisin sint propensi. Quibus dein, teste gravissimo HIPPOCRATE, adhuc si debent adnumerari, qui pectus à natura depressum & angustum obtinent, qui scapulas instat alarum promouentes, costalque in thorace protrahentes habent, nec non, qui oblongi colli vel etiam gibbosi sunt.

§. XI.

Temperamentum phthisicorum elicitum in juvenibus.

Deinceps certa constat experientia, & vel solius HIPPOCRATIS comprobatur testimonio *aph. 9. Sect. V.* homines, qui habitus corporis gracilioris ac tenerioris, stature proceræ atque ætate juvenes sunt, à xviii. ad xxxv. ætatis annum hæmoptysi æque ac phthisi valde esse obnoxios, vix aliam ob rationem, quam quod in hac ætate vasa sint teneriora longeque facilius, quam quidem in profectionibus, expansa dissolvantur. Ut plurimum vero omniumque facillime hæmoptica & phthisica accide affectio viris & juvenibus, qui tempore prædicti sanguineo-choleico facile animo commoventur & in pueritia frequentis narium hæmorrhagias perpelli sunt, prædicti si nimio motu incalescant. Tum enim sanguis magna in copia & impetuosius ad superiora & pectus compulsi per minima arteriæ ac venæ pulmonalis vascula libero itinere ad cor redire nequit; unde ramorum majorum à subiecte sanguinis nimis expansionis & disruptiones & denique extravasationes fiant necesse est.

§. XII.

Dieta perniciosa.

Ex diæta perversa causam hic præbet antecedentem incompensativam possum spirituosorum usus. Quod quidem non adeo difficili indiget

probatione, quam satis cuique spectatum sit, in regionibus visivis si ut omnes pectoris morbos, ita maxime hæmoptysin ac phthisin longe esse frequentiores, quam in aliis. Hinc etiam HORMANUS in *Hercule med. lib. 1. cap. 3.* rectissime arguit, phthisicam affectionem in Austria inferiori non aliam ob causam endemic grassari & tam innumeros rapere, quam ob vini generosioris, præsertim maritimo tempore, abusum.

§. XIII.

Progressivum nunc ad eas causas considerandas, quæ salvi humoris in pectore decubitus procurant, quem antiquissimi Medicorum promiscue ex capite deduxerunt, quasi passim ab eo humoris in pectus delapsus fieret. Sed non satis perspicuum & in experientia fundatum est hocce iudicium. Multo magis nimis sanguinis ferosi ad pectus, præcipue vero ad fauces totumque canalem asperæ arteriæ, quæ tunica glandulosa inserta obsta est, congesti accusanda videntur; idque eo magis in subjectis scrofulosis & graveolentibus, coryza, crubricis catarrhis per omnem ætatem obnoxios. Quod si enim plus sanguinis de feri ad glandulosas partes per arterias appellitur, quam per vasa venosa potest regredi, ingens ferosi laticis contingit secretio, quæ copia incessens, admissio aëre frigido, coagulatur & tandem magna sæpe copia ejicitur. Procedente tempore & malo diutius perseverante, accedentibus adhuc aliis causis, ut crustatibus ex prava diæta & digestionis vitio collectis, transpiratione impedita, vel profundo animi moreore &c. ferum induit naturam salis & corrosivam, adeoque successu temporis vesiculas pulmonales & vasa tenerissima corrodit.

§. XIV.

Ex dictis & adductis jam facili negotio poterit perspicui, quantopere rigidi & septentrionales venti ac tempestates pluviosæ, nebulosæ ac frigide, quæ tonum vasorum pulmonalium relaxando, sordes in iis accumulantes, tabidam ac phthisicam sint insensæ, ut propterea *aph. HIPPOCRATIS 10. Sect. III.* veritati omnino æstimemus consentaneum, qui autumnum expressis verbis tabidam declarat noxiam. Et profecto, si ullo in morbo ingignendo magna æris est potentia, est sane in pectoris affectionibus, maximeque phthisi, unde etiam TULLIUS in *obs. med. lib. II. cap. 10.* causam, quod in Hollandia tam frequentes sint vomice & phthises, locis uliginosis & aëri continuus vaporibus putrida refero tribuit rectissime.

§. XV.

Transimus nunc ad eos morbos inquirendos, qui ad phthisin disponere solent: inter hos vero primo loco referri debent variolæ. Hinc ego per plures novi pueros & adolescentes, quæ superata variolosa febre, variis subinde pectoris molliis per multos annos durantibus, ut tussi sicca, sensu doloris acuto, spirandi difficultate, tabe & lenta febre infestati, & accedente demum abscessu, mortui fuerunt, quos inter præsertim Serenissimum Saxoniarum Principem referre lugemus. Eadem scire certa luditur post morbillos. Nam in hæc exanthematicis affectibus magna scri peccat acrimonia, quæ non modo in principio horum morborum nervosis pulmonum membranis firmius inhaerens tullim siccam easque sat molestem concitat, verum etiam, expulsiōne materiæ ad corporis

corporis superficiem facta, insignem in hoc viscere debilitatem relinquit. Jam si aegroti forte maturius, quam quidem materia viscosa omnis transpiravit, liberiori, maximeque vernali & autumnali aëri sese exponant; per facile evenit, ut resistans male indolis materia ad interiora recedens ut plurimum pulmones debiles petat, irriter, exulceret. De quo legi meretur Thomas BARTHOLINUS Cent. IV. histor. 43. & MICHAELIS in praxi clinica part. I. lib. III. cap. 5.

§. XVI.

Noque plane insolens de ab experientia alienum est; ex albis pariter cutis efflorescens, ut scabies, gutta rosacea, maculis scurbicatis & purpura & retro pulsus phthificam labem sepius fuisse lubertam. Quod idem fieri observamus post suppreffos copiosius sudores, post interemptive tractata capitis vel pedum ulcera, vel etiam post fonticulis præmatute consolidatos. Nec desunt exempla, quæ etiam ab erysipelate, doloribique podagricis & arthriticis repressis, & incautius tractatis phthificam affectionem docent prognatam. Etenim, quum acris & caustica materia hac ratione intus retinetur & per venas ad sanguinis refoveretur, sit inde, ut ad nervosas easque tenerissimas pulmonum membranas delata firmus ipsa inhaereat easque irritando confringat; unde vasa coarctata obstruantur & demum corrodamur necesse est. Memini quoque, à curato tumore scincho sub axillis & pone aures phthificam affectionem inducunt, ut nihil denique dicam de frequentis phthicosæ ab hæmorrhoidibus vel mensibus suppreffis generatione.

§. XVII.

Denique non prætermittendum esse arbitror, dari exempla, licet non adeo frequenter obvia, quæ optime nos convincunt, phthificam tabem, præter supra dictam hæmoptysin etiam ab aliis fortioribus hæmorrhagiis commode in nonnullis posse induci. Quod quidem potissimum valde de eiusmodi subjectis, quæ vel per nativitatem, vel ob contractam ab aliis causis pulmonum atoniam ad hunc morbum disposita existunt. Cui aditioni sanam quoque rationem habemus susfragantem, quæ non minus superabundantem, quam deficientem sanguinis copiam siccis producentis nos docet aptissimam. Unde videtur, qui phthicos præcuratam causam in sola plethora repositam tenuant, quantum sibi & experientiæ contradicant.

§. XVIII.

Singularis superest questio, quæ in utramque partem à Medicis agitur, utrum phthisis sit contagiosa? Ego vero neutiquam vereor hoc asserere, vel saltem eo restringere, ut ejusmodi miasmata, si non ad phthisin inducendam, tamen, si dispositio jam adfit, ad promovendam existant idoneum. Nam mirabili certe & valde multiplicativæ indolis est omnis materia ulcerosa & corrupta, ita proflus, ut plurimi morbi maligni & per contagium grassantes, quales sunt scabies, lepra, varicellæ, ulcera antiqua fordida in peste carbunculi, imo quoque dysenteria &c. exinde deducendi veniant. Neque tamen tam malignam nostri miasmatis naturam esse censeo, ut è longinquo & subitaneo quasi impetu homines inficiat, sed tum demum, si quando propinquius & continuo cum phthificis convertentur. Confirmant nos in tali judicio ferendo celeberrimi in arte medica viri. Ita RIVERTUS

Frid. Hoffmanni Oper. Tom. III.

Cent. I. obs. 99. notabilem refert casum ancillæ, quæ per contagium heræ suæ, cui diu noctuque ministraverat, in phthisin incidit, & Cent. IV. obs. 92. mentionem inicit puellæ, quæ à forore phthifico quadam mamma præbente phthisin incurrit. Aliud exemplum nobis affert SCHENCKIUS, qui in obs. lib. I. obs. 133. memorat, ita contagiosæ esse confirmationem phthicosorum sputa, ut Medicus illa olfaciens factus inde sit phthicosus. De quo etiam consuli potest observatio de phthisi è contagio in M. N. C. Cent. IX. obs. 26. descripta.

§. XIX.

Progrediendum nunc est, ad prognosin nostri mali suppeditandam. Veram phthisin inter graves & curari difficillimos morbos vel primo loco esse collocandam, non modo in vulgus tot tristibus exemplis cognitum existat, verum etiam à Medicis longa experientia est comprobatum. Ipse HIPPOCRATES lib. I. de morb. sect. II. ita se jactat: *tabes cum sunt, necessitatem habent, ut interiantur.* Cui adducitur GALENUS lib. IV. de loc. affect. cap. 8. & V. method. med. cap. 1. & 8. & CELSUS lib. III. cap. 22. quod si vera phthisis est, inquit, inter iustis prout occurrere necessarium est, nec facile hic morbum, cum inveteraverit, evincitur. Ex recentioribus de insigni phthisin sanandi difficultate videtur FORESTUS observ. 45. lib. XVI. & Rodericus à FONSECA Tom. I. consil. 58. & Tom. II. consil. 38. nec non TIMONIUS à GULDENKLEE in epist. lib. III. ep. 2. ubi hæc habet: *ingens satur, in via mea praxi, quam 27. annis exercet, neminem ex his, qui ulceræ pulmonum affecti fuerint, integræ salutari restituerè potuit, etiam si nihil intrinsecum relinqueret, quod ad curationem hujus mali nullo modo facere poterat, neque ab aliis celeberrimis Medicis quampiam restitutum vidi.*

§. XX.

Verum enim vero, licet phthicosæ curatio sit difficillima, imo, si ad tantum sanguinem pervenerit, ut à vulgo quoque signis manifestis cognoscatur, supra omnem humanam ament posita; non tamen facile idem de omni, præsertim in incunabulis quasi suis adhuc hærente, prædicare. Namque plura mihi cognita sunt exempla eorum, qui à vulnere pulmonibus inflicto, vel à precedente hæmoptysi & raptione vasorum nascentium, nec non post pleuritidem & peripneumoniam peccoris abcessus & vomitis laborant, sed nihilo minus tempestiva medicatione à malo suo penitus fuerunt liberati. Pari ratione nihil & aliis obviante licuit, per plures à phthicosis parentibus genitos, qui pectus interius depreffum & scapulas instar alarum prominentes habuerunt, qui ad iam valde proclives sanguinem in puericia ex naribus, citra ullam causam externam, frequentius stillant, saltem ad fauces & pectus defluxiones cum tussis sicca & serena, æstivo etiam tempore insistenti, passi sunt, carnemque mirè amiserunt & non longe post passum calorem volarum percepērunt, florido adhuc genarum colore existente, in integrum congrua medicina & diæta fuisse restitutos. Imo denique pulmonum abcessus, ubi ingenti in copia pus tamen, æquale & unius coloris tui ejectionem, reliqua tamen pulmonum substantia nondum corrupta, nec fœtibus insularionibus, vel fistulis ulcerosis obiecta, neque cæcis & pulmonum vasa concretis polyposis infarcta fuerunt, convenienti methodo tam diætetica quam pharmaceutica feliciter vidi sanatos. Id quod innumeris aliis

Bb 2 exem-

Alia efflorescentia
& externa
materia mala
non est.

Nihil
à morbo
est.

Phthisis
de contagio
propterea

Phthisis
recentioribus
contagiosa
non admittit.

Set iactat

exemplis confirmare possemus, si ad longius ex-
currendum tempus nobis suppeteret.

§. XXI.

Cum enim
vires sunt,
expulsi.

Jam prævideo, quid obici mihi hic posset: scilicet, qui fiat, ut tam raro phthisis, vel tantum incipienti obtingat curatio. At vero, quæ id multo sæpius prohibent, variæ dantur causæ, quas inter hæc mihi possimilia esse videtur, quod non satis evidentiæ signa diagnostica semper suppetant, quibus de veræ phthiseos præsentia ejusque generis causis certiores reddamur. Quam in rem egregia sunt verba FERNELII, qui in *patholog. lib. 3. cap. 10. latens abscessus*, inquit, seu *vomica*, vitium imprimis abditum, sæpe nec laboranti, nec Medico notum, quo laboranti ipse nec confusa mentis intermissio, nec se morbo teneri putat, causamque interitus noscitur inaus perit sub pectore: non pauci tamen insinuat e viris bona quadam erepti sunt, in quibus dissimilis non alia mortis causa comparatur, quam repentina vomica in pulmonibus disruptio, quæ per suffocationem su viâ exstinguitur. Omnibus tamen sic affectis nullo non tempore ante, quam vomica rumperetur, adfuit cruenta cum tussi erythra, corporis gravitas, pectoris levis oppressio & stridor difficilis, quibus tabes raro comes. Sed hæc signa aliis quoque affectibus communia sunt. Præter hæc vero de admodum difficulti phthiseos diagnosi plenius nos convincere possunt frequentes Medicorum, etiam sæpe clarissimorum, circa eandem errores. Ita enim complures phthisici habentur, qui tussi chronica cum catarrhali deflusione affecti materiam paullo crassiores, coloris ex albo viridis rejiciunt, aut qui tussim stomachalem hypochondriacam ex vitiosa primarum viarum labora ad pulmones delatæ subortant diutius experiuntur. Fit quoque, ut asthma humidum, præsertim ubi post suppressas hæmorrhoidales vel mensium excretiones, factantque inde in dispositis humorum ad pectus regurgitationem & congestionem ortum fuerit, pro phthisica affectione non raro venditur. Nec denique obscurum esse poterit, lentam scibem cum tussi & repentina corporis extenuatione & colliquationis fuloribus junctam, quæ arthritide, podagra vel feebuto affectis nonnunquam supervenit, ad phthisin sæpiissime referri, cum tamen nulla in pulmonibus continui solutio reperitur. His vero ita constitutis, quam tam anceps, tamque difficilis veræ tabis pulmonalis sit cognitio; facile poterit colligi, quam incerta sit curatio, quæ illi debet esse superfructuosa.

§. XXII.

Quod ad-
huc affre-
ditur.

Sed accedit adhuc alia non minoris momenti causa, quæ phthisicos & inde subortæ hæticæ sanationem impedit: quod scilicet perpauci medentur sint, qui idoneis ad hoc negotium pertinentibus medicamentis recte & circumspecte uti norunt. Nam si ullo in morbo, certe in phthisi curanda, non tantam remedium contraindicationem Medici opus est prudentia. Postulat enim phthisis laxantia & humectantia, postulat leniora traumatica & adstringentia, imo postulat nonnunquam blanda anodyna &c. quæ nisi debita cautione iustoque tempore & exacta circumstantiarum habita ratione adhibentur, longe gravia mala efficiunt, tantum ab, ut levamina quicquam afferant.

§. XXIII.

Præmissa
generalia.

Præmissa hæc generalioribus ad prognosin

spectantibus, nunc de eventu morbi nostri tam salutari quam perniciæ pauca erunt subiungenda. Sciendum itaque, spem in angusto esse positam, si hæticus calor magis magisque increvit & pulsus etiam primo mane fertur citatior, si caro cum viribus consumitur, neque hæc aliquo modo per somnum resciantur. Quæ quidem mala plerumque eveniunt, si, quo plus puris adest, eo minus expectetur. Tum enim acris illud fit & sædus carbonibulque injectum tetro odore nares ferit, & eo magis quoque sebris augetur. Si porro accedit summa spirationis cum metu suffocationis difficultas; si ægri in eo latere, ubi læsio loci est, non possunt jacere; si odorem cadaveris ex ore spirant, si vox rauca, sudores colliquativi, diarrhæa & perit cum dolore quandoque juncta intumescencia supervenit, capillæ desiliunt, mortem in propinquo esse certissimum est. Quodsi denique expectoratio prorsus supprimitur, ægri sensim paulatimque, maxime sub situ capitis elationi, mentis satis com-
potes, spiricum emittunt.

§. XXIV.

Contra vero meliora sunt speranda, si vires ad-
huc constant & respiratio est liberior, si appetentia ciborum ac digestio salva, si spiritum, quod ejicitur, album & æquale est, nec sebris hætica urget. Major tamen sanationis spes apparet, si æger est boni corporis habitus, si pectus habet amplum, hereditariæ deest dispositio, & si calor sit mitior alvique compæcta deponit. Hæc enim ratione phthisici, præsertim convenienti diætæ & medicamentorum usû adjuvi per longos annos vitam sæpe possunt protrahere, quoniam in rem magni momenti sunt verba WILLIST, quæ lib. de medicament. operat. Sect. I. cap. 6. de tabe seu phthisi in hunc modum prodicit: *Accedit interdum, inquit, febris, quandoque, aut forsitan lina in pulmonibus efformari easque circum circa parietes callosi obtinere, ita ut materies ibi collecta in massam sanguineam minime transferatur, sed quotidie ita, copia licet ingenti expellatur. Taliter affecti, quasi tantummodo fontanellam in pulmone haberent, spiritum esse mollem & crassum, immo fæcibus & quasi purulentum omni mane, aliquantulum in toto die rejiciunt, tamen alias satis sanè degunt, bene respirant, comedunt & dormiunt, usque, aut saltem bono corporis habitu præstant & non raro perferant. Hinc nonnulli dicuntur phthisin per 30-40. annos habuisse & morbum cum usque ad vitæ terminum, haud proinde abbreviatum, protraxisse. Et profecto notabile est circa pulmonum ulcera, quod salvis reliquis visceribus sine notabili corporis contabescencia per plures annos possint durare. De quo videri potest KERKRINGIUS in *specilegio anasaræ*, abf. 72. & BARTHOLINUS *Cent. II. hist. 14.* Nec adeo conceptu est difficile. Ut enim natura interdum vitiosa excrementa per ulcus extremarum partium, vel etiam artificiale, ut fontanellam insigni cum emolumento expellit; ita cur idem non possit locum quandoque habere in pulmonum ulceribus, æquidem non video.*

§. XXV.

Sed demum non parum periti Medici interest, si
specialiora illa, quæ phthisicorum convalescentiam manifestant, signa probe nosse. Hæc quidem optime tradita legimus apud ARISTOTELI *lib. III. cap. 1.* quæ digna censemus, quæ huc transferamus: *Si veniant in melius phthisi laborantes, tussis longior & rarior sit, plura excre-*
nantur.

Cap. XI. De affectione phthifica, five tabe &c. 289

mutatur saniosa spuma & humidiora, multa per ventrem aqua exsternatur, urina copiosa excremitur, licet nondum quicquam in ea substat, vox sonantior clariorque redditur, somni longiores, quantum satis est, efficiuntur, praeordia remittuntur, dolor interdum ad scapulas in remissione transit, anhelus rarus, lenis, sed cum vocis asperitate sa: & ita sane mortem effugiunt.

CURATIO.

§. I.

Pro diversa mali phthifici statu atque conditione tam ratione temporis & causarum, quam respectu virium aegrotantis medendi methodus & aqua remedium appropinquatum applicatio multum omnium differt. Nobis tam in curativam, in mitigativam & praeservativam displicere placeat. Prior locum habet, ubi talis causarum status & circumstantiarum ratio est, ut spes restitutionis in integrum affulgeat & idoneus medicamentorum usus sanationem adhuc promittat. Mitigativa vero ea est, ubi tanta vis morbi est, ut eus expugnatio nec ab optimis remediis sit obtinenda, sed in id potius debeat incumbi, ut urgentia symptomata mitigando peioraque ac funesta auferendo vitam ad longius tempus prolongemus. Tertia denique praeservativa sicut in universum ad morbos graves praecavendos omnium est optima, facillima & securissima; ita etiam in nostro affectu, ubi adhuc est in incunabulis, principem suo merito locum tuetur.

§. II.

Accedimus jam ad methodum medendi curativam. Hac locum maxime invenit, ubi à vomica rupe abscessus apertus oritur & magna puris ejicitur copia, quod iuxta illam eventum post pleuritidem & peripneumoniam male terminatam, post haemoptiis & vulnera pulmonis infecta, saliva reliqua pulmonali substantia, etque nec citra, nec scilicet. Quo in casu nec rectius nec melius datur praesidium, quam lactis cura decenter usurpata, qua ego perplexis phthicos, in cyroba charontis quasi haerentes, sanatos praesentem reddidit valenadino novi. Nam si ullum est remedium, quod non heri aut nudius tertius natum, vel quatuor tantum experimentis comprobatum, sed quod triginta seculorum omniumque inter omnes nationes Medicorum jugi & constanti experientia saluberrimum & praecleari in phthisi curandae usus est deprehensum, certe est lac & cum hoc prudenter instituta curatio, de qua utilia quaedam hoc loco tradere oportet erit pretium.

§. III.

Et primo quidem ut certiores fiamus, lactis usum esse vetustissimum & primis mox temporibus, quo salutari arti majus statuere pretium coeperunt homines, ab optimis Medicis, seu summum phthicos remedium esse commendatum, è re erit, certa, quae id comprobent, testimonia ex veterum monumentis in medium asserere. Primum itaque, qui lactis plurimum in sanando tribuit, suo iure dicendus est HIPPOCRATES, quem postea secutus est GALENUS, qui multus est in commendando lactis ad phthidin usum, & lib. V. meth. med. cap. 12. mentionem injicit loci, quem vocat Stabias, aeris puritate, pecudum pabulo & lactis ibi emulsi salubritate celeberrimi, ad quem frequentissime confluebat, ad sanitatem recuperandam

Frid. Hoffmanni Oper. Tom. III.

elumbis phthificorum cohors; non secus, ac nostris temporibus ad acidulas & thermas, recuperanda per quas sanitas gratia, convenire quotannis agri solent. Qui mos & curandi methodus, teste ANDREA BACCIO, Romanorum doctissimo Medico, etiam ante centum annos in Italia viguit. Nam lib. IV. de theoriae eccegius hic auctor ita scribit: Neapolitani Medici pro ultimo remedio agros phthificos, & qui sanguinem effusum, vel ejusmodi theoriae ulcera & alia vitia patiuntur, ad Tabas mittunt, cum successu adeo salubri, ut sint, qui itam in iis degant vitam.

§. IV.

Est quoque inter veteres eosque periclitissimos Medicos ARETAEUS, qui lib. VII. de morb. ceterum dubitavit assilire, phthifico, si multum lactis potent, nullo alio regere auxilio. Praeterea vero hic refert de TRALLIANUS, qui in omnibus prope pectoris morbis lactis usum in suis de re medica libris summo opere suadet. Ita memorabilis exstat locus in lib. VII. pag. 309. ita se habens: quod si corpus tuum, alimentum non sentis constabere manifeste inceptis, neque thorax multum puris cohaereat, etiam solum lac ipsis dari debet, & ajunant omnia alia antecellunt, quod probe purgat. Alia loco contraveniunt: agere spiritus ajuna lacte adustus subinde conspersionem opportune efficit datur: omnia enim, quae pulmonem cavernis infixa sunt, reiectione reddunt murgera. Et de haemoptysi loc. cit. pag. 304. haec habet: omnes haemoptysi lacte manant. Neque enim medicamentum, aut cibum, aut aliud quippiam adeo accommodum ipsis ac utile, quam lac: & qui per initia solo ipso caustanter, longiori tempore usi sunt, omnes in totum sanaverunt. Porro addit: novi quendam, qui cum tota anno lac bibisset & comederet, & à vino abstinisset, ab haemoptysi & puris spuma liberatus fuit, ut nec postea in phthisin incidere.

§. V.

Verum enim vero, demonstrandum etiam à priori, eliquare lac tam celebre tamque incomparabile in pectoris morbis fit praesidium. Primum vero scire licet, lac nec unius esse generis, nec equalem quoad omnia virtutis, sed pro diversitate aumantium, & pabuli peculiares qualitas possidere facultates, quae fortiam sunt expendendae. Primum omnium se nobis offert lac aluminum, quod summo in pretio semper à Veteribus habitum fuit, multumque habet sili dulcis, sed parum tenace caleos & linguosius substantiam, quare nec tantie conspuitur & ad conficiendum caseum & butyrum minus aptum existit. Serum ejus abstergentius & laxantem, humectantem & acrimoniam temperantem possidet facultatem. Hoc sequitur caprillum, quod non tam serofum est, quam aluminum, neque tam bene laxat & abstergit, sed consistenter est crassioris & quia fronsibus arborumque aliquid resinosi cohaerent, velut caprae, ad consolidationem partium suppuratarum plurimum valet. Lac bubulum purius est, multumque terrea, sed minus feri habet; unde etiam multum ex eo butyri & casei confici solet. Habet virtutem temperantem, nuancientem & consolidantem. Humanum lac ad usum medicum praestantissimum videtur praestantissimum. Nam dulcissimum omnium est, ejusque nutritiis vis insignis abunde apparet in infantibus. Differt vero etiam lactis varietas pro diversitate pabuli & herbarum, quibus animalia vescuntur. Hinc lac vernale salubre

Bb 3 admodum

almodum est, quia tunc vegetabilia multis succis temperatis surgunt, cum contra luberrimum, quia tunc animalia feno & stramine vescuntur, minus salubritatis habent.

§. VI.

In pectoris morbis.

Hisc expositis facile oñc judicatur, lac ideo in omni pectoris affectu de tabescentia universale remedium dici de haberi posse, quod omnibus medendi indicationibus satisfaciatur. Primo enim, ad acrimoniam humorum, quæ irritationis, vehementioris tussis & corrhionis præcipua causa est, insigniter temperandam, mitigandam & demulcendam, lacte, præcipue vaccino nihil deprehendimus efficacius. Nam uti veneni corrosivi arsenicalis vim noxiam infringere valet, ita multo magis spicula salum corporis nostri involvere poterit aque obtrudere. Ubi porro scopus de intento est, viscidus & crassus humores detergere, ulcera purgandi, alvum laxandi urinæque motum si de humorum affluxum à paribus affectis divertendi, alinum reliquis omnibus, propter capiosum serum dulce abstergens, erit præferendum. Ubi virtus consolidandi & conglutinandi fauciatis partes expetit, capillam satisfaciatur. At partes vero tabe consumtas nutriendas & ad vires deperditas restaurandas, nec salubris nec valentius datur humano lacte, præsertim, quando ex mamma mulierum, nullo accedente aere, quo spirituosum elementum avolat, hauriatur. Quam in rem memorabile est, quod diciturimus WETZELIUS in *epist. ad Veracitatem scribit. Certe divini quid tam in humanam, quam asinum lacte latet, quod aures humanas crederet diffusa, nisi id fupibus comperissem. Vidi his meis oculis, quasi novus homines in le lactis fuisse. Non legi mox nos nlla habere firmorem, colorem nitidioram & vires robustiores plurimi acquirere.*

§. VII.

Ubi fere lactis.

Sed non modo in lacte, verum etiam in ejus fero, si rite paratum fuerit, magna & efficax, imo interdum potentior ad chronicas pulmonum & aliorum viscerum passionis sanandas virtus residet, quam in lacte ipso. Nam, si vasculorum in visceribus obstructions, quæ fere initium dant longis morbis, referandæ sunt aque expediendæ, si lentis ac tenaces humores dissolvendi, si emunctoria aperta servanda & partes calore torridæ sunt humectandæ, serum lactis, æ quocunque animali sit petum, ipsi lacti anteferi debet. Locum de hoc argumento suffus potest nostra *disseratio de mirabili fere lactis virtute.*

§. VIII.

Lactis usum in rebus adhibere ne cogit.

Ex hisce adductis clare liquet, non modo in pectoris affectibus, sed etiam in difficillimis morbis sanandis non sine ratione, sed consentiente experientia ab antiquissimis de peritioribus nostri temporis Medicis lac maximi semper habuimus fuisse. Totum vero arcanum in recto & prudenti ejus usu ad morbos tam curandos tam mangandos, unico consistit. Quod si cum quis de alimentis & medicamentis minus recte uti callet, plus detrimenti affert quam emolumenti. Quam regulam si in rimis ex recentioribus tenere debent, qui, nescio ex qua causa vel quo affectu, lactis usum medicum penitus rejicere, dammare & infamare unibus viribus concedunt.

§. IX.

Lactis usu.

Quamvis vero per se satis eximius sit usus lactis

ejusque feri ad multas indicationes in phthico curacione altissimè obfervandas; negari tamen minime potest, salutarem ejus energiam pro diverso scopo obtinendo diversis modis & rationibus secundari possè & exaltari: quod sequentibus demonstratur dabimus. Et primo quidem, lactis vis mirè intenditur ac vere medicinalis redditur, si animalibus, quorum lacte fruimur, pabulum medendi scopo accommodatum & quodammodo medicatum exhibemus. Etenim, à diversis alimentis, quoniam animalia & homines vescuntur, indole, lac etiam, quod præbens, differentem acquirere facultatem, non est quod dubitemus, præsertim quam vel quotidiano conflet exemplo, medicamentum purgans nutrici oblatum, per lac quoque infanti lugenti communicari. Laudandi igitur sunt antiquiores anis nutriz antilites, qui, ut lac meliorem obtineat efficaciam, asinum vel capris inter pabulum ejusmodi obulerant herbas, quæ ad mortuum, quem curantem susceperat, virtute apte specificâ splenduerant. Hinc est, quod GALIENUS *loc. cit.* memorat, herbas in Stabulis nascentes, quales sunt gramin, polygonum, medifophyllum, rubus, hedera, cyttus, lentiscus &c. lac ammannium, si lacte vescantur, efficere saluberrimum. Quem eximium morem de nos uique eo felici cum succellu sequamur, quando paria affectu absterctionem, vel depurationem moliri sumus, hortensum, scabiosum, lecorium, charrefosum, artem, hylosum, verumicum, marrubium album cum pabulo mitteri jussimus; si vero consolidandi sint mentio, plantaginis species, hederam terretrem, agrimoniam, millefolium, tanaculum, consolidam majorem, pulmonariam &c. pascui loco obfervenda curavimus.

§. X.

Verum, adhuc sunt alii modi lactis virtutem melius autem modo per varia intentione augendi. Scilicet per varias & appropriatas admixtiones, quas inter præcipue eninet miscela lactis cum aqua mineralibus; de qua ego, sine omni ostentationis nota, vere asserere possum, quod primus fuerim, qui ipsam in Germaniam introduxi. Nam quam ante triginta & plures abhinc annos aquarum salubrium, in nostris regionibus scaruerentium, tam calidarum quam frigidarum ingredientis enclitici chymica leutatus nullum sal acidum & vere viriolicum, sed potius alcalicum & medicum, cum subtiliori terra & tenuioribus maris particulis in ipsa deprehendimus, experimentum feci, lac cum ejusmodi aquis remiscendi, idque tam felici cum succellu, ut exinde in compluribus chronicis, maximeque pulmonum affectibus vel tollendis vel leniendis tam admirabiles viderem effectus, qui nec à solo lacte, nec à thermis vel scidulis locum adhibitis possent expectari. Unde mirandum, mo plane dolendum est, plurimos ames fuisse & adhuc esse, qui in phthisi & pulmonum exulceratione acidulas exilimant nocentissimas, easque nec per se, nec cum lacte mixtas adhibere audent. Duos tamen arce nostram atatem excipimus celeberrimi nominis Medici, quorum alter ex majoribus est *Raymundus Joannes FORTIS*, qui *Cent. II. Consil. 20. 27. 28. 30. & maxime 34.* acidularum usum commendat, dum *advertente inquit, tempore, quo aque acidule in valle solis exalceator opportuna sunt, quæ pulmonum ulceribus saluberrime ac præstantissima à nobis quandoque fuerint experta, ad cosdem tanquam ad unicam sacram anchoram conjungendum consulimus, cui remedia, si malum non cejerit, mi-*

mus decollis, lalli aliisque ejusdem facultatis ces-
sum fore arbitramur. Atque ex recentioribus est
MORTONIUS, qui medicatas aquas in pulmo-
num mortis salubres esse perhibet, plethj. ad p. m.
68. si pulmones tumoribus flectomatosis cum ca-
lore min hecico obfisti sunt, aque hoc paulo scri-
bit, plurimos plethicas multas annos harum aquarum
usu, cum appetitus & virium restitutione, ca-
loris hecici & tussi minoratione, & aque majori
respirantis libertate restituti & sine ulla recu-
satione sanos redditos vidi.

§. XI.

Ego autem licet in morbis, qui ex pulmonum
substantia soluta, præsertim graviori pendere, non
facile aquas minerales, quæ validioris indolis sunt,
suscipiam, multiplex tamen experientia confirma-
tur, illas ipsas, quæ mitiore obtinent ge-
nium salseque alcalino valde turgent, (ut sunt
fontes Selterani vel Carolinæ thermæ,) cum lac-
te five asinino five caprillo decenti proportionem
mixtas non modo in tussi chronica rebelli, cum
dolore thoracis compressorio, spirandi angustia,
leno calore & tæbe juncta, verum etiam in pro-
funda pulmonum suppuratione & vera phthisi
exoptatissimum præstissimè levamen. Hac enim
ratione ad lentam, viscidam materiam dissolvend-
am, ad obstructiones capillarum vasorum res-
ferandas, & ulcera detergenda ac depuranda lac
majorem & præstabilissimè acquirit virtutem.
Multo vero magis lactis cum aquis mineralibus
potus indicatur, quando hæc pulmonum vitia ab
affectione hypochondriaca, scorbutica, arthriti-
ca, vel etiam calculosa, quod non raro evenit,
suscitantur. Plura de consuetudine illi lactis & aquarum
saluberrimo legi possunt in dissertatione, quam
ex professo de hac materia conscripsi.

§. XII.

Fuit autem hæc methodus, lac per varias ad-
mixtiones corrigendi jam prisca Medicorum cog-
nita atque consuea. Hinc plura in HIPPOCRATIS,
TRALLIANI, AETHI & ARISTEI monu-
menta consignata existant exempla, ubi lac aquæ
permixtum phthisi laborantibus præceperunt, vel
etiam inprimis hydromel lactis aditum exhibue-
rant, cui miram HIPPOCRATES tribuit efficaciam,
dum lib. II. de dieta illud ipsam pulmonem emol-
lire, tussim sedare, spiritum educere & urinam
movere perhibet. Hæc dum meditamur, insignis
occurrit locus apud CL. SRONIUM in aphorismis.
notis Scilicet V. aph. 99. qui non modo externum
& vulnerarium, verum etiam internum aque
calcis usum in impetigine & lepra curanda sum-
mis effert encomiis, atque dein miscelam hujus
aque cum lacte egregie commendat, his verbis
Quin imo, inquit, quod magis mirum, in ulceribus
internis, diarrhoea, dysenteria &c. hæc aqua cum
lacte, aut sero lactis pota mira præstat, ut ex Duo
de la Cloire, celeberrimo inter Sanones & Va-
cosnes prælico addidit. Nec ego facile hanc metho-
dum improbare, siquidem in dysenteria cum
intestinorum exulceratione juncta lac cum sone
Selterano mixtum incomparabilis semper depre-
henderim efficaciz.

§. XIII.

Sed ulterius progrediamur, ac quibuscum aliis
remediis lac commodè possit jungi inquiramus.
Ad pulmonum vitia graviora in propriè sic dicta
phthisi emendanda insula & decocta ex herbis
vulnerariis & pectoralibus confecta non modo à

Medicis, sed etiam à vulgo omni tempore summo
in pretio habita fuisse, res in artis exercitio notissi-
ma est. Herbarum autem, quæ huic usui positissimum
accommodatz laudantur, sunt speciatim consoli-
da major cum radice, consolida faracnica, tussila-
go, plantago acuta, pulmonaria maculosa, fani-
cula, scolojendrium, scabiosa, veronica, agrimo-
nia, hederæ terrestris, marrubium album, millefo-
lium cum lammianibus, hypericum cum floribus,
flores rosarum & id genus alia, quæ vel cum cere-
visia, vel cum aqua, alpechtis ficulibus, melle, semine-
que sceniculi & anisi stellati coquantur. Neque de-
sunt exempla, quæ insigni cum phthisicorum emol-
limento hæc ipsa adhuc testantur, quum si sim-
plex salsè abscissis vel ulcus sine induratione scir-
rho, sine concretionem polyposa adsit, multo utique
ad præteritas lasas consolidandas potius conficere. Ni-
hilo minus non insiciendum est, quomodo decocta
non raro propter viem suam adstringentem magno
fuisse damno maxime ubi duria tuberculis pulmo-
nis inter initia tussi obfista, vel si quando ad hæ-
moptysin intempestive sillendam adhibentur. San-
guis cum extravasatus hac ratione facile subit co-
gulum, minimæque vascula obstruuntur, ut hinc
longe major sanguinis & humorum in pulsitibus
fiat stagnatio ad producendam veram phthisin ap-
tissima. Quod in periculum ne incurramus, ejus-
modi insula vel decocta cum portione vel æquali
vel dimidia lactis miscere præstat, unde vis eorum
adstringens ex parte infringitur & simul acrimo-
niæ humorum temperandæ prospectur utilissime.

§. XIV.

Quod si deinceps primæ viæ ab humorum vicio-
rum colluvie sunt repleandæ, solia sennæ, rha-
barbarum & manna cum lacte vel solo, vel aqua
de acidulis temperatioribus diluto, vel etiam
cum sero lactis commodè possunt insundi leniter-
que decoqui, quum alias phthisici, maxime si sen-
sibilioris sunt nature, facile à purgamentis, etiam
minutis, lædantur. Vidi quoque, ubi inprimis
luxurians acida sabburæ in primis viis progenis
sunt, magnesiæ, quæ nonnulli subtilissimus calcis
vivæ elutriatus flos est, ad drachmam unam vel
duas cum aliquo lactis caprini uncis datam egre-
gie alvum subduxi.

§. XV.

Ad tussim serenam omnesque vires cum somno
eripientem demulcendam, ad acrimoniæ tempe-
randam partemque conscrictas relaxandas Veteres
olim insigni cum utilitate diacodia, quorum præ-
cipue ex succis & semine papaveris sunt compo-
sita, adhibuerunt, recentiores vero massas pilularum
de cynoplosa & de styace, quæ iusta & refra-
ctioni docti propinata fructu suo non desistantur,
præscribere solent. Nihil tamen minus hæc singu-
la magis proficiunt, quando cum honsu lactis
circa formæ tempus offerantur. Expedit quoque
nonnunquam, ubi magnus humorum ad pectus
affluxus & major in tussi diuturna & phthisica cor-
ruptio metuenda est, ad divertendum humorum
impetum, quæ urinam cient remedia modeste in
usum trahere. Cui scopo iidem lac & ejus serum
in usum potest vocari ejusque vis diuretica aliquo
modo augeri, si cum seminibus siliæ, petroselinæ,
dauci cretici, milii solia, violarum &c. invicem
probe conquassatis insusum porrigitur.

§. XVI.

Præter jam dicta supersunt adhuc alia remedia in
læsiōe pulmonū phthisica tam ad depurationem,

Bb 4 quam

Quoniam
in ista
hoc sunt
proposit.

Le m'affir-
me par
ce que il a
vu en son
temps.

Cum lac-
tis & aquarum

Cum aut
diacodia
& diuretica

Cum insu-
la & de-
cocta.

Veluti
lactis & aquarum
cum lacte

mis per-
turbat.

quam ad consolidationem summe proficua. Quo nomine maxime splendent & effertur balfama sic dicta pectoralia & vulneraria; quoniam licet in Medicorum libris multe ac variae exstant formulae, nobis tamen probatissimas tantum & de peritissimis in arte viis inventas hic recensere placeat. Primum vero locum merito obtinet celebratissimum illud Meisomti, Professoria medici experientissimus, balfamum, quod ita componitur: *Recipe olei hyperici antiqui uncias duas, spermatis ceti drachmas sex, terebinth. Venet. purissime drachmas tres, sanguinis draconis drachmam unam, laudani opiat grana sex. M. detur ad drachmam una ad duas.* Nec minoris efficaciae esse deprehendi, quod in hunc modum paratur: *Recipe olei amygdalarum dulcium uncias duas, serum sulphuris à calce viva sublimat. drachmas duas + Coque leni calore. Adde balfami de Caparra drachmam unam, spermatis ceti, cere flavae ana unciam dimidiam, extracti croci drachmam dimidiam, oleum anisi, feniculi, macis ana guttas decem.* Quibus succedit tertium hac ratione conficiendum: *Recipe mellis entimi Prusici, diacodi Montani ana unciam unam, essentia myrrhe aquosa & inspissata unciam dimidiam, serum sulphuris, extracti seminatium melleisoli drachmas duas, croci liquidi drachmam dimidiam, oleum macis, ligni sassafras ana guttas octo.* Haec nobilissimae virtutis balfama, quando his typis indicato est, non meliori vehiculo, quam cum lacte asinino, caprino, vel vaccino, convenienti quantitate possunt exhiberi.

§. XVII.

Alvigen-
da inter-
na acci-
dens &
pauca com-
perata.

His ita excussis, quae ad methodum medendi curativam pertinere visa sunt, accedimus jam ad curam palliativam seu mitigativam, qua phthisi affictos à gravioribus & vitæ infestis accidentibus immunes reddere, ipsique vitam, licet valetudinariam diutius protrahere alaboramus. Hocce curationis genus in his potissimum locum invenit, ubi intensior carneque & vires scilicet deperdit calor urget, qui plerumque ob materiae purulenta cum sanguine mixtionem accedere solet, qua vitalis calor inquinatus per motum intestinum ebullit, acriorque & salior evadit. Ad resingendum igitur hunc aestum & acrimoniam humorum temperandam, remedium non datur lacte praestantius, tumque lac vel asinum, vel humanum convenienti dosi & sub iusta dieta exhibitur omne absolvie punctum. Eodem quoque sine emulsionibus, quae semina quatuor frigida majna, papaveris albi, decoctum hordei, vel Comu Cervi, aquam rosarum, liliorum convallium, cerasorum nigrorum, julepum rosarum &c. habent, frequentius possunt propinari. Horum lacticiniorum virtus miram adjuvat, si cum pulveribus temperantibus nitrosis, quorum magna, etiam in incipiente hectica, vis est, exhibentur. Possunt autem hi pulveres in hunc modum componi: *Recipe matris perlarum, lapidum canerorū ana drachmas duas, nitri purificati drachmam unam, olei destillati macis guttas quatuor. M. detur ad drachmam unam.*

§. XVIII.

Est-
aque dal-
tis.

Nec, ad mitigandam symptomatum atrociam, negligenda sunt balnea aquae dulcis cum decenti quantitate lactis vaccini & nitri purificati portione remixta, quorum beneficio partes stricte, tense & aride humectantur & relaxantur, nullisque, calor ac somnus placi flores redduntur. Quamobrem etiam in ista curativa methodo nonnunquam locum habere possunt astipulum.

§. XIX.

Ubi callosus & in veterato ulcere pulmo est, obfus-
tus ac quotidie spiritum pure mixtum, non sine no-
tabili corporis viriumque decremento ejicitur, uni-
ce providendum est, ut acrem salsamque sanguinis
& humorum dystrasum depurando, ulteriorem
pulmonum exulcerationem avertamus; quo sine
temperatiora insula, quae ex hederæ terrestri, ber-
ba costi, charesfolii, veronicae, scabiosae, tullia-
ginis & pulmonariae optime conficiuntur, sum-
mam meremur commendationem. Sed ut cre-
brius & satis longo tempore adhibeantur necesse
est. In subiectis scrofulosis & catarrhis obnoxii
ubi à magna humoris impuri ac serosi ad pulmo-
nes decumbentis colluvie malum inductum & sus-
tentatum fuerit, ad inhibendam majorem ad
pectus congestionem per potu ordinario decoctum
radicis chinae & ligni fantali rubri cum pas-
sulis, quod ab auctoribus summopere laudatur,
cum bonis ægrotum rebus poterit substitui.

§. XX.

Tandem quoque in tali rerum statu curandum
est, ut tonum pulmonum, quantum quidem fieri
potest, conservemus. Cui scopo obtinendo sac-
charum rosaceum cum praescripto decocto siepius
assumtum insigniter velificatur; quod simplex
remedi- genus non modo olim Arabum doctissi-
mi Medici, & inter hos maxime AVICENNA ma-
ximopere commendabant, verum etiam recentio-
rum nonnulli vel solum ad phthisin tollendam &
mitigandam æstimant idoneum. *Vid. ZACUTUS
LUSITANUS in praxi aërie. lib. I. obs. 139. & M.
N.C. Dec. II. ann. obs. 19. & SYLVATICUS in consil.*

§. XXI.

Transimus nunc ad curam praeservatoriam, cu-
jus ratio in eo consistit, ut truculentum hunc mor-
bum ab his, qui vel natura, ætate, corporisque
habitu, vel ex consuetudine in diæta erroribus ad ip-
sum proclives existunt, tempestive occurrendo
causis avertamus, aut ubi jam adit quædam in
pulmonibus lætio, eam convenienti remedium
ultra vel plane tollamus, vel ne ulterius progredia-
tur, impediamus. Jam vero superiori loco abun-
de satis evictum censuimus, in subiectis, temperamento
sanguineo-cholerico, corporisque habitus gracili-
ori præditis, ab anno ætatis XVII. ad XXXVI.
phthisin, seu spiritum purulentum cum magna tussi
& spirandi angustia junctum ex hæmoptysi non
modo plerumque nasci, verum etiam frequentius
repetere; quare praecipuus Medici labor esse debet,
ut cruenta hæc dejectio, seu gravissima & sonica
causa, perire omnibusque modis abigatur, vel
ita saltem moderetur, ne exinde ad phthisin fiat
transitus.

§. XXII.

Ad quod quidem ex voto exsequendum præter
maturam & sufficientem nonnunquam repe-
titionem sanguinis missione, nec certius nec securius
datur remedium. Qua in re consentientem habeo
omni tempore experientiam & peritissimorum
Medicorum auctoritatem. Sufficiat tantummodo
ex celeberrimi nostri avi Medicorum BOERHA-
VI, *praxi medica*, quam, ipso invito, anonymus
quidam edidit, dignum attentione locum hic
inserere, qui ita se habet: *Si quis hominem ex phthi-
fica familia natum vellet curare, tunc summa opus
est attendendum, ne hæmoptiam accipiat, si hæc
efficiat, tunc curabit, aliter non. Hinc circa
deci-*

acidæ cruditatæ progenies cum lenta febre est, ipsam sæpe observari nocentissimam.

§. III.

*Caveat
circa V.
Sæpe
purgantia.*

Sanguinis per venam sectam missio sicut in phtisi incipiente & ad hanc præcavendam, in juvenili ætate, est utilissima; ita scopo curativo, ubi per morbum & calorem vires valde consumptæ sunt, minus quadrat; nisi forte ad unciam tantum unicam aut dimidiam pro ventilatione sanguinis admittatur. Purgantia paulo validiora, ut aloetica, scammonata, helleborata, multo magis emetica, tum vires infringendo, tum temperatam humidum educendo, mirum in modum nocent. Hinc ubi humores à pectore derivandi leniterque per alvum evacuandi indicatio est, hoc sine magnata, tamarindinata & quæ ex rhabarbato, agarico & fenasæ foliis consistunt laxantia, omnium sunt commodissima. Quod si vero nimis humorum copie imminuendæ parva dosi data non sufficiunt, aut si humores nimis crassi & viscosi, qui minima vascula obstruunt, resolvendi & educendi sunt, pilulæ de succino *Crotæis*, aut quæ ex gummæ ammoniacis, croci, mercurio dulci, extracto rhabarbati, aloës &c. coalescunt, aptissime possunt substitui.

§. IV.

*Circa
motum.*

Motus & corporis exercitatio, maximeque exercitatio à periculis tum pristinæ tum novæ ætatis Medicis in hæctica & phtisi curanda mirum laudatur. Sed inter inertia morbi & ubi ætas juvenilis corporisq; habitus plethoricus est, hamopyrin sæpe revocando plus mali atceit. Neque eum utilis est, ubi ingens pulmonum læsio & vomitum præsentia metuenda est: nimio enim corporis motu, qui curru & equo absolvitur, quam facile funesta inducitur inflammatio. Longe tamen aliter res se habet cum tæbe hypochondriaca, in qua moderata sæpiusque repetita corporis exercitia locum inveniunt æquiditum.

§. V.

*Circa
aerem.*

Aër quo temperatior, quo purior & serenior est, eo magis phtificis deprehensur proficiat. Quod si itaque nimis humida ejus intemperies est, quo relaxato & ab infarctu tumido pulmonum visceri mirum quantum nocet; convenit omnino, atmospheratam corpus ambientem per suffragia ex mallicæ & succino paniculis balsamicis imbueri, vel per myrrham electam in ore detentam & saliva solutam aërem inspiratum balsamicum reddere.

§. VI.

*Circa
causam
phtificam
translatam
a catarrho &c.*

Quum sæpius à catarrho falso, vel acri quadam causâ materia ex aliis locis ad pulmones per mensuram translata exulcerationis phtificæ sit initium, ad affluxum hinc derivandum & evacuandum, totus non minus quam utilis esse præcavit cussici usus, quo inter scapulas & in cervicem adhibito inmentem phtidam scilicet sublatam legitimus apud RIVERIUM in *obs. Cent. II. obs. 61. 78. Cent. IV. obs. 92. & SCHENCKIUM obs. 56.*

§. VII.

*Circa
curam
per
alvum
& aquam
potabilem.*

Ad curam cum lacte vel solo, vel aquis mineralibus sumpto secure & efficaciter insistentiam, sequentes necessario tenendæ sunt cautiones:

I. Considerare debet inquiri, an ventriculus ejusmodi polleat robore, ut digerere iterumque expellere hoc medicamenti genus possit.

II. Consultum est, ut ante, quam ipsa portio suscipiatur, prima regio à viscidiorum & acidiorum humorum colluvie probe depuretur. Ad quod quidem perficiendum commodissimum est, insulam laxans manuum stimulo tartareo exaltatum propinare.

III. Præstat primis diebus lac vel asinum vel humanum mane hora VI. aut VII. & à meridie hora V. ad sex vel octo uncias haurire, & dein per gradus ad copiam paulo liberatorem ascendere.

IV. Quando per sex vel octo dies æger potationi indulgit, remedium leniter laxans & collectas interea sordes blande educens est interponendum, idque quovis sexto die repetendum.

V. Pro potu vinum & cerevisia exulter & potius præsens ex hordeo, Cornu Cervi, & corticibus citri eligatur. A cibis quoque, qui concoctu sunt difficiles & prave ingenerant succos, serio est abstinendum; contra vero jucula ex testudinibus, cancri fluviatilibus, carne virulina & gallina cum herba lactuæ & eichorei hortensis confecta eximie sunt utilis.

VI. Denique ad vim ventriculi concoctricem, quæ semper fere languet, promovendam elixir quoddam balsamicum pectorale & stomachicum, quod myrrham electam, crocum, nuciflam, cortices aurantium, trifolium fibrinum & radicem glycyrrhizæ habet, inter epulas assumere expedit.

§. VIII.

In nimis & colloquacivis sudoribus, qui in phtisi & hæctica vires mirum exhauriunt, præter serum lactis & emulsiones, species de hyacinthio, si cum refracta portione nitri de dimidio laudani opiatæ grano pro dosi miscerentur, eximium afferunt solamen. Quod si vero à vehementia tussis, quæ valde exagitur sanguinis & humorum massa, nimia sudoris contingit profusio, lenè & correctum opium, quod est massa pilularum de styrace, vel *Wildeganii* cum pulvere temperante optime datur, utpote quod tussim sedando sudorem compescit. Si vero præter tussim colligans massæ sanguinæ æstus sudoris causa exstitit, clarissimi viri MORTONIUS & PITCAIENIUS corticem peruvianum cum grano laudani opiatæ præscribere non verentur.

ENARRATIONES MORBORUM.

OBSERVATIO I.

Studiosus XXV. annorum, natione Frisus, Tenet & macilentus corporis, ob inordinatam vitæ genus, maximeque frequentiores à vino & spiritu vini crapulas ac desolandum verberis abusus, vernis superioris anni tempore incidebat in tussim, cum febre catarrhali, tam vehementem & continuam, ut omni somno privatus vires mirum amiserit. Tussim siccam excipiebat, valde humida, quæ ingentem lentæ & viscidæ phlegmatis, variegati coloris, rejiciebat copiam. Aderat simul magna pectoris angustia cum spirandi difficultate, atque invalescens febrilis æstus non modo carnem penitus absumebat, ut insileret sceleri æger appareret, verum etiam vires ita prorsus enervabat, ut movendi potentia, imo ipsi sensus imminui viderentur. Flures ex

Medi-

Medicorum numero consulu, qui pectoralibus, analepticis, fero lactis & pulveribus temperantibus nitrosi tamen morbi perniciam oppugnantur & nihil penitus, quod levamen ullo modo ferre posset, intentatum reliquerunt: sed quum ex omnium sententia nihil spei ad salutem reliquum videretur, evenit, ut fragis hortensibus vescendi appetitus flagraret. Admisit ex permissioe nostra quendam & succum suxit ac deglutivit, idque crebrius repetit, nihil inde turbatum in prima regione, sed vires potius quodammodo relevatas sentiens. Quod quum animadverterem, diutius horum fructuum usum protrahere iussi. Paruit ager consilio & per diem magnam quantitatem cum appetentia devoravit. Et eni prodigio similis conspiciebatur effectus. Elapsis enim tribus hebdomadibus quum pro quindecim imperialibus ager comedisset, vires, quae antea praeteritae deiectione erant, magis magisque se erigebant, ardens calor deservescibat, noctes erant placidiores, tussis minor, respiratio facilior & sic contra spem omnium eveniebat, ut intra duorum mensium spatium optime convalesceret.

Epiqrise.

Instar miraculi certe haec cura in hac urbe habita fuit, quum ceteris, etiam probatissimis remediis, nihil juvantibus à fructibus, succo refrigeranturgidia, natura optimum levamen acciperet. Ex quo dicitur, latitare interdum in vegetabilibus & fructibus specificam quandam adversus graves & diuturnos morbos efficaciam, ita, ut etiam malorum chinensium satis diu continuato perniciem icterum sublatum, & largiori malorum persicorum usu affectionem melancholicam novem sedatam, Temperati quippe & fermentescibilis ejusmodi succi egregia pravam humorum dyscrasiam immutanda vi possent.

OBSERVATIO II.

Studiosus Hallensis xx. & aliquot annorum, qui per annum, & quod excurrat, otio, veneri & Baccho multum inhaeravit, à parentibus ad justam temeritatis poenam luendam in carcerem traditur. Sed inde ira valde commotus non nullum post assilignitur truculentis imi ventris torminibus & spasmus, pereunte simul ciborum appetentia. Accedebat tussis sicca convulsiva, quae noctu maxime infellans omnem fere somnum admovebat. Jungebantur agra spasma & incendium carnem cum viribus mirum consumens. Sub tali rerum statu, quum ager omnia fere medicamina respueret, pro potu ordinario pilulum ex hordeo & Cornu Cervi paratam & mane ac vespere ferum lactis acidulum, adjectis cancerum lapidibus temperatum, cum syrupo papaveris albi allumendum commendavi. Tullum succum succedebat valde humida, qua miram phlegmatis purulentam cum stris sanguineis mixti reddebat copiam, itaque spirandi angustia vexabatur, ut in momenta suffocatio instillare videretur. Ordinavi igitur hac assumendo mane & vespere ad libitum unam & ultra bibendum; & ut alterius diebus mane pinguedinis canina recentis uncia dimidia, circa decubitu vero pulvere temperata cum duobus massae pilularum de styrace granis maritato uteretur, suavis fuit; unde assus paulo minor, somnusque placidior heri cepit. Absoluta post aliquot hebdomades hac lactis cura accessimus ad decocto-

rum, ex speciebus vulnerariis & pectoralibus comminatum usum, qualia composuimus ex herbis veronica, leucobolae, sanicula, agrimoniae, bederae terrestres, scolopendriae, plantaginis acutae, quas invicem cum cerevisia secundaria, adjectis sicibus & melle, decoqui iussimus. Inter alimenta praecipue lac cum amylo & oryza mixtum, nec non placentas ex farina triticea tenuissima, lacte, buryro & vitello ovi cum passulis minoribus & concisus ponis Borsdorffianis confectas commendavi. Quorum remedium ope, absolute duorum mensium spatio, integre convalescit.

Epiqrise.

Plura mihi in memoriam incidunt exempla juvenum, qui ex immoderato vini & spiritus vini usu in phtisicam affectionem prolapsi ejusmodi remediis, contra spem omnium pristinae sanitati fuerunt restituti. Nec adeo obscura est hujus rei ratio. Evenim in juvenili & vegeta aetate, ubi, reliquis viticibus salvia, humores à nimio spirituosorum potu valde exaginati per externam refrigerationem, aut alium affectum in pectus decumbentem subsistunt, indeque inflammationem & abscessum formant; contra ut temperantia & consolidantia remedia plus laetis afferte solent, quam ubi admodum viticera obfiratione alioque virio laborant, vel ipsi pulmones à longo tempore laetum contraxerunt, vel etiam concretionibus polyposis sunt repleti.

OBSERVATIO III.

Vir xl. annorum, sanguineus, ad iram Phlegma valde proclivis, olim militiae mobilique ^{ex as et a} inordinato vitae generi deditus, nunc in otio & quiete vivens, neglecta, cui antea fuerat, venae sectione, varia ad fluxum haemorrhoidalem sensit molimina; qui cum minus succederet, venae sedales cruore inibi stagnante satum dolore & ardore valde incommodebant. Accessit Chinurgus hunc tumorem externe corrosivis tractavit remedium; unde ulcus prodit moris fistulosum, quod laetis serpendo, vicinas partes exedit, nostrumque per annum & ultra pellens cruciavit incommodis. Consulti itaque sunt alii rei medicae & chirurgicae magis periti, qui per sectionem & remedia convenientia interna consolidationem ulcers procurarunt. Sed elapso mensis spatio vehementer ager corripiebatur tussis, qua in gravelescente non modo multum & viscidum & purulentum materiae exspuebat quantitatem, verum etiam quae adsumebat alimenta, eo vehementem ventriculi irritationem, fere omnia reddere coegebat. Aderat simul magna spirandi difficultas; corpus, quod antea sat pingue & robustum erat, tabe consumi, vires cum appetitu profleri & alvus supra modum fluida fieri incipiebant. Medicamentis contra haec mala praescriptis nihil proficientibus, ego tandem vocatus aegrum accessi; & quum pulum non adeo celerem, nec calorem, nisi post tractandae aesculapiae, in quem vel levissima data causa facile incidebat, magnum deprehenderem, sequentem ingressus sum medicandi methodum.

1) Pro potu ordinario commendavi decoctum ex radice chinae, salsaparillae, scorzonae, ligno cassiae & heris saniculae, pulmonariae & marrubii albi, additis passulis & sicibus, confectum.

2) Ad sedandum vomitum & ventriculi roboran-

roborendum exhibui elixirum nostrum viscerale, cum dimidia liquoris anodynii mineralis & essentia corticum aurantium portione remixtum.

3) Cremor hordei cum amygdalis dulcibus, vitello ovi & saccharo cando, adjecto quandoque olei amygdalarum dulcium cochleari, aut pinguedinis caninae recentis portione, saepius fuit oblatum.

4) Bolus armeniae cum extracto millefolii & florum chamomillae vulgaris aequali pondere in pilularum formam redactum circa horam decubitus, singulis fere diebus, ad drachmam unam assuere iussi.

5) Fonticuli utrique brachio fuerunt inusti, qui magnam ichoris secundi quotidie fundebant copiam. Nec denique sanguinem e vena tali tusa parviori quantitate detraxere negleximus.

Quibus remediis intra sex circiter hebdomadam spatium id per Dei gratiam consequuti sumus, ut ager à molestiis, quae antea valde urgebant, symptomatibus liberatus, pristinae integritati fuerit redditus.

Epiresis.

Phthifica haec affectio à metastasi, seu, ut Hippocrati dicendis mos fuit, palindrome, tum sanguinis per haemorrhoides exitum non invenientis, tum materiae ulcerosae ob fistulam consolidatam intus retentae sicut traxisse originem videtur. Neque ignotum, sed in re medica facis obvium est, ab antiquis ulcerosis fistulosis, & foniculis quoque praemature consolidatis, à humoribus glandularum scirrhis, ut colli & parotidum testis, à gutta rosacea, scabie & aliis cuius desfectionibus per topica imprudenter cohibitis, materiam viscosam excrementitiam, per metastasin ad mollem & spongiosam pulmonum substantiam translatam ibi per moram ulcus formasse. Quae cum ita sit, ad derivandum ejusmodi decubum haud sine ratione foniculos brachii admoveo pulvis, & reliquam curationem non valis, & humores multum exagitantibus remediis, sed potius lenissimis temperantibus, demulcentibus & roborantibus perficiendam judicavi.

OBSERVATIO IV.

Formina xx. annos nata, de molesto sinistro hypochondrii dolore, alvo adstrictiori & contumaci tussi humida duo conqueffa incidit ante biennium, praegressa fortiori corporis commotione, in haemoptysin, ad quam sedentem ipsi à Medici pariter ac vulgo varia & sine dubio adstrictive indolis oblata fuerunt remedia. Cessavit fluxus, nec postea rediit, sed simul menstrua purgatio, quae facis antea liberalis fuit, emansit, & tam proxima angustia cum pectoris oppressione & insigni virium decremento successit spiratio. Ante anni spatium molestia eaque continua tussi elidebatur materia parafenta, cum stris sanguineis & muco viscido sat copioso mixta, corpus magis iniquique ob depressam ciborum appetentiam contabefcebat, virium indices major erat lapsus, augebatur calor, pulsuumque à summo cibo celeritas. In tam miserabili statu posita à me petie consilium agra. Ego itaque curam lactis asini cum tertia parte fonsi Selterani mixti, & crebriorem sacchari rosacei usum per mentem & ulera continuandum iussi, interposito circa vespere pulvere temperante ex conchis praeparatis,

lapidibus cancrorum succo citri imbutis & paululo nitri composito, quem cum emulsione seminum ty. frigidorum adsumere debuit. Cerevisiam quoque pro potu interdixi, & denique ad ventilationem sanguinis parciorem venae sectionem circa fossilia & aequinoctia commendaui. Quae methodo probe observata, quam insigni virium allevamentum percipere agra, per literas mihi magnas egit gratias pro consilio & auxilio, non sine fructu suppeditato.

Epiresis.

Si ullo in morbo Medici perversa medicamentorum applicatione miseris ægrotantibus multum afferunt damni, certe in nimis sanguinis excretionibus per adstringentia id fieri certissimum est, ut ideo non modo de adstrictivis validioribus praepollere usurpatis, verum etiam de mitioribus, quae innocentius alias indolis sunt, vulnerariis & pulmonariis, imo ipso Peruviano cortice trifles quotidie casus attentioni Medico in artis exercitio observare liceat. Et hinc nihil prope frequentius occurrit, quam quod ab haemoptysi, per ejusmodi adstringentia perperam tractata, phthifica affectio suam trahat originem, de quo quidem optime praemissa morbi historia convincere nos poterit. Quod vero si incidit, statim inter initia morbi, quae potissimum in humoris corrupti & putrefacti flagratione vascularumque pulmonalium infarctum consistunt, succurrendum est, quo sine securis nec praecientius datur remedium asinino lacte, cum fonte Selterano, vel Carolinis thermis ad dimidiam vel tertiam partem permixto: cujus remedia ope obstructions & flagrationes dissolvunt, acris & tussi humores temperant, ac denique per alvum & urinam educuntur utilissime. Praeter haec vero quam simplicissimum hocce remedium laudabili exsuccas partes nutriendi vi polleat, nihil dubii est, quam simul viribus insigni accedat augmentum. Nec quidquam exinde detrimenti in corpus redundat, si modo secundum regulas, quas supra praescripsimus, rite usurpetur.

OBSERVATIO V.

Ego, quam non ita pridem in aula vicina Martusburgensi versarer, à doctissimo Archiatro Dno Claudio reletum audivi singularem casum, qui ita se habet. Vir aliquot supra xxx. annos natus, boni & pleni corporis habitus, robustae naturae & integrae semper valetudine gavisus, ante duos circiter annos in dextro thoracis latere dolorem periensit praeflorum cum spirandi quadam angustia, maxime sub ascensu scalarum, junctam, nihil minus amplissimum, quo fangebatur, munus alicum sine ulla molestia obit. Sed accidit, ut in natalis Principis à frigido potu, in corpus saltanda commotum & calcfactum liberalius immissis, proximus de insigni corporis viriumque languore conqueffus, per universum corpus horrorem tantaeque pectoris compressionem perciperet, quae omnem spirationem adinere videbatur. Sequelatur postea intensus febris calor & ingens cum tremore artuum tussienodi conatus, sed sine omni expectoratione; noctes transiebat ager insomnes & elapsis septem diebus suffocatus animam expirabat. Corpus disseccandum iussit Dux Serenissimus, & ecce pinguedine, quae duos pollices latitudine aequabat, totum corpus erat obducum. Omentum apparebat multa

Phthi-
ca, ut
ab illis
et per
hoc, quod
occurrit.

Insuper
notum
est de
phthi-
ca, ut
per
hoc, quod
occurrit.

multa pinguedine instructum & reliqua imi ventris viscera, hepar, lien, pancreas, renes sana erant & integra. Aperto pectoris cavo primo omnium in conspectum veniebat pericardium, quod præter multam pinguedinem nihil ostendebat præternaturale. Incisione facta in dextrum cordis ventriculum conspiciebatur concrementum crassioris substantiæ polyposum, quod in venam cavam tam adscendentem quam descendentem protensum harum capacientem valde ardebant. Insuper pulmonibus lobus dexter, qui collis veris ætistissime accretus difficillime poterat separari, materie innatabat fortidae & purulente, libras propemodum duas pondere æquantis, in qua complures corruptæ pleuræ partes hinc inde hærebant dispersæ. Diaphragma quoque in superiori parte ab incumbente putrida materia valde corrosum & sinistram pulmonem lobum, qui adpectu sanus adparebat, culro dissectus tota materia corrupta purulenta erat repletus.

Epiçrisi.

Licet morbus, quo vir generosissimus perit, non proprie ad phthisin referri possit; cum tamen in hunc finem potissimum hoc loco inferre lubuit, ut evidenter adpareat, quam brevi tempore & quam facile vitale pulmonum viscus in sano & integro corpore possit lædi atque lethaliter corrumpi. Causam tam atroci & subitanæ catastrophæ jure meritoque rejiciendam puto in subitam inflammationem, quæ in corpore plethorico & vasis cordis majoribus polypos obiectis liberiorumque sanguini motum prohibentibus per potum frigidum calenti corpori ingurgitatum inducitur in magnum abscessum degeneravit, qui cessante expectoratione celeriter incretens totamque pulmonum substantiam depascens brevi spatio vitales exstinxit motus.

OBSERVATIO VI.

Studiofus juris XXIV. annos habens, corporis tenerioris ac stridoris, stature mediocris, ex liberaliori vini potu & paullo vehementiori corporis sub pilæ lusu exercitatione incidit ante biennium in hæmoptoen crebrius recurrentem; Sedata hac sanguinis rejectione, dolorem in pectore pressurum cum spirandi angustia corporisque marcore retinuit. Sequēbatur postea immanis tussis circa decubitus maxime, ob molestiam muci in laryngem destillationem, infestans, qua magnam sputi mucosi & quandoque purulenti reddebat copiam. Interim adhuc salva gaudebat appetentia, nec quidquam à summis cibis molestiæ, nisi quandoque, quum medicratis regulam neglexerat, pressurum in ventriculi regione dolorem sentiebat. Non multo post accidit, ut ob contumeliosam cum commilitone contentionem gravi percelleretur iracundia, unde mox in pejus conversis omnibus, de ciborum fastidio, majori præcordiorum anxietate & somno inquieto conquerebatur. His tandem, prævia horripilatione, jungēbatur febris continua, tantaque spirandi & expectorandi difficultas, quæ, omnem adincedum spiritum, perpetuam minabatur suffocationem. Adhibebantur optima, quæ in hoc casu commendari solent, remedia, sed in cassum datis omnibus, æger brevi post animam efflavit. Dissecto cadavere menterium, omentum omnesque reliquæ interiores partes pinguedine fere carbant. Ventriculus cum duodeno

Frid. Hoffmanni Oper. Tom. III.

rubicundis maculis erat obfessus & pulmones, qui beuni erant coloris, pleuræ fere undique & in utroque latere tenacissime adnati inveniebantur. Dexter pulmonum lobus scirrhosis tuberculis & parvis vomiciis obfessus sanguineque extravasato repletus videbatur. In sinistro conspiciebatur cavius, contenta materia purulenta turgida; cupas quantitas non minoris diffusi posse videbatur, quam quinque unciam. Denique dextrum cordis ventriculum occupabat polypos, tamen sat magnum in arteriam pulmonalem emittens.

Epiçrisi.

Quod hic juvenis diu admodum ab hæmoptysi sibi ingentem pulmonum laborem, quæ sine dubio in scirrhosis tuberculis posita fuit, contraxerit & nihilo minus sua subire munia rite potuerit, non adeo mirandum est; quam per experientiam abunde conficit, magnas tenerimo huic visceri laciones induci & tamen vitam ad lieros usque annos nonnunquam posse protrahi. Interim difficulus ex hoc casu, ad vitæ pulmonum exacerbanda & inflammationem lethalemque abscessum ingenerandum nihil fere potius esse, præter febrem, vel acutam, vel intermitentem & inprimis vehementem animi commotionem. Quare quilibet pectore laborantibus longius vivere volupe est, commendandum arbitror, ut ab omni tum animi tum corporis excessu abstinendo moderatissime vivant.

OBSERVATIO VII.

Honestæ XXVI. annorum femina, à parentibus phthisi demortuus progenita, quarto puerperio exacto in violentam incidit tussim cum serosis defluxionibus ultra dimidium anni graviter infestantem. Quatuor abhinc mensibus febre corrupta fuit tertiana male morata, quæ spastiodicis pedum sub frigore & declinatione tractionibus copiosisque sudoribus mirum fatigavit. Varia hinc inde præscripta medicamina quum nihil tulerunt opis, tandem ad corticis chinæ in electuario usum perventum est. Conquevit inde febris, sed longe graviora accesserunt pathemata; siquidem glandule colli intumuerunt, dolores punctivi & pressivi in sinistro pectoris latere, cui ægre incumbēbat ægra, cum anxia spiratione & calore vespertino cooperant in gravescere mensuræ purgatio imminui viriunque robur magis labefactum. Ego igitur in consilium aditus non dubitavi ratione & experientia suffultus, præmissa ventris per potionem mannatam expurgatione, præscribere usum acidularum Egranarum cum terria lactis caprini vel asinini parte remixtarum, quas tepescitas per integrum mensem mane ad mensuram unam, sub convenienti diætæ regimine, bibere jussi. Pro potu ordinario decoctum radicis chinæ cum passillis & inter epulas, ad stomachum roborandum, elixir nostrum balsamicum viscerale sumendum; lateri vero thoracis sinistro dolenti glandulisque colli tumidis imponendum suavi sequens emplastrum: *Recipe gummi bdellii, myrrhe, sagapeni, gummi anise, singulorum natiunciam dimidiam, spermatis cæti, cera ana unciam unam cum dimidia, storacis sulphuris drachmas duas, pulveris croci drachmam dimidiam, olei anisi, camphæ ana drachmam unam. M. f. l. a. Emplastrum.* Neque vero spem fecit hæc cunctatio; quippe qua finita insigne symptomatum levamen percepti ægra, tantum quod in integrum

Phthisi hæmoptico-ria a febre tertiana corrupta-? cur reddita.

Cc ob

Tubæ pulmonalis inflammatione a febre letali.

ob inordinatum mensium successum non fuerit resistens. Suasi igitur, ut eleosaccharum myrrhanum in frequentius usum ducat, quod ita paratur: myrrhæ optimæ uncia una ex libra una aquæ, adjecta salis tartari drachma una, coquitur; quod remanet à coctione, est magna gummo-resinosum temperatus, myrrhæ saporem & odorem adhuc referens, cujus drachma una cum uncia una sacchari canariensis mixta vel singulis diebus, vel quam maxime circa inflammationem mensium periodum cum infuso Thee vel Coffee sumitur utilissime. Est enim hoc remedium genus & pectori & utero amicum, æque à me per aliquot annos summa cum euphoria sæpius commendatum.

Epicrisis.

Ex pthificis parentibus nasci feminae nisi à puerperio exactam diutè habent rationem & si bi ab aere frigido animique affectibus cavent, periculæ, si præsertim locum non rite fluxerunt, latentem reluciscere morbum solent; quod & ante aliquot annos in persona Scenidiana annotare mihi licuit. Dein in naturali ad pthufum dispositione, quid? quod in omni prava viscerum constitutione febris tertiana & biliosa, tum acuta, quam chronica superveniens mali est ominis, dum malum non modo exacerbat, sed & immedicabile reddit. Multo vero adhuc majus periculum ostendit, si adtingentibus præmature supprimunt. Tum enim plerumque mensium fluxus valde turbatur atque pervertitur, ut præsea ejusmodi morbi curatio medendi multum faciliat negotiū, nec nisi convenientibus & generosioribus cesset remediis.

OBSERVATIO VIII.

Studiosus medicinæ industrius, qui mihi quondam à manibus fuit, XX. aliquot annos natus, temperamenti sanguineo cholericus, ad impatientiam & iram valde proclivis, ob hereditarium, quam à parente pthifico acceperat, dispositionem, vernali & autumnali tempore crebrius laborabat tussi, rarsedine & interdum cruento, licet parviori spūto; quæ dein, into matrimonio & Physici munere obtento, ita increbescant symptomata, ut materiam purulentam sæpius rejiceret corporeque fere penitus contabesceret. Sed nihil minus infusi herbar veronicæ cum lacte caprino mixti & conservæ rosarum continuo usu, nec non venæ sectione ter in anno administrata per triginta adhuc annos, quæ Dei gratia est, servatas est felicitissime.

Epicrisis.

Cognita mihi sunt adhuc alia exempla juvenum, qui vel à parentibus, vel ex inordinata academica vita pthificam pulmonum dispositionem obtinuerunt similibusque corrupti symptomatibus vitam satis diu protraxerunt. Ita memini Doctoris medicinæ Sileciaci, qui tali labe affectus in nostra academia, præter accuratam victus observationem, solo frequentiori infusi thei-fonnis ex veronica & pulmonaria cum lacte temperati usu, adjectis nonnunquam olei tartari per deliquium virginis guttulis vitam ad multos annos prolongavit. Quod vero, si evenit, indicio est, ulcera quandam aperta callositate superinducta in aliqua pulmonum parte, salva reliqua eorum substantia, latere. Quamdiu itaque per

congrua remedia tum motuum & humorum temperatura conservatur, tum obstructio & inflammatio in hoc viscere avertitur, nihil metuendum periculi est. Hæc scribenti in mentem incidit summe Reverendissimus Theologus Helmsladiensis Calixtus junior, qui olim superflus mihi retulit, se per triginta fere annos quotidie, sine ullo respiratorum detrimento exspisse pus album scetidum, & nihil adhibuisse præter venæ sectionem bis quovis anno iteratam & decoctum radicia chinæ & cassias cum passulis, quo ad mensuram dimidiam continuo uteretur.

OBSERVATIO IX.

Quum Minde Wellphalorum, ante quinquaginta & quinque annos, provincialis Medici munere fungens degerem, sequens mihi obigit notabilis casus, quem hic inkerere placeat: Consiliarius regius, vir floridi & sanguinei habitus, ea tempestate, quum peripneumonia popularis habebat circuitus, vehementi febre, cum spūto sanguineo & ingenti spirandi difficultate juncta corripiebatur. Decrecebat equidem morbi & febris vehementia, sed elapso mensis spatio invadebat tussis, pectoris oppressionem gravientemque inducens, calor circa vesperam lentus affligebat, appetitus sequebatur prostratio & corpus, valde antea obesum, consumta pinguedine, marum emaciatum apparebat. Tandem quadragesimo ab accensione febris die simul & semel cum maximo impetu tanta puris flavi ex ore sequebatur copia, ut aliquot libras pondere aquaret. Excipiebat mox respiratio facilior, unde ego accessit miratus sum & summas divinæ benignitati gratias habendas esse edixi, quod tanti periculi abscessus non intra thoracis cavitatem ruptus & æger, ut subinde usu veniret, ob nimiam materię ad asperam arteriam congestionem suffocatus fuerit. Et quam vires non adeo multum dejectas deprehenderem, de salute quidem recuperanda non desperandum, ipsam tamen curationem paulo longius protrahendam esse nunciavi, quam in hunc, qui sequitur, modum institui. Primo laxante mannæ & rhabarbarino primaræ regionem à sordibus depulendam & dein dimidiam læsis vaccini tepellæ mensuram, infusillatæ balsami cujusdam pectoralis drachma una, singulis diebus mane bibendam suasi. Balsamum autem ita erat confectum: *Recipe olei hyperici venusti unciat duas, storum sulphuris drachmas duas, coque leni calore: Colatura adde terebinthine Venetæ drachmas duas, croci drachmam dimidiam, oleorum anisi, nucis, destillatorum ana guttas duodecim. M.* Inter cibos quam maxime juscula avenaceæ & hordeaceæ cum jure carnis vitulinæ, gallinæ & cancrorum fluviatiliū succo parata, & loco potus mox pisanam, mox decoctum chinæ & herbar pulmonariæ cum passulis commendavi. Quarta à prandio hora iterandum jussu lactis tepidi usum cum electuario, quod ex conservæ rosarum unciis duabus, hematitidis preparatis, boli armenici ana drachmis duabus & convenienti syrapi papaveris albi portione compositum ad drachmas duas deorare æger debuit. Ad statum, quibus venter fere perpetuo erat turgidus, discutendos injici jussi clysteres emollientes & carminativos. Tandem vero, ut externis pariter succurratur remediis, pectoris tum anteriori quam posteriori parti impositum fuit emplastrum ex gummi bdellii, spermate ceti, æxingia humana, cera, floribus sulphuris croci & oleo anisi constitutum. Qua methodo tantum per

Emplastrum
de perispermio
arabico, resina
damascena, et
essentia
camphoræ.

Phthi-
sis
hereditaria
sive utra
queque.

per Dei clementiam profecti; ut intra binos menses integre vir amplissimum convalesceret & ego non exiguum inde famam in juventute mea retulerim.

spiratio sine raucedine facilis sit, alique beneficium optime semper consilet.

Epistola cum consilio.

Epistola.

Abcessum, seu empyema à peripneumonia æque ac pleuritide male progressæ facile posse enasci, non modo gravissimo HIPPOCRATIS testimonio, sed & certa longæ experientie fide constat. Neque minus in eo concursus est Medicorum sententia, permagnam & vix medicabile hoc malum esse habendum: nam si intra thoracis cavum rumputur ejusmodi empyema, raro evadunt ægri: si intra pulmonem substantiam contingit disruptio atque pus ad asperam arteriam magna in copia congeritur, perquam facile suffocatio jugulatur. Dei itaque & nature benignitati in nostro ægrotante jure meritoque est tribuendum, quod medicamina, in juvenili ætate à me commendata, tam felicem habuerint successum. Ceterum quoad curandi methodum hoc possimum debet animadverti, magnam sæpe quorundam remedium in longis morbis sanandis esse efficaciam, si convenienti doli, ordine, & quod præcipuum est, satis longo tempore usurpentur. Multa enim medicamentorum varietas crebriorque mutatio tantum adest ut ægrum juvet, ut ipsum ponas in deteriorem & lethalem sæpe statum præcipites.

OBSERVATIO X.

*Epistola à
meo
consilio.*

Haud ita pridem Ser. quidam Princeps Lutetie Parisiorum meum supra singularem casum requisivit judicium & consilium, quem hoc loco recensere operæ arboris pretium t illustrissimi stemmatis scemina, XVIII. annos nata, quæ tum ob texturam corporis teneram aptamque membrorum figuram, tum ob eximiam ingenii animique alacritatem cuique se commendat intuenti, jam inde ab octavo ætatis anno multis catarrhibus pectoris fauciumque defluxionibus, coryzam, tussim, raucedinem inducentibus tentata fuit, quæ licet à febre cum alvi dejectione subsecuta solute remiserunt, tussim tamen cum voci quadam asperitate sæpius recrudescens pertinacius inhaesit. Decimum supergesta annam crebra multaque saltatione, nulla tamen subsequente aut lassitudine, aut anihela spiratione, corpus strenue exercuit. Quindecim annos habenti exire primum recto ordine ceperant muliebres purgationes, quæ non multo post, initis matrimonii legibus, ipsi gravidæ subsisterent, & quem octimestre absolvisset gestationis tempus, primo noni mensis die parturire cepit enormi conatu, per duodecim horas durante; ad quem allevandum quater Medici detrahi jussissent sanguinem & sic tandem infans prodiret enecat. Lochia quoque dein rite fluxerunt, nihilo minus decimo à partu die sollicitabatur tussi sicca, cum enormi capitis dolore æstusque febrili frigora, quæ parcam prout non adeo viciis excrebrat copiam, remanente oris quadam ariditate febrique quotidie recurrente. Hæc contra mala varia remedia nihil tulerunt levaminis, ut potius lentescens ille viresque & carnositas corporis substantiam depascens calor, qui à passu major sit, cum largo sudore quotidie affligat, nec non tussiculosa pectoris consulsio, cum crebra prout ad puris indolem non accedens exsecratione vehementer urgeat; sicut ceterum re-

Exhibet hic casus exemplar veræ phthicosæ, seu pulmonum exulcerationis, cum febre lenta ad hecticam inclinante: id quod multa validaque tussis, crebrior mucida cum pure mixta materie rejectio, sudores colliquativi, tabida corpora viriumque consuetudo, æstus voluticus & pulvis à fumis cibis celerior testatur faciunt luculentissime. Quod si autem hujus mali veram proficquamur originem, dubitare non licet, illud ipsum à nimia sanguinis, ob crebriores venæ sectiones, jactura proxime esse deducendum. Etenim hac ratione humorum per omnes corporis, maxime excretionibus inservientes partes mirum fuit turbatus; unde non modo vitalis ille cruor naturali temperie sua immutatus ac serosior factus formandis hinc inde stagnationibus opportunissimus exsistit, verum etiam pulmonibus à perfectis catarrhis crebriorique tussi jam antea debilitatis eo facilius labem inducere potuit. Digna enim est, quæ probe teneatur observatio, phthosin æque facile à nimia sanguinis abundantia oriri prædictique ejusdem per venæ sectione immutatione averti, ac à boni cruoris defectu ejusque inconcussa detractione, maxime in corpibus tenera & vasorum & fibrarum consuetudine præditis, posse generari; quale quid in puerperis à nimio lochorum fluxu exhaustis sæpe iterumque observare mihi licuit. In prognosi nostri mali suppeditanda statim in antiquis rem esse prædixi, nihilo minus curationem, si ipsi adhuc locus superesset, in hunc modum putavi instituendam. Primo consuli, ut lac asinum ad tertiam partem cum Selterana, vel alia ejusmodi principio alcalino imbuta aqua remixtum quater de die ad octo unciam pondus bibatur. Quod si vero harum aquarum deficeret copia, seri lactis dulcis libram medicam, addita nitri purificati & salis tartari portione, mane & à meridie potandam commendavi. Deinceps hora quarta vespertina & ante decubitu adsumi debuit pulvis, sequentis compositionis: *Recipe coram cervi sine que preparati, mandibula lucii piscis, boli armenæ, specierum de hyacintho, nitri puri, solutionis oculorum cancri, succini preparati ana drachmam unam: M. F. pulvis, div. in xii. partes.* Tandem commendata fuit recta vivendi ratio, ut nimirum ægra leuissimis ex carne caponis elixa ac vitulina paratis utatur jusculis, quibus herbe plantaginis acutæ, scabiosæ, pulmonariæ maculose, agrimonie, hederæ terrestreis, cardui benedicti cum cancri fluvialibus contulis inter decoquendum fuerint adjectæ. Et quum magna vis in posu sita sit, ab omni alio abstinere & pro potu ordinario hoc sanguinem purificans decoctum eligere consilium duxi: *Recipe cornu cervi rasum, radicem scorzonera, china, singulorum uncias quatuor, rasura ligni sancti rubri, radicem cichorii ana unciam unam cum dimidia. Confecta d. s. species, quarum duas uncias in tribus aqua mensuris per tres hora quadrantes coquenda.*

Et hæc fuerunt, quæ proponenda duxi remedia. Sed non multo post nuntiatum mihi fuit, illustrissimam ægrotam, ante consilii mei adventum placide exspirasse.

OBSERVATIO XI.

Circa generatorem affectionis phthicæ trans-

circa car-
 poris ob-
 scitatem ad
 pe- ora
 morbis
 dignetur
 rem.

clationem utilem hoc loco inferere placet observa-
tione; quod videlicet in longævo artis exerci-
tio annotaverim, homines proceræ admodum sta-
turæ, vegetos & robustos, in optimo ætatis flore
constitutos pestibus istis, qui ex pulmonum labe
nascuntur, ægritudinibus, quales sunt hæmopty-
sis, asthma, tussis chronica & convulsiva, empye-
ma, febres peripneumonica & pleuritica ipsæ-
que phthisis & hæcica, frequentius esse obnoxios,
& apertis eorum post mortem cadaveribus pleu-
rumque coactiones polypolas in cordis cavitati-
bus aque pulmonum vasis deprehendi. Causas
tam peculiaris phænomeni si paullo curatius in-
quirimus, has observamus possitimas. In celsis
ejusmodi corporibus, testante pulsu debiliore &
tardiori, sanguinis progressus atque circuitus nun-
quam fere non tardior est ac impedior, quam in
perionis mediocri statura præditis; quippe tum
difficilis admodum est sanguinis ex inferioribus
& tam remotis à corde partibus, propter perpen-
dicularæ situm, ad pectus & caput adiensus:
gravia enim, per leges motuum, natura deorsum
tendunt & guttur sanguinis retardatur ab aliis, in
quas alidunt. Accedit dein, quod proceræ hæc-
e corpora plerumque sint pinguiora & ad sub-
eundos strenuos labores minus apta vitæque defi-
dit magis dedita; unde circulari humorum motu
retardato, ut spiritiores & crassiores evadunt succi
necessè est. Jam, si forte talissimodum ad ostentatio-
nem nati homines paullo vehementius & diu-
tius, e. g. armis bellicis exercerentur, massa san-
guinis & humorum, ob validiorem musculorum
motum, magno cum impetu ad cor & pulmo-
nes compellitur, & quum æquali tenore ac nisu
per minima pulmonum vascula non possit ferri,
sunt iode omnino humorum in vasis stagnatio-
nes, sunt distensiones, disruptiones & extrava-
siones, quæ ad recensitos pectoris morbos addi-
tum parant amplissimum. Ob eandem quoque
stagnationem accidit, ut secedentes solidæ &
crassiores sanguinis partes invicem coeant tem-
porique progressu in majorem compactæ mo-
lem valorum alveis arctissime adhaerescant & hæc
ratione æquibalem sanguinem per cor & pulmo-
num visum circuitum impediendo, morbosas istas
pectoris affectiones magis obtristant consuma-
tioresque reddant.

Epirijis.

Quanto difficilior est morborum, qui firmum
in pulmonibus sedem & causam obtinent, sa-
natio; tanto facilior & tuior est ab hisce præ-
servatio. Igitur præter ea, quæ jam superiori ca-
pite hoc sine commendata sunt, siadeo 1) ut
proceri ejusmodi homines à vitæ motus experte
abstinendo corpus perpetuo exerceant; hæc ta-
men observata cautela, ne motum paullo vali-
diorem & nimis laboriosum insistant. Namque
hæc major motus species sicut in morbis, qui à
viscerum, maximeque hepatis prava constrictio-
ne & impeditiori sanguinis per ipsa circuitu pro-
ficiscuntur, summum tam præservanda quam cu-
randi scopo fert auxilium; ita & coartato pulmo-
nibus & morbis abhinc procedentibus valde est
insensu, ut usque eo non modo ad hos ingigen-
dos, verum etiam exacerbandos multum conse-
rat momenti; 2) ut missio omni potu spirituosiori,
ut spiritui vini & cerevisiæ crassiori, potum
tenuiorem, cuique nec nimis calidum, nec ni-
mis frigidum assumant, nec in victu cibis nu-
trientibus plus jussu indulgeant; 3) ut circa æqui-

noctialia tempora secta vena redundentem sin-
guinis copiam imminuendam curent; 4) ut sibi
caveant, ne post longiorem quietem motionem
vehementius & repentinè quasi initio insistant;
quod autem si fecerint, mox insusum veronice
& florum bellidis in largiori quantitate hauriant.
Et hæc est facilis & genuina gravissimos & fere
immedicabiles hos morbos mature avertendi me-
thodus, quam rite adhibitam non sine fructu fore
confido.

OBSERVATIO XII.

Pervulgata est opinio, iis plerumque omni-
bus, qui viscera non habent integra, maxime-
que gravem in pulmonibus læsionem foventes
phthifica passione laborant, aquarum mineralium
usum esse insensitissimum. At vero hoc assertum
non universale, sed cum grano salis esse intelligen-
dum, ego quidem multiplici edoctus experientia
bona adievere fide possum. Novi enim non
nullos, qui ulcere pulmonum, sine febrili tamen
æstu, affecti insignem purulentæ & ichorose ma-
terię quotidie rejectum copiam & à moderato
Carolinarum usu, ob liberiorè inde redditam
perspirationem facilioremque materię visiosæ ex-
pulsionem, ob ciborum adque etiam tonisquæ cor-
poris vigorem restitutum optime habuerunt, li-
cet in totum sanitati non fuerint restituti. Nec dis-
simili ratione novi alios, qui tussi valde humida
& pertinaci per aliquot annorum decursum gra-
viter affecti, frustra datis omnibus aliis expertis
contra tussim remediis, à Carolis cum jussu re-
gimine potatis egregie penitus allevati, aut à mole-
stissimo hoc affectu penitus liberati. Ita mihi in
memoriam venit fortuna generosa, temperamenti
sanguineo-phlegmatici, laxioris quæ corporis ha-
bitus, quæ ex inordinato vitæ genere & possi-
sum immoderata ciborum incongruorum adpe-
tentia, ante octo circiter annos, in tussim incidit
valde consumacem humidam, quæ per multos
annos laborioso ac vehementi pectoris non minus
quam abdominis conatu ingentem viscidam phleg-
matis, varii coloris, per vices ejecit quantitatem,
quæ intra nycthemeron collectam integram adæ-
quabat libram. Jungebatur simul, abique tamen
febrili calore, angusta spiratio corporisque uni-
versi languor, cum pallore faciei multaque &
crebriori vomitione. Hæc contra mala quam ab
omnibus, quæ magna in copia devoraverat, me-
dicaminibus, nihil tulit levaminis, ego con-
sultus prudentem & moderatum Carolinarum
usum suasi. Renuebant quidem consilio tum Me-
dici tum ægrotantis amici; malo autem ingraves-
cente ægra per excessus montes salubres hos fon-
tes sponte adiit, eosque per unguem & ultra se-
cundum methodum à me præscriptam bibit, tam
felici successu, ut non modo tussis vehementia cum
nimia mucis viscidis ejectione remiserit, verum
somnus etiam placidior & respiratio liberior red-
dita inde fuerit. Sequenti anno eandem curam
non minori fructu iteravit; & licet malam ex-
inde non protius cessaverit, longe tamen mitius fa-
ctum fuisse ægra mihi lata nuntiavit.

Epirijis.

Id omnino firmissimum & in experientia suis
fundatum esse largiori, morbos, qui ob nimiam
viscerum, maximeque pulmonum læsionem, ob
æstum febrilem & præsentem virium lapsum le-
thales habendi sunt, à potu fontium salubrium

Observa-
tiones cum
aquarum
mineralium
usu.

minus sanati, sed potius ad funestum perducitur exitum. Tali enim ratione ob stagnationem & extravasationem aquarum in corrupto viscere magnamque in eodem continui solutionem longe major inferitur putredo. Id quod eo magis evenit, ubi humor vel in cerebro, vel in thoracis & abdominis cavitate extra vasa effunditur, vel etiam polyposi in cordis & pulmonum vasibus hærent concretæ, quæ liberum fluidorum circuitum impediunt. Contra vero, ubi non tanta viscerum læsio humorumque corruptio, quæ ex viribus dijudicari debet, nec febrilis calor adest, optime sanæ hæc aquæ, dum aperientem, absterisivam, viscidolose humores per omnia emunctoria, & præcipue per alvum evacuantem ac simul roborantem possident virtutem, fructum ferunt præstantissimum. Sed ut convenienti regimine, ordine ac dosi adhibeantur, necesse est.

Plures de phthisi observationes reperire licet in *Causult. & Respons. med. Sect. II. casu LXXV. LXXVIII. LXXIX. XCIX. & C.*

CAPUT XII.

De cachexia icterica.

THESES PATHOLOGICÆ.

§. I.

Quamvis plures sint cachexiæ, siue depravati corporis habitus species, nobis tamen jam de ea speciatim agere animus est, quæ flavescens & nigricans corporis colore sese prodit, & icteri, seu morbi arcani & regis nomine in scholis medicis insignitur, nihilque aliud est, quam vitiatum & corruptum sanguinis & humorum, ab admixta bile excrementitia, propter vitium in biliferis ductibus, statum, functiones universi corporis multum ledens cuiusque externam flavo vel livido colore deturpans.

§. II.

Signa, quibus se manifestat hic morbus, sunt præcipue sequentia: Primo in tunica oculi albuginea flavedo conspicitur, quæ demum universa cutis imbutur; urina crassa & obscure rubra mingitur, linteamina instar croci tingens, faeces vero alvine coloris sunt pallidi. In peiori statu salivæ quoque flavæ exspuitur & omnia adsumpta saporis sunt amaricantis. Præterea affectu de sensu quodam violente sinecluræ, pressiois & tensionis in dextro hypochondrio, neque minus de angustia circa præcordia, respirandi difficultate, totiusque corporis conqueruntur lassitudine.

§. III.

Longe adhuc prolixius & accuratius hujus morbi historia & progressus à Medicorum antiquissimis, maximeque ARISTO in lib. III. cap. 15. describitur, sequentem in modum: *Icterus universi habitus ægritudinis est, & membrorum singula indicia apparent; perspicua vero sunt & ea, quæ in altissimis oculis cernuntur: & sanati secundum tempera color flavus exquirat efflorescit. Quicumque nigro arqum laborant, in his acris color viridi commixtus apparet. Iidem frigens, imbecilli, desides, tristes atque demissi animi sunt.*

Frid. Hoffmanni Oper. Tom. III.

terum odorem exhalant, gustatum amarum habent; spiritum non facile durant; in ventriculo morbus percipiunt, alvi excrementa portacea, subnigra, arida sunt, ægreque descendunt; urina valde colorata est, ad nigrum vergens. Ad hæc cruditate laborant, cibum desolantur, vigilant, moerent, melancholia agitantur. At in albus arguatur color est ex albo & viridi temperatus; mente sunt hilariores; cibos accipere primo eos piget, sed ubi cuperent, quaviter comedunt, facilius quam priores consequntur; alvi purgantia sunt alba, arida, eretacea; letum reddunt flatum, pallidum, ericinum. In utriusque corpus omne pruriginosum est; calor in naribus exiguis quidem sed mordax percipitur; gustatus amarorum non amarus, lingua enim bile suffusa non sentit, dulcium vero amarus. Si nullius visceris caliditas sursum evidens, sine mixta est, sed diuturnior; Si perseveraverit & viscus inflammationem vexatum fuerit, in aquam intereunt desinit; multi & sine aqua intereunt sudore colligativo interierunt. Ex quibus adductis evidenter elucescere arbitror, singulas fere corporis functiones in morbo hoc præter naturam affici. Neque ratio è longinquo erit repetenda. Nam sicuti sanus & vegetus functionum status à temperata & laudabili sanguinis & humorum crassi quam maxime dependet & sustentatur; ita è contrario si hæc ipsa ab impuris & pro majori vel minori gradu corruptis humoribus vitiantur, non mirum est, actiones inde corporis nostri tum vitales, tum naturales & animales plus minus accipere detrimenti.

§. IV.

Multo vero magis de bilis excrementitiæ singulari partes tam fluidas quam solidas immutandi efficacia convincere non possunt variae de eadem apud auctores observationes. Ita sanguis è vena icterici emissus spuma & consistentia flavus adparet, teste THEOD. ZWINGERO, qui in ictericis quandoque ne guttulum quidem unicam rubicundi & floridi cruoris deprehendisse, sed sanguinem per venæ sectionem curiositatis gratia emissum flavæ jumentorum urinae similem non sine mentis stupore observasse scribit. Imo in forma quadam, inquit, sinuata icterica caustorimus sanguinem & urinam, quam crassam emisit, sibi invicem simillimam fuisse; post 15. vero dies, quibus icterus invexerit prope modum diffusus fuit, sanguinem ad aliquot uncias extraxit maxime rubicundum ac floridum existisse. Neque viscera & intestina, ut pulmones & ventriculus naturalem colorem retinent, sed æque ac pinguedo & membranae flavedine plus minus saturata tinguntur. Quæ de re consuli possunt ZACUTUS LUSITANUS in praxi admirabili lib. III. PAISENIUS in M. N. C. ann. IV. obs. 194. & THONNERUS, qui in observat. lib. III. de ictero obs. 1. mentionem injicit Cardinalis cussidam Romani, ictero defuncti, cujus singula membra flava invenit. Insuper quoque ossa flavedine imbuta & arte quasi tincta in pucro ex matre icterica nato deprehendit KERKRINGIUS in *Spiegel. anat.* cui symbolum suum addit DOLÆUS in *Encyclop. medica* lib. III. cap. 8. ubi in viro quadragenario, ictero demortuo, omnia sunt abdominis tum thoracis viscera & ipsum cerebrum cum ossibus & cartilaginibus icterica tinctura i. c. flava adfecta Hannover vidit. Notari præterea dignissimum est, quod GALENUS & SEXTUS EMPIRICUS scribant, ictericos ob oculorum colorem

Obs. rubeo-
trem circa
sanguinem
& consi-
stentiam
viscerum.

flavedine infectum omnia objecta flava intrari. De cujus observationis fide MERCURIALIS in *prælect.* *Boonienſibus* valde dubitavit, quia nec *Celsus*, nec *Caelius Aurelianus*, nec *Aetius*, nec *Avicenna* hujus symptomatis mentionem fecerint. Nos tamen bina exempla in ætate virili constitutis observasse testamur.

§. V.

*Differen-
tia morbi
icterici.*

Deinceps ad verum morbi icterici iudicium accuratius dignoscendam & ad meliorem exinde ratione causarum, eventus & curationis judicandam formandam hæc monenda esse ducimus, quod multum hic affectus, per quem speciem icterum flavum intelligimus, inter se differat. Namque constanti experientia comprobatur deprehendimus, alium valde esse contumacem ac diuturnum & difficulter admodum medicamentis expugnari; alium brevi tempore cessare & remediis facile cedere; alium dein perpetuo inhaerere, alium tantum statim reverendi periodis & certis modo horas perdurare atque etiam in quibusdam esse anniverſarium. Datur præterea icterus vel *idiopathicus*, vel *symptomatikus*. Illius quidem causa altius visceribus, maxime hepatis, inhaerere; hic vero aliis morbis superveniens nonnumquam colicæ convulsivæ hystericae, cardialgiæ & pelioni iliacæ, vomitionis & purgationis post validius adsumtum emeticum aut purgans medicamentum jungitur. Est quoque criticus, qui interdum salutis in febribus acutis præbet indicium, interdum perniciem statum præfigit, quod fieri solet, quando inflammationi ventriculi jungitur, vel hæc icterum sequitur. Postremo ingens omnino inter icterum flavum & nigrum tam ratione causæ, quam periculi notanda occurrit differentia, utpote in hoc longe gravior humorum corruptio & viscerum læsio, quam in illo debet suspicari.

§. VI.

*Causa præ-
dicta morbi
icterici.*

Præmissis sic potioribus, quæ ad morbi historiam pertinent momentis, dispendicendum nunc erit de veris nostri mali & symptomatum causis. Jam vero unanimis Medicorum sententia est, in ictero tantum non semper hepar præter naturam esse affectum: videamus igitur quomodo hæc læsio ad malum nostrum contribuat. Quod si autem perpendamus, nobilissimam hepatis viscous à natura in hunc potissimum finem tantum ductum varietate & copia instructum esse, ut sulphureum, adustum & cum lymphâ viscida quasi alcalisatum, quod bilis nomine venit, à sanguine & humorum massa seccemat, secretum per peculiare canales ad duodenum, ad promovendam ibi digestionem, deferat; facile intelligimus, impedito vel profluxu intercepto bilis ad intestina intrare, huius ad vasa lymphatica ipsiusque sanguinem ficti regurgitationem, adeoque proximam & principalem icteri adesse causam. Et quum tali ratione serum & succus nutritivus bile inficiuntur, explicari facillimum est, cur color cuius in flavum mutetur, nutritio vultum capiat & urinae crassæ atque rufæ tinctæ colore tingantur; neque minus iode patet ratio, cur non flavo colore per alvum prodant excrementa, cur digestio ciborum languet & multa circa primam regionem percipiuntur incommoda.

§. VII.

Sed paullo altius & specialius erit inquirendum, quanam sub tanta ictericorum differentia, quam supra monstravimus, præcipue in hepate partes ac viæ præter naturam affici soleant & à quibusnam causis vitio laborent. Hæc ipsæ vero vel in vitio materie vasa obstruentia, vel in motibus spasmodicis vasa coarctantibus, in universum potius esse quique theoriæ modice gnarus facile poterit iudicare. Utriusque igitur status peculiarem instituiamus disquisitionem.

§. VIII.

Et primo quidem, spasmos ictero sæpenumero præbere originem, in experientia omnino fundatum est. Quocumque enim, quod sæpius accidit, subito icterus invadit, brevique tempore terminatur per periodos iterum recurrit, tunc sane nec in materia peccante, nec in vasorum obstruktionibus & infarctu, sed potius in spastica ductus chodochi, qui tunica valde sensibili nervosa præditus est, constrictione causa residere videtur. Quam ob rem deprehendimus, à vehementiori ira, quæ nihil ad inducendum icterum potentius est, neque minus à corrosivis & drasticis tam purgantibus quam vomitum cientibus remediis, vel ab ipsa bile in cholera, cardialgia & principio febris biliosarum, icterum subinde oriri, quippe quæ omnia rite invicem comparata de spasmodica ductuum biliosorum agitatione testantur luculentissime. Ut nihil denique dicamus de anatomicis eorum, qui ictero perierunt, sectionibus, in quibus nonnumquam ne minimam quidem à calculosa, vel mucida & viscosa materia obstruktionem in ductibus, qui bilem ad duodenum vehunt, reperire licet.

§. IX.

Progredimur ad alteram causam, vasorum obstruktionem, de qua quidem eo minus dubitare licebit, quo frequentiori constat observatione, cythidem scilicet non raro insignis magnitudinis calculis esse repletam. Quod iudicium valet de reliquis ductibus hepaticis & imprimis chodochi, qui non modo calculis magnitudinis, figura & colore inter se diversis, verum etiam gypsum, staphæces & viscosa materia sæpenumero inveniuntur obfessi, ita tamen, ut quo illa magis mollis ac solubilis est, eo symptomata leviora subsequantur. De quo consuli meretur M. N. C. *ann. I. obs. 44. & BONETUS in seipule brevis lib. III. Sect. VIII. obs. 36.*

§. X.

At vero, non semper à calculis vias bilarias infarciuntibus icterus solet induci. Ita *ETTMULERUS in praxi Part. II. pag. 54.* confirmat, distictam fuisse mulierem, ex cujus vesicula fellis plures lapides majores minoretque fuissent collecti, quæ tamen ab ictero libera mansisset. Qui adiungendum esse censeo, quod Cl. Lippsenius Professor D. PETRAMANNUS in vetula Torgensi præter 17. lapides nihil forme facci biliosi in cythide fellæ deprehenderit, cum tamen icterici mali profluxu experta fuerit. *Vid. ejus dissert. de serutinio icteri ex calculo vesicæ fellæ.* Quæ cum ita sint, reddenda à nobis est huius phenomenon ratio, quæ nostro quidem iudicio haud dubie inde erit petenda. Quam diu calculus in vesica

felica

*Hepaticæ
sua ductus
modo in
ductus*

et ob-

*et ob-
structionem
ductuum
hepaticorum
et chodochi
lib.*

*Calculi
quando
aliter con-
sejunt.*

fellia non movetur, sed quietus jacet, non secus ac calculus in renum tubulis nullas creat molestias. Simul vero ac è loco suo deturbatus ad ductum cysticum propellitur, ibi hærens vehementi distensione atrocem dolorem & spasimum, qui totum ductuum biliariorum systema in consensum trahit, progignit & sic morbum nostrum graviusque cum ea complicata symptomata producit; quæ dein, excluso per alvum calculo, ut à nobis sæpius observatum est, ex toto quiescunt.

§. XI.

Calculus
reni apud

Sunt vero quedam signa haud fallacia, quæ calculorum in ductibus biliaris indicant præsentiam, qualia potissimum sunt gravis & lancinans in hypochondrio dextro circa scrobiculum cordis dolor, constanter cum aliquali remissione affligens, cum summa præcordiorum anxietate, spirandi angustia, pectoris compressione, nausea & nonnunquam ipso vomitu, alvi constipatione, inquietudine & vigiliis junctus. Quibus accedit, quod ejusmodi ægrotantes non erecti, sed dorso flexo incurvati incedere possint.

§. XII.

1) ab ob-
structione
ductuum
biliarium
causatur.

Verum enim vero, non tantum à bile in ductibus biliaris concreta, verum etiam si materia tenax, viscida biliosa minimos ductus secretionis talis dicatos infarcit, icterus progignitur. Hoc enim si incidit, non ad ductus biliaris, sed per diffusa vasa lymphatica bilis cum lymphâ ad sanguinem deferatur necesse est. Quam in rem digna est, quæ annotetur observatio Jacobi CAMENICENI in *epist. ad Matthiolum* pag. 184. qui vidit hepatis venas in parte ejus cava prius quam in communem illum caudicem portæ desinunt, obstructas lapillis eas distendentibus, foras nigrit, intus flavescens. Quorum & illud referendum est, quod de glandulis arterie hepaticæ & fellis ductui ad intestina tendenti adjacentibus apud BORELLUM pag. 326. legitur, quantum mole & tumore hæc ita comprimebatur, ut vix aliquo conatu instrumentis tenuissimis esset transitus; quin imò ab excrecentiis carnis compressionem aut occlusionem cholidochi causari CABRULGUS *obs. chir.* 10. & MECKEREN *obs. chirurg.* 43. annotant: & ab omnimoda ejus exsiccatione & obstructione omnem viam interceptientem icterum subortum in Cardinali quodam Florentino post mortem se vidisse perhibet ARGENTERIUS in *lib. IV. aph. Hippocratis* quamvis hæc observationes sint rariores.

§. XIII.

Causa
medica
est.

Hinc ita deductis, deveniendum jam est ad causas mediatas inquirendas, quæ ictericæ cachexiæ potissimum vellicantur. Ex quibus præcipua he nobis offert plethora, seu major sanguinis & humorum, quam natura ferre potest, copia. Quod quidem non adeo mirum videri debet. Etenim quam per hepatis viscum, etiam in statu naturali, ob venam portæ impulsu sufficienti destitutam, languidior est circularis motus, fit omnino, ut accedente plethorico statu sanguis spissior & viscidior facilius inibi stagnet maneatque vasa obstruat. Unde etiam fieri observamus, in cachexia leucoplegmatica, in scirrho & induratione hepatis, ob deficientem partium biliarum separationem, cutis colorem ex

flavo viridescens apparere. Nec quidquam superest dubii, quin pessime indolis icterus, quem nigrum appellant, ingentem & fere immedicabilem hepatis labem magnamque humoris biliosi corruptionem pro causa & fundamento agnoscat.

§. XIV.

Ex diæta vino causam ictero præbent antecedentem cibi dispepti, quales sunt pisi, fabæ, lentæ, caseus &c. utpote qui ob rudiorem crassoremque texturam suam, maxime si magna ingeruntur copia, difficilis digeruntur sanguinemque ingenerant spissum ac impurum. Huc quoque referendi sunt ex pontentis vina acida, aulera, cerevisiæ acedentes & aquæ, quæ argillosas & tephaceas secum vehunt particulas; quæ tamen omnia longe pejorem elerant effectum, si vita accesserit sedentaria ac somnolenta. Nihil vero tam potenter ad morbos ex hepatis vitio oriundos confert, quam immoderatus vini generosi & præsertim adulti abusus, unde chylus, & lymphâ nutricia coagulantur bilique magna & sanitati summe infensâ inducitur dyscrasia. Præterea ad malum vite regimen pertinet quoque animi affectus, ex quibus præter iram, quam jam supra inter præcipuos nostri mali causas retulimus, mirum quantum valet longior tristitia, quæ dum sanguini crasso ingignendo & abhinc prodeunt tardiori ejusdem circuitui apprime vellicatur, ad icterum chronicum & contumacem aut producendum, aut revocandum existit apudissima.

§. XV.

Denique etiam non raro ex aliis morbis prægressis icterus suos repetit natus. Hinc febres intermittentes per remedia adstringentia interpeffive suppressas sæpenumero icterum sequi, præter experientiam testatur RAMAZZINUS, qui à tali febre, per corticis chinæ usum perpetuam cohibita icterum subortum in libris suis annotavit. Neque rarum, sed in praxi medica satis obvium est, à mensibus vel hæmorrhoidibus obstructis vel retardatis icterum enasci.

§. XVI.

Transitus nunc fiat ad suppeditandam prognosin, quæ Medico ad existimationem accipandam debet esse commendatissima. Hæc vero, prout ipsa subiecta respectu ætatis, corporis habitus, roboris & nature differunt, vel prout causæ vel atrociore vel mitiores sunt, tam ratione durationis quam eventus malum omnino differunt. Quando enim hoc malum juniores invadit homines & simplex tantum ac solitarium est, non cum alio morbo, ut quartana, malo hypochondriaco, vel obstructione ex hepatis scirrho complicatum, nec adeo longum tempus duravit, convenientibus remediis tam diæticis, quam pharmaceuticis tolli potest facillime. Quod si vero sæpius post curam, colore flavo in nigriorem vergente, recidivat & indurationem hepatis junctam habet, funesti ut plurimum est eventus, quia vel in hæcticam, vel hæmorrhagiam enormem terminatur. Si à vehementiori iracundie affectu, vel à purgante & emetico drastico, ob spasmodicam intestinorum ductuumque biliferorum strictionem icterus oboritur, commodæ medicinæ in tempore adhibita facile cedit. Difficiliorem vero admittit sanationem, si aut longiori tristitia fovetur, aut si

corpus à morbo antea perpeſſo valde debilitatum inoadit.

§. XVII.

Prognofis. Qui febrī jungitur icterus, ſæpius illius criticam affert ſolutionem. Ita in praxi aliquoties notandis occaſio fuit, febres, quæ cum ſpafmīs imi ventris, vomitūque bilioſo & intensiori æſtu ſtipatæ in corporibus hypochondriacis, prævia iracundia ſuſcitantur, ictero ſuperveniente feliciter fuiſſe terminatas, quod jam olim confirmavit HIPPOCRATES, qui lib. IV. ap. 64. quibuscunque, inquit, per febres die ſepimo, aut nono, aut undecimo, aut decimo quarto icterus incidiſſe, bonum & ſalutare eſt, niſi dextrum hypochondrium obduraverit. Haud diſſimili ratione icterus in febribus intermittentiſſis, imprimis ſub paroxyſmī initio exortus, nullum portendit malum: nam illo finito & hic ipſe evaneſcit. Qui vero inflammationi hepatis, vel duodeni aut ventriculi accedit icterus, in accipiſi ægrum eſſe ſignificat. Sæpe etiam gravidas circa ultimum geſtationis tempus adoriſur, qui tamen tempeſtiva ſanguinis melleſione facile ſupprimuntur. Calculus in cyſtide ſellea contentus, ſi inſignis eſt magnitudinis, adeo ut totam ferme veficulam oppleat, cauſa ſæpe eſt icteri graviffimorumque ſymptomatum, quorum potiſſima ſunt, dolor ærdens circa ſcrobiculum cordis in latere dextero, tormina circa idem latus ſeviſſima, naufæa, vomitus, ſpithymia, reſpirandi difficultas cum lurido faciei aſpectu. Quæ vero ſi incidunt, periculofus morbi ſtatus eſt, qui tandem in alciem definit lethalem. Hinc etiam aliquoties in iis, qui hæc ſymptomata deſuncti ſunt, diſſectis totam veficulam ſelleam calculis vidi reſertum & circumjacentes parētes, ut colon & fundum ventriculi, flavo colore contaminatas, atque exterius, ob bilis ſorte acrioris per poros cyllicos tranſudationem, corroſas. Pari quoque ratione aſſumati convulſivo, quod pierumque hydropem tam thoracis, quam abdominis poſſe trahit mortiferam, ſepiſſime cauſam præbet veficæ ſelleæ à ſuſtententibus copioſis concrements calculoſis repleto.

§. XVIII.

Prognofis. Ad nigredinem vergens icterus ob magnam eamque malignam, quæ fixæ, terreſtris & acido-corroſivæ indolis eſt, humorum corruptionem lethalia ut plurimum inferit ſymptomata, nec curari ullo, aut niſi ſummo negotio poſſeſt. Talis icteſtus quam maxime eſt ſenibus, & facile in maraſmum, in cachexiam, tumores oedematofos, eryſipelas malignum, ſphacelum, vel etiam in moleſtas degenerat hæmorrhagias.

THESES THERAPEUTICÆ.

§. I.

Præmiſſa. In curatione icteri prædenter & circumſpecte adordanda primo ſtatu cauſarum, corporum, & temporis aliarumque circumſtantiarum haberi debet ratio; quidem pro ſingularum diverſitate, illa ipſa etiam aliam æque aliam poſtulat methodum. Quod ſi enim, uti ſæpius ab ira, à validiori medicamento, aut veneno aduſto, vel per conſenſum ex colica ſpafmodica hæmorrhoidali & hyſterica evenire ſolet, icterus ſubito corpus invaſerit & adhuc recens eſt; à vehementiori duciſſimam biliariorum per hepatis penetralia diſper-

ſorum ſtrictura illam oriri, vero eſt ſimiliſſimum, atque tum Medicus primam indicationem exequi ſoldeat: nimirum, ut tenſe & conſtrictæ partes relaxentur, adeoque bilis tam ſecreto ſuſpenſa, quam ejus ad inteſtina deſcenſus impediens naturali reſtatur libertati, atque demum, ut bilis acrimonia, quæ ſpafmorum genitrix eſt, miſigetur ac contemperetur.

§. II.

Diſtis ſcopis obtinendis egregie ſerviunt emulſiones, quales ex ſeminibus ty. frigida majoribus, papaveris, & cannabis &c. quod ob ſulphur vaporoſum, quo præ alia imbutum eſt, præcipue à SYLVIO commendatur, cum aqua ſedativa virtute prædiſtis, ut ſorum tiliæ, acaciæ, primulæ veris, liſionum convallium, chamomillæ vulgaris, millefolii, ceraſorum nigronum, addita ſyrupi papaveris albi portione, commodè poſſunt parari. Egregie porro & expente hoc ſine virtutis eſt liquor nocter anodynus, ſi cum aliquot olei macis deſtillati guttulis, vel in aſſeſibus colicis & hyſtericis cum eſſentia calloſci, croci & laudano opiato ſydenhami miſceatur. Ad mitigandam vero humorum acrimoniam pulveres abſorbentes leniter nitroſi, qui ex lapidum cauterorum, concharum, matris perlarum, pulveris Marchiani aut drachma una, ſuccini præparati, nitri puri aut drachma dimidia, olei macis gutt. quatuor conſerti poſſunt, opera faciunt pretium, quibus pro circumſtantiarum ratione aliquot extracti calloſci, vel croci grana ſunt admixcenda. Vehiculū loco infervere poſſeſt ſerum lactis & lac purum aqua dilutum, vel emulſio amygdalina, vel etiam decoctum avenaceum cum uno altero olei amygdalarum dulcium cochleari permixtum.

§. III.

Externa quoque anodyna & paregorica præcordiali regioni tepide appoſita inſigne ſerunt levamen; quo ſine commendanda eſt veficæ floribus ſambuci, chamomillæ vulgaris, millefolii, ſalviæ &c. ex lacte coctis repleta, vel ſi hæc moleſta videatur, epithema ex thoriaca, oleo nucis moſchata expreſſo, ſpermatæ ceti æquali pondere mixtis, & pauxillo croci ac camphoræ compoſitum ſcrobiculo cordis applicari poſſeſt utiliſſime; idque eo magis, ubi cardialgia, ſeu gravis ventriculi ſpasmus cum nimia vomitione jungitur. Nec ſpernenda efficacia ſunt emmata ex ſpeciebus paregoricis cum lacte coctis & ſufficienti pinguedinis vel olei chamomillæ coſti quantitate coſecta, utpote quæ, ceu balneum internum, partes ſpafmo dolorifico correptas ſoveat leniuntque inſigniter.

§. IV.

Eadem quoque methodo iſſenſuque vii remediis expedit, ubi perſonæ icterica cum ſenfibus ſpafmīs ex calculo ductui cyſtico aut cholocho ſimiliter impaciæ enaſcitur. Atque tum non minorem præſtant effectum, quam quidem exferere ſolent, ſi calculus tenum ureteribus inhaerens graviffima in circumjacentibus nervoſis partibus parit ſymptomata, quibus propter ſpafmum relaxatum ſubſiſtis, natura ſæpe ſuis ſolius viribus utens ejusmodi obſaculum ex illis anguſtiis deturbat ſeliciffime.

§. V.

Et hæc ſunt potiſſima, quæ ictero, ex ſpafmodica ductuum biliariorum ſtrictura ſuborto, faci-

Idem qui inferunt medicamenta in- teria.

Quorum cauſa eſt.

Idem præſent ad ſpafmum ex- citato ſen- ſatione.

Indicationes uti in ſpafmo.

faciliusque transirent satisfaciunt remedia; videmus nunc, quam in conatum fieri saepiusque recidivante malo, quod vasorum hepatis obstructioni debetur, inunda sit medendi via. Vix aliae autem sunt indicationes, quam ut 1) ductum biliarium obstructionibus a biliosa, viscida & terreftri cretacea amurca invicem concreta provenientes dissolvantur, atque hac ratione liberior bilis ad duodenum curius, ad rite peragendum chylificationis negotium, reflatur; 2) ut vasa bilis secretoria a languine tenaci, viscido infarcta convenientibus remediis referantur, quo succum biliosum ad ductus biliarios libere transmittant. Denique 3) ut valde retardatus ac impeditus sanguinis circuitus, qui obstructionum concretionumque constituit fundamentum, per totam vasculorum hepatis substantiam naturalis reddatur & aequalis.

§. VI.

Hic indicationibus explendis, mea quidem sententia commodè intervenit, quae recensibimus, remedium genera. Et ex his longe eminent decocta, seu apozemata, quae ex speciebus, specifica quaedam humores viscidos resolvendi & occlusas hepatis vias aperiendi facultate gaudentibus adparantur, cujus generis sunt radices quinque apertientes & curcumae, si ex aqua coctae, vel etiam in syrupum, qui in pharmacopoeis profus, redactae assumentur. Spectant huc quoque herbae lactiferae, ut lactuca, scorzonera, taraxacum, tragopogon, sonchus, endivium, hieracium &c. quae si cum aqua decoquantur, aut si succus recens cum fero lactis vel asinino lacte offeratur, eximiam praestant opem. Idem tenendum esse arbitror de succo graminis recentis. Hinc celeberrimi Bataviae Medici SYLVIVS & BOERHAAVIUS de vaccis & bobus referunt, quod eorum hepar hiberno tempore, quam sereno & stramine velerentur, calculus esset relictum, qui aestate, quam recenti gramine pro pabulo uterentur, amplius non apparet: dubio procul, quod succus harum herbarum solutis hepar a viscidis & coagulatis humoribus optime repurgatur. Nos itaque ictericis decoctum radicia graminis, eryngii, cichorii, feniculi &c. pro potu ordinario insigni cum fructu commendavimus saepissime.

§. VII.

Tum vero nullum est, quod in omnibus hepatis morbis, adeoque etiam in icteritia curanda, praesentior, certior ac efficacior virtutem praestet remedium, quam aquae minerales tam frigidae quam calidae, sub convenienti regimine potatae, utpote quae tum ob aquarum subtilium principio elastico spiruoso imbutarum copiam, tum ob sal medium, quo turgent, minerale, in lentis humoribus dissolvenda, in opilatione vasorum referenda omnisque generis excretionibus promovendis magnam habent potentiam. Et profecto si dicere velimus quod res est, raro admodum, vel proflus non icterus recidivans & chronicus sine convenienti fontium salutarium usu, quales praecipue sunt acidulae Egranae, Spadanae, Schwalbacenses & thermiae Carolinae, ex voto poterit sanari.

§. VIII.

Nec insuper habenda sunt salia neutra sive medi generis, quae ob insignem aperitivam, deterisivam & tam per diuresin quam per alvum

leniter evacuantem virtutem inter medicamenta adversus icterum proficua speciale merentur commendationem; ex quorum censu sunt terra foliata tartari, tartarus tartarizatus, sal polycretum, arcanum duplicatum, nitrum purificatum & antimonium, solutio oculorum cancr. cum succo citri, tartarus vitriolatus & borax &c. Huc pertinent etiam salia ex aquis mineralibus, Egranae, Carolinae, Sedlicenibus & Epsonensibus elicta; quorum vis mirum intenditur, si cum sufficienti quantitate aquae, feri lactis, vel appropriati decocti longiori paullo tempore adhibeantur. Nec praetere licet rhabarbarum, quod in hepatis affectibus ad humores dissolvendos & corrigendos specificae & spectatissimae est virtutis, sive in substantia cum dictis salibus remixtum, sive cum herbis supra laudatis in vino infusum, sive in tincturam & essentiam cum terra foliata tartari redactum propinetur.

§. IX.

Ultima denique medentis debet esse intentio, ut tonus vasorum hepatis debilitatus atque dejectus, qui obstructionum & concretionum causa existit, remediis blande roborantibus & tonicis restituatur. Quod quidem martialia, etque praesertim liquida, ut tinctura maris pomata, cydoniata, Ludoviciana, aperitiva Zevvifera, nec non peruvianus & cascariæ cortex, in pulvere vel in decocto oblatus, nrimè praestant. Quo scopo etiam acidulae Pymontanae, quae martiali elemento praeter ceteris imbutae sunt, laudem merentur eximiam.

Ultima indicatio per se patet.

CAUTELAE ET OBSERVATIONES PRACTICAE.

§. I.

Emetica in ictero saepe sunt indicatissima & praesentissima sunt opem; saepe vero deprehenduntur summe perniciosa, quando videlicet ex ira vehementiori, vel ex spasmo ventericuli & cardialgia, vel à colica spasmodica ortum morbus duxerit, vel etiam si ductus cystico inhaerens calculus graviores circa praecordia effecerit anxietates. Quod si vero istud utendi indicatio est, leniora, qualia ex radice Ipecacuanhae cum uno grano tartari emetici conficiuntur, in usum vocare praestat, quae dein, ubi amurca biliosa, in duodeno subsistens & ductus cholidochi orificium claudens bilis transitum impedit, vel ubi materia tenax biliosa, non adeo concreta, sed mobilis ductus obfideat hepaticos, hanc ipsam evacuando, opitalantur utilissime. Ea enim emeticorum vis est atque indoles, ut in ductus biliferos, qui ex tunica valde nervosis constatae sunt, operationem suam diffundant & eorum systolen augendo, humores vitiosos egregie exturbent.

Cautela circa emetia.

§. II.

Validiora purgantia, ideo quod spasmos adaugent, motus sanguinis exagitant & vires emittunt, nunquam non in nostro malo observantur noxia; hinc suo jam tempore HIPPOCRATES lib. de ratione villis in acutis ictericis inter eos reulit, quos non purgare oportet: nam periculo, inquit, expones & nihil juvabit. Et lib. de affect. Sect. V. ubi carationem morbi regit tradit, purgantium mentionem iniecit in hunc modum: corpus balneo calido extrin-

Circa purgantia.

Ante m-

Ante m-

trifidus emolliendum, alius vero & vesica m-
defacienda. Morbus autem si cum bilis caustica
sub cutis vertitur. Quae si noverit vir idios, non
facile in incurabiles morbos incidit. Sola
enim morbi ex parvis occasionebus magni ac du-
turni fieri. Et quae quidem ad cibos aut potiones
spoliunt vel fortiter, vel medicamenta, quae
doloris gratia exhibentur, ea omnia sine periculo
admoventur, si iuxta praescriptum adhibueris.
Qua vero pharmaca purgant bilem aut pituitam,
in his periculum constituitur & culpa medentibus
imputantur. Ex quo praclaro loco clare appa-
rebitur, Hippocratem abulium medicamen-
torum, quae bilem infra cutem ferunt, ut sunt
purgantia, penitus in ictero damnales & Medi-
cos, qui imprudenter istidem utuntur, idiosas &
moris causam recte omnino habuisse. Neque
minus graphias verbis sumamus, quae ex pur-
gantibus chologogis in ictericos redundat, no-
xam describit CÆLIUS AURELIANUS
lib. III. cap. 5. Vitandum probamus, sit, fre-
quentem, & variam medicamentum potationem,
qua sella deducere promittuntur, sive ventris.
Etiam sius extenditur, & solidioris cibi fastidium
duplicatur & corporis fortitudo minuitur, atque
cibi accepti corruptantur, & omnis corporis ma-
teria adhibere medicamentum deterior fit; quod
facere videmus eos, qui sapissime ac iuxta ablu-
stium, aloin, diagrydium & colocyrida dari
probaverunt.

§. III.

Circa sudorifera & balnea.

Sudorifera, praesertim nimis calida & volatilia, quae expansivo sulphure suo intestinum humorum motum exagitant, penitus à cura sunt excludenda, utpote biliosos humores, qui viscidius sunt consistunt, per angustos subcutaneos meatus non transmittuntur, sed reclusi omnino per hepatis colatorum & renale cribrum volunt expurgari. Neque minus caute procedendum est cum balneis nimis calidis, in ipso morbi statu ac paroxysmo adhibendis. Neque obscura est laeae rei ratio. Etenim, quum obstructi sint pori cutanei, icterici non facile sudant, sed utrinus calor, sanguinem exagitant & humores acriores reddendo, vasculorum sanguiferorum in aliis locis concitat ruptionem. Contra vero tepida & temperatiora, quae ex aqua fluviali cum sulfure trinceo & lacte sunt balnea, si spasinorum circa primam regionem urget vehementia, securus possunt admitti. Possunt quoque sine omni noxa, si morbus in declinatione curisque emunctiorum parvulus est, ad flavum colorem penitus detergendum, paulo calidiora cum herbis emollientibus & deterfivis parata adhiberi utilissime.

§. IV.

Circa medicamenta emana.

Medicamentis amarificantibus, quae ex radice gentianae, trisuli tiberi, centauro minori, absinthio, carduo benedicto &c. preparari solent, magnae in ictero sanando ab auctoribus hinc inde tribuuntur laudes. Verum haec ipsa plus saepe detrimunt, quam emolumentum afferre, multiplices edoctus experientia testor. Equidem videtur eorum usus ob hanc rationem utilis, quod defectum bilis supplendo, ciborum digestionem & excretionem faciliunt. Nihil tamen minus, quam visa cum chylis ad sanguinem transire, sulphureis biliosis impuritatibus coarctando, malum saepe perniciatius reddunt. Si quid vero ab istem in primis viis sperandum est utilitatis, tum maxime ad fieri deprehendimus, quando

impurus sordes per alvum, quae valde obstitant, expurgant. Namque nec bilis, nec alia amara temperaturae humorum vitalium sunt amica, sed simul cum stercore debent excerni; & ob hanc rationem rhubarbarum magni est faciendum, imo & amara iuxta comminorata in infusis cum vino possum concedi, si cum purgantibus lenioribus, ut rhubarbo, solis fennae, agarico & salibus tartareis combiuntur.

§. V.

Quoniam in utroque ictero summa humorum peccat impuritas seu cacochymia, ex mercurio parata medicamina, quae alias à nonnullis commendantur Medicis, sunt infensissima. Unde à mercurio dulci, in minori etiam dosi sub pilularum forma exhibitio, gingivarum intumescitiam cum summo oris fetore, nec non cardiacas anxietates cum appetitus viriumque prostratione originem fundit novi. Mercurius enim non modo cum acidis, verum etiam, & multo magis cum alcalinis salibus mixtus valde corrosivam & venenatam induit naturam.

§. VI.

Venae sectiones praeservandi potius, quam curandi sine habent locum. Nimia enim sanguinis redundantia circulem fluidorum motum, qui in hepate semper tardior est, magis imminuendo, ad morbos hepatis ingignendos multum omnino contribuit. Neque tamen morbo iam praesente & plethora urgente, ad graviora symptomata averenda, penitus dissuadenda est sanguinis ventilatio, ut ipsa potius magnam pollicetur fructum, si à suppressio mensium vel haemorrhoidum fluxu malum laborum aut suffocatum fuerit. Quod idem valet, si quando post quinquagesimum annum, quo nobiles solent cessare solent, semine hoc morbo coarctantur.

§. VII.

Circa topica notare convenit, quod haec ipsa hepatis regioni applicata insignem sanguinis & humorum per ductus hepaticos circuitum adjuvandi vim habeant, adeoque ad augentiorum nostri affectus curationem permulsum conferant. Ego hoc sine saepius optato cum fructu usus sum cataplasmatibus, vel sacculis herba absinthii, marubii, menthae, & floris chommaliae romanae & vulgaris reperis & ex vino Rhodano coctis, vel etiam emplastro japonato Barba bene camphorato, aut diachylo simpliciter cum croco remixto.

§. VIII.

Sed in affectu nostro persanando alimentorum quoque summa habenda est ratio, probeque dispendiendum, an aegri natura istem ferendis par sit, utpote non omnibus omnia conveniunt. Quod quidem potissimum observamus circa potum. Alii enim solum lactis, alii solum aquam fontaniam, vel cum cremore tartari & saccharo, vel etiam vino Rhodano & succo citri mixtam, alii cerevisiam pro potu cum fructu sumunt, cum contra alii haec omnia respuant. De vino autem in genere utendum ita docet, quod modice debeat dari; siquidem omne spirituosum plus nocet quam prodest. Inter cibos quam maxime sunt removendae carnes infusatae, pisces, placentae & cum butyro fixae, nec non omnia leguminosa, exceptis fructibus aquosis, ut sunt

ceca-

ceraſa, ribes, cucumeres, pruna cocta, &c. qui ut plurimum innocentis ſunt uſus.

lulæ noſtræ balſamicæ in frequentioreſ ducantur uſum.

§. IX.

Epicriſis.

Ad præſervationem mali & averſendam recidivam aeris mutationes, peregrinationes, ac ſufficiens corporis exercitatio omne ſerunt punctum; quibus largior congrui potus uſus animique tranquillitas utiliſſime poceſt ſubjungi. Hinc nota mihi ſunt exempla eorum, qui his omnibus prudenter adhibitis icterinum pertinacem ſugunt feliciffime; ſicut contra diuturna experientia ſatis habeo comprobatum, vitæ ſedentariæ & potibus ſpirituofis addiſctos, ut & eos, qui poſt motum fortioreſ frigidiſſimum ingurgitarunt potum, & diuturno mœore fatigati ſunt, non modo affectioni noſtræ valde eſſe obnoxios, verum etiam difficile admodum ab ea penitus liberari. Denique non incongruum videtur, quam CELSUS lib. III. cap. 24. in uſum commendavit vivendi rationem ſubneſcere: *Per omne tempus, inquit, utendum eſt exercitationi, fri- catione, balneo, lecto etiam & conclavi cultiore, uſu, loco, ludis, læſtivia, aliis, per quæ mens exhilaretur: ob quæ regius morbus diſcur videtur. Malagria quoque, quod digerat, ſuper præcordia datum prodeſt.*

ENARRATIONES MORBORUM.

OBSERVATIO I.

Formina XXX. annorum, macilentæ & ſanguineo-cholericæ conſtitutionis, in iram valde proclivis, ob vitam ſedentariam & varios in diæta commiſſos errores per triemeſtre ſpatium uteri purgationem non experta, corripiebatur haud ita pridem dolore in hypogaſtrica regione tam acuto, ut corpus erigere vix valeret. Sequēbantur dein diarrhœa biliôſa, quam ſedatam mox excipiebat cardinalgia, cum faciei pallore & crebrioribus ſtipata liſophymis. Aliquot dies poſt univerſum corpus ſtaveſcente contaminabatur colore; urinaſe cedeſebant craſſæ & crocæ, ſæces albeſcentes, & circa ſcrobiculum cordis continuo urgebat dolor punſivus atque preſſorius. Sub tali rerum ſtatu meum ægra requirebat conſilium. Ego igitur omnem curationis ſcopum eo dirigendum ratus, ut ſpaciſicæ ſtriſturæ relaxaretur, ſequentem inſi medendi methodum. Primo ordinavi mixturam antiſpafmodicam, ex liquoris noſtri anodynæ, eſſentia croci, caſtorei, corticis aurantiorum æquali portione & aliquot ſlei macis guttulis compoſitam, de qua tertia quavis hora xxx. guttas cum pulvere præcipitante nitroſo ex aqua liliorum convallium adſumere juſſi. Exteriori regioni ventriculi & hepatis imponendos ſuſi ſacculos, qui flores chamomillæ romanæ, crocum & flores macis continebant, ex lacte coctos. Dein circa tertium diem, ad expurgandam ab impuris ſordibus primam regionem, propinxi pulverem ex rhabarbari ſeleſi ſerpentis duobus, cremoris tartari ſerpulo uno & niri puri grani ſex coſectum; pro potu vero ordinario duas partes aquæ cum una lactis parte remixtas commendavi. Quibus per aliquod tempus rite uſurpatis, dolores quidem & ſpafmi penitus quieſcebant; attamen quam menſium negotium in ordinem redire remeabat, ſuaſior fui, ut elixirium noſtrum viſcerale & circa inſtans menſium tempus pi-

cterum frequens colicæ biliôſæ ſpafmodicæ eſſe ſymptoma, pluribus mihi exemplis cognitum eſt; cujus cauſam non æque facile in liſia acrimoniam in inteſtinorum volumine hærentem, quam potius in ſanguinem biliôſum, in inteſtinorum tenuium nervoſis admodum tunicis flagrantem puſto rejiciendam. Spafmus inde concuſtatus tantæ ſæpe potentia eſt, ut non ſolum nervos ſtomachi membranas, ſed & totum duodenum biliôſorum ſyſtema in conſenſum rapiendo, vehementer ſtrictus afficiat. Qui cuſmodi colicæ ſuccedere ſolet alvi fluxus, boni ut plurimum omnis eſt, neque ideo facile ſiſtendus; alioquin motus ſpafmici ſurſum vergentes malum longe reddunt deterius. Multo magis in tali colica, cum ictero juncta accommodatum purgans inſignis eſt uſus. Ita ROLFINKIUS in diſſert. de tartaro contra Mercatum, qui in hoc caſu purgandum eſſe negabat, præcipue commendat jalappam, cujus innocentem uſum vel ſuo ipſius exemplo ſatis comprobat, dum colica, & hinc ictero ſæpe correptus pulverem cuſmodi purgantem non ſine fructu adhibuiſſe teſtatur. Ceterum ex præſata morbi hiſtoria intelligere licet, feminas cholericas, remanente menſium fluxu, corporique refrigeratione & vitæ ſedentaria accedente, ſemper ſere graviores incurſere dolores & ſpafmos, ad quorum recidivam præſcindendam præcipua Medici debet eſſe intentio, ut muliebres per uſum purgationis præſtitiæ reſtituat integritati.

OBSERVATIO II.

Vir L. annorum, Conſiliarius intimus Hannoveranus, temperamento præditus ſanguineo, animoque mobiliori, laute & vinoſæ diætaæ adſuetus, nunquam venæ ſectiõnem paſſus, incidit poſt uſum aquarum Schwallbaceſium, quas neglectæ accuratiori diæta biberat, in gravem diarrhœam, cum tetro oris ſectore & iraculentis inteſtinorum doloribus ſtipatam. Peſſimis hiſce ſymptomatibus ſedatis in ſcenam prodibant dolores cardinalgici, qui per totum dorſi tractum uſque ad ſcapulam proteſſi per periodos multam ſigebant crucem; appetitu tamen ſomnoque integris permanentibus. Accedebant dein ictericæ paſſionis indicia, quæ flavo cutis colore, urina craſſa & obſcure bruna, lintamina croceo colore tingente, nec non ſæcibus albis, abunde ſe maniſeſtabant. Tentarunt equidem Medici ad tollenda hæc mala plurima remedia genera, ſed inſito plane effectu: nihil enim proſecerunt decocta aperientia, nihil purgantia, nihil martialia & amaricantia, tantopere alia commendata. Tandem ego conſultus ſuſi uſum acidularum Pymonteniſium, quæ ad menſuram & ultra quotidie potæ, interpoſito ſtomachicorum amaricantium & pilularum polychreſtarum uſu, & cauſam & morbum cum ſymptomatibus ſuſulerunt feliciffime. Hoc tamen notabile videtur circa hunc ægrum, quod ſub potu harum aquarum ſalubrium urina, quæ alias tenuis & limpidi mingi ſolet, croceo imbuta colore ſecteleſcit, neque prius evanuerit, quam affectu & ſtaveſcente cutis colore penitus ſublatis.

Epietis.

1) Facile, credo, medicinar peritus perspicies, hunc affectum firmam habuisse sedem in hepatis ejusque ductuum obstructione & sic ex liberiori bilis per hosce ductus ad duodenum transitu intercepto fuisse prognatum. Dolor acutus cum magna anxietate cardiologica, nec non gravativa lateris pressio vix aliunde suam duxerunt originem, quam à bile, quæ ex stagnatione in ductibus & vesicula fellea acrior redditæ per tenuis, præsertim vesiculæ tunicas, transsudavit ipsasque ventriculi & intestinorum membranas valde sensibiles arrodendo, ad spasticas concitavit stricturas. Transsudare autem bilem ex cystide fellea posse, testatur anatome, qua non semel, sed aliquoties bilem instat guttularum dextræ ventriculi parvi, vel colo inhaerentem, hæque partes penetrant flavo colore tinctas annotasse memini.

2) causâ quoque hujus affectus querenda erit in nimia ductuum biliariorum, maxime cholodochi, à bile copiosius inibi stagnante distensione; etenim quam nervosa hisce partibus propter raram intercostalem & vagum magna cum orificio ventriculi, diaphragmate & ipso œsophago intercedit conspiratio, non mirum est, si altera harum partium præter naturam affecta & omnes consentientes reliquæ simili malo affligantur. Oris fætor accessisse videtur, quod forte ob bilis balsamicæ defectum putrilago reliquii chyli fuit inducta. Sæpe etiam impurius & excrementitius in narium & faucium peristromate hærens lymphæ terrem ejusmodi odorem exhalat, uti quidem videmus in cachexia & scorbuto affectis.

3) docet hic casus quam optime, non dari potestius, nec efficacius ad inveteratas obstructiones, in quibuscumque partibus ejusmodi debellandas præsidium, ipso aquarum salubrium usu, quæ & copia aquæ, & activo minerali principio instructæ oculos tubulos aperiant, atque hinc omnibus aliis pervulgatis & de re pharmaceutica delatatis remediis præferendæ sunt longissime. Sed necesse est, ut conveniens accedat vitæ regimen, quo neglecto, contrarius sæpe effectus sequitur, quod exemplo fontium Schwalbencium satis evidetum arbitror.

OBSERVATIO III.

*Alteras de
grosso de a
Brienne.*

Generosissima Consiliarii sulci uxor, juvenula, formosæ admodum faciei, teneræque & sanguinæ complexionis, utero primum gravis, incidit octavo gestationis mense in iéctum, qui, excluso dein foetu, per totum puerperii tempus duravit. Non multo post densio concepit utero, & licet venam bis secandum præluerit, aliquot tamen ante partum diebus eandem labem incurrit, qua nihil obstant iterum secundo partu incolumem peperit filium. At vero, quam nunc pernicius, quam quidem antea hoc malum inhaereret, maritus à me petit, ut ipsi succurrerem consilio, ne rursus gravis tam molesto affectu tentaretur. Ego tum in vitæ victusque rationem inquirerens deprehendi, generosissimam hanc feminam vitæ sine labore desidi, dietæ vinosæ & somno nimis indulgenti, ejusque loci cerevisiam bibere valde nutrientem, ac plerumque alvum habere obstructam. Unde causam mali in nimia sanguinis redundantia repositam arbitratus (suasor sui, ut

loco potus ordinarii aquam potaret vino dilutam, atque uterum gestans tam circa tertium vel quantum mensum, quam circa septimum & nonum sanguinem à vena fellea detrahendum curet; alvum vero, si impigra & obstructa esset, pullis rhubarbarinis cederet. Quibus probe observatis peperit adhuc diversis temporibus tres liberos ab iécti accessione libera.

Epietis.

Iécticam hanc passionem à sola plethora, quæ sub tali vivendi genere in gravidis valde increta, productam fuisse, nihil est dubii. Nullum enim viscus à nimia sanguinis copia plus labis contrahit, præter hepar, in quo uti secundum naturam paulo difficilior & lentior est sanguinis circulatio; ita hæc sub plethorico statu magis impeditur: & quam tali ratione sanguis à sordibus biliosis minus rite depuretur, sed propter coagulatum bilem reliqua ad sanguinis massam deferatur, iéctus generatur facillime. Interim dicimus, venæ sectionem præsentissimum & optimum adversus iéctum à plethora esse remedium, quam in nostro casu eo magis utilem prospexi, quod meminerim, ægrotantis matrem, insigniter plethoricam, ante decennium graviditatis tempore quartana correptam, iterata venæ sectione, frustra datis aliis medicamentis, feliciter fuisse sanatam.

OBSERVATIO IV.

Fœmina LX. annorum, habitus corpori phlegmatici, per integrum fere annum rheumaticos dolores in humero dextro experta fuit; qui quum duobus abhinc mensibus, relictæ priori sede, dextrum sub costis spuris occupabant hypochondrium, sequebantur in his locis vehementes pressuræ & constitutivus dolor, per sex hebdomades tanta vehementia infellans, ut ægra inde nec sternare, nec bene respirare posset. Urina simul secedebat crassa, turbida & saturato bruno colore tincta; facies apparebat livida & sublivida. Non multo post vehementis ille dolor simul & semel exspirabat, & contrario autem ægra interne in affectu latere percipiebat sensum explosionis, à quo eo ingenti sustinebatur amarore, ut fauces bile insectas omnesque, quos adsumebat cibos amaro sapore existimaret imbutos. Sumto itaque ex consilio Medici emetico, tribus vomitionibus bilem rejiciebat copiosissimam, & non multo post feces, quæ prius albidæ erant, colore flavo rursus per alvum secedebant. Interim semper adhuc conqueritur ægra de oris amaricæ & fæccitæ, de appetitus prostratione & quod urina, quæ colorem brunum jam amisit, mingatur adhuc turbida. Nullum assumit liquorem præter vinum, quod ipsi solum amaro sapore vacare videtur, totum autem corpus marcore indies magis magisque conficitur, pulsus sentitur debilis & frequens, & faciei color pallidus permanet atque flavus.

Epietis cum respons.

Recte omnino hic affectus, qui nunc in marasimum lentumque febrem inclinat, originem fuisse statim ab humoribus, ex humero dextro per metastasin ad dextrum hypochondrium latus ipsumque hepatis viscus delatis. Neque dubitandum, quin humores viscosi, crassi ad huc per-

partes delapsi obstructions ductuum hepaticorum effecerunt; quibus forte aperti non modo sanus quidam, *vide eis Knull in Leibe*, olerius, verum etiam, ob copiosam bilis in ventriculum & duodenum effusionem, vomitiones cum continua oris amaritie conscientia fuerunt. Ipsa enim bilis tam finititer palati, oesophagi & linguae adhaeret tunicis, ut facta commotione, particulae ejus aciores nervorum papillis insinuatæ amarum ejusmodi saporem facile inducant. Quum vero acidi liquores, ut vinum, egregia sulphurea, bullosa & acres partes infringendi vi polleant, non mirum est, si nostra ægrotæ maxime hñdem delectetur. In curatione eo potissimum respiciendum existimavimus, ut nimia bilis acrimonia temperetur alique beneficium conferatur. Quo fine commendavimus primo temperatis decoctum, quod cum vini & spiritus nieri dulcis portione remixtum pro potu ordinario adhiberi debuit. Dein præscriptum pulverem, qui rhabarbarum, lapides cancerum & nitrum continebat. Hæc tria enim ad bilis acrimoniam, in sinu ventriculi & duodeni hærentem temperandam leniterque & sine molestia evacuandam præsentissimæ sunt efficias. Distinguis præterea ex hac morbi historia, quod etiam per metastasin humor in corporis aliqua parte stagnans ad alia loca, maximeque viscera dimoveri, ipsique insignem possit noxam afflicte. Hinc non ignota nobis sunt exempla, ubi tumor oedematidius medicamento quodam repellente acido, vel etiam per terrorem aut paroxysmum febrialem ad interiora repulsi ventriculi hepatisque regionem occupavit, ibique dolores, vomitus, anorexiam, flatulentiam, ardorem & demum veram excitavit icteritiam; quæ tamen omnia disparare symptomata, si tumor pristinum locum occupavit.

OBSERVATIO IV.

Vir literatus Consiliarii munere fungens, annorum XXXVII. corporis macilentioris, loco vini in prandio spiritum vini tenuemque cerevisiam bibens, post viginti diurnum moreorem, accedente finis vite sedentaria, in lentam incidebat febrem, cum plenaria appetitus prostratione & icterito corporis colore illoptam. Nilil varia hinc inde data proficiebant remedia, ut potius malum inde pertinacius fieri videretur; donec tandem lenius vomitorium, ex tartari emetici grano uno & pulveris Ipecacuanhæ granis xv. compositum & bis assumtum integrum reddebatur valetudinem. Aliquot annos post icterica hac passione longe affligebatur gravius; siquidem nunc salivam expuebat flavescens, & de sapore umium, quæ affluebat, amaricante valde conquebatur. Alvus raro, nisi clysteribus vel suppositoriis admonita, reddebatur excrementa, quæ instar argillæ erant compacta, & urina quoque mingebatur bruna, sedimentum deponens crassum atque copiosum. Circa curationem hujus mali maxime erat notabile, quod omnia, expertæ alias virtutis remedia, quæ sunt rhabarbarina, pilule polychrestæ balsamicæ, antispasmodica & sedativa, essentia & extracta amaricantia, nec non infusa aperitiva, magnam præcordiorum anxietatem, nauseam & vomendi conatum, imo nonnunquam ipsum vomitum concitarent. Unicum, quod ferre poterat, medicamentum erat sal aperitivum, ex sale Carolinarum, nitro purificato, solutione oculorum cancri & tartaro vitriolato conflatum, quod cum sufficiente potu, quem aqua pura

Eisd. Hoffmanni Oper. Tom. III.

fontana cum quarta parte vini & pauxillo succi citri remixta præbebat, parca sed crebriori dosi assuinebat. Insuper quoque externe cataplasma ex herba absinthii, scordii, floribus chamomillæ, & semine cymini in vino coctis regioni hepatis applicato, idque refrigeratum crebrius iterare jussit. Et sic binis mensibus elapsi, sponte soluta alvo ingens excrementorum sicciorum, cretaei coloris, per quatuor dies secedebat cumulus; unde sensim paulatimque feces albæ reddebantur flavæ, color curis naturalis cum appetitu redibat & æger, quæ Dei gratia erat, pristinum recuperabat sanitatem.

Epteris.

Docet imprimis hic casus, quantum ægrotantium naturæ quoad usum & operationem medicamentorum differe inter se soleant, ita profus, ut quæ aliis insigniter conferunt, alii mirum sepe noceant: quod quidem in morbis chronicis, ubi ventriculus est sensibilis magnæque vitiosorum humorum colluvie scatet, frequentius experiri mihi licuit. Cura in hoc ægrotante, quæ salibus & sufficienti congrui potus usu fuit peracta, omnino optimum tulit levamen, quod vicariam quasi operem aquarum mineralium præstitit. Externa vero cataplasmata & sicut in pertinacibus ejusmodi morbis sanandis nunquam non observavi proficua & sæpe cum præsentanea mali remissione usurpata; siquidem non modo urina inde dilutior facta, sed & feces alvine in flavas matæ plenariam convalescentiæ spem pollicebantur, quum contra hñdem sepositis morbus mox pristinum indubat indolem. Scybala demum dura & cretaei consistentiæ fuisse dejecta, meo quidem iudicio, ab acido lymphæ gastricæ & succi pancreatici, sub bilis defectu valde exsuperante, quoad alvum ex parte fuerant coagulata, recte venit deducendum.

OBSERVATIO V.

Fœmina XL. annos nata, succi sanguinisque plena gravi per aliquot tempus moriente ob hñi unici obitum affecta, in enormem incidit uteri hemorrhagiam, quæ seclata corripiebatur paroxysmo febrili, cum frigore artuumque rigore & vehementi vomitione illoptato. Jungebatur simul altero die icterus, unde mox coloco cutis commutabatur in flavum, urinae secedebant turbidæ & opacæ, stercora albæ. Remittebat equidem per intervalla hoc malum; quoties tamen vel ob prægressam animi commotionem, vel ob intensissimum acidorum & lactisminorum usum novi accedebant insultus febriales, propterea icterus cum omnibus revertebatur symptomatibus; donec tandem post multas iterationes sponte terminatus per anni spatium silebat. Tum vero inopinato eadem ludebatur fabula: siquidem præcedente febre cum vomitu & pungitivo in regione dorsali dolore auriginosus color in conspectum denovo prodibat, qui intra biduum quidem evanescebat, sed, quod notabile erat, singulis hebdomadibus circa diem solis, statim veluti tempus servando, recedens per integrum fere annum inhaerebat pertinacissime. Hinc ego consultus thermas Carolinas, subpancto subinde & interposito elixirii balsamici & pilularum balsamicarum usu, sub convenienti regime bis in anno potandas suasi, tum exoptato cum successu, ut ægra inde feliciter restituta nunc à tetra malo libera degat.

D d

Epi

Uterus paroxysmo febrili corripitur.

Epicrisis.

Illud maxime omnium in præfato casu debet animadverti, quod satis temporibus per annum prope si aium, febribus humore præcedente, icterus productus & paucorum intervallo dierum terminatus fuit. Cuius quidem peculiaris effectus non adeo facili videtur ratio. Nos tamen in genere genecia hujus mali ita concipiendam arbitramur. Primo quidem omnium ipsa ductuum biliosorum structura, quæ naturalis bilis ad duodenum iter impedit, vel profusa sufficit, recte debet ac uari; quæ si diutius durat sapiusque recurrit, citius omnino solet, ut viscidior atque terrefacta bilis partes ob moram invicem coeunt, primum in molliores, dein in duriores vasa bilifera obfidentes abeant concreciones, quas transfluent in hepate rursus secreta bilis continua partium viscolarum adpositione temporis successu adauget. Et quum hac ratione ipsa quoque bilis arior evadit, non mirum est, si a sufficienti ejusdem in duodeno flatu tempore collecta copia nova ipsius suggerit materia; qui tanto facilius celeriusque, inverso canalium biliosorum motu, bilis in vasa lymphatica effundunt, quanto major a subsistente intus tenaci materia vasorum ad est angustati. Ex qua propofita theoria liquido patere arbitror, ad talem ipsamodicum crebriusque recurrentem icterum curandum, non nisi præsentissimæ efficacis remedia, quæ altius penetrando, humores crassos resolvunt, vasorum minimorum obstructions abstergendo expediunt, atque totum sanguinis per hepatis circuitum restituunt, in usum esse vocanda. Ex omnibus vero vix ullum datur certius, & præstantius, quam theriacæ Carolinæ, quæ sub convenienti diætâ & interposito utilium medicamentorum usu potius ob sal, quod vident, absterfivum ad insarctus referendos impuræ sordes per alvum & urinam eliminandas longe sunt aptissima. Unde simul in præputio esse judico, cur, memorante Cæso lib. III. cap. 30. ASCLÉPIADES aquam salum purgantis causâ in ictero curando per biduum bibere jussisset, atque vinum gratum salum ad ventris solutionem conservandum commendaverit.

OBSERVATIO VI.

*Interdum
vires in
gravi
transfor-
matione
in
ictum.*

Vir quidam quadragenarius, ob inordinatum vitæ genus multoque in Baccho & Venere excessum jam longo abhinc tempore doloribus arthriticis & cardialgicis obnoxius incidit ab iracunda animi commotione in icterum, pessimum stipatum symptomatibus. Inestabant quippe per intervalla atrocissima circa dextrum ventriculi orificium atque pylorum tormina; jungebatur sudor frigidus, inapetentia, sanmaque inquietudo, sine celsiori tamen arteriarum pulsatione. Hinc in consilium accerlebatur plures ique satis periti Medici; neque vero prohibere poterant, quo minus hæc mala per facis longum tempus crebris reciderent accessibus. Tandem aurigo sensum paulatimque declinabat in icterum nigrum. Ordinabat itaque Medicus balneum per aliquot dies continuandum; quod vero quum fortasse adhiberetur calidius, tanta subinde morbus capiebat incrementa, arger longe truculentiora ventris tormina cum ipsiusmodi velox per noctem potissimum infestante, et magna ictericia & continuo deficiens stimulo experiri deberet. Sequebatur hinc indus major corporis emacatio & ingens virium

languor, qui demum cum extremorum refrigeratione ingravescentem agrum diuturniori vitæ ultra omnino privabat. Corpus ita examinatum trahebatur mihi sectioni, qua insinuat nullam nec in partibus externis, neque internis reperiebatur pinguedinem & admodum parcam sanguinis in venis copiam. Intestina flaccida erant distenta brunique coloris; vesica urinaria naturali longe conspiciebatur crassior & punctis nigricantibus repleta. Hepar exploratum ad tactum invehiebatur, durum & colore ex flavo viridescente imbutum; vesicula autem fellea nigra, humore viscido instar picis nigra repleta, ductus cysticus proflus angustatus. Denique duodenum cum dextro ventriculi orificio & intestino colo oblitum flavo colore tincta & exteriori parte corrosa videbatur.

Epicrisis.

1) Icterus flavum, nisi provida excipiantur medicatione, in corporibus cacochymicis, ubi eximia succorum est depravatio, perscille in atrophiam icterumque nigrum transmutare, ut plurimum lethalem, compariabilis pro dolor exemplis evictum habeo. Progreffu enim temporis, nisi bonus & laudabilis, sed crudus potius & acidus ad sanguinem transferatur succus chylosus, ex bile flava fit nigra & corrosiva, à qua non modo coloris flavi in lividum mutatio, verum etiam acutissimi ventris dolores cum ipsiusmodi vesicæ admodum dolorifico juncti debent derivari. Nihil autem profecto ad exacerbandum ejusmodi humorum acrimoniâ nisi potentius, præter validius calidum, vel oretenas adiatum vel exterius applicatum. Hinc ego à balneis sifrenis jussu adhibitis in ictericia nigra, præter sifrenem ac lethalem gingivarum hæmorrhagiam, cujus supra mentionem fecimus, enormem quoque diarrhoeam & in femina mictionem cruentam vidi productam.

2) Cystis fellea humore tenaci facta clare subindicare, quanta particulæ in sanguine sulphurearum atque biliosarum à naturali crasi fuerint deflexio, quam Veteres, licet observationibus minus subtili non inapte arriat, & multorum rebus morborum causam, dicere consueverunt. Nec dubitare licet, quin à bilis, in fellea cystide firmiter inclusæ, acriori & subiliori parte, per poros transsudante & vicinas partes atrodente truculenta illa circa scrobiculum cordis pathematata speciem fuerint concitata. De quo confertim possunt STALPARTUS vas der WIEL Cent. I. observ. 47. TULPIUS diss. lib. II. cap. 27. & M. N. C. det. I. ann. III. obs. 100.

OBSERVATIO VII.

Per litteras ante annum opem meam requisivit vir quidam Serenissimo Principi à consilio, cuius uxor sanguine sæpius recurrente diu afflicta nullis hæcenus remediis ad pristinam reduci sanitatem potuit. Ipsa autem XLII. annos nata, statum medicorum corporisque multo sanguine turgidi, vitæ sedentariæ & victu crassiori dedita illibatam semper præ se tulit valetudinem. Verum, elapso abhinc decennio, quum sub ipso mensium fluxu & ægeliâ hyeme aliquot miliarium ictu confusus corpus annuum refrigerasset, menstrua per uterum purgatio, quæ à primo eruptionis tempore semper recte & habuit, mirum quantum cepit immutari, atque

*Interdum
diutius
superior
dilatatur.*

HOX

mox parior, mox copiosior, mox per plures, mox per pauciores fecerit dies, nullumque servando ordinem modo anticipavit, modo postposuit. Quare varia suborta fuerunt parthemata, quibus ante biennium accessit ipsa icterica passio, quæ convenienti quidem remedium ope remissit, sed post anni dimidium deorsum invasit, & abhinc singulis fere mensibus circa consuetum mensuram tempus inopinatim rediit, abique ullis sui adventus indicibus. Novissimum vero accessum hanc præcesserunt signa: sensit ægra vehementes in dorso & inter scapulas dolores cum præcordiorum anxietate & alvi obstructione, in quam etiam extra paroxysmum valde erat proclivis. Exceperunt vomitus, & tum flavus in universo corpore prodit color. Ego igitur ut satisficerem mariti precibus, ad hocce malum præavendum hac usus sum medendi methodo. Primo onerium, ratione dietæ commendavi sufficientem corporis exercitationem & ut ægra, à citis sumo indurais atque salinis abstinendo, juscula cum radice graminis, cichorei, asparagi &c. cocta; pro potu vero ordinario decoctum radicis chinæ & sarsaparillæ sedulo adsumeret. Dein ex medicamentis ad alvum æquam servandam suavi passulas rhabbarinas, interposito salis nostri speciei ad drachmas unam usque, alternis diebus capiendas. Tum inter epulas elixir nostrum viscerale balsamicum & circa tempus, quo paroxysmus invadere consuevit, elixir quoddam antispasmodicum, quod liquore anodynum minerali, essentiam croci, calosæ & succini habebat, ter in die capiendum obtuli. Denique, ubi dolores urgerent cum spasmis & flatribus, clystina emolliens & carminativa non injiciendum & circa instantem mensum periodum pilulas nostras balsamicas alternis diebus fumendas curavi. Quibus, benedicente Numine, effectum est, ut malum primo rarius accederet, & postea à cura vernali cum fonte Selterano recte instituta penitus cessaret.

Epicrisis.

Varia sunt, quæ ex hoc casu annotari merentur momenta, quorum postissima recensibimus:

1) Egredie docemur, feminas sub mensura purgatione, à frigoris vehementia cohibita perficere, nisi mox accommodata succurratur medicina, in statum valetudinarium conjici posse; ex quo difficulter admodum emergunt.

2) Intelligimus, ab irregulari mensum successu, concurrente simul ex dietæ vitio plethora, generari spasmos, qui naturalem bilis ad intestina cursum sufflaminando, icterum sæpenumero producant; & quum circa mensum tempus in ejusmodi subiectis semper solent esse vehementiores, non mirandum arbitror, cur tum temporis novæ mali factæ fuerint accessiones.

3) Confirmatur, morbos ejusmodi chronicos remedium tam diætetico-rum quam pharmaceutico-rum usu omnino vinci posse & superari, sed ut convenienti dosi, tempore & ordine adhibeantur necesse est.

OBSERVATIO VIII.

Puer XII. annorum, à largiori uvarum acidarum usu, febre corripiebatur biliosa, cui adjungebatur icterus, cum tumore circa hepatis regionem subdaro & ingenti præcordiorum anxietate ac inquietudine supar. Urina simul redde-

Frid. Hoffmanni Oper. Tom. III.

batur attamento similis, & feces alvine per integros tres dies scedebant nigrescentes. Hinc ego vocatus dedi pulveres absorbentes leniterque nitrosos, cum rhabbario mixtos, quos parva sed iterata dosi offerre jussi. Pro potu commendavi lac eburyratum; & exterius dextro hypochondrii lateri apponendum fusi cataplasma supra descriptum; quorum remedium usu egregie demum convalescit.

Epicrisis.

Quæ recentissimis mala jure meritoque à perveris uvarum concisionibus sunt deducenda. Nihil enim infantibus majores creare molestias possent, quam fructus immaturi & acidi, in copia assumpti, eo quod non modo alvum adstrictiorem bilemque corrosivam reddunt, verum etiam chyllum & lympham coagulando, visceribus sanguineis obstructions inferunt, quæ si in hepate contingunt, prona ad icterum via patet. Et hinc est, quod etiam ob pomum acidorum usum icterum observaverit Ruopius *Cru. III. obs. 19.*

2) Ego quoque non raro icterum à vermibus vidi subnatum, concurrente simul febre vaga. Tum vero insulsum rhabbari cum passulis, interposito pulvere salino, ex tartaro virioliato, nitro & cornu cervi usque egregiam commodat operam. Quod si vero

3) icterus, sicut in nostro casu, febri jungitur de pulsum adeit celeritas cum siti orisque ardore, lac eburyratum, præsertim merse Maii, præsertim est efficacia, quod jam olim Simon Pauli in botan. quadripart. pag. 30. in tali casu summojere commendavit.

Plura de ictero exempla reperire licet in *Responf. ac Consult. medicis, Sect. III. Casu XVII. XIX. LVII. & CXIX.* Speciatim vero de doloribus & spasmis à calculo fellico ortis vid. *Med. System. Tom. IV. P. II. Sect. II. Cap. III.*

CAPUT XIII.

De cachexia & chlorosi.

THESES PATHOLOGICÆ.

§. I.

DE cachexia acturi in limine statim hujus disquisitionis monendum esse docemus, quod sub hac voce præter & subitumidum corporis habitum, cum facto cutis colore junctum intelligamus; qui à vitiosi sibi abundantia viscerumque totis dejecto oriundus singulas corporis functiones perturbat & labefaciat insigniter.

Cachexia definitio.

§. II.

Veræ & essentialis morbi cachectici notæ hæc sunt potissimæ: color cuius pallidus cum virore albicans & flavescent; corpus paulo pleniore & tumidius, tactu frigidum & molle adparens, neque minus infirmum & grave cum vacillatione crurum & anhelitu, præsertim sub adictu scalarum difficili, pedum intumescencia ac inflatio, mentis torpor, animus deses, somnus gravis, palpebrarum insuamescentia, pulsus tardus & mollis, urina alba & turbida.

Signa essentialia.

§. III.

Historia morbi à Cal. Aureliano hanc modo.

Equidem cachexiæ nomen HIPPOCRATI ignotum fuisse videtur; ejusdem tamen non adeo obfcura mentio & expositio sub morbis lenis lib. de interna. affectibus. §. 34. & 35. legitur. Omnium optime vero à CÆLIO AURELIANO & ARETÆO specialibus & propriis signis hæc morbi species, cum subjunctis causis, delineatur. Quare præcursu erit opere, quæ de iis prodiderunt, hæc adponere. Primo CÆLIUS AURELIANUS lib. III. Cap. 6. hæc profert: cachexia, sive malus corporis habitus nascitur intemperantia agerantis, vel curatione mala medicantis, aut post agriitudinem tarda resumptionis causa, item ex purgamentibus sepiissime potatis, vel ex sœva duritie jecoris, aut lienis; vel ex fluxu hæmorrhoidis longissimi temporis, item ex febris longæ tempore corpore affecto, aut materia putrulenta collectionibus, aut vomitu post vespertinos cibos, & his similibus. Est autem ipsa quæ passio sepiissime hydropisimi anteceditur causa aut maculærum in superficie corporis. Sequitur cachecticus pallor subalbidus, aliquando etiam plumbeus color, debilitate tardus ac piger corporis motus, cum inflatione inani, aliquibus etiam venter fluit cum febricula in plurimis latente, quæ circa vespertam magis augeat; pulsus et cetera ac scissus, cibi fastidium & vini major appetentia, urina fœta, & extensio venarum.

§. IV.

Ab Aretæo descripta.

Dein ARETÆUS lib. I. cap. 16. hunc morbum ita describit: cachecticus sequitur corporis gravitas, pallor subinde repetens, venter flatibus refertus, oculi concitati, somni graves torporem afferentes; flammibus pedes intumescent. In ventre ac in omni corpore caloris imbecillitas eadem est, ad omne opus abjectus & prostratus animus; sudor pruriginosus, tarde spiritum ducunt, arteriarum motus languidi, debiles ac frequentes sunt. Extrahitur morbus in multum tempus; intestinorum difficultas adeo continua. Alimentis elaboratio ad coctionem pertinet debilis admodum atque invalida est. Labis hujus cause sunt: hæmorrhoidum suppressio & consuetorum vomituum retentia & ab exercitationibus quies, & ab ingentibus laboribus atium.

§. V.

Cachexia in corpore hanc dicitur chlorosin.

Quem in genere cachexiam dicunt morbum, is in virginibus, quæ nondum menses expertæ sunt, aut si ipsi inordinati & pauciores fluunt, chlorosis denominatur, itemque morbus virginæ & febris alba; de qua maxime agit HIPPOCRATES lib. de virginum morbis, nihilque aliud, quam cachexiæ species est, isdem, quibus cachexia, signis sese prodens: facies enim est pallida, interdum subflava, labiorum insolitus pallor, oculorum subsilentia, palpebrarum livor, ingens membrorum lassitudo, animi torpor, pedum frigus, gravitas & ad movendum inertia, appetitus defectio, cum nausea & vomitu, somnus turbulens, pulsus languidior; urina circa colorem mingitur valde aquea in progressu turbida. Accedunt frequentissime, præsertim sub scalarum adfensu, respirandi difficultas, cordis tremor & palpitatio, intumescencia & inflatio pedum. Sæpius quoque junguntur pathemata cardialgica cum intercurrentibus capitis doloribus & animi deliquiis.

§. VI.

Cachexia pro-

Quod causam nostri morbi ejusque accidentium proximum attinet, hæc ipsa quidem consistere videtur in nimia sanguinis impuri & humorum viscidiorum ac minus spirituosorum abundantia, ob naturalem tonum, vigorem & robur partium solidarum, maximeque viscerum chylicarum, sanguificationi & depurationi inservientium valde laborantem in corpore collecta. Etiam ob partium filiosarum & vasculorum atoniam lentior & tardior fit sanguinis circuitus, & hinc secretionum æque ac excretionum negotium saluberrimum imminuitur; unde sordes excrementitiae, viscidæ, biliosæ, falsæ & serosæ, quæ in hepatis & renum colatorio severni & furas ejici debent, maxima ex parte retentæ impurum plane ac intemperatum reddunt sanguinis serum & succum nutritium. Temporis successu fibræ motrices illius subcutanei cribri æque suo naturali privantur robore; quare hæc sordes minus rite & feliciter per cutis colatorium colari possunt ac rejici; unde in corpore reticulari, cuculæ & cutim intercedente, à cinis sero pallidus, subviridis & flavescent color cum aliquali corporis intumescencia laboratur, ipsaque nutritio penitus depravatur. Et quoniam sub tam depravato sanguinis & humorum statu subtilissimam illud ac tenuissimam cerebri & nervorum fluidum, quod Veteribus naturæ, recentioribus spirituum animalium nomine veniens fibræ solidis vigorem & vim elasticam conciliat & functionibus quoque animalibus præest, non amplius à sanguine & lymphæ probe temperata & pura, sed multis aquosis, viscidis & vappidis contaminata sordibus nutritur ac sustentatur; consequens omnino est, ut illud ipsum insignem contrahat labem ejusque vis ac energia tam in animalium quam vitalium actionum negotio mirum quantum labascit & imminuitur. Unde non mirum videri debet, si ingens corporis gravitas & languor, appetitus prostratio, ad somnum & soporem proclivitas, animi tristitia sensuumque torpor simul juncta infestant.

§. VII.

Ad tantam vero sanguinis & humorum dytalam & quæ abhinc proximè emergit, cachexiam maxime omnium viam pandit habitus corporis a natura valde laxus & spongiosus, qui in fibrarum inoriturum mollitiæ, vasorum exilitate & copia tendunturque tenuitate consistit. Quare etiam sequenter sexum præ virili, omneque eos, qui sanguineæ & phlegmaticæ sunt complexionis, præ aliis nostro morbo valde observamus obnoxiosos. Nam ejusmodi corporis flatus & habitus ad sanguinem & serum in majori copia generandum admodum est idoneus; & quia sanguis in hisce subiectis circulator tardius, evadit ipsior, lentior & ad exiguos excretoriorum, maximeque hepatis canaliculos observandos magis aptus.

§. VIII.

Otiosum quoque vitæ genus & plenaria à laboribus consuetique exercitationibus quies & remissio, non modo experientia, sed etiam ARETÆO loc. cit. testè recte causis adnumeratur procatasticis, eo quod ad humorum copiam, impuritatem, tardiorum circuitum, flagnationem viscerumque tam sanguificationi quam depurationi dicatorem obstructions perturbatum confert. Quæ quidem mala eo magis incidunt, si major

Cachexia morbi hanc dicitur chlorosin.

Vita sedentaria & intemperantia ac ut.

major ciborum, præsertim infantium, viscidiorum, bellariorum, acidorum & qui difficilius dissolvuntur, est adpetentia, quam natura debilis & viribus exhausta ferre, digerere & in utilem probeque temperatum succum chylosum potest convertere; unde ingens cruditas acidarum æque ac viscidiorum est proveniens, quæ dein primum impuritas in massa humorum fundamentum existunt. Valet enim omnino commune illud proverbium: vitium primæ concoctionis, quæ fit in primis viis, non facile corrigitur in secunda, quæ in visceribus sanguificationis & depurationis inservientibus peragitur, multo minus in tertiâ, quæ actû nutritionis absolvitur.

§. IX.

Potus quoque, circa quem varii committuntur errores, variè ad nostrum affectum tam in sexu sequiori quam nobiliori disponit. Fœminæ enim ut plurimum parum adsumunt potulentorum, ita ut sæpius vix semel intra unius diei diuiesum bibant: per quotidianam autem, quæ in corpore sunt, excretionem multum à massa sanguinis & humorum decedit fluidi; quod nisi restituitur, necessario humores evadunt spissiores & ad liberiores per minima vascula circuium minus apti ad infusum contra & oppilationes, quæ nostri mali causa existunt, magis idonei. Nostro jam tempore largior potus Coffeæ nimis concentrati usus in sexu sequiori præcipua existit causa chlorosæ, præsertim quando fœminæ, vitæ nimis otiose deditæ, & quæ adstrictioris sunt alvi, ipsum cum multo saccharo quotidie bibunt. Tali enim ratione spissior jam existens sanguis multis sulphureis, aëustis & oleosis imbutur particulis; quarum nisi sufficiens cum ipsa bile per hepatis auctus excretorios sit separatio, & qualitas & color lymphæ immutetur necesse est. Neque ex alio fove derivanda videtur ratio, quod purpureæ scorbuticæ hæc hominum ætate sint familiarissima. In sexu vero nobiliori peccatur quam maxime nimia potus spirituosus, vinosi & consistentioris cerevisiæ abundantia, utpote quæ non satis liquidos & tenues humores reddunt vitales, sed potius, eorum coagulum inducendo, ad nostrum morbum permultum conferant momenti.

§. X.

Neque minorem in nostro malo ingenerando obtinet potentiam prava aeris, maximeque frigida & humida intemperies, dum externam corporis superficiem aut confringendo aut relaxando salutare transpirationis negotium prohibet, adeoque ad humorum impuritatem coacervandam plurimum valet. Hinc etiam observamus, sub atmosphaera nebulosâ & turbida diutius persistentes & ventis simul ex occidente flantibus, itemque tempore vernali & autumnali, aut si quis in locis valde humidis, paludosis humilioribusque conclavibus commoretur, vel dormiat, frequentem morbi cachectici esse proveniunt.

§. XI.

Aditum quoque ad nostri affectus genesis animi faciunt pathemata, quorum ea est vis æque potentia, ut proxime in partes nervosas, maxime omnium vero in ventriculæ & universum intestinum canalem mere nervosum & membraceum agendo, motum harum partium peristalticum functionemque naturalem valde immutent & labeficiant. Nocent vero quam maxime & ad invenhendam cachexiam & chlorosiam

rosin admodum disponunt gravis terror, diuturnus morer & suppressa iracundia, eo quod excretionem sanguinis criticas per menses ac hæmorrhoides vel nimis augent, vel retardant & cohibent.

§. XII.

Enim vero, & certa ac frequens observatio, & probatissimorum Medicorum auctoritas confirmat, quod nimis imminuta alias salutares & criticae sanguinis superflui per uterum & anum expurgationes non modo cachexiæ & in fœminis chlorosæ, verum etiam aliarum gravissimarum & pene incurabilium passionum præcipue causæ existant. Nam quandocunque sanguis consuetum exitum per ordinarias vias, vel ob spasmos, vel ob nimium crassum humorum infusum non habet, stagnat, viriat, corrumpitur & ad vasa regurgitat majora & viscera; quorum tonum, ac functionem vitiando varia & gravia pathemata in membris etiam partibus sæpius excitat. Morbus ille, virgineus, qui indigitatur & circa pubertatis tempus virgines viro jam maturas frequenter infestat, unice ab impediis hæc expurgatione sua manatur incurabili. Id quod per pulchre explicat JOANNES LANGIUS in Epist. medicis. lib. I. ep. 21. his verbis: *id temporis natura ducit sanguinem crassum ad matricis lacus & venas ab hepate desit: qui quoniam ab illarum angusta ostia, quæ nondum patulant, viscescunt quæ & crudis humoribus obstruuntur & denique ob sanguinis crassitiam transire non possunt: tum rursus per vena cava majorisque arterie propagines ad cor, hepatis, diaphragma & præcordiorum venas regurgitat: capiti quoque bona pars impertitur & circa viscera accidentia gravia parit, dyspnœam, tremulum cordis palpitum, hypochondriorum inflationem, stomachi fastidium, earumque. Sed eadem mala non tantum virgines & juveneculas, sed & conjugatas, quin imo seniores eo corrumpunt tempore, quo fluxus mensium secundum naturæ ordinem solet cessare, vel ubi ille ex quacunque alia causa fuerit summissus. Nec dissimili ratione in sexu nobiliori consuetus hæmorrhoidalis fluxus suppressus, qui robur ac tonum partium deprimendo, vasa pravorum succorum copia implet, ad affectum cachecticum concurrat.*

§. XIII.

Verum enim vero, nihil quoque frequentius evenit, quam ut post enormes & fere incompeccabiles, sive per uterum sive per venas sedis hæmorrhagias, nec non per graves vulnerationes, chronici & rigidi sic diæti valdeque pertinaces morbi, quales sunt cachexia, leucophlegmatia, anasarca, oedemata pedum, vel etiam atrophia, cum summo virium languore, enascantur. Sicut enim omnes partium functiones, ubi secundum naturæ ordinem fieri debent, à convenienti sanguinis probe temperati copia ejusque libero per omnes canales progressu & circulo sustentantur, & inde robur ac vigorem suum accipiunt: ita necesse est, ut, exhausto pæne vitali ejusmodi fluido, ingens partium & viscerum fiat imbecillitas, & ingens functionum præstandarum læsio ac immutatio. Maxime omnium vero ventriculæ cum adnexo intestino canali suos patitur manes, quippe cujus atonia & imbecillitas immutatum quoque concoctionem & ob corrupta alimenta multas parit cruditates, quæ in venas & habitum corporis transeunt, non modo vitiosam efficiunt nutritionem, sed & ipsa viscera sanguificationi humo-

Sanguinis excretionis immutatio.

Sanguinis excretionis immutatio.

rumque depurationi dicata, ut sunt hepar, lien, renes, &c. insigniter laetant, & quo minus munere suo rite sangui possint, prohibent. Accedit & illud, quod, deiciente iusta sanguinis & humorum copia, minima & capillaria vasa, maximeque ea quae tum secretioni utilium, tum excretioni inutilium succorum inserviunt, non aperta manent, concidunt & angustiantur, adeoque longe magis suo defraudantur munere; unde ingens impuritatum origo.

§. XIV.

*Morbi
profectus
pervertitur
curatio.*

Nec aliam subesse puto rationem, quam nimiam boni & laudabilis sanguinis iacturam, quod si potissimum, qui a longis morbis, maximeque à febribus & dysenteria nondum plenius convalescent, sed adhuc imbecilles plus ciborum ingerunt, quam lingua ventriculi actio digerere potest, & in bonum succum transmutare, cachexia admodum sint expositi. Quod mali, experientia teste & antiquissimis Medicorum consentientibus, & illis frequentius evenit, qui per iras & imprudentes morborum curationes, quales cum fortioribus purgantibus, vel etiam adstringentibus ad nimias haemorrhagias, & paroxysmos febrium supplicandos inhibere solent, nimis sunt debilitati. Etenim, pessimae omnino indolis ista sunt medicamina, quae vires, in quibus omnis naturae energia residet, nimium exhaustant: qualem censum iure prope suo subeunt drasticæ evacuantia, & quae minores tum inutilibus excrementis tum humoribus depurandis dicatos canales confringunt & obliquant remedia, quibus imperiti Medici non modo nostrum affectum, sed & alias plures eosque lethales morbos accerunt saepissime.

§. XV.

*Differentia
cachexiae
ab aliis
morbis.*

Quoniam nostrum affectum cum aliis morbis multum intercedit affinitas, operæ erit pretium, ut enodemus, in quantum illis accedit, & in quantum discrepet. Primo itaque sciendum est, cachexiam à chlorosi & fluore albo quoad essentialia morbi indolem minus differre, sed tantum quoad sexum & subiectum, sive sedem causae, quae in nobiliori sexu in ventriculo & hepate, in sequiori vero in his & utero simul quaerenda est, aliqua ex parte discrepare. Neque minorem cachexia cum cacochymia alit convenientiam; siquidem haec aequae ac illa ingentem impurorum in vasibus supponit praesentiam, tantum quod magis ab intemperantia & primae digestionis vitio, quam a prava reliquorum viscerum naturalium constitutione enascitur; unde ex majori cacochymiae gradu, qui in nutritione depravata consistit, ad cachexiam demum fit transitus. Deinceps & illud probe observandum est, quod non omnis febris & pallidus faciei adfectus pro essentiali cachexiae caractere haberi debeat, utpote qui ab omni graviore morbo saepissime remanet, & vel ex collecta vitiorum humorum in primis viis colluvie, vel ab incrudinae affectu suppressio, vel à spasmo ventriculi oritur, sed convenientibus remediis facile cedit. Multum quoque cognationis cachexia habet cum ictero. In utroque enim affectu nutritio esse depravata, faciei & cutis color luridus, virium languor, mentis torpor, viscerumque & ventriculi magnae stomia & laesio; nihilo tamen minus in obprensa est differentia, quod in ictero à sola bile ex biliferis ductibus, vel obstructis, vel quasi totidem constitutis, per vasa lymphatica ad

sanguinis massam regurgitante haec mala originem sumant, quum contra in cachexia ventriculus, lien, hepar remaneat simul graviter afficiantur, adeoque haec gravior & rebellior sit, ita prolixi, ut, nisi curetur, in icterum rigrum transeat. Differt quoque affectus noster ab anasarca & leucophlegmatia, utpote in his major partium inferiorum observatur inflatio atque durities & post impressionem digitorum foveae relinquuntur; quod in cachexia, nisi jam proxime ad horum affectuum gradum accesserit, minus contingit. Neque dein negligenda est, quae cachexiam & atrophiam intercedit differentia. Equidem in utroque morbo magna partium fluidarum peccat impuritas, viscerum atonia & nutritionis vitium; alii in atrophiam corpus extenuatum indices magis magisque contabescit, & nulla propterea adeit nutritio, quae tamen in nostro affectu vitiosa est & copiosior; unde corpus plerumque amplius habet molem. Denique etiam discrepat cachexia à scorbuto. Nam in omni quidem scorbuto est cachexia & vix reparabilis humorum dyscrasia, ex variis doloribus, exulcerationibus cutique defecationibus conspicua, quae vero in cachexia nondum ad tantum pervenit gradum. Quod si vero haec junguntur accidentia, dici solet cachexia scorbutica.

§. XVI.

Quoad prognosin nostri mali id tenendum esse arbitror, quod cachectici pro varietate aetatis, temperamenti & vitae generis multum omnino inter se discrepent, & pro majori vel minori humorum viscerumque laebe faciliorem vel difficiliorem recipient sanationem. Ita, si aetatem respiciamus, senes praeter juvenibus, eo quod ipsi necesse est cachexiae species est, nostro affectu longe gravius afficiuntur; imo non raro exinde in atrophiam & marasmodum incidunt. Dein, quae subito nascitur cachexia, uti sere ob intensam erantiam pravamque ciborum digestionem post longos morbos evenit, facilius solvitur, quam quae ex viscerum vitio hepaticae vel lienis fistulosa obstructione paulatim succrescit. Hinc etiam ubi viridescens & in nigrum vergens color apparet, qui plerumque latentis viscerum laesionis, ob corruptae bilis admixtionem, insidium praebet, majus periculum subest, quam ubi pallidus tantum color, qui solum phlegmatis abundantiam subindicat, cutim occupaverit. Praeter haec sciendum: quo diutius malum inhaesit, quo major jungitur spirandi difficultas, hypochondriorum tensio atque durities, & quo magis vires labascunt, ut syncope quoque intercurrat, eo plus reformidandum esse periculi. Neque facilem curationem admittit, ubi ex haemorrhoidum fluxu vel progressu, vel saepius recurrente malum fuerit subortum. Nullus insuper datur morbus, qui tam facile in hydropem tam anasarcam quam aicitem, in atrophiam & ipsam quoque hecticam inclinatur, quam ipsa cachexia, praefertim nisi mox ab initio convenientibus iaccurrant remediis. Chlorosis denique, si modo non negligitur, non adeo periculosa est, neque ad longum tempus durat, sed vel maribus mensium restitutione solvitur, vel in juvenulis virginibus solo conjugio feliciter curatur. Mulieres vero, quae diutius chlorosi laborant, aut scieris fiunt, aut morbofam ac debilem edunt prolem.

CURATIO.

§. I.

Indicatio
in curatio-
ne.

Expositis itaque & peruestigatis nostri affectus causas, ordinis postulat ratio, ut iisdem submovendis aptam & accommodatam inveniamus medendi methodum, quæ, nostra quidem sententia, sequentibus absolvitur indicationibus. *Primo* quidem eo respiciendum ducimus, ut languis & humores crudi, spissi & impuri corrigantur & per coagnam emunctoria & corpore ejiciantur; horum vero loco subtilis chyli, sanguinis humorum promoveatur generatio. *Dein*, ut referatis viscerum minimorumque vasorum oppilationibus liber & æqualis sanguinis per omnes corporis tam externas quam internas partes resistatur circuitus; & *denique*, ut nimis dejectus ventericuli & intestinorum viscerumque tonus roboretur.

§. II.

Quæ hu-
morum
corruptio
et evacu-
atio infer-
untur?

Primum itaque, antequam ad humorum pravorum respiciatur correctionem, opera Medico danda est, ut fontem præcludat, ex quo ejusmodi humoribus majus accedit incrementum. Fontem hanc constituit ventericulus cum adnexo intestinum canale, ex quo crassities procedant viscidæ, mucidæ, acidiæ, quæ per incidentia digestiva corrigi & ad mobilitatem debent præparari, quo eo commodius possint eliminari. Huic scopo quam maxime comoda sunt salia sic dicta neutra, cujus generis sunt tartarus vitriolatus, arcanum duplicatum, solutio oculorum cancri cum succo citri, teara foliata tartari, sol polychrestum, sal Carolinarum, Egranarum, tartarus tartarizatus, sal absinthii, quæ cum sufficienti aquæ vehiculo soluta oportet exhibere. Hæc quippe si repetita, vel majori præbentur dosi, præter effectum incidentem & resolventem, alvum quoque movent & sordes efficaciter educunt. Quod si vero non suffecerint, post ejusmodi præparationem evacuanda subjungenda veniunt, quæ ex myrrha, gummi ammoniaco, extracto rhabarbari, abinthii, panchymaggoi Crollii, cinnabari, succino & sale succini, summis ad drachmam dimidiam æqualibus partibus parantur. Ex serpulo uno possunt formari pilula viginti, totidemque adsumi. Spectant huc etiam præ omnibus aliis nostræ pilulæ balsamicæ, quæ tonum & robur ventericuli labefactatum simul egregie restituunt & confortant; vel etiam in forma liquida insusum vinosum apparari potest ex radice pimpinellæ, armoraciæ, cichorei, rhabarbaro, agarico, corticibus aurantiorum recentibus, summis centaurii minoris, cremore tartari & passulis minoribus, quod quotidie in aurora per dies decem sufficienti quantitate erit hauriendum. Neque minorem spondet efficaciam aqua Sedlicensis ad libram dimidiam cum syrupo florum persicorum, vel cichorei cum rhabarbaro, aut rosarum solutivo ad unciam unam alternis diebus per vices potata. Si vero alvi nimia est strictura, consilium est, per leniter evacuantem potionem mannatam, quam *maius electa uncia dua, cremoris tartari drachma una, rhabarbari & nitri purificati drachma dimidia, in aqua fontana unciis octo soluta* constituunt, sordes educere.

§. III.

Expurgatis sic probe primis viis, operam na-

vare oportet Medicum, ut totam humorum massam puriorem & fluidiorem reddat, atque infarctos emunctiorum canaliculos aperiat, quo eo melior sanguinis & feri fiat depuratio. Cui scopo obtinendo inserviunt decocta, ex radice farfaparillæ, china, scorzonæræ, cichorei, radura ligni lassafæ & cinamomo parata, quæ diluora potui ordinario possunt dari, concentrata vero mane in lecto ad perspirationem liberiores promovendam assunt. Juavè quoque interdum mane in lecto sudorem ejicere, qui elicitur, si essentia succini & pimpinellæ cum tinctura antimoni & liquore cornu cervi æquali pondere sumta ad quadragesimam guttas ex decocto calido propinatur. Nec incongruum erit, pro re nata ad diuresin ciendam tincturæ tartari drachmam unam cum decocto interponere.

§. IV.

Maxime omnium vero ventericuli habenda est ratio, cujus tono roborando aptissima sunt clixiria sic dicta stomachica; quæ inter eminent, elixir Michaelis stomachale in *B. Parentis metho- sauro pharmaceutico* descriptum, nostrum ballanicum in *notis ad Poterium* propositum, sal volatile oleum cum tinctura tartari remixtum, elixir stomachale ex essentia gentianæ rubræ & corticibus aurantiorum recentium, nec non elixir ballanicum ex extracto centaurii minoris, cardui benedicti, absinthii, gentianæ, myrrhæ, succino, croco, cornibus aurantiorum recentium sine menstruo spirituosum cum tenui salis tartari lixivio paratum. Quæ medicamenta, maxime si inter epulas, vel statim à cibis sumtis offeruntur, non modo ad alimentorum digestionem blandamque chyli spirituscentiam conciliandam verum etiam ad naturalem & ballanicam humorum temperiem restituendam viscerumque tonum roborandum, magnæ miracæ sunt efficacitæ; sed ut paulo diuturnior usus accedat, necessu est.

Poterius
habenda
est ratio

§. V.

Quod si hæc remediis morbus rebellis cedere nolit, ad aquas minerales, quarum eximius in cachexia tam virili quam feminina usus est, deveniendum erit. Omnibus tamen hoc sine longe præferendas esse puo acidulas Pyrmontanas, quibus ego non semel sed sæpius chlorosin, ex mensium obstructione enatam, in corporibus etiam adpectu tenerioribus curatam novi. Ejusdem cum hæc virtutis sunt fontes Spadani, utpote ambo subtilissima martiali elemento imbuti non modo spissos humores fluxiles & mobiles reddunt, atque obstruções emunctiorum meatus referant, sed & tonum ac robur viscerum augendo, sanguinis per univèrsum corpus circuitum egregie promoveot.

Aquam
minera-
lem istam.

§. VI.

Præter jam recensitas aquas medicatas, martiali principio turgidas, alia quoque medicamenta martialia cum salinis & balsamicis maritata commodeque exhibita non inepte pro specificis & efficacissimis ad cachexiam & chlorosin sanandam habentur remediis. Unus vero varis proflent martis compositiones chymicæ æque ac pharmaceuticæ, nulla tamen magis te mihi commendare videtur, quam crocus ejus subtilissimus, qui non ex chalybe, sed solius ferri quod copiosius phlogiston recondit, cruda limatura, aqua pluviali conferta & calori solari exposita conficitur. Præstat

Marti-
alem istam.

D d 4 tamen

Ostendit
tamen

tamen hoc medicamentum cum aliis accommodatis remediis permiscere. Hinc ego radicem pimpinellæ, ari, cinamonum acutum, sal tartari & saccharum, quæ insignem in humoribus incidentis præstare effectum, adscire solitus sum, tam felici eventu, ut inde virgines, quæ chlorosi cum enormi capitis dolore aliisque symptomatibus stipata diu laborarunt, feliciter restitutas viderim. In forma liquida tinctura maris pomata, cydoniata & cum succo citri parata, præsertim vero *Zovelferiana* reliquis omnibus palmam præcipiunt. Egregie tamen horum medicamentum intenditur efficacia, si cum sufficienti decocti supra descripti quantitate, vel etiam cum iuleculis, quibus radices aperitivæ graminis, cichorei, petroselinii, asparagi, foeniculi &c. incocta fuerint, exhibentur.

CAUTELÆ.

§. I.

Cautela circa Verum solutum in co. laria ab experientibus præcipitur.

Si ullo in morbo, certe in cachexia apprimè necessarium est, ut, quam primum fieri potest, malo occurratur; alius gravis metus est, ne, si curatio tardior accedat, in atrophiam, scorbutum & hydropem æger præcipietur. Quod si igitur cachexia ob consuetam sanguinis excretionem suppressam corpus occupavit, operam dare Medicum oportet, ut ipsa commodè remediis revocetur. Quo sine, nisi vires ex longiori mali persistentia emervatæ ad prohibeant, venam lecare sanguinemque in parciore quantitate, sed iteratis vicibus, e. g. per triduum, detrahère juvabit. Quod auxilium genus jam olim ab HIPPOCRATE in lib. de morb. mulier. §. 3. commendatur, & iis potissimum saluti est, quibus solennis per uterum purgatio deficit. Inacutissima contra iis est venæ sectio, qui mole vitiosorum humorum turgidi parum sanguinis intra vepas sœvent.

§. II.

Circa hæmorrhoidum præparatum.

Præter dictam venæ sectionem prudenter institutam corporisque purgationem in cachexia ex mensium vel hæmorrhoidum obstructione suborta magna quoque vis residet in thermis Caronis, quarum conveniens interno ulu talimodi excretionis diu suppressas ego revocatas novi. Sed cavendum ab aliis est, ubi morbus ex nimio hæmorrhoidum vel mensium profulgentiæ originem traxit.

§. III.

Circa hæmorrhoidum.

Sanguine in mensibus suppressis decenter detracto vitæ namque obstructionibus per aquas minerales vel medicamina martialia tetnotis, fluxus nonnunquam sponte sequitur. Quod vero finitimus evenit, necesse est, ut ægre per horæ circiter spatium immitantur balneo tepidiori, quod ex herba maritima, melissæ, artemisiæ, yulegiæ, fabina, floribus chamomillæ romanæ, salviæ, bacchi lauri &c. apparatus ad flagrantem humorem dissolvendos, macidamque de tenacem seri materiam per uteri ostiola expurgandam sæpius deprehendi utilissimum.

§. IV.

Circa menstruum.

Cachectici nunquam violentis tractandi sunt medicamentis; quem in finem sedulo fugienda sunt omnia validiora purgantia, sedentaria & balnea quoque calidiora, per quæ læpe perniciosa pravorum humorum ad turbidiores partes sunt metastasæ.

§. V.

Quoad modum utendi martialibus scire licet, quod 1) eorum efficacia per sufficientem corporis motum & exertationem debeat promoveri; 2) cura ad dies decem & quindecim ita continuari, ut tertio vel quarto die lenè purgans remedium, uti sunt passulæ rhabarbarinæ interponatur; 3) quod sufficiens & dulcis potus cum exacto vitæ victuque regimine simul in usum vocetur.

§. VI.

Observavimus una cum HIPPOCRATE & PLATERO in prævi cap. XIV. virginitatibus pallidis ac morbois, si nubant & viris jungantur, interdum prima nocte menses fuisse eruptos & in ordinem redactos, cum colore vivido & insigni incolumitate subsequata; quapropter matrimonium ceu summum in hoc casu remedium commendare licebit.

§. VII.

Pedes frigidi & tumidi in hoc morbo probe testis & in moderato calore sunt servandi. Involvantur quoque linteis arcte constrictis, ut laxitas emendetur & promior humorum ad cor fiat recursus. Quod si vero nimium intumescunt, facculi calidi ex milio, surfuribus & sale confecti sunt imponendi. Circa pediluvia notandum, quod ipsa locum non habeant, ubi tumor jam invaluit, sed tum præter jam dicta reclusi adhibentur frictions cum linteis asperioribus calidis infundendæ.

§. VIII.

Quod denique diætam tam præservatoriam attinget quam curatorem, aer frigidus-humidus, nec non conclavia paullo decliviora, vaporosis humoribus repleta, pro somno capiendū sunt insensibilissima. Inter cibos autem eos potissimum, qui difficilius solvuntur, quales sunt fructus horæ, acidi, lactici &c. omnia vitare modo oportet. Necet quoque aqua sola pro potu summa, quam ideo vitæ bonæ notæ Rhenanus & Mosellanus diluere præstat. In genere vero notandum, quod cachexiæ morbus à nimia ciborum comestione copia sæpius oritur & sustentetur; quare abstinencia & cura per inædum omnium pharmacorum vinū in tali casu superat longissime.

ENARRATIONES MORBORUM.

OBSERVATIO I.

Vir sacerdotali munere fungens, temperamenti sanguinei corporisque habitus spongiosus, victu crassiori & cerevisiæ consistentioris potui addictus, per viginti annorum decursum singulis fere mensibus cum euphoria cruentas habuit sedes. At quem duobus abhinc annis ob detestandum filie patrum stuprum diuturno affectus fuerat cum tacita iracundia morore, salutaris hæc excretio hæmorrhoidalis sensim sensimque immutata sicla penitus detrahit substituit; unde appetentia ciborum perit, facies antea florida mutata fuit in flavescentem & flaccidam, pedes intumuerunt, difficillimeque nunc respirare coepit. Consultavit itaque rei pharmaceuticæ peritum, qui vinum lavans singulis diebus mane per mentum & ultra bibendum obtulit, à quo sex septemve vicibus quotidie alvum deposuit. Potui prænam, &c.

& ex cibus sola jufcula avenacea in largiori copia haurienda commendavit, nec irritio effectus; utpote non modo tumor pedum cum reliquis symptomatibus ex voto remissis, verum etiam respiratio facilius inde facta fuit: nisi quod confusus hæmorrhoidum fluxus in ordinem nondum rediit. Non multo post derепente æger in vehementes circa regionem lumbarem incidit dolores, cum urina multo sabulo repleta secessione junctus, qui usque dum sepius recurrere misere nostrum cruciavit. Ante anni vero quadrantem tumor utrumque pedem, maximeque sinistram cum difficiliori anhelitu denovo occupabat: flatus similes sinistram hypochondrii latus mirum distendebant & sæpius calculose concrectiones, præcipue post esum unius alteriusve taleoli raphani rusticani facile conditi, cum urina excrebantur. Ego igitur consultus, quam vasa sanguinea admodum turgida, deprehenderem, ob pedes nimium tumidos venam in brachio secandam & loco cerevisiæ crassioris præparatæ ex hordeo, rasura comu cervi & corticibus citri bibendam suasi. Dein singulis diebus mane salis aperitivi, ex polycresto theriacum Carolinarum & nitri crystalli aequali portione compositi drachmam unam in libra dimidia aquæ solvendam de tenuique jusculum superbibere, & alternis diebus circa horam decubitus pilularum nostrarum balsamicarum no. x. devorare jussi. Denique ad flatus dissipandos effusum corticum aurantium liquori anodyno nuptum cum elixirio viscerali alternatim in prandio sumendam obtuli, esum raphani rusticani interdixi, ipsamque potius plantis pedum imponendam commendavi. Et sic intra mensis spatium, remittentibus sensim symptomatibus, fluxus hæmorrhoidum rediit sublevis, & jam melius æger habere coepit.

Epirisus.

Dilucide omnino ex præfata morbi historia adparet, quantum in universa motuum & functionum naturalium œconomia perventum, gravique & chronico morbo per fluxus critici superpressionem arcessendo gravior & diutius inharrens animi affectus obtrineat potentiam. Deinceps ut ut in vino laxante, singulis diebus per mensem cum abstinentia adhibito, flatus cachecticus fuerit sublatus, mirum tamen non est, hunc non ita multo post rediisse, quam hæmorrhoidalis fluxus, à quo originem ipse traxit, nondum in ordinem fuerit reductus. Symptomatum complicatorum, me quidem iudice, talia reddenda erit ratio: à suppressis hæmorrhoidibus ingens in intestinis crassus suborta est infasio, quæ vasa iliaca & emulgentia simul comprimendo, tum pedum innumescens, tum calculorum in renibus concrectioni materiam & occasionem præbuit largissimam. In curatione tali prudenter adomanda eo præcipue respiciendum duximus, ut liberior sanguinis per intestina & vasa adjacentia compressa restitutus circuitus; quo scopo non modo venam, ob pedes tumidos, in brachio tundendam, verum etiam reliqua commendavimus medicamina.

OBSERVATIO II.

Vir generosissimus, aliquot supra L. annos natus, fluxum hæmorrhoidalem nunquam expertus, in aulæ per plures annos strenuus viri, non optimæ semper notæ, interfuit compositionibus, corpusque subinde venando sub varia

tempestatis mutatione multum fatigavit; sed nihilo minus, admittis bis in anno venæ sectione, bene habuit. Ante annum vero tempus, quam Principis exideret clementia, animam mox totum morori dedit; unde appetitus sequuta est prostratio, cum anxio circa Ictericulum cordia dolore acriter sepius convellente. Jungebantur dein corporis macies & difficilis, præcipue sub adscensu scalarum, respiratio, moleste hypochondriorum inflationes cum virium insigni decremento, colore faciei lurido & aliquali pedum intumescens. Pulsus dummo tempore scitebatur tardus ac debilis, nunquam tamen intermittens, & circa vesperam paullo celerior cum levioribus æstus interni indicis. Hinc ego consultus suasi, ut bis de die elixirium viscerale, liquori anodyno nuptum, & ante decubitum sal nostrum aperitivum & temperans adlueret. Loco potus Thee mane bibendum commendavi insulam theiforme, & quam pro potu decoctum ventriculus non ferre videretur, potum cerevisiæ Lobegingensis permisi. Denique cataplasma ex floribus chamomillæ romanæ, macis & caryophyllis aromaticis in vino coctis, regioni stomachi sepius tepide applicandum & pedes tumidos surfuribus triticis calefactis crebrius immittendos jussi, tam salutari effectu, ut intra trium mensium decursum major convalescentiæ spes appareret; siquidem pedes sub continuo dolore & larga mucii crassi ac viscidii per urinam secessione sensim sensimque detumescabant, appetitus erat vegetior, respiratio facilius, formæque & pulsus magis naturalis. Ceterum circa hanc morbi historiam probe notari meretur, quod per præteritam hyemem generosissimus ægrotus multis vexatus fuerit catharibus ad pectus defluxionibus, suffocationem non raro minitantibus, præsertim quam Medicus ordinarius in tali paroxysmo venam in brachio secandam jussit. Exspiravit tamen præcognitionis metus à frequentiori clystero in anum injectione.

Epirisus.

Vir hujus generosissimi sulci valde inordinatum vitæ genus à longo inde tempore mihi perspectum sepiusque æstimanti admirationi fuit, quod à morbosa afflictione ipse liber tandem permanisset; attamen quum ab ineunte fere ætate eidem adlueret, consensu in alteram quasi naturam videtur conversa. Nota enim mihi sunt perplura ejusmodi exempla; ubi viri aulæ innutriti, sine notabili sanitatis detrimento diu vitam egerunt incolentem, donec tandem, ob infestum fortunæ casum, diuturno morore vel graviiori animi perturbatione afflicti, tota natura simul & semel cum omnibus functionibus succumbente, confestim in statum cachecticum, vix ulla medicina reparabilem conjecsi sunt: ut usque eo clare pateat, quantum animi pathemata habeant potentiam, cacochymiam vitiolosam diu latentem in actum deducendi, & in pessimum valitudinis statum convertendi. Curationem quod attinet, quam in nostro ægrotò, ætate non adeo multum provecto propter continuam corporis excitationem nec duriciem, vel firmiorem in visceribus obstructionem, nec polyposum in majoribus ramis concrectionem suspicaver, ipsamque corpus non adeo pingue, sed bene transpirabile deprehenderem, convalescentiæ spem promissi, si modo Vir generosiss. per aliquot menses strictam cum patientia & obedientia dietam servare

accusum.

accommodarique uti vellet remediis. Nec conceptam spem fecerit eventus; siquidem sub critica matrice viuida per urinam evacuatione, quae in statu cachectico-hydrotico semper boni est omnis, symptomata remiserunt, & aeger succellit temporis integre sanitati sui restitutus.

OBSERVATIO III.

*Cachexia
depressa
ab inordinata
dieta.*

Vir in XL aetatis anno constitutus, temperamentum sanguineo-phlegmaticum, texturae firmitatis, qui à primis juventutis annis comestitionibus & poculis diligenter interfuit, maximeque spiritum vini magna in copia hausit; vix ephebus factus copulam inuit conjugalem venereque strenue exercuit; nihil minus praeter ventriculi flatulentiam & steriles inhius incommoda valetudinis nulla unquam sensit. Ante aliquod vero tempus diuturniori afflictus morbo subito incurrit difficilem respirationem cum magna virium iactura, paulumque sensim intumescens tum vacillatione junctam. Succedit subitumidus habitus, faciei pallor, & aestus circa vespertam volatus, cum insigni oris ariditate & siti siparum. Praeter haec continui aliunt vomendi conatus ipsique vomitus, quibus tam efulem, quam potulenta regere debet; alvus est aperta, sed flantibus densa, urina fecedit pauca & rubra, sedimentum deponens sat copiosum. Ego sub tam confuso rerum statu de recuperanda valetudine plene desperavi; ut tamen aeger levamen quoddam acciperet & ad aliquod adhuc tempus vivus servaretur, ab usu medicamentorum abstinere, aërem mutare, & moderata dieta cum animi tranquillitate uti commendavi.

Epicrisis.

Hanc morbi historiam eo potissimum fine hic inferere placet, ut dilucide appareat, quare ratione per inordinatum vitae genus natura debilitari & ad graves morbos, qui non statim se exerunt, sed succedentibus deprimi annis, praesentem gravini animi affectu accedente emergunt, disponi possit. Deinceps sciendum, sub tali corrupto morbi statu tantaque naturae imbecillitate vix ullam medicamentis, etiam praestantioribus, superesse locum; sed omne, quod Medicus tentare & efficere potest, id temperatis & lenioribus dieteticis debere perfici, quippe quae optimus ejusmodi aegrotantibus dant levamentum. Graviter itaque errant ii Medici, qui adversus tam fontem morbum multis & validioribus remediis pugnandum esse sibi persuadent.

OBSERVATIO IV.

*Chlorosis
a male cu-
rata pas-
sione lecho-
thica.*

Vir generosus, L. & aliquot annorum, constitutionis sanguineo-phlegmaticae, animique tranquillioris, iucundationibus cum vita sedentaria punctis admodum deditus & inde à multis annis defluxionibus castrahilibus & rheumatismis cum latente febricula obnoxius, incidit autumnali tempore in febrem quartanam, quae post sex septemve accessiones electuario quodam ex china chinæ confecto discissa, sed post aliquod tempus via reversa eodem medicamento promte debellata fuit. In hujus vero locum succellit corporis totius languor, appetitus prostratio, ingens à sumtis cibis praecedentium compressio, tomus paucus ac turbulentus & insigne virium decrementum; quibus demum superveit cum pal-

piratione cordis & pulsu intermittente dyspnoea, sub corporis motione & adicentis scalarum molestissima, nec non pedum intumescencia. Quum itaque uxor anxie meum efflagraret auxilium, ego morbi causis, quam praecedentem quartanam esse augurabar, & agrotantis naturam probe perspecta, difficilem mox curatum morbum judicavi; suasi tamen, ut preparato prius bene corpore sintes Egranos tepesfactos cum congruis tam roborantibus visceratibus, quam laxantibus medicamentis biberet, ob aëris mutationem peregrinationem inflinueret, & quam rarius antea adhibuerat, sanguinis detractionem, singulis anni quadrantibus admitteret. Sed hinc minus rite observatis, quum alius Medicus sine horum remedium ope levamen promitteret, aeger non multo post in pejorem statum coniecit, viribus decrecentibus & lipothymia subinde intercurrentibus, demum succubuit.

Epicrisis.

Medicamenta seorsum, quae inter merito cortex Peruvianus primas tenet, si minus circumspicere sed intempesive, non attenta agrotantis natura morbosae causa, nec iusta temporis, ordinis ac doctos ratione habita propinantur, in pessimam valetudinis statum, & juniores quidem in hypochondriacum, proveciores in cachecticum & hydropicum affectum facile posse conjicere, ego compluribus testari possum exemplis. Hae quippe medicamina, quae adstringendo potissimum vim suam exerunt, lenioris naturae subjectis, praesertim in quartana ante iustitiam causae morbosae correctionem oblata, minimos viscerum meatus, qui sanguinis & feri depurationi serviunt, occludendo, visceribus non modo virosam inferunt labem, sed & naturalem humorum crasim penitus deturbant, ut subito inde, nisi cito succurrat remediis, irreparabilis fluxus cachecticus in scenam prodcat. In hoc nostro casu suspecta mihi fuit cordis palpitatio, pulsuumque intermissio cum respirandi difficultate, sub paulo validiori corporis motu ingravescentes; quae symptomata concretionis polyptorae indicium mihi saepius dedecunt certissimum; unde etiam prognosicon non adeo auspicatum circa hunc affectum proferre potui.

OBSERVATIO V.

Vir XXX. annorum, laxioris & pinguioris corporis habitus, temperamentum sanguineo-phlegmaticum, qui haecenus crudo victui largitione cerevisiae crassioris potui adiectus vitam egit sedentariam; autumnali quondam tempore, quum sub frigido aëre nudo capite diutius steteret, febre corripiebatur continua, in qua ob urgentem sitim & aquam & cerevisiam secundariam magna bibebat copia. Convalescebat quidem, sed post aliquot hebdomadas afflictebat profluviu sanguinis ex utraque nare valde inmodico & per duodecim fere horas durante. Adhibebantur venar sectio & alia hoc sine ulla remedia, sed sine effectibus; donec tandem, superveniente lipothymia fluxus sponte cessabat. At vero brevi post facies antea rubicunda & florida suffundebatur pallore, oculi apparebant concavi, pedes semper frigidi & subitumidi à tactu digitorum retinebant foream, appetitus cum viribus mirum languebat & difficilis sub levi motu aderat respiratio; quae mala aeger expugnaturus meam requirebat opem.

Epicrisis.

*Depressa
chlorosis
duplex
causa ab-*

Epicrisis cum curatione.

Ex variis subinde causis statum enasci cachecticum, attenta observatione & experientia abunde scitis intelligimus. Equidem principalis & proxima hujus mali causa in vigore & robore solidorum, quo circulantur & depurantur fluids, deperdit consistit; attemen quæ hanc principaliori propugnatae servantur mediate & occasionales causæ non unius ejusdemque sunt generis. In nostro casu vires solidarum partium destruxisse videtur tum potius in febre & extra ipsam immodice adsumtus, tum nimia sanguinis per effrenem hæmorrhagiam amissio. Non semel enim sed sæpius experiri mihi licuit, homines phlegmaticos & obiores, qui strenui fuit potatores, in hæmorrhagiis & quandoque etiam in paralyticis affectibus longe incurrere facilius, quam quidem eos, qui calidiores & sicciores sunt temperaturæ; vix aliam ob rationem, quam quod à nimia sericopia facile infarctus sunt viscerum sanguineorum, qui liberiores sanguinis circuitum interceptando, ejusmodi congectiones & metastases sanguineas efficiunt. Et inde quoque fieri observamus, ut proceræ ejusmodi subiecta à nimia ciborum & cerevisiæ ingurgitatione progressu temporis macie valde extenuentur & demum sub plenaria virium & appetitus prostratione in atrophiam lethalem incidunt. Si curationem respicimus, frustranea omnis est medicina, nisi in tempore hi belluones sibi temperant. Optimam tamen locant operam rhabarbarina & elixiria blanda stomachica, digestionem roborantia, quorum compositionem jam supra in ipsa curativa methodo docuimus.

OBSERVATIO VI.

*Chlorosis
et suppressio
menstrui.*

Virgo generosa, XVIII. annos nata cui ante biennium exire primus recto ordine coeperunt menstrua, sed non multo post, quam iterato fluxu patens butyraceum, calidum laque frigidi adiensisset, subliterunt, varias abhinc incurrit rectæ valetudinis læsiones; quales possibiles sunt, pedum gravitas, movendi impotentia, dolores circa præcordia post sumtum cibum præfioris & contringens, tantaque spirandi difficultas, ut vix per scalas ascendere valeret. Alvus præterea est adstrictior & flatibus, sinistram præcipue latus distendentibus, turgida, facies pallida, pedes sunt tumidi & gelidissimi, pulsus arteriarum in manibus debiles, circa colum contra vehementiores; conjunctis simul per intervalla capitis doloribus atrocissimis. Ut igitur promoveretur, quæ usque huc suppressa fuerat mensium fluxio, adhibita quidem sunt, cum repetitis in pede venæ sectionibus, medicamina varii generis euphorisid, sed nullum ab omnibus misera tulit levamen. Neque ferre poterat pediluvia, quamvis temperatoria; quippe quorum usum mox cordis palpitatio, & levissima animæ defectio insequi videbatur. Quare ut tandem à tantis liberetur malis, neum ægrotantis mater imploravit auxilium, & ut curam vernalem præscriberem vehementer à me petiit. Ego itaque suavis fui, ut primo omnium pedes ægra in perpetuo servaret calore & præmissis eorundem cum panno asperiori frictionibus, & venâ tusa sex minimum cruoris uncias emitteret; post hæc vero per decem dies singulo mane hauriat nodulum, talis compositionis: *Rec. radicem Zedairæ, aristolochia rotunda, vincetoxi-*

et, ana unciam dimidiam, herba melissa majorum, florum chelidii pogill, quatuor, rhabarbari drachmas sex, foliorum feniculi stipitibus, limatura martis, ana drachmas tres, cinnaomoni, anisi stellati ana drachmas duas, crocoris tartari unciam dimidiam, pagularum minorum uncias tres, C. D. S. species pro una & dimidia vini mensura. Dein elixirum nostrum viscerale ad sexaginta guttas in prandio assumentum obtuli, & denique ut loco cerevisiæ secundariæ, cui hæctenus adjuverat, cerevisiam bene coctam & lupulatum biberet, corpusque, quantum fieri posset, motu & labore sæpius exerceret, commendavi.

Epicrisis.

Non semel sed frequentius per id temporis longinquum spatium, quo morborum curationibus vacavi, annotare mihi licuit, à solo pane ex siligine vel tritico cum vel sine butyro inter ipsum menstruum fluxum largiori in copia calide comestio pertinacem mensium suppressionem una cum doloribus circa ferobiculum cordis pressioris aliisque pessimis symptomatibus fuisse inductam. Cuius quidem peculiaris effectus hæc videtur ratio, quod ob deficientem digestionem & dissolutionem multæ in prima regione visiosæ cruditates & inde spasticæ stricture fuerint concitate, quæ ad totum excretionis salutiferæ negotium pervertendum sunt valdidissime; ut adeo dicere liceat, quam caute & provide non modo circa cibos, sed & circa omnium rerum non naturalium usum foemina, præsertim juniores & sensibiliores sub ipsa menstrua purgatione gerere se debeant. Deinceps de illud dignum est, quod ex præfata morbi historia observetur, pediluvia, alias plane innoxia, & salutaria in ejusmodi casibus effectus, nisi præmissa venæ sectione & pedum, qui plerumque frigidi sunt, fomentatione aut frictione, neque calida, neque epida esse admittenda: cutis enim strichuram augendo, majorem sanguinis ad præcordia reditum inferunt. Denique, ubi à propolis remedia fluxus non revertatur, rectum thermiarum Carolinarum usum tam internum quam externum suasi, utpote quæ salutares aque ad mentes in juvenculis subsistentes revocandos nunquam non deprehenduntur utilissima.

OBSERVATIO VII.

Virgo nobilis, XXIV. annorum, sanguineo-cholericæ, à primis adolescentiæ annis valde inordinatum habuit mensiuorum successum; siquidem mox per duos menses sanguis plane nullus, mox admodum parca prodit copia. Jam vero dimidia pars anni præterit, quam omnis fluxus expiravit: unde malle malorum origo. Incidit enim optima virgo in chlorosin, sive malam corporis habitum, ex pallido & sublivido faciei colore satis conspicuum, jam anhelosè respirat, languore totius corporis, maximeque pedum gravativo afficitur, ciborum malisidio pressa, quæ adsumit alimenta, vomitu rejicit, totumque corpus, exoluta prope viribus, indies magis marcore consumitur. Hæc mala expugnaturus Medicus, vomitorius, laxantibus & calidis pelliculis emmenagogis hæctenus morbum aggredi satagit, venamque brachii sinistri tundendam curavit, sed tantum abfuit, ut levaminis quicquam atulcris, ut potius rebus in pejus ruentibus, nunc permolesia tussis ægram diu noctaque excruciet, & febri-

*Chlorosis
cum natura
cholericæ.*

fabriculosa intemperies cum frigore & infrequenti æstu, insignem plantis pedum & volis manuum ardorem inducere, aliquoties de die, præsertim circa noctem, invadat. Anum præterea obident hæmorrhoides cæcæ & tumidæ, quæ tanto ardore ac dolore furiunt, ut forum prope omnem eripiant. In tam misero rerum statu posita virgo generosa petiit à me majorem in modum, ut ipsi consilio & auxilio fucarerem. Unde ego præcibus annuens consilium dedi, ut præmalis per aliquot dies pediluvii, venam in pede secandam, & aliquot cruoris uncias detrahendas curet. Dein ad sanguinis circuitum æquabiliorum reddendum tussimque demulcendam præscripsi insusum thei-forme, quo mane in lecto ad aliquot patellas epoto corpus ad lenem sudorem profluendum disponere debuit. Posthac ut ventriculi quoque digestio promoveretur, & cruditates acido-vicidae corriganter, elixirum obuli stomachale balsamicum & loco ponas ordinarii decoctum temperatum adsumendum. Ad calorem hæticum internum refrenandum propinavi pulveres leniter nitrosos, item succum citri vel aurantiorum cum corallio & matre perlarum infusum, circa tempus forni æ aquis sedativa virtute imbutis, ut cerasorum nigrorum, melissæ, florum tilæ, primule veris, &c. addita spiritus nitridulcis & syrupi balsamici portione, capiendum. Denique quoniam generosam virginem ad itæ adfectum valde proclivum deprehenderem, ab iis omnibus summo studio abstinere consului, quæ animi tranquillitatem ullo modo possent turbare. Et hæc sunt quæ in præsentis morbi statu accommodata duxi remedia. Quo tamen specialius prospiciatur saluberrimo mensium negotio, nisi aquis medicatis hoc fine utilissimis utendi copia daretur, circa eam temporis periodum, qua alias ferri consuevit menstrua per uterum purgatio, remedia, quæ specifica quidam menses leniter ciendi virtute possent, adhibenda putavi. E quorum numero præcipue eminent martialia cum aromaticis & balsamicis prope mixta. Ego itaque à longo abhinc tempore summo cum fructu alterius diebus adhibere solitus sum pilulas nostras polychrestas cum pulvere martiali tenuissimum remixtas, itemque tincturas facinæ probe alcoholisatam & minus spirituosam, frequentius potui inditam. Nec contemnendum pollicentur effectum frictions in partibus inferioribus circa pubem, illa, dorsum & pedes cum pannis calidis, præmissa harum partium cum unguento ex oleo liliorum alborum, vel æxungia humana, oleo lavendulæ & jupiperi consilato inunctione, insituate sepiusque iterata.

Epitript.

Quæ agram nostram excruciant symptomata, amice à critica illa & subterranea sanguinis mensuræ excretionis suppressa sua ducunt incunabula. Deficiente enim vel prius intercepta talismodi condita fluxione ingentem sanguinis & humorum massam contrahit dysscrasiam & impuritatem, ut nec nutritioni, nec partium corporis nostri functionibus vitalibus & animalibus præesse amplius possit. Quod si itaque a pessimis his malis afflictas feminam liberare debet Medicus, opus maxime omnium est, ut sanguinis utilissima excretio naturali refluatur integritati humorumque massa ab impuris sordibus liberetur; quod tamen non ita facile, ut primo quidem intuitu putatur, perficiatur; sed magna adhibenda est cautio, ne imprudenti bonorum remediorum appli-

catione malum deterius reddamus, gravioraque arceamus symptomata. Exemplo nobis luculento esse poterit perversa Medici in præsentis casu curatio, utpote quianæ quamobstrucla & angustata uteri oscula referat humoresque fluxiles & ad excretionem apti facti fuerunt ingentem fluidis per cuncta, purgantia, venæ sectionem in brachio & emmenagoga, quæ ex myrrha, croco, aloë & baccis lauri confecta repert, fluidis introductis motum; ut adeo non mirum esse debeat, si omnibus in pejorem statum conversis, molestissima tussis cum spirandi angustia & hætico calore juncta succellit.

OBSERVATIO VIII.

Equidem non possum, quin candide hoc loco recenscam publicque juris faciam singularem plane & in libris Medicorum haud facile obvium morbi cachectici, sive simplicis, sive cum incipiente hydropre juncti & quocunque ex causa subortu curationem, quæ cum urina vaccarum recenter excepta & loco aquarum mineralium per mensem & ultra singulis diebus mane ad mensuram dimidiam vel unam pota, felici admodum successu instituitur. Viximi jam & quinque effluxere anni, quam mihi, ad valetudinem Potentissimi Regis Prussie tuendam, Berolini degenti primum de peculiari hac cura coexistit. Result quippe mihi virgo, quæ liberorum informationi vacabat, Gallica, esse ibi feminam itidem natione Gallam, quæ hac methodo vernali & æstivo tempore complures, maxime feminini sexus, ex mensium obstruclione & post puerperium chlorosi & cachexia laborantes, omnibus remediorum generibus nihil proficientibus, pristina restituisse sanitati, & ipsa, quæ hæc mihi narrabat, sancta fide adieverat, & ante annum misere afflictam eadem curatione integram recuperasse sanitatem. Ego hinc paullo magis de nova hac & prorsus mirabili medendi methodo sollicitus veritatem percontando erui diutius insili. Adhuc itaque, me postulante, perlatæ virgo plures numero feminas, quæ narrato prius morbo suo statu itidem constanter adiecebant, semper ipsas, hausta mane extra urbem in palcos ultra mensis spatium vaccarum urina feliciter fuisse sanatas, & exierere hoc remediis genus suum tam per alvum, quam urinam operationem, quæ ciborum adpetentia pæne emotua cum viribus mirè restitueretur. Tum ego urina insignem quantitatem mihi adportari jussi & cum ea, quæ sequuntur, feci experimenta: bona ejus parte in vasis stanneis super carbonem lento calore inspissata, post multos emissos vapores deprehendebam magna flavescens, quod gustu exploratum insar bilis amaricans erat & salisum; assundebam spiritum vini rectificatum, & en, mox color extrahabatur flavescens; sal remanebat viscosum immixtum, quod medæ erat nature & in aqua solum saporis terræ solistæ tartari non absimilis. Unde collegi, præclaram hujus remediis virtutem a sale essentiali herbarum, quibus æstivo tempore hæc animantia vescuntur, esse deducendam, cujus ope non modo viscerum oppilationes referantur, sed & visioforum humorum per urinam & alvum promoveretur excretio, ut ideo nihil dubii sit, quin adversus complures morbos medicina sit efficacissima. Posthac hujus remediis usum adhuc commendavi aliquibus, chronicis passionibus afflictis; attemen, quoniam scetidam hanc medicinam, nausæa inde correpti, respuebant, plura circa ejus virtutes tentamina instituire

Remediis
ferventibus
periculum
interitum
causam
causam
causam

insinuare non potui. Interim, quam sub tractanda hac materia rursus in mentem mihi venerit, curioso lectori reticere nolui, hoc tantum commonescens: nisi ob squalidum foetorem sola urina sine nausea in usum duci potest, melius fortasse poterit, quando sal ejus, facta evaporatione remanens & in aqua solutum offertur; quod vero, an eundem praestet effectum, aliis experendum relinquo.

OBSERVATIO IX.

*Cachexia
in femina,
aqua Lau-
chstadien-
sibus san-
ata.*

Formina procera & gracilis, XX. & aliquot annorum semper largum & regularem habuit mensem successum. Accidit autem aliquando, ut, dum menstrua fluent, vehementer percelleretur terrore; unde mox salutaris hac excretio suppressa per longum tempus remansit. Varia hinc ingreiebant valendissimi incommoda: lassitudo enim & gravitas membrorum cum lurido faciei adspectu subsequabatur, parum cibi sumebatur, pedes intumescabant, caput lancinante dolore satis vehementi quotidie fere afficiebatur, respiratio erat difficilis & febricula quondam non continua sed erratico, quae nullam servabat periodum, cum magna siti per intervalla invadebat. Ego igitur in consilium adieci, pullum in manibus deprehendi valde languidum, qui contra satis vehemens & fortis erat circa collum & tempora; unde brachii venam secandam iussi & sanguinem valde fibrosi educebatur copia. Postea commendaui aquas Lauchstadienfes, una cum balneo tepido circa vesperam adhibendo, & elixira nostri viscerum usu bibendas. Integra tres primas durnat haec curatio, praemissa & interposita, adordes evacuandas, essentia rhabarbari cum tinctura tartari parata, vel etiam pulvere rhabarbarino cum cremore tartari confecto. Et optime res processerant; melius enim agra adpetebat, paulatimque vires recipiebat, respiratio simul reddita faciliore. Redebant quoque menses circa statum tempus, sed tantum vilcidus instat horae cursu liquor parviori effluebat copia; qui tamen essentia succini, myrrhae & croci succellu temporis desinebat & sanguis naturalis reddebatur.

Epicrisis.

Fontes Lauchstadienfes aquam vehunt puram & subtiliorem, sulphurei odoris, croco maris tenuissimo imbutam; quae hinc etiam ab injectione galliarum mox purpureum & postea atrum induit colorem. Scrij si olim de viribus & proprietatibus horum fontium, quorum ego inventor sum, integrum tractatum, & certa adferebant fide possum, iisdem loco balnei decenter adhibitis atrocissimos dolores, membrorumque contractions, cum multo ichthiaden fuisse sublatas. Interne pariter eximii sunt usus; siquidem cum debito regimine, & sufficienti corporis motu potius fetres chronicas, asthma & leucinae quoque chlorosin fugarunt felicissime. Equidem multi, etiam celeberrimos nostri temporis Medici, ex Marte praeparata remedia in morbis, ubi viscerum oppilationes & infarctus suspiciendi sunt, propter vim majorem adstrictivam solem reformidare, & inter medicamina infida minime tuto referre; quum contra alii, lique non minoris etuditionis & saepe viri, illa ipsa non modo secunda & innoxia celeberrima, sed & instat panacea in hypochondriaco & cachectico malo summe commendat. Ve-

Erid. Hoffmanni Oper. Tom. III.

rum, ut meam interponam sententiam, nihil ex martialibus Jamni pertimescendum arboris, dum modo cum vehiculo satis largo & diluto sumantur & corporis simul jangatur exercitatio. Multo vero minus periculi alunt ipsi fontes, qui tenue martiale principium recondunt, & tenuissimum illud phlogiston elementum ex terrae sinibus imbibunt; quod quidem in dictis Lauchstadienfis facile deprehenditur, quando haec aquae diutius in vasis majoribus flagrant. Tum enim crocum deponunt flavum, qui cum aequali fulis ammoniaci porione sublimatus flores dat instat croci subtilissimos, sortem & gratum odorem spirantes; ex quibus cum spiritu viri rectificatissimo tinctura maris flavescent, magni usus, extrahitur pulcherrima.

Vene sectionem quod in brachio celebrandam susceperim, haec me impulerunt causae. Natusque praecipue hi morbi a nimia sanguinis abundantia, qua universis humorum circuitus & cum eo salutaris excretionis retardantur. Quum itaque viderem, in hac agra brachii venas sanguine esse turgidas & respirationem, ob sanguinem ad pedes congestum, difficiliorum, in superioribus partibus, quia inferiores id ipsum prohibebant, venam aperiri iussi; maxime quum meminissim jam olim HIPPOCRATEM in statu cachectico & hydropico venae sectionem libe de diena acutor, his verbis commendasse. *Si difficulter spiraverit hydropicus (anasarcoides) & tempus verum fuerit, & simul atas viguerit, & virum robur adit, de brachio sanguinem detrabere oportet.*

OBSERVATIO X.

Dum hac scribo, incidit in manus peculiaris de tumore pedum oedematoso retro pulso casus, quem cum benevolo lectore communicare operae existimo pretium. Est scilicet virgo generosa, XX. annos nata, habitu corporis laxiori animoque sensibiliore praedita, quae ante annum pedum laboravit oedemate; ad quod abigendum quum ex Medici consilio ceruissum exterius applicasset & pediluvia quoque cum thermis Hirschergeris per sex hebdomades adhibuisset, evanuit quidem tumor, sed in ejus locum circa instans mensium tempus atrocissimi capitis & dorsi dolores cordisque anxietates cum insigni pedum frigore corporisque universi languore junctae successe-
runt: quae pessima symptomata redeunte menstrua periodo ita ingravescerant, ut agra motibus spasmodicis agitari & pra nimia pectoris constrictione asthma convulsivo affligi videretur. Advocatus Medicus venae sectionem commendabat, quae tamen ob nimiam valorem exilitatem & constrictionem in pede celebrari minus poterat, sed in pollice ejus institui debebat; unde sanguis valde ipsi & fere congruati largi exprimebatur potus, quam effluebat copia. Tum quidem per tempus minores videbantur accessiones, sed non multo post, praevia levi iracundia, malum redidit ferocius & nunc instat febris, aliquot de die recurrente, certos format paroxysmos, qui vultu sunt horrendi: namque generosa infans quasi perterrita vehementer expavescit, oculi clauduntur, loquendi potentia perit, brachia manusque attolluntur, jactantur, varisque modis distrahuntur, dentibus stridet, spiritum instat mercurium frigidum emittit, pedes refrigerant, labia rigore concussa tremunt & colore livido alpeant, totumque corpus hinc inde agitur & mox antrosum, mox retrorsum movetur. Tandem elapsi
Ee horae

horæ spatia hæc omnia remittunt, remanentibus præ-ordiorum angore, cephalalgia, inquietudine & lassitudine. Ceterum notandum, alvum plerumque esse pigram & vix semel intra tres quatuorve dies deponi, mensuræque negotium consueto tempore rite succedere. Medicus ordinarius latentem purpuram tantorum malorum causam reputans hæcenus pulvres solares & sic dictos nigros Halenses cum essentia dulci concentrata magna in copia obulit, sed sine omni effectu. Alius igitur accessit medicinæ peritus, qui liquorem anodynum interne dedit & externe membra balsamo vitæ insungi iussit cum insigni mali levamine. Sed quoniam prior his fessiois medicamina solaria denuo adhiberet, mox pristina ingruebant symptomata.

Epietisti cum consilio.

Præfata morbi historia licet strictius sumpta ad præsentem tractationem minus pertinere videatur, feracissima tamen est cautionum utilissima, quæ optime nos admonent, quam caute tumor cachecticus externis remediis debeat tractari, nisi ægrotans in grave præcipitare periculum voluit. Dignum autem imprimis est, quod probe animadvertatur, imprudens balneorum, maxime nimis calidorum, usu tumorem pedum evanuisse longoque pejora accessisse symptomata; quod mihi quidem læpidissime in praxi annotare licuit. Ex enim ferum illud acre & impurum, quod in pedibus flagrat, ubi inducta ipsi stricture, à venis resorptum ad partes nobiliores pellitur, has ipsas præter naturam afficiendo, ad ipsiomedias sollicitat agitationes, quæ in nostra ægrota miras luserunt tragedias.

Quam curandi scopo Medicus adhibuit venæ sectionem, præservationis loco debuisset administrare. Interim plenus exinde de summa infernorum parium constrictione convincimur, quæ tanta sunt, ut phlebotomo locum vix relinquant. Quod porro atinet curationem per concentratiora medicamina, quæ in parvissima dosi data magnam edunt efficaciam, ut fere sunt pulvres solares & ejusdem farine alia remedia, hæc jure meritoque videtur taxanda. Nihil enim est deterius, quam cuius spiræ, ut oculus alvæque obstruitur, calidioribus massamque humorum exagitantibus medicamentis uti, & quod noxium in corpore hæret, ad ejus peripheriam cum impetu propellere velle. Quæ perversa methodo nihil profecto aliud efficitur, quam ut anxietates augeantur singulaque exacerbentur symptomata. Multo magis tum eam oportet esse medentis intentionem, ut in paroxysmo violentos motus sopiat & quæ huic extra paroxysmum occasum præbere causas apte præscindat. Quo scopo præter dytleres emollientes & oleosus, pulvres leniter antispasmodici nitrosi & cinnabarii, nec non liquor noster anodynus cum essentia castorei maritatus, qui specifica quadam effrenis motus compescendi efficacia pollet, summam merentur commendationem. Neque sua laude carent remedia externa, quæ inter eminent olea nervina rutæ, lavendulæ, majoranæ, nucidæ &c. admixtione auxungiarum temperata & in linimentis formam redacta spinæque dorsii, nuchæ & pectori inuncta. Quo etiam pertinent frictiones pedum, ad spasmos eorum relaxandos friguæque detellendum.

Plures casus legantur in Responsis & Consultis, usibus medicis. Ser. III. Cap. LXI. usque ad LXV. item Ser. IV. Cap. CLXXXII.

CAPUT XIV.

De hydropo.

THESES PATHOLOGICÆ.

§. I.

Cachexiam proximam esse ad hydropem gradum, conflans amiquissimorum Medicorum fuit assertio, qui inde in suis de re medica monumentis post cachexiam statim de hydropo agere consueverunt. Nullus autem ex omnibus utriusque affectus consensum rectius agnovit, ipso ARISTO, qui lib. IV. cap. I. hæc egregia profert: *hydrops in viscere primario delitescens totum corpus in malum habitum convertit, nullaque est pars moxa carens. Neque enim in inferiori ventre fluctuans humidum hydropem nuncupamus; quandoquidem neque ibi vitium est, sed quum morbum consequitur tumor, inflatio, coloris seditas, ille in aquam colliguitur habitus hydrops est & appellatur. Nam tunc etiam nonnullam foras sponte aqua prorumpit, aut aliqui præcordia referendū effundit, adhuc in sede sua permansit hydrops. Princeps itaque causa malus habitus est, sive cachexia. Quibus verbis optimus hic ex antiquissimis auctoribus clarissime innuit, morbum primarium esse malum corporis habitum, cujus symptoma potius & affectus sit tumor aëquosus; eo quod hoc cessante morbus nihilo minus per aneret. Et in sequentibus ita pergit: *Anasarca laborantes colore ex atro viridique permixto infecti sunt, obscuraque & nigrae venas habent.* Quæ signa admodum etiam communia sunt cachexia affectus. Accedit deinceps & hoc, quod ab insensu causis, quæ malum ingenerant cachecticum, quæ ex CÆLIO AURELIANO in superiori capite descripsimus, hydrops quoque originem ducat, id quod auctores confirmant, ipsaque experientia, optima rerum magistra, abunde satis corroborat.*

§. II.

Quum itaque cachexia morbus cum hydropo tam arctam habeat affinitatem, ut ille hujus causa ac fundamensum recte dici possit ac debeat, non possumus, quin omnibus rite comparatis, in speciali hydropis notione suppedianda, ipsum valde depravatam corporis, quoad omnes partes & functiones suas, habitum dicamus, cum insigni & præternaturali humoris serosi, aut in toto corpore, aut in certis ejusdem cavitatibus, stagnatione & collectione conjungimus.

§. III.

Functiones nostri corporis tam vitales, quam naturales & animales in hydropo valde esse vitatas atque læsas, signa, quibus sese prodit truncatus hic morbus, & quæ optime collegit ARISTOTELIS loc. cit. testium faciunt luculentissime: *Omnia, inquit, inest pallor, spiritus difficultas, tussis; diversa temporibus signa sunt pigritia multa, a cibo abstinens; & si aliquid adsumat, quævis modicum & statim carens, nihil minus valde infatur, distensiones patitur, curæ a madore eorum corpus est, idcirco neque in haberi sudore molestant. Præterea albidus sunt & effumigati; semini sunt graves, torpentes, breves, animi deliquium, circummima quæque sollicitudo, evadendi cupiditas.*

§. IV.

§. IV.

§. VI.

Equidem hydrops à primis fere artis nostrae rudimentis in tres species, *anasarcam*, *ascitem* & *tympanitidem* divisus: atque *anasarca* dictus fuit, quando totum corpus tumore obdusum est; *ascites*, ubi abdomen turgit & intra ejus cavitatem stagnans lymphæ viscera inundat; *tympantides*, ubi abdomen non molle, ut digitorum vestigia imprimi possint, sed valde inflatum ac durum comparet; ipse tamen ARÆTUS quartam addit & inter anasarcam ac leucophlegmatiam aliquam constituit differentiam, existimans: in utraque hac hydropis specie tumidam quidem faciem & brachia esse; & in leucophlegmatia, ubi juxta recundaret, non minus quam in anasarca omne corpus impleri, atque paries tam superiores quam inferiores cum ipsis membris intumescere, quod in illis potissimum contingeret, qui juvenes robusti in aetate prospera fortuna consisterent: ac in hydropo, anasarca dicto, carnem in succum famosum quasi colliquefcere, qualis à membris graviter cõtus effunditur. Dein quoque leucophlegmatiam minorem hydropis speciem curatque faciliorem habendam esse statuit, quoniam variz ejus tollendæ sint prosperæ occasiones, ut sudoris, loti excretionis, aut alvi nonnumquam copioso effluvio; quum contra in reliquis speciebus, præscriptis si mixtæ sint, Medicus totum hominem permutare debeat, si ipsis curare velit. Quæ peculiari & eximio in præxi medica usus differentia illud maxime differentialissimum hic auctor indicasse videtur, in leucophlegmatia quidem perinde ac in anasarca aquam copiosè inter cutem stagnare, sed in hoc sanguinem simul, quo carnes nutriuntur, valde esse corruptum, adeoque virum longe subesse gravius. Multo vero adhuc evidentius elegantem hanc distinctionem in eodem capite describit hunc in modum: aqua inter cutem nonnumquam à corpore frigida potu continuo procrevit, quum prænimia sui ad saturitatem quippiam multam aquam gelidam insurgitaverit, postea humidum in personarum delatum sit, atque inde in ventribus calor refrigerante fuerit. Deinde in illa gutta effluunt, quæ prius in aërem versus per transpirationem diffundebantur. Id igitur si incidit, facilius est hujus morbi curatio, nec quam visus aliquod, aut totus homo adjectus sit.

§. V.

Quod si meum profiteri licet sententiam, ego rei veritate & experientia convictus non possum non ARÆTIO assentiri, quod leucophlegmatia levior sit species, facilioremque recipiat sanationem quam anasarca. Equidem illa communiter à nostris ævi Medicis cum hac solet confundi; quum tamen jam à CÆLIO AURELIANO sæpiusque laudato ARÆTIO aqua intercus vocetur, quoniam inter ipsas pinguedinis cellulas aqua collecta flagrat & hinc colorem pallidum inducit: quum è contrario in anasarca, sive hypofata, ob majorem sanguinis quam in ipsa leucophlegmatia corruptionem, color carnis & cutis magis degravatus & ex atro viridescens adpareat, manifesto indicio, quæ sanguificationi humorumque depurationi inserviant viscera, aut sunt pulmones, hepares & renes, nimis laxitate vel infarctus vicio laborare, & ad functiones secundum naturam peragendas minus esse idoneas. Quando itaque leucophlegmatia cum anasarca juncta est, jam gravior hydropis species emergit, quum leucophlegmatia initium, anasarca vero augmentum præbeat.

Frid. Hoffmanni Oper. Tom. III.

Longe ven deterior & prope insanabilis ea hydropis species est, quæ ascites vocatur, cujus signa optime notavit ARÆTUS, dum loc. cit. in illibus, inquit, tumorem, in pedibus inflammationem videre licet; facies, brachia, & reliqua exilia cernuntur: intumescunt testes, præputium & totus colis ad inequalitatem tumoris tortuosus est. In corporis ad alterum latum conversionibus humor in locum declivem & tumorem & fluctuationem facit, fluctu autem liquoris sonitus exauditur. Ex quibus colligi licet, ingentem lymphæ ob vastam lymphaticam vel hydatides disruptas esse extravasationem viscerumque inundationem, quæ hæc ipsa temporis successu in plenariam abeant corruptionem.

§. VII.

Quoad illam speciem, quæ tympanitis, item quæ hydrops siccus appellari solet, ubi abdomen valde tenum & inflatum ad palmæ percussum instar tympani edit sonum, sciendum est, eam symptoma potius anasaræ & ascitis, quam certam hydropis speciem esse dicendam. Hæc vero si jungitur, ut fere plerumque in ascite evenit, pessimum & incurabilius denotat statum, qui vel à flatibus intra intestina coactis, vel à vapore, ex aqua in abdomine extravasata exhalato otundus abdominis maculos ita à toto suo deijcit, ut penitus elanguescant.

§. VIII.

Ut autem plenius adhuc rectiusque de gravissimi nostri morbi natura indoleque pateat, optatæ erit præsum, epulsem initia pariter ac incrementa cum symptomatibus rite exponere, quæ ita se habent. Primo tumor occupat pedes, qui succedente tempore ad femora, inguina, ilia, abdomen & ad scrobiculum usque cordis pertingit. Intendunt venter aqua turgidus ita promines, ut pedes vix cerni queant & abdominis ruptura sit metuenda. Progressu temporis aqua in scrotum quoque descendit, illudque sæpe ad capitis magnitudinem inflat. Neque scrotum solum, verum ipse etiam penis cum præputio ita intumescit, ut intusqueatur lotique excretioni injiciatur remora. Ubi manifestòprehenditur, aquam, quæ penem distendit, ex vicina inguinis regione cutim inter & carnem penus sese insinuat; contra vero, quæ scrotum in tumorem elevat, plerumque ex abscissione per personarum processu delata. Aliquantulo tamen etiam, maxime in leucophlegmatia & anasarca laborantibus, evenit, ut aquosus humor in paritibus circa inguina collectus sub communibus testiculorum iuregumentis se inferens tumoris in scroto causa existat, abdomine aqua prorsus vacuo. Neque tamen in omnibus hydropicis scrotum tumorem concipit, sed quoddam eorum sine omni ejus intumescencia demortuos novi. In foemina inguina similiter tumida fiunt, & ipsa uteri vagina ab aqua sæpe elongatur, ut procidat. Dein commune hydropicorum symptoma est dyspnœa, quæ post vehementiorem corporis motum & noctu potissimum exacerbata, ob facilem aquæ abdominalis sub sinu decliviori ascensum, suffocationis metum subinde minatur; unde, si liberius respirare miseri volunt, corpus mox elevare & in lecto potius erecti sedere, quam decumbere coguntur. Mirum quoque vexat tassa, sicut ut plurimum & nonnisi inane tussendi desiderium mentiens, dum acris salique

E e 2 lym-

lymphæ, in universo corpore peccans laryngis præsertim & bronchionum fibrillas membranaceas stimulat, irritat, convellit.

§. IX.

Posthæc notabile est, in anasarca urinam minus tenuem & albam, in ascite paucam & crassam cum copioso sedimento rubro latericio. Potius quoque urinae quantitas inter istâs hydropis ut plurimum respondet, alvus laxa est & ciborum appetentia bona; quæ tamen omnia ingravescente malo deficient. Urget præterea inexhausta & elamosa sitis, de qua recte cecinit Poëta: *quo plus sitis pota, plus sitientur aquæ*. Jungitur autem hæc nimia potandi cupiditas ob has potissimum rationes: tum quod salivæ latex ob glandulas salivales obstruatas deficientes fauces aridas irrorare amplius non potest, tum quod ea, quæ adfluit saliva viscida falsaque est, & ab æstu febrili mox exsiccat. Febris enim in peiori morbi statu nunquam sere non adjungitur lenta atque continua, ex pullu, qui parvus fertur & crebrior, satis conspicua, quæ carnem superantem partium una cum viribus lentius paulatimque depescens mortem demum procurat. Deinceps in anasarca æque ac aliae in ignis sæpe pruritus in partibus pedum inter brachia percipitur & pedes quoque maculis invidis & veticulis observantur obiti, ex quibus aperitis serum effluit sua acredine partes rodens, vel etiam inflammans, unde non raro prodeum mali moris ulcera, quæ teste *Hippocrate lib. VI. aph. 8.* difficulter sanantur & consolidantur; utpote visibus acris feri major est ac copiosior, quam ut remediis lenientibus & exsiccantibus possit mitigari. Atque huic speciei hydropis præcipue associatur febris, quæ ab inflammatione interstitorum, præsertim per drastica remedia inducta, originem trahit, cui horror demum & rigor superveniens sphacelose & fænetæ viscerum corruptionis præbet indicium.

§. X.

His ita expositis progrediendum nunc erit ad ea, quæ sectio hydropo demortuorum nobis sistit perscrutanda. Et primo quidem, quod hepatis viscum atinet, ex M. N. C. & BONATI *sepalis luto* alilique anatomicorum libris constat, illud plerumque morbidum fuisse repertum, & nunc quidem pallidum & sere exsangue, nunc tumidum & arum, tensum, scirrhosum hydatidibusque repletum, cum vesicula fellis, materiam aut aqueam & minus amaram, aut spissam & in calculos concretam continente. Speciatim vero hepar in junioribus in globum quasi contractum & induratum, ut sub cultri incisione strepitum ediderit, & in tympanitide aridum & instar corii corrugari torrefactum se annotasse referunt HORSTIUS *lib. III. obs. 9.* & TULPIUS *lib. II. cap. 36.* Læcet contra varia apud RUYSCHIIUM in *observat.* & BONETUM in *lib. cit.* præsent exempla, ubi hoc viscum sine omni labe adparuit sanum: quod idem RIVETUS in *observat. communicat. IV.* testari videtur, qui in hydropico quodam, hepate satis bene constituto, solum lienem reparit corruptum & totam fere ipsius substantiam bili aræ similem. Dein, quoad reliqua viscera notandum occurrit, omentum in dissicilis ascite defunctis ut plurimum inveniri corruptum & sphacelatum, vel plane extenuatum & absumtum, pancreas scirrhosum, & mesenterium, ob vesicas, quibus interioribus obditi solet, aqua repletas & glandulas ad sabbæ magnitudinem tumefactas, in magnam

molem excretam, quæ de re notabilis casus exstat apud TULPIUM *lib. IV. cap. 35.* Neque intestina cum ventriculo relinquuntur immunia, sed ista observavi inflammata, fiderata & corrosa. In tympanitide ipsa æque ac abdominis cavum multis flatibus videtur, quales observationes etiam commemoratur FELIX PLATERUS *lib. III. præf. cap. III. obs. 50.* & HERCULES SAXONIA in *prælect. præf. part. II. cap. 27.* De ventriculo autem notatu dignum est phenomenon, quod interior ejus tunica nodis globosis, parvas avellanas magnitudine adæquantibus tota sit obrita, qui nihil aliud esse videmur, quam exigue illæ in statu naturali majores vel annulares glandulæ, quæ alias tunicæ huic villosæ eo latere, quo nervæ adnexa est, interpersæ cernuntur.

§. XI.

Neque tantum imi ventris viscera male sunt affecta, verum etiam observatio quam maxime dignum est, quod frequentissime in hydropo, sive sit abdominis, sive pectoris, cor, præsertim quoad dexteri ventriculi capacitatem, ingentis & plane mirificæ deprehendatur magnitudinis, ita ut ego in duobus tumidis illud instar bovini conspexerim. Quæ de re consili etiam possunt M. N. C. *Dec. I. ann. V. obs. 64.* item BARTHOLINUS *Cent. II. hist. 66.* Deinde si meam ipsius experientiam licet proletere, ego plena fide testari possum, omnes sere, quos secandos curavi hydropicos, præter viscera male constituta polyposa in corde ejusque vasibus habuissè concreta. Id quod etiam plures aliorum observationes confirmant, ex quibus memoratu digna est, quæ in M. N. C. *Dec. II. ann. V. obs. 66.* descripta legitur, ubi in anasarca demortuo intestina, omentum, pancreas, hepatis & lien sine omni vitio fuerunt visa; in dextero autem cordis ventriculo polypus inventus, qualem etiam venam cavam & arteriam pulmonalem occupavit, ut ideo æger superfluo de ruptura cordis in dextro latere conquerendi causam haberet gravissimam. Et eadem Acta *Cent. IX. obs. 50.* referant anatem hydropicæ, in cujus dextero cordis ventriculo polypus ad quadratam ulnæ partem longus & in arteriam pulmonalem protensus fuit anatomicus: ut silentio præteream complura alia, quæ de eadem re *Cent. III. obs. 117.* *Cent. VIII. obs. 41.* item *Dec. II. ann. VI. obs. 73.* leguntur exempla; hoc tantum adjiciens, ubi cordis vasa polyposa concrescentibus sunt repleta, ibi plenamque ingentem feri in thoracis cavitate effusi observari copiam.

§. XII.

Quod ad serum intra cavitates collectum attinet, hoc ratione copie, coloris & consistentiæ solet esse diversum. Interdum enim instar aque valde est dilutum, siffusculum tamen & igni impositum in gelatinam concrevit, interdum flavum & loturæ carnis non ab simile. Quantitatem si dispicimus, hæc itidem pro corporis amplitudine moribusque diuturnitate almodum est diversa; si quidem quandoque triginta, quandoque sexaginta, imo centum adæquat libras. Contineatur autem hujus aquæ plurima pars in cavitate abdominis, vel intra peritonæum & musculos abdominis; nonnunquam tamen etiam in duplicata peritonæi formato ibi sacco inclusam cum contineri fidem faciunt observationes, quæ inter notabilia est CL. LITTE, quæ in *Mémoires de l'Académie des sciences à Paris ann. 1707.* legitur.

§. XIII.

Señla anasarca hydropo demortuorum.

Observatio circa coarctationem aperiens.

§. XIII.

*Karlo sum-
maris hy-
dropoe.*

Explicetis sic satis dilucide phenomenon, quae in distictis hydropoe demoustrari solent observari, sequitur jam, ut discipiamus, quanam sint praecipue & proximae inundationis aquarum in gravissimo hoc morbo causae. Equidem Veteres, quibus naturalis machinae nostrae constructio hydraulica, inque primis circularis humorum progressus fuit incognitus, lesam in hepate male adfecto sanguificationem & sanguinis in aquam conversionem accusarunt; nostro autem tempore, quo structura corporis humani monumque vitalium oeconomia clarius fuit detecta, longe rectius hae causae possunt demonstrari. Vix autem melior tumoris hydropici causa, me iudice, poterit allegari, quam circularis sanguinis per venas motus & progressus valde difficultis, tardus & variis ex causis praepeditus. Quam quidem adhesionem experientum est Clat. anatomico Lowrio primum, quod scio, infirmum comprobat clarissime. Hic enim in vivo animali venam aliquam majorem filo confixit, itaque vinculum per horam reliquit & protinus tumorem ordinatum in illa parte, qua rami ad venam excurrunt, animadvertit. Simile quid conspicitur, quando ad enormes haemorrhagias filendae infirmum venas valde comprimit, quod nomine *Tourniquet* venit, applicatur. Quod si enim diutius relinquitur, in tumorem succellit pars atollitur. Huc quoque illud pertinet experimentum, quam in homine mortuo vena subclavia, v. g. manus dextrae, foriter constringitur & postea cum siphone in venam manus apertam rubicundus paulo spissior liquor inspuitur. Namque tum brachium intumescit, eoque aperto observamus in cellulas pinguedinosas sub cute miram ejus penetrasse copiam, vix aliam ob causam, quam quod propter positum obstriculum liquor injectus venas, quae per adiposum panniculum transeunt, nimium distendit, atque tandem per ansem poros extravasatus fuerit.

§. XIV.

*Quae om-
nes morbi
causae.*

Enimvero nullus dubio quin ex dictis experimentis abunde satis pateat, nimiam corporis in hydropoe intumescens & separationis fieri à sanguine ejusque intra cavitates & interstitia flagnationis veram causam esse retardatum sanguinis, per venas maxime, transitum. Attamen longe adhuc clarius adferri hujus patebit veritas, si perpendere velimus, quam facile & expeditum sit, ut sanguis in suo per venarum systema circuitu sistatur; idque potissimum has ob rationes. Nam primo sanguinis per venas regressus à partibus inferioribus ad superiores, ob situm perpendicularem, secundum naturae ordinem multis modis est tardior, quam in arteriis; unde etiam fit, ut venae non modo numerum, sed etiam diametrum arteriarum longe multumque superent. Deinde venarum tunica non tanta vi systolica & motrice elastica praedita sunt quam arteriae. Quibus demum accedit, quod venae teneriores valdeque potius instructae sunt tunica, per quas tenue liquidum facile potest transire. Quod si itaque accidit, ut ob nimiam serosi humoris in corpore humano copiam totus & robur vasorum, maximeque venarum propter nimiam distensionem magis infringatur atque debilitetur; non potest non per universum corpus vitalis sanguinis circuitus, qui omnibus

functionibus praestit, easque in integritate conservat, valde languescere atque imminui; quod etiam ex pullis, qui rarus, molli ac debilis est, aperte cognoscitur. Et ex hoc fundamento non modo praeternaturalis intumescens, sed reliquorum quoque cum hydropoe complicatorum symptomatum, ut lassitudinis, gravitatis corporis, pigritiae, nec non salutarum per cutim, renes, & alvum excretionum immixturarum vera deducenda venit ratio.

§. XV.

At vero, praeter hanc perpetuum fere omnis hydropis accidens est ingens tyrandis difficultas, suffocationis metum subinde incutens, quae inde vix aliam agnoscit causam, quam quod ob vim cordis & vasorum immixturam systolicam sanguis viscido rore teferens per minimas & angustissimas arteriae & venae pulmonalis ramificationes non facit libere, nec sufficienter possit transmitti; unde in illis stagnat & facta ad cordis dextrum ventriculum regurgitatione miras parit anxietates. Et quum praecipua pulmonis functio in eo consistat, ut, si per minima & copiosissima vasa ejus substantiae vasa sanguis trajicitur, lymphae & chylus cum ejus partibus maxime nateantur aërique subullion elastica inbuantur substantia, ut inde spirituosus, fluidus & ad conciliandam corpori vires idoneus evadat cruor vitalis; recte omnino colligitur, difficultiorem sanguinis per pulmones progressum gravium accidentium esse causam. Nam laetatur exinde universum sanguificationis negotium & loco sanguinis floridi, fluidi ac temperati vasa copiose sero repleantur & infarciuntur necesse est. Longe vero deterior status est, ubi jam polypose concretionis valis pulmonum & cordis majoribus adherent. Hae enim ratione non modo sanguis per cordis & pulmonum meatus in cursu suo praepeditur, ibique stagnans varia parte incommoda, verum etiam in totius venae cavae systemate omnibusque partibus, ad quas hae venae perungit, subsistere incipit; unde ingens liquor serosi coningit scissio. Quo difficultus autem est, ejusmodi alius corpori impactum repagulum ariis ope tollere, eo facilius est judicatu. eam hydropis speciem, quae tali fundamento nititur, pessimae esse indolis difficultissimaeque sanationis.

§. XVI.

Hae de leucophlegmatiae & anasarcae generatione dicta sunt. Quod vero ad generis ascitis attinet, ego confidenter adferere haud dubitaverim, hepar maxime in hac hydropis specie praeter naturam esse affectum & male constitutum, utpote quum in nullo aequo videretur ac in hoc ipso tam difficultis est sanguinis progressus ac circulatio. Et licet succullosa hepatis à diaphragmate sub respirationis actu commotio, ipsiusque robur tunicarum, quibus venam portae instructam esse ex anatome novimus, sanguinis cursum haud leviter videatur adjuvare; nihilo tamen minus, quando cruor lentescens adpellatur, dicta vena portae, & pulsus & valvulae destituta, eundem per innumeras venae caveae canaliculos difficulter transmittit; unde haud levis ad flagnationem & infarctum sit dispositio. Cui si accedit ob parciorem potum, vitam sedentariam, ingesta liberalius acida & vini spiritus abusus, aut propter haemorrhagias vel febres per adstringentia praepostere curatas sanguinis & lymphae

*Karlo sum-
maris hy-
dropoe.*

*Assili go-
nelli de-
pedit ab
hepatis ob-
staculo.*

lentior ac redundantia, vel etiam ob multas animi aggrinationes morboque praegressos ipsius hepatis ejusque vasorum atonia; vasa utique certo certius infarciuntur, &c, sublatâ proportionem ad motum, sanguis segmienter trajectus hinc inde in canalium alveis stagnat ejusque aquosa pars secreta lymphatica vasa, magna in copia ibi sita, implet. Porro etiam lentescens lymphæ præternaturalis spissitudo ejus per hepatis circuitum modo leviores modo graviorem remoratur. Quod si autem paullo spissior à sanguine secedens lymphæ in hepate obhaerescit, &c, dissipata fluidiore parte, ad majorem crassitudinis gradum redigitur, tunica vitalis illius visceris crassescunt & induratur tandem in scirrhum abeunt, ita tamen, ut induratio rugis intima occupet, scirrhus vero in exteriori parte membranacea vasisque extimis obhaerescit. Præcipuum itaque alitidis sedem esse hepatis, cadaverum sectiones supra adductæ satis faciunt demonstrant.

§. XVII.

Erredone-
ram alimen-
tum vis-
cerum in-
de.

Verum enim vero, præter hepatis reliqua abdominis viscera non sunt ab omni labe remota. Lien enim sæpe extra ordinem magnus, atro sanguine repletus & scirrhusa membrana obdusus, RIVERO, SCHENCKIO, FORESTO & autopsia teste invenitur. Pancreas, secundum RONDELETTUM atque PETERUM in observ. anat. in omnibus fore hydropicis disiectis durum & scirrhusum, quin interdum totum absumtum deprehenditur. Quoniam putridum & emaciatum, glandula mesenterii, intestinorum, duodeni & ventriculi præter naturam constituta, tumida & indurata conspiciuntur. Quod si igitur meum de hisce phenomenon sententiam proferre licet, ego quidem arbitror, hæc abdominis jam rotata viscera litem suam ac vitium simili modo à præternaturali hepatis constitutione & impedimento sanguinis per ejus vasa circuitu unice contrahere; idque positum propter intimiorem horum vasorum consensum & communionem. Etenim notum ex anatomicis est, omnem sanguinem, qui ex ventriculo, fistula intestinali, mesenterio, pancreate, omento & liene regreditur, in venam portæ abire & hac mediante per meæ vasculorum hepatis viscus ad venam cavam ipsamque cor transmitti debere. Quod si itaque ibi progressus & orbicularis motus sistitur, necesse omnino est, ut sanguis ad dicta abdominis viscera regurgians ibi stagnationem, infarctum, scirrhusum & corruptionem causeat.

§. XVIII.

Hydropis
causa præ-
cipua.

Quoniam per uteri, maximeque spermatica vasa, quæ in varios circinnos, pampinos vitium emulantes, concentricos implicatosque divaricantur, difficilior & valde tardus est sanguinis regressus, adeoque longissimum ad vitalem cordis contem iter, fit omnino, ut in utero & connexis ipsi partibus, tubis nempe & ovaris, copiose necesse feri inundationes & tumores aequosi orientur. Nunquam enim citius & promptius fluida & aquosa pars à sanguine secedit, quam ubi lentior minusque expeditus ejus per viscera transitus est, quemadmodum id clare patet in hepate; & ob hanc etiam causam non facile numeratæ oras, quam in hepatis ac uteri substantia & adjacentibus ei partibus, vasa reperies lymphatica, quæ à largiori decubitu & adfluxu lymphæ

dissecta, magnas in vesicas, quæ hydatides Græcis dicuntur, explicantur, quibus demum disruptis nonnunquam subieo hydrops gignitur & mara feri quantitas effusa cavitatem abdominis occupat. Ita permultas hydatides in uteri confinis post partum difficilem reperit SALMUTHUS cent. I. obs. 38. & in hysterica femina gravida dissecta PEGHLINUS obs. 19. In cornubus ac tubis uteri ingentem aquæ copiam nonnunquam colligi, fidem facit TULPIUS observat. I. IV. obs. 45. exemplo foeminae, quæ in utroque uteri cornu novem circiter aquæ purissimæ libras inclusas innumeris vesicis gestavit. Plura ejusmodi exempla vide apud SCHENCKIUM I. III. obs. 6. 7. & ROLFENIUM de organ. genital. cap. 20. nec non SYDENHAM de hydropo. Eandem quoque in rem apprime facit HARDER observatio, perhibens: in foemina rustica repertum esse non solum ovarium sinistrum aquæ subfalsæ & foetens libris duabus oppletum, sed etiam annexam eidem tubum Fallopiam notabili hydatide obfessam. Et nosmet ipsi ante viginti annos ex gravi in hypogastricum regionem lapsu annotavimus in quadragennaria subortum ibi intumescientiam cum dolore testivo, quam aquæ limpida largum profluvium cum sanguine menstruo primum prodire excepit, quod postea etiam cessante sanguinis stillicidio per anni dimidium continuavit, ita, ut quotidie minimum libra una efflueret, donec ægra, incassum adhibitis variis medicamentis generibus, tunc lenteque seque penitus confecta obdormieret.

§. XIX.

Neque etiam adeo insolens, sed aliquoties à Hydropo frequenter observatum est, sub gravidatione simul occurrere hydropem; & hinc fit, ut sapienter Medici in judicanda graviditate fallantur. Vidimus vero ejusmodi foeminas gravidas hydropem simul laborantes post partum copiosiori effluxu servatas; alias autem interisse, humore scilicet in cavum abdominis jam effuso. Inprimis memoratu dignum est, quod PLATERUS lib. III. observat. p. 620. producit de muliere quadam, quæ, quoties uterum gessit, toties detenta fuit alcite. Et hanc ob causam quoque in ea vcrsimus sententia; hydropicos tumores in foemina plus ex utero, quam hepatis & viscerum, quæ cum hepate habent connexionem, vicio subnasci; & facilius quoque perinari, quam ubi hepatis primario adfectum est, eo quod liberior & apertus fero stagnanti per uteri ostia patet exitus.

§. XX.

Quod attinet ad causas procacitatis, antea advertimus, hydropicæ adfectionis, tam pectoris quam abdominis, præ omnibus maxime esse obnoxios homines procere stature. In his enim sicut ob longius sanguinis à pedibus ad cor iter & sinum perpendiculararem ordinario valde tardus & lentus sanguinis est progressus; ita ille ob causas accedentes persicillitur difficilior; unde etiam fit, ut polyposa concretæ cum hydropo pectoris & artuscula in proceris ejusmodi corporibus, his morbus demortuis crebrius reperiantur. Præterea quoque nostro malo admodum sunt subiecti habitu corporis molli, spongioso, minusque firmis instructo libris præditi, in quibus aqua eminet substantia & quos phlegmaticos vocamus, vel sanguineo-phlegmaticos.

Hus

Huc dein & illi spectant, qui corporis sunt obesi, & in tenera juventute cataractosis defluxionibus lapsus fuerunt affecti, nec non qui tumoribus oedematosis frequenter corripiti. Ratione ætatis senes, in quibus ob elatorem vasorum dejectum excretiones non rite succedunt, & lymphæ majorem contrahit lentorem ac spissitudinem, hydropicus tumoribus frequenter subijciuntur. Respectu vite generis, ob vitam sedentariam, fartores, fiores, textores; & ob ætatem, qui fibrarum vigorem imminuunt, vaporosum, balneatores, pilatores, fallones & lotrices in hydropem præ aliis vite proclives. Regiones quoque & loca, quibus inhabitamus, merito huc debent referri; qua de causâ in locis palustribus & maritimis plures reperiuntur hydropici, quam in locis mediterraneis, uti quidem in Hollandia, vino tum aeris tum aquæ, heri animadvertimus.

§. XXI.

Ute autem locus aliquis, qui antea talis non fuit, dein ad hydropem ingigendum aptior fiat, ex accidenti contingere potest, mutata scilicet victus ratione, quod de Angliâ egregie ostendit Listerus de hydropē. Cibus enim & potus inconueniens ad hydropis genesis multum omnino conferant. Ex cibis autem crassis, crudi, viscosi & dulces, vel sola nimia voracitas, in eis potissimum, qui parum se movent, iam ad hunc morbum parantur paratissimum. Frequentius tamen à potu, si quantitate vel qualitate peccat, hydropis malum suboritur; unde eos, qui potulentia, in quibus modice adsumunt nihil aliis noxæ inest, magna in copia ingerunt, non raro annorum decursum, nisi naturæ robur viscerumque integritas id prohibeat, hydropicos fieri consuevit: id quod copiosius hausit cerevisiæ non satis desecare, recentes, maxime quæ ex tritico fiunt & vulgo *Breybals* dicuntur, abunde satis confirmant. Nullum autem potus genus, consentiente quotidiana experientia, tam nocivum est, quam spiritus vini, & illius æmulus ex frumento paratus. Hinc ego non possum, quin ex eo collectas & aromaticas acutas aquas vite vulgo dictas, præsertim si jejuno ingurgitantur ventriculo, aquas mortis iure meritoque censeam. Denique nihil tam subito & intra paucos dies nostrum ingenerare morbum valet, quam potus frigidus post insignem corporis incalcescentiam in copia hausitus, ut usque eo ARÆTUS lib. IV. de signis & causis dicitur. morbor. recte prædiderit: aqua inter cutem non nunquam à copioso frigido potu provenit, quum præ nimia siti quispiam multam aquam gelidam ingurgitaverit. Et hinc quoque est, quod SÆLVIVS in tract. de morb. epidem. annotaverit, in ardore ac siti febri à potu copiosius ingurgitato intra duos tredecim dies hydropem fuisse excitatum. Longe vero gravior noxa perimelenda est ab aquis palustribus stagnantibus, pro potu adsumtis, quas jam tum HIPPOCRATES inter causas hydropis retulit. Et exinde simul petenda venit ratio, quare, uti supra diximus, in locis paludosis & maritimis frequentior hydropis sit proveniens. Neque vero hic excludendum est intemperatius aquarum mineralium tam calidarum quam frigidarum sine convenienti regimine usus, de quo mihi permulta etque tragica exempla in praxi observare licuit.

§. XXII.

Ex omnibus vero his, quæ sicut ad alias chronicas passionēs, ita etiam maxime ad hydropem conferre solent, principem fere locum obtinent animi pathemata, præsertim vero diuturnus animi moror & angor, cui tanta in eis vis atque potentia, ut, visceribus fibrisque motricibus omnem vigorem, tonum ac robur subtrahendo, languidum sanguinis circulum & excretionum suppressionem producat. Nec minor est efficacia vehementis iræ, maxime si cibus, vel potus copiosus frigidus desuper ingeratur. Sequitur enim pressio, ut aiunt, pede ingens præcordiorum contractio & anxietas, color cachecticus, ciborum inappetentia, spirandi difficultas & successu temporis ipse hydrops, quem plus vice simplici succelsisse novimus. Causa tantorum malorum hæc esse videtur: vehementiori hac animi commotione ventriculus cum duodeno & adnexis biliaris ductibus valde & spasmodice contrahitur; unde non modo succi biliosi & pancreatici ad bonam digestionem promovendam secretio impeditur; verum etiam copiosiori cibo ac potu adsumto multum ingeneratur stas, qui alvinam excretionem faciunt totumque sanguinis circulum inaequalem reducit.

§. XXIII.

Nihil insuper magis ad genesis hydropis contri-
buit, quam consuetæ & criticæ evacuationis, ut in febribus per menses, per lochia, in viris per hæmorrhoides suppressio. Vid. HIPPOCRATES Sect. VI. apb. 12. Ita Trajanus imperator, ex retentione hæmorrhoidum alcius factus & curatus, sed recidivum passus mortuus legitur apud DIOCASSIUM. Pari quoque ratione, enormes sanguinis live per vulneta, live per nates, uterum, aut venas lēdīs proflusiones ad hoc malum valde disponere, quotidiana fere experientia comperimus. Nam in sanguine incomparabilis latet vite thesaurus: quo nimium destructo minima & secretoria & excretoria vala conviunt & angustantur; hinc nec bonus generatur sanguis, nec utilisimum secretum liquidum cerebri & nervorum, unde solidarum partium imbecillitas; neque inutile & impurum, quod in corpore est, foras eiecit, unde magna imphritasum coærvatur colluvies. Minime tamen ita simpliciter statuerim volo, ac si omnis largior sanguinis evacuatio hydropicum adfectum producat, sed ubi in corporibus aliæ adhuc causæ accedunt, facile eum oriri arbitror. Ita quidam ab obstruptione viscum scorbuto & cachexia laborantes valdeque acri & impuro sanguine furtos post frequentes & enormes hæmorrhagias in aquosum hunc mortuum incidisse novi; certe non ob solam illam hæmorrhagiam, sed ob malum corporis propter obstruptionem dispositionem atque humorum dykrasiam. Immodica quoque in dysenteria excretio sapius hydropis secunda mater est, quare HIPPOCRATES Sect. VI. apb. 47. adiecit: quicunque difficultate intestinorum corripitur, eos superveniente longa dysenteria aqua intercus excipit & moritur.

§. XXIV.

Imperitiores quoque Medici præpostera morborum curatione causæ hujus mali non raro evadunt; quando videlicet immodicas sanguinis,

difficilis flatuosa, difficilior anasarca, asцитес certe periculosissima; & quando asцитес enim tympanitide miscetur, magni etiam est periculi. Deinde in universum dicere possumus, asцитес, si invaluerit & ex morbis aliis, in quibus jam tum viscera sunt corrupta, aut corrumpuntur, prodierit, & ubi à vasis lymphaticis vel hydatidibus disruptis extravasata est, atque superiora cum sibi marcescent unineque pauca & valde rubræ cum sedimento minguntur, omnino esse incurabilem. Contra vero cum hydropem cum HYPOCRATE sanabilem asцитес, in quo viscera quidem insarta, sed non scirrhus, nec corrupta sunt & aeger appetit, nec male respicit, urinæ mingit tenues, sique ætas est juvenilis. Quando etiam hydrops, præsertim leucophlegmatica & anasarca, in plethorica ex asциmate subnasctur, vel à nimio pocu in febribus & à largiori ciborum adpetentia post ipsas exantlatas, vel etiam post enormes hæmorrhagias suboritur, spes omnino sanationis superest, si tempellive convenientibus succurramus remediis.

§. XXXI.

Tussis quando asциті supervenit, nihil boni potendit, quod suo jam tempore HYPOCRATES recte notavit *Sect. VI. aph. 35. & VII. aph. 47.* Non tamen de tussi ista leviori, quæ etiam inter initia plerumque adparet, hoc intellectum volumus. Malum itidem signum est, si cibi adpetitus cum viribus plane perit, sitis augetur, multum liquidi adsumitur & parum per urinam rediit: neque boni sunt omnes horrores febiles cum ardore interno in alciis, si supervenientes, sed plerumque funestum prænuntiant exitum. Pernicialis quoque hæmorrhagia per pulmones five sedis venas aciti supervenientes esse solet, nec melioris omnis est, si erysipelas cum febre in cruribus erumpit, cum HYPOCRATES etiam *lib. VII. epidem.* advertitur. Qui præterea recidivæ hydroys asцитес, difficulter admodum, & secunda vice vix unquam curatur: quod tamen aliter profusè se habet cum anasarca, qui si periodicus est, non tantum periculi potendit, quam itariæ. Ceterum vero notari meretur, ex nostro morbo non facile quonquam mori, nisi qui in corde vel vasis pulmonalibus gerit polypos, vel in hepate scirrhum, vel glandulas in inflammatione habet tumefactas, vel etiam, si feminas respiciamus, utram scirrhusum atque corruptum.

§. XXXII.

Solvitur interdum citra artem solius nature beneficio hydrops, dum aqua sibi viam & exitum per pedes pandit, vel etiam per ruptum umbilicum aut alibi apertum abdomen. Ab HYPOCRATE in *Coar.* annotatum legimus, diarrhæam in hydropse incipientem esse salutarem. Et mihi quoque nota sunt ejusmodi exempla, ubi per longiorem diarrhæam, effluente pura ex alvo aqua morbus feliciter fuit solutus. Contra vero, si in consummato & inveterato hydropse, vasisbusque jam corruptis supervenit diarrhæa, spes in angustio posita est. Denique adhuc notabile est, quod FERNELIUS *Patholog. lib. VI.* de muliere habet, cui instante menstrua purgatione humor sub abdomine congestus per uterum sponte fuit profusus, ut omnis moles bado subsideret, & quem proximo mense denso succreverit, stato tempore totius iterum effusus.

§. I.

Prius quam traxerit hydropis morbo manus adhibet auxiliatrices Medicus, probe debet respicere, an curationem adhuc recipiat, an plane sit insaniabilis. Hoc si animadverit, consultum erit, à tali cura se retrahere potius, quam sanam periclitari, aut minime hanc ipsam provido prognostico firmare atque manere. Ipsa autem genuina medendi ratio in eo consistit, ut primo aquam, quæ intra cutim & cavitates collecta stagnat, evacuemus, & dein causam, ob quam accumulata est & adhuc quotidie accumulari, perire tollamus. Equidem aquarum evacuatio parum admodum ad curationem videtur consilire, nisi causa, cujus effectus est aquarum extravasatio, removeatur: illa enim nondum sublata nova subinde moles aquarum brevi tempore renascitur. Verum enim vero, quoniam medicamentorum, abigendæ huic causæ idoneorum, vis atque energia ab aquarum copia mirum quantum infringitur & viscera quoque ac partes, ubi stagnant, temporis successu valde læduntur & corrumpuntur, eo omnino adlaborandum est, ut à nimia colluvie corpus liberemus.

§. II.

Ad quem scopum obtinendum, nisi ipsa natura, vel per lævæ diarrhæam, vel per humoris ex pedibus effluxum id præstet, deliberandum est, num arte chirurgica per paracentesin commode & sine periculo id fieri possit. Qua de re egregius exilat locus apud CÆLSUM *lib. III. cap. 21.* qui ita se habet: *Erasistrato, inquit, desuper per paracentesin curandi via, quia frigida aqua emittitur, quæ vitiatæ hepate subinde renascitur. Sed primum non hujus visceris unius hoc vitium est. Nam & plene asциті, & in totius corporis male habitum est. Deinde, ut inde experiri, tamen aqua nisi emittitur, quæ contra naturam ibi subsistit, & jecineri, & cæteris interioribus partibus nocet. Contraque, corpus nihilominus esse curandum. Neque enim sanat emissus humor sed medicum locum facit, quam intus inclusos impedit. At ne illud quidem in controversiam veniat, quin non omnes in hoc morbo se curari possint, sed juvenes robusti, qui vel ex toto careant febre, vel certe sanis liberales intermissæ habent. Nam quorum stomachus corruptus est, quive ex atra bile hoc deciderunt, quique malum corporis habitum habent, idcirco hinc curationi non sunt.*

§. III.

Nostra de paracentesi hæc esto sententia: Quum in principio morbi viscera adhuc sunt bene constituta & excelsiva aquarum mole totum abdomen turget, ut sæpe fit in leucophlegmatia cum & sine anasarca juncta, nec sine periculo aqua purgante potest educi, tum eam, si modo aeger ferre velit, institui posse arbitror, si modo provide & cum certis cautijs, quas B. BRUNNERUS in *M. N. C. Dec. II. ann. VIII.* tradidit, administratur. Hic enim clarissimi nominis Medicus *loc. cit.* ad putredinem feri in abdomine contenti avertendam, quæ ab aëre amisso post paracentesin facile contingit, injectionem tincturæ ex myrrha & aloë cum spiritu vini

*Indicatio-
nem curandi
morbi.*

*Paracentesin
visceris
asциті in
a. excelsiva
apud.*

*Polypus
filius.*

*De hac
operatione
etiam de
Fernelio
notæ præ-
terea.*

vinī camphorato suadet. *Nec est, inquit, quod hanc reformidemus in abdomine: temperatur enim aqua intus contenta, tolerant hanc tendines atque nervi, nam in cane spiritum terebinthinæ, ardentiorē adhibe, intestinis inflammatis felici cum successu adhibui. Nec dubio, quia, si ulla arte aut ingenio hac lymphæ fermentatio in abdomine et inflammatio impediri possit, paracutefus in maiorem dignitatem adferretur, eaque præstari possit, quæ aliis impossibilia visa fuerunt. Exaltata enim abdominis palude, easa lymphatica vel rupta, vel exesa facilius persanarentur.* In hydropoe periclitari sine omni periculo admittitur, & fere absolute necessaria est hæc operatio. In ascite etiam desistat & inextingibili eandem non ad curationem, sed ad suffocationis periculum abigendum, ut æger in vita adhuc conferuetur, institutum novi. Ceterum ex fonte chirurgico jure adhuc repetere licet scarificationes, per quas in pedibus & scroto decedunt infusæ humores in anasarca copiose stagnantes feliciter sæpe evocatum vidi. Sed præcavenda omni modo est corruptio.

§. IV.

Purgantia ad eam educenda præstata.

At vero, ubi in anasarca vel leucophlegmatia copia aquarum per medicamentum cum euphoria est educenda, id omnium maxime per purgantia paulo fortiora, in principio morbi, sufficiens dosi & debito cum regimine exhibita debet præstari. Difficilissimum igitur, quænam hoc sine Medicis usui hæcenus fuerint. Primo autem loco occurrunt elaterium, quod à Veteribus æque ac Recentioribus, ad educendas aquas, mirifice laudatur. Ita Dioscorides lib. IV. c. 151. de eodem tale ferti iudicium: *elaterium confert hydropicis, extrahendo aquositatem mirabiliter sine nocimento, & non est stomacho nocivum.* Sui adfinitur AVICENNA, CELSUS, Alexander MAMMARIAS & postea quoque Jacobus BONITIUS, HERCULES SAKONIA, Joannes HEURNIUS, Gabriel FALLOPIUS de medicinali aquis pag. 55. REHNERUS obs. medic. pag. 167. & HENRICUS ab HEER, qui invicem hoc remedium generis miserie extollunt. Ex Angliis pariter LISTERUS ab SYDENHAM in tractat. de hydropoe idem omnibus aliis purgantibus longe præferunt de hic ita scribit: *elaterium, sive secula cucumeris ægrestis potenter, in permodicâ quantitate, vires suas exsertit in castorbanda alvo & facibus cum serofa & aquosis humoribus copiose egerendis.* Post elaterium gummi guræ seu de Peru ab uno circiter sæculo, si ad aquam ejiciendam ad scrupulum dimidium, vel grana XII. propinetur, valde corpis celebrari. Extractum eius maxime æstimatur à RULANDO & succus iridis nostratis, nec non corticis mediæ sambuci inter polychrestæ & magnæ efficacæ hydragoga non modo à Medicis, sed etiam à vulgo cum laude refertur.

§. V.

Eam necendi modus.

Quod ad ipsam operationem horum medicamentorum attinet, sciendum est, quod acri, volatili caustico principio, nervosæ ventriculi partes vellicando, agant & hinc vomitum in sanis vehementer ciant. In hydropicis autem æque ac emetica ex antimonio parata per alvum magis quam per vomitum operantur, forte quod nervosæ ventriculi & intestinorum tunice ab aqua stagnante nimis sunt flaccidæ & relaxatæ. Unde simul læculenter adparet, ad ingentem

aquarum molem ex universo corpore per alvum exturbandam leniora & mitiora prioribus non sufficere, sed talia omnino requiri, quæ subtili quadam & penetrante sale suo nervosarum & musculosarum partium systema, maximeque ventriculæ & intestina stimulant insignem aque copiam eliminandi vim possident; quæ inter purgantia modo allata ipsæque vomitoria primas tenent, si pro diversitate naturæ corporis, plus minus sensibilibus, convenienti dosi exhibentur. Nam certe non pauci dantur exempla eorum, qui post triginta & plures dejectiones excessiva hydragogi dosi integre convalescunt.

§. VI.

Possunt vero ex fortioribus hisce purgantibus, vel etiam emeticis variæ concinnari formulæ, quibus ipse hæcenus in praxi usus sum insigni cum fructu e. g. *Rec. elaterii, extracti bellebori nigri, absinthii, centaurii minoris, mercurii dulcis singulorum drachmam unam, extr. alli croci grana duodecim. M. fiat cum balsamo Peruviano pulule ex drachma dimidia no. xx. mane sumenda.* Vel etiam insusum potest parari purgans in hunc modum: *Rec. corticis mediæ sambuci, radicis bryonia, iridis nostratis, fibrarum bellebori nigri, rhabbarbi Alexandrini, radicis gentiane rubra, viaticæ, levistici, corticum aurantiorum recentium ana unciam semis, summationem centaurii minoris, pilul. quantur, Caryophyllorum drachmas tres, tartari tartarisati unciam unam. Fiat species cum duobus mensuris vini insusulanda & ad sextam partem pro dosi bis in septimana bibenda.*

§. VII.

Præter purgantia ore assumpta, clysmata quoque ad educendas aquas mirabemur obtinere efficaciam, quæ ex radice asari, cortice medio sambuci, radice iridis nostratis, summationem centaurii minoris, floribus sambuci, feminibus iv. carminativis cum vino & aqua, addito oleo chamomillæ vulgaris & drachmis duabus salis Epsoniensis possunt parari. Neque in omnibus hydropicis omnique tempore opus est, drasticis remediis aquarum evacuationem moliri, sed mitiora interdum ac leniora in majori paulo dosi exhibere consilium est, quæ eundem sæpe longæque naturam præstant effectum. Et tamen non semel sed aliquoties tribus uncias mannae electæ cum duabus foliorum fenæ & cremoris tartari drachmis in aqua fontana leniter solutis & intra dimidium horæ epotis, plus quam decem libras aquarum cum euphoria exturbatas vidi. Pulvis quoque mechascanæ albæ ad drachmam unam vel duas cum vel sine cremore tartari inter securiora hydragoga jure debet referri. Neque minorem promeretur laudem rhabbarum sive in substantia datum, sive in essentiam cum terra foliata tartari redactum. Quam in rem notabilis est historia, quam ex observatione MONTANI Adolphus OTTO in epistola SCHULZII postcritati reliquit. Meminit scilicet viri cupulidam, qui quam ventre, pelibus totoque corpore insperatè immutasset, rhabbarum continuo usque à drachmis ad uncias usque, subducto sero plene convalescebat.

§. VIII.

Possit sufficientem per alvum evacuationem diuretica, quæ simul virtute attenuante & viscidis humores dissolvente gaudent, in usum sunt vocanda. Splendens hæc virtute præcipue salia aqua-

Formula purgantium.

Formula emeticæ & mitiorum purgantium.

Diuretica.

aquarum medicinalium, Egranarum, Carolinarum & Sedlicensium in Bohemia, quæ in liberaliori paullo dosi oblata non modo egregiam aquas flagnantes evacuantem, sed simul etiam aperientem & diureticam possident efficaciam. Quo nomine pariter laudanda veniunt salia neutra, ut tartarus tartaricus & vitriolatus, terra foliata tartari, sal polychrestum, nitrum antimoniale, solutio oculorum cancri quæ cum cremore tartari fit, sal succini volatile cum oleo tartari per deliquium in sal medium redactum; ante omnia vero nitrum ipsum purificatum, vel quod majoris adhuc efficaciam est, nitrum ex micela spiritus niri & olei tartari per deliquium regeneratum; quæ omnia ob eximiam, quæ possident, in obstruktionibus viscerum dissolvendis & tubulis rerum urinosarum reterandam virtutem insigniter merentur commendari. Sed quod bene notandum, hæc omnia sub larga liquidæ quantitate adsumi debent.

§. IX.

Præter hæc vero in diuresi movenda non minorem pollicentur fructum salia herbarum per incinerationem parata, ut absinthii, cardui benedicti, vel solum sal tartari probe calcinatum, liquor niri fixi atque silecium *Glauberi* &c. quæ paullo largiori dosi sumta in tumoribus oedematosis expugnandis mirabilem sæpius effectum præstisse novi. Spectant hæc quoque liquor niri dulcis, liquor noster anodynus mineralis, clystus antimonii, spiritus tartari & tinctura antimonii acris; quæ liquida medicamina vel sola, vel etiam cum dictis salibus per circumstantiarum ratione mixta dari possunt utilissime.

§. X.

Plurimum tamen refert, quo quis vehiculo utatur in dictis remediis adsumendis. Hinc salia laudata neutra longe præstantiorem edunt effectum, si magis cum sero lactis, vel aqua petroselinæ, fragorum, vel etiam vino Mosellano, quod igne est diureticum, quam cum alio potus genere sumantur. Ego quoque non sine insigni ægroantium levamine decoctum ex radicibus quinque aperientibus, radicibus eryngii, ononidis, semine dauci, seleri, bacis juniperi & alkekengi præscribere hæcenus consuevi, quod simul potui ordinario potui substitui.

§. XI.

Sudorifera ubi corpus totum colluvie aquarum sciatet & subcutaneum emunctorium clausum & obstructum est, parum merentur laudis. Nam hydropici difficulter ad sudorem disponuntur; & si regimine externo nimis calido vel volatilibus sudoriferis cogantur, metus est, ne inflammatio cum febre, vel etiam metastasis feri ad ipsum eor vel cerebrum, ut suffocatio aut adæctus soporosis & apoplecticus sequatur, procuretur: quæ observatio circa balnea etiam laconica, quæ cum spiritu vini fiunt, probe meretur attendi. Quod si vero ab ingenti humorum copia tam per purgantia, quam diuretica corpus fuerit liberatum ipsiusque natura ad libentioris transpirationem ac sudorem vergit, tum quidem non validiora, sed temperata diaphoretica, qualia sunt mixtura simplex, liquor mineralis cum refracta dosi spiritus bezoardici *Bassii* mixtus, tinctura antimonii selectior, vel pulvis ex cerussa antimonii, sale cardui benedicti, nitro

purificati sive per se, sive cum rob sambuci vel etuli mixti laudabili effectu minime destituantur, maxime si horum usum cum prudentia crebrius repetamus, vel eorum vires foris ex vino calido, præsertim Hungarico, cum linteis applicato adjuvemus.

§. XII.

Laudatis itaque internis evacuantibus ad auspiciorem effectum consequendum externa debent conjungi, quæ in nostro adfectu, si unquam in alio, operam præstant laudatissimam. Eorum quum in habitu corporis eximo sub cute, ubi copiosi & efferti humores subsistunt, partiumque solidarum tonum & robur prius enervant, mali fomes latent, ipsa sana dicitur ratio, extrinsecus sub varia forma adnota remedia, quæ vi sua roborante, balsamica & resolvente humores flagnantes non irrodo attenuant, & ut in vasorum poros recipi possint, aptos reddunt, sed & putredini resistunt, tonumque & robur relaxatis partibus resiliunt, ad hunc humores per congrua emunctoria è corpore exterminandos plurimum omnino conferre. Et si meum adponere experientiam licet, ego accommodatis ejusmodi subsidii externis effectum sæpe longe præfentiorum facilitatemque, quam ab ipsis internis vidi consequutum. Quæ vero huic scopo & indicationi egregie intervniunt, sunt: radices levissicæ, iridis, squillæ, cyclaminis, folia etuli, herba scordii, cardui benedicti, absinthii, flores utriusque chamomillæ, sambuci, bæccæ lauri, juniperi, semina carvi, cumini &c. ex quibus succuli vel epithemata possunt parari & ex vino, aceto vini & aqua calida vivæ coctæ abdomini, pedibus, & sic roto calide imponi, siquæ refrigerint, reterari. Atque talimodi epithemata aliis sub alia forma adhibitis externis, ut emplastris & unguentis, me quidem arbitro, longe multumque sunt præferenda.

§. XIII.

Equidem recensita jam remedia tam interna quam externa ad subigendum rebellem hydropis morbum omnino sunt præstantissima; autem sola omne curationis negotium nondum absolvent, sed ad causas hydropis radicibus tollendas adhuc ea requiruntur prædicta, quæ, ne aqua facile regeneretur, & recidiva fiat, prohibent. Hiic itaque generosa evacuantibus subungere oportet roborantia; quandoquidem & vitærum, & valorum partiumque fibrorum vis tonica systolica dejecta principalis circuitus sanguinis & lymphæ per vasa impediti & hinc stagnationis causa & ratio existit. Quare hæc remedia, si ulla alia, ad graves ejusmodi passiones earumque recidivas aveniendas virtute possent eximia. Quo nomine commendamus ex materia medica radices pimpinellæ, vincetoxicæ, ari, *Zedoiræ*, extractum absinthii, gentianæ rubræ, cardui benedicti, scordii, centaurei minoris, corticem Peruvianum, castæillæ, cappari, myrrham, succinum, cinnamomum, quando ex hisce cum menstruo tenui & vino Hungarico essentia vel elixirum paratur, quod pro renata etiam cum liquore martiali, ut tinctura maris *Zardisferi* potest misceri & continuato usu convenientique dosi propinari; utpote hoc medicamentum non modo ventriculum & intestina, sed & hepæ, pulmones & lien, quæ tum chylificationi tum sanguificationi intervniunt, corroborat, atque saluantes excretionis, si impeditæ, vel retardatæ fuerint, promovet utilissime.

CAU.

Remedia
tam
externa.

Roborantia
ex materia
medica
pro curatione
dum con-
ferant.

Quam
diutius
procuratur
remedia

Quæ cum
sunt
remedia

Quæ sub
tenui

CAUTELE.

§. I.

Nam vena
sectio in
h. hydropoe
periculosa

Quæstio est non minoris momenti, num venæ sectio etiam in tumoribus hydropicis locum habere possit? Dubium videtur, quia corpus plus ingenti feri, quam sanguinis copia est repletum, partisque solidae omni vigore ac robore sunt destituta, atque præterea apud auctores, præsertim recentiores, vix legitur, venæ sectionem in ipsa curatione profuisse; nihil tamen minus apud antiquissimos medicinarum parentes, ipsamque HIPPOCRATEM multa exstant loca, ubi summa cum laude mentio sit venæ sectionis in cura hydropis administranda. Ita HIPPOCRATES de diæta acutar, hæc habet: Si hydropicis difficultas spiraverit, & tempus verum fuerit, & simul etiam vixerit & virum robur adsit, de brachio sanguinem detrabere oportet. Et eruditissimus Jacob SPONIUS valde notabilem in apophorismis novis Tell. V. §. 87. observationem subiungit: Vidimus, inquit, hydropem virginis curatum venæ sectionibus, qui ab exhibitis hydragogis & diureticis, cuiusvis generis, magis ac magis intumuerat. Et ALEXANDER TRALLIANUS pluribus verbis de ea ita disserit: hydropem anasarcam per venæ sectionem curare quandoque opus est. Si jecur non solum, sed & lien ac ventriculus tumorem ac duritiem habeat, considerate edne per externas missiones sanguinem, tamoque id magis, si vires non prohibeant, & copia sanguinis in venis manifeste, & ægrotus in flore ætatis constitutus sit, nec tempus anni magnum frigus afferat. PAULUS vero AEGINETA lib. III. cap. 48. de curatione hydropis agens paullo clarius, sed cum data conditione id confirmat, dum ait: curantes intumescimus in anasarca ab evacuatione per venæ sectionem, maxime si ob hæmorrhoidum, aut mensuræ purgationis suppressionem constans fuerit affectus. Atque nos etiam, multiplici edocti experientia, in hisce omnino consensum addimus: in leucophlegmatia & anasarca, si status adsit phlebotomicus, atque ab asthmate sanguineo hæc mala præcipuum duxerint originem, venæ sectionem magnam ad curationem momentum asserre. Negamus vero, in ascite hydropoe & tympanite id sine periculo fieri posse, dum etiam ipse TRALLIANUS in loco allegato sub finem addit, phlebotomiam in ascite & tympanite penitus esse excludendam.

§. II.

Curatio
non a purgatione

Quemadmodum in leucophlegmatia & anasarca, ad colluviem feri copiosi exturbandam, validiore medicina purgante, majori etiam sub dosi administrata interdum uti necesse est; ita in ascite nihil drasticis periculosius est, utpote quibus, quod per crebriorem experientiam multum compertum est, desubito inflammatio intestinorum sphæculosa & mortifica, quam anatome detexit, excitatur. Id vero circa fortiorum purgantium usum serio monendum existimo, quod in principio quidem locum inveniunt, dum vires adhuc constant, sed quod non crebrius, & nisi interjectis sex septemve diebus sint repetenda, atque interea vires medicamentis & cibis, laudabilem succum præbentibus roboranda. Præstat tamen à drasticis illis remediis, ut gummi gutta, elaterio, colocynthide, helleboro, &c.

que colligativam quandam viribusque adversus facultatem, quam natura debilis de sensibilibus stomachus ferre minus potest, recondant, interdum plane abstinere de potius in eorum locum purgantia cum emeticis lenioribus mixta propinare, quæ vel in forma pilularum, vel infusi exhibitæ similem laudabilem, longeq; tutiorem exhiberent effectum.

§. III.

Quum scorbutica humorum dyscrasia adfecti perfacile in tumorem incidant hydropicum, tum medicamentis, quæ etiam specificæ adversus hydropem virtute prædita esse creduntur, sic dicia antiscorbutica, ut radix armoracis, raphani rusticani, nasturtii aquatici & hortensis, nec non cochleariæ succus multum sunt præponenda, maxime quando cum sero lactis, vel decocto betæ rubræ liberaliori paullo & repetita dosi adsumuntur. Vidi enim simplicibus hisce remediis simplicissime plebejos à tumoribus hydropicis integre sanatos, mirifica quotidie per vias urinarias copiosi feri ducta quantitate.

§. IV.

Pulvis squillæ & ejus acetum à veteribus, Galieno, Celso Aureliano, Celso & aliis maximi semper in hoc morbo fuit estimatum, præsertim ubi asthma ad suffocationis sepe metum concurrat. Et secundum meam quæque experientiam bona testari fide possum, perpiures misere adfectos inopinatum inde de vis sperandum accepisse levamen. Namque hæc radix sale suo penetrante acerrimo instructa stomacho & aliarum nervosarum partium tunicis fere insinuans motum ipsas cum vigorem, stimulando, resistit, humorumque circulum retardatum insigniter adjuvat. Quod dosin atinet, potest ad grana sex vel octo cum eadem quantitate radicis pimpinellæ vel ari misceri & additis aliquot nini granis, cum vehiculo calido exhiberi.

§. V.

In tympanite magnus & summe proficiuus est usus clysterum, ex speciebus carminativis confectorum. Observavi quoque in hac passione pilulas purgantes cum anodynis maritatas, ut sunt massæ pilularum Stæckii, Wilegansii & quæ ex extracto hellebori nigri, mercurio dulci, sagapeno, opoponace, asa foetida &c. conmixtae sunt, insignem attulisse fructum. Præter hæc vero exterius in hoc adfectu inunctio rotius ventris cum oleo philosophorum, vel oleo camphoræ cum oleo amygdalarum dulcium parato insinuat, & per aliquot dies continuata levamen quoddam præstat.

§. VI.

In malo ascite, ubi viscera valde sunt affecta & spes sanitatis recuperandæ perennis ostenditur, lenioribus laxantibus & roborantibus unice agendum est. Cui usui inserviant pilule polychrestæ ad mentem Becheri paratæ & interposita semper salis aperitivi dosi propinate. Quamvis methodo, nisi res omnino conclamata est, miseri vel curantur, vel certe diutius conservantur. Majorem tamen spem & opem eadem hæc medicamenta anasarca laborantibus promittunt.

§. VII.

• §. VII.

*Causes
circa
frenum
regias.*

Incidit interdum, ut hydropici per hæmorrhoides, vel per nares vel etiam scissuram per menses ingentem sanguinis profusionem, non sine vitium notabile decremento & periculo patiantur; quo casu nihil absurdum & ineptius est, quam narcoticis, ut massâ pilularum de cynoglossis, vel alitis stypticis ad eam comprimendam uti. Nam augere inde vitium obstructions, quæ has fluxiones immodicas progignunt, & vitium major fit defectio.

§. VIII.

*Causes
circa
frenum
regias.*

Oritur interdum post perperam institutam sâlvationem hydropica labes, atque tum decoctis, quæ lignum guaiacum, tassâsas, radicem lappathi acuti, lignum queruum, argenteum virum & antimonium, in prua ligatum ingrediuntur, debet expugnari.

§. IX.

*Causes
circa
frenum
regias.*

Quando serotum vel ex hydrocele, vel ex delapsu aquarum ex abdomine magna humorum copia turget, adeo ut valde situm in lecto & movendi potentiam impedit, paracentesim multi commendant, quæ tamen parum juvat, ut potius nonnunquam plus incommodi creet, nec sine periculo superveniens isphaceli suscipiatur. Et quia humor intra membranas testium satis viscidus hæret, ejus effluxus plerumque parcius esse solet. Præstat in tali casu externis cataplasmatis discutientibus, quorum catalogum supra recensuimus, inhære & curam morari. Horum enim ope sudor sæpe aquosus elicitur summo cum levamine.

§. X.

*Causes
circa
frenum
regias.*

Quando ipsa natura, optima medicatrix, sponte suas sita querens vias cutis poros vel in pede, vel in abdomine aperit, per quos non sine notabili tumori subfultentia dies nocteque multum scri profunditur; cavendum maximo, ne corruptio accedat, quam per episthemata, quæ superiori loco præscripsimus, frequentius adhibita debent prohibere. Interne vero tum temporis cum elixiris roborantibus balsamica natura juvanda, corruptio internarum partium avestenda, vixelque conservandæ sunt.

§. XI.

*Hydrocras
circa
frenum
regias.*

HIPPOCRATES lib. VI. epidem. hanc curam hydropicis proponit: *Hydropse laborantem convenit exercitationibus desatigari, sudare, paucum edere, parum bibere, vino albo, nec multo somno uti, & purgantia adsumere, quibus aqua & phlegma vacuetur.* Utilissima hæc curandi methodum possitimum de prima hydropis specie, leucophlegmatia, intelligenda venit, in quam persicilicet, qui morbos longos & immodicas hæmorrhagias perpelli corpus nimio cibo vel potu replent, incurant. Hicce commendat exercitia, quibus corpus evadit magis transpirabile; deinde sudorem, quo pars copiosi seri avolat, tum paucum, qui non serosum, sed laudabilem chylum gignit; prodesse etiam potus abstinentia, tum quia erofus indulgens sibi dicitur hydrops, nec sum pellis, nisi causa morbi superest vena, tum quia aucto per sitim calore superflue humiditates dissipantur. Neque infrequenter tum hâtorie hydropicorum, qui sola potus abstinentia per annum integrum convalescere omnino. Vinum album urinas mor-

Frid. Hoffmanni Oper. Tom. III.

vet, somnus humiditates augeat; hydragoga vero medicamenta sacra hujus morbi anchora sunt, quia nimiam humidum auferant.

§. XII.

Quum ex statolentia primarum viarum, præsertim in hypocondriaci, tumores ordematosi, qui initium hydropis constituunt, facile gignantur, expedit tunc non purgantibus, sed emenatibus sedulo uti, quæ ex speciebus carminativis & roborantibus, ut baccis lauri, juniperi, herba rutæ, majoranæ, foliis ebuli, floribus chamomillæ vulgaris, & romanæ & seminibus quatuor terminativis, ex aqua vel lacte coctis cum decenti olei anethi & chamomillæ cocti quantitate optime conficiuntur. Eadem methodo feliciter sæpe usi sumus, ubi ex retroquassa, vel intus retenta materia podagrica isphacis & flatus in intestinis initium tumoris hydropici machinantur.

§. XIII.

Sequitur sexus longe fere magis, quam virilis tumoribus hydropicis esse obnoxius, si deficit vel suppressa ad rem us remanet, vel ante quinquagesimum annum plane cessat mendum per uterum purgatio: quod in postimum eventus feminis, quæ otio, somno & vitæ sedentariæ nimium indulgent, vel sollicitudine & molestia diutius afficiuntur. Juvat tali in casu tum ad præventionem, tum ad curationem sanguinem mittere, corpus movere, peregrinari & locum mutare. Quæ si nihil proficiunt, aquis mineralibus tam interne quam externe uti convenit, quæ etiam in suppressis hæmorrhoidibus in viris, ad eas revocandas, magno sunt præstidio & auxilio.

§. XIV.

Quod ad curationem ordematam in pedibus atinet, ea provide est adornanda. Permuta enim eaque tridua novimus exempla, quæ eam perverio modo institutam possint cessasse testantur. Nam si adstringentibus, sive cataplasmatibus tractatur ejusmodi tumores, detumescent quidem pedes, sed intus serosus latex per metastasin repellitur & ad pulmonis delatus catarrhen efficit suffocativum funestum. Longe securius est pannis calidis, vel saccis arena aut fursibus calidis repletis eos fovere, ut in perpetua ferventur transpiratione. Neque inutile est, fasciâ lateri moderate adstrictâ partes tumentes convolvere, ita ut ab extremo partis incipiat & usque ad tumoris finem inducatur. Sunt nonnulli, qui scarificationem, vel etiam profundiorum incisionem cum CELSO fudent, qui eam his verbis præcipit: *incidendum quoque super talum, quatuor fere digitis, ex parte interiore est: quo per aliquot dies frequens humor feratur: atque ipsos tumores incidere alibi plagi oportet.* At vero, mox quidem iudice, tale quid provide & prævia prudenti deliberatione debet heri; nunquam vero in acie, vel scorbutica humorum dyctasidra laborantibus moliri. Facile enim supervenit isphacelis & propter nimis laxam carnem & aquosum affluxum difficulter ejusmodi vulnera consolidantur.

§. XV.

Ultimo loco, ut de eventu mali certiores fiamus, præstat omnino tenere auream regulam Celsi, quæ his verbis comprehenditur: *Consuetudine loquens, est, luso quotidie ventrem moriri, & quæ tempe-
bit, sit alvus, notam imponere: postea quoque die.*

F. I. vider

videre, plenus varpus sit, an extenuatur. Id enim quod extenuatur, medicamentum feruit. Neque alienum est, metiri & potionem ejus, & urinam. Nam si plus humoris excernatur, quam assumitur, ita demum secunda valetudinis spes est.

ENARRATIONES MORBORUM.

OBSERVATIO I.

*Hydrops
aniformis
cum sym-
ptomate
jaundicæ
jaundicæ
jaundicæ.*

Fœmina xxx. annorum, sanguinea, habitu corporis spongioso & succulentio prædita, quæ semper largiora habuit mensura & aliquot cum enormi hæmorrhagia & multis polyposis concrementis ejectis perpessa est abortus; imminenti quondam mensium fluxu vehementi contripitur terrore; unde ille mox suppressus varia atulii incommoda. Siquidem nunc optima fœmina de ingenti corporis lassitudine, inappetentia, præcordiorum anxietate cum languida pulsuum celeritate pedumque intumescencia cepit conqueri. His denum malis jungebatur valde difficilis & anhelosa respiratio, ipse tumor ad femora usque ipsamque abdomen, quod tactu durum & tensum erat, adscendebat; cibi assumi in flatus resoluti multas creabant anxietates, siis intendebatur &; incrementum sperandi difficultate, ægra in lecto erecta sedere & ob suffocationis metum liberam capere auram per fenestras debebat. Varia hinc inde remedia tam emmenagoga, quam purgantia & diuretica nihil forebant opis. Tandem vero ex pedibus sponte aperti quotidie larga aquæ effluebat copia, unde abdominis tumor mirum subinde decrescebat. Ego hinc ad putredinem ascendam pedibus exteriori adpicare iussi sacculos semine mili, anethi, carvi, baccis lauri & juniperi, herba absinthii, scordii, floribus chamomillæ repletos & in vino rubro coctos. Interne singulis quatuor diebus otuli decoctum mannatum cum tartaro emetico acutum sub tali formula: *Res. Manna electa uncias duas, aquæ florû acetiæ uncias quinque, terra foliæ tartari drachmam unam: Coque & solve leni calore: Adde tartari emetici granula subtilia, olei de cedro gutt. quatuor, essentia corticis aurantiorum, gentiane rubre ana guttas quadraginta. M. quo medicamento tria aquarum quantitas summa cum euphoria, sine torminibus & virium prostratione fuit educta. Præterea elixir nostrum balsamicum cum vino Hungarico ter de die sumendum iussi. Et hac ratione post aliquot hebdomadas, tumore & duritie successive evanescentibus, appetentia cum viribus rediit, pulsus simul factus est naturalis faciesque reddita colorior. Denique circa illud tempus, quo menses ex utero ferri consueverunt, venam in pede secundam curavi, & en, altero die post ipsi menses prodierunt & tam misere afflicta fœmina exoptatissimam recuperavit sanitatem.*

Epicrisis.

Sifit hic casus exemplum hydropsis, qui ex mensium, vel in yiridis hæmorrhoidum fluxu cohibito, salvis adhuc & sine induratione, obstructione vel scierhescentia visceribus, subito fit enalici. Subortus autem à talis modi causis hydropsis facilius, quam quidem aliis potest sanari, si metuendæ viscerum, & discurantur humorum extravasatorum flatus, corruptionis apertæ occurrere remedia scilicet. Longe autem felicius succedit sanationis negotium, si sponte à natura in pedibus sit apertio. Nam copia humorum extravasatorum subolata relicta adhuc in corpore æque

facili negotio à medicamentis digerentibus & evacuandis vino possunt & excerni. Ego vero, si minoribus res peragenda est, ad sufficientem & nutam humorum evacuationem vix convenientius & efficacius reperi medicamentum, quam quod ex majori mannæ portione & aliquot tartari medici granis concinatur. Dici enim vix potest, quantum hoc remedium educat aquæ quantitatem, sine omni turba & vomitu, qui rarius in hydropicis per emetica solet fieri. Præter hæc notabile in hoc casu occurrit, quod frustra tentetur mensium repente suppressorum revocatio in iis corporibus, quæ à diuturniori animi afflicto & nimis humorum viscosorum stagnatione omne partium robur perdididerunt. Multo magis eo respicere debet Medicus, ut prius effectus morbosos removeat & viribus quodammodo resumptis ciborumque appetentia restituta, circa illud tempus, quo menses fluere siveverunt, vel sanguinis melleos in pede, vel pilulis balsamicis refracta dosi aloeticis & crocatis naturam ad mensium negotium leniter stimulet.

OBSERVATIO II.

Militie præfectus, quinquagenarius, corpore valde robustus, ob varios in victu & potu excessus autumnali tempore in febrem incidit quartanam, quæ quum per mensem & ultra laboraverat, hujus molestiæ pertæsus per quatuor dies larga in quantitate decoctum adsumit valde chioatum; unde febris quidem evanuit: sed non multo post, prægressa corporis refrigeratione ciborumque concoctu difficilium inuementantia, pedes cum abdomine caperunt intumescere, vires imminui & respiratio valde difficilis reddi. Ego consultus curam hoc modo institui: Primo sal quoddam aperitivum, quod sal tartari & Carolinarum, nimumque purificatum habebat, ad drachmam unam in aliquot uncias aquæ & vini solumum bis de die, ut mane & hora quarta pomeridiani, sumendum obtuli. Dein in prandio elixir modicum viscerale, & ante decubitus undecim pilulas balsamicas deglutendas dedi. Denique pro potu ordinario decoctum sarsaparillæ cum tercia vini Mosellani purè remixtum præscripsi, tam felici evento, ut intra mensis spaciū integre mihi convalesceret.

Epicrisis.

A nullo morbo præcedente crebrius hydrops nascitur, quam ex febre quartana perperam curata: quod suo jam tempore GALENUS lib. III. de levis affe. & disertissimus CELSUS sat luculenter prodiderunt. Etenim, quum sedes tum quartanæ tum hydropsis in ipso hepate, ut jam Veterum nalis opinio, præcipue debeat collocari, evidenter adparet, quando hæc febris nimis præcipitanter, & antequam obstructio in hepate vel per ipsam febrem, quæ optima est medicina, vel per congrua remedia naturam adjuvantia, satis expedita fuit, cohibetur, persicile recidivam febris, aut alium longe graviores morbum, qualis hydrops est, succedere. Idque eo magis evenit, si forte ob nimiam ciborum appetentiam, corpore adhuc debili, multi crudi spissique generantur humores, qui ad hepatis insarctum denovo augendum mirum quantum conferunt. Equidem in longinquo artis exercitio complures ejusmodi casus, ubi ex quartana imprudenter suppressa vel novi insultus febriles vel anasarca hydrops prodierunt, adnotavi, sed nulla alia quam supra proposita methodo, quæ unico ad

obstructiones viscerum tollendas & excretiones restituendas directâ est, curam insinui & benedicente Numine feliciter perfeci.

OBSERVATIO III.

Graviditas
ab abortu
causata.

Fœmina genosâ, xxx. annos nata, succulenti & formosi habitus, tertio mense gravida abortiendi incredibiliter sanguinis in magna frusta coagulati, quem molam dicunt obstrictes, eiecit copiam; unde mirum in modum debilitata, vires quidem ex parte resumpsit, sed quum crescente siti nimia erat in posu, exactis binis mensibus ad faciem usque à pedibus valde innumuit, anxie spiravit & de summa totius corporis gravitate lotique retentione coquefacta fuit. Consuluit itaque Medicum, qui grana decem claterii in forma pilularum præscripsit, unde mira colluviei serolis per quindecim fere dies edueta fuit quantitas cum insigni tumoris decremento. Interpositis postea per sex circiter dies medicamentis stomachicis, quæ ex extracto absinthii & centaurei minoris, spiritu nitri dulci, tartari, & essentia corticum aurantium & cascarillæ confabunt, eadem dosi pristinum subungebatur purgans; quo iterum magna feri exturbabatur copia. Tum vero ter singulis diebus rob æbuli ad unciam dimidiam fuit oblatus, & pro ponu ordinario vinum Mosellanicum cum fontibus Dœnnstæinensibus adiunctum, & sic brevi post urina secedebat liberius, totumque corpus, quod antea siccum erat, leni succundebatur madore: ita ut intra sex hebdomadam decursum agria pristina redderet integritati.

Epiſtola.

A nimis harmoniâ hâgis per causam tam internam quam externam inductis, vel a sola crebriori sanguinis è vena secta detractioe tumorem concitari hydropicam, plane non novum, sed in experientia satis obvium est. Sanguine enim notabiliter immixto vasa minora tam secretoria quam excretoria collabuntur, & nec utiles ad motum sustinendum humores, ut cerebri fluidum, feceruntur, nec inutiles per organa excretoria rite separantur. Unde residua sanguinis portio non modo in crasi sua valde immutatur, sed & in motu ac cursu suo impeditur; ut inde persicile feri contingat secessio. Quod vero si incidit, non statim hydrops emergit anasarca & ascites, sed in principio solum leucophlegmatia corpus solet occupare, quæ ex abundantia feri inter panniculum adiposum, ob motuum vitalium imbecillitatem, flagrantem suam ducit originem. Et hæc hydrops species ex facili potest curari, si modo medicamentis, sile quodam subtili volatili vim suam exercentibus mature succurramus. Hæc quippe non modo in tunica vasorum motrices agendo, tonum ac robur ipsis restituant, sed & glandulosas intestinorum partes stimulando, flagrantia feri colluviem per alvum ejiciunt utilissime. Qua virtute præ cæteris pollet elaterium, à Medico cum bonis ægrotæ rebus oblatus; in ejus laudes, jam supra lais expositas, redire nolo.

OBSERVATIO IV.

Pessima
melancholia
hydropica
causata.

Illustris fœmina xL. annorum, succi sanguinisque plena, & semper largiorem mensium fluxum experta, quinqueennio abhinc ætumno in

Frid. Hoffmanni Oper. Tom. III.

cidit in dysenteriam, tunc temporis epidemice grassantem, sub qua cum sævis ventris torminibus cruentas habuit defecationes. Per mensem & ultra hoc malo conficta convaleuit quidem, sed abhinc vires recipere vix potuit; appetentia ciborum erat fere nulla, potulentorum nimia, abdomen flatibus valde turgidum, alvus, quæ antea rite respondebat, nunc constriCTOR, cum languida pulsum celeritate. Inter hæc quum adhuc id haberet infirmum, ut ob inopinatum trium filiorum obitum magno adlitteretur moerore, accidit, ut incremente varium deflectione & coloris pallidi in lividum conversione, univsum corpus, maximeque pedes & hypogastrica regio valde intumesceret. Ad hunc tumorem accedebant summa spirandi difficultas & ad leviorum motum cordis palpitaciones, mensium copiosus & aquosus fluxus, urinaque teous secessio. Consulti sunt plures Medici, qui per acriora purgantia, martialis & calidiora diuretica curationique tentarunt, sed irrita omni opera ægram hydropse pectoris lethali laborantem exilantes derelictam habuerunt. Tandem & ego consului hanc inii methodum. Primo singulis diebus ante decubitus decem pilularum ballamitarum & alterius diebus mane drachmam unam salis digestivi, quod terre soliatæ tartari, oculorum cancri, arcum duplicati æquale pondus cum dimidia nitri purificati portione habebat, ex aqua & vino sumere & insulam theiforme superbibere jussi. His ita per decem dies adultioris radicem mechocannæ albe ad drachm. unam cum radicis ipecacuanæ granis quindecim & nitri purificati gran. decem subjunxi; quo medicamine mira æquoli liquoris, sanguine parum tincti, quantitas per uterum excreta & alvus simul ad decem sedes stimula fuit. Elapsis quatuordecim diebus idem remedium iteravi, interponendo elixirium meum viscerale ballamicum, bis de die ex aqua feniculi & mellis citratæ vinosæ capiendum. Et sic convalescentiæ spes adparebat exoptatissima; siquidem abdomen non modo deumescibat, sed & respiratio erat liberior, facies vividior & appetitus cum viribus vegeior; unde ego medicamentis ballamicis continuandum ratus, elixirium præscripsi ex tinctura paravis, essentia gentianæ rubræ, succini, & additis aliquot olei carminativi guttulis compositum; circa instans vero mensium tempus pilulas nostras ballamicas dedi, quibus iogens aquæ & viscidum humoris copia fuit expurgata. Adpropinquante vere loco acidularum & thermarum per mensis spatium in villa rurali mane assumpta fuit tinctura martis pomata, desuper bibendo mensuram fere unam brodi medicinalis, in quo herba nasturtii aquatici, radices asparagi, feniculi, petroselinæ, apii, addita cremoris tartari portiones, erant decocta. Absoluta hæc cura elixirium nostrum balsamicum & interdum ex rhabbarbo & passula cum cremore tartari laxans ægri adhibuit, & sic intra biennium restituta jam iotg errime vivit.

Epiſtola.

Varia sunt in præfata morbi historia, quæ probe merentur adnotari, quorum potissima sunt:

1) Quod malum dysentericum, nisi finito morbo tonus & motus ventriculi ac intestinorum peristalticus convenienti medicina roboretur, persicile graviolem, ut hypochondriacum & cachectico - hydropicam excitare potissimum possit. Tono quippe & robore harum partium destructo, non modo ciborum digestio & chyli boni

F f 2 gene-

generatio, sed & sordium per alvum excernendum fecesse multum vacillat, adeoque ad spasmos & flatulentias, gravium symptomatum genitrices, intestinorum canalis disponitur.

2) Quod hydropicum malum longe facilius in foeminis ob uterum & mensium negotium, quam in nobiliori sexu producat. Nam propter difficultiorem sanguinis per uteri venas, in semet ipsas valde implicatas, regressum non modo vasa uterina sanguine facile infarciuntur, multumque serositatis ibi deponitur, sed & in toto corpore humorum circuitus languescit & retardatur, adeoque ad cachexiam hydropicam fit transitus. Qui tali vero fundamento natum hydrops, curatu est facilius, quam ex hepatis vicio enatus. Longe enim expeditius est, obstructa uteri vasa reserare, sanguinisque impedimentum motum promovere, & collecta ibi serositates expurgare, quam hepatis obstructum & induratum emollire, & sanguinis per ejus vasa circuitum in ordinem redigere. Cujus rei luculentum esse testimonio potest felicissima collecta humiditatis in nostra aegrotata per uterum evacuatio, à medicamentis digestivis leniterque stimulantibus adjecta, quam ego non semel, sed saepius in foeminis cachecticis & leucophlegmatica laborantibus observandi occasionem habui.

3) Probe notandus est saluberrimus tincturae martis pomatae cum brocho carnis medicinali usus. In genere tamen notari velim, martialia in forma liquida & temperato acido menstruo parata majori cachecticis foeminis quam viris esse praesidio. Hae enim ob laxorem & spongiosorem, quo per nobiliori sexu gaudent, texturam ejusmodi roborans & subdissolvens medicamentum optime ferunt.

OBSERVATIO V.

*Hydrops
affectus a
pericardio
in ca-
chectica.*

Juvenis xx. annerum generosus, habitu corporis spongioso praeruptus viarum sodenarum adductus à prima statim infantia ex scabie retro pulsati insigni pedum abdominique intumescencia cum lividis maculis in cute hinc inde efflorescentibus laboravit. Academiam ingressus valetudinis emendandae causa exercitium commendabatur pugillitarium, à quo vehementer aliquando celeratus, quam largiori frigida cerevisiae haustum infunderet, mox pessime habebat. Languor enim universi corporis cum nulli valida & respirandi angustia sequebatur, aquosus pedum tumor increfcebat, tamque subinde capiebat incrementa, ut non modo scrotum, sed totum quoque abdomen occuparet & ad ruptionis usque metum distenderet. Praeterea, quod notabile erat, à nimia scroto inflatione retrahabatur mensula; & praepitum insit vasa insitum urinae excretionem, quae communiter in hydropo paucior efflolet, retardabatur, pedes frigidissimi nec ignitis regulis ad calorem naturalem poterant reduci; appetitus tamen adhuc modice consistat. Praeter varii generis medicamenta consilium inibat Medici de scroto aperiendo, ex quo cum lancetta aperto ingens aquae profluebat copia, unde scrotum quidem cum abdomine dimanatum, somnus quietior & vires quodammodo refectae videbantur, pedum vero tumor aequo ac molestem tuffiendi conatu perleverat. Sanato hoc ulcere praelina ludebatur tragedia: namque abdomen cum scroto denovo in magnam increfcebat molem. Rursumque cutis in membro virili incidebatur & plus quam decem feri educabantur libere.

Hoc pariter vulnere consolidato vires iterum cum appetitu vigere ventrisque tumor remittere videbatur. At vero quum paucis, obsumum domum revertendi desiderium, ingenti angereetur merore, accidebat, ut praevio horrore & succedente à flu erysipelas in pede erumperet, cui depellendo vix ulla pars erat, medicina. Dolor enim & tumor inflammatorius mox totum corripiebat pedem & circa quintum diem livida, cum interspersis magnis vesiculis, emergebant maculae, pulsus ferebatur debilis & celer, sitis urgebat fere inexhausta, noctes erant insonnes, alvus praeter modum fluida, urina alba & clara, tandemque viribus consumtis aeger placide exspirabat. Corpore post mortem dissecto intra abdominis musculos & pinguedinem magna observabatur aquae quantitas, in cavo vero abdominis mensurae quatuor, in thorace mensura dimidia, in pericardio quatuor circiter unciae fluitabant aquae limpidissimae. Hepar & lien, insolite magnitudinis & coloris pallido albicantis, reperiebantur, durissima, sanguine pane omni destituta, qui tamen supererat in hepate sanguis ex globulis insar nulli solis duris videbatur compositus. Bilis erat paucula & insar glutinis compacta, brunni coloris. Vasa venosa valde extensa parum continebant sanguinis, loturae carnis non absimilis. Duplicitate peritonaei, quae veteres & vasa spermatica, ipsaque vesiculae continent, coisolis hydatidibus erat obfusa, ex quibus disculis magna aquae profluebat copia. Pulmones denique crant fere ex sanguine & candidi, in corde vasa coronaria valde inflata. Dissectis pedibus membrana, sub qua adeps reconditur, aqua turgescibat, & quum perventum erat ad membranam, quae musculus supersternatur, ea insar vesicae aqua repleta adprebat, factaque dissectione aquae insar rivi effundebatur & glutinosa materia tragacanthae resemens conspicebatur.

Epietis.

Ex hac memorabili morbi historia plura notatu digna in usum medicum possunt elici;

1) extraordinaria vasorum venosorum magnitudo sanguinis circuitum per venas indicat impedimento & valde retardatum, à quo etiam derivandum est, ut vasa lymphatica, ob lymphae à sanguine secessionem ampliata tandem disrupta fuerint.

2) induratio illa viscerum malum ostendit incurabile, quam dudum jam optimus juvenis intus absconditam reconcidisse videtur. Quare non mirum est, à pluribus abhinc annis eum cachexia laborasse, quam tumores pedum oedematosi & maculae in cute flavae & lividae communiuntur luculentissime.

3) peculiare meretur animadversionem, quod exigua sanguinis in vasis & visceribus reperta fuerit quantitas, maximeque hepar, lien & renes omni fere rubedine adparuerint exuta; cujus rei ratio exinde venit deducenda. In tali statu cachectico-hydropico, ob signorem sanguinis progreffum, languidationis actio, seu chyli in sanguinem conversio mirum quantum laesa est ac depravata; hinc omnes, qui ingeruntur cibi in serum potius, quam sanguinem solent transmutari. Et inde quoque fit, ut Languis hydropicorum è vena emissus nunquam non copioso sero sit repletus.

OBSERVATIO VI.

Hydrops
sanguinis
in vena.

Vir L. annorum, laetiori dietæ vitæque sedentariæ addictus, & lacticia cum fructibus acidis horæis in deliciis habens, prægresso diuturniori moerore incidit in cachecticum corporis habitum, ex colore faciei lurido, sublivido & ad flavidinem inclinate satis conspicuum; unde ciborum appetentia, satis antea vegeta, una cum viribus valde concidebat, status & borborygmi in abdomine, ob feignorem alvum, miras creabant molestias; respiratio cum præcordiorum anxietate reddebatur difficillima, ut per intervalla morti proximus æger haberetur, &c, quod maximum erat, pulsus micabat debilis, nonnunquam intermittens, plerumque inæqualis. His tandem malis jungebatur icteritici faciei color cum majori pectoris angustia pedumque intumescencia, quæ altius subinde adscendendo ipsâ demum femora & scrotum oblidebat. Multa à variis Medicis adhibita medicamina nihil asserebant levaminis. In consilium itaque adducebatur alius cura hydropis famigeratus Medicus, qui extractum elaterii & emulæ ad drachmam unam cum jussulo calido aliquoties propinabat; unde cum ego viderem expurgabatur ingens viscidæ copæ, & decreverem pedum abdominisque tumore læta convalescentia spes assilgebat. Nihil tamen minus quam anxia præcordiorum oppressio aucta potius quam diminuta & vires cum albescentia magis inde prostratæ viderentur, ego cum aliis adstantibus Medicis validius illud catharticum seponere & nonnisi temperata balsamica & roborantia adumere suasi, donec omnibus in pejus ruerentibus æger diem obiret supremum. Cadavere aperto in abdomine pariter ac thorace magna feri extravasati conspicebatur copia. In cordis & pulmonum vasis desincebant concretamenta polyposa, ex dextro cordis ventriculo per arterie pulmonalis ramos dispersa. Felles cyllis calculo, æres minimum drachmas adæquantæ multisque minoribus lapillis erat repleta. Totum vero hepær cum liene atro sanguine inveniebatur infarctum valdeque flaccidum & reliqua vasa venosa omni fere sanguine privata.

Epiçrifs.

Docet imprimis hic casus, quomodo ex præcedentibus & ad unam quasi cumspitantibus causis hydrops fiat generatio. Siquidem habitus corporis spongiosus, acidorum & lactis abusus, animi moeror & vitæ laboris experta sunt naturæ ac indolis, ut spiritusascentiam sanguinis immutando, humores valde glutinosos ingenerent, qui ad vasculorum obstructions, concretionesque polyposas & calculosas materiam subministrant largissimam. Videtur autem hydrops in præsentî casu magis symptomaticus, qui obstructionem hepatis & spasmos præcordiales, ob calculum in cyllide fellicæ & polypum in corde atque pulmonibus contentum, inductos excepit. Anxietates enim & spasmice præcordiorum stricture, multo magis vere concreta ista fibrosa, pulmonum vasa replentia liberiores sanguinis circuitum non modò in pectoris regione, ubi sedem fixam habent, sed per reliquas quoque remotiores partes impediunt; unde ob tardiores ejus circuitum serum in vasa lymphatica secedit, & in porium habitum effunditur. Quod si vero polyposa ejusmodi repagula hydropico-

Frid. Hoffmanni Oper. Tom. III.

rum tumorum causæ existunt, facile est judicari, cum hæc ipsa nulla expugnari arte queant, morbum fieri insanabilem. Videmus hinc purgantium, præsertim validiorum, usum potius hisce circumstantiis magis esse noxium quam proficuum: quandoquidem hæc, validissime in genus nervosum agendo, anxietates & spasmos in præcordiis fervientes adaugent, ut inde non possint non vires cum appetitu magis proficere. Nos in genere ita judicamus, longe consilium esse, hos morbos tempèssive avertere, quam, ubi increverunt, his curandis multam operam impendere frustraneam.

OBSERVATIO VII.

Hydrops
pulmonis &
thoracis.

Vir xxx. annorum, complexionis sanguineæ, qui adolescentiæ annos inordinato vitæ genere transiit maximeque spirituosos potus magna in copia ingurgitavit, milinæ delituit corpus quondam vehementer exposebat frigori, quod quum pectus possimum occuparet, brevi post de stabiliti & fixo sinistri lateris dolore, spirandi quoque difficultate conquereretur. Mutato vitæ genere, quum à vita valde laboriosa ad quietem transiret, non modo doloris & præcordiorum anxietates, sed tussis quoque & spirandi angustia tanta cum vehementia ingravescebant, ut per semelhas nonnunquam liberiores anhelare aërem deberet. Accedebat dein pedis & femoris sinistri intumescencia, quæ scrotum simul valde distendebat, alvus & appetitus satis bene constabant, & urina mingebatur flavescens coloris tenuis. Tandem cum data occasione in nimium effusus risum pectus vehementius commoveret, mox de summa spirationis angustia conquerens in horis suffocari videbatur & sub debili & inæquali arteriarum pulsatione per validam tussim epicebat spumam sanguine leviter tinctum; & demum viribus penitus dejectis tercio die post animam efflabat. In sectione cadaveris totum abdomen conspicebatur integrum, in thoracis autem cavitate in sinistro latere mira aquorum fluctuabat quantitas, quæ ad septem propemodum libras accedebat. Cordis vasa concreta alba inflata calami scriptorii continebant, pulmones erant depressi ac collapsi, & arteria pulmonalis, polypo intus repleta, visui se offerebat nigra & sphacelata, foetidum spirans odorem. Penitus deinceps inspecta thoracis cavitate in dorso variæ se obijciebant membranz & cuticulæ dilataczæ, à vertebis & costis thoracis separatzæ, quæ non obscure indicabant, magnum hic delituisse saccum membranaceum aqua repletum, qui disruptus tantam aquæ copiam in thoracem effuderat, ipsamque mortem acceleraverit.

Epiçrifs.

Mortuus est hic æger hydropo thoracis, quo orthopnoea vexati, ut recte monet BAGLIVUS, qui non nisi erectæ cervicæ spirare, nec in lecto, ob suffocationis metum stabilem invenire locum possunt, plerumque laborant. Sed memorabile in nostro casu videtur, quod hydrops fuerit sacculus, & aqua extravasata sacco membranaceo ex pleura à costis separata producto inclusa, quæ dolorem fixum peperit, liberamque pulmonum expansionem, præsertim sub diaphragmatis à ventriculo inflato compressionem, impedivit. Postquam vero, tumore per risum rupto, serum in tanta copia effluxit, ut pulmones inundaverit, non

F f 3

non potuit fieri, quin denegata horum expansione, sanguinis circuitus plane fuerit interceptus, & strangulatione quasi æger intererit. Quod vero ex aspera arteria serum sanguinolentum tulli fuerit rejectum, hæc videtur ratio, quia sanguis per arteriam pulmonalem in pulmones redactus, & regressu suo impeditus, cum impetu ad tunicam arterie glandulosam confusus, ibique inflammationem excitavit. Quod dein pedum intumescendum attinet, sciendum est, hanc fere inseparabile hydropsis pectoris esse symptomata. Si denique curationem truculentam huius mali arrendere velimus, nihil dubii est, quin in eiusmodi casu paracentesis cum fructu possit institui; si modo ægrotus hancce admittere operationem non recuset: præsertim quum jam olim HIPPOCRATES eandem in hydropse pectoris commendaverit.

OBSERVATIO VIII.

*Asthma
hydropis
cum summo
furore.*

Annus est, & quod excurrit, quum vir in summa dignitate constitutus, asthmatico-hydropticus, LX. ætatis annum supergressus, meum postularet iudicium de tranquilla totius morbi historia, quæ hæc continebat momenta. In adolescentia vir generosus multum sæpe cruoris à naribus fundere suevit, & cum academicam ingressus vitam, literarum studiis & lucubrationibus in multam noctem productus, neglecto corporis moru plus iusto indulgisset; affectionem incidit hypochondriacam cum hæmorrhoidibus cæcis junctam; ad quam mitigandam aquas Wildungenses & Schwabacenses aliquoties cum fructu potavit. Ante duodecim vero annos Medicus sotes Pymontanus bibere iussit; enimvero ab horum usu mox redierunt hæmorrhoides cæcæ valde furæntes, quæ tandem applicatione hirudinum in ulcus fistulosum transierunt. Post hæc per aliquot annos anxietatibus cardialgicis, & asthmaticis pectoris oppressionebus per intervalla fuit obnoxius, quibus duobus abhinc annis dolores podagrici & nephritici cum perineæ ichthuria stipati accesserunt. Nunc diæmum effluxit anni, ex quo prævia iracundia adfectus asthmaticus cum summa præcordiorum anxietate graviter invaluit, & pedum primo, mox femorum & croti, totiusque abdominis tumor successit. Consuluit itaque Medicum, qui insulam purgans exhibuit per sex dies bibendum; unde, magna feri colluvie excreta, inferiores quidem partes detumescere ceperunt, sed remanente asthmate, licet remissiori, non multo post in sinistro thoracis latere dolor obortus est cum spūto cruento punctorius, ipseque tumor rerudescens pristina loca repetiit; unde urina fecerit parcius, & spirandi difficultas cum sermo parvo & perpetuo pleuritico dolore demum increbuit. Hæc morbi fuit historia, quæ attente perfecta singulisque probe pensatis responsum dedi: quod asthma, hæmoptoe, pleuritis, & ipse tumor hydropicus pulmonis male adfecto, & vel obstructo, vel polyypis obfesto suam debeat originem. Quod si enim sanguis ex uno cordis ventriculo ad alterum minus liberum habet transitum, aliter fieri non potest, quam ut in dextro ventriculo & toto venæ cavæ systemate ejus cursus sistatur ac retardetur; hinc stagnat & serum secedens substantiam porosam & cavitates intrat. Pulmones vero, me iudice, vix aliunde suum contraxerunt libem, quam à sanguine per spasmos & status intesti-

nonum, qui hypochondriaci, podagrici & nephritici valde familiares sunt, ad pectus nimum congestio. Neque de nihilo est, polyypum in pulmonibus concretionem suspicari, utut de pulsu, qui in tali casu plerumque intermittens & inæqualis est, nihil retatum mihi faciat. Sæpius enim iterumque in asthmate cum dolore punctorio & spūto cruento juncto polyypus in thorace ædnoravi. Et hæc ratione ductus mox tristem morbi eventum judicavi, qui etiam inopinato post venam in brachio sectam sequutus est.

Epiresis.

Hypochondriaci, maxime hæmorrhoidarii, nisi se precipitare in graves & funestas adfectiones velint, exquirunt præcepta fervæ diæteticæ & possunt a vehementibus animi motibus abstinere, atque paucis, sed fidis ut remediis debent. Id quod tanto magis necessarium est, si forte doloribus nephriticis, arthriticis & podagricis conflantur, ne materia morbida, ad superficiem corporis salutari motu propulsa ad interiora reprimatur. Perfacile enim hæc ratione asthma succedit hydropicum lethale, atque tum asthma ut plurimum primarius est adfectus, cui hydrops ut symptoma adscinditur: unde præcipua morientis cura ad causam asthmatis removendam dirigi debet. Multum itaque peccant ei, qui solam curandi intentionem ad tumorem abigendum dirigentes hydragogis fortioribus aquas educere moliantur; quæ perversa methodo inflammationes intestinorum lethales possunt accendere, præsertim si hæc ipsa cardialgia & spasmi, à materia podagrica repulsa jam fuerint adfecta. Tali in casu antispasmodica cum diaphoreticis mixta, vel etiam V. Sio, aut clysteres pericialibus ejusmodi symptomatibus averendis valde sunt idonea. Denique id probe tenendum est, ne facile in asthmaticis, si polyypus quispian subest, ut ex variis signis judicare licet, vena in brachio secetur, multo minus si largiori quantitate nec interrupto flumine sanguis miratur. Cor enim coagulo jam infarctum sanguinis affusus sufficere desitutum quam facile ex toto sylloen amittit, ut syncope lethalis inde emergat, qualia exempla non pauca in recenti memoria tenco.

OBSERVATIO IX.

Vir illustrissimus, XL. & aliquot annos ætatis, medice staturæ, habituque corporis spon-
*Asthma
hydropis
cum summo
furore.*
giosi & temperamento sanguineo præditus, foris juvenis qui à prima adolescentia integro virum & ad-
petuus vigore gavisus, in militibus exercitiis cum defangantibus corporis motionibus junctis, quotidie fere summum quasivit voluptatem; ante quinque vel sex annos ob lautorem diætam vinique spirituosioris & cerevisiæ triticeæ valde nutriente potum præter modum coepit pinguescere, terque quater in anno leviori rheumatismo, mox manus, mox pedes pererrante tum maxime temporis corpi, quum frigida & humida regnabat aëris intemperies. Huic dein superveniebant adhuc alia, eaque longe graviora mala. Nam pedes occupabat tumor, & in pectore spirationis difficultas per intervalla pellime affligebat; quæ non parum capiebat incrementum, quum à nimia ciborum variorum appetentia abdomen flavidus distentum liberorem
dia-

diaphragmatis descensum saepe impediret, in a prius, ut illustrissimus aegrotans in lecto non decubere, sed erecto potius corpore somnum capere per aliquot annos debuerit. Sopor quoque interdictum non raro per horae dimidium & ultra invadebat inopinatim atque tam gravis, ut excitari vix posset. Præterea nullam in omni vita toleraverat sanguinis per nares vel fedales venas fluxionem, quam deficientem ex parte compensare Medicus studebat venæ sectione bis in anno instituta, quæ vero quum in pedibus, qui tumore continuo erant oblitii, administraretur, parumque inde sanguinis efflueret, nihil hac methodo proficiebatur. Nam vanus erat timor, ubi quem Medicus, ne forsitan periculi plenam suffusionem accresceret, venam in brachio fecare dubitabat. Multo magis iussa metuendi erat ratio, ne tumor aquosus in corpore adeo plethorico, & faciei colore ad nigredinem vergente, magis ac magis increveret; quod etiam brevi possi insequeretur. Etenim mox totum corpus aequaliter intumescerebat, & quod pessimum erat, consuevit manuum & pedum dolores rheumatici nunc sub tempestate frigidiore vel plane non adparebant, vel minx remittebant. Quum is esset depravatus valetudinis status, & indices spiratio difficilis ad suffocationis metum appareret, ego pariter in consilium vocatus, hunc morbum asthma cum hydropse anasarca junctum, & a nimia sanguinis abundantia, qua cor cum pulmonibus pæne oppressum erat, inductum iudicabam. Quum Medicus ordinarius ante meum accessum in brachio admiscrat venæ sectionem & laudabam & approbavam, consilium fore ratus, ut aliquoties pro re nata iteretur: & iterabatur quoque cum insigni spirandi levamine pulsuumque augmento. Accuratiori insinuo examine, cui intererat adhuc alii perississimi Medici, ex certis & evidentioribus signis vitæ nec obstructa, nec scirrhusa, sed integra, nec intra pectoris abdominique cavitatem serum extravasatum, nec pulmones polypis obfessi deprehendebantur: & quum sub modica ciborum adpotentia alvus satis bene responderet, abstiniuius ab omnibus fortioribus hydragogis & diureticis, & potius injuncto accuratori vitæ regimen medicamento dedimus balsamica amara, stomachica & carminativa, interpositis subinde siliis detersivis & pilulis temperate roborantibus. Potui præscripsimus ceterisiam insigniter diureticam, & ad discutientes flatus ano clystere carminativos frequentius injiciendos curavimus. Hæc inter uno vel altero mense transacto natura, optima gravissimorum morborum medicatrix, sponte sibi exitum parans copiosas in pedibus excubabat vesiculas, & quibus cum febrili quodam motu & redeunte podagrico insultu ingens aque expellebatur copia. Et sic tandem Illustrissimus æger melius respirare, quietiorem sinum capere, urinam, quæ antea parvor fluebat, magis reddere, & resumptis viribus penitus convalescere inciperebat, ut nunc, quæ Dei gratia est, ab omni malo immunis sanus degat.

Epistola.

1) Permultum interest, ut Medicus in cura gravem & fontici morbi prudenter adomanda veram causam primamque scrutetur originem, quæ in hoc nostro casu nimia fuit sanguinis abundantia, & exinde orta in visceribus nobilioribus & externis partibus stagnatio; unde si-

mul asthma & ex hoc hydrops fuit enatus, qui facile potuisset averti, si è venâ brachii tali tempestive conveniens sanguinis detractio fuisset quantitas. Minime enim à tali venæ sectione, in brachio instituta, metuenda est major sanguinis ad superiores partes attractio, & ex hac oriunda suffocatio; ut hæc ipsi potius certo avertatur, si nimia, quæ jam adest, plethora imminuitur: quod suo jam tempore optime præcepit HIPPOCRATES, eo loco, quem in cautelis §. I. allegavimus.

2) Luculenter edocemur, in maximis morbis vincendis lenissima & fere simplicissima remedia optimam fere levamen, si modo satis diu continuantur. Quod si enim in nostro casu ad educendas è corpore aquas fortiora purgantia & diuretica adhibuissent, facile periculis induci potuisset intestinum inflammationem, quam ego quidem non raro in anasarca & alcie laborantibus vidi. Longe itaque consilium fuit, præter iussum & sufficientem sanguinis missionem ejusmodi remedia, quæ discutiedu flantibus & tono intestinorum roborando idonea sunt, in usum vocare. Etenim, primarius morbus fuit asthma, cujus effectus seu symptoma hydrops debet haberi, & quoniam asthma à nimia sanguinis abundantia & coagelatione ad thoracem partemque superiores, neque minus à flantibus ex primarum viarum cruditatibus originem traxit, facile intelligitur, quare adhibita remedia omne in curatione abolverint punctum.

Plura de hydropse exempla reperite licet in responsis & consil. medicinali. *Sed. III. casu LVI. & LXVII. usque LXXXI.*

CAPUT XV.

De flatulentia ventriculi & intestinorum, & afflione tympanica.

THESES PATHOLOGICÆ.

§. I.

IN nulla corporis humani parte tantas molestias *Flatulæ* creant flatus, (qui nil sunt, nisi vapores halituo- *ne quæ* si *est* si) quam in ventriculi & intestinorum cavitate, ubi velut in carcere inclusi, hosce canales ex tunicis mere muscularis & nervis, quæ motu & sensu gaudent, conflatos, remittente ipsarum tono, non sine dolore & anxietate vehementer distendunt, & ut multum inde omnis generis functiones ledantur, efficiunt.

§. II.

Si speciatim ventriculus à flatibus incarcerationis supra modum expanditur, gravissima oriuntur symptomata, qualia sunt summa circa præcordia anxietates cum valde difficili & ægra spiratione, pectoris oppressione, inquietudine extremorumque frigore & ingenti virium collapsu. Inter hæc facies cum adipectu lurido contracta est, & interdum cum difficili deglutitione faucium urgent constrictione, cordis palpitatio, phlogosæ, scotoma, vertigo & hujus generis alia. Cognoscitur autem flatulenta hæc affectio ex intumescencia, quæ circa cordis scrobiculum versus latus dextrum satis sæpe ad tactum manifesta est, nec non ex crebra & vehem-

medicamentis semper fire auctiores evadunt, ut ne rumpatur abdomen, pondere serum incumbentium comprimendum sit.

§. IX.

Simili quoque ratione per attentam experientiam innoveſcit, atroces diutiusque perſeverantes in primis viis ſpaſmos inteſtinarum moriam & flacciditatem morſusque perſiſtenti imbecillitatem, & ex hac demum vehementes inflationes ſubſequi. Hinc colicam ſpaſmodicam frequenter excipit flatulenta; quæ, niſi rite tractetur, ſed ad dolores mitigandos poſiones anodynæ offiſantur, perſicile in paralyſin tranſit. In cuius rei illuſtrationem notatu digna celeberr. WERRERII experimenta, quæ in tractatu *de cuncta aquatica* ad effectus venenorum demonſtrandos attulit, multum conſerre arbitror. Etenim ab arſenico canibus ingeſſo graviffimas vomitiones & ſpaſicas ventriculi contractiones; poſt has vero, flacceſcente ventriculo vehementes ejus diſſenſiones flatulenta obſervavit. Id quod etiam clariſſime in oculis incurrit, quem à ſummo veneno corroſivo, quod atrocibus ſpaſmibus operatur, demortuis totum inteſtinarum volumen, ſectiōne abdominis ſecta, propter ſtutus impetuofe erumpit, ut vix in locum ſuum reduci poſſit. Ex quibus probe conſideratis clariſſime poterit intelligi, acriter purgantia & emetica, dyſenteris quoque, nec non colicas ſpaſmodicas & hæmorrhoidales ordinario ingenem primarum viarum imbecillitatem relinquere, quæ moleſtæ abdominis inflationis cauſam præbet aptiſſimam.

§. X.

Verum enim vero, non raro evenit, ut ſpaſmæ de ſtutus ſimal inteſtinarum canalem obſideant, quorum illa tunica conſtrigunt, hi vero in inteſtinarum cavitate contenta vehementem & contrariam expansionem moluntur. Id quod poſſimum fieri ſolet, quando materia flatulenta acrimonia quadam bilioſa imbuta eſt, quale quid animaſcere licet in infantibus lactantibus, qui horrendis toninibus & borborygmis, extrorſum etiam per violentas exploſiones ſe manifeſtantiſſimis, valde cruciamur & feces depoſunt ab acido aroſcente admixto virides, quæ limba tenuiora inſar aquæ fortis exedunt. Idem obſervamus, ubi mania tenax, mucida cum vitellina bile, vulgo dicunt *Eier gebacktes*, commiſta ejicitur. Sæpe etiam lentiores mucidi, quos infantes è tuſſi humida mucilaginofa ſuſum propulſos degluſiendi ventriculo & inteſtiniſ obſtrudunt, in culpam veniunt, è quibus ſtutus copioſiores cum toninibus excitantur.

§. XI.

De flatulentia, quæ totum inteſtinarum tractum aequali niſu diſtendunt, hæcenus diximus; ſequitur jam, ut de particularibus iſtis inflationibus & ſpaſmibus, qui certam tantummodo inteſtini partem occupant, quadam, quæ in attentioni praxi conſideratione digna ſint, proſeramus. Scire autem licet morboſos ejuſmodi effectus in hypocondriaci vel ſæminis hyſterici poſſimum contingere, ubi e. g. ventriculi ſine inteſtinarum expansione inflatus eſt: quod plerumque ſit, cum ſpaſmus in duodeno vel principio j-juni exiſtit. Inteſtinum quoque ileon, citra inflationem ventriculi ſut craſſorum inteſtinarum in vermiformiſ uſanſibus, vel hernioſis cum ex-

quitiſis doloribus juxta umbilicum ſæpe valde expaſum deprehenditur; & in hypocondriaci hæmorrhoidaliſ, ubi inteſtinum rectum & inferior pars coli ob ſanguinem ſtagnantem, ejuſque denegatum per venas ſedis effluſum à ſpaſmibus violentè anguſtatur atque conſtringitur, ſuperior pars inteſtini coli, maximeque ejus flexura in hypocondrio ſiniſtro & circa regionem lumbarem vehementer expaſiur; unde dolor emergit preſſorius, quem ſeni vulgo, ſed perperam adſcribunt. Frigore interdum, ut flexura coli in dextro hypocondrio circa hepatis & ventriculi regionem valde elevetur, mulumque creet moleſtiæ; cujuſ cauſa, ut ego arbitror, in principio coli, quod circa contina offiſiſ ilei, valvule coli & inteſtini cæci ſum eſt; reſidet, eo quod convenienti tono ac robore ſyſtalico, quo ſuſum pelluntur excrementa, deſtitutum eorum copia inſarciar, quæ ingentem ſtutum materiam ſuppeditat. Neque tantum ſpaſica ſtriſura & ſubſequens inflatio, quæ tranſitoria eſt, certam inteſtini portionem occupat, graviffimorumque ſymptomatum cauſa exiſtit; verum etiam præternaturalis quedam anguſtia, durides, aut occaleſcentia ex variis cauſis contracta, certam inteſtini partem obſidet, & totum inteſtinarum motum perſiſtalicum perturbando ſaviſſimis ſymptomatibus cauſam ſubminiſtrat, quæ nonnisi per anatomen deſanctum in conſpectum venit. De quo ſingulari & in praxi uſiſſimo argumento celeberr. LIPſiæ Profeſſor WALTHERUS eruditam de inteſtinarum anguſtia edidiſt diſſertationem.

§. XII.

Accedimus jam ad diſquiſitionem illius adſeſus flatulenti, in quo totus abdominis inflatio non tranſitoria, ſed ſtutaria & continua eſt, quæ tympanitidis nomine venit, quem CRETUS lib. III. cap. 21. ita deſcribit, *quod ſi tumor ventris vehementer intumet cum crebro ex motu ſtutus ſuo*. Hic morbus hæc ſe phenomienis & ſignis manifeſtas: Plerumque poſt dolorem & tenſionem circa regionem lumbarem ſiniſtram, alvique conſtipationem venter vehementer diſtenditur, ſtutus ac ruſtus per ſuperiora violentè per vices extruduntur, pulſus eſt inæqualis & adpetitus deſectus, ſed ſitis increſcit, circa præcordia & umbilicum tenſivus dolor, rodens & punſtorius cum aſtu quodam obſervatur. Sæpe etiam urina adeſt cum compreſſione ſiſticidum. Tumor etiam, ſi æger ſupinus jacet, nunquam ſubſidet atque in neutrum laus æger poſſe decumbere.

§. XIII.

Hujus continuæ, valde moleſtæ & periculoſæ ventriculi ac inteſtinarum inflationis cauſam non ſine ratione WILLIſIUS, BAGLIVUS, alique recentiores in ſpaſtica tunicarum inteſtinalium ſtriſura repoſuerunt, utpote qua diutius in hærente, pori & meatus inteſtinarum, per quos vapores tranſpirant, anguſtantur & obſtruantur, ut poſtea inſus retenti vi ſua elatiſtica propter admixtum aërem tam violentam inteſtinarum diſtenſionem efficiant. Ad quod genuina hujus mali cauſa in tali ſtriſura ſpaſmodica jure querendus ſit, non obſcure HIPPOCRATES lib. IV. ap. 11. his verbis ſubindicare videtur: *quibus tormina adiunt, & circa umbilicum cruciatuſ & lumborum dolor, qui neque à medicina*

Spasmi
præternaturalis

Spasmi de
stutus
simal quædam
de contina

Tympani-
tides signa

Flatulentia
&
Spasmi præ-
ternaturalis

Conſtipa-
tio

mento, nec aliter solvitur, in tympanitidem, five hydropem siccum jamatur.

§. XIV.

*Tympani-
tis non
semper
cum alio
janguine.*

Hic adfectus communiter pro specie hydropis à Veteribus aque ac Recensionibus habetur, quia sæpe ceu symptoma, præsertim asciti admiscetur, cum tamen morbus sit plane peculiaris & sine ulla aque extravasatione in abdomine contingat. Ita DOLÆUS in *Encyclopæd. lib. III. cap. IX. pag. 157.* refert, se in puella tympanitice novem annorum demortuæ abdomine ne guttulam quidem feri vel aque observasse. Atque in *M. N. C. Decur. I. ann. II. obs. 59.* recensetur anatomia pueri tympanitide demortui, cujus ventriculus mirum diffusentis nihil præter flatus, & aliquid viscidum humoris continuit; intestina autem omnia tam pellucida transparuerunt, ut etiam multis in locis compuncta statim ceciderint, ne guttula quidem aque in illis adrepente. Pari ratione VALENIUS *comment. in lib. IV. Hippocrat. de vitæ rat. in acut. & COLLADUS adversariorum I. II. c. 40.* ex aperto simili cadavere nihil notatum dignum aque existisse, sed crasso exspirante flatu totum repente ventrem detumuisse annotant. Notata quoque digna sunt, quæ PLATENIUS *obs. 53. p. 616.* de puero tympanico mortuo refert, ubi intestina tanopere distenta apparuerunt, ut femoris crassissimi certis in locis adæquare viderentur, atque ex compressione disrupta stercus magno impetu profunderent. Aliis autem locis adeo fuerunt convoluta, contorta & inflexa, ut nec excrementa nec flatibus deorsum parceret via, & simul vermibus oblongis quam plurimis repleta.

§. XV.

*Subjuncta
tympani-
tis.*

Hæc inflatio tympanica sexui foemino citra hydropem quam maxime est familiaris, præsertim post puerperium, quando lochiorum fluxus non rite succellit, vel ipse ab admisso frigore animique adfectu cohibitus omnino fuit. Idem contingit, quando non rite deligato & compresso post partum abdomine error in dieta fuit commissus, nec prima regio tempore puerperii a fordibus sufficienter expurgata. Tum enim non raro mulieres durum & inflatum abdomen cum magna molestia, spirandi difficultate & anxietate, alvique pertinaci adstrictione satis diu gerere solent. Eadem symptomata post partum laboriosum, si secundine non ex toto secesserint, sed pars quedam remansit, aut si ab eorum imprudenti extrahione utero inducta fuit læsio, non semel sed sæpius observavimus. Quandoque etiam post abortum, si imprudens accedit medicatio, ejusmodi tympanicæ adfectiones eveniunt; quarum causam & originem in perverso & turbato per uterum, & dein per intestinorum tractum sanguinis circuitu reponendam esse existimamus. Quod si enim ob vitium utero inherens naturalis sanguinis cursus, velesus critica excretio non rite & libere succedit, ob subsequenterum stagnationem per contentum etiam liber sanguis per viscera abdominis, speciatim vero per intestina transitus impeditur, ubi portio vel sanguinis vel feri subsistens eorum fibras teneriores & sensibiliores distorquet, confringit, easque duriores & teniores reddit, ut dein libera vaporum in intestinis contentorum respiratio minus recte fieri possit. Quod vero si incidit, flatuum provenus magis productum & effectus, quam causa tympanitidis esse solet.

§. XVI.

Ejusmodi tumores abdominis diffensivos in infantibus & pueris, præsertim si vermibus laborant, item post variorum vel morbillorum morbum frequentius observare licet; cui malo nisi in tempore accommodata succurrat medicina, partes superiores marcescunt & hædico superveniente calore ægri intereunt. Maxime vero propter addephagiam, ubi ventriculus & ejus tonus imbecillior existit, pueri & infantes in grandes ejusmodi tumores incidunt, quorum variz existunt causæ: dum videlicet variolæ & morbilli, vel etiam continuum febrem, ob vires valde suppressas, liquidumque spirituosum nimis exhaustum, ingens motus peristalticus subsequitur imbecillitas, & ob insignem sanguinis & humorum à morbo contractam dyscrasiam tunice intestinorum & peritonææ sero acri spastica vellicantur strictura, quæ flatuum exitum prohibet; perfacile evigilat, ut hic morbus producat. Quandoque glandularum mesaraicarum & vasorum lacteorum est infectus, qui succum chylosum non transmittens sordes in primis viis accumulatur, quæ ex parte in flatus resolvuntur, ex parte vero per alvum exturbantur.

§. XVII.

At vero non tantum foemina hysterica, & qui ætate sunt pueri vel infantes ob vermium coliciviam & exanclatos difficiles morbos, tympanicæ huic passioni sunt obnoxii, sed & ita potissimum in eandem incidunt, qui ad hydropem ascitem inclinant; cujus quidem rei hæc mihi videtur præcipua causa, quod in ejusmodi corporibus, ubi viscera abdominis, præsertim hepar, minus rite suo sanguine manere, succus quoque biliosus nec in quantitate, nec in temperie recte sit constitutus, ideoque suis, quas in digestionis negotio exferre debet, viribus privatus. Repetendum enim hoc loco ex physiologia est, bilem genuinam atque naturalem esse medicamentum præservatricem: neque enim solum propter principium, quo polle, alcalino sulphureum & saponiforme, quo intimoerum alimentorum solutionem & digestionem promovet insigniter prodest, verum etiam propter amaritatem temperate sulphuream atque balsamicam, blande stimulando & intestinorum tunicas roborando, motum peristalticum factum testumque servat: quo perverso & vitioso tota motuum vitalium œconomia, una cum salutaribus excretionibus, ut fere videmus in hypochondriaciis, turbatur atque pervertitur.

§. XVIII.

In illustrationem & confirmationem hujus sententiæ non possum hic silentio prætere singularem & prorsus raram observationem, quæ in *Transact. philos. Societ. Reg. Londinensis ann. 1730. no. 414.* legitur. Accepterat nimirum miles vulnus, ex quo post varia symptomata septimo die mortuus est. In ejus cadavere nulla penitus læsio ullius partis internæ, excepta sola vesica fellea, inventa fuit, utpote quæ in lyndo leviter per foras, ob effusionem bilis omnimodam, collapsa & flaccida deprehensa est. Nullius visceris inflammatio vel levisima apparuit, canalis tamen intestinum valde inflatus atque extensus, & colore flavo à bile effusa, abdomen inundante, tinctus observatus, vulnus etiam externum siccum, tumore vacuum fuit, nec durante vita ullum inflammatio-

*Singularis
casus de
hujus obser-
vatione, quo
id confir-
matur.*

tionis signum habuit, ut sane mirum sit quo pacto ex vulnere adeo levi, uti videtur, tam brevi temporis spatio, absque febrilibusque gravioribus symptomatibus, sanctatus interierit.

§. XIX.

Inter symptomata notata digna in isto vulnerato annotata; primo omnium referri meretur inflatio abdominis, quae statim ab accepta plaga sequuta est, & talis absque notabili incremento & decremento permansit, & post mortem etiamnum adparuit, quia homo aërici vel tympanitici faciem retulit. Nihil tamen minus, praesentiae hac canalibus alimentorum distensione, inflationis abdominis causa, nullum ructum nec flatum per superiora aut inferiora reddere potuit. Quamvis etiam alimenta liquida ac potum in sufficienti quantitate adsumserit, alvus tamen officio suo per omnem morbi decursum nec semel satisfecit, nec tenuissimis purgantibus & clysteribus adplicatis ullo pacto moveri potuit. Urinam paucam, flavam & quasi croco tinctam, omni sedimento destitutam reddidit. Nihil tamen caloris febrilis in toto ejus corpore observare licuit, sicut nec pulsus citatus fuit, sed potius aequalis ac fortis, usque ad vixit diem penultimum, quo inaequalis redditus est, duravit. Lingua etiam non dura, scabra aut nigra, qualis in febribus, praecipue inflammationis quandoque conspicitur, arida tamen ob defectum salivae fuit. Usus quoque item per illud tempus, parum & saltem aliquando per semihorulam dormitaverit, neque etiam opii usu ad somnium disponi potuerit, tamen nihil in illo, vel minimum delirii indicium adparuit. Atque sic iste absque ulla gravioribus symptomatibus, si singulum levemque vomendi consuetum, pridie ante obitum accedentem, excipias, exspiravit.

§. XX.

Et haec est peculiaris illius casus cum symptomatibus descriptio. Licet jam nobis nonnulla, ad scopum nostrum utilissima, exinde elicere. Praecipue vero docemus, quantum non interrupta bilis laudabilis secretio ad sanitatem conservandam praestet utilitatis, & quid quantumve e contrario ejus defectus aut vicia ad gravissimos morbos, maximeque tympanitidem, contribuant. Etenim in hoc nostro casu à nulla alia causa, quam ab effusione atque totali bilis defectu deducenda est, quae vulnus excepit, canalibus alimentaris inflatio, quae hic ipse ultra sphaeram elasticitatis extensus, tonum suum motumque peristalticum omnino amisit. Hoc autem perditio non modo naturalis chyli per vasa lactea transitus impeditus, verum etiam reliquae in aliis visceribus secretionibus labefactae tandemque sufflaminatae fuerunt omnino. Unde non potuit non ultimum omnium mors brevi post insequi.

§. XXI.

Quod attinet ad prognosin, merito tympanites valde periculosa habetur affectus, quo aegros saepius mori, quam servari videas. Hinc ingenue non minus quam vere fateatur doctissimus Puerarius, se nullum unquam tympaniticum convalescentem vidisse. Vid. addit. ad Burnetii thesaur. med. tom. II. Lib. VIII. quia perinacem mestuum conspersionem flatuumque incarcerationem vix dissolubilem, & gravem partium distensionem cum aetia significat. Quando

morbo chronico, ut hydropi jungitur vel supervenit tympanitici affectus, via ulla admittit curationem, eo quod valida intestinorum ac musculorum abdominis distensio sanguinis per viscera progressum, vasa venosa comprimendo, valde difficilem imbecilliorum reddat, atque excreta per alvum & sudorem magis sufflaminat. Tympanites simplex si inveterascit, nec cito curatur in senibus & infantibus, in molestissimum chronicum malum transit & tandem ad interitum ducit.

§. XXII.

Contra vero abdominis distensio, quae colicæ flatulenta nomen habet, in se & sua natura non multum alit periculi, atque facilem admittit sanationem, quando tonus intestinorum deperditus per convenientia tam interna quam externa remedia restituitur. Quod si vero spasmodici quidpiam ad flatum excitandos concurrerit, ut in senibus, quibus menses non rite fluunt, vel in iis, qui ex calculo in ureteribus, vel in ductibus biliaribus haerente laborant, fieri solet; aut si pathematæ spasmodica haemorrhoidalibus moliminibus superveniant, tunc utique paullo difficilius est curatio, quia tum remedium vis & operatio partium ipsarum sedandis, partium aetiae tollendae debet esse dicata, quae tamen inter se contrariata videntur.

THESES THERAPEUTICAE.

§. I.

In affectu ventriculi & intestinorum flatulento curando nil prius habere debet Medicus, quam ut flatibus per inferiora promoveatur exitus, materiaeque tenax viscida, quae flatum proveniunt velificatur, attenuetur & per alvum leniter educatur. Quo sine primo omnium in usum vocare decet enemata, quae tam derivandi quam discutiendi & evacuandi praedicta sunt efficacia; cujus generis sunt, quae ex herba hyssopi vel horum, floribus chamomillae vulgaris & romanae, summisatibus millefolii, bacis juniperi & feminibus carminativis majoribus &c. cum jusculo carnis vinulae & decenti salis gemmae, ammoniaci, aut Eboliensis & olei chamomillae cocti portione optime possunt parari. Sed notari meretur, vix unum alteramve clysterem allevando malo sufficere, sed eorum usum crebrius esse repetendum.

§. II.

Haece dein interponenda & subjungenda sunt laxantia, virtute simul carminativa & quodammodo anodyna instructa. Quo nomine commendare licet pilulas balsamicas ad Brecheri, Stablii & nostram methodum confectas, vel si natura paullo robustior & inflatio tympanitica fuerit, duas partes extracti panchymagogi Crelhii cum una parte massae pilularum Wildegansii, Starchii vel de styrace ex aqua carminativa minus spiratiosa ostendere soleo.

§. III.

Posthac ordine sequuntur medicamenta, quae principio temperate balsamico & volatili oleoso aromatico constant & vulgo carminativa dicuntur, quorum tamen operandi ratio non ita debet explicari, ac si sale suo volatili subtili materiam flatuum tantum resolvant tenuioreque reddant; sed potius, quod tonum typicorum intestinalium co-

Symptomata in ista vulnerato Symptomata

Prognosis

Clysterum usus in flatu colica

Causa

Quorum usus in flatu colica

Prognosis

Roborantia in forma pilularum

eorum que systolen vigorando prohibeant, ne flatus subfiliant, sed è sede sua dimoti per tubum intestinale facilius exturbentur, aut ne novus subinde flatuum fiat proveniens, impediatur. Et enim, quoniam destructus ventriculi & intestini motus peristalticus principalis flatulentie causa existit, ea omnino, quae eximia has partes roborandi efficacia possent remedia in nostro morbo fuisse inacidissima. Splendens vero maxime ejusmodi virtute & ob insignem saphaque comprobata utilitatem eminentiorem merentis laudem primo pulveres ex radice ari, zedoaria, pimpinella alba, salis digesti Syllii, vel tartari virriolati, seminis cymini, summitatibus centaurei minoris, corticibus aurantiorum exsiccatis ana drachma una, olei chamomille veri, vel de cedro aut cortice aurantiorum guttis sex compositi, quibus, si suspicio addit acidi in primis viis copiose stabulantis, commode adduntur ocula cancrosum.

§. IV.

In forma liquida.

Huc quoque deinceps referenda sunt in forma liquida sequentia medicamenta, quorum prius sit mixtura ex essentia carminativis constata, eximii usus: *Recipe essentia corticis aurantiorum, zedoaria, carminativa Wedelii, singulorum aequam dividiam, spiritus niri dulcis vel liquoris nostri anodynii, spiritus de tribus ana drachmas duas M. D. ad xl. guttas. Aluerum medicamentum constituit pocio, cujus hæc esset formula: Recipe aqua carminativa Dornrellii, chamomille vulgaris, zedoaria cum vino ana unctam unam, spiritus niri dole, drachmam unam, olei carvi puri guttas olo cum sacchari drachmis duabus subillas M. D. S. Falo et a. Löfel vall.*

§. V.

Que pro-
prie exten-
da.

Nec denique negligenda sunt externa remedia, quæ inter commendanda sunt linimenta totæ epigastricæ regionis inungenda. Horum præcipua ingredienda sunt oleum chamomille & rosæ coctum, oleum nucis & balsamus Peruvianus, quibus admisceantur olea juniperi, carvi, anisi vel cymini. Insar omnium vero esse poterit balsamum nostrum liquidum, viæ dictum, quod cum tribus partibus aquæ reginæ Hungariæ remixtum ventriculo intinctum vel cum lacte calido impostum summæ deprehendi efficacie.

CAUTELE ET OBSERVATIONES
PRACTICÆ.

§. I.

Cautela
contra colli-
cationem mor-
dicam.

Si flatulenta abdominis distensio partim à spastica tunicarum intestinalium strictura diuturna, partim à præternaturali earundem tensione atque duritie proficiscitur, atque hæc ipsa à stagnatione humorum & acrimonia biliosa sovetur, cautissime cum carminativis calidioribus, aromaticis, volatilibus & sulphureis, qualia sunt olea destillata ætherea carvi, juniperi &c. mercandum est; si quidem hæc flatuum elaterem & turgescendum humorum augendo, tumorem reddunt contumacem & symptomata longe sæpe periculosiora, ut æstus præternaturalis cum ingenti siti, anxietate & summa spirandi difficultate accessunt. Et hinc est, quod FERNUS lib. de flatibus cap. 21. mentionem facit multercule, tympanitæ micæ afflicte, quæ usu electuarii admodum calidi, quod digestionis flatuum præscripserat Medicus,

in novum tantumque incidit tumorem; ut totum inde pectus mirum in modum fuerit distensum & paullo post miera supremum diem obierit. Quam in rem etiam egregia sunt verba HELMONTII, quæ lib. de flatibus continentur. Si ventositates, inquit, in nobis sint vapores aut exhalationes, certe major dolorum atque flatuum excitatio & distensio partium sequetur, adhibitis calidis, eo quod vapores augeri est necesse & cruciatus ac distensiones multiplicari.

§. II.

Purgantia omnia, non exclusis etiam sennatis & valde aloeticis, omni modo fugienda esse suadeo, quia magis intestina exsiccant, & fibras tendunt, contractas durioresque reddunt. Multo vero majorem noxam non sine periculo adferunt, si quis repetita eorum dosi flatus promovere velit. Commendanda potius sunt manna cum cremore tartari in sero lactis, vel sote Sedlicensi soluta, non omisis emollientibus & blande discutientibus.

§. III.

Ubi spasma flatuum secundæ genitricis sunt, quod sæpe fit in statu plethorico hæmorrhoidali in juvenali ætate, nitrosum cum salibus deteris & refrigerantibus juncta securissima sunt. Profunt quoque spiritus niri dulcis, liquor noster mineralis, succus niri cum sale abundii, oleum amygdalarum dulcium, emulsiones ex feminibus tr. frigida, massa pilulari Syllii & Starckii, imo quandoque etiam confert vena secunda. Hinc CAROL. DE LA FONT Academiæ Avenionensis Professor in diserti, de hydrope tympanitæ exemplum addere curavi a se tympanitici ope tincturæ rosarum, aliquot spiritus virioli guttulis imprægnatis, & julepo ex aqua pontulacæ, cichorei, nymphæ, syrupo de nymphæa, & papavere, sale prunelle & spiritu sulphuris confecti, interposito libidine usu emulsionis temperantis, vel decocti hordei cum syrupo de limonia & sale prunelle, acopiate ex crystallis mineralis, lapidibus cancrosum, virioloque martis cum conserva rosarum compositæ.

§. IV.

Ex uteri viro post partum laboriosum, puerperium, aut abortum mensuram irregularem fluxum, si ejusmodi graves & contumaces abdominis distensiones accidunt, certe pilule ad imitationem Beckeri ex extractis amaræ & gummatibus resinosis temperarioribus cum refracta alois portione præparata convenientique ordine & dosi exhibitæ incomparabilem exhibent efficaciam. Idem valet etiam de eliditis temperate ballamicis ex isdem speciebus paratis, quippe quæ, dum blanda sua sulphurea ballamica virtute totum & robur ventriculi & intestinorum deperditum restituunt, mirum effectum, præsertim ubi bilis deficiens & biliosa est, præstant, modo non nimia dosi adhibeantur: nam natura ipsam adjuvavit & successu temporis etiam in certis intestinorum partibus, exsiccando tunicas intestinales, hinc inde præternaturales angustias pariunt, & sæpe ita symptumata post se trahunt.

§. V.

Magnum certe clystères præstant usum tam in accessione & præsentia malis, quam extra illud fere. At vero si spasmus in intestinis tenuibus sævit, non sufficiunt clystères, sed tunc suadenda sunt manna, cal-

Circu-
pans.Que pro-
prie in
plethorico
hæmorrhoidaliCautela
contra colli-
cationem mor-
dicam.Circu-
pans.

cal-

caſſia, ſcilicet Anglicanum, Sedlicenſe, item ſerum lactis caprini cum cremore tartari vel tartaro vitriolato paratum. Theriacum quoque & acidularum providus uſus in hypochondriacis non eſt ſperandus, ſed magnam poſitus promittit open.

§. VI.

Inter externa in vehementi abdominis inflatione ſomenta ſicca & maxime omnium arena in igne vel ſole ſiccata ceu magnam præſidium habuerunt antiquiores Medici. Hinc varia exſtant loca, ubi eandem commendarunt. Vid. *CELLSIUS lib. III. cap. 21.* & *PLINIUS hiſtor. natural. Lib. XXI. cap. 6. arena littorum maris*, inquit, præcipue tenuis & ſole candens in medicina eſt ſiclandis corporibus hydropicorum. Nec aliter ſentit *CÆLIUS AURELIANUS*, qui *lib. III. tardarum paſſionum cap. 8.* ex arena littoris, ſole ignita torrenda hydropicorum corpora ſtatuit. Noſtris temporibus ut multa alia, quibus Veteres felici cum ſucceſſu utebantur, arenatio in deſuetudinem venit: neque tamen adeo negligenda videtur. Arena enim calida non modo compreſſione, quam mole ſua efficit, intumeſcentiam cohibet, ſed & calore ſiccò humores pravos inter cutem ſtagnantes attenuat, ut ſuccia per vaſa ſua itus reſiduique reſtituantur: imo cutis quoque ſyracula aperiantur & tranſpiratione aſſuatur. Vulgare noſtro tempore experimentum eſt, arenas calidas & exſiccatas in ſacculo regioni ventriculi & umbilici imponere, eo quod vix habeant diſſolvendi & diſcutiendi utiliſſimam. Præter hæc vero emplaſtrum de ſapone bene camphoratum & cum oleo hyoſcyami malaxatum in flatuofa abdominis diſtentione non ſine ingeni levamine applicatum novi. Cui virtute parum cedit galbanum ventri impoſitum.

ENARRATIONES MORBORUM.

OBSERVATIO I.

Quæ xx. ætatis annum ſupergreſſa eſt virgo generoſa, tenerioris texturæ & ſacii admodum pallide, jam per biennium pauciori & irregulari menſium fluxu aſſicta graviter ſubinde de doloribus circa umbilicum tenſivis, abdominis inflationibus, & præcordiorum anxietatibus cum ingeni laſſitudine & adſpectus proſtratione conqueſta fuit. His brevi abhinc tempore iungebatur febricula vaga, circa velperam maxime adſurgens, urina inſtar feri lactis mingebatur turbida & pallida, æque virum tanta ſuccedebat proſtratio, ut lipothymia ſæpius accederent. Qui conſultabatur Medicus, ad menſes ſolum reſpondens, fortiora obtulit emmenagoga; ſed tantum aberat, ut levaminis quidquam ſequeretur, ut poſius eſſentiam ſymptomatum augmentum ægra perciperet. Ego tandem in conſilium adhibitis, ante anni circiter dimidium aliquot aſcarides per alvum excretas conſpexeram; unde vermiſum colluvium pro genuina cauſa habendam ratus primo eſſentiam ordinabam tanacetis & ſantonici cum liquore anodyno æquali portione remixtam, & ſerum lactis mane per aliquot hebdomadas bibendum. Tum vero præſcribebam pillulas ex gummi ammoniaco, aloë roſata, rhabarbato, mercurio dulci & croco, interpoſitis ſubinde pulveribus digeſtivis. Et ſic, ingeni

putride & ſæptentis pituitæ copia cum aliquot necatorum vermium fruſtris exturbata, peſſima ægrotantis ſymptomata ſenſim ſenſimque evaneſcebant. Nihilò tamen ſecius remanebat magna ventris debilitas & ad ſtatus generandos diſpoſitio, ad quam debellandam eſſentiam corticum aurent. & carminativum *Wedellii* cum ſpiritu nitri dulci inter prandium commendabam, tam felici eventu, ut ægra ab omnibus malis liberata nunc integerrime vivat.

Epiſtola.

Docet inprimis hic caſus, quantum Medici interſit, veram morbi cauſam & originem probe noſſe; qua ignorata non modo remedia eadem removende oppoſita nihil juvant, verum etiam, quod peſſimum eſt, plus noxæ afferunt. Fuſſe autem in noſtro caſu vermes præcipue accuſandos, teſtis eſt ipſe morbi eventus. Nec adeo difficile eſt, ex hac cauſa rationalem ſymptomatum ſuppeditare ætiologiam. Enitenim, quum iniqui illi hoſpites in inteſtino ileo potiſſimum ſedem ſuam habeant, facile ibi moriū dolores efficiunt, paſſioni iliace non abſimiles, unde ſtatus exitu ſuo per inferiora præcluſi ſuperiorum inteſtinorum tractus occupant, eoſque diſtendunt & ita divellunt, ut continui quaſi ſolutionem moſtantur. Et quum hac ratione ingens his paribus inducatur æticia, non mirum eſſe debet, cur materiali etiam cauſa ſublata remediis ſtomachicis, non ſecus ac in iliacis ſanatis, per longum adhuc tempus, ad tonum reſtituendum, inſiſtere conſultum ſit.

OBSERVATIO II.

Fœmina xxx. annorum, temperamenti ſanguineo-cholerici, à matre progenita, quæ per viginti & plures annos moleſta laboravit flatulentia, jam per triennium ſine omni dolore & incommodo, ſalvoque menſium fluxu, gravi abdominis diſtentione adfecta fuit, quæ, accedente vita deſide & concurrentibus variis animi perturbationibus, ſeptem abhinc menſibus multum increvit & vehementes ventris dolores, ſpirandi anguſtiam, alvique obſtructionem cum menſium imminuto fluxu comites habuit. Hæc contra mala Medicus pugnavit carminativis, aperientibus & eximie virtutis roborantibus, ſed in eodem ſtatu morbus permanſit, ſomnus tamen & adpetitus bene ſemper conſiſtit. Non multo poſt, ob errorem io dicta commiſſum, optima ſemina febrem incidit tertianam, per ſeptem hebdomadas durantem; unde viribus cum ſomno & adpetitu deſectis pedes intumuerunt & inflatio abdominis adauſta cum aliqua fluctuatione ad manus percuſſum inſtar tympani ſonum edidit. Elapſo menſis ſpatio materia gryſea purulenta, omnis expertis odoris, cum intermiſtis ſanguinis ſtriis, præcedente leviſſimo horrore, per aliquot dies in notabili quantitate per uterum exercebatur; quo factò levamen quidem miſera percipiebat in utroque hypochondrio, ſed non modo pedum tumor perſeverabat, ſed abdominis quoque ita ſubinde invaleſcebat, ut in lecto decubitus impediret. Aberat tamen, quod bene ſperare licebat, ſitis, aberat ſtutis & nimia virium depreſſio, aberat quoque, quod alias adeſſe ſolet, ciborum ſaliſſimum, ſed modice poſius adpetitus conſiſtebat. Præterea urina mingebatur

Inflatio tympaniſica cum materia purulenta ex utero egreſſa.

G g

ſava

flava cum nubecula alba, faeces secedebant duræ, mensium plenaria erat suppressio, & insignis dolor cum tumore anum occupabat.

Epistifi cum Consilio.

Non omnis, præsertim in sequiori sexu, abdominis expansio pro inflatione intestinorum tympanitica habenda est; sed incidit sæpe casus, ubi post puerperium, aut laboriosum partum, mole pinguedinis aucta abdominalisque musculis crassioribus redditis, abdomen valde tumidum observatur. Nam frequenter obvium est, per violentos & diu perseverantes spasmos in partu sanguinem ad partes molliores minusque resistentes, quid? quod ad ipsum collum & ejus glandulas copiosius delectum vasa ibi nimis dilatare & flagnationes efficere, ut strumæ quoque hæc raro inde enascantur. Fit tamen nonnunquam, ut etiam inflatio intestinorum tympanitica, uti in præferti casu, diuturno abdominis tumore superveniat, quæ procul dubio propter crassam dietam vitamque sedentariam inducitur, & dein retardato mensium fluxu post tertianam febrem ita adaugetur, ut ordinarius Medicus verum acuten hydroperem adesse judicaverit. Ego tamen potius morbi augmentum adscripsi anisicibilibus, quibus forsitan nimis cito febris fuit suppressa. Increvit enim inde infarctus in utero, à quo demum abicellus ibi fortuitus & magna materiz gryfæ, nullius odoris, copia excreta fuit, quæ opusatum symptomatum levamentum attulit. Quapropter præcipua curationis fuit intentio, ordinarium sanguinis per hepar & uterum cursum resiliuere: quo sine fonte Egræ tumefactum, interpositis pilulis balsamicis, ad mentem *Beccheri* confectis, & elixiris stomachicis, per aliquot hebdomades cum recto regimine bibere jussi. Et quoniam clysteres camminativos in ejusmodi casibus nunquam fere non utiles deprehenderim, crebriorem eorum usum summo preme commendavi & cataplasmata ex herbis, floribus & seminibus camminativis, ex vino coctis regioni pubis imponenda fuisse. Denique roborandi sine elixirium ex essentia succini, corticum aurantium zedoariæ & liquore anodyno, æquali ad pondus omnium proportionem sumto, præscripti & sic curam feliciter perfeci.

OBSERVATIO III.

Flatulentia abdominalis ab ætrogæstibus antea.

Virgo generosa, xx. & aliquot annos nata, constitutionis tenebrosæ, vasis tamen sat amplis prædita, quæ mensium fluxum ultra annum sat largiter & supra naturæ modum experta habitum obtinuit cachecticum & postea loco sanguinis sinceri & puri humorem per uterum eiecit valde aquosum & mucidum; ex imperiis junioris Medici consilio per quatuordecim dies balneum Lauchladiense, adjecta semper aluminis portione, adhibuit. Subfistit quidem inde fluxus, sed non multo post incidit in fistis grandem ventris tumorem, cum sensibili duritie in dextro inguine latere, summa anxietate, peccoris oppressione totiusque corporis languore conjunctum. Ego in consilium vocatus curationem ita institui. Circa tempus somni obtuli dosin salis nostri aperitivi, postero vero die mane fulgurum balsamicarum, nostræ præparationis no. xiv. & circa prandium elixiri nostri visceralis centum guttas, idque per quatuor continuos dies. Postea ordinavi balneum

circa vesperam adhibendum, quod sequentes habuit species: *recipe herba majorana, salvia, matricaria, mentha, artemisia, rosmarini, florum chamomilla romana & simplicis singularum manipulos duos, baccarum lauri, juniperi anacardium unum. Includentes sacculo & in aqua leniter coquantur. Huic balneo infundat ægra per lavam, & sacculus inter hæc imponatur ventri maximeque regioni inguinali.* Consumitis iterum lavando quatuor diebus, pristina rursus methodo ægra per sequens quatuoriduum mane pilulas balsamicas & inter prandendum elixirum sumit viscerale, atque simul vesperi balnei usum continuavit. Quorum remedium opem mira coluviei glutinosa & viscidæ ex utero promanavit quantitas & remittentibus flatulentis symptomatibus exoptata rediit integritas.

Epistifi.

A præpostero balneorum adstringentium usu pessimum symptomatum productum fuisse syndromen, extra omnem quidem possum est controversiam; placet tamen in meliorem hujus rei confirmationem similem fere casum allegare GALENTI, qui de præceptis, ad postum. elegantius prodidit, uxori Boethi, fluore albo laboranti ex adstringentium usu ventrem ita intumuisse, ut utero gerentis suspicionem subierit. Plures ejusmodi sat memorabiles observationes exfluxit in M. N. C. ann. II. Dec. I. obs. 26. & ann. VI. obs. 103. quæ dignæ sunt, ut probe annotentur. Subfistunt enim hac ratione non modo in utero, verum etiam in partu ipsi vicinarum vasorum humores excernendi, atque mora viscidiores tenacioreque redditi, intercipienti libitum sanguinis circulum variæque congelitiones & impetuosos motus ad certas partes efficiendo, omnes corporis functiones valde turbant & symptomata accerunt gravissima. Omnis itaque opera & cura medentis in eo maxime est deligenda, ut dissoluta fluxuorice reddita tenaci obfluente materia, ejus per uterum exitus promoveatur. Cui scopo obtinendo præscripta nostra methodo remedia egregie interveniunt.

OBSERVATIO IV.

Juvenis xx. annorum, temperamenti phlegmatici, crassiori dietæ & sedentariæ vitæ addictus, vehementem dextri lateris dolorem, ex imo abdomine ad superiora ascendentem, præsertim à cibis, quos in deliciis habebat, flatulentis, ultra anni spatium perensit, multaque ad eum compescendum adhibuit sine effectu remedia. Ego consultus, omnibus rite exploratis in regione inguinali, dextri lateris, circa os ilei tumorem annotavi sat magnam; unde consilium dedi, ut huic loco emplastrum imponeret ex terebinthina veneta, mastiche, cera & balsamo Peruviano constatum, idque bis in hebdomade renovaret. Intra prandium dedi elixir meum viscerale balsamicum cum essentia zedoariæ & liquore anodyno minerali remixtum & pilulas balsamicas bis intra septimanam sumendas fuisse. Et hac ratione intra duos menses inflatio ista detumuit, tandemque penitus arger convalescit.

Epistifi.

Nihil dubii est, quin in præferti affectu intestinum

num colon in ea parte, ubi à cæco prodiens magnis vasis, membranisque & nervis robustioribus eo sine instructum est, ut excrementis sursum pellendis capax sit, atonia laborasse; qua factum est, ut feces retentæ diuturnior mora in flatum se explicaverint, qui reliquam coli portionem, ad hepatis viscus anfractuoso ductu procedentem, ita infusare, ut exterius quoque tumorem observare liceret. Quod vero si incidit, ea omnino remedia adhibere consultum est, quæ flatus & accumulatas in intestinis sordes blande evacuandi & simul roborandi virtute possent. Quo nomine pitule nostræ balsamicæ & ad eandem methodum paratæ aliæ cum elixiris temperatis stomachicis insignem merentur commendationem. Sed interna hæc medicamina externa debent secundari, à quibus non exiguum felicitis curationis pendet momentum, ita profusus, ut his sepositis supervacaneis sæpe sit omnium, etiam optimorum internorum usus.

OBSERVATIO V.

Calix fl.
nervosa
et in sub-
stantia
re fr. jugu-
lata.

Judæus t. x. & aliquot annorum, bene alias valens & robustus, per biennium ob varios fortune infestos casus animo perturbatus male habuit. Nam subinde de flatulentia abdominis & hypochondriorum distensione, alvo adstricta, somno inquieto, & languente appetitu conque- rebatur, urinam per intervalla turbidam & sibilosam cum ardore mingens. Hic cum causam coram judice amitteret, gravi animi affectu commotus, mox in brumali gelu iter conficiebat plurimum milliis; quo fiebat, ut domum reverfus summa præcordiorum anxietate, pectoris oppressione, dolore circa cordis robiculum tensivo, insigni totius corporis languore, nausea & subinde vomitionibus vehementer corripere- ret. Qui primo accerteretur Medicus, evulsa- ret curam adgredebatur essentia stomachicis & carminativis, sed mirum inde singula increfcebant symptomata. Quam itaque meum æger postulare consilium, ego causam horum malorum curatius inquirens, in primo intestino, quod dandærum vocatur, ipsoque pyloro virum latitare exinde argumentabar, quia continuo æger querebatur, quod ingesta, præsertim solidioris consistentiæ, ob angustiam, quæ transitum impe- dired, difficulter descenderent, & inde ad supe- riora cum anxietate & vomendi conatu fieret re- gurgitatio. Præterea abdomen flabibus valde erat turgidum, alvus adstricta, somnus paucus & in- terruptus, tamque virum & corporis languet- sentia cum faucium ariditate aderat, ut non pa- rum periculi in tam sonico adfectu & ætate jam profectioni suspicaret. His ita constitutis ægro- tanti potionibus analepticis, iusculis cum cancri fluvianilibus & radicibus aperientibus decoctis, pulveribusque leniter nervosis prospiciebam, & clysteribus emollientibus ventrem apertum ser- vare expediebam, eo quod solventia medicami- na dejectæ vires non admitterent. Et eni non parum inde levamen percipiebat. At vero, quum per quatuor menses huic malis constitutus nondum restitutum se penitus videret, alius vo- cabatur Medicus, qui per medicamentum, quod & sudorem proliceret & spasmus lasseret, certissimam promittebat opem. Erat autem hoc ita compositum: *recipe cinnabaris, antimonii dia- phoretici ana drachmas tres, salis volatilis cornu cervi, croci, castorei ana drachmam unam, misce* *Frid. Hoffmanni Oper. Tom. III.*

dividatur in octo doses & singulis quatuor horis una sumatur. Sed à quatuor sumis anxietates invalescebant, & largus sublequebatur salivæ fluxus. Inspectis faucibus illis totæ apertis ar- densibus & dolentibus erant referre. Durabat hæc salivatio, nullis allevanda remediis usque ad mortem, quæ tertia septimana ab adiuncto re- medio accedebat.

Epicrisis.

Quod si veram hujus mali pessimumque symptomatum originem scrutari velimus, certe vix aliam, quam vehementem iracundiam adfec- tum corporique refrigerationem deprehendere licet. Tali enim ratione obortus in duodeno spasmus adnesum pylorum vehementer constrin- xit, & ita angustavit, ut nullus prope flabibus & ventriculo patuerit exitus; unde hic supra mo- dum distensus ingenti præcordiorum anxietate, inquietudini & reliquis symptomatibus ausam præbuit largissimam. Nec dubitandum, quin in- tempestivus medicaminum calidiorum usus an- xietatis permultum adauxerit, upote quæ oculis excretiois viis semper magis obstruit, quam profuit. Cæterum dignus est, qui probe an- notetur peculiaris plane pulveris oblati effectus, quem ego, pharmacopæi errorem accusandum ratus, vix credididsem, nisi facta inquisitione hunc omni culpa vacuum deprehendidsem. Sat graves igitur erant rationes, quæ mihi fidem fa- ciebant, tam largam salivationem in corpore, vehementibus spasmus ab effusa bile exagnato, soli cinnabari, in largiori dosi præscriptæ & per admixtum sal volatile cornu cervi ad ma- jorem activitatis gradum adactæ esse adscriben- dam, ut inde discere omnino licet, quod si- milis sæpe effectus ab optimo alias medica- mento præter spem ac opinionem nostram pro- veniant.

OBSERVATIO VI.

Vir xxx. annorum, sacerdotali manere fun- gens, tribus abhinc annis, quum in Academia de- gens Belgica cibus uteretur crassioribus & pisci- bus marinis, neglectoque potu & sufficienti cor- poris exercitatione, literarum studiis cum pro- fundis meditationibus junctis plus jussu incumbere- ret, graves primum sensit ventriculi & intestino- rum inflationes, murmura, flatuumque & aqua- rum in abdomine fluctuationes satis sonoræ, quæ plerumque a prandio & adsumo Theriæ vel cere- vitiæ potu sub vita motus experte augebantur. Idem observabat, quando profundioribus medi- tationibus mentem desatigabat, cum contra à suscepta exercitatione & ructuum per os explo- sione insignis mali perciperet levamen. Præ- terea alvus plerumque bene respondebat; cibo- rum tamen adperentia linguebat, caput vertigine & aurium salsura tentabatur, facies erat pallida, totumque corpus marcore conficiebatur. His malis debellandis varia æger opposuerat remedia, sed omnibus nihil proficientibus, meam tandem im- plorabat opem. Consilium igitur dedi, ut primo omnium & vena pedis tusa lex minimum cruo- ris uncias detrahendas curet & aliquot diebus interjectis, ad primam regionem à cruditati- bus viscidis, flatuum genitricibus repurgan- dam, per tres dies fontem Sedlicensem dua- rum librarum pondere pro dosi biberet. Paruit

Gg 2 æger

Pesse fl.
nervosa
et in sub-
stantia
re fr. jugu-
lata.

348 Cap. XVI. De cachexia uterina, five fluore albo.

zget confilio & inde melius habere cepit. Ad malum itaque penitus submovendum bis in septimana primam regionem à viciis cruditatibus beneficio pilularum balsamicarum liberandam & elixir nostrum balsamicum per sat longum tempus sumendum fuit. Denique, quum ad curationem tam molesti affectus accuratum vitæ regimen plurimum conferrat, frequentiore corporis exercitationem, & ut æger à nimis meditationibus, ac cibis, qui difficilioris sunt solutionis, infumatis, piscibus marinis, fructibus leguminosis & fermentatione facile subeuntibus, omnibusque lacticiis se abstineret, commendavi.

Epietisti.

Licet hæc stultentia effectus magis & symptomata sit mali hypochondriaci, quam primarius morbus, ideoque hæc stridum non pertinere videatur, discere tamen potest attentus Medicus, quantum, si non omne, ad morbi stultentis generationem contribuat motus intestinalium peristaltici imbecillitas, variis ex causis inducta; quas inter in præsentis ægroti præcipue referre decet intensiores mentis labores, per multas noctes productos: utpote nimia mentis fatigatio eximiam habet potentiam canalem istum, qui digestionis præst, nervum & valde sensibilem debilitandi; quod eo magis accidit, si vicia motus experti & ciborum duriorum ac stultentorum usus accesserit. Quoad curationem scire licet, quod fontes medicati tam thermales quam frigidi borborigenos & murrina ventris laepe augeant, præteritum si non alvum sufficienter ducant, nec urinam moveant, ut sunt Wildungenses & Selterani &c. Tum enim ob languidiorem motum peristalticum facile stagnant, & atoniam augent. Consultius itaque duxi, fontem Sedlicensem, interpositis & subijunctis balsamicis stomachicis medicamentis, commendare.

CAPUT XVI.

De cachexia uterina, five fluore albo.

THESES PATHOLOGICÆ.

§. I.

Fluxus albus, quod sit.

Qui fluxus albi nomine in scholis Medicorum venit adfectus feminasque summe molestat & cruciat, malum est cachecticum, quod in inordinato humoris impuri, mucidi, plerumque albi ex muliebris effluxu, cum magno incommodo functionumque naturalium lesione junctis consistit.

§. II.

Quomodo fluxus albus præcipue incidat.

Huic fluxui quamvis ætas plerumque consiliens sit obnoxia, minime tamen declivior est excludenda, id quod suo jam tempore optime annotavit HIPPOCRATES lib. II. de morbis mulierum. At vero dantur etiam observationes, utut rariores, quæ testantur, puellas teneriores, vix sex septemve annos natas hunc fluxorem fuisse perpessus. Quæ de re consulantur FERNELIUS lib. VI. Pathol. cap. 16. RODERICUS à CASTRO lib. I. morb. mulier. cap. 14. & AULA Hæstiensis.

Vol. I. obs. 83. Frequenter vero evenit & incipit hic fluxus circa annum decimum tertium vel quartum, quo tempore feminis menstrua erumpere solent. Nec maritata tam itera quam extra graviditatis statum, ab eo sunt immunes. Novimus enim gravidas toto gestationis tempore eadem obnoxias. Quod si denique habitum corporis respiciamus, experientia teste, feminas & nervis & fibris minus solidis, sed laxioribus & natura, ut aunt, ferociori prædictas præ aliis huic malo observamus subjectas.

§. III.

Inordinatus dicitur fluxus, quia non certam servat temporis periodum; siquidem aliis continuus est & quotidianus, in aliis per intervalla repetens bis terve in mense accidit; licet sint exempla, ubi etiam periodice & statim quasi tempore venit. Dein in nonnullis menstruum fluxum modo præcedit, modo comitatur, modo sequitur, vel etiam intermedio tempore prodit; quin imo in graviore statu ipsorum mensium loco oritur & ne illis quidem, quibus menstruum tempus secundum naturæ ordinem præterit, ut vetulis, parciat.

§. IV.

Variat hic fluxus quoad colorem & consistentiam, quod optime demonstravit PLATERUS in prax. tom. III. p. 670. In hoc fluore, inquit, huius interdum serafus capiose plerumque, nunc limpidus sine morbi, nunc acris vel salsus, alias florescens, virescens, aut nigricans nonnihil, aliquando & sanguis, interdum inodorus, alias fetidus ei copulatur. Huic pinnosus etiam miscetur, aliquantulum glutinosus, inodorus & frigidus, pancia, vel eadem, aut etiam inagore quam serum quantitate.

§. V.

Huic fluxui, si moderate se habeat, nulla alia graviora superveniunt accidentia, atque tam mulieres quam virgines multis sepe mensibus vel etiam annis sine noxa eundem perferre solent. Quod si vero immoedior sit, tum malus corporis habitus five cachexia eum comitatur; unde non modo insignis oritur corporis languor & functionum imbecillitas, sed & pruritus, mordicatio & ardor in pudendo & circa illud direxant. Tum quoque in plerisque mulieribus permagnum, in aliquibus tamen nullum, in conceptu lenientur impedimentum; atque si fuerat materia, turpituudo hæc non modo ipsa feminis molestiam, sed maritis quoque fastidium, ut ab ipsarum consortio abstineant, parere solet.

§. VI.

Quod nosse adfectus multum cum cachexia affinitatis, eleganter ostendit HIPPOCRATES lib. II. de morbis mulierum §. 9. fluxus, inquit, albus fluxus velut alba asini urina & in facie sunt tumores albi & partes ambæ sub oculis tumores & bydropiformes ac non valde bona specie præditi sunt oculi & color corporis albidus, & venter immo tumidus & in cruribus tumores laxi, & si præterit digiti nota imprimuntur & stomachi morbus percipiunt, dum jejuna fuerint vel etiam vomuntur velut acidam aquam & si acclivior locum præce,

procedunt, ambelatio corrumpi, eructum perfrigeratio, genus impotentia, uterus prater rationem aperitur & ad osculum procidit gravis. Tales difficile est à morbo liberare. Minime hæc Hippocratis adfecta de fluore albo, moderato, incipiente, sed potius de pertinaci chronico, qui primam causam de fonte suum in malo de tam quoad solidas quam fluidas partes depravato corporis habuit, præcipue omnium vero in magna ventriculi imbecillitate habet, sunt intelligenda. Nam quia fluidum illud chyliform & lymphaticum temperatum subtile, quod solidis partibus vires de robur conciliat, nimium simul per vias uteri devias decedit, fieri omnino non potest, quin virtus solida & systaltica cordis & arteriarum, atque peristaltica ventriculi & intestinorum immineatur; unde languor & magna virium prostratio sequitur; & vi digestrice ventriculi perditæ, crudi & viscidæ succi in massam sanguinis delati atque accumulati nutritionem non modo de pulchritudinem faciei vitiant, sed & animi vigorem demunt, & tristitiam inducunt.

§. VII.

Sedes mali est uterus.

Sedes hujus mali omnino est uterus, cujus anatomicam fabricam, & possitimum vasorum structuram accuratiori paulo consideratione dignam existimo. Ex primo quidem tenendum est, nullam in univerſo corpore partem tam numerosa vasorum copia instructam esse, quam ipsum uterum. Ex his enim primæ sunt arteriæ & venæ spermaticæ, quæ ovaria contingunt, ac in fundum uteri copiosissimæ ramificationibus seruntur. Deinde rami arteriæ & venæ hypogastricæ ad partem medianam & inferiorem uteri, nec non ad vaginam excurrunt. Hæc largissime per uteri corpus disseminata sanguinea vasa, mirum tortuosæ ac serpentina quasi flexu discutuntur. Id vero peculiare sibi servat exquisita vasorum uteri per anastomoses connexio, quod in plurimas cellulas, mutuo communicantes, diversæ magnitudinis canalium alvei desinant, & cellulas ovalis figure forment, quæ substantiam ipsius uteri spongiosam & funguam reddunt. Notandum insuper est, quod non modo hypogastricæ venæ, quæ sanguinem revehunt, denudito majorem capacitatem obtineant, quam arteriæ hypogastricæ, verum etiam, quod venæ sic dictæ spermaticæ non recto, sed anfractuoso admodum & in orbem quasi recurvo ductu porrigitur, ita profusus, ut si easdem extricare, earumque longitudinem supputare velimus, aliquot ulnas æquant, arteriæque spermaticæ longe superarent.

§. VIII.

Uterus formæ.

Ex plane peculiari jam exposita vasorum uteri structura luculenter patet, tarde unique ac segnit per venas has, præsertim valvulis destitutas, sanguinis cursum & circulum succedere, ut adeo ex hac theoria anatomica, seu fundamento, de mensium fluxus, & vitia omnia, quæ ex utero mulieribus contingunt, commode possint explicari. Quæ propter nunc etiam extimè perspicua erit ratio, quare virgines aque ac conjugatæ tam frequentis tamque diuturnæ & molestissimæ feri, varis consistentiæ, varique coloris ex utero & ejus vagina profusio diverſent. Nam quia tonus & motus uteri, qui acquabili fibrarum ejus contractione & remissionem consistit, tam facile læduntur, debilitantur deſcunt, prætereaque

Frid. Hoffmanni Oper. Tom. III.

tardus admodum per circumflexa, & in serpentinis ductus porrecta uterina vasa sanguinis & humorum cursus, imo lentior quoque sanguinis per venas, valvulis destitutas regressus est; per facile utique non solum infarctus & stagnationes sanguinis ac feri in matrice oboriuntur, sed ipsæ etiam serosus & lymphaticus humor, segnitiori progressu lenteſcens, tandem exitum sibi parat, ac per passum in utero & vagina obvia officia effunditur. Communis quidem plurimorum auctorum est sententia: ex lacunis GRAAFII, five follicis, circa urethram conspicuis, & parvis ibi consistentibus glandulis, humorem hunc excerni, at in his lacunis nullum, quod setam admittat, foramen facile reperire licet, sed potius ad utrumque latus orificii, & per totam vaginæ substantiam lacunæ apparent plures, quæ quam facile setæ ad digiti dimidium aditum concedunt, earumque ductus pressu liquorum, femini haud dissimilem plorant. Vid. Cel. HEISTERI *compend. anat. pag. 81. & 82.*

§. IX.

Verum enim vero, utus relaxatæ hæ glandulæ stillare possint humorem paulo copiosorem; nequaquam tamen hæ ipsæ unicam & genuinam fluoris albi sedem constituunt, sed longe plures dantur meatus, è quibus materia fluoris albi, nec non liquoris serosi impuri, in puerperis, cum & post loquiorum fluxus manans, oritur trahit. Et licet RUYSSCHIIUS glandulas in utero unquam viſas esse, aut demonstrari posse negat, nullum tamen dubium est, quin ex istis offoliis, quæ sub mensium fluxu sanguinem fundunt, ferum etiam exitum moliri possint. Perquam enim notatu digna est Cel. FANTONI *anat. C. H. pag. 186.* observatio, qua silem facit, quod status per venas uteri in cavum matricis & vaginæ, ac vicissim ex hoc in venas adigi possit acquiri nutrimentum. Deinde etiam teste GRAFFIO & HORSTIO, post & foraminula in cervice uteri conspiciuntur. Neque prætereunda sunt quæ VERHEYEN in *Anat. C. H. cap. 33. c. f. tab. XVII. fig. 2-3.* prodidit, quod scilicet in utero, in aqua macerato, & per aliquod tempus spatium in blando calore detento, in interiori non modo vaginæ superficie, plurima corpuscula globosa, & albi quidem racemati ipsi inhxerentia, alibi vero per eam disseminata, sed in inferiori quoque parte cavitatis uteri, similia corpuscula videntur, eademque pro glandulis, seroso-piuitosis humoris secretioni intercurrentibus non imminuto habenda esse existant.

§. X.

Nil itaque est dubii, quin per eadem vasa, vias & poros fluxus materis muliebri contingat, è quibus ipsæ menstruas sanguis scitur. Atque hujus adiecti evidens argumentum est, quod mensibus suppressis fluore albus in quibusdam loco horum supervenientia observetur. Quod autem revera loco sanguinis albus liquor, unde etiam nomen morbus obtinet, proveiat, ea de re elegantem observationem habet SEVERINUS PINAUS de *nois virginibus. lib. I. problem. III.* qui in dissectis cadaveribus virginum & mulierum uteri profusio alba, dum viverent, laborantium, licet ob alium morbum extinctarum, humorem simplicissimum in utero invenit, ex cavitæ ejusdem guttatim in suum pudoris filantem, in quo candorem, ut calcem aqua dissolutam

G g 3

solutam

solum dixisset, acquirerebat, forsitan ab aere frigido admisso particulis ferosis se interponente, non excluso tamen acore, & glandulis uteri forsitan profecto.

§. XI.

*Quæse-
ditur, quæ
materiam
fluxus sup-
peditant.*

Quum igitur causa fluxus albi proxima recte in tono fibrarum & vasorum uteri destructo, & circulatione sanguinis per ejus vasa impedita, quæ serum & sanguinem sequestratur, reponenda sit, sequitur jam, ut discipiamus, quænam ex causis mediatis remotionibus ad constituendam hanc proximam causam conspiciantur atque concurrant. Jam vero à nulla re magis, quam ab aere frigido & humido tonus fibrarum relaxatur; hinc facile patet ratio, quare tempore autumnali & in locis frigidis ac humidis, paludosis, humilionibus, vapidis, quæ aer purus & septentrionalis statu suo non facit purgare potest, hic morbus inter feminas præcipue dominetur; & cur, teste SYLVIO in *praxi lib. III. cap. 4.* in Belgio longe frequentior sit quam alibi, maxime si error in cibo & potu accesserit. Nam omnes illi cibi, qui ob viscositatem minus resolvablem digestioni minus obsecundant, ut sunt leguminosa, lacticia, farinacea, nimis dulcia, item ex cibis marinis cochleæ, offree, pisces palustres, neque minus fructus horæi in copia assumpti, omnia acida, acetaria, cum chylum generant glutinosum & crudum, qui ad assimilationem & nutritionem plane idoneus est, hunc fluxum multum fovet & augent. Idque eo magis accidit, si nimia voracitas in puellis vel etiam infantibus accedat. Deinde quoque experientia firma & fere quotidiana observamus, mulieres quæ otio, vitæ sedentariæ, & somno nimis indulgent, longe facilius sibi hæc incommoda accerere, quam illas, quæ labore & motu corpus firmant. Quamobrem etiam agrestes minus expositæ sunt huic fluxui quam urbanæ, quæ ob motum & laborem constantiori fruuntur salute.

§. XII.

*Quæse-
ditur, quæ
causæ sint
operantur.*

Ceterum quoque id sciendum est, eas mulieres, quibus per rarem mucosæ desillationis frequentiores fuerint, si supprimuntur, facta metastasi ad uterum, humoris albi ex utero emanationi valde esse obnoxias. Maxime omnium vero id evenit, quando fluxus menstruus recto ordine & decenti quantitate non succedit. Nam ab eo tempore confestim incipit vacillare sanitas, vasa impuris humoribus implentur & principium fit cachexiæ.

§. XIII.

*Quæse-
ditur, quæ
causæ sint
operantur.*

Exposuimus jam eas causas, quæ crudorum humorum abundantiam corpori ingenerant & materiam molestissimam huic fluxui suppeditant. Nunc etiam ad eas considerandas progredimur, quæ ipsum uterum, seu veram hujus mali sedem ad illum disponunt. Cujus generis præcipue sunt, quæ nimium relaxando vasa & fibras uteri, ipsum robur tonicum adimant: quo vacillante & deficiente, sanguinis & humorum massa per vasa tot copiosa & convulsa lentiori & impediori cursu feratur necesse est, unde quam facile fit feri vicidii per poros uteri secessu. Hinc etiam observamus, in maritatis partus laboriosos, à quibus magna utero conciliatur imbecillitas, frequentes abortiones, secundinarum improvidas & violentas post partum avulsiones sapienti-

me primam huic malo originem & causam suppeditasse. Simili ratione observatum à nobis est, quod ex feminis, quæ immodicæ mensium fluxioni sæpius obnoxie sunt & quæ molas per abortum excernunt, eodem fluxu frequentius laborare. Namque hæc omnia nimiam indicant vasorum distensionem & relaxationem, quæ, nisi mature & tempestive convenientibus roborantibus remediis tollatur & vasorum tonus reparetur, procedente tempore difficili admodum negotio resiliunt.

§. XIV.

Plurimum vero refert, tum ad eventum morbi recte judicandum, tum ad rite instituendam ejus curationem, nostrum affectum ab aliis similibus uteri fluxionibus, cum quibus quandam alit convenientiam, recte discernere. Primum itaque non confundi debet cum mensibus decoloribus, quibus mulieres, præsertim juniores, sæpe sunt obnoxie; & licet ù sint violati, exacte tamen suam servant periodum, quam contra fluxor albus non modo substantia & colore sit diversus, sed & promiscue & sine ordine feratur & cum inordinatis vel etiam nimium fluentibus mensibus jungatur. Tum quoque multum interest, album fluxorem à virulenta gonorrhœa, quæ ab impuro coitu contracta est, distinguere: quippe misera venerem non proliatas solum glandulosas, verum etiam vaginam uteri cum insigni dolore & molestia exulcerat, & viros, qui coeunt, contagio inficit. Deinde copia fluxus veneris longe minor est, quam in fluore albo, tanto vero acrior cum intensio ardore & dolore juncta, & cum mensis fluunt & urina fertur, permanet, quam fluxor albus vel mensis antecedit vel sequatur. Hinc CLAVIVS in *prax. medic. lib. II. cap. VIII. §. 3.* insalubre tales morbos ab invicem distinguendi dedit signum: *Pete, dicat, à muliere, an tempore mensium fluxor ille alba materia adsit, si dicat quod sic, significat eadem, quod morbus, à quo dixeratur, seu gonorrhœa gallica; si vero durante menstruatione fluxor albus evanescat & eadem finita deus regressatur, pro certo habeat, mulierem fluore albo uterino laborare.*

*Differen-
tia fluxus
albi a
mensibus
decoloribus
& seu
re emen-
gusto.*

§. XV.

Neque vero omnis saniosa materia pro gonorrhœa virulenta & contagiosa habenda est. Nam interdum, quævis raris, abscessus & ulcera in feminis sterilibus gignantur, quæ sine contagio sunt. Potest hac de re legi CLAVIVS in *observ. medicis variis lib. IV. & V. de ulcere musculorum uteri vaginæ vicinarum & utero purulento.* Deinceps quoque non omnis erosio & exulceratio certum gonorrhœæ purulentiæ præbet signum, siquidem in fluore albo, & magis adhuc in scorbuto, seri vitium eo acrimoniae probei potest, ut vicinas partes exedat atque exulceret, sed hæc exulceratio magis est superficialis & cum insigni pruritu juncta, facilioremque admittit sanationem. Verum, ut omnis error in judicando evitetur, consultum duco per mulierculas, quæ omnes circumstantias accurate debent examinare, in veritatem inquirere.

*Gonorrhœa virulenta
sterilibus
signa.*

§. XVI.

Denique ut etiam prognostica quedam subiciamus, statuimus, fluxorem album, si moderatus, si recens atque ex causa externa subortus sit, non adeo multum in recessu habere, atque

Prognosi-

in

in fanis aliquoq; feminis, aut virginibus per plures menses sine symptomatum atrocitate procedere. Nihilominus tamen tarditate sua feculi delicatiori & muodicitæ dedno valde est incommodus & tædiofus, eo quod colorem faciei rofeum cum tempore inde aruitum, nonnullæ valde inde triftantur & melancholicæ fiunt, quia maritis & fponfis exoræ evadunt. Alia vero eft ratio fluoris albi, qui ex fumma ventriculi imbecillitate & malo corporis habitu oriundus nimium invahuit, aut alios graves morbos fubfequitur, quippe qui, omnes partium functiones lædendo, ingentem in univerfo corpore mutationem inducit; oritur enim non raro fumma macies cum lenta febre & ftentitas quoque inde emergit, uti jam dudum docuit HIPPOCRATES *lib. 1. p. ap. 4. que prænotanda habent uteros, gravidari nequeunt; extinguuntur enim in ipfis genitalia*. Et *lib. de ftentitate: fi uteri lubrici fuerint, mulier non concipit, fermen enim foras elabi funt*. Deinceps ex fluore alio diutius laborantes facile & frequenter patiuntur abortum, quia laxata nimium uteri tono conceptus non facit firmas radices agere poteft, fed affidua illuvie corrumpitur & foras ejicitur. Sequitur quoque ex hoc malo non raro uteri præcidentia.

CURATIO

G. L.

Causa def-
prolium
invenitur. Quum valde pertinax sit, si radices egerit
malum, & difficilis admodum curationis, non im-
probus, ut inter Medicorum scandala non im-
petio referri debeat; non abs re sed operæ erit
pretium, tam difficilis fanionis causâ paullo
accuratius inquirere. Ex quibus prima mihi vi-
detur, quod Medici proximam hujus morbi cau-
sam in sola tantum impuritate & nimia feri co-
laviæ constituent, quam tamen potius ad uteri
vitiū, ubi mali sedes est, etque valorum de-
structum rorum respicere debent, non omittis
iis remediis, quæ sordes expurgant. At certe
præstantissimis roborantibus & magno negotio
opus est, ad naturalem & valde deperditum utero
vigorem reparandum, idque ob ingeniem va-
lorum inter se complicatorum copiam & hinc
dependentem segniores sanguinis per ipsa transi-
tum, quo vasæ & glandulæ nimis relaxatæ to-
no suo desinuntur. Dein inter causas diffici-
lioris fanionis & illud referendum esse puto,
quod Medici plerumque vel prorsus non, vel sal-
tem levi admodum cura ad primam mali origi-
nem, quæ in summa ventriculi imbecillitate re-
sidet, respiciant. Quod si enim digestio cibo-
rum minus rite succedit, pravi accedunt succi
ad sanguinem, & euepta quoque in biliosum
vel pituitosum amurcam convertuntur, quæ sa-
pidiosum vel pinguedinis rancidæ, vel dulcedi-
nis quasi mellæ, vel acoris & nidoris sensum
ingignant. Nisi itaque in prima statim regione
vitiū corrigitur, frustra sunt, quæ ad san-
guinem depurandum & humores vitiosos exter-
minandos adhibentur remedia. Nec denique ex
causâ ægræ fanionis omittendum est, quod per
naturam suam mulieres ita sint comparatæ, ut
rarius diætetica Medicorum præceptis obediant,
sed ad ingenium suum viventes iis omnibus,
quæ ad fluxum hunc proritandum facere possunt,
uti sunt vita defect, fructuum dulcium, acidorum,
farinaceorum & insulsi quoque Coffer abusus

potio parior & formis longior, ventris & inferiorum partium refrigeratio, fumus calidus ex ignis carbonibus hiemali tempore in naturalia admittitur, nec non potus frigidus corpori affluendi ingurgitatur, &c. nimium indigeant: utpote quae omnia fanitari sunt infesta; longe tamen maiorem noxam eo tempore adferunt, quo iam uterum labem quandam, v.g. per partum, abortum vel alium graviter morbum percrevisse contraxit.

6. II.

Quod ad generales & curatorias attinet indicationes, quia ratione illarum sint expediendæ, pauca explicabo. Ante omnia prima regio, & universum corpus à nimia feri colluvie per congrua evacuantia & solennia naturæ emunctoria est liberandum. Deinde totus de robur uteri deperdium præstantissimum tam internis, quam externis remediis debet restitui, quo facilior & expeditior sanguinis & humorum per ejus vasa fiat progressus, & inde molesta pravorum humorum flagitationes ac secessiones potiusque & glandularum relaxationes tollantur, ac ulteriores avertantur. Posthæc ventriculi habenda est ratio, quo boni succi ad sanguinem ferantur, qui vitiosos corrigant & bonos laudabilesque amissos restituant. Denique, si malum gravius est de sinu cachecticum, opera danda est, ut tota sanguinis & humorum massa in meliorem reducatur temperiem, & excretiones naturales promoveantur & visceribus pristinum suum robur ac naturalis reddatur functio.

§. III.

Primo itaque fluendum est, ut primæ viæ à
sordibus excrementis repurgentur: quod ta-
men non per remedia valde commoventia ac
purgantia, sed potius per benigna & mitiora,
que repetita dosi data per episcipam operantur,
debet præstari. Atque in eo consentientes habeo
peritiores artis nostræ antiques, è quorum nume-
ro vel unicum allegasse sufficit, doctissimum
Ritvium, qui *cent. III. obs. 82.* testatur, se fru-
stra tentatis aliis remediis, in pituita laxante cer-
tum ac fidum invenisse auxilium, etque sola per
mensem integrum usurpata mulierem diuturno
fluore albo laborantem sanasse; quod medicamen-
tum in *praxi lib. XV. cap. 1.* rursus valde comen-
dat. Ex omnibus vero laxantibus in hoc morbo
proficuis certe eminent rhabarbarina, eo quod præ-
ter laxantem, etiam blande balsamicam & amari-
cantem recondunt virtutem, que acidum vitio-
sum corrigit partisque simul deplesas egrege re-
borat. At vero ne scilicet rhabarbarum leve &
cariosum, sed, quod optimum est, solidum, sincere
moneo. Potest hoc medicamentum cum aliis ap-
propriatis commode remisceri & vel in forma pul-
veris, vel infusi & decocti, vel etiam in extrachum
& essentiam redactum exhiberi. Pulvis ita com-
ponitur: *recipe rhabarbari optimi drachmam di-
midiam, perne foliatæ tartari gr. ana duodecim. M.
detur pro una dosi.* Infusum unibulum hoc modo
est præparandum: *recipe rhabarbari optimi drach-
mas sex, radicis zedoariæ, aristolochiæ rotunda,
pimpinellæ, corticis aurantiorum ana drachmas
tres, seminis danci, anisi stellati, salis tartari
ana drachmam unam & dividim. M. F. spes-
cie pro una vini mensura.* Extrachum optime
ingredietur pilulas, que laxantem & roboran-
tem exferunt virtutem, si ita conficiuntur: *Soma-
tur extracis rhabarbari, aloes rosæ, gummi*

352 Cap. XVI. De cachexia uterina, sive fluore albo.

galbani, myrrha electa, gummi badera, sandaraca, extrahit aristolochie rotunde, succini portione antea drachma una. Fiant cum essentia balsami Peruviani pilula ex scrupulo uno, no. xx.

§. IV.

Quando cachexia urget & ventriculi magna adest imbecillitas viscerumque laxitas, nunquam non pessantissima deprehendit ejectione, quae sequuntur medicamina: *Recipe croci maris tenuiss. i, sive antimonii martialis cachectici, fucula ari, salis abstruui, solutonis oculorum canceri, singulorum drachma unam; corticis castorei, succini, ciuebaris, ana drachma dimidiam, olei ligni sassafras guttas sex. M. F. pulvis, qui ad drachmam unam cum aqua vino diluta mane potest exhiberi, cuius tamen operatio longe conspicietur erit, si insusum Theiforme, ex herba melissae, menthae, utricae moruae, salviae, fernine dauci & aniso stellato paratum superbibatur. Post haec ad robur uteri restituendum, neque minus ad amurcam dissolvendam & exturbandam longe utilissimum erit hocce remedium: *recipe essentia succini, ligni aloei, tinctura antimonii acris, liquoris nostri mineralis, spiritus cornu cervi ana meriam dimidiam, quod ad guttas l. pro re nata cum infuso Theriiformi, vel vino diluto potest assumi.**

§. V.

Haecenus dicta esse sunt pulcherrima & appropriata adversus nostrum malum medicamina, sed opus etiam est, ut externis eorum virtus secundetur, quae inter diuturno usu comprobata laudem merentur balnea, cum speciebus roborantibus, nervinis, sale oleo volatili repletis, praeparata, quarum censum subeunt herba majoranae, faturciae, thymi, melissae, calamintae, mentricariae, abrocani, oregani, rorissinarini, hyssopi, flores chamomillae romanae, baccae lauri, juniperi, &c. quae includi debent sacculo & per horae dimidium in aqua leniter decoqui. Talis sacculus dein, dum aegra balneo insidet, regioni uterinae est imponendum. Nec extra balneum inconsultum est, sacculus ejusmodi tenuiores, in vino rubro leniter decoctus per noctem inguinalem regioni applicare. Praeterea quoque laudem externe merentur suffragia, quae ex tacamahaca, massiche, succino, benzoe & ibure confici & ad uterum admitti commodum possunt.

§. VI.

Diana.

Quod ad dietam attinet, sub hac cura paucis, tenui & cupepto cibo opus est, abstinendo ab omnibus carnis, praesertim durioribus, pinguibus, insumatis, piscibus marinis, neque minus a leguminosis, acidis & dulcibus, lacticiis, farinaceis, & assatae carnes praesentiri debent elixis. Pro potu ordinario commendamus decoctum ex radice chinæ, signo salassas, sancto rubro & flavo, signo leonicis & cinnamonom. Vinum etiam bonum Hungaricum moderate inter cibos fumentum coctionis imbecillitati succurrit utilissime.

CAUTELE ET OBSERVATIONES CLINICAE.

§. I.

Circa ad-
progen-
tate

In fluore albo, sive simplici, sive virulento,

vel etiam in mensibus decoloribus, adfingentibus tam internis quam externis nihil periculosius est; siquidem inde materia stola in utero ejusque vas retenta in massam saepius valde tenacem concrevit, qua non modo excretio haece impeditur, sed ingens quoque & ad testum durus tumor in regione pubis non raro subascitur, qui, nisi cito succurratur, nunquam fere non gravior accersit accidemia. Vidimus enim exinde lentas febres cum atrophia, phthisin, purpuracea exanthemata, tumores tympanicos, & erodentes in faucibus defluxiones uvulae & amygdalas pessime adficietas, nec non uteri fibrillos, apustemata & exulcerationes pene insanabiles.

§. II.

Pessive sive clystina uterina sicuti ab antiquitate ipsoque HIPPOCRATE in mulierum adflictibus magno in pretio habita & in frequentiore usum tracta fuerunt; ita mirum videtur, nestro tempore eorum usum in praxi medica penitus evanuisse; cum tamen in certis casibus & maxime, ubi substantia uteri laesa est, non sine insigni fructu eadem usurpata experientia doceat. Vidimus etiam in fluore albo inveterato, qui difficulter alias sanabilis est, nec non in abscessibus & exulcerationibus peculiarem plane effectum. Nam sicuti gonorrhoea tam benigna quam maligna in viris non facile, si inveteravit, sine injectionibus sanari potest; ita etiam in fluore albo necesse est, ut ad partem graviter adflectam & laesam medicamenti accommodati virtus proximae accedat. In genere vero illud notandum arborer, quod tales injectiones non simul ac semel & magna in quantitate, sed crebrius & in refracta portione ad unciam scilicet unam vel duas adhiberi debeant. Vitanda autem sunt omnia salsa, acris, nimis pinguis & lubricantia.

§. III.

Thermæ Carolinae ut in cachecticis desideratissimum serant opem, nihilo tamen lecius ubi substantia uteri nimium laesa est, & nimia feri fit profusio, multo vero magis, si fluor est veneris & exulceratio praesens & cum urina multum glutinis, quod fundum petit, cum dolore secedit, caute cum ipsis, sive interne five externe adhibeantur, mercandum est. Utpote haec aquae propter calcariam subtiliorem, quae pollent, terram, externe valde consilium, interne vero, si corruptio adsit, relaxatis & exesit paribus ob nimiam copiam nocent. Melioris conditionis sunt fontes, martiali principio imbuti, ut Lauchstadienses & Freyentalenses, qui cum herbis nervinis decocti, ad serum superfluum per transpirationem educendum, & affluxum ab utero averendum, efficaciter sunt praesantissima.

§. IV.

Saepe observavi a menstruo fluxu per duos trese menses non ex graviditate, sed aliis causis, retento, ingentem sanguinis profusionem abortam fuisse, quam postea fluxus albus excepit. Quare ad utrumque malum praecavendum venae sectio, expensis prius omnibus circumstantiis, administrata est utilissima. Namque uteri vasa a nimia sanguinis copia distenta suum amittunt tonum & robor, ut solemnes ibi fiant stagnationes non tam facile removende.

§. V.

Circa pess-
sive & cly-
stina uter-
ina.

Circa thermæ
Carolinae.

Circa ven-
nae sectionem.

§. V.

Circa balnea.

Balnea tam sicca quam humida ante conveniensem corrigentium, robotantium & evacuantium usum adhibita tantum non semper majori solent esse detrimento quam emolumentis. Nam impuros humores, nimium commovendo, ex ignobiliori sede ad nobiliorem saepe non sine ingenti periculo appellunt. Balnea sicca sive laconica, si a superfluo & excrementitio humido corpus prius probe liberatum fuerit, in foeminis phlegmaticis usum omnino habent laudatissimum, dum externo calore, sudorem eliciendo, partibus ob excretam nimiam humiditatem relaxatis pristinum tonum ex voto restituant.

§. VI.

Qua praesentia, si venteris, in cruditatibus suis.

Si venterculus, ut saepe incidit, ingenti cruditatum sententia sciatet, cum fructu iteratis vicibus offeruntur blanda emetica, ex quibus radix ipecacuanha, quae leniter roborat, & perspirationem adjuvat, omnibus reliquis est praefenda. Nec fuso fructu destituitur elixir nostrum viscerale cum essentia cascariellae remixtum & inter cibos assumendum.

§. VII.

Circa suffraganea abstinenda.

In intertento fluore albo, si quid adhuc, cura finita, de fluido ex genitalibus exsillat, praeter jam dicta externa & interna, suffusio ex olivabano, tacamahaca, mastiche & succino meretur laudari, quae viæ ad uterum tendenti, commodum instrumentum sunt applicanda: quodammodo enim relaxatas glandulas roborant.

§. VIII.

Concedenda cura, utrumque malum in foemina si fuerit, uterum & venterem &c.

Quandocunque foemina scorbutica, imo venerea, vel quae crebrius purpurat rubram patitur, hac fluxione perniciosa corripitur, abstinendum omnino est a calidioribus purgantibus & balneis, sed mitissime sunt prioris temporibus tractandae diaphoreticis fixioribus, & ejusmodi medicamentis, quae corruptioni lymphae maxime obstat. Ego igitur tali in casu cum fructu adhibui pulverem nostrum bezoardicum cum uno alterove sulphuris antimonii nostri grano maritatum, aequae simul decoctum praescripti, quod solet in huc venerea ex lignis & radicibus sanguinem depurantibus, addito antimonio crudo, comparari. Et si corpus per mensem & ultra ita fuerit preparatum, interna pariter ac externa cum meliori fructu pro sanatione possunt adhiberi.

ENARRATIONES MORBORUM.

OBSERVATIO I.

Fluxus albus cum alio malis complicatus.

Pervenerunt haud ita pridem ad me doctissimi celeberrimi Parisini Medici & Archiatri Regii litterae, quae accuratam morbi nostri cum mille aliis malis complicati exponerant historiam, quam non possum non integre huc transcribere. Nobilissima matrona annos XXXV. nata, partium omnium symmetria rite constituta, latroque satis pectine, sed a patre genita, qui phthisicus interit, aetatis anno XX. veneream lœm a marito contraxit, unde, brevi interposito temporis spatio, hydrargyrosi rite administrata optime convaluit. Quanto vel sexto anno post ex pe-

ripneumonia graviter aegrotavit, quae in suppurationem versa est, & per anacatharin feliciter expurgata. Inde tamen quinque circiter abhinc annis variis coepit morbosus symptomatis conflictari, quae nunc sigillatim recensenda veniunt, sed paucis, nam ut vulgari fertur axiomata, *intelligenti paucis*.

I. Laborat aegrotans ventriculi imbecillitate tam varia & sibi jam parum constante, ut modo rite appetat, & rite concoquat: modo appetat debilis, & ignavus quoque concoquat: plerumque appetat quidem satis bene, sed tam male concoquat, ut cibaria, etiam exspecta, in biliosam amurcam, vel in pluviosos mucus, quod ad maximam partem, convertantur. Alvus aliquando satis libera, pigrior aliquando. Interdum nulla anxietate premitur stomachus, saepius vero aliquot post pastum horis inasuetu ponderare, quod ad cardialgiam proximam accedit, gravatur, & agra fastidiosum vel pinguedinis rancidæ, vel dulcedinis quasi mellæ sensum experitur: nunquam vero, vel rarissime saltem, acorem nidoremve ullum empyreumaticum.

II. Interdum, sed maxime dum instant catamenia, laborat agra dolore in ovario dextro, dextroque uteri latere, qui non raro ad multibria usque extenditur, sed subobscuræ, & qui siveit praesentim si aegrotat erecto corporis trunco aliquandiu pedibus insistat, maxime statim a palu. Ceterum menstrua & ea qua par est quantitate, & statim quo debent tempore solent ut plurimum fluere, quantumvis consergit non semel, ut tardius segruiusque manaverint. Apparet interdum fluor albus nec copia multus, nec colore aut acrimonia ullo modo vitiosus, qui menstruorum eruptionem antecedit vel subsequitur, sed quo nec erosioni, nec caloris ullus in mulieribus sensus inducitur. Matrona da qua questio est, peperit olim semel atque iterum ante contractam lœm venerem, sed parturicio sausta, partusque vitales fuere, atque optima sanitate etiamnum fruuntur.

III. Quod nunc potissimum est, & de quo peritiam tuam postulam, Vir illustre, in paucis accipia. Aegrotans ab eo tempore, quo ex peripneumonia graviter decubuit, solita erat interdum ex pulmone & ex illo pulmonis loco, ubi peripneumonia sedem habuit, excreando mune emittere, ter aut quater in mense, spiritum unum vel alterum, spissum, rotundum, cineritii coloris, aquae praeponderans, sed non graveolens. Jam vero circiter ab uno mense derepente & absque sensibili quavis causa, tussiendo ipsa aliquot ejecit sanguinea, seu potius pituitosa sanguine vivo & rutilante imbuta, vel strisim interspersa, quae larga venae sectione in brachio, bis intra horas sex repetita, celerissime & felicissime cohibita sunt. Inde neque febre ulla, neque ullo spirandi labore, neque ulla omnino tussi agra tentata fuit, sed jam ab aliquot diebus queritur se experiri quandam doloris obscuri sensum in superiore & dextra thoracis parte, & regione tertiae vel quartae costarum superiorum, scilicet in eodem loco, ubi olim latum abscessus, in quem peripneumoniam degenerem fuisse supra dictum est. Ab eo vero tempore maturitatis horis, ubi primum expurgantur, unum alterumve spiritum educit ex pulmone, facillimum quidem nulu & fere sine tussi, sed quod plenumque cineritii, grisei, subfulvi coloris est, aquae praeponderat, laeve est & spissum, &c.

354 Cap. XVI. De cachexia uterina, five fluore albo.

& ad pus concocci naturam videtur paullo minus accedere, si revera purulenter non sit. Ceterum agnata febre, tussis, dyspnœa omnino vacat, & in utrumque latus perinde jacet sine noxa, etiam in situ corporis plane horizontali, qui nobili matronæ conaturalis est. Notari autem velim agrotam, ante brevem illam hæmoptœon, qua laboravit semel, ut modo dictum est, lætè vaccino per duos aut tres menses usum fuisse semel in die: initio quidem solo, vel cum admixta aqua communi, sed minus feliciter, utpote quod ventriculo noxam inferebat: postea vero cum aqua Spadana ad mediâs partes addita, unde ventriculus melius quidem habuit, sed mensuræ fluxus tardior pariorque evasis, atque tussis quamdam sicca & quasi-convulsiva & hysterica per duos menses agrotam perinaciter cruciavit. Porro non orisistendum censio, tot tamque variis morboris symptomatibus, insultu, quosdam hystericos, sed leviores, quos *vaporifer* vocant, interdum superadici, maxime dum instant catamenia, aut à illata periodo paullo diutius cessant, quo tempore agnata de quadam pectoris angustia quasi ipsinodica, de distractione mediastini & de continua ad tussendum propensione quesit fuit. Denum quamquam agnata medicis præscriptis obsequium non denegat, stomachus, five natura, five ex antiquo vivendi more, in concoquendis cibis ita variis illi est atque mutabilis, ut qui uno die proficere visi sunt, noceant sequente, unde evenit, ut habenz diætz severioris interdum remittenda sint: siquidem experientia conspectum est, quod & ab HIPPOCRATE dictum tenes, cibos ab agrotante avidè expetitos felicius, promptius & minore tumultu confici, utcumque paulo magis dyspepti videantur, quam qui concoctu faciliores esse censentur, si eos agnata palatum respiciat. Est tamen modus indulgentiæ nostræ, sunt certi denique fines, intra quos agnata, nec relaxandi, sese contineri facile patitur.

Responsio Consultatoria.

Est omnino hæc adfectio inter graves, diuturnas, curatuque difficiliores & eventu accipites referenda. Totus enim corporis habitus tum quoad solidas & fluidas partes, quam quoad functiones vitiatu videtur. Pulmones in dextro latere cavitatem reconduunt ulcerosam callositate obductam, quæ ex peripneumonia ante sex annos contracta, temporiquæ successu ita aducta videtur, ut timor sit, ne in majorem corruptionem & febrilem hæticum calorem ex facili transierit. In uteri quoque dextra regione non exigua delitescit labe & obstractio, quæ ingravescens mensium pariter negotium in ordine magis turbat, unde fluoris albi & pathenaturæ spumodiorum, seu hysterico-hypochondriacorum origo; quæ, dum totum nervorum partium syllema in consensum rapiunt, quantas in œconomia motuum vitalium excitent turbas, res artis perito non obscura, sed satis clara ac evidens est. Fovetur autem & augetur singula hæc mala, ut ego quidem arbitror, à vitiis ventriculi & primarum viarum imbecillitate pravæque alimentorum digestionis, quæ fieri solet, ut loco chyli probe temperati & subtilioris, qui materiam boni sanguinis, lymphæ nutritiæ & tenuissimi cerebri atque nervorum fluidi suppeditat, succi crudi, lenti & viscidii ad sanguinem delati minima emunctorio-

rum vascula, per quæ optime fit chyli & sanguinis deputatio, obstruant, unde ortus mali cachectici, quo primario Illustrissima nostra laborat. Quod si itaque adhuc spes recuperandæ sanitatis, vel mitigandæ adversæ valetudinis superest, meo quidem iudicio, initium curationis moliri oportet à restituendo ventriculi & primarum viarum robore ciborumque digestionis promovenda. Ad quem scopum obtinendum primo omnium exquisita diætz vel accuratioris vitæ regimen habenda erit ratio. Sicut enim apud feminas, quæ molliori & sensibiliori prædiz constitutione desidiæ, somno varique generis edulibus & animi adflectibus indulgent, mali cachectici, hysterici & hypochondriaci facili sit proventus; ita etiam, nisi hæc omnia, quæ causam morbo dederunt antecedenter, rite submoveantur, supervacanea est omnis reliqua per medicamenta curatio. Quod ad ipsa remedia attinet, quæ nostræ agrotanti existimem proficua, primo omnium suaderem, ut prima regio à festina & illavie vitiorum humorum per lenes & benignum emeticum expurgetur, exhibendo videlicet, prout ventriculus magis vel minus sensibilis est, scrupulum unum, vel grana xxiv. radicis ipecacuanhæ. Hæc quippe radix sine omni noxa ventriculi & duodeni cavitatem à sordibus inhibi hærentibus, quæ insar fermenti chylum inficiunt & contaminant, liberat, perfrigationem simul egregie adjuvat, tonumque & robur ipsi partibus conciliat, ideoque pro circumstantiarum ratione bis vel tertio die potest iterari. Subjungenda postea sunt temperata balsamica, quæ digestionis negotium promovendo tonum ventriculi corroborant. Quo fine in usum trahi potest elixirum, quod ex *coriœ aurasiensis recentium uncia dimidia, extracti abynthii, gentianæ rubræ, castæ illæ, myrrhæ electæ ana drachma una, salis tartari drachmis tribus cum aqua menthae unctis octo composuitur*, vel solum vel cum quarta parte spiritus niri dulcis aut liquoris nostri aodyni remixtum ad Lxxx. vel C. guttas intra prandium & quatuor horas post cum potu ordinario potest exhiberi. Hoc enim medicamentum valde temperatum stomacho, pectori & utero est amicum, nec ullam in sanguine excitat commotionem, sed ut eas usus per longum tempus continuetur necesse est. Posthæc commendarem, ut alternis diebus circa lecti introitum numero decem offerantur pilule, hujus compositionis: *Rec. extracti rhubarbari, zedoariæ, myrrhæ, succini ana drachmam unam, extracti calostei scrupulum unum. M. F. cum essentia balsami peruviani pilule ex scrupulo uno no. XX.* Postero die mane drachma dimidia pulveis leniter aperitivi ex *lapidibus cancrorum, iride florentina ana drachmis duabus, solutione ocularum camæri cum succo citri, salis polychrestii, niri puri ana drachma una* conflati cum fructu erit sumenda, desuper bibendo insulum Theiforme, quod ex herba veronica, melissæ, pulmonariæ maculose & aniso stellato potest componi. Pro potu ordinario, cuius summa est in diuturnis adfectionibus sanandis efficacia, suaderem decoctum radicis chinæ & sarsaparillæ cum pulvis, addita in fine coctionis cinnamomi portione acutum & cum pauxillo vini, inter cibos potissimum remiscendum. Ceterum moderationem in sanguine mittendo plurimum commendando. Vidi ex relatione ad præcavendam hæmoptœon, intra sex horarum spatium bis largiter è vena nûa sanguinem detractum; nullum

nolem tamen in nostris regionibus, ubi sanguis non adeo ebullit, id imitari. Nam in sanguine, nisi nimium exundet, virum latet thesaurus, qui si supra modum subtrahatur, minima viscera concidunt & angustantur; unde non modo utilium succorum secretio & inutilium excretio imminuitur, sed & vis digestrix & tonica ventriculi & intestinorum marum labefactatur, ut periculum sit, ne status cachecticus inde plus increseat, quam decreseat. Idem sentiendum velim in hoc morbi statu de cura lactis, quæ licet, si præsertim cum aquis mineralibus instituantur, in pectoris adfectibus egregio sit solamini, in nostra tamen ægrotæ ventriculum magis debilitare, mensuramque negotium retardare, quam proficere videtur. Et hæc sunt quæ circa Illustrissimæ personæ curationem vernalem proponere placuit.

OBSERVATIO II.

Illustri loco nata femina, xxx. annorum, constitutionis tenerioris, in loco degens mari vicinior, vitæque sedentariæ & cibis durioribus, ut piscibus marinis, præsertim ostreis, adfecta, per annum fere, parvum & inordinatum mensium fluxum experta, jam albo tentatur fluore molestissimo, facies incipit pallere, corpus marcescit & a limus quoque ad tristitiam & metum nunc longe magis, quam antea pronus horrenda sibi fingit pericula, maxime quando matris, eodem adfectu olim detentæ, subit recordatio. Ne itaque malum majora sumat incrementa, meam ægra imploravit opem.

Epitriſis cum consilio.

Ventriculi imbecillitati & prævæ ciborum digestionis ego præcipue omnium in hoc casu succurrendum ratus, primo blandiori emetico, radice videlicet ipecacuanhæ ad drachmam dimidiam cum decem tartari virosulati granis bis in septimana exhibita primam regionem à vitiosorum humorum laboribus expurgandam fusi. Dein singulis hebdomadibus pilulas nostras balsmicas cum extracto rhabarbari mixtas capiendas commendavi, intermedio vero tempore vinum stomachale, egregiæ virtutis ad tres quatuorve uncias mane hauiendum imperavi, cujus hæc erat compositio: *recipe radices zedoaria, calami aromatici, enula ana unciam semis, herbe absinthii, verisamarini, marrubii albi, mentha, salvia, centaurei minoris singulorum manip. unum, baccharum juniperi unciam unam. Concisa confusa infundantur in vini Canariensis mensura una & dimidia, calidulo loco reponentur.* Coletur usus tempore & per mensem hæc cura continuetur, addito monito, ut corpus moderato motu frequentius exerceatur & cibi capiantur eucepti, abstinendo à victu duro & crassiori, cui oleracea, lacticia, farinacea & acida jure debent adnumerari. Et hac medendi methodo ego affectum hunc recentem ex mala digestionis ortum, nisi jam in cachexiam degeneraverit, in aliquot feminis sanavi felicissime.

OBSERVATIO III.

Femina, xxx. & aliquot annorum, macilentæ, post abortum tertia vice passim, per annum & ultra fluore albo correpta fuit satis mole-

sto, mensibus inordinatè & interdum largiter profluentibus. Ordinavi pilulas, quales in curatione præscriptissimas, balsmicas, circa tempus decubitus per triduum devorandas, desuper bibendo postero die mane vinum laxativum uterinum ad tres circiter uncias. Isdem diebus immittendam jussi ægram balneo aque dulcis cum herbis robotantibus, facculo inclusis decocta temporeque infusus facculum hunc inguinali regioni imponendum. Interjecto trium dierum intervallo pristinam curam per totidem dies repetendam fusi; idque rursus tertia vice, hæc tantum caute-la, ut sub quavis cura novæ herbar pro balneo fumantur. Denique uterum thure, mastiche & succino incensis commendavi suffragandum, rectamque vitæ rationem per longum adhuc tempus continuandam injunxi. Quæ methodo, quum non modo per alvum, sed per uterum quoque ingens humorum sentina fuerit expurgata, optima hæc femina, sicut plures aliæ peritacine & molestissimo hoc adfectu laborantes, pristinam recuperavit sanitatem.

Epitriſis.

Quando auspicio succedere contumacis fluoris albi curatio debet, non satis est primam regionem & univerſum corpus à colluvie feri vitiosi liberare, sed omnium maxime uteri habenda est ratio, ut si ipse nimis relaxatus & humorum viscidiorum coitæ fartus roboretur, quod per balnea jam laudata, herbis nervinis & aromaticis efficacia reddita expediri potest commodissime. Et quoniam plerumque sterilitas vitiosam ejusmodi uteri fluxionem comitatur, eadem hæc methodo hæc ipsa potest tolli & exoptata fecunditas reddi.

OBSERVATIO IV.

Illustris matrona xxvii. annorum, constitutionis valde teneræ & temperamenti sanguineophlegmatici, ante novem circiter annos post puerperium, lochii cessantibus, molesto albo viscidæque materiæ ex genitalibus profluvio cepit laborare: quod inter initia, cum parum exciperet perciperet incommodi, non adeo multum æstinavit. At vero invalescente hoc malo, cum multa alia accederent symptomata, plures consuluit medicinæ peritos, quorum quidem ope se levatam paululum vidit, penitus tamen liberari nunquam potuit. Jam brevi abhinc tempore fluxus tanta summis incrementa, ut non modo copiosior ex genitalibus feratur, sed &, mensibus durantibus, non cesset: unde vires valde decreverunt, atque pedum tanta est imbecillitas, ut vix viginæ passus sine ingenti virium deflectione progredi ægra possit. His accedit summa cutis sensibilis; siquidem sub quavis fere aëris mutatione subito corrumpitur rheumatismo, cum cephalalgia, doloribus odontalgicis & faciei erysipela te stipato. Haud ita pridem, accepto tristis de subita propinqui morte nuncio, vis morbi ita invaluit, ut nec extra lectum esse, nec somnum capere possit. Imo nunc quoque, per intervalla, quod pessimum est, frigus accedit, extremorumque tremor ac animi deliquium. Tam misere itaque adfecta ægrotans, meum requisivit per doctissimum Medicum consilium.

Epitriſis.

Fluor al-
bus à
menſium
retentione.

Fluor al-
bus cum
fusa co-
rruptione
cephalica.

Fluor al-
bus post
abortum
repetitum.

Epiergisi cum Confilio.

In præsentî hoc casu non tam ad fluxorem album, quam potius ad ejus effectum seu statum cachectico-atrophicum summamque virium prostrationem respiciendum existimavi. Quam difficile autem sit, in tam depravato temporisque diuturnitate confirmato adfectu convenienti medicina succurrere, abunde scitis notum est. Si qua tamen recuperandæ salutis spes superest, ita curationem suscipiendam esse edixi. Primo omnium, injuncto accuratiori vitæ regimine, usum elixirii nostrî visceralis cum cibis bis de die ad Lxxx. guttas commendavi. Dein curam præscripti fonsæ Selterani cum tertia parte lactis asinini remixti, exhibendo per mensis spatium singulis diebus mane mensuram dimidiam & ultra. Omni tri-duo, ad moderandum fluxorem uterinum circa decubitum dari jussi no. xi. pilularum balsamicarum; exterius vero succurrendum duxi suffumigio, & epithema ex aceto florum sambuci cum aqua reginæ Hungariæ aequali portione remixto, inguinali regioni applicandum suavi.

OBSERVATIO V.

*Fluxor al-
bus à la-
borioso
purno.*

Fœmina xx. annos nata, constitutionis quoad corpus tenerioris, quoad animum valde sensibilis, cibus dulcibus, fructibusque horæis & lacticiis nimium indulgens vitamque amans sedentariam, à primis adolescentiæ annis perpetuo fere viscidis muci per nates stillicidio laboravit. In conjugio primum gravida partu functa est admodum laborioso, idque propter paullo vehementiorem secundinarum extractionem, & inde obortum dolorem valde acutum. Neque dein lochiorum fluxus, ut debuit, successit, sed omnino fere sublitit; unde febrem incidit optima mulier valde acutam, à qua tamen brevi post convaluit. Retinuit vero ab infelici hoc puerperio magnam uteri atoniam, & perpetuum se-re feri albicantis & putridi ex sinu ejus profluvium, quod post mensium effluxum semper infestat gravius. His accedunt adhuc aliæ rectæ valetudinis læsiones: nam à frigore admisso, vel flatulento cibo adsumto, aut à levi quadam animi commotione, dolore lumborum ad-ficitur valde gravativo, macilentia in dies magis redidit, & vesperi inferiores pedum partes tumidæ conspicuntur. Durant singula hæc mala per integros sex menses, quare de his peiora adhuc eveniant, meum maritus efflagi-tavit consilium.

Epiergisi.

Meretur attentionem in præmissa morbi his-toria, quod humoris feroci ex muliebris pro-fluxio violentum partum & vehementiorem se-cundinæ evulsionem exceperit, quale quid mihi in artis exercitio annotare licuit sæpius. Nam-que tali ratione non exigua utero inducitur læsio & atonia, quæ plerumque majorem sanguinis affluxum & decubitum post se trahit, quo fit, ut serum per poros & meatus nimis patulos se-cedat, & copiose nonnunquam expendendis pro-maneat. Augetur vero hic fluxus circa tempus mensium, quia tunc majori nisu & copia sangui-nis ad uterum confluit, à quo major ejus relaxatio sequitur necesse est. Dolor lumborum, qui fere

individuum diuturnioris albi profluvii comes est, sanguinis stagnationi & diffensionis vasorum tam spermaticorum quam hypogastricorum, quæ san-guinem ad uterum vehunt & revehant, debet assignari. Namque difficiliori reddito sanguinis per uteri venas regressu, is ipse in vasis addu-centibus accumulatur, eademque nimium dis-tendendo partes adjacentes nervos comprimæ, unde doloris sensus. Quod curationem ardet, consilium dedi, ut per tres continuos dies pilu-larum mearum balsamicarum no. xv. circa decubitum, postero die vero mane dosis pulveris si-lino-nitrosi sumatur, idque aliquoties, interpo-sitis semper aliquot diebus, repetatur. Pro pon-a præscripti decoctum multichium cum pauillulo cinnamomi acutum & inter cibos cum vino remixtum. Ad uterum roborandum exterius com-mendavi suffumigia ex sandaracæ, masticæ, benzoe & cinnabari vulgari confecta, sæpiusque inguinali regioni imponendis suavi sacculis her-bis nervinis repletos & ex vino rubro coctos; interne vero eodem fine balsamum nostrum vitæ cum tinctura tartari aequali portione remix-tum cum infuso theiformi mane exhibere jussi. Quæ methodus, subjuncto simul accuratiori vitæ regimine, opem attulit exoptatissimam.

OBSERVATIO VI.

Generosa fœmina, xx. & aliquot annorum, *Fluxor al-
bus à la-
borioso
purno.* temperamento prædita cholericomelancholico, cui à primis pubertatis annis menses fluxerunt parviores & decolores, ante dimidium fere an-ni circa menstruum periodum sat copioso muci albi ex muliebris vezatur profluvio; unde mille malorum circa id temporis origo. Nam sub-inde gravis capitis dolor affligit & exquisitum refrigerationis sensum, *als voren ein Stuck Eis auf den Kopf läge*, inducit. Flatus hypochon-dria moleste dissendunt, alvus est adstricta, urina succedit pallida, transpiratio fere nulla est, & circa vespertam horror invadit febrilis: extrema frigent, appetitus languet omneque artus lassitudo & gravitas occupat. Ad expugnandam hæc mala varia ægrotans adhibuit remedia, quæ ta-men, neglecto vitæ regimine, parum vel nihil attulerunt levaminis. Ego igitur consultus primo omnium accuratam dietam injunxi, & ut ægra à cibis crassioribus, quos in deliciis habebat, ie-dulo abstineat, jusculisque utatur tenuioribus cum radice cichorei, petroselinii, asparagi, graminis &c. decoctis; ad meliorem autem digestio-nem promovendam obtuli elixirium nostrum viscerales inter cibos adsumendum. Dein ad pri-mas vias à crudisatibus & sordibus repurgandas, statusque discutiendos chylotheses emollientes & car-minativos crebrius ano injici, & pilulas balsami-cas ad *Becheri* mentem confectas, ter in septima-na circa decubitum adsumere jussi. Post harum usum sequenti die mane præscripti pulverem ex lapidibus canerorum, nitro depurato, tartaro vitriolato, solutione oculorum cancri componen-dum, desuper bibendo vascula quædam infusi theiformis ex mellisa turcica & citri corticibus confati. Postus loco ordinavi fontem Selteranum cum tertia parte vini Rhenani remixtum, & circa instans mensium tempus pilulas balsami-cas reiterare imperavi. Exterius succurrendum duxi suffumigiis, & sacculis roborantibus ingui-nali regioni applicandis, nec non venæ sectione ter in anno celebranda.

Epiergisi.

Epigris.

Sistit hic casus fluorem album cum adfectu hypochondriaco-hysterico complicatum, de quo copiosus flatuum in abdomine proventus, pertinax alvi obstructio, ciborum fastidium, excrementorum refrigeratio, totius corporis languor, crebriores capitis dolores cum horrore febrili abunde satis testantur. Originem suam singula hæc mala mutuari videntur à mensium fluxu valde inordinato, & quoad colorem vitiatu, cui in ordinem redigendo omnis impendendus est medentis labor. Docemur præterea ex hac morbi historia, quantum interfit, ut Medicus conveniens vitæ vietasque regimen præscribat, ita prorsus, ut hoc neglecto, frustranea sit omnis reliqua vel pretiosissima medicina.

Plura hinc inde legantur in *Consult. & responsis nostris medicinal.*

CAPUT XVII.

De gonorrhœa benigna & virulenta.

THESES PATHOLOGICÆ.

§. I.

Gonorrhœa definitio.

Intet morbos ex atonia partium solidarum oriundos, referri adhuc jure meritoque debet gonorrhœa, quæ nihil aliud est, nisi involuntarium feminis & liquoris femini analogi ex genitalibus fillicidium, à nimia vasorum semen adservantium partiumque adjacentium glandularum laxitate dependens.

§. II.

Differencia a pollutione.

Differt gonorrhœa à pollutione, in qua per intervalla vel breviora vel longiora modo feminis puri, modo cum sero chyloso mixti notabilis, ad unam vel duas drachmas accedens quantitas noctu cum insomniis venereis & voluptate, interdum ex pulchritudine foeminarum adpectu, vel post equitationem, ob nimiam vesicularum seminalium vel glandularum proflatarum laxitatem lenemque irritationem simul & semel ejicitur.

§. III.

Species est vel benigna vel virulenta.

Gonorrhœa est vel benigna, vel maligna. Hæc dicitur, si cum ardore, colore vario & exulceratione liquidum guttatum prodit, & plerumque in cacochymicis, scorbuticis, vel etiam calculosis cum emissionem urinæ dolorifica, ob acrimoniam, est conjunctum. Illa vero, seu benigna adesse dicitur, quando sine dolore, ardore, aut excoitatione liquidi equaliter tincti & albicantis sit profluvium. Atque hæc species cum fluore albo mulierum, magnam alit convenientiam, utpote qui iidem nihil aliud est, quam materiam chylisæ, ope glandulose substantiæ uterini sequestratæ excretio. Quam in rem legi meretur MASSARIUS, qui lib. IV. p. 267. ego, inquit, sentio, Medicos frequenter hallucinari, qui opinantur, ægras profusione feminis laborare, cum magis aliorum excrementorum fluxione laborant.

Frd. Hoffmanni Oper. Tom. III.

borent. Siquidem videmus plurimis ægrotis hoc profluvium multas annos perdurare, ex quo, profusente semine, necessarium foret, illas ad extremam maciem & corporis consumtionem deduci, si eum illis solet contingere, qui immoderate coitus utuntur, quod tamen non videmus illis evenire.

§. IV.

At vero, non modo ea gonorrhœæ species, de qua MASSARIUS sermo est, diutius protrahitur, sed & de reliquis plura notata digna existant exempla eorum, qui per multos annos utroque genitalium fluore laborarunt, Vid. BARTHOLINUS historia 36. cent. II. ubi de viro Bergauesi, & Anat. lib. I. cap. XXIII. p. 234. de Barattino mentionem facit, quorum ille per decem, hic per triginta annos gonorrhœam sustinuerat, ille virulentam, hic incertam, an benignam vel malignam. Manserat uterque cætera sanus, nisi quod prior ossibus vix hæretet.

§. V.

Datur etiam gonorrhœa virulenta, quæ à contagio venereo suis repetit natales, eosque potissimum adicit, qui turpissima libidine incensi scorta frequentant. Atque talis fluxus purulentæ varique coloris & consistentiæ materia, nec non summa virium imbecillitate se manifestat. Junguntur quoque, nisi cito occurratur, sat magni testium & glandularum inguinalium tumores, ulcera glandis & præputii inflammationis, & membri dolorifica incurvasio: quid? quod urina mingitur multis referta filamentis, quæ quasi vermiculos representant. Si ingravescit malum vel inveteraverit, vel minus rite tractatum fuerit, miasma alit per vasa lymphatica ad sanguinem & fluidum tenuissimum sanguinis inquinat; unde venereæ huius prodeunt indicia, qualia sunt lancinantes capitis artuumque dolores, noctu potissimum exacerbati, sacrum ulcera, ossium nasi extesio, pustulæ in glandulis cancri naturam amulantes, macies universi corporis cum faciei pallore, oculis concavis, topiis quoque & hujus generis alia.

§. VI.

Hæc sunt generalia, quæ malignum hunc fluxum comitantur & excipiunt symptomata, accuratorem tamen ejus historiam sequentibus tradere juvabit. Breve tempus post tam infelicem coitum fluxus leviter incipit, & dein tertio, quarto & sequentibus diebus ingravescit. Glans semine tenuiori incipit madere, postea alba quadam obducitur colluvie, & maculae in indusio reperiuntur. Inter initia color materiæ profluentis est albicans, qui, si fluxus paulatim largior emanat, in flavum, & demum in viridem mutatur. Quando urina emittitur, primo in glande, tum in radice urethæ, demum per totum canalem dolor percipitur ardens & sese intolerabilis. Interdum continuis urget mingendi conatus, interdum mictio valde impeditur, & pene supprimitur, sine dubio ob molestissimam penis tensionem, quæ nocte ut plurimum cum magno cruciatu & duritie ingravescit, & tanta est, ut penis exinde incurvetur. Præterea insignis ad venerem est stimulus, ut vix à coitu sibi laborantes temperare possint, & ulcera quoque,

Historia venereæ descriptio.

Hb 45

ut supra dictum est, non raro in glande & præputio latitant foedissima.

§. VII.

Uteri gonorrhœa viridis.

Quod sedem adfectum attinge, audiamus, quid de ea sentiant auctores. GRAEVIUS in tractatu de virorum organo generationi dicatis, ipsam in prostatico collocandam existimat. VESALIUS lib. V. anat. cap. 21. de suspensio quodam & Paravi dissecto, qui ante suspensum involuntario feminis fluxu laboraverat, refert, habuisse cum omnes meatus, atque eos potissimum, qui ex testibus in deferentis semen vas revolutiones pertingunt, apertos ac valde laxos, ideoque hos ipsos accusandos putat. Nos tamen sat gravibus inductis rationibus statuimus, veram sedem in urethrae tunica, copiosis glandulis, à COWPERO & LITTMO detectis obita, esse reponendam; licet non negandum sit, si profundius malum, ut in gonorrhœa virulenta, proferat, prostaticas simul & vesiculas feminales contagio addici. Id quod abunde satis testantur anatomicae sectiones eorum, qui per vitam suam tali fluxu diutius laborarunt. In his enim prostaticas callosas, scirrhosas & exulceratas nonnunquam fuisse observatas abunde constat.

§. VIII.

Uteri malitiosa.

In feminis infectis ulcuscula proveniunt in glandulo corpore, sive in eo loco, ubi lacunae circum & in meatu urinarii exitu collocantur, erumpunt. Testis est GRAEVIUS in tractatu de mulierum organo generationi dicatis, qui in cadavere mulieris hoc vitio inquinatae dissecto, corpus glandulosum, sive prostaticas urethrae circumpositas, utero ejusque vagina innoxias, male adfectas offendit. Et hinc patet ratio, quare feminae, ut multa testantur exempla, sortum in utero parere possint infantem & tali labe peritum non infectum. Aliter tamen sentit PALMARIUS, qui in libro de lue venerea cap. IX. vesicæ collum adducit, ideo, quod ex ulcere cervicis vesicæ, à gonorrhœa curata residuo per totam vitam purulenta stillaverit materia, parum ab ea dissimilis, quæ in diuturna gonorrhœa à prostaticis ex urethra fieri solet. Cæterum notandum est, in mulieribus hoc malum non ita fervire ac in viris, siquidem feminas infectas diu vivere sinis, cum viros contra, nisi curetur, ad lethum ducat.

§. IX.

Causa gonorrhœa virulenta & ejus symptomatica.

Causa gonorrhœa virulenta utique est mixta, ex impuro coitu cum femina vel gonorrhœa maligna, vel lue venerea infecta ad viri genitalia, & postea per poros ad lympham vel liquorem seminale tranalatum, cujus crasin mixturemque naturalem plane destruit & dissolvit, partim causticam ac erodemem, partim putredinosam indolem inducendo, unde dolores, ardores, tumores, inflammationes & exulcerationes genitalium suam mutantur originem. Nam ita sepe procedit hujus misfmatu multiplicatio, ut ab initio tantummodo glans inficiatur, dum contagium per poros apertos in coitu se infinuat, dein, nisi accomodata succurritur medicina, ad urethrae glandulas, tum ad prostaticas porosas, demum ad ipsas vesiculas proferat feminales. Si lymphæ infecta per lymphaticas vasa, quæ COWPERUS à præputio ad inguina abeuntia demon-

stravit, glandulis communicatur inguinalibus, tum bubo fit venereus, sive tumor durus lenius sensimque indolens: si vero gonorrhœa profundior est, & circa initium urethrae, ubi feminales vesiculae semen effundere solent, inflammatio oritur, tum hæc vascula à tumore comprimuntur, & semen ad hæc vesiculas deduci nequit; unde testium tumor.

§. X.

In causa gonorrhœa benignæ assignanda, tum ipsius genitalis liquidi, tum vasorum seminalium toni, qui plerumque dejectus est, habenda est ratio. Et primo quidem, quod semen atinet, attentiori observatione cognitum perspicuumque habemus, vel ob nimiam ejus abundantiam in subjectis plenis & in coelestibus laute viventibus, vel ob ejus acrimoniam in subjectis cacochymicis, scorbuticis & arthriticis hunc fluxum non raro contingere. Deinceps, si ad labefactum organorum seminalium tonum respiciamus, hanc unque à nemine in dubium vocari arbitror; siquidem ea omnia, quæ insignem hæc vasa debilitandi potentiam obtinent momenta, quorum potissima sunt nimia seminis, sive per pollutiones, sive per crebriores coitus, vel sordam manulaprationem & gonorrhœam virulentam prægressam professiones, ad gonorrhœam benignam etiam valde disponent, ideoque eo magis in hominibus, qui temperantem sunt & phlegmatici & natura debiliores.

§. XI.

Progrediendum nunc est ad suppedinandam gonorrhœam tam virulentam quam benignam prognosin. Utraque, si convenientibus tractatur remediis, brevi tollitur; cum contra, si invalefecit & gravioribus stipatur symptomatibus, difficilior sanetur, & non modo viros reddit steriles, sed & progressu temporis ad cachexiam & hælicam tabem laborantes ducat. Speciatim vero de virulenta ita scire licet: quo major est infectionis gradus, eo gravior quoque illa est & rebellior; raro tamen luen venereum post se trahit, nisi incongrue per medicamenta sudorifera & adstringentia vel externe vel interne adhibita fluxus cohibeatur. Hoc enim suppressio mox bubones, scrofi & testiculorum tumores, carunculae urethrae obdenses, & alia pessima symptomata cum ipsa venerea lue superveniunt. Ipse fluxus quo facilius procedit, eo mitiora sunt symptomata: pessimum contra est, si parce nimis exstillas, & urina cum summo fœtore mingitur flavescens & viridis. Denique inter certa mitigati & in melius conversi mali signa rescriamus, si dolorifica membri erecti constrictio & exquisitissima sub mictione ardoris sensus in urethra minuitur, depressus antea vigor redire incipit, & ipsa facies antea pallida vividior redditur. Curatæ vero gonorrhœa indicium est, si liquoris limpidi ac tenuis, albumen ovi referentis una alterave guttula compressione penis evocatur. Gonorrhœa benigna sicut plerumque diutius protrahitur, medentemque multum facessit negotiis; ita eo magis medicinæ resistit, si, ut sæpiissime evenire solet, gonorrhœam virulentam excipit. Differt tamen peninde ac homines differunt, quos iuvat, ita e.g. eos longe diutius vexat, qui temperamento sunt phlegmatico, & catarrhalibus deflexionibus, alvique fluxibus in puericia fuerunt obnoxii. Hi enim

Causa gonorrhœa benigna.

Prognosis virulenta gonorrhœa.

Cap. XVII. De gonorrhœa benigna &c. 359

enim dum natura fibras obtineat laxiores, judicari facillimum est, si qua parte atonia laborant, hanc longe esse graviores, quam quidem in ista, qui fibris robustioribus sunt præditi.

CURATIO.

§. I.

Causa diffi-
cilio for-
matur
gravior
irregue.

Quum gonorrhœa tam benigna quam viru-
lenta ratione causarum valde inter se differant,
differrentem quoque postulant medendi metho-
dum. Utramque igitur sortium expendamus,
ordiendo à curatione benignæ. Hanc autem ad-
modum esse arduam & laboriosam, in progno-
si jam ostendimus: neque nos aliam hujus diffi-
cultatis causam agnoscimus, quam quod in hoc
morbo ad partes adfectas nimis debilitatas & à
tono suo dejectas, maxime in subjectis magna
præviore succorum colluvie scitentibus & dys-
crasia scorbutica infectis, non secus quam ad
foeticulum ex universo corpore humorum im-
purorum fiat adfluxus. Accedit adhuc, quod
generationsi intervenient partes, quæ in nostro
adfectu morbose adfiguntur, ex meris fere ner-
vis nervosisque tunicis sint constatae, ad quas re-
mediorum energia, experientia teste, penetrat
difficillime.

§. II.

Indicatio-
ni curati-
onæ.

Abolvitur autem pertinacis hujus mali cu-
ratio his fere indicationibus. Primo opus est,
ut convenientibus laxantibus copia impuri feri,
si in corpore abundat, evacuetur, & à parte
adfecta deriveret. Dein ut partes nimis relaxa-
te & flaccidæ accommodatis tam internis
quam externis roborantibus medicamentis con-
fortentur.

§. III.

Primum
modum at-
tem, ex-
plicat la-
xantia.

Primæ indicationi satisfaciant, quæ per epi-
cram operantur laxantia: quo nomine com-
mendari merentur pilule balsamicae Becheri, &
ad ejus mentem consecræ Stablii & nostræ, quæ
non modo alvum ducendi, sed & egregie robo-
randi possunt efficaciam. Præterea utilissimum
saepè deprehendi insulsum laxans, ex sequenti-
bus speciebus compositum. Recipe *rhabarbari*
Alexandrinii unciam unam, radicis vinetoxici,
pimpinellæ, rasura ligni salsastræ ana unciam di-
midiam, foliorum fenugræci, agarici trochiscati, fi-
brarum hellebori nigri singulorum drachmas tres,
cardamomi, cinnamomi, ana drachmas duas,
passularum minorum uncias tres, tartari crudi
unciam dimidiam. M. C. C. D. S. Species, cum
duabus vini Rhenani mensuris infundenda. Dosis
sit quarta part mensura.

§. IV.

Quæ alve-
ni radica-
tionem satis-
faciant.

Huic infuso per octo dierum spatium mane
adsumto, ad expellendam alteram indicationem,
subjungendus est pulvis hic utilissimus: recipe
ossis sepia unciam unam, coralliorum rubrorum,
succini, specierum de lyciis, corticis chae-
erillæ ana drachmas duas. M. F. pulvis, cujus
dosis ad drachmam unam mane & circa noctem
eum decocto cremoris bordi amygdalino sumi po-
test. Eodem quoque tempore exteriori regioni
pubis & perinæ, maxime per noctem adplicandæ
suadeo sequens epithema: recipe herba melissæ,

Frid. Hoffmanni Oper. Tom. III.

mentha, basilici, storum rosarum rubrarum, ba-
lauriorum ana manipulum, corticis gramastrum,
caryophyllorum, nucis, cardamomi, mastichis
ana unciam dimidiam. M. F. species, quæ succula
inclusa in vino Gallico rubro coquenda.

§. V.

Cum his invicem conjungendum est accurata-
tum regimen dieteticum, quod ita debet insti-
tui. Primo omnium abstinendum est ab omni-
bus cibis valde piperatis, aromaticis, salitis, le-
guminosis & infantilibus, nec non ab immoder-
ationi vini & cerevisiæ pota. Evitetur quo-
que frequentior cum seminiore sexu conversatio,
evitetur veneris exercitium & fortior corporis
motus, præsertim qui curru fit vel equo. E
contrario vero inter cibos commendanda sunt
juscula avenacea cum vitello ovi, amygdalis &
pistacciis preparata & in emulsionem reducta,
quorum magna est ad acrimoniam lymphæ fal-
sæ demulcendam efficacia. Convenit quoque
pro potu adsumere serum lactis dulces, vel de-
coctum ex radice scorzonæ, chire, sanslo ru-
breo, rasura ligni salsastræ, glycynhizæ & passu-
lis constatum.

§. VI.

Quod si hæc minus sufficiunt, ego ad ma-
lum, præsertim inveteratum tollendum, post
horum usum cum fructu hæcenus commendare
solitus sum balnea ex speciebus nervinis & robo-
rantibus composita, quales sunt abrotanum, ma-
jorana, mentha, hyssopus, origanum, serpil-
lum, rosmarinum & hujus cæsus alia. Post
balneum aeger lecto se committat, lenem expe-
ctando sudorem. Nec sine auspicio successu ali-
quoties ulus sum fontibus Lauchladensibus, bal-
nei loco per aliquot septimanas adhibitis, upose
quæ propter tenuissimum, quem in sinu sovent,
maris crocum insignem relaxatas partes robo-
randi possident virtutem.

§. VII.

Eadem curandi methodus locum invenit ap-
pissimum in largioribus & valde debilitatis
pollutionibus cohibendis, modo hæc observetur
cautio, quod purgantia rarius ostendantur, siqui-
dem, si alvum modicis opus est, sola rhabar-
barina & passulata sufficiunt. Præter allata ve-
ro remedia in tali casu externe regioni lumbari,
seu potius spinæ dorsali circa lumbos adplican-
dum huic sequens emplastrum: recipe *empla-*
stri spermatis ranarum uncias duas, sacchari sa-
turni, aluminis usi ana drachmas duas, campho-
re, olei ligni Rhodii ana drachmam dimidiam.
M. D. Porro quoque singulare plane effectum
in pertinaci hoc morbo annotavi à convenienti
balneorum frigidorum usu, modo corpus probe
prius fuerit præparatum, nec plethora, cacochy-
mia aut nimia virium dejectione adfuit, quæ id
prohibeant. Bis autem in die, mane & hora quarta
vespertina infusus fieri potest per horæ dimi-
dium in aquam puram fluviantem, vel, quod
melius est, in Lauchladensem, quo peracto in
lectum paulisper calefactum se recipere & ali-
quot infusi theiformis vascula bibere juvabit. Et
mirum profecto est, quomodo non modo totum
corpus inde roboretur, sed & transpiratione in-
terdum ad sudorem usque aucta, optime humo-
rum à parte affecta fiat derivatio.

H h 2

§. VIII.

§. VIII.

Indicatio-
nis curan-
da gonor-
rhea com-
munis.

Quod ad gonorrhœæ virulentæ medendi metho-
dum attinet, hæc ipsa quidem in principio,
si rite instituitur, non adeo difficilis est. Quod
si vero malum, uti sæpius evenit, ab empi-
ricis chirurgis perversa methodo per adstringen-
tia tractatum, curandum nobis traditur, mag-
no labore multoque negotio opus est, ita pro-
fus, ut luem universalem, quam ralem fluxum
radicibus extirpare facilius sit. Genuina autem
gravem hunc adfectum sanandi ratio, me iudice,
in eo versatur, ut primo omnium susceptum
in genitalia virus venereum, quod partim acris
causticæ, partim putredinosæ indolis est, e corpi-
ore è corpore expellatur. Dein, quando jam à
virulenta materia relaxatæ, erosæ vel ulceratæ
fuerint, semini tam conservando quam excernendo
dicatæ partes, mundificentur, consolidentur
& roborentur, adeoque liberior humorum adflu-
xus præparatur.

§. IX.

Quædam
prostat
causa im-
puræ ad
profluvi-
um malæ.

Quum itaque primum & præcipuum medea-
tis negotium eo dirigi debeat, ut qua fieri potest,
celeritate veneni intrinsecus suscepti expulsi-
one corpus ab effectibus perniciosius præservetur, con-
sultum omnino arbitror, mox primis à suscepto
& contagioso coitu diebus alexipharmacum cum
sudorifero regimine exhibere: quo scopo com-
mendari meretur essentia ex spiritu Cornu Cervi,
succini & essentia bezoardica aequali portione
constata, quæ singulis diebus mane ad sexaginta
gustulas cum infuso scordii, scabiosæ & gale-
gæ potest sumi, expectando postea per horam
in lecto sudorem. Neque minorem pollicetur
fructum pulvis diaphoreticus ita componendus,
recipe pulveris bezoardici Anglicani vel nostri
drachmas duas, bezoardici mineralis, reguli anti-
monii medicinalis ana drachmam dividiam, ni-
stri grana quædecim, camphora grana quatuor. M.
F. pulvis, dividatur in VI. doses, quarum una
circa somni tempus per tres quatuorve dies capia-
tur. Exteriori vero ad discutiendum insidens ge-
nitalibus virus commendare soleo aquam d'ar-
quebuseade cum essentia succini & spiritu vini
camphorato vigoratam, in qua linteum macera-
tum tepide membro, regioni pubis ac perineæ,
etiam sub ipsa diaphoresi potest applicari.

§. X.

Cautio
gonorrhœæ
per par-
tione.

Quod si vero jam altius venenum radices ege-
rit, sequæ inimicus insinuando, involuntarium se-
minis fluxum cum ardore, dolore & exulcera-
tione effecerit, præcipuum esse debet labor, ut ejici-
atur, consiliumque per appropriata & tam materie
virulentæ correctioni, quam extirpationi dicata
remedia ab impuris sordibus liberetur. Atque
horum remedium censum recte subeunt pur-
gantia, quorum primum ingrediens esse debet
mercurius dulcis, qui peculiaris & specifica sua,
qua pollet, virtute in acrimonia ulcerosa caustica
temperanda, evacuanda & viscositate resolu-
enda, reliquis omnibus palmam reddit dubiam.
Optime autem cum extracto rhabarbari, & in
subjecta ferrosioribus cum extracto panchyma-
gogi *Crostiti* aequali portione remisceri æque in
pilularem formam cum balismo de Copaiva vel
Peruviano potest redigi, dando pro dosi alter-

nis diebus scrupulum unum vel drachmam di-
midiam, donec ardor immineatur, materie-
que profusius subflavus & viridescens color
reminat. Eodem fine eximiam merentur lau-
dem, quæ sequuntur pilulæ: *recipe gummi am-*
moniaci depurati, sagapeni, extracti bellidori
nigri, trochischorum albandal, mercurii dulcis,
resine ligni guajaci, balsami de Copaiva, sin-
gulorum drachmam unam. M. F. l. a. pilule ex
scrupulo uno no. xx. quæ per tres dies mane,
vel circa noctem passim deglutiri. Tum per bi-
nos dies, maxime in subjecta phlegmaticis alexi-
pharmaca superius memorata, ea, quæ diximus,
methodo exhibere, postea rursus per triduum pi-
lulas adsumere & sudorem movere, idque tercia
vice repetere juvabit.

§. XI.

Post sufficientem impurorum humorum è cor-
pore evacuationem remedia subiungi debent,
quæ blanda balsamica virtute exsiccant, consoli-
dant, & nimis relaxatas feminæ partes robo-
rando, fluxum cohibent. Hæc inter jure suo ac
merito referri merentur terebinthina cocta, mas-
silia, succinum, myrrha, opobalsamum, rhabar-
barum, bolus armena, antimonium diaphoreticu-
cum, terra catechu, hamatites, & antimonium
martiale cachecticum, quæ invicem in formam
pilularum secundum artem præcepta possunt redigi.
Instar autem omnium esse poterit hæc formula,
quæ ego hætenus insigni cum fructu uti con-
suevi: *recipe terebinthina Veneta, succini, massi-*
chis, extracti rhabarbari, castorei ana drach-
mas duas, balsami de Copaiva, resine ligni gu-
ajaci ana drachmam unam. M. F. ex drachma di-
midia pilule no. xx. quæ per decem pluresve dies
circa noctem cum emulsione semper ana sumantur,
superbibendo postero die mane infusum theiforme
ex veronica, mentha, melissa, millefolio & consoli-
da sacracena confusum, vel etiam decoctum,
cupus ingreditur sit radix chinæ, sarsaparillæ,
glycyrrhizæ, cichorei & antimonium crudum in
petra ligatum. Nec excludenda hoc loco venit
mixture, quæ ad fluxum feminalem modcran-
dum & compescendum præstantissimæ est virtu-
tis, & ita componitur: recipe tinctura antimonii
acris, essentia ligni guajaci, succini, ligni aloes
ana unciam unam, tinctura beneditidii seu li-
quoris martialis, qui ex capite mortuo florum sa-
lis ammoniaci martialium paratur, drachmam
unam. M. & si inde essentia nigricantis coloris,
quæ pari ratione, alio prius sufficienter expurga-
ta, his in die ad XL. guttas sumi potest.

§. XII.

Verum enim vero, nisi usum remedium in-
temoratum externis quoque secundemus, incassum
laborabimus. Hæc ipsa vero pro symptomatum
ratione longe differunt. Ita ad dolorem & ardo-
rem in genitalibus temperandum, vel etiam bubo-
nem, qui sæpe junctus, suppurandus, præclarissus
sunt cataplasmata, quæ ex speciebus demulcenti-
bus & emollientibus, ut radicibus liliorum alborum,
althææ, floribus chamomillæ, sambuci, verbasci,
semine sænu græci, cymini, anethi, hyoscyami
&c. ex lacte vel decocto avenaceo coctis
possunt parari calideque crebrius imponi. Ad
exulceratas urethre partes mundificandas & re-
laxatas roborandas summe utilitatis sunt in-
jectiones ex mercurii dulcis drachmis duabus in

Per hanc
mixturam
ad
dissolu-
tionem
genuæExterna
remedia
sunt

infusi theiformis saturati libra dimidia ad horæ quadrantem decoquenda. Quod si vero magna est erosio, hac cum melle despumato, addito decocto myrrhæ ex aqua, ope siphonis injectur utilissime.

§. XIII.

Diana con-
suetudo.

Ultimo loco multum quoque interest, ut Medicus rectam & accommodatam vivendi rationem præscribat, atque ægros imprimis à cibis aromaticis, duris & nimis nutritivis, nec non à cerevisiæ & vini potu, vehementiori corporis exercitatione, animi adflectibus & mulierum consortio abstinere jubeat; alioquin malum adhuc præsens non modo difficulter evellitur, verum etiam, si curationem jam receperit, ex facili recidit. Inter cibos itaque jucula tenuiora cum endivia, acetosa, lactuca & cichoreo alterata, & pro potu ordinario decoctum glycyrrhizæ cum hordeo, vel serum lactis commendare juvabit. Nec laude sua carent emulsiones ex amygdalis dulcibus, feminibus 1v. frigidis majoribus, & papavere albo cum decocto Cornu Cervi diluto confectæ & pro potu adsumptæ, quibus commodissime adduntur nitrum purificatum nec non pulveres leniter diaphoretici ex Cornu Cervi us- to, animonio diaphoretico sive cerussæ antimoni- parandis. Hac enim ratione acrimonia humo- rum temperatur, partiumque genitalium ardor & dolor, si urget, consopitur efficacissime.

CAUTELÆ ET OBSERVATIONES CLINICÆ.

§. I.

Cautela circa pur-
gationem.
Balsamica
& diuretica
in fluxu
hæmorrh.

In gonorrhœa benigna maxime omnium ac- criora purgantia & illa, quæ mercurialia ingre- diuntur, cautius sunt adhibenda, quod idem valet de balsamicis fortioribus & diureticis; si- quidem humores magis commovendo & ad par- tes genitales debilitatas appellendo, effluxum materiam augent. Multo vero magis hæc singula exulere in subiectis sanguineis & cholericis, qui- bus longe gravius nocent. Haud aliter sentien- dum est de adstringentibus, quæ nunquam sine præmissa sufficienti humorum correctione in usum debent vocari, nisi mali moris gonorrhœ- am, maxime in his, qui magna humorum impu- ritate sciant, proutare velimus.

§. II.

Cura V.
Sunt &
remedia per
medicam.

Venæ sectio & cura per inediam, quæ pota- viciusque tenui & exsiccante absolviunt, in ple- thorici pinguis & spongiosi habitus lauteque vi- ventibus inter morbi initia locum inveniunt ap- tissimum, cum contra, si fluxus disturnatur cor- pus debilitatum nimis fuerit, omni profectus de- beant; siquidem vires magis exhauriendo sæpe cachexiam, tabem dorsalem cum hæcica febre vel impotentiam visilem inducunt.

§. III.

Tempera-
mentorum
& humo-
rum mix-
tura
est in gon-
orrhœa
maligna.

In curanda gonorrhœa maligna attendere ma- xime Medicus debet ipsam ægrotantis constitu- tionem. Plurimum namque relet, num labo- rans complexionis sit cholericæ & sanguineæ aut phlegmaticæ, & an naturæ sit robustioris vel im-

becillis ac teneræ. Neque minus probe inquæ- re oportet, qualis humorum sit conditio. Hæc enim prout differit, variat quoque ratione syn- proptumatum adfectio. Ita si corpus offendant caco- chymicum & ex improba victus ratione vel alio glificente morbo ut scabie, purpura scorbutica, vel adfectu hypochondriaco detentum: tunc utioque deteriora curatuque difficiliora pertimescenda sunt symptomata.

§. IV.

Si calidioris sensibilibiorisque indolis homines perniciosi hæc fluxio corripit, ab omnibus cali- dioribus, purgantibus, sudoriferis, diureticis, decoctis lignorum, ut guajaci, acrioribus, es- sentis balsami Peruviani & opobalsami, maxi- me in principio fluxus, abstinere debemus. No- vi enim præpostero, & sine convenienti corporis præparatione, instituto illorum usu, visiosum humorem retentum, fluxumque suppressum, sed loco hujus bubones exciatis, & non modo circa genitalia, sed in facie quoque pustulas ulce- rosas pessimi moris excitatas.

Cautela circa res-
torationem
phlegmaticæ
naturæ.

§. V.

Qui legniorem & phlegmaticam obtinent tem- peraturam, in his, præmissa sufficienti corporis expurgatione, roborantibus & leniter spirituosos gonorrhœam incipientem perfecte curant & hostile virus expulsum merent. Atque hoc sine nonnunquam per aquam vitæ in parciore, sed sæ- pius repente, doct exhibitam potui licuit, qualis ita paratur: *recipe herbe menthe manipulos tres, terebinthina veneta unciam unam, balsami Peruviani unciam dimidiam, dissilientur cum vini Rhenani mensuris tribus. Dosis sit uncia una ad duas.* Cui etiam commode substituitur hæc for- mula: *recipe aqua rosarum, spiritus vini relligati ana mensuram dimidiam, julepi rosarum un- ciat duas, balsami nistri vitæ guttas L. M.*

Cura re-
stitutionem
phlegmaticæ
naturæ.

§. VI.

Quandiu materia profluens fetida est & sub- viridis, nunquam danda sunt adstringentia, nam ubi intempetive & nimis cito fluxus isdem sup- primitur, aut decocta lignorum validiora cum re- gimine sudorifero officuntur, venenum transiit in seminis & lymphæ massam, unde symptomata sua venereæ propria relinquit. At vero ex nullo prope adstringentia facultatis remedio major re- dundat noxa, quam à saccharo saturni interne, ut empiricorum mens est, sinistre oblato. Vici enim colicam convulsivam, appetitus prostrationem alvique perniciatissimam oblationem inde in- ductam. Idem quoque valet de injectionibus ad- stringentibus, quæ, nisi fluxus impuro correcto, nunquam debent adhiberi.

Cura ad-
stringentia.

§. VII.

Inter medicamenta urinæ fluxum promovendi pessime, ut arbitror, à quibusdam referuntur cantharides & parata ex iis essentia, siquidem viis urinariis admodum fluxu insensæ, facili- que perniciosas renem & vesicæ inflammationes cum micthi cruento, nisi convenientibus succurramus remediis, ciere valent.

Cura ad-
stringentia.

§. VIII.

Circulatio
Sectio.

Venz sectiones in curatione gonorrhœæ virulentæ raro exiguntur, & in sensibilibus, quibus facile materiae fordidae contingit suppressio, magis obliunt, quam profunt; atamen si corpus sanguine turget & juvenile est, ad mitiganda symptomata sine noxa concedi possunt.

§. IX.

Quid sit
curandum si
fluxus sit
per
ur.

A variis subinde causis evenit, ut materia parcius ex pene effluat, & mox pustulae in corpore hinc inde appareant. Tum vero loca affecta humectare, foris, balneis & cataplasmatibus relaxare, atque purgantibus materiam deorsum ducere consultum erit. Juvant quoque eodem sine injectione lactis dulcis, & decocti avenæ cum oleo amygdalarum dulcium remixti, à quibus ego fluxum sæpius iterumque revocatum scio.

§. X.

Gonorrhœa
invenitur
rara per
fistulam
anæ cura-
tionem, sed
per
ur.

Mirum certe est, quod gonorrhœa per fistulationem tolli non possit; crebrior enim usus & experientia suis docet, pessima venere ulcera, quæ in universo corpore radicantur, hac curatione fuisse sanata, sed gonorrhœam remansisse. Ex profecto molestissima hæc fluxio, si male tractata & inveterata fuerit, rarius ad frugem reducitur, sed per totam sæpe vitam laborantes comitatur. Latitant quippe nonnunquam in glandulis proflatis tam majoribus, quam minoribus scirrhosa & fistulosa ulcera, quæ radicibus tollere difficilissimum est. Nihil tamen minus aliquoties exoptatissimum repertum auxilium in usu thermarum Carolinarum interno, quæ, licet alias provide in gonorrhœa recenti sint usurpandæ, eo quod debiles partes magis relaxando, majorem materię adfluxum efficiunt; in inveterato tamen malo, dum insigni vaforum obstructions tollendi, diuque latentes, incarceratos & duros tumores resolvendi efficacia polent, cum fructu dari possunt. Sed ut minori quantitate, adhibitis simul in & post curam roborantibus balsamicis internalis & injectionibus, bibantur suadeo.

§. XI.

Quæ
sit
in
urethra
curatio
etiam
invenitur.

Quando urethra, cujus tunica media valde glandulosa, non modo exulcerata, sed & nimis relaxata est, & fungosæ substantiæ quidpiam adhæret, ex qua postea prodeunt urinam valde remorantes caruncule, solam essentiam opobalsami cum spiritu vini extractam, item balsimum nostrum viæ, cum tribus partibus *leau d'arquebuse* dilutum aliquoties de die fuso cum succellu injiciendum curavi. Enimvero tali injectione sit vehemens in membro excitatur ardor, qui tamen sensim paulatimque remittit. Speciatim vero de carunculis, quæ nonnisi species verrucarum sunt, tenendum arbitror, quod pulvere quodam erodente, aut ferro candente optime tollantur. Sed hæc operatio peritam postulat manum, ne forte tali ignito instrumento vicina pars lædatur.

§. XII.

Circulatio
per
ur.

Ad mundificanda glandis & penis ulcera fe-

quens epithema præstantia erit efficacia: *recipe aqua calcis viva cum aqua rosarum diluta unciis duas, leau d'arquebuse unciem unam, sacchari saturni grana decem, mercurii præcipitatis albi grana octo. M.* Contra ubi firmal consolidandi intentio est, balnearum sulphuris antimoniæ & terebinthinatum cum unguento digestivo remixtum commendari meretur.

§. XIII.

Bubones, si junguntur, quantum fieri potest emplastro emolliente *Agricola* cum oleo hyocyami & sapone malaxato sunt maturandi. Cui scopo etiam emplastrum *Herbette* saponatum & cum pauxillo oleo hyocyami subactum egregie interservit.

§. XIV.

Quando scrotum cum testiculis in magnum tumorem agitur, succurrendum est fomentis calidis, siue admisione vaporum ex decoctione herbarum & florum emollientium cum lacte facta prodeuntium: qua methodo tempelive adhibita tumor molliuit, ut dein emplastra resolventia majori cum emolumento adplicari possint.

ENARRATIONES MORBORUM.

OBSERVATIO I.

Flagitavit haud ita pridem opem meam vir xxx. annorum, temperamenti sanguineo-cholesterici, qui cum per crebras manipulationes magnam sibi contraxisset vaforum sensum atoniam, gonorrhœam incidit benignam, per quatuor annos sub alvinarum fordium excretionem lotique emissionem moleste infestantem. Ad sistendum hunc fluxum aliquoties sumit oleum terebinthinæ, unde fluxus quidem cessabat; tantum autem aberat, ut pristinum genitalibus robur & stimulus ad coitum resisteretur, ut potius hic penitus suppresseretur. Nec ullus per quadriennium remedium poterat revocari, usque tandem naturæ vigore cibique rupeptis pollutiones nocturnæ cum leni quodam stimulo & penis erectione redirent. Sed non multo post pristina ludebatur scena, & materia feminis analoga sub alvi & vesicæ exoneratione rursus è pene profluerebat, idque nunc per integros quinq; annos. Ego igitur consultus primo omnium fuisti, ut ager, leposita omni cerevisia, decoctum ex radice scorzonæ, chinæ, acetosæ, rasura ligni sanali rubri, flavi, aloës, lentifici &c. mane calidum, dein frigidum biberet, atque in victu carnes tantum illatas & ex his confecta tenuiora juncula adsumeret vinique rubri Gallici, Pontac dicti, haustum cum elixiri ex essentia corticum aurantium, infusura taraxi & pauxillo olei macis confusæ XL guttulis inter cibos caperet. Ad alvum apertam servandam commendavi mala Borsdorffensia cum passulis cocta & prunellas; ante decubitum vero pulverem obtuli sequentem: *rec. succini præparati drachmam unam, mirri præparati drachmam dimidiam, terra creta, corticis cassie illa ana grana duodecim. M. F. pulvis dividendus in doses IV.* Demum quoque regioni pubis per noctem calide imponendum fusi lacculum solis myrsidauri, Bonbus chamomillæ romanæ, rosarum, massicæ & succino repletos & ex vino rubro

coctos. Nec dubito, quin æger egregium inde percepturus sit levamen.

Epicrisis.

Intempestive in nostro casu adhiberetur fuit oleum terebinthinæ. Equidem tali remedio fluxus ad tempus sistitur, sed ex facili redit, ac sæpe graviora accedunt symptoma. In curatione rite instituta ego maxime omnium respexi ad ægrotantis naturam corporisque habitum, qui quum valde esset obesus, tenuiorem victum seu curam per inediandum præscribere consultum putavi. Nisi enim commode subtrahatur morbi pabulum, parum vel nihil proficitur. Posthæc vero eo annitendum duxi, ut partes feminales nimis relaxatæ & à tono suo dejectæ roborentur, id quod tutissime perficitur remediis tam internis, quam externis supra commemoratis.

OBSERVATIO II.

Vir xxx. annorum, constitutionis sanguineæ, habitu corporis spongioso præditus, post celebratum cum impura coitu, malignum feminis cum dolore, ardore ac molesta membri & perinatæ tensione junctum incidit profluvium. Chirurgus in consilium adhibitus essentiam balsami de Copaiva sat larga obtulit quantitate, indeque efficit, ut non modo copiosius materiz purulente cum sanguine mixtæ, sed & ipsius puri sanguinis ex urethra succederet stillicidium. In tali rerum statu venæ sectionem in manu administravi, & ad alvum ducendam pilulas ex extracto panchymagogo *Crollii* & mercurio dulci confectas adhibere jussit, quo fiebat, ut sanguinis quidem fluxus cessaret, urina vero semper sabulosa, & liquor ex genitalibus albicans per longum temporis spatium promanaret. Ego tandem consultus decoctum præscripti temperatius bibendum, & sacculos ex speciebus roborantibus nervinis repletos in vino rubro decoctos regioni pubis & perinatæ crebras applicare, & ad relaxatas partes roborandas balsamum nostrum vitæ cum tribus partibus *Teau d'arguebusade* dilutum incipere imperavi, tam felici eventu, ut brevi post relicta illa liquoris albicantis ex genitalibus fluxio evanesceret.

Epicrisis.

Sistit hæc casus gonorrhœam virulentam in benignam desinentem, uti quidem ex liquoris albi diu purulenti profluvio deprehendere licet. Difficulus admodum ejusmodi gonorrhœa simplex à maligna residua, si invaluit, curatur: quare ut tempestive Medicus manum auxiliatricem adferat necesse est. Cæterum taxari omnino meretur perversa Chirurgi in tractando hoc ægro methodus, dum ad virus venereum è corpore cito eliminandum inter initia morbi mox calidiora præbuit remedia, quibus, præsentem jam fluxum, nihil datur periculosius. Hac enim ratione virulenta materia in sanguinis & lymphæ massam invehitur, longoque subtilior redditur, ut facilius inde ad ipsam lucem veneream fiat transitus.

OBSERVATIO III.

Vir L. annorum, temperamenti choleric-

melancholici, in primis juventutis annis gonorrhœa laboravit virulenta, quæ aliquoties sisti, iterumque recruduit. Aliquando tamen mercurialibus & terebinthinaceis prius fuit sublata, sed aliquod tempus post in utroque inguinum latere prodierunt bubones. His iterum intra tres menses sublaris in cervicæ, cubitorum articulis, & in ani ossisque sacri confinis effloruerunt maculæ lividæ & squamosæ, quæ, accedente calore, intolerabilem excitant pruritus & ardorem. Petiit itaque Carolina, easque balnei loco adhibuit, sed inde in gonorrhœam incidit simplicem, tam pertinacem, ut nullis hæcenus remediis tolli poterit; siquidem à mioribus injectionibus materia profluvium redditæ est sordidior, à fortioribus copiosior & sanguinolenta. Post varia adhibita remedia fluxus quidem renasit, sed brevi temporis spatio iterum rediit, denique fuit expugnatus. A quo tempore mox in inguine æger dolorem percepit tractorum & pressuræ, cui se associavit febricula interperies & simul cum urina, quæ plerumque cum ardente dolore redditur, alba viscidæque materia prolucitur; majori tamen quantitate, si corpus movet, quam si in quiete continet.

Epicrisis.

Ex præfata morbi historia plura in usum nostrum depromere possumus.

1. Perquam notari dignum est, quod fluxus seminalis crebriores patiatur recidivas, ita prorsus, ut exactis aliquot annis reverti possit. Ratio inde petenda venit, quod rarius proli dolor hoc vitium radice tollatur, sed ante convenientem evacuationem sanguinique depurationem adstringentibus tractetur. Qua methodo fluxus quidem ad tempus compescitur, sed materia vitiosa circa loca adfecta intus retineatur, unde novi mali fomes perpetuo in corpore latitat.

2) Accedit, quod in nonnullis subiectis gonorrhœa perperam curata partium feminis secretioni vacantium magnam possit se relinquat infirmitatem, quæ postea facile ab impurorum humorum copia, à balneis nimenique refrigerantibus, vel corpus humectantibus & alio modo debilitantibus, imo ex morbo vel ætate invalescit, ut hinc ejusmodi involuntarius feminis profluvium vel in extrema etiam ætate non raro contingat.

3) Non dubitandum, quin in nostro hoc casu crebriores injectiones, sicuti omnia topica imprudenter applicata, fuerint perniciosissima. Exterum prius per convenientia interna remedia humorum vitiosorum correctioni, evacuationi & à loco affecto derivationi prospicere debet Medicus, quam ad externa progreditur; alioquin damnum inferet vix ulla medicina reparabile.

OBSERVATIO IV.

Qui xx. annos habet juvenis generosus ex impuro coitu sibi saniosum ex genitalibus contraxit profluvium, ad quod abigendum Chirurgum consuluit, qui præter purgantia saturnina, ut tinctura antiphthastica *Grammæ* & pulvere quodam ex coralliis, osse sepis, succino, terra sigillata & magisterio saturni composito fluxum

Ex gonorrhœa sistitur male tractata symptoma

com-

Gonorrhœa virulenta in benignam rediit.

Gonorrhœa virulenta

compescere tentavit; & subleuit quoque, sed mox æger accubillimis adligebatur ventris torminibus, ut humi serpere, & corpus miris subinde modis torquere cogere; alvus simul erat constrictissima & perpetua, sed irritus ad vomendum conatus. Intermittebant quidem singula hæc mala per aliquot horas, sed statim quasi periodis eadem vehementia revertebatur. Ego igitur in consilium adicius, clysteres infundere iussi mere oleosos, ægrum in balneum descendere & somenta abdomini applicare lausi. Interius vero decoctum mannarum & rhabarbarinum cum oleo amygdalarum dulcium per vices adsumendum obtuli. Alvo sic aperta, flatibus discussis, ingenuique fundum expurgata copia, singula quidem remittebant symptomata, sed, quod memorabile est, molestus feminis fluxus redibat.

Epierysis.

1) Saevissima illa, quæ enumeravimus symptomata non aliunde arcescenda sunt, quam à temerario medicamentorum saturinorum usu, quorum tanta vis est ac vehementia, ut teneras ventriculi & intestinorum membranas nervosa spassice crispando ac constringendo, motum & tonum peristalticum plane invertant, adeoque efficiant, ut sanguis intra sensibiles intestinorum tunicas subsistens rosiones, inflammationes & spasmos concitet atrocissimos.

2) Illud adhuc notandum venit, quod sedatis istis intestinorum spasmis, alvoque resecta, feminis profluvium redeat, aperto indicio, per consensum quasi & sola generis nervosi constrictione talem fluxum antea fuisse cohibitum.

OBSERVATIO V.

Cœnoidis loco adhuc commemorare placet, quod non raro melaena venereum, nisi tempestive avertatur, ipsam vesicam afficiat ejulque tunicas internas atrodendo, non modo dolorem & spasmus inibi exciet intolerabilem fere, sed & dysuriam inducat, unde urina cum copioso sedimento purulento, quod in fundo conspicitur, emittitur. Neque remes omnino sunt immunes, sed quandoque magnam contrahunt labem, ut chylosa & nutritia materia simul cum urina fecernatur; & si incrementa sumit talis exulceratio, febris accedit lenta & hecica, dolor capitis artuumque exquisitissimus, virium jactura, vigilia & ipsa denique mors. Quod si vero incidunt hæc mala, tuta & utilissima deprehendi primo infusa herbarum vulneraria, qualia ex veronica, agrimonia, urtica mortua, mentha, melissa, floribus hyperici, sicubus &c. optime conficiuntur. Dein pro potu præscripti decocta temperiora & quandoque tincturam tartari vel antimonii minus acrem cum balsamo de Copaiva permixtam, nec non pulveres ex osse sepia, semine lycopodii, corallii & aliquot neri purificati & cinnabaris granis compositos cum emulsione seminum xv. frigidorum obtuli. Nec demum omitendas duxi injectiones, quæ ex aqua d'arquebuse cum aqua calcis vivæ, plantaginis, spermatidis ranarum optime conficiuntur. Omnium tamen remedium vires longissime superant aquæ Spadana, jam olim ab HENR. AB HEER in tali casu valde commendatæ, si per aliquod tempus cum debito regimine adhibeantur.

Plures notabiles observationes occurrunt in Consult. medicinal. Sect. III. casu XLIV. usque 411.



FRIDERICI
HOFFMANNI
MEDICINÆ
RATIONALIS SYSTEMATICÆ,
TOMI QUARTI,
QUO
SPECIALIS MORBORUM PATHOLOGIA,
& huic superstructa solida Therapia,
CUM MEDENDI METHODO,
CAUTELIS CLINICIS, ET MORBORUM
ENARRATIONIBUS, ADJUNCTA EPICRISI, EXHIBENTUR.
PARS QUINTA,
DOCTRINAM MORBORUM AC VITIORUM EXTERNAS
potissimum partes affligentium perspicua & demonstrativa methodo tradens.



PRÆFATIO.

EN! exhibeo jam Tibi, B. L. octavum medicinæ systematicæ tomum, in quo vitiis externam corporis superficiem adligentium rationalem pathologiam, solidamque huic superstructam therapiam ex genuinis principis medico-chirurgicis perspicue traditam invenies. Nam mihi cum prudentioribus omnis ævi Medicis rata semper ac firma fuit sententia, nobilissimam eamque vetustissimam artis salutaris partem, quæ chirurgica nominatur & saluberrima externis humani corporis languoribus medendi præcepta tradit, Medico cum laude res suas peragenti scitu esse summe necessariam, sine cujus notitia neminem puto vel satis occurrere, vel rite mederi omnibus morbis posse. Equidem non ignoro, & olim fuisse, & adhuc esse ex Medicis plurimos, qui, artem illam, quæ manu sanatur, remediumque externorum pro vario scopo applicationem docet, ad disciplinam medicam directe pertinere negant; at vero hi certe non intelligunt, totum hominem tum quoad internas, tum etiam externas partes medicinæ objectum esse, tanque mirabilem has ipsas intercedere harmoniam, ut vitium, quod extrinsecus conspicitur, ex interioribus sæpissime oboriatur, pariumque externarum læsio è contrario internas facile vitiose adficiat. Accedit, quod vitia, quæ externis infesta partibus manulem operam exigunt, plerumque etiam interioribus communia sint, ut fere in inflammationibus, tumoribus, apostematibus, scirrhis, exulcerationibus, humorumque extravasationibus videre licet, quibus certe non sola internorum medela, sed maxime etiam prudenti externorum ope succurrere expedit; quæ tamen pro diversâ corporum natura, pro causarum morbi, aliarumque circumstantiarum differentia mirum in modum variat, maximamque prudentiam requirit. Unde satis elucet, nec medicinam à chirurgia, nec saniores chirurgiam à medicina, principis anatomico-physicis & mechanicis fundata tuto posse sejungi. Quæ quum ita sint, rectissime admodumque præclare judicarunt Veteres, qui ex familia Aesculapii ortos arte medica imbuendos primo omnium chirurgiæ præcepta docuerunt, ipsique in suis de re medica monumentis summum statuerunt prærium. Neque vero solum antiquissimis temporibus, sed nostra etiam ætate à prudentioribus magno præ ceteris honore afficiuntur illi Medici, qui paullo accuratiori anatomis scientia instructi, rem medicam apte cum chirurgia conjungunt; licet pauci sint, qui egregiæ huic arti addiscendæ tempus operamque navent.

Et quam immensum salutis dispendium in universum genus humanum redundaret, nisi Medicus chirurgicæ artis probe gnarus, rerumque in ea obviarum peritus esset? Etenim, quum in nostris potissimum regionibus plurimi eorum, qui chirurgiam de instituto tractant, omnemque eidem industriam impediunt, perniciosos committant errores, maxime sane de salute rerum publicarum servanda desperandum est, nisi prudens Medicus hanc crassam Chirurgorum inscitiam consilio adjuvare, & multa damna modestiori admonitione præcavere satagat. Accedit, quod pertinaciores partium externarum læsiones difficilem, vel nullam plane recipiant sanationem, nisi convenienti interno remedium usu perite succurratur; cujus tamen Chirurgi plenissime præcipiant. Id quod omnino exinde derivandum esse arbitror, quia chirurgiæ scientia ut plurimum vulgari, empirica & minus rationali methodo tractatur, minimeque pensi habetur, an illam exercens ex anatomis studio partium externarum, ut ossium, musculorum, nervorum, tendinum, membranarum, glandularum, & vasorum structuram, situm & connexionem didicerit, an doctrinam de sanguinis circulo, de viribus, de robore partium, de nutritione &c. calleat, nec ne: quum tamen hæc omnia scitu necessaria sint, plurimumque inferviant, ut quis de externis læsionibus remediumque tam usu quam noxa eo melius ferre iudicium possit. Summa igitur gratia habenda est Potentissimo Prussiæ Regi, Domino meo longe clementissimo, qui non modo boni publici promovendi causâ, sed etiam tuendæ militum valetudinis gratia collegium anatomicum chirurgico-medicum

multis sumtibus constituit, eisdemque Professores in re medica & chirurgica peritissimos præposuit, ut artis chirurgicæ studiosos in rebus anatomicis & rationali morbos tam externos, quam internos sanandi methodo, quantum ad Chirurgi officium spectant, omni diligentia instruant atque exercent. Neque minorem meretur laudem eximius Gallicæ nationis ardor, quo illa instigata non modo omnem movet lapidem, nullisque parcat sumtibus in chirurgia plenius perficienda, ejusque cultoribus erudiendis, verum etiam minime vereatur, limatiora Medicorum extraneorum scripta in vernaculam convertere, ut inde chirurgiæ dediti saniora hauriant principia.

Hinc ego non sine insigni animi voluptate comperi, Lutetiæ Parisiorum & scriptis meis tale statui pretium, ut digna haberentur, quæ in vernaculam à clarissimo D. D. BRUHIÉRIO traducta impensis meritissimi bibliopolæ BRIASSON publici juris fierent, omnibusque latinæ linguæ ignaris utilitatem adferrent. Vidi jam primum medicinæ systematicæ tomum gallice redditum & accurate impressum: & forte etiam reliquæ partes sequuntur, maxime quum hoc suum propositum ipse mihi auctor per litteras indicaverit.

Sed ut redeamus, quo digressi sumus, quemlibet sane abunde convictum spero, quam necessaria quamque proficua sit medicinæ cum chirurgia conjunctio, ita quidem, ut nec Medicum sine chirurgia, neque Chirurgum sine solidioribus medicinæ principiis medentis munere rite fungi possit. Ideoque in præsentī hoc octavo tomo res maxime ad chirurgiam pertinentes rationali methodo exponere allaboravi, ea spe fore, ut rei medicæ dediti diligenti hujus operis lectione & usu fructum percipiant non poenitendum, quem ego toto pectore voveo, opto, & apprecor.

C O N S P E C T U S

C A P I T U M.

- | | |
|---------|---|
| CAP. I. | <i>De scorbuto ejusque vera indole.</i> |
| II. | <i>De sphacelo à causa potissimum interna ejusque curatione.</i> |
| III. | <i>De purpura præsertim chronica scorbuti sobole.</i> |
| IV. | <i>De lue venerea.</i> |
| V. | <i>De pustulosis & pruriginosis variis generis affectibus cutis.</i> |
| VI. | <i>De omnis generis ulceribus tam benignis quam malignis, præsertim cancerosis.</i> |
| VII. | <i>De circumspecta ulcerum fistulosorum curatione.</i> |



CAPUT PRIMUM.

DE SCORBUTO EJUSQUE VERA Indole.

THESES PATHOLOGICÆ.

§. I.

Scorbuti
nomen
falsa acci-
pitur.



SCORBUTI nomen tam late nostris temporibus patet adeoque familiare est, ut quævis fere chronica passio, si qua ipsi impuritas jungitur, scorbutica adpelletur; hinc nihil in praxi medica est solen-

nus, nihil usitatius, quam ut cachexia, arthritis, dyspepsia, paralysis, erysipelas, colica, atrophica, rheumatismus, purpura alique plures hujus generis affectiones inter scorbuticas numerentur. Quid? quod mos adeo invaluit, ut hodie Medici imperitiores, si quando ex certis signis neque morbum nec causam ejus rite possunt cognoscere, statim scorbutum prætentant, & pro causa scorbuticam acrimoniam accusant. Deinceps non raro accidit, ut affectus quidam sæpe plane singularis, cui portentosa spastica-convulsiva junguntur symptomata, in artis exercitio occurrat; & tum usu receptum est, ut illam vel ad fascinum, vel ad inale scorbuticum rejiciant. Horum sententiæ plane adversantur alii nostro tempore non adeo incelebres Medici, qui hunc morbum, quem scorbutum nominamus, vel plane negant, vel tantum pro exacerbatione mali hypochondriaci & hysterici vendunt; qua in re tamen, uti ex infra dicendis elucefcet, admodum falluntur.

§. II.

Definitio
realis.

Scorbutus proprie sic dictus est magna summæ universi corporis læsio à summa sanguinis & succorum vitalium dyscrasia & corruptione, ob ingens diæta aërisque vitium, præcise, locis maritimis & septentrionalibus ut & militibus in castris viventibus admodum familiaris, curationis valde difficilis.

§. III.

Signa
offensiva.

Hic affectus, qui gravibus admodumque variis symptomatibus est stipatus, in partibus præcipue externis suam manifestat indolem: nam si imminet, lassitudo spontanea totum corpus occupat, & crurum pedumque gravitas cum mo-

Frid. Hofmanni Oper. Tom. III.

vendi impotentia subsequitur. Deinde color faciei à naturali rubedine recedit, ichor cum sanguine mixtus ex gingivis fluit, quasum carnem relaxat & ad dentium usque radices consumit, ut illorum utrobique fiat vacillatio: in cruribus porro emergunt iracule, diversæ figuræ, magnitudinis ac coloris, quæ sæpius in ulcera mali moris desinant: crescente malo dolores lancinantes, vagi vel fixi cum movendi quadam impotentia vel convulsiva strictione, artus invadere solent.

§. IV.

Veteribus etiam hunc morbum non plane fuisse incognitum, haud obscure ex HIPPOCRATE elucet, qui lib. de internis affectionibus §. 34. nostrum affectum sub splenis nullo defecit, quo laborantes hæc pari dicuntur: venter inflatur, postea splenem immiscuit & durus est, & dolores acuti in splenem incidunt, color faciei mutatur & fit niger, pallidus, maliciori speciem refertur, gingivæ male olent, à dentibus discedunt & ex subis ulcera erumpunt, velut pustula nostrurnæ, membra insuper attenuantur & sterces non fecedunt. Idem PLINIUS in hist. nat. lib. XXV. cap. 3. peribelle confirmat perhibens: quod in Germani Cæsaris exercitu citra Rhenum & vitiosi & medicati fontis aqua potu vi malefica conspurcata duo novi externi morbi, quorum alter puridum oris male olevis vitium, quod quædam adpellabant, quo intra biennium omnes dentes decidebant; aliter qui nervus crurum adeo obadebat, ut compages in genibus dissolveretur & crura vellicaret, quod ob id euvetis à cruribus adpellatum.

Veteribus
plures non
incognitus
fuit scor-
butus.

§. V.

Ut vero eo clarius peculiaris hujus morbi genius innotescat, consultum nobis visum est, integram hujus luis historiam cum omnibus gravibus symptomatibus prætexere, ita quidem, ut juxta singulas partes, quas dicitur hic morbus occupare gravitate addigere solet, progredientes, de abdomine initium dicendi faciamus. De ventriculi quidem gravitate & dolore non adeo frequenter ægri conqueruntur, aliquando tamen nausea, vomitus & cardialgia adficiuntur. Appetitus in quibusdam valde est dejectus, in aliis præter naturam auctus. Contrarium autem valet de siti, siquidem appetitus humidi fere nul-

Complicata
morbi his-
toria cum
symptomati-
bus enumer-
atione, quæ se ce-
ferunt à re ab-
strusa.

11 3 lus

lus est: ructus frequenter emergunt acidi, amari, nididiosi & foetidi cum impetu saepe erumpentes: in ventriculo & intestinis rugitus & murmura frequentius sentiuntur: alvus est multis valde laxa, aliis contra valde adstricta, ita, ut faeces nimis aridae vix possint emitti: in quibusdam podex quasi introfium trahitur, ut nihil commode, vel tantum cum molimine maximo immitteri possit. Præterea in abdomine valde notabiles sunt dolores, qui vocantur colici, longe tamen aliter, quam vulgares comparati: sunt enim lancinantes, acutissimi, intolerabiles fore, ut parum ablit, quin manum sibi adfecti inferant; & ab his doloribus hic morbus etiam *Scharbock* nominatur. Neque tunc adest, ut in aliis doloribus, tumor venteris a flatibus distenti, sed introfium potius capitur umbilicus, ut pugna manus in cavitate imponi possit, diuque durat nec medicamentis vel fomentis facile cedit, idque tandem peculiare habet, ut frequenter in paralyfin definat.

§. VI.

Jam progredimur ad ea, quæ in pectore præter naturæ ordinem se offerunt, inter quæ occurrit ægra spirandi facultas, quæ frequentius oritur vel exacerbatur sub nimio corporis motu. Hanc per sepe comitatur anxietas, quam sub diaphragmate, in medio hypochoondriorum spatium, ubi cartilago ensiformis situm habet, ægri percipiunt, & quæ ipsos non nisi erectos respirare sinit. Facilis autem ex hoc adfectu lapsus est ad hydropem, subsequente prius crurum & dein abdominis tumore, præsertim si vehementiora eaque drastica purgantia fuerint adhibita. Præter respirandi difficultatem in thorace dolor lateris nunc sinistri nunc dextri, modo versus dorsum, modo versus sternum & ipso in sternone percipitur, qui tamen non debet confundi cum pleuritide vera, ubi dolor est continuus & punctorius cum febre, rursi continua & spatio colorato; quod minus observatur in pleuritide scorbutica, ubi dolor quidem est acutissimus, non vero continuus, sed per intervalla rediens: neque adest febris neque sitis, nec difficilis est dolorum spiratio. Præter hæc pulsus parvus & inequalis, plane contrarius est illi, qui in vera pleuritide occurrit: tussis aliquando nulla vel non adeo molesta est, siquæ adest, non tam vitio thoracis, quam potius à materia in glandulas faucium destillante evenit. Recte itaque hoc malum pleuritidis spuria scorbutica appellari potest, facileque à vero pleuritidis morbo distinguitur, quod diutius quam ille inhaeret. Deinceps palpitatio cordis non infrequens scorbuticis malum est. Accedunt quoque sæpius pectoris angustia & animi defectiones, quas ægri, dum à lecto surgere conantur, præter omnem fere externam causam patiuntur: in eo tamen hæc mentis deliquia ab aliis videntur recedere, quod pulsus sub ipsa major fortiorque observatur, qui in aliis contra parvis & interceptis micat ictibus. Præterea in thorace, quia œsophagus ibi situs est, aliud adhuc symptoma incidit: conqueuntur enim frequenter ægri scorbutici totam gulam eorum esse obstrictam, & hæere ibi aliquid instar pali, quod removeretur, quo minus solida vel liquida adsumta possent transcurrere, ut inde, si quidquam deglutendum sit, in suffocationis versarentur periculo.

§. VII.

Misso thorace progredimur nunc ad collum, fauces, ipsiusque caput, ubi iterum varia occurrunt symptomata, & primo quidem salivatio, quæ valde frequens scorbuticorum symptoma est. Dein gingivæ in hoc malo valde laborant, quæ inter initia sunt tumide & vel leviter contractæ sanguinem fundunt seorsum: sæpe etiam caro ibi luxurians copiose excrevit, cui tandem fetor accedit molestissimus. Sub gingivis ita male adfectis dentes in suis alveolis vacillare incipiunt, ita nonnunquam, ut eximi possint. Dolor quoque dentium frequens adest, & ille quidem præter manifestam causam, in eo tamen ab alia distet odontalgia, quod subito recedat facileque recurat. Capitis dolores sæpe adfunt immanes, ut plurimum vagi, raro fixi, qui suas circa vespertam potissimum habent periodos, sed oborto noctu sudare desinunt. Vertigo quoque & somnolentia aliquando eveniunt, somnolentia per intervalla incidit: cum contra alii vigiliis torquentur & per plures septimanas vigilantes non debilitantur, uti febricitantibus accidit. Solet etiam aliquando gravis tristitia, aliquando plane delirium sine causa accedere, in eo vero à ceteris deliriis differre, ut plane inordinate & præter iustas causas invadat.

§. VIII.

Facto nunc transitu ad partes externas, convulsiones, dolores, ac spasmos in eis obvenientes consideramus. Convulsiones sunt frequenter ad poplitum, aliquando etiam talos trahunt, & hinc inde immanes sunt contractiones, quæ etiam non raro in articulis permanent. In Germania inferiori dicunt, *de Krübel Krauckbeu*, quem adfectum egregie descripsit GREGORIUS HONSTIUS. Frequenter etiam contingunt paralytes, præsertim in cruribus, post graves intestinorum spasmos; ubi stupor præcedens imminenti mali initium est: differunt vero ab ordinaria paralyti, quæ sensum fit & diu durat, omnemque motum tollit; scorbutica vero subito accedit, subitoque recedit, motum adhuc ex parte relinquens, præsertim si in lecto adfecti se contineant. Porro ingens lassitudo omnes artus citra manifestam causam occupat: conqueruntur etiam scorbutici nonnulli de dolore vermiculari, quem ita exprimunt, *als wenn was lebendig darinnen wäre*; aliquando obtusus, sensivus dolor ipsas ossium medullas occupat, qui osteocopus appellari solet. Alii atrocissimos experientur dolores pungentes, lancinantes, non secus ac si pars ab altera divideretur. Vagi plerumque sunt hi dolores & nunc ex alia parte in aliam se transferant, sed mox iterum derelinquunt; unde etiam arthritidis vagæ nomen habent: aliquando fixum locum videntur figere in pectore, ubi pleuritidis metu.

§. IX.

In cruribus potissimum dolores oboriuntur, circa talos etiam & plantas pedum; aliquando in digitorum extremitatibus, in coxendice, genu, dorso, lumbis & nucha, & differunt in eo ab arthritide vera, quia non circa articulos tantum, sed etiam in carne circa membranas vagantur. Præterea observantur copiosi sudores, inprimis noctu molesti & conspuentes, (dicunt *der febrindende Scharbock*) sanguis quoque profu-

si in capite
est, colla et
fauces.

Cicero
de nat.
deu.

Proferunt
in convul-
sionibus.

flusiones aliquando ex naribus contingunt & difficulter siliuntur. Maculae præter hæc oriuntur, quæ tunc majores, tunc minores, culicum moribus similes, præcipue rubicundæ, deinde purpureæ & sublivide, tandem nigre evadunt. Mares interdum integrum tibiae implent, late se extendentes, frequenter quoque in cruribus, collo & pectore apparent, evanescent autem modo, modo iterum erumpunt. Aliquando etiam tumores & tubercula in corporis partibus oboriuntur, pedes ordematius tumor occupat, sunt quoque exacerationes hæc ratione: primo pars admodum dolet, deinde abscedit cuticula, non aliter, ac si fervente aqua pars esset superflua, proficit serum & tunc insensibilis pars dolet; sed vix unquam verum pus ibi notatur, alias etiam ulcera profunda observantur sicca, quæ nullum pus vel saniem fundunt & facile in gangranam abeunt. Gangraenæ etiam frequentes sunt scorbuticæ, potissimum in pedum digitis, quæ in eo ab aliis differunt, quod sine causa manifestæ & inflammatione invadant lenteque ferant & tarde jugulent. Hæc præcipua ac potissima sunt scorbuti signa & hoc morbo adfectorum symptomata, quæ quidem non in omnibus similiter & omnia observantur, sed in nonnullis horum adiant plura, in aliis pauciora, in aliis majora, & iterum in aliis minora, longius vel brevius tempus durantiæ.

§. X.

Causa scorbuti præterea cognoscitur in summa lacorum coarctatione.

Postquam igitur integræ & completæ affectus nostri huiusmodi cum omnibus fere & singulis, quæ complicari solet, symptomatibus recensimus; proximum nunc est, ut paulo exquisitis dispiciamus, à quibus causis tam proxima, quam remotioribus, tanquam à fonte, atrox hic morbus cum pravis suis effectibus proveniat atque promanet; idque maxime hanc ob rationem, quia tam præservationis quam curationis momentum, veris morbi causis cognitis, unice innititur. Nos vero diu istius morbi continentem & proximam causam in summa lacorum vitalium impuritate, vitæque & sanitati insensibilissima corruptione, jam supra in definitione reposuimus; attamen cum minus adhuc determinatum sit, in quoniam labes illa potissimum consistat, vel quomodo oriatur, pravamque indolem suam exerat, operæ erit pretium, ut hoc ipsum accuratiori disquisitione eruamus.

§. XI.

Quomodo generetur.

Rectam corporis nostri valetudinem, sive functionum ejus tam naturalium quam vitalium & animalium integritatem à laudabili humorum vitalium, sanguinis, sacci lymphatici, nutritii & nervorum fluidi temperie, mixtione ac crassi, eorumque libero & æquali in omnes corporis partes influxu & circui dependere, res in physiologicis certa est & extra omnem dubitationem posita. Verum enim vero, quam debita temperies ac puritas in eo maxime consistat, ut partes subtiliores, & mobiliores, aqueæ, æthereæ, elasticæ, blandæ sulphureæ, cum gelatinosis & tenuioribus mucidis debita proportionem inter se mixtæ & unitæ sint; crassiores vero, glutinosiores & terrestres varique generis salinæ, nitæ, alcalinæ, sulphureæ sive biliosæ & superflue aquosæ & pingues per congruam, à provida natura constitutâ coloratâ & emunctoriâ, ut fere sunt perspirabilis cutis, hepar, renes, intestina, tunica glandulosa faucium, nasi & bron-

chiorum, rite eliminantur; judicatum est facillimum, tum fluidorum vitalium impuritatem, sive Græcorum loquendi idiomate, cacochymiam oriri, quando particule terrestres, tenaces, sulphureæ atque salinæ in corpore intus retentæ præ dulcibus ac temperatis prædominam obtinent. Hoc loco autem scire expedit, impuram in hoc morbo sanguinem dyscrasiam non semper unius ejusdemque esse generis, sed pro diversâ excrementitiarum particularum indole permulsum differre & varia quoque inducere symptomata. In quibusdam enim subjectis fluida materia valde viscida fixa terrestrius salina acidâ; in aliis biliosa salino-alcalino-sulphurea scæet ac dominatur; hæc etiam auctores scorbutum vel à crassa frigida vel à calida derivare solent: nos tertiam adhuc speciem addimus, quæ à fluidorum vappescence & in putridam corruptionem vergente dispositione derivanda est, & hæc utique pejora indolis ac naturæ reperitur.

§. XII.

Putrida corruptio & vappidus humorum status vel eo ipso satis evincitur, quia scorbutus per contagium sæpe propagatur, & adfectiones omnes, quæ contagio insunt, putridis exhalationibus pro causa & fundamento agnoscunt, quæ altius penetrando, in illis semini seu fermenti humores jam dispositos, præsertim pingues inquinant & in suam convertunt naturam. Unde non mirum esse debet, quod à solo scætere cadaverum, scorbuto extinctiorum osorum hujus mali annotaverit SENNIERTUS cap. I. & IV. de scorbuto, & similes exhalationum scorbuticarum noxas graphice depinxerit CASPARUS HOFMANNUS de febribus cap. LVII. Si quis, inquit, statim à morbo extrinsecus fuerit, nihil periculi subest; sed postquam putredo cadaveris succedere solet, procul bine abesse debent fœdales, nisi eadem velint labe contaminari. Et quid malum? ingens illa, quæ sponte occidit lassitudinem, artuum languor ac impotentia, magna virium ad lipothymiam usque prostratio, pulsus arteriarum debiles ac languidi, pessimi sudoris & urinae fautores, & tam facilis tamque prompta partium extremitatum sine graevissima externa causa, sphaclatio, satis clare ac manifeste tummum sanguinis, & succi nutritii corruptelam patesciunt.

Corruptio in putredine præsertim in scorbuto evincitur.

§. XIII.

Verum enim vero, ad genuinam symptomatum scorbuticis inhærentium causam explicandam, non depravata solum planeque aliena humorum indoles sufficit; sed aliud adhuc momentum, videlicet destructa elementis fluidi cum solido in sanguine unio requiritur, quam ex pluribus cum scorbutis conjunctis phenomenis non obscure licet colligere. Maxime vero omnium hæc fluidi à solido, etoque graviore elemento separationem inter alia satis docere possunt fluxiones sanguinis aquosi, quæ per nares, gingivas & alium contingere solent; neque minus, quod in partibus extremis, ut facie, labiis ac cruribus, valorum oscula nonnumquam se aperiant, & sanguineum laticem fundant. His demum accedunt salivationes, urinae & sudores copiosi, scorbuticæ frequentissimi, qui nimiam seri à sanguine crassiori secessionem similiter abunde declarant; cum contra dolores vagi ac incondantes ex una in alteram partem transeuntes, insignem serimuri tenuitatem & subtilem acrimoniam produunt. Siquidem tenuis & acris humor ex vascu-

Causa morbi dicitur esse corruptio in solido sanguinis.

372 Cap. I. De scorbuto ejusque vera indole.

lis sepositus, à parte ad partem facillime ac celeriter transferatur, quod quidem præcipue in arthritide vaga scorbutica evenire deprehendimus; quo etiam præcordiorum angustia, spasmodicæ officiorum ventriculi & diaphragmatis contri-
ctiones, dolores intestinorum lancinantes, & si-
miles in pectore fævientes, qui pleuritidis spu-
ritus nonnunc veniunt, ac denique pruritus & ex-
ulcerationes jure debent referri. Lentorem de-
nique crassitatem humoris scorbutici, ex tumo-
ribus, doloribus fixis, artuum lassitudine, hor-
rore, stupore animadvertere licet: & abhinc
etiam palpitaciones cordis, syncopes, carus &
lethargus, pulsus debilis & parvus, tristitia, me-
lancholia, polyposæ concretiones, majoribus pul-
monum & cordis vasibus inhaerentes, adfectiones
paralyticae, tumor & incrementum subitum cor-
poris, hepatis & lienis magnitudo, ut & tuber-
cula in variis partibus &c. sunt derivanda.

§. XIV.

Quod pro-
bitur.

Præterea destructam solidi cum fluido unionem intimam, quæ ad circueum per minima va-
sa & viscera summe necessaria est, sanguis per
venam incisam emissus, qui ut plurimum grum-
osus, niger, gravis ac crassus est, supernatante
infusim copiosa aqua, mali odoris & saporis,
ad sensum demonstrat. Viduus non raro, è pe-
dibus sanguinem in aquam immisissim brevi tem-
pore in fibrosa concretione compactum, in aliis
in patina collectum non ita multo post crassio
tenacissimoque glutine fuisse obductum. In qui-
busdam vero loco sanguinis crassius, valde tenuis,
coccinei coloris & ævis saporis serum, nulla cras-
sior nigra substantia in fundo vasculi relicta, efflu-
xide, non sine admiratione conspeximus.

§. XV.

Sedes ha-
jus mali
non est pro-
prio loco.

Hic ita, quæ mali nostri causam concernant,
clare expolitis, non immerito in questionem veni-
unt, quænam possibilium viscerum in nostro morbo
sint adfecta, & quæ præcipua mali sedes sit
habenda. Verum enim vero, quæ hac de re
audores in diversis abeant sententias, expend-
endum videtur, quæ ex his veritati magis con-
gruant, quæ minus. Veteres quidem, inter quos
HIPPOCRATES agmen ducit, lienem maxime,
utpote succi melancholici & astralitari sedem
accusabant; sed accuratiori recentiorum per ana-
tomen inquisitione constat, non tam in liene,
quam potius in hepate sedem hujus mali esse
constituendam. Ita SENNERTUS lib. III. med.
præf. sect. II. cap. 2. in cadavere scorbuto ex-
flandis aperto, mentum sese totum putridum
& corruptum, in liene vero nihil, quod tan-
tum ad sensum culpam potuisset, deprehendit.
FORESTUS lib. XX. observ. scbol. 2. in quodam
Hollandiæ Præfide magis hepar, quam lienem
affectum fuisse, diligenter annotavit. Sic etiam
REUSNERUS exercit. IV. de scorbuto, viri cujus-
dam hepar corruptum, calidum & ad depura-
tionem sanguinis ineptum vidit, lienem vero
magnitudine & colore cum hepate sano certan-
tem. Imo HORSTIUS Tr. de Scorbut. sect. II.
§. 8. scorbuticum quandam viscidum commemorat,
cui jecur totum interius atque exterius scirrho-
sum erat, nec quicquam valorem vel sanguinis
exhibebat; lien vero triplo major, quam secu-
dum naturam esse solet, optimeque sanus con-
spiciebatur, parenchyma jecoris colore sit rubeo,
nec non substantia cariosa referens. Et WILLI-
sus post plurimum scorbuticorum cadaverum dis-

sectionem multoties observavit, hepar aut cyli-
ndrum scilicet fuisse in culpa. Invenit enim in
nonnullis hepar prorsus exsangue & inflat ubi-
us vaccini exsuccum, in aliis vesicam bilia-
riam prorsus vacuum & inanem, in aliis lapi-
dibus obditam, in aliis amurca maxime amaref-
cente repletam, lienem vero optime validum ac
sanum.

§. XVI.

Si nostram hac de re sententiam interponere
licet, non dubitamus asserere, omnia viscera de
emundatoria, quæ fluidorum depurationi infer-
viunt, labe quadam ac vitio esse adfecta; dum
à lentiori sanguinis progressu, minima coram
valcula ac meatus perfacile nimium infarciuntur,
à viscida amurca obstruuntur, & demum
plane indurantur. Speciatim vero universale il-
lud ac solemne universi corporis emundatorium,
cutis, per quod tenues excrementarii succi exha-
lant, non sine ratione maximam pati labem vi-
detur: neque viscera in abdomine sua sanguinea,
ad quæ vena portæ pertingit, ut hepar, lien,
mesenterium, omentum &c. ab omni labe de
culpa sunt immunia; eo quod hepar partibus
impuris, salis, sulphureis & in alcalinam natu-
ram vergentibus, fecerendis dicitur est; lien
vero ad intimam fluidi cum solido mixtionem
præcipuum confert momentum: quare harum
omnium partium læsio imprimis in scorbuto at-
tendenda est. Ceterum probe notari velim, ob-
servationibus anatomico-præciticis non penitus ef-
se in nostro adfectu sciendum, quæ rarissime
scorbutici demortui, sed quando jam in hydro-
pem, atrophiam, hæticam, morium nigrum,
vel sphacelum internum delapsi sunt, cultro ana-
tomico subjiciuntur.

Sed omnia
sunt visce-
ra &
emundato-
ria læsa
sunt.

§. XVII.

Quod vero nosse adfectus tam diuturnus ac
contumax sit, ut appropriatis etiam & efficaci-
bus præfidiis valde resistat, id mea quidem sen-
tentia inde deducendum est, quod digestionis &
chylificationis officina, sub qua ventriculorum
cum intestinis intelligimus, non recte se habeat,
sed valde læsa sit. Sicut enim à succi mensuri,
salivæ, gastrici & pancreatici temperie leni-
terque spirituosâ indole, & sufficienti influxu,
intima alimentorum dissolutio & succi boni,
subdulcis, chylosi, præparatio & extractio uni-
ce pendet; ita dum per impuritatem sanguinis
vitiati menstruales illi succi à temperata indole
plane defleunt, non nisi crudum, viscidum &
acidum chylum producunt, qui ad sanguinem ac-
cedens ejus intemperiem ac impuritatem magis
adhuc intendit, auget, pravoque fomentum su-
stentat.

Ventricu-
lus rursus
dignus.

§. XVIII.

Hactenus mali scorbutici ejusque symptoma-
tum, continentem de proximam causam veram-
que sedem, & quomodo vires ubique diffun-
dat, perspeximus; proximum nunc est, ut, unde
causæ hæc morbi internæ suam nanciscantur
originem, investigemus: idque optime hinc con-
fido, quando ad causas illas externas non natu-
rales à Medicis appellatas, quibus quotidie ad vi-
tam opus habentur, animum mentemque adver-
temus. Ita primo omnium nos docet experientia,
scorbuticum malum quæ maxime certis regio-
nibus & populis, præterierim septentrionalibus &
maritimis, ut Cimbris, Norwegis, Seelandis,
Fri-

Causæ non
naturales.

Frisiis, Didmaris, Belgis, Suecis &c. esse proprium ac valde familiare. Cujus rei causa in catholico isto, seu universali fluido aereo-aethereo est querenda, quod exhalationibus impuris, putridis, falsis, nimiumque aqueis refertum, vi sua elastica & expansiva, a qua vigor, tonus & robur solidorum, eorumque vis motrix systolica dependet, multum privatur. Quapropter etiam in aliis climatibus, ad meridiam vergentibus, loca lacustria, uliginosa, humida, ubi facile inundationes & aquarum delapsum non habentium stagnationes, item nebulæ frequenter contingunt, ad progignendum eundem morbum sunt aptissima; certe non aliam ob causam, quam quod aer, multis exhalationibus humidique vaporibus repletus, fibras motrices valde relaxando, humorum circuitum cum naturalibus se- & excretionibus valde retardat atque imminuat.

§. XIX.

Sicut vero secundum HIPPOCRATIS effatum lib. de flatibus non ab aere solum, sed ab ingestis etiam morbi proveniunt; ita experientia edocuit cognoscimus, victum inprimis durum & salsum, qui ex carnibus taurinis, porcinis & annosiorum animalium compactionibus, multoque sale conditis & fumo induratis, neque minus ex piscibus, præsertim maritimis exsiccatis & salitis constat, varisque gentibus mari & septentrioni proximis, familiaris est, ad nostrum morbum plurimum conferre momenti. Quo etiam legumina crassioris texture, in locis præsertim humidioribus & uliginosis progerminata; panis grossior, durus, & ex fecali, tempore pluvio collectus, confectus, item qui situm contraxit, jure debent referri. Ex potulentis aquæ crudæ, duræ, graves, salis & stagnantes, ad quotidianum potum usurpatæ, vel si cerevisiæ ex illis coctæ, lupulo non bene conditæ, vel acidæ & sacculentæ reddidæ fuerint, nostro malo ingenerando plurimum vellicantur. Hæc omnia tamen longe majori sunt documento, si vita iners, desit omnique sere laboris & exercitationis experta conjungitur. Sic enim vitalis fluidorum circuitus & abhinc pendentes se- & excretionis valde retardantur, sanguinique crassities & spissitudo inducitur.

§. XX.

Porro animadvertimus, corpora spongiosa & laxioris habitus, temperamentis sanguineo-phlegmaticis, quæ exilitate ac copia valorum multaque pinguedine prædita sunt, præ scioribus macilentis, strictioris complexionis, quæ vasa majoris diametri habent, scorbuticæ corruptioni esse obnoxia; hanc potissimum ob causam, quod in illis tardior & lentior humorum circuitus, impeditiorum excretionum fit successus & succi pingues aquosi quam prompte, misermate quodam accedente, in putredinem abeant corruptionem. Præterea de illud observamus, quod foeminae præ viris, urbani præ rusticis, eruditi præ plebeis, qui laboribus fatigati pravos humores in corpore accumulatos per transpirationem expellunt, ad luem hanc magis sine dispositi.

§. XXI.

Maxime vero omnium ad corrumpendam sanguinis massam, motusque œconomiae corporis nostri pervertendos, & excretiones, quæ per cutem, alvum & urinam sunt, supprimendas,

consequæ sanguinis evacuationes, in foeminis per menses, in viris per hæmorrhoides imminuæ, magnam in nostro adfectu obtinent potentiam. Huc quoque pertinent mulieres steriles cum illis, quibus menstrua sponte propter atamem subsistunt, & omnes, qui constrictas sanguinis missiones, sive scarificando, sive venam incidendo, olim susceptas, penitus omittunt: siquidem inde humores in corpore valde cumulant, libere per omnia vasa circulari nequeunt, sed hinc inde stagnantes, impuritatem contrahunt; unde scorbuti origo. Quantum vero suppressæ sanguinis excretiones, ad scorbutum conferunt, tantum & contrario nimis, quæ per nates, uterum, hæmorrhoides & in puerperis per lochia contingunt, sanguinei laticis profusiones, testibus probatissimis SALOMONE ALBERTI, EUGALENO & WILLISIO, ad genitum nostri mali contribuant. Nimia enim sanguinis jactura, perinde ac nimia ejus abundantia, humorum stagnationi & corruptioni animum præbet largissimam.

§. XXII.

Ratione ætatis vel maxime huic morbo obnoxii sunt senes; quippe morbi ipsi familiares, multum cum scorbuto conveniunt alunt, ideo quod ex impura, salina & viscida sanguinis & humorum crassi suum mutantur originem. Neque hoc judicatum est difficile: siquidem sub invalecente ætate, minima vasa, per quæ potissimum sordium inutilium excretiones fiunt, partes nutriuntur, & lymphæ quoque cum sanguine intente mîscetur, ardere, coarctari & angustari incipiunt; unde suo perfuncti munere nequeunt, totaque sanguinis massa successu temporis impura redditur.

§. XXIII.

Insuper ad classiem causarum remotarum maxime ea, quæ vires labefaciunt & motus vitales se- & excretorios minuunt, referri debent. Sunt autem præsertim hoc in numero graves animi, per anxiam curam, tristitiam & mororem diuturnum, inducæ perturbationes. Sic EUGALENUS Tr. de scorbuta p. 3. obf. XV. constat prædicere aucta esse, eos facite omnes, quos cum crassiori victus ratione diuturnior maior exercuit, ad scorbuticum malum esse proclives. Cui advenit WILLISII, qui nonnullos, fortuito timore percussos, scorbuticos evasisse, observavit. Magnam enim hæc animi pathemata obtinent potentiam in solidorum robore infringendo, & sanguinis circuitu, qui inde pendet, remorando; unde humores tardius circumacti, spissi, ad trajiciendum minima vascula inepti & tandem impuri evadunt; unde facilissima ad scorbutum transitus.

§. XXIV.

Uti vero nimium otium, quod supra demonstravimus: ita etiam vi excessus in motu committitur, ut vel nimis violenter insinatur, vel diutius justo continuatur, damno esse solet. Tali enim ratione, purissima ac subtilissima succi sanguinei, nutriti & nervosi pars dissipatur & exhauritur, ut facilius postea humores alienam & corruptam indolem, præsertim accessu contagii, induere possint. Reprobandum vero quam maxime est, intertempus & intensior corporis a passu motus, quo videlicet succus chylosus, nondum satis recte digestus, in sanguinem nimis cito rapitur, unde omnia facile mala, quæ a digestionem

1) Aër
purus.

2) Ingesta
præca.

3) Otium.

4) Temperamentum
sanguineo-phlegmaticum, grave,
et visum.

5) Excretiones
supprimuntur.

— nimia.

6) Aetatis.

7) Grævo
animo ad-
fectus.

8) Motus
corporis
auctus.

male

male peracta, crudoque & rudi chylo provenire, supra innuimus, certo certius propulsant. Sapiens itaque GALENUS lib. II. de sanitat. tuenda cap. 2. præcipit: non debet, cum adu-
nistratur exercitium, erudi incoctique cibi aut succi multitudo vel in ventriculo vel in vasis conti-
neri; unde periculum sit, ne prius, quam per
maturam coctionem utilis sit, in omnes animales
partes rapiatur.

§. XXV.

Nihil præterea facilius, nihil promptius ad scor-
butum disponit, quam ubi morbus aliquis non
ita diu prægressus, quamcumque labem, vel ma-
ximam sui vestigium, sive languini & sacco
alimentari, sive alicui ex visceribus præcipuis
impressum reliquit. Hinc nihil in arte est fre-
quentius, quam quod febribus tam continuis,
quam intermittensibus, inopportune suppressis,
vel si acri adhuc debiles statim alimentis se
obstant, scorbutus à tergo succedat. Ratio in
proclivi est: succi enim vitales per febrile in-
cendium subtiliori & sulphurea sui parte, de-
bitaque spirituscentia orbiati, ægre suum cir-
cuitum absolvent; unde maxima a pristino mor-
bo relicta facile alienam contrahit indolem.
Ut multas hac de re observationes, quæ om-
nes morborum in producendo scorbutu poten-
tiam confirmant, silentio prætereamus, com-
memorare tantum hoc loco placet consensum, quem
hypochondriaca affectio cum scorbutu habere
solet: siquidem hic illam sapilline aus comitatur
aut excipit; unde Medicorum quidam decepti,
nullam inter utrumque morbum discrepantiam
admittere voluerunt.

§. XXVI.

Genus quoque vitæ interdum huic malo cau-
sam præbet antecedentem. Sic maxime nautas
eodem corripimus observamus, qui longis & diu-
tius navigationibus detenti non nisi humidum
aëre circumdantur, simulque crasso, lasso ac du-
ro victu se nimis onerant. Morbus noster dein-
ceps etiam non raro citi callosus, tam maxi-
me obrationem, quod milites in castris degentes
nulla diæte victuque ratione habita aquas
fluentes & potus genera sæpenumero corru-
pta, cibos crudos & interdum semiputridos, pa-
nem sicut obductum & lardum rancidum inge-
runt, corpora imparo humido, perferunt per
noctem frigido exponunt aëri, nimisque vigi-
liis, excubiis, ac inedia defatigantur ac vitæ
prostrantur. Qua de re existat insignis locus
apud OLAVUM MAGNUM lib. de regionibus sep-
tentrionalibus XVI. cap. 51. qui hic transcribi
meretur: *ex cibis, inquit, piscibus, carne, sale
& fustis mactatis, essentibus frigidis & crudis,
ac pane non probe pisto, morbus ille horrendus
castrensis & à vulgo Scherbock dictus intrinsecus,
quo fauces & gingivæ putrescent, ventriculus di-
rit cruciatus torquetur, dentes stupent & vacil-
lant, &c.* HUCHSTETTERUS pariter obs. med.
decad. VII. cap. X. p. 162. de scorbutu, tanquam
militari morbo, in media Germanie parte olim
grassato, longam recenset observationem, cu-
jus præcipua momenta hic allegare lubet: Post-
quam Rex Sueciae anno 1634. urbem imperia-
lem Augustam Vindelicorum armis suis subje-
cerat, milites in civium aedes locati febrem mi-
litem ardentem malignam cum delirio & pe-
techii junctam, quæ etiam milites Cæsarei in-
fectarunt, in urbem intulerunt, ut ingressi inde

multitudo succubuerit. Hoc vero morbo circa
brumam remanente, plurimi civium de lassitu-
dine, gravitate & ambulandi impotentia con-
quirebantur: neque poterant stare erecti ob
crura rigida, dura, & dolorosa, quibusdam in-
tumescentia, quibusdam constibulentia. Qui
ficcioris nature erant, illis tendines, nervi ac
musculi crurum fursim trahebantur, ut flecti
non possent, interdum cum acuto dolore, in-
terdum sine eo: quidam in lecto cubantes se
volvère, non tamen pedes extendere valebant.
Plurimi ex his, circa finem hiemis 1634. algi-
dum, satis cesserunt. In plurimis ea erat pe-
dum infirmitas, ut isdem initio non possent,
licet aliquem in lecto motum haberent. Macu-
lae autem omnibus fere erant communes, quæ
multifariam colorate primo insular lentium ru-
brae, dein cæruleæ, tandem livide in artubus ap-
parebant, tanta interdum latitudine, ut maxi-
mam cruris partem occuparent. Junioribus gin-
givæ laxo ac flaccido luxuriabant tumore; quo
fortius tacto ac fricato sanguis niger ac foetens
effluebat, simulque fetor oris ac modificationis
defectus aderat. Leucopneumia, ascites,
tympanites, atrophæ, diarrhæa, icterus acce-
dens mortem inferbat: aërem siccum ægotan-
tes non bene ferre poterant, propter sanguinis
ebullitionem, hinc etiam nimis motus ipsi erat
noxius.

§. XXVII.

Proposita jam mali scorbutici historia, ejus-
que signis & causis in liquidum deductis, facili-
simum erit, hunc morbum ab aliis, quibuscum-
ratione symptomatum & impure dyscrasie mul-
tum habet commercium, ad evitandum confusio-
nem, distinguere. Equidem probe scio, plures
& ante nos fuisse, & nostra adhuc ætate esse
medicos, qui scorbutum eundem esse morbum
perhibent, quem HIPPOCRATES lib. de intern.
affect. nomine *ilei cruenti* descripsit; siquidem
in hoc affectu, perinde ac in scorbutu, ingens
ex ore fetor exhalat, gingivæ a dentibus ab-
scedunt, sanguis è naribus manat, imo ulcera
quandoque ex cruribus pullulant, horumque
alia sanescunt, alia graviora fiunt: at vero, quum
de maculis, quibus le hodie intuentium oculis
scorbutus representat, alium apud HIPPOCRA-
TEM sit silentium, & ipse quoque, vulvo cru-
ento laborantes, ad ambulandum ac laboran-
dum promptos expeditosque esse dixerit: cum
tamen in scorbuticis languor, gravitas, frigus
& crurum ad movendum impotentia adsit, ego
vix possum induci, quin ita sentientibus fidem
adjungam. Sunt dein nonnulli, qui scorbutum
ad icterum nigrum referunt, quia in hoc os foet-
et, gingivæ exeduntur, multumque sanguinis
stillant, ulcera ægrius cicatricem fiunt, & in
ægris quoque ad laborem tarditas, languor &
difficillima sanatio observatur. Ut vero non
hegandum sit, quod ambo hi morbi, ob sum-
mam humorum corruptionem, insignem habe-
ant convenientiam, in eo tamen videtur gra-
vis intercedere differentia, quod in ictero ni-
gro, sicut ac in scorbutu, color faciei totiusque
corporis niger appareat, stercora porracea sece-
dant, saporis amarities adsit, nullaque febris,
nullaque contagii vis observetur. Cui demum
accedit, quod in ictero hepar potissimum adfec-
tum sit; cum contra in scorbutu eadem fere in
omnibus visceribus labefacta, maximeque
systema nervosum partium spasmis & dolori-
bus

9) Morbi
progressus.

10) Vis
militaris
in castris.

Defini-
tio.

Ab illo
cruento
supponen-
do.

Ab ictero
nigro.

bus lancinantibus pessime affligatur: quod tamen in scelerio minus contingit.

§. XXVIII.

Facile porro à malo hypochondriaco & melancholico scorbutus distinguitur, licet non raro junctus cum ipso prodcat. Equidem in dicto affectu ob tonum viscerum destructum & tardioris sanguinis spissioris circuitum impuritas quedam & humorum corruptio adest, neque minus est stali humorum dolores & spasmi viluntur; ass massa sanguinea non tam putrida est & corrupta, nec tam multis & acerbis salibus imbuta: unde etiam non modo contagii vis delicti, sed & maculae, ulcera putrida, gingivae relaxatae & sanguinolentae, summa corporis ac artuum lassitudo, imò virium ad lipothymiam usque defectio, ceu consueti scorbuticorum symptomata, plane defunt. Denique lues scorbutica ratione corruptionis, quae solida aequae ac fluidae partes exedit, ob maculas quoque, dolores & ulcera, imò ob contagii virus multum cum venerea habet affinitatis, nililo minus tamen permultum intereffi, ut utrumque affectum probe discernamus, quia alioquin in praxin damnum redandam gravissimum. Probe itaque tenendum arbitror, lucem veneream non nisi contagio nasci scorbutum vero ex aeris, aquarum & dietae vitio, rerumque non naturalium abusu oriri & inde certis regionibus certisque climatibus esse proprium. Porro scorbutus gingivae magis occupat densaeque reddit cariosae; lues autem venerea magis tonsillis, uvulae, naribus, osibusque palati, exulceratione & erosione est infesta. Urina scorbuticorum est crassa, colorata, salibus lixiviosis turgida; in lue autem venerea minus est colorata, turbida cum limoso sedimento. Tandem in scorbuto spississimi & dolores magis sunt vagi; in lue venerea magis fixi, osibus inherentes, qui tamen noctu sub lecto ingravescunt.

§. XXIX.

Cum nullo vero morbo nosfer adfectus plus habet affinitatis, quam cum purpura rubra chronica, quae febris ut plurimum experta, adeoque hodie familiaris est, ut etiam *morbus scorbuticus* appellatur, maxime cum pariter ac ipse scorbutus non exiguum humorum impuritatem pro causa & fundamento agnoscat. In eo tamen à scorbuto differt, quod in hac pustula, semen nililo amplitudine aequantes numerosissimae cum corrugatione, asperitudine & ariditate cutis, intercorrentes, praesertim inter initia, horripilatione, pruritu, aestu & pectoris quadam angustia, efflorescant, quae peculiarem fontem cum largo saepius sudore spargunt; quale quid in scorbuticis ita annotare non licet. Deinceps nullum aliud exanthema, imprimis in sensibilibus naturae hominibus, tam instabile est, quam purpureum, utpote quod mox comparat, mox iterum retrocedat, nihil saepe incommodi, nisi aliquam pectoris oppressionem suumque raucecedinem relinquens, quae tamen symptomata regimine convenienti adhibito facile iterum remittunt.

§. XXX.

Inter morbos cum scorbuto multum similitudinis habentes, jure quoque numerari debet cachexia, quae à nostri avi Medicina plerumque scorbutica appellari solet. At vero, quo patet, quantum hos morbos intercedat discriminis, sci-

re licet, cachexiam neque contagio propagari, neque populariter grassari, nec gingivae adeo esse infensam, nec denique maculis corpus deturpare; quae omnia tamen in vero scorbuto tantum fere non semper contingunt. Imò denum ipsa causa materialis in scorbuto aliter est comparata, quam in cachexia: in hac enim serri magis tenuis, quam glutinosi & acris delinquit copia; unde etiam externum corporis habitum valde relaxatum, flaccidum & tumidum obieramus.

§. XXXI.

Constituta sic nostri morbi ab aliis sibi cognatis differentia, sequitur jam, ut indicemus, quomodo de ejus eventu de curatione firmum & prudens ferre judicium possimus. Et primo quidem in genere notare licet, scorbutum ex his esse adfectionibus, quae nec subito aegrum invadunt, nec subito cum defertur, sed tessidineo quasi gradu procedentes, ad mitigationem aequae ac curationem multo tempore exactaeque victus ratione opus habent. Unde etiam fit, ut nosfer adfectus, si vel levis error committitur, facile recrudescat, praesertim si à parentibus, haereditario quasi jure, ad liberos descendit; & tum raro etiam tollitur radicitus. Idem quoque contingit, si inveteratum est malum, si corpus senile, vel à praegressis morbis valde debilitatum & exhaustum, invadit; tunc enim sensim ad hydropem, atrophiam, paralyfin, convulsionem, carum, lethargum, apoplexiam, sphacelationem extremorum, aliaque lethalia mala viam slemit. Aliter contra res se habet, si malum est incipiens, aetas juvenilis, habitus corporis strictior, & origo ejus à contagio; tum quippe curam est facilius, maxime, si ejus fomes per menses, haemorrhoides aut diarrhoeam criticam subtrahatur. Facilius quoque sanationem recipit, si locus mutatur & ex insalubribus maritimis, septentrionalibus, ad meridionales plagas fit transitus. Porro quando hypochondriaci, cachectici & gonorrhoeae virulentae impliciti, in symptomata incidunt scorbutica, cura quidem difficillima, sed non pro summe desperata habenda est. Res notata perquam digna est, quod, licet homines in regionibus septentrionalibus valde sint robusti; nihil tamen minus ex hoc morbo laborantes aegrius convalescant. Cujus rei rationem adferre videtur aphorismus HIPPOCRATIS (XXX.) à SPONTO allegatus, qui hic est; quibus corpus male transpirat, ii robustiores sunt, & minus aegrotant, si vero aegrotant, difficilius restituantur. Etenim in populis regiones septentrionales inhabitantibus, quorum cuius à namio frigore crassa, densa & constricta est, portio sanguinis subtilior & spirituosior, retinetur; nec tam copiose & liberaliter exhalat, unde populi ejusmodi regionum sunt robustiores. Quandocumque vero hi homines aegrotant, difficilior à morbis, qui per transpirationem sanari debent, ob cutem valde densam & constrictam, convalescunt.

§. XXXII.

In specie vero notandum est, quod tumores, in partibus subito erumpentes & brevi evanescentes, saepius indicant paralyfin ventris vero tormina & continue circa umbilicum contortiones, vel sphacelationem intestinorum & subitam mortem in senibus, vel tympanitis post se trahant. Maculae, quo magis ad colorem nigrum

Progreffu

Progreffu
speciei de
tumores
& aliter
bus scor-
buticis.

vergunt, eo pejoribus sunt indolis, sique in ulcera abeunt, difficillime fiunt curationis, ut potius in corruptionem spheacelorum sepiissime desinant. Pestilimum quoque est, si gingivæ & adjacentes partes exulceratae carnem ad ossa absumunt & abscessum in mandibula furoant.

§. XXXIII.

in morbo scorbutico dyscrasia prædominatur.

Morbi, qui ex scorbutica humorum dyscrasia proveniunt, ut fere sunt paralytis, purpura chronica, cachexia &c. facile recidunt, ita quidem, ut nunc singulis annis, nunc ex longiori intervallo, pro victus ratione, quo regimine aliisque circumstantiis recidescant; & si demum ipsi visceribus, vel partibus nervosis labes est impressa, hæc non tam facile tollitur: humor enim scorbuticus, qui fermenti ac semini naturam amulat, sanguinique & succo nutritio profundius inhaeret, ægerrime expellitur.

§. XXXIV.

Scorbutum cur difficile est si curatio.

Uterius quoque notatu perquam dignum est, quod ordinario & hypochondriaci & scorbutici rarius pristinæ sanitati restituantur, idque maxime hanc ob rationem, quia rarius Medicis obediunt regulisque dieteticis acrius se submittunt, sed per medicamenta cito curari cupiunt: unde fit, ut subinde ab uno remedio ad aliud, ab uno Medico ad alterum transientes malum ipsi deterius reddant, præsertim si nativa remedia adfuerint, medicamentorum, vel etiam optimorum virtutem eludat. Huic accedit, quod perpauci sint Medici, qui rebelles hos morbos congruis remediis, convenienti ordine, methodo, & dosi adhibendis, recte tractare didicerunt. Plerumque enim heroica adhibent medicamina; cum tamen insular regula generalioris scire liceat, scorbutum, inter chronicos facile gravissimum, non validis & fortioribus, sed lenissimis & simplicissimis tractandum esse remediis.

THESES THERAPEUTICÆ.

§. I.

Indicationes præcipue & præcipue, ad quæ adhibenda sunt.

Hactenus de scorbutici origine, indole & eventu satis videmus discessisse, nostrum nunc erit ostendere, qua ratione atrox hic morbus commode possit averti tutoque sanari. Sicut autem duplex hic scopus in nullo facile morbo obtinetur, nisi ad arcendas & tollendas ejus causas tam proximas, quam remotas omnem intentionem omnemque remedium energiam dirigamus: ita quoque vix melior scorbutum tum præservandi tum curandi datur methodus, quam quæ removendis ejus causis est dicata. Hæc ipse vero quum in perverso rerum non naturalium, maximeque aeris usu, unico sint querende; siquidem nemo unquam, nisi ab aliis sit infectus, scorbutum laborabit, qui non graves in dieta vitæque regimine errores commiserit: per se pater, ante omnia dietam rite esse instituendam, si causas scorbuti subtrahere velimus. Quod autem ut recte perficiatur, regulas nonnullas dieteticas præscribere ex usu erit.

§. II.

Ad huc morbum.

Maxime omnium habenda est ratio, ut qui ad scorbutum dispositi, vel eodem jam adfecti

sunt, ærem, in quo morbus prognascitur aut fovetur, permittant: quod fieri potest, si à locis insalubribus, ubi aeris fluidum impurum, vaporem, mousque elasticum & pravis exhalationibus & copiosis nebulis refertum est, secedendo ad salubriora se conferant. Spectat hæc aphorismus omni encomio dignissima HIPPOCRATIS Lib. VI. epidem. expressus & à SPONTIO pag. 278. citatus, ubi regionis mutatio in omnibus fere morbis longis utilissima dicitur. Et experientia quoque insignem hanc utilitatem adhuc magis confirmat, qua cognoscimus, quod ii omnes, qui in locis ad scorbutum ingenerandum aptis nati & diutius educati fuerunt, longe melius se habent, si mutata priori statione, loca salubriora, quæ ærem vehunt purum, subtilem & magis temperatum, inhabitant. Neque facile hæc in re accuratior viderem observatores, quam Italos, qui pro valitudine tuenda aliud æstate, aliud autumnum, aliud hieme, domicilium sibi eligunt. Sed Germani, & inter hos ipsi etiam Principes, de aeris puritate parum solliciti, saepe ex locis insalubribus in insalubria concedunt, ibique diu morantes morbosam corporis dispositionem sibi contrahunt. Cuique igitur scorbutico jure commendari debent locis æriæque mutationes, seu itinera ex regionibus septentrionalibus in meridionales, maximeque Italiam, Galliam &c. suscipienda. Quod si vero peregrinandi & locorum impuritatem evitandi commodum deest occasio, aëre aeris fluidum est emendandum, quod ligno juniperi in camino combusto, vel suffragio succini, carbonibus ignitis injecti, optime potest perfici.

§. III.

Quod victum imprimis vitentur cibi difficilioris concoctionis duri, ut sunt carnes annosiores, infumate, salis & quæ rancorem contraherent, pisces marini exsiccati, atque illi cibi, qui austeræ & adstringentis sunt facultatis. Fugiant quoque scorbutici carnes pinguiore & quæ ad putredinem inclinant, itemque dulcia, quæ pro diversitate succorum in primis viis stibulationum vel aciescent, vel lentorem contrahunt, viscerumque infarctus augent. Alia tamen ratio est cum passillis minoribus, quæ ob blandum cum subtili a. ido dulcedinem laxant, emolliunt & acrimonium humorum temperant. Si quid vero præ omnibus reliquis magnam meretur commendationem, certe est accommodata à pleniori victu abstinentia, seu magna in cibis sumendis moderatio, præsertim in subiectis voracioribus, pinguius & sanguineo-phlegmaticis; ideo quod nimia ciborum ingluviæ frequenda plerumque fit pravorum succorum matrix.

§. IV.

Ex potulentis ad nostri morbi generem præferuntur aquæ graves, stagnantes, facile putrescentes, turbide conferunt; quare aquæ potius pure, leves, nec falsedine, nec calcaro terrestri elemento imbutæ, in quibus facile cili coquantur, ad potum debent eligi, & ex his cerevisiæ coqui. Dicit enim vix potest, quantum in locis septentrionem spectantibus in ceant cerevisiæ, ex insalubribus aquis confectæ neque satis coctæ, nec lupulo satis conditæ; quæ, dum facile aciescent & saculentæ evadunt, per minimos viscerum & excretoriorum meatus difficulter transiunt, magnamque insuper flatuum copiam ingenerant.

Peris copiosiores.

rant. Vina quoque austera, quæ multum acidum in recessu solvent, omni modo vitare oportet; contra vero fragrantia & subtili spirita animata, moderate sumta, insignem merentur commendationem. Splendens autem hac imprimis virtute vinum Hungaricum genuinum & minus adulteratum, item vinum Rhenanum bonæ notæ venustum, quod adhuc majoris sit efficaciz, si absinthii, cochleariz, & enulæ essentia vel extracto imprægnatum cum moderamine interdum bibatur.

§. V.

Quoniam simul nimium otium seu deses sine labore vita, minusque somnus, experientia testis, permultum affectus nostri generis patrocinatur, certe nec efficacius, nec certius ad eundem tam præservandum quam curandum exstat remedium, præter sufficiens motum corporisque exercitationem. Etenim, quam continua cordis ipsius & reciproca diaphragmatis ac thoracis actio, qua mediante simul circulus sanguinis per viscera abdominis egregie promovetur, unice vitam fluidorum & solidorum motum sustentat ac moderatur; hanc vero corporis exercitio, sub qua, motu muscularum aucto, contenta in ipsis fluida propellantur, mirum quantum adjuvat: non inquam facturus sum, si corporis motum, universale illud præsidium & remedium appello, quod naturalem fluidorum motionem & solidorum structuram conservat, sanguinis & humorum cursum promovet, purum ab impuro separat, adeoque omnia generis morbos, ipsumque scorbutum arceat. Constatentem hac in re habemus HIPPOCRATES, qui lib. II. de dieta hæc prodidit: *otium humectat & corpus debilitat, labor vero siccatur & corpus roboratur.* Cujus aphorismi ratio per se satis liquida est, & nostram de motus in scorbutum utilitate sententiam non parum confirmat. Nam ab otio omnino tardior fit sanguinis circuitus; unde humidum superfluum non sufficiens per excretoria eliminatum, fibrosas nerveasque partes relaxat: cum è contrario à labore nimis humiditates dissipantur, quibus expulsi usque solidorum incrementi, majusque corpori robur accedit. Neque minus omnia, quæ vires imminuunt, sanguinisque progressum tardiores ac debiliores efficiunt, ut forte sunt nimis vigilie, profundæ meditationes, intempestivæ studiorum causa susceptæ lubricationes, nimia veneris exercitia & crebrior ebrietas, inque primis immoderati animi affectus, ut diuturnior tristitia ac metus, cane pejus & angue sunt fugienda.

§. VI.

Et hæc sunt præcipua in vitæ victusque regimine tenenda momenta, quibus jam alia lenitas & tutiora remedia subungere placet, quæ causis mali scorbutici tam proximis quam mediatis removendis magis accommodata hæc usqueprehendimus. Jam vero in superioribus abunde satis evictum est, sæva illa, quæ scorbutum comitari solent, symptomata, ab ingenti sanguinis dyscrasia sordiumque recrementorum in sanguine & reliquis succis vitalibus accumulatione; hanc vero à tardiori sanguinis circulo & vasorum capillarum in viscentibus & emunctoriis infarctu vel obtusatione dependere. Quapropter appropriata huic malo tollendo remedia co debent dirigi, ut humores impuros salsos, acres,

Frid. Hoffmanni Oper. Tom. III.

sulphureos diluant ac temperent, tenaces, viscidos dissolvant, occlusos viscerum & coloratorum meatus referant, totumque partium nervosarum ac muscularum systema valde debilitatum corroborent. Tali enim ratione liberetur & expeditior fluidorum per omnes partes minutissimisque canalibus circuitus, & abluenda pendens intima fluidi cum solidiorum, blandaque succorum vitalium temperies obveniat quam optime.

§. VII.

Summam humorum dyscrasiam à Medicis, qui data opera de scorbuto scribere, duplici generis statui supra jam diximus; singuli tamen in eo conveniunt, ut pro saluberrima morboe diversitate diversis quoque medicamentis alterantia ce temperantia, quæ partim acido immutando, partim salii volatili sulphureo contento peranso & causticæ acrimoniæ demulcenti inserviant, præscribenda existimant. Quantumvis vero aliquam salium differentiam lubenter largiar, valde tamen ridicula mihi videtur tam diversæ & anxie excogitata eorundem correctio: liquem demonstratum dabo, tantum unicum, eumque tutissimum & experientie magis conformem esse methodum salia morbois cujusunque generis cicurandi, quæ videlicet per conveniendam illud obtineatur; utpote hæc cuicunque tali temperando & corrigendo respondent abundeque sufficiunt.

§. VIII.

Hæc autem virtute imprimis splendet aqua simplex, levis & pura, quæ genuinum omnium salium dissolvens ac menstruum jure dici meretur, in quam, si debito cum regimine debitaque quantitate admittitur, particula cujusunque generis salina, in sanguine & succis oberrans, prompte ac facile se immergunt, ut inde per se le diluantur, mingantur, corrigantur. Sed præter temperantem, quæ pollet aqua, virtutem, adhuc aliam in malo scorbutico exierit efficaciam, dum tenacium viscidorum humorum coagulum dissolvit, atque cæcia vasa & colorata ab impacta viscida materia infarcta & obtusata liberat. Longe tamen præstantior hæc aqua attributa facultas esse deprehenditur, si quoad aquæ puræ, levis ac subtilissimæ insuper adhuc principio quodam vel spiritu minerali & convenienti salii neutrius vel volatilis, vel fixi alcalini copia sunt imprægnata, uti de varii generis acidulis vel thermis, & nominatim quædam de famigeratissimis Carolinis, Egeranis, Selteranis, Wildungensibus, Emmentibus &c. hæc usque observare licuit. Hæc enim communis aqua multo activiores expeditior per exilissimos canalium quævos trajiciunt, colorata promissum subleant, ideoque in obtusationibus relaxandis sordibusque excrementitiis eliminandis excellentiorem præstant energiam. Quæ cum ita sint, nullus dubito adferere, in fontibus totius universali scorbuticæ affectionis præsidium esse constitutendum; maxime cum longa & constant experientia nec in hac sententia adhuc magis confirmat; utpote qui jam per triginta & plures annos non modo ad pertinaces chronicas, maximeque hypochochdras & hystericas passiones, cum scorbutica quadam impuritate junctas perscrutans, verum etiam ad scorbutum jam confirmatum evellendum, mineralibus aquis tam frigidis quam calidis summo cum agrotantium emolumento

K k

tusq

Admodum cor-
poris.

de velle
quæ non
munda.

Indicatio-
nes curatio-
nis specifi-
cæ.

Quædam
hæc aqua
simplicis
est, quæ
admodum
purum.

per aquam
simplicem
puram.

per fontem
selteranum.

378 Cap. I. De scorbuto ejusque vera indole.

usus sum. Longe tamen certior ac præstantior subsequitur effectus, si harum aquarum virtus accuratiori vitæ victusque regimine, & appropriatis medicamentis antiscorbuticis ac balsamicis adjuvetur, & aliquoties talis curatio repetatur.

§. IX.

*Pro Lauch.
Balsoregij.*

Quandocunque vero copia, locus & occasio fontibus his medicatis utendi deficit, sola aqua fontana, puriore & leviori, cura nostri affectus feliciter poterit institui. Magna enim in refractariis morbis debellandis aquarum est efficacia, si modo sint puriores vel subtili, martialis prospicue, elemento imbutæ; id quod cum primis felicissimæ & scorbuti & aliorum rebellium morborum per fontem Lauchfadiensem, quodvis maribus Hala distantem, quotannis infinitæ curationes luculenter possunt ostendere. Continent hæc aquæ subtiliorem maris crocum, quo tonus fibrarum motricium universi corporis relaxatus egregie corroboratur, & hac ratione sanguinis per universum corpus ejusque minima vascula circuitus una cum salutaribus excretionibus egregie promovetur; idque tanto magis, si non tantum interne, sed etiam externe hæc aquæ adhibentur. Unde simul edocuerit, quod antiqui avi Medici, & inter hos potissimum CELSUS lib. II. cap. 9. & SCRIBONIUS LARGUS cap. 32. ad lienes magnos & affectus, qui inde oriuntur, concedendos, potum aquæ, in qua candens ferrum subinde extinctum fuerit, non sine ratione tantopere commendaverint.

§. X.

*Quædam
ex aqua lit.
vel potum*

At vero præter aquas minerales in corrigenda scorbutica acrimonia fere instar summi genii remediis hæc animantium & præcipue asinum, quod etiam antiquissimi medicinae antistes, HIPPOCRATES, GALENUS, ARETÆUS, CELSUS, in suis scriptis ad variâ chronicas maximeque ab acrimonia oriundas passiones vincendas miris encomiis extulerunt ac laudaverunt. Neque defuit ex recentioribus peritissimi Medici, qui idem confirmant, & in scorbutica hæc lac, præcipue asinum, vel serum lactis bubuli aut caprini, ceu summe specificum & appropriatum remedium commendat. Quæ de re DRAWITZIUS, BALTHAS. BRUNNERUS, EUGALENUS, WIERUS, SALOM. ALBERTI, MATTH. MARTINI, qui perinde de hoc nostro affectu scripserunt, legi possunt; utpote qui ad unum fere omnes candide fateantur, sola diæta lactea, vel sero lactis antiscorbuticorum herbarum succo permixto & diutius usurpato, se fere in scorbuto ejusque symptomatibus misigandis præstississe, quam omnibus fere aliis auxiliis generibus: imo etiam molissimum hoc malo tabescentes plus virium inde hausisse, quam ex optimis roborantibus. Neque hujus effectus ratio conceptu est difficilis. Sic ut enim sive illa scorbuticorum pathemata, ut sunt lancinantes & spastici artuum dolores paritque externarum crofiones & exulcerationes, non nisi humorum fæmæ dyscrasie & negotio excretionum naturalium, quæ per cutim, alvum, hepar fiunt, imminuto, neque minus obstruccioni valorum originem debent; ita certe ad meatus oculos restandos, tenaces humores dissolvendos & acres salios contemperandos nihil aptius est diluendis, demulcentibus & fluxiles humores ad transpirationem aptos reddentibus: inter quæ utique lac asinum, quod reliquis dulcius est, vel lactis caprini aut vaccini serum prin-

cipem merentur locum, præsertim quando herbarum antiscorbuticæ, ut cochlearia & nasturtium aquaticum, quæ, præter sal volatile, amarum elementum sœvent, cum eo infunduntur vel leniter decoquantur.

§. XI.

Quandocunque vero cum diathesi scorbutica viscerum infarctus & cachexia, vel affectio hypochondriaca & purpura, quod sæpius sit, conjungitur, tunc melius succedit curatio, si lac cum aquis mineralibus acidulis, tam misioribus, ut Selteranis, Wildungensibus & Tœdtschensibus, quam etiam cum fortioribus, ut sunt Pyrmontanæ, Egranzæ, miscetur & hac ratione sub debito vitæ & victus regimine bibitur, de qua cura saluberrima dissertatio nostra de convulsio aquarum mineralium cum lacte confertur potest.

*Per serum
fœcibus
medicatis
primariis.*

§. XII.

Verum enim vero, præter hæc recensita auxiliorum genera, commemoranda etiam sunt quedam ex pharmaceutico fonte desumpta & imprimis specifica sic dicta antiscorbutica: in quorum numerum non immerito veniant, cochlearia & omnes nasturtii tam hortenstis, quam aquatici species, beccabunga, raphanus rusticianus, radix armoraciæ, sinapi de hujus generis alia, quæ subtilissimo principio salino-sulphureo repleta, intima corporis penetrant, & fluidis pariter ac solidis partibus visatam ingentem mutationem inferunt; siquidem tenaces viscosos humores dissolvunt, fixos acidos exaltant, subtiliorem reddunt, & solidis nimium relaxatis tonum, vigorem ac motum restituendo, vappescientem corruptionem à corpore arcent. Variæ autem ex his simplicibus præparationes prostant & in usu sunt. Quidam enim aquas ex his destillant, quidam spiritus per fermentationem aut abstractionem inde parant. Alii iterum ex recentibus concisis & madefactis succos exprimunt, quos vel per se cochleariat, vel debito cum vehiculo, ut est serum lactis, prostant; alii ipsos cum alimentis miscent & juleulis ac brodiis carnis incoquant, vel cerevisiis in fermentatione adiungunt, imo etiam cum saccharo conservas ex his consciunt; prout nempe diversâ circumstantiarum ratio requirit, quam judiciosus Medicus data occasione debet attendere.

*Specificis
sic dictis
antiscorbuticis
in edictum.*

§. XIII.

Sequuntur jam alia magnificæ fæmæ adversus scorbutum remedium genera, de quibus judicium nostrum exponere placet. Atque hujus generis sunt ex amaris maxime radices gentianæ, cichorei, herbarum scordii, cardui benedicti, absinthii, centaurei minoris, trifolii aquatici; ex balsamicis & roborantibus bacce juniperi, summitates abietis & pini, cortex winteranus, calcarilla, chinæ, capsparum, herbarum scolopendriæ, veronica, marrubii albi, epithymum, radices enulae, zedoariæ, ari &c. ex gummatibus armoniacum, sagapenum, galbanum, ex lignis salisfræ, guajacum, aloes &c. quæ si vel in substantia, vel melius in infuso & decocto, aut etiam in essentiam vel elixiria redacta, congruo tempore, ordine ac dosi usurpantur, vires ad mitiganda symptomata morbumque debellandum exterius insigne; utpote principio, quo gaudent aëvo, blandæ sulphureo, balsamico, circuitum sanguinis deprellum excitant, & intemperiem viscidam & acidam quam optime corrigunt.

*Amara
herbarum.*

§. XIV.

§. XIV.

Hæc excipiunt alia, quæ in nostro affectu non minus utiliter adhiberi solent remedia. Et hæc ejus sunt naturæ ac indolis, ut parum principio blande sulphureo vaporeoso, partim emolliente ac temperate virtute spissius ac doloribus leniendis & sopiendis interserviant: quo nomine à quibusdam auctoribus æxingiæ anamantium re-
Emollientia ac dolori spissius
centes, præsertim humana, canina, medullæ ossium, cremor lactis, oleum amygdalarum dulcium sine igne, sperma ceti, castoreum, alia ferida, extractum millefolii, chamomillæ vulgaris, the-
Diapnoea
riaca coelestis, dialcordium *Fræstoris*, crocus, lumbrici terrestres, rasura dentis hippopotami, ungulæ alci &c. commendantur, ex quibus varia in forma liquida preparari & cum fructu pro diversis morbi, corporis ægrotantis & temporis ratione usurpari possunt.

§. XV.

Diaimus hætenus de scorbuti curatione, quatenus per ea remedia, quæ humores crassos attenuant & incidunt, acres salios contemperant, meatus obstructos aperient & relaxatas partes roborant, debet institui. Jam operæ erit pretium, ut eam de evacuantibus, quorum plane nulla facta est mentio, nostram deprimamus sententiam; idque eo magis, quia ab excretionibus naturalibus, quæ per alvum, urinam & transpirationem, per uterum quoque & venas hæmorrhoidales fiunt, immixtis, vel prorsus suppressis primam nostri mali originem derivavimus. Quod primo itaque loco ad sanguinis millionem attinet, quæ per venarum brachii vel pedis incisionem, per scarificationem aut hirudinum adpositionem perficitur, experientia duce assertum, summa cum cautione & prudentia hoc evacuationis remedium esse administrandum, omnique circumstantiis probe ponderandas. Si enim status est plethoricus, morbus recens, corpus juvenile, & in viris à fluxu hæmorrhoidali, in fa uanis à menstrualis cessante vel sup pressio originem ducit, utique peritus Medicus congruis in locis sanguinem detrahare tuto poterit. Quod si vero, ut in mali progressu sæpe accidit, iteri magis imputi & corrupti peccat cœgia, tum certe emissio sanguinis, præsertim in paulo largiori copia instituta, vires labefactando, plus damni quam emolumentum afferet. Si vero quædam minuendi sanguinis indicatio adest, & possimum dolores, tumores varique partium deformationes talem depletionem urgent, tutissime hæc obtineri poterit, quando sæpius, sed non adeo copiose, vel rectius adhuc per scarificationem sanguis detrahitur: quæ methodus, sicut tutissima est; ita nobis in curandis morbis gravioribus admodum semper placuit.

§. XVI.

Quod attinet ad alia evacuationum genera & quidem purgantia, de his nostra cum aliis peritioribus Medicis hæc est sententia, quod omnibus validioribus exclusis, lenissima tantum in ulum vocare deceat, cujus consensus fuit radix poly-
Laxativa
podii, folia fenugreci, aguricus, rhabarbarum, manna &c. quæ cum speciebus antea recensitis antiscorbuticis debito modo commixta, & per insutum, aut lenem decoctionem usurpata, noxios humores ex primis viis blande & per epicrasin educendo, opem omnino præstant utilissimam. Quæ pertinent etiam pilule polychrestæ balsamicæ
Frid. Hoffmanni Oper. Tom. III.

secundum exemplar Becherianarum, ex alio bene depurata, extracto rhabarbari, herbarum amararum, & temperatioribus balsamicis ingredientibus paratæ debiloque tempore cum vel sine interpolatis pulveribus absorbentibus & salibus digestivis usurpata. Idem tenendum arbitror de diureticis, quorum fortiora propter nimis seri evacuationem in cura penitus repudiare oportet; eligenda vero sunt, quæ leniter viscidos & tartareos humores educunt: quo nomine decoctum radicum quinque aperientium, præsertim petroselinæ, felleri, feniculi, asparagi, quæ etiam ab antiquioribus Medicis, HIPPOCRATE & ASCTATO adhibita sunt, commendari merentur. Idem valet de diaphoreticis, quorum optima sunt, quæ transpirationis vias aperiant flexileque reddunt, & sanguinem ac humores ad superficiali corporis movent; rejectis ita, quæ humores fortiter commovendo & exagitando per nimium sudorem ferum cum viribus nimis subrahunt. Commodissima igitur sunt sic dicta diaphoretica, quæ transpirationem leniter promovere, cujus generis sunt, liquor bezoardicus Bussii, cum spiritu nitri dulci, spiritus tartari, mixtura simplex, spiritus Cornu Cervi succinatus cum tribus partibus liquoris anodynæ mineralis & spiritus co. hlearis permixtus, flores sulphuris, æthiops mineralis, insulsum herbaræ theæ, veronica, cardui benedicti, flordii, florum sambuci, antimonium diaphoreticum, cerussa antimonii, Cornu Cervi sine igne, Cornu Cervi usum, succinum, bezoardicum minerale, regulus antimonii medicinalis, cinnabaris nativæ & antimonii; ex compositis vero pulvis Anglicanus; LUDOVICI, bezoardicus noster, quibus interdu pro circumstantiarum ratione dimidium vel quarta pars grani camphoræ potest addi.

CAUTELÆ ET MONITA PRACTICA.

§. I.

Hic igitur, quæ ad generalem curandi methodum pertinent, expostis, reliquum est, ut specialiohem de certis individuiis proprium cum necessariis cautelis subjungamus. In scorbuto sic dicto calido, qui sub constitutione cholericâ, diata vinosâ & ætate juvenili vigens, ingeniem particularum bisolarum & sulphurearum in massa sanguinea abundantiam supponit, specifica antiscorbutica, sale sulphureo volatili turgida, præcipue cochlearia & ejus spiritus, aliæque volatilia oleosa summa cum cautione offerri debent. Et enim quam salum in sanguine impuro spicula acuendo inque concitatorio motum agitando, symptomatum exacerbationem efficiant, capitis artuumque dolores, anxietates ac lienis inflationes accerferunt, ideoque magis obstricti, quam profunt. Quod si vero cum acidis, ut sunt acetosella, succus citri, aurantiorum, berberum; granatorum &c. ad temperiem redigantur, tutius exhiberi possunt. Ita conserva cochlearia; cum æquali parte conservæ acetosæ mixta & bi vel ter in die, superbibendo aquam antiscorbuticam, adjuvata egregium præstat effectum, maxime si in calidis & binosis subjectis humectans diata, quæ ex læsionibus, emulsionibus amygdalinis; hordei & avenæ decoctis, brodia gallinarum cum lactuca, endivia, acetosa, nasturto &c. parâs consistat, simul conjungatur, & remedia vesicam & alvum leniter subducuntia interponantur. Notandum tamen in genere hoc loco venit; quod cura cum antiscorbuticis herbis & eorum
Cautela circa speciem æstivam scorbuti antiscorbuticæ
Kk 2 succit

380 Cap. I. De scorbuto ejusque vera indole.

succis sive per se, sive cum vehiculo convenienti mixtis instituta satis diu continuari debeat.

§. II.

Quando in scorbuto salia muriatica peccant, sicuti fit in iis, qui catuibz sale conditis fumo- que induratis copiose vescuntur, & ulcera ex- dentia, foetorem oris, gingivaz putridas urinam- que salum & crassam habent, uti maxime in diu navigantibus observamus, tum solum lactis lar- gius & satis diu haustum, nec non poma citria, chionisia, item fructus horai multum præstant utilitatis; cum è contrario spiritusosa & antiscor- butica volatilia damno esse soleant.

§. III.

Craudes sepe numero dolores in abdomine lancinantes, in pectore oppressivi fiunt, qui minime carminativi, vel calidioribus medica- mentis debent tractari, sed juvat tantum liquo- rem nostrum anodynum, vel elixir antispasmo- dicum, ex dicto liquore, essentia croci & ca- storæi compositum convenienti dosi per vices ad- sumere. Præter hæc vero brodia gallinarum cum oleo amygdalarum dulcium & spermate ceti adsumta, serum lactis cum radice altheæ, stori- bus papaveris rhœodæ & lumbicis terrestribus coctum, decocta avenacæ, & chyleres emol- lientes ex lacte addito croco & paxillio callo- rei, omne absolvunt punctum. Non minori opus est cautioe, si, ut sæpe fit, spontaneæ ad- sunt evacuationes e. g. diarrhœæ; utpote quæ le- niter tractatæ magno plerumque sunt levamini, cum contra præmatore cohibeat anxietas car- dialgias, torminosas hypochondriorum inflatio- nes, vitærumque insarctus post se relinquant.

§. IV.

Opia non nisi purgantibus, vel alexipharma- cis correctâ, ad immanes dolores sedandos vigi- liasque placandas, exigua quantitate & tantum bis vel ter exhibere licet, eo potissimum fine, ut vires consuevantur, quas, cessantibus dolori- bus, ægri melius recipiant morboque vincendo sic pares fiant.

§. V.

Topica in doloribus, exulcerationibus & ma- culis plus sæpe nocent, quam prosunt; quod qui- dem potissimum animadvertere licet in arthriti- de vaga, ubi externa sine discrimine applicata, materiam visiosam ad interiora maximeque ner- vosas partes repellendo, gravissima sæpe symp- tomatâ, ut in capite vertiginem, auditus dis- cultatem, in pectore spirandi angustiam, in sto- macho cardialgias, in intestinis lævissima tormi- na, imo nonnunquam horrendas artuum convul- siones, producant. Præstat itaque à topicis tum penitus abstinere, & affectas partes lineis cali- dis involutas in æquali tantum transpirato ser- vare. Quod si tamen nihilo minus ulcera cru- diosa nigra externam possint medellam, imitan- dus est EUGALENUS, qui prudenter monuit, ut, oculis omnibus acrioribus, leniora solum, quæ ex vitello ovi, myrrhâ, olivano, croco, oleo ro- sanum, balsamo Peruviano &c. parantur, in usum ducamus. Scorbuticis quoque, si jam ni- mia & ad corruptionem tendens humorum im- puritas adest, magna cum cautioe scarificatio unperanda est, ob gangrenæ metum, quæ aqua calis vivæ cum spiritu vini camphorato & oleo ammoniaco exaltata optime potest averti.

§. VI.

Ubi summa humorum adest corruptio, tumo- res & inflammationes quam facile in ulcera ab- eunt rebellia, quæ non parum negotii & mole- stiarum medentibus & agrotantibus facessunt. Ubi corpus siccum & sensibile est, ob dolores & spasmos facile sunt febres carmen viresque con- stantes; ubi spongiosum phlegmaticum & pin- gue, in puridam humores corruptionem desin- nant, quæ instar sphaceli serpit & progressu tem- poris summam, imo fœnalem virium prostratio- nem producit. Quapropter prudens Medicus non tantum appropriatis & convenientibus externis, sed potissimum internis sanguinem depurantibus, & purcedini resistentibus remediis prudenter de- bet succurrere. Cavere quoque & Medicus & Chirurgus debet, ne nimis cito & mature tumo- res inflammatorios ante sufficientem suppuratio- nem aperiat: cito enim in gingivis & humi- dis putrida nascitur corruptio.

§. VII.

Ad gingivaz putridas & sanguinolentas tam depurandas & consolidandas, quam ad dentes vacillantes firmandos, nihil reperi præsentius, si- balismo vitæ nostræ compositionis, si hujus una pari cum trious partibus syrapi aurantiurum re- mixta giogivis illatur. Hoc autem deficiente essentia succini, myrrhæ, spiritus vini campho- ratæ & spiritus salis dulcis cum melle commo- de possunt substitui. Lenior quoque scarificatio in tali casu sæpe prodest, ut inde materie intus contentæ ichorose paretur exitus: nec opera lu- diur, si in tumore ghigivarum sanguinolento, unguentum ægyptiacum cum melle rosato & spiritu cochleariæ remiserum, vel gummi lacæ & spiritus cochleariæ externe applicentur. Interne vero decoctum raphani rusticiani ex lacte, vel cerevisia cum strobilis pini cocta usum afferunt desideratissimum.

§. VIII.

Quando mitigatis symptomatibus morbus jam inclinare & à ferocia sua videtur remittere, MAT- theus MARTINI Tractatu de morbis mesenterii apprimè utilia censet balnea aquæ dulcis pluvia- lis; quæ diutius, & quidem ex admonitione FERNELII observat. 44. per decendium & ultra continuare jubet. Neque facile reprobare audeo saluberrimum hujus viri consilium, præsertim cum de proficuo balneo non in scorbuto usu cer- tionem me reddat Clarissimi VOLCKMANNI Se- nioris observatio in Decur. II. ann. VI. M. N. C. repetunda, ubi vir hypochondriaco scorbuti- cus balneo ex aqua dulci, cum herbis emollien- tibus decocta parato, manet & vesperi adhibi- to, post triduum ad se rediisse & vires receptisse dicitur. Aquæ vero balnei, gravissime sustend- innatavit laborum nigricans crassa cum acredine, quæ indices majora fuisse incrementa. Ad tu- mores duros & dolorificos pedum crurumque emolliendos ac discutiendos balneum ex herbis antiscorbuticis betaburgæ, nasturtii, cochleariæ & succi expressione refectus, ut & ex summiatibus abietis & pini paratum crebriusque adhibitum summe proficuum deprehendi.

§. IX.

Ego vero hoc unicum tantum habeo, quod cir- ca utrum balneorum tam naturalium, quam artifi- cialium moneam, ne primo unquam adhibeantur,

Circa re- mittere & inflammato- riam.

Circa pu- gnatibus & agrotantibus, si- balismo vitæ nostræ compositionis, si hujus una pari cum trious partibus syrapi aurantiurum re- mixta giogivis illatur.

Balneo- rum usus

Circa bal- nea tam naturalium, quam artifi- cialium moneam, ne primo unquam adhibeantur,

si jam putrida quadam humorum corruptio in partibus externis conspicitur; dein, ne justo calidiora sint & corpus ad multum sudorem disponant. Sequuntur enim exinde, pressio quasi pedis, summa artuum lassitudo, susus intensio, cordis palpitantes & cephalalgiae; quibus si quis per potum frigiditatem alique refrigerantia succurrere velit, periculum est, ne tonus ventriculi & intestinorum minime inde destruat.

§. X.

Multi scorbuto detenti, scribit MARTINI loc. cit. durante curationis tempore, parum vel modicum tantum sentiant emolumenti, dimissis vero Medicis & medicamentis, sanantur: natura enim ex medela debilis reddita, recuperatis post curationem viribus, ad morbum vincendum magis valet. Quod quidem monitum sui jam tempore antiquiores Medici probe agnoverunt & eo utilissimum monitum in variis morbis tollendis commendatum. Unde ARTIUS lib. II, fern. 2, cap. III. & RHASES petres interdu septimanas à medicina abstinendum suadent; ANRETUS vero, cedentibus Medicis, multos morbos sanari adierit. Quam insignem observationem ego ipse saepius in multis chronicis affectionibus, praesertim vero in hypochondriaco & scorbutico malo depellendo certissimum deprehendi. Valet enim & semper valebit elegantissimum CELSI dictum: *optima interdum medicina est, medicamentum non uti.*

ENARRATIONES MORBORUM.

OBSERVATIO I.

*Scorbutus
genuum
spicem.*

Femina honesta quinquagenaria, sanguinis & pinguedinis plena, naturae sensibilioris & ad iram procivis, sub vitae genere immobili victum duorem saltem, ut sunt carnes & pisces insumari, nec non fructus horarum, quos jam mane ingerebat, admodum habebat in deliciis. Potus erat cerevisia valde saturata, plenusque sacculenta; cujus noxam avetere cogitabat viro acido, cum sacchari portione remitto: somnum habebat largiorem, sed turbulenter, & animum magna affectuum intemperie perpetuusque fere cupa distractus. Menstruæ purgationes jam à trigésimo quarto anno cessarant, à quo tempore singulis annis venæ sectionem admisit, jam vero per triennium omisit, unde varia eoque graviora experta est pathemata, qualis sunt ingens praecordiorum anorexia, spiratio ægerrima, continui sudores cum impetu interdum ex ore erumpentes, & phlogoses post passum faciem infestantes. Praeter haec de acuto dolore & ardore circa praecordia, noctu potissimum conquirebatur: maculae quoque flavae hinc inde in corpore dispersae & praecipue in facie & hypochondrio dextro conspicuae cum languore totius corporis apparebant, imo demum pedes tumor cum dolore intolerabili occupabat. Enim vero contra hunc affectum varia praescripta sunt remedia, ut ex volatilibus, Ispiritus cochlearis, sal volatile Sylvii, liquor Cornu Cervi succinatus; interpolans quoque fuit usus apotematum, ex leniter evacuantibus & sanguinem depurantibus confectorum, à quorum uso quadammodo melius habuit, ut surgere de lecto & ad consueta redire negotia poterat, remanente tantum insigni manuum pedumque stupore. At quem anno sequente mente Februario sub auribus & plevrosi costis tempellate, vini emulsi

Frid. Hoffmanni Oper. Tom. III.

potui supra modum fere indulgeret, non ita multo post sub mammis & axillis pusillae erumpentes ardore & pruritu molles, quae succellive coeuntes concredebant, cutem ardebant & exulcerationes cum taeda putredine effluiebant. Haec jungebatur febris, quae circa vespertim nulla novam pustularum eruptionem, continuam sitim, sonni defectum, pusillum celeritatem & frequentiam, saturatam rubicundam urinae colorem, pertinacem alvi adstrictionem, & cruciatus propter ardorem intolerabiles fere inducebat. Pustulae aliae, magnitudinem ovi gallinae, vel fensui luctant inflati aquantes cum sibilu quasi flatu, (ut exprimebat agra) è corpore erumpentes, tunc erant transparentes & inflati illarum, quae per ambulationem excruciantur, aqua repleta; unde etiam acu vel fuscipe apte insignem ichoris putridi ex viridi luridi, cum substratum arduentis fundebant copiam; aliae contra minores subobscuri nigri videbantur coloris. Sedem habebant vagam: siquidem non modo thoracem, abdomen & artus, sed faciem quoque, imo nasi & faucium interiora obsidebant. Medicus consultus nihil quidem, quod ad impuritatem humorum emendandam, ad viscidos & lutos humores temperandos, & dolores lenandos conferre praestitisset, omisit; pustulas quoque, quae circa vespertim quotidie prodierant, postero die mane aperientibus, iisque pulverem exsiccatem, ex lapide calcaninari, tuta, Cornu Cervi usso & maltitice compositum inspergendum curavit; sed impedire non potuit, quin novae singulis diebus pustulae, non quidem in pristinis, sed vicinis locis rursus protuberassent; donec tandem post mensis decursum, vi morbi deservescere, omnia in melius convertentibus & agra sensim paulatimque convalescebat. Per aestatem, quae sequebatur, bene valebat, praeter quod licibus humida manus infestaret. At vero, quum palato rursus nimium indulgens fructibus horae se nimium replebat, nec ab iracundiae affectu sibi temperabat, denovo febrili recurrebat aestus, sub quo, ut antea, à vespere ad medium usque noctem pustulae cum magno ardore molestissimaeque pruritu emergebant. Per medicamenta temperantia, acidula, diluentia lenaque disposita & anodyna denovo agra per dimidium fere anni se à molestissimo hoc affectu liberam videbat, donec tandem ira iterum commota, cui frigidum potum superingererat, pristinam accerebat tragicordiam.

Epitipsis.

Morbis hic pustularis rarissimus omnino paulo accuratius meretur evolutionem. Si ex verbis GALENI, CELSI, & AVICENNAE, qui quam optime fontes curis exulcerationes pustularumque species descripserunt, consulas, apparet, vesicas illas magnas, in nostra agra phlyctenas esse nominandas, quibus deinceps vesiculae minores nigricantes, epinichides se intermiscuerunt. Ante omnia vero probe notandum est, humorem illum aequalem, qui insigni quantitate ex vesicis stillabat, mox in gelatinam concrevisse, cujus portio cochleari indita, admodum leniori ignis calore in ossem albam inflat albuminis ovi cocti coibat; unde patet, illum ipsum ex fero salio excrementicio cum nutritia lymphae commixto consistisse. Idem contingit cum humore, qui ex vesicis post adhesionem vel cantharidum applicationem fundi solet. Quemadmodum

Kk 3

vero

vero ab igne, vel fide cantharidum acerrimo dissoluta cutis vascula talem humorem fundunt; ita quoque salia corrosiva indolis, in corpore humano ex vitioso victu enata & febrili aestu ad habitum corporis propulsa, rodendo ac lancinando fibras ac vascula, eadem phenomena excitare possunt. Quod circa vesperam precipue paroxysmus redierit, hanc vesperam ratio, quia omnes morbi, qui à salina acri materia foveantur, ut catarrhales febres, magis de noctu, quam de die infestant, quoniam tunc minus expedita, sed valde tarda ac lenta sanguinis ad exteriora est progressio & respiratio difficilior. Surrexit vero malum ad usum vini enulati, quia hæc radix acri volatili sulphureo elemento imbuta fortiter sanguinem commovet, & ad superficiem propellit; hinc etiam inter sudocifera & alexipharmaca principem sibi locum vindicat. Primam hinc malo originem præbuit mala diæta; utpote in qualitate & quantitate tam esculentorum quam potulentorum graves committi sunt errores. Quo magis enim à dulci & temperata indole alimenta decedant, eo impurior & minus naturæ congruus chylus, qui sanguinis materia est, conicitur; quo vero sanguis crassior est atque impurior, eo majori cum difficultate per debita colatoria, præsertim sub deficiente corporis motu & exercitatione animique pathematum intemperantia, depuratur. Accedit in præsentis hoc casu, quod anno trigesimo quarto menses jam emanerint; unde mox pressio pede primo nimis humorum in vasis accumulatio, & hanc postea cacochymia sequuta est, præsertim cum consuetæ venæ sectione fuerit omissa. Recte enim scribit PRIMEROSIUS lib. III. de morb. mulier. cap. V. pag. 176. *Mirum non est, mulieres, quibus in juvenute menstrua superflua fuerunt, tandem, si prava vitæ ratio accersita, ætate ingravescente scorbuti affici. Cerebrior hujus affectionis recursus, me iudice, non aliunde, quam à prava diæta debet deduci, quod fit, quando morbus ejusque causa, quæ in hoc casu in vitio viscerum maxime sita, non integre fuit sublata & agri illis rebus, à quibus morbus originem sumit, quæ inter prava victus ratio potissimum valet, rursus inhaerent. Inprimis vero noxæ ægrotæ insensæ admodum fuit, malumque de novo produxit impetuosius iracundia affectus. Hic enim primo per se sanguinem intensissime commovet, & febrilem quasi accessionem efficit, quæ cum magna vi humores ad exteriora propellit: dein sub ita ordinario biliosus humor magis commovetur, magnaue copia in intestina effunditur; unde inclinat ad vomitum, oris amarities, nausea, constricção sub scrobiculo cordis, & alia mala proveniunt. Si vero deinceps vitiosa bilis ipsi sanguini admiscetur, naturalem ejus crasim, quæ temperata esse debet, vehementer inquinat, & in fermentum quasi ac feminium morbosum convertit. Quod ad curandæ methodum attinet, recte Medicus à fortioribus, sive per sudorem, sive per alvum & urinam evacuantibus abstinuit, sed lenioribus tantum usus est remediis, quæ turbas non movent, nec malum exacerbant. Ego in ejusmodi casibus præmissa, si vasa turgescant, venæ sectione & præmissis lenioribus laxantibus sanguinemque depurantibus, summo cum fructu commendaui potam aquarum mineralium vel cum, vel sine lacte, conjuncta simul accurata diæta victusque ratione, & elixir balsamico temperato post passum sumto insinuant. Quod si vero occasio ejusmodi aquas utendi defuerit, serum lactis caprini acidulanum,*

cum succo herbarum antiscorbuticarum minum & exaltatum ad mensem & ultra subsistere jussi. Quod ad externas amines, si vesiculae fuerint apertæ, linimentum, quod alias contra ambusta celebratur & ex oleo lini, albumine ovorum, croco, cerussa & pauillo sacchari saturni compositum est, provide applicari potest. Probe enim hoc loco notanda est cautela, in perfusione pulveris exsicantis ex bolis & terreis confecti in talismodi cutis erosæ affectibus non semper adeo tutum ac fidum relinquere effectum, partim ob id, quod, gelatinoso illo succo glutinis in formam conijcto, transpirationem penitus impedit, partum etiam, quod à tergo effluenti materie nullum permittat exitum; unde hæc conclusa & mora peior reddita, ulterius serpendo subnexas partes corrodit.

OBSERVATIO II.

Fœmina XXX. annorum vegeta, sanguine & succis plena, per longum abhinc tempus vitam egit sedentariam, & largiori ciborum, valde nutrientium fructuumque horarum comestione admodum est delectata; nihil tamen unquam molestiæ inde persentientia. Interea quum aliquando graviori, eoque diuturno afficeretur motore, mox mensium fluxus, satis aliquot copiosus, succedebat pariter, noctes ducebantur inotmes, & inopinato in cruribus maculae, vixit manus late emergebant cereulæ, imo paulo post universi corporis superficies pustulis suffundebatur rubicunda, sanguinem & acre serum stillantibus. Præter hæc, tota cutis squamosa supra modum erat sensibilis, adeo ut vel à levissimo aëre frigidiore afflatu summæ perciperentur anxietates, cum contra paulo calidius regimen ingentem exciabat pruritum. In artubus quoque noctu exquisiti lævebant dolores, sub sudore plerumque ingravescentes: urina ad livorem & nigredinem accedens secedebat crassissima, ex ore sator exhalabat vix tolerabilis, & caro gingivarum relaxata putridoque fœtore oleo nonnunquam sanguinem fundebat nigrum pessimeque olemens. Ego itaque in consilium adhibui primo præscripti decoctum ex radice chinæ, sarsaparillæ, rasura ligni sassafras, herba veronica & scorbuti confectum, cujus largam ægra copiam singulis diebus mane cum salis volacilis oleo guttis sexaginta debuit adsumere, lenemque postea sudorem in lecto expectare: ubi tamen ceu peculiare phenomenon attendendum est, quod à salis volatilis usu per duos tantum dies continuato, urina turbida cum sedimento mox in limpidam croream fuerit mutata & postea, eodem medicamento vel parcius dato, vel plane seposito, statim turbulenta urinae crassities redierit. Quæ cum animadverterem, hanc medicinam bis vel ter in die suavi repetendum, & interdum hujus loco spiritum siliæ & viroli dulcem substituentum. Ante decubium ordinavi pulverem ex lapidibus cancrorum, cerussa antimonii, succino, castoreo, niro & cinabari compositum, & bis in hebdomada pilulis polychrestis balsamicis, mercurio dulci remixtis alvinae fordes evacuandas statui. Nec me frustrata est hæc medendi methodus. Siquidem ægrotæ per mensem his medicamentis usa, subjuncto balneo, pristinae sanitati ex voto fuit reddita.

Episcipia.

Præsentis hæc affectus scorbuti pustularis nomen
jure

Scorbuti
pustulae
in pinto-
ritas ad-
mone-
re.

eorum M-licium ausu se sibi ipse consolare
 et diceret, ex scriptis meis dieteticis, quæ
 legibus, id cepit consilium, ut omni vi-
 cerevisis sepositis, nullique in victu sal-
 uti aculis cibis, aquam puram fontanæ bi-
 beret. Quo consilio per longius temporis spatium
 libenter et commode sibi præstitit æger, ut in-
 tra se- mensum decursum ab omnibus, quæ no-
 tionem inuolunt, symptomatibus liber evaserit; præ-
 ter quod molestus ille pruritus, atque mollities
 de tumor cum æstu de dolore pressorio circa os
 factum adhuc nonnunquam invaderet. Metu ita-
 que nullulæ adhaerens meam implorabat opem;
 quoniam ego hocce ferebam consilio, ut potum
 aquæ communis continuaret, interdum aquam mi-
 nerales, vel sero lactis uteretur, bisque vel ter
 io anno venam pedis secundam præbeat de per-
 mennis aliquot elixiri mei visceralis usum sibi
 post prandium commendatum habere. Quo in-
 stituti recti vitio succurreretur, si quentem aquam,
 quæ ad partem adfectam eluendam de & putre-
 dendi elefendandam præcari solet esse effectus, com-
 muni. *Recepte myrrhe electa drachmas duas;*
cortex lentis in aqua spermatæ ranarum vinctus
quatuor; colature adde sacchari saturni, lapidis
medicamentosi Crolii ana drachmam dimidiam.
D. Et enim in eiusmodi casibus sæpe extimo cum
 fœcula præcipitum unguentum ex olei vitello-
 rum ovorum, injuncti de linaria ana uncia una,
 tinctura parata, plumbi usi ana drachma una,
 olei Præparati gutta quindecim constat, non
 dubitavi sed sum pariter hæc ægroti commen-
 davi, ut eodem pariter indulgentem sæpe obline-
 ret. Nec me frustra elu hoc methodus; liqui-
 det inde ægrotus egritudine sensim levamen, ne-
 que amplius de plena convalescentia desperat.

Epicrisis.

Præsentem ægrotum inter scorbuticos esse nu-
 trerandum, ex variis, quibus jam per decennium
 obnoxius fuit, pathematibus licet argumentari;
 utque quæ singula scorbutico salinæ de visci-
 dam humorum diathesi satis superque produnt.
 Peculiare tamen de non omnibus similiter pro-
 prium symptomata habendum est venarum hæmorrhoidi-
 alium intransigentia, quam sibi æger lauto
 multumque sanguinis ingenerante victu, vita ob-
 literarum studia sedentaria de nullis sanguinis
 alutis evacuamentis sine dubio contraxit.
 Quod si enim à pleniori victu sanguis subinde
 magis magisque accumulatur, non potest non
 sub motus defectu de languidiori excretionum
 succellu spiritior evadere longevæ difficultatis per-
 totum corpus, maxime vero per ieni ventris vis-
 cera circumagi; unde non modo in his, sed etiam
 potissimum in vasis hæmorrhoidalibus, ob diffi-
 cultatem à perpendiculari regressum, stagnat
 de denegato ibi exitu tubercula produci, quæ cer-
 to providam tam externam, quam internam
 potulant opem. Illam optime præstant remedia
 à nobis supra præscripta; hanc vero à dilu-
 entibus de acrimoniam sanguinis temperantibus per-
 bene licet expectare. Et prospectio miranda est
 solus aquæ communis, vel minerali principio
 inbutur, in tali malo effectus, ut ideo veritati
 contra mania deprehendatur, quæ superiori fo.
 VIII. curatio de aqua excellentissimo scorbu-
 ticorum remedio fuisse docuimus.

OBSERVATIO V.

Vir generosus, XL. annorum, habitus cor-
 poris carnosus ac robustus, temperamenti ad me-
 lancholicum accedentis, ante quindecim circiter
 annos Rosiochii studiorum causa degens, ob
 dietam insuetam de paulo calidiores, autum-
 no in febrem incidit tertianam pertinaciorē;
 quæ demum curata quum ad pristinum vitæ ge-
 nus, dietam nempe salubrem de duriorē, reverte-
 batur, pathematibus hypochondriacis de co-
 nominibus hæmorrhoidalibus, tempus de ordi-
 nem non servantibus correptus fuit. Mutato de-
 inde vitæ genere sedentario in magis mobile,
 diu ab istis molestiis victi immunis, præterquam
 quod per verum de autumnale tempus catar-
 rali faucium defluxione de tussis humida labora-
 verit. Quum vero aliquod tempus post vitæ mo-
 tus experti amnicque affectibus, præsertim itæ,
 plus iusto indulsisset, nec venam, uti alias sue-
 verat, tundere curasset, factum est, ut gravibus
 symptomatibus, ingenti languore de lassitudine,
 doloribus artuum gravatiss, nucham maxime
 noctu infestantibus, alio adificiis, quæ vi ter-
 tio die suum exsequeretur officium, plenaria ad-
 pectus prostratione, oris siccitate, vertiginosa
 capitis debilitate, auriumque tinnitu adficeretur.
 Inter hæc pulsus erat languidus ac durus, urina
 pauca de rubicunda, de sudor de noctu largissi-
 mus, sere colligatus cum ingenti fœtore pro-
 fundebatur. His accedebat memorabilis acerbis
 de quasi ardentis doloris species, qui certum tan-
 tum locum, proli magnitudine circumscriptum
 io lingua occupabat, cæterisque intervallis, maxi-
 me si dolor in nucha silebat, suam habebat exa-
 cerbationem, ut ideo æger coactus anxie multo-
 rum Medicorum imploraret opem, qui plenum-
 que calidioribus stomachicis, acrioribus purgan-
 tibus, pulveribus nitro, de diaphoreticis, à qui-
 bus semper largus manabat sudor, ut de decoctis
 temperantibus de venæ brachii incisione dirum
 hunc morbum oppugnabant quidem, sed plane
 non mitigabant. Ego igitur in consilium simul
 adhibitus fuor fui, ut æger circa vernale tem-
 pus, corpore prius per insulsum manatum à for-
 dibus purgato, fontem Selteranum mane ad men-
 suras prope duas, inter cibos vero pro porta
 ordinario ad mensuram dimidiam cum quarta vini
 Rhenani parte remixtam per aliquot septimanas
 biberet, singulis diebus aliquot horas ante vel
 post prandium sub clementi coelo morum corporis
 equitando infliceret, circa somni tempus pul-
 verem præcipitantem leniter nitrosium, de inter
 prandium elixir meum balsamicum, cum spiri-
 tu cochlearie saturato animatum ad LXXX.
 guttas adsumeret. Nec me sefellis hæc lenissima
 curandi ratio, ut potius hæc remedia per sex
 circiter hebdomadas adhibitis generosus æger ab
 omnibus istis gravioribus symptomatibus sensim
 paulatimque fuerit liberatus.

Epicrisis.

Plura sunt, quæ ex præfata morbi historia in
 usum prædictum possunt converti, quorum præ-
 cipuus hic recensere operæ erit premium:

1) luculenter apparet, ex febre intermittente,
 vel alio quocunque morbo convalescentis, si
 posthabitis bonæ diætæ regulis statim majorem
 ciborum copiam ingerunt, in alios chronicos
 adfectus facile incidere. Ratio hæc esse videtur:
 quod

quod robore ventriculi & intestinorum destructo viribusque à pristino morbo consumis nimia alimentorum copia non rite potest subigi & in bonum chylum converteri; unde ingens cruditas fit proveniens, qui dein novis morbis & ingignendis & alendis causam materiemque suppeditat largissimam.

2) Addidit licet, quod hypochondriaca affectio in juvenute contracta diu quidem filere, accedente tamen perversa diæta, vita & viciis experire, affectuumque intemperantia facilius possit resuscitari, quam quidem in iis, qui tali morbo nunquam laborarunt.

3) Illud quoque notatu dignum est momentum, quod rebella scorbuticus morbus tam brevi temporis spatio tanta cepit incrementa viresque adeo prostraverit, ut omnes fere functiones corporis inde læsæ apparuerint. Quod quidem in præsentis ægroto conceptu non adeo est difficile, cum sub statu corporis plethorico, excretionibus per alvum & cutem suppressis & continua adfectuum intemperie fieri aliter non potuit, quam ut tota sanguinis & humorum massa in dyscrasiam & inquinatam, foetibus excrementis salino-vitida referatam brevi degeneraverit. Denique

4) Et hoc observari meretur, quod scorbutica, acris caustica indolis materia sæpenumero tantum certam corporis regionem, uti in præsentis casu certam lingue partem, occupet vehementiusque affligat, non aliter, sicut fieri nonnunquam animadvertimus, quod in nonnullis molestus doloris, ardoris aut frigoris sensus definitam capitis portionem, e. g. lynciput, occupat, tempora &c. reliquis salvis insenset, vel etiam in oculis, nucha, tibis suam exerceat tyrannidem. Ubi tamen peritæ & fundata ratione monito, quod in ejusmodi doloribus topica, ejusque etiam sint generis, patum efficiant, imo potius obstant, nisi prius internis massa humorum sit correctæ, & sanguinis cursu ad emunctoria, præsertim vero ad cutis cribrum restituito, corpus ab impuris succis liberatum: quod optime per corporis exercitationem, debitum aquarum mineralium usum, aliisque temperatioribus remediis perbelle obtineatur.

OBSERVATIO VI.

*Subvenio
suppressionem
menstrualem.*

Vir XL. annos natus, habitu corporis spongioso, qui apprime sanguinis & succorum accumulationi faveat, donatus, ex loco, quo vini & cerevisiæ potui adhierebat cibique crassioribus & fumo induratis usus fuerat, ad nos circa hiemem se contulit. Adproinquante vere doloribus infestabatur rheumaticis cum febre juncis, quibus successu temporis appetitus prostratus, spiritum copiosum, ardor & dolor in faucibus, tumor & pustule indolentes in lingua, quæ sponte apertæ carnem exedebant & cavitationem ibi ulceratam efformabant, sese adlociarunt. Ad graviora hæc symptomata profliganda Medicus interne sanguinem depurantiæ & exterius linimentum, ex spiritu vini, myrrha, massiche, radice tormentillæ & mercurio præcipitato compositum, nec non pilulas mercuriales eo cum effectu ordinabat, ut brevi post non modo ulcus lingue profundius serperet, sed & ingens pituitæ, pessime olentis copiam ex ore foetido nigritque dentibus oblitio dies noctesque effunderetur, quæ omnia ægrum adeo cruciabant, ut nec solidi quicquam deglutire, nec loqui, nec etiam

formam capere valeret. Alius simul consulebatur Medicus, qui non minus liquorum decoctis, lenioribus purgantibus, theriacalibus, sulphureatis, balsamicis & subadstringentibus tam internis quam externis vim morbi frangere conabatur: sed irrita erant omnia, ut potius non tantum per quatuor fere menses idem permaneret status, sed & postea omnia in pejus ruerent symptomata. Somnus enim aderat plane nullus, febris & anxietas præcordialis noctu majore furebant incrementa viriumque robur magis magisque labascebat. Præterea urina per totum morbi decursum pauca erat & rubicunda cum sedimento lateritii coloris, & quod mi moratu dignum est, si ulcus lingue sub balneis-oreum ulu melius videbatur, minusque pituitæ per os fiebat ejectione, non modo præcordiorum anxietas, sed & dolor sinistri lateris, ubi ulcus erat, augebatur; cum contra, manante iterum materia foetida, interdum cum sanguine mixta, leniora apparebant symptomata. Materie ex lingua ejectæ permagna erat quantitas: siquidem circa finem morbi intra aliquot horas plus quam mensuris exspuebatur. Nec denique reticendum est, quod demum in sinistro latere circa aurem glandula parotis cum dolore ac insigni duritie innumuerit; unde aucta indies virium dejectione auctoque febrili æstu miser ægrorum à morbo superatus aliquot hebdomadas post diem obiit supremum.

Etiætiæ.

In præsentis hoc casu inter alia notari meretur ulcerosa lingue corrupeio, quæ rarius quidem in libris Medicorum occurrit; à me tamen sæpius iterumque observata est in ejusmodi hominibus, qui scorbutica humorum dyscrasiam infecti dentes vacillantes, gingivæ erosas cruciatuque habuerunt, & inter massicandum inopinato quodam moru linguam vel leviter lacerarunt. In his enim sicut ordinario sanguinis & humorum impetus ad caput præcipue est directus; ita hic, accedente quadam causa externa, facile potest augeri & sic certe parti, e. g. lingue laud leve vitium afficari: quod si quis verum tum mercurialia vel interne velit præparare, vel extreme affectæ parti applicare, oleum cammino plus addet, quam detrahet. Nam regulæ instar præstare tenendum esse arbitror, mercurialia prospiciat medicamenta, utcumque etiam præparata & adhibita in scorbuto tantum non semper maximo esse nocumento. Longe vero certius graviusque nocere solent in vitis dentium & lingue scorbuticis, quia sanguinis & lymphæ ad has partes affluxum, qui per se satis magnus est, augendo, plerumque malum gravissimum & vix ulla medicina superandum accendunt; idque eo magis, quoniam certa experientia fide constat, quod omnia lingue, seu partis spongiosæ continuæque salivæ affluxu machilæ ulcera difficiliora sint curationis, dum ibi escicantia & absorbentia penitus sese sua privantur energia. Quæ omnia igitur quam in præsentem ceciderint ægrorum, mirum esse non debet, cur morbo ferendo & vincendo impar factus animam efflaverit.

OBSERVATIO VII.

Vir L. annorum illustrissimus, habitus corporis spongiosi valdeque obesi, vitam agens

*Scorbutus
cruentus
lub*

sub
laute
ple-
niori

sub laute pleniorique diæta non tam sedentariam, quam curis gravissimam molestem, ante aliquot abhinc annos primum scorbuticis vexari cœpit patientibus, ita ut gingivæ tumide ex fœtidi sanguinis funderent, dentes maxillæ sinistræ vacillarent, & æger, quod notabile, fœtidæ linguam inspersæ sensationem, præsertim post pinguium elum perciperet, quæ loquelam quodammodo interciperet videbatur. Ad hæc igitur mala tollenda varia extrinsecus roborantia, adstringentia & corruptioni resistentia, ex internis vero decocta antiscorbutica sunt commendata; unde tumor quidem cum sanguinis profluvio evanuit, ex denubis vero vacillantibus materia quedam alba, ibidem collecta paulatim permanavit. Non ita multo post recurrit cruenta gingivarum sinistræ lateris intumescencia, & abscissus in anteriori maxillæ superioris incisore formatus ichthiosorum fœtidæ materiam, quæ cohibita ad maxillam dextram scriptis, ibique tumorem & dentium relaxationem induxit. His ita constitutis Medici iterum externis roborantibus, balsamicis, & interne sero lactis, cum cremore tartari & herbarum antiscorbuticarum succis parato molliora hæc symptomata profligare contendent; nihilo tamen fecius fœtidiosum materiam viscidæ, odore desinitæ, stillicidium continuavit: quare ego consultus, singulis probe ponderatis intellectis, frustraneum fore omne curationis negotium, nisi morbi fontes, quem in corpore hoc plethorico ciborum valde nutrientium usus subministrabat, penitus subtraheretur. Suavis itaque fuit, ut illustrissimus æger per mensem & ultra cura per abstinentiam sive medium hoc modo uteretur: præmissa venæ sectione, alique foribus per infusum vinolum, ex rhubarbo, radice arti. pimpinellæ, cichorei, agarico trochiscato, corticibus aurantiorum & passulis confectum leniter evacuat, in retracta portione carnes magis assatas, quam coctas panemque bis coctum debuit comedere, iucula pinguiora aliisque nutrientia vitare, & post ordinario decoctum ex rasura ligni sassafras, lentis, radice cichorei & paulillo cinnamon; substitueret, idemque mane, ad lenem sudorem movendum, calide in lecto haurire. Ad robur ventriculo conciliandum cum chylum ingenerandum commendavi elixir meum viscerale balsamicum, finita mensa cum vino capiendum; externe vero consultum duxi, ut à Chirurgo artis perito dens affectus eradicaretur, & ad putredinem arcendam liquamen myrtæ cum brodio corticis aurantiorum gingivis illineretur. Dentium vacillantium confirmationi prospectum fuit essentia terre catechu, cum essentia balsami Peruviani brodioque corticis aurantiorum permixta; & ut impetus humorum ad superiora præhæberetur sanguisque æqualis circuitus per caput promoveretur, spiritum nervino collum & tempora inungenda curavi. De eventu autem morbi hæc scire expedit. Evulsione densis non opus fuisse comperi, sed leniori tantum gingivarum scarificatione ordinatiusque remediis ex voto ægrum convalescisse.

Epicrisis.

Scorbutus hic modo fuit incipiens, & à nimia sanguinis & succorum abundantia, sub plethorico lauteque victu accumulata originem duxit. Quod si enim homines sanguineo-phlegmatici, seu laxiori fibrarum ac valorum textura præditi multos nutrientes cibos ingerunt, non potest non

inde sanguinis copia valde augeri, quæ vasâ supra modum distendendo, hæc imbecilliora reddit, debitoque fluida propellendi robore privat: unde sanguinis spissitudo, & dein sub languidiori excretionum successu ejus impuritas; ex hac vero ipsa scorbutica lues oritur facillime. Si quis itaque scorbuto, à tali causâ suborto, præsertim vero symptomaticæ gingivarum affectioni in præfenti hinc casu recte velit succurrere, parum profecto medicamentis internis, multoque minus externis proficiet, nisi superabundantem succorum copiam subtrahere, totumque fibrarum systema relaxantem roborem satagat: quod quidem in ejusmodi subjectis sanguineis & spongiosis corporis habitu donatis non solis sanguinis missionibus, sed melius longe tutiusque curatione per inedium, quam supra docuimus, potest perfici. Hac enim per aliquod temporis spatium rite adhibita, superflui humores exsiccantur & dissipantur, fibræ nimis relaxatæ & à tono suo dejectæ roborantur & ad majorem contractionem animantur, adeoque omnes se & excretionem, cum naturalibus corporis functionibus suæ resiliuntur integritati. Ex certe, si dicere licet quod res est, ego in cœturo & nunc quinquaginta annos superante artis exercitio summe rebellium nullaque medicina domandorum affectuum curationes per Dei gratiam sola hæc methodo diætetica abfolvi, imo præsertim pessimi moris ulcera, frustra alias adhibitis tam internis quam externis remediis, ad sanationem perduxî, ut ideo sæpe valde miratus sim, cur hæc eximia, licet domesticæ curandi methodus tam parvi à Medicis habeatur, imo fere profusa negligatur. Sed ista est, proh! dolor perverfa mortalium indoles, ut neglectis diæticis parataque facilioribus remediis sola perniciosa & magnas laudes fontantia medicamenta fluka cupiditate inhiant.

OBSERVATIO VIII.

Haec ita pridem miles XXVI. annorum, corporis gracilioris ac proceri, facie pallidus, qui jam per quinquennium ulceribus pedum scorbuticis laboraverat, à militiæ præfecto ad me mitterebatur, ut ibi meum & consilium & auxilium expeteret. Ego itaque singulis, quæ ad morbi originem veramque indolem cognoscendam pertinent, probe examinatis, deprehendebam, hæc impuritate sanguinis scorbutica omnia hæcenus mala ortum incrementumque sumfisse, & à longo abhinc tempore usque eo durasse. Ulcera enim adhuc duo in malleolo pedis dexteri erant aperta, in sinistro autem pede cicatrices & bruni coloris macule satis late, ad ulceribus jam consolidatis relicte, conspicebantur, quæ valde dolebant, miserumque ægrotum, de magna totius corporis lassitudine, membrorum gravitate & vagis doloribus jam consequentem mirum cruciabant. Medicamenta hæcenus adhibita erant fere sola externa, internis aut omisiss, aut cum debito vitæ regimine non diu satis continuatis: quare ego cum sanguinem deyrantibus curationem instituendam ratus commendabam, ut imposterum accuratiori vitæ victusque ratione habita, corpus aliquot horas ante vel post prandium erundo aut equitando moveret, loco potus ordinarii decoctum ex rasura ligni sassafras uncis quatuor, radicibus glycyrrhizæ & cichorei ana uncia una confectum larga in quantitate tam calide, quam frigide biberet, & interposito nonnunquam leniori laxante, cibis,

Thore
Favos ab

Cap. II. De sphacelo à causa potissimum &c. 387

cibis, quos pariori manu adsumere debebat, herbas antiscorbuticas, ut sunt cochlearia & nasturtium, inter coquendum adjiceret. Ex medicamentorum classe nihil obtuli, præter elixir proprietatis, cum mensuram aquosam paratum, debeatque spiritus cochleariarum, oleo probe essentificati portione remixtum, cujus LXXX. guttas ter in die capiebat. Externe ad ulcera adhuc manantia mundificanda & consolidanda oleum vitellorum ovorum, essentia succini & myrrhæ nuptum commendabam, superimposito emplastro Barbette saponato & camphorato, quod etiam alteri pedi applicandum curabam; & quidem hæc omnia tam felici succellu, ut post duorum mensium spatium æger me revivens, non solum colore melior, viribusque & corpore robustior videretur, sed & ulcera ex voto sanata fuerint.

Epitaph.

Docet imprimis hæc morbi història, quam parum in scorbuto curando ejusque symptomatibus, uti sunt ulcera, sanandis externa remedia efficiant; nisi simul probe observatis vitæ victusque regulis appropriata & correctioni humorum data interna conjungantur. Splendent autem hac imprimis virtute medicamenta sic dicta antiscorbutica, quæ sale volatili sulphureo turgida omnis generis excretiones promovere & amissum sanguinis balsamum restituendo, universam flumidorum massam egregie corrigunt, ut postea natura, vel paucis externis adjuncta sponte ejusmodi ulcera perianet. Deinde ex tam facili & intra breve tempus ablata curatione addiscere licet, quantum Medicus arte sua possit præstare, si ægros dictis obediētes, ætate juvenes firmiterque naturæ robore donatos obtineat, & quanta & contrario sint impedimenta, si in pernicies & ad genus suum viventes inciderit.

Plures observationes legi possunt in *consultat. & responsis med. Sell. III. casu CXXIII. CXXIX. CXLVII. CXLVIII. CXLIX. CLVII. usque CLXVI.*

CAPUT II.

De sphacelo à causa potissimum interna ejusque curatione.

THESES PATHOLOGICÆ.

§. I.

Infirmitas vitæ expostum. Nullus affectus atrocior & crudelior, quam sphacelus est, ubi nobis vivētibz inægræ corporis partes, subito putrescentes moriuntur; effluque hujus morbi tam sæva & infesta indoles, ut, ubi temel nidum suum elegit, pertinacissime inhaereat, & non tantum partem, cui insidet, mortificet, sed citato pede progrediens primum vicinas partes corumpat, mox totam machinam destruat vitæque privet. Quum vero pro diversitate corporum & individuum, pro varietate causarum, quæ vel externæ vel internæ sunt, pro genio sui magis vel minus maligni indole & symptomatum concursu permultum variet, suasque gradus habeat, tum neque eadem semper auxilia, neque eandem medendi

rationem locum invenire posse in apice est. Siquidem longe alia incedendi via deserviat, ubi à causa interna, seu prava humorum indole ac corruptione nascitur, alia, quando humoribus integris, à violentia externa originem ducit. De utroque hoc loco agere constituimus.

§. II.

Definimus vero sphacelum, quod sit *putredinis corruptio partis in corpore vivo, qua non modo ejus textura & structura cum usu & functione plane destruitur, sed & restitutio in pristinum statum nunquam expectanda est.*

§. III.

Neque tantum partes externas musculosas, tendinosas & nervosas hic vitæ insensibilissimas morbus aggreditur, sed potissimum etiam partes internas corporum, chronico diuturno, vel etiam brevi acuto affectu laborantium affligit, & lethiferum in ipsis effectum producit. Postquam enim nostro tempore laudabiles ille dissolvendi corpora morbo exlinctum mos obtinuit, proxima interius causa nunquam fere non in corruptione sphacelosa partis & visceris cujusdam principalis observatur, & conspectui datur: quemadmodum in dissertatione *de causa morbis in morbis* id ipsum fusiore tractatione persecuti sumus.

§. IV.

Occupat vero hoc malum frequentius partes externas, sanguinis vivo influxu destitutas, tendinosas, nervosas & corporis extrema, ut manuum pedumque digitos, item scrotum, præsertim si corpora longiori morbo sint emaciata, vel senio connecta. Frequentius quoque prehendit cachecticos, hydroticos, paralyticos, & scorbuticos, &c. qui sanguinem impurum, particulisque sulphureo-balsamicis orbatum, & humores ad corruptionem & vappescientiam pronos in vasibus alunt. Imo etiam facile ad ossa transit, quæ fortissimè sæpius putrilagine consumit, quando videlicet virulenta partium circumdatarum sanies putridisque ichor ad eorum intima penetrat.

§. V.

Variis vero modis sphacelus externis in partibus se manifestat, ita ut naturali colore & calore earum pereunte tactu frigida evadant, color rubicundus in lividum & nigrum successu temporis mutetur, & in parte quoque proxima ambiente florida & vivida consuetudo pereat, inque pallorem transeat. Maxime vero omnium in portione specialissime affecta sensus tactus perit, ut nec profundas scarificationes nec incisiones ægri sentiant. Accedit porro ipsius partis tumida elevatio, quæ etiam in proximè ambientem partem se diffundit, etiamque tumore afficit. Præterea, portio corrupta in diffusum dissolvitur putredinem, suamque consistentiam plane amittit cum gravi & cadaveroso fœtore nares feriente, quæ etiam mox ulterius subitico serpit, & partes circumjacentes simili labe inficit. Et quandoque in parte ejusmodi sphacelata scarificatio, quam, uti dictum est, non sentiunt ægroti, inflicitur, ex vulnusculis insistentibus non sinceris sanguis, sed ichorosis cruentus humor, ob sanguinem ibi subsistentem coagulatum

tum effluit, cum stigmatibus nigris inter vulnufcula adparentibus.

§. VI.

Quomodo vero sphacelus à gangræna differat, quibusque signis uterque affectus, multum inter se cognatus dignosci debeat, è re utriusque fore duo, ut paucis delibemus atque erasemus. *Gangræna* est extremus inflammationis gradus, quam, nisi rupta omni mora præsentissimas feramus suppurias, mox sequitur & comitatur partis corruptio, sive sphacelus. Hæc autem gangrænam in inflammatâ parte præsentem prænotant: quando coloris floridum, quod in inflammatione adfuit, extinguatur, deinde dolor & pulsus arteriarum, ægro antea valde sensibilis, finita nondum morbida dispositione remittit, pars antea dura & renitens mollis fit, colore livido, sensu destituta, & cutis à carne facile sejungitur; sique digitis prematur, in profundum cedit, nec postea resiliendo revertitur: uno pulfule quoque & vesicæ copiosæ in partis superficie apparent, quæ apertæ laticem acrem fundant, nigredinemque subitus recondunt.

§. VII.

Verum enim vero, sphacelatio duplici modo, vel ex præcedente gangræna, vel sine ea nascitur. Illa pterquam à causa externa manifesta & violenta originem habet, videlicet à strictioni partis ligatura, dum sanguis post ligaturam non invenit libere remeandi viam, vel à vehementiori partis contusione, vel à lésione tendinis & nervi, & hinc orta dolorum atrocitas: quod acutere solet sanis, vegetis, in vigore ætatis constitutis, sanguineque & viribus plenius. Atque hic sphacelus maxime acutus est, &c, nisi maiorem contentum remediis luccurratur, hominem celeriter è medio tollit. Altera sphaceli speciem, quæ postquam à causa interna oritur, præter opinionem sponte emergit, maximeque familiaris est, ut supra inimus, cachecticis, senibus, scorbuticis, quorum vasâ humores in putridam corruptionem pronis sciant. Et hoc multum magis est chronicum, non celeriter viam destruit, sed aliquoties latis diu assidue lentoque gradu interit. CORNELIUS CELSUS lib. 7. cap. 26. hanc sphaceli speciem canceri nomine, sed latus patente, describit, ita ut erysipelas, si in ulcus tendit, simul complectatur, adeoque diserte de ejus causâ & genesis loquitur, ut clarissime pateat, non aliam eum præposuisse, quam qui in corpore mali habitus sponte provenit.

§. VIII.

Hicce discussis sequitur, ut, quomodo dirum hoc vitium in partibus externis laboratur, dissipationes ac clare demonstreremus. Jam satis, ut arbitror, ex physiologicis commentis est, ut totius corporis, sic quoque cuiusvis partis viam, vigorem, & à presentantia corruptione præservantem omniumque functionum integritatem ab humorum vitium libero & æquabili circuitu successu dependere. Tandem enim pars est viva & à corruptione immunis, quando adhuc sanguineus latex singula ejus vasâ & vascula æqualiter perlit. Sic paralyticorum membra, utot sensu & motu voluntario privata adhuc tamen vita frui dicuntur, quoniam vitalis adhuc puritas per illa ipsa fertur & per circuitum resolvitur. Proinde uti mors totius corporis; ita

etiam ceræ cuiusdam partis mortificatio à cessante & destructo sanguinis circulo dependet. Hoc enim sublato, crasis sanguinis & mixtio naturalis perit, fluidum à solido separatur, & ob moram particulæ sulphureæ mobilis subtiliores avolant, moraque intestino fermentativo uno varii generis partium dissolvitur; unde foetidissima emergit putrilago. Quando enim progressus sanguinis motus definit, protinus fluidum aëreo æthereum in sanguine contentum, pariter atque externum incumbens calore suo motum alienum internum seu insectum inducit, qui texturam & vinculum, quo inter se gaudent partes, destruit; quoniam circularis ille motus utique præcipuum est naturæ instrumentum, quo corpus à putredine servatur, quo varii generis elementa sanguinem constitutis in intimâ mixture & unionis continentur. Quum vero liber ille fluidarum partium motus à solidorum firmitate, robore & vi cordis & valvularum systolica elastica, cujus beneficio fluida impelluntur, procelluntur, progrediuntur, unice dependeat; hæc autem solidorum vis naturalis & motrix à sanguinis & succi nervosi bene constituti per minima vasâ infuso sustentetur: facile patet, causam sphacelationis, si à causa interna fit, potissimum in sanguine ejusque prava constitutione esse querendam.

§. IX.

In quoniam vero laudabilis succorum vitalium ad viam & sanitatem custodiendam necessaria constitutio consistat, jam breviter perquirendum erit. Sanguinem esse humorem non homogeneum, sed ex varii generis particulis, subtilioribus & crassioribus, terrestribus & squæ, salinoque sulphureis oleosis pinguibus confusum, &c, si rite vitalibus præfite functionibus debeat, ad dulcem blandamque temperiem per intimam harum partium unionem redigi debere extra omnem dubitationem aleam possum esse existimo. Quod si igitur sanguis satis fluidus est, ut per subtilissimos canales se & excretionis libere possit trahi, & à superfluis elementis separari, sanitas corporis comparatur, sive omnes partium ejus functiones integræ salvæque manent; ubi vero è contrario crassiores, mucide prædormitium obtinent, tum per minima vascula libere non permeare, id est nec satis influere, nec satis effluere possit: unde subsistit, incrima vasâ obstruit, & alienam plane indolem acquirit, quod maxime fit in orofis, senibus, cachecticis & scorbuticis, qua ratione facilis ad sphacellum fit dispositio & transitus.

§. X.

Quodcumque itaque sanguinem in minimis vasâ coagulat, ejusque motum ac progressum impedit, id ad genesis sphaceli multum conferre, apparet. Unde etiam videmus, quod à combustionis modo graviori per ignem facta sanguis coagulatus haud infrequenter materiam sphaceli proximam suppeditat, vix aliam ob rationem, quam quod nimis ignis calor sanguinem coagulet ejusque fluiditatem demat. Non dissimili modo ab intensiori gelu tempore hiberno in corporis extremitatibus diras ejusmodi coagulationes & sphacelationes evenire videmus. Perquam enim notum est, sanguinem è vena nullum brevi tempore à frigore in coagulatum abire; sicut pariter haud facile quencquam fugiet, per

per frigora itinera facientibus pedes, manus, nares, aures emori. Inprimis vero frigus partibus erysipellate affectis, vel alia ex causa æstuantibus infestum esse deprehenditur. Ita exemplum in EPHEMERID. Dec. II. ann. III. p. 135. item apud Gregor. HORSTIUM exstat, quod manus fibre ardente laborantis, in aquam frigidam demissa sphacelata fuerit retracta. Idem fieri observamus à graviore vulneratione & contusione, cum sanguis extra vasa positus & in poris retentus perscibile stagnat & resolvitur. Quæ de re plura exempla Gul. Fabricius HILPANUS libro de gangrena & sphacelo notavit.

§. XI.

Tonum etiam fibrarum motricium ab humido nimis relaxatum & vivida vegetaque systole destitutum ad stagnationem & corruptionem sanguinis sphacelolum multum facere, paralytici, cachectici, hydropici &c. satis abundeque testatum faciunt: quo eam referre oportet præpositas erysipellate & inflammatione affectarum partium curationes per cataplasmata, emplastra refrigerantia, contringentia, vel nimis relaxantia pinguedinosa. Quod vero scorbutici & senes, quorum sanguis & humores cum scorbuticorum sanguine multum habet affinitatis & similitudinis, tam facile & citra causam externam præcedentem ad atroc hoc malum dispositi sint, ex jam adductis facile quilibet poterit colligere; utpote eorum sanguis & lymphæ ad ipsius fluxum & coagulum, præ ætate juniorum, facile inclinat, dum mobilioribus, benignioribus & balsamicis spiritibus particula obstat, mucidus, crassus, lentus & iners relinquitur: cui si postea accedit vel externum frigus, vel moeror animi, terror aut metus, præ etiam alio humido frigido, & aliud quodcumque externum relaxans, ut balneum, subito & præter omnium opinionem dispositio ad sphacelum emergit. Neque omittenda est in senibus, præsertim scorbuticis, scicior ac rigidior & vasorum & fibrarum textura, dum interstitia & pori magis coarctantur, ut non modo sanguis & lymphæ difficultus per ea transeant, sed & tonus partium solidarum, ob deficientem fluidi nervosi & sanguinei influxum, valde debilitetur; multo vero magis in extremitatibus pedum, ubi musculosæ partes minores & plures tendinose sunt, per quas ordinario sanguis propter gravitatem descendens difficultus circumvolvitur.

§. XII.

Proximum jam est, ut etiam discipiamus, quomodo immoderatus & imprudens rerum nonnaturalium usus ad sphaceli productionem concurrere possit. Ex harum causa principem fere locum aer, multis effluviis vappidis & humidis refertus, & vi elastica obertus sibi vendicat, qualis est in locis humidioribus, habitationibus profundis, mari & fluvii, sive paludibus propinquis, qui in genere omnium partium solidarum tonum ac robur relaxat, transpirationemque impedit, ut per cutis spiracula subtiliores puridæ salino-sulphureæ partes non possint exhalare. Ex ciborum genere huc incipimus pertinere omnia, excellivis qualitatibus prædita, ut fere sunt nimis dulcia, acida, falsa, fumo indurata, vel etiam nimis pinguis. Ex potulentis huc spectant vina acida, vel etiam nimis spiritus vini abusus, quo fluidum temperatur subtile dissipatur, crassioribus partibus, quæ, si in coagulum abeunt, relictæ.

Frid. Hoffmanni Oper. Tom. III.

Ex quo simul ratio patet, quare rebelles chronicæ passionēs, ut scorbutus, hydrops, cachexia, & sphacelus utriusque in locis, ubi familiarissimus spiritus vini & liquorum spirituosorum potus est, sint frequentissimæ. Hinc quando accedit imbecillior natura, quæ secundum CILIUM omnibus morbis patet, maximeque senibus communis est, item nimium otium, vel anxia animi cura, quæ omnem corpori & animo vigorem eripit; tum utique fœdita ad tales morbos gravissimos aperitur. Denique notabile est, sæpius citra ullam causam externam occasionalem, etiam sine rumore & rubore conficiat, sine febre præcedente, dolorem immanissimum oborti & funestum sphacelum subsequi, ut FERNELIUS de abditis rerum causis lib. II. cap. 15. testatur. Ita quoque HORSTIUS lib. IX. obs. 25. animadvertit, sphacelum in corpore cacochymico vi purgantis fortioris esse introductum.

§. XIII.

Prognostica licet ipsi tractationi hinc & inde præposita sint intermixta, placet tamen pauca specialiora addere. Maxime autem omnium in prognosi ferenda ad ipsum individuum agrosam esse respiciendum; quod si juvenile & ætivum est, majorem sanationis spem promittit, quam senes, tardum & senile; & licet in juvenibus corruptio sphacelosa, præsertim si ex gangræna præcedente oborta fuerit, celerioris vehementiorisque faciat progressus, quantis senibus, ob majorem particularem tam sulphurearum probilium, quam humidarum ad putredinem aptitudinem eorum tamen annotandum est, quod corruptæ partis à sana separatio debitaque suppuratio sub convenientium remedium usum in junioribus ob sanguinem, quem præ senibus alius, fluxiliorem & puriorem, & ob majus virium motuumque vitalium robur facilius succedit. In genere vero notandum velim, quod nulla unquam portio nisi acta corruptæ esse sectanda sit resumptio, sed potius partis sphacelate à sana scellio desideranda, quam ipsi senilibus corporibus nature beneficio vix unquam contigisse memini. Ceterum, si gangræna vel sphacelus ab extra provenit, longe citius & facilius sanationem recipit, nec tam citato pede progreditur, dum sanguis & humores balneo suo genuino, quod putredinem arceat, adhuc sciant; focus autem hinc solet, si ab interna causa malum dependet, ubi longe periculosior est status, nec tam brevi tempore humores possunt emendari.

METHODUS MEDENDI.

§. I.

Quum in omni morborum genere prudentis sueque officio sagacientia Medici sit, ut pro ipsi conditione & diversis morbi statu convenientia adhibeat remedia, tam profecto in sphacelo sanando id ipsum observatum necessarium esse arbitror. Alia enim medendi via inveniunda est, si totum membrum sit emortuum, alia si pars tantum necrosi laboret. Illud si incidit, amputatio unicum est remedium; hoc vero ubi evenit, ea adhibere decet medicamenta, quæ sanguinem benignum reddunt, obstructions remouent, & laudabilem sanguinis influxum & refluxum in partem corruptionis proximam promouent, ut hac ratione quod sanum est defendatur, emortuum facile separetur, & laudabile pus

L I quod

Quæ cum
medicinis
causis
conferantur.

Causæ
non-
naturales.

Indicatio-
nes
curatio-
nis.

quod optimum convalescentiæ signum præbet, genereatur.

§. II.

Quorum
causam
putredinem
erant

Quod si igitur indicium est, destructorum motum in affectis partibus vigere ulceratque serpere, prima Medici intentio esse debet, ut violentum hunc & naturæ insensibilissimum motum, mortem & putredinem inducentem sistat: quod quidem optime perficitur deobstruentibus, balsamico robotante sulphure & sale penetrantiori instructis, utpote quæ sanguini liberiores cursum, partibus debitam transpirationem, & materie æthereæ sanguini inclusæ liberissimum iter redituque concedunt, ut hac ratione putredo arceatur, & quod emortuum est, sejungetur. Huic scopo ex voto satisfaciunt omnia sale volatili oleo, acidum desluente imbuta vegetabilia, ut auta, salvia, angelica, levisilicum, flores sambuci; bacce juniperi & salia volatilia urinosæ vel oleosæ, maximeque resina illa subtilissima & penetrantissima camphora: quo etiam spectant sale quodam alcalino fixo amaro imbuta, uti scordium, cardus benedictus, aristolochia rotunda, aloe, centaureum minus, abanthium; item oleo balsamico turgida, ut myrrha, thus, mastiche, balsamum peruvianum; vel denique incisoria vi agentis, ut sal ammoniacum, lapis medicamentosus *Crollii*, virriolum martis & veneris, aqua calcis vivæ, cineres clavellati, vinum, ejusque spiritus.

§. III.

Ex his
partibus
formam.

Possunt ex dictis apparari cataplasmata & fotta, crebriusque calide applicari, quæ partem incidendo & tonum partis robotando, partem putredinem arcendo, divinam afferant opem. Mihi vero quasi instat omnium hæcenus in uso fuerunt duo remedia, quorum primum ita se habet: *Recipe radicem angelicæ, levisilicæ, ana mactiam unam, herbæ scordii, ruta, cardui benedicti, salvia ana manipul. unum, myrrha, mastiche ana drachmas sex, salis ammoniaci mactiam unam semis, viridis aris drachm. semis, aluminis issti drachm. tres. Hac mixtionem coacta & contusa coque in aquæ calcis vivæ, vini Francos. spiritus vini camphorati partibus æqualibus. Alterum est solutio florum salis ammoniaci vitriolorum in spiritu vini non rectificato, adjecta debita quantitate camphoræ. Quod si autem malum profundius in carnosæ partibus lateat, prius infusum debent scarificationes, ut non modo sanguis in coagulum condensatus & corruptus è membro laborante evacuetur, verum etiam, ut medicamenti vis ad ipsam labem propius pertingat. Et profecto inanis est nonnullorum metus, qui aëris accessum ad putrefactionem accelerandam contribuere existimant: cum tamen facile possit cohiberi, si suis mature debitis administris affectæ parti propicietur.*

§. IV.

Abstrahenda
interius
conspargenda.

Hæc remedia sæpe præstantissimum valentur opem, maxime si interius alexipharmacis & diaphoreticis, quæ sanguinis mixturam in crasi & motu suo servant, liberumque transpirationis succellum adjuvant, rite fuerint secundata: cujus energię quam maxime esse deprehendantur, liquore cotinu cervi succinatæ, tinctura bezoardica mediæ & volatilis, diascordium liquidum, spiritus bezoardicus *Bussi*, essentia theriacalis,

theriaca celestis, & omnia salia volatilia oleosa. Singula tamen hæcenus enumerata interna remedia multis parafangis antecellit, certissimoque effectu ceu eusporifon facta se comprobavit hæc quæ sequitur formula. *Accipe vini Rhenani optimi libram unam, succi cancerum recentis mactias tres, theriaca drachmas duas, lapidem cancerum drachmas tres: blando calore hæc misceantur & pro duplici dosi bibas ægratus, observando simul debitum ac temperatum sudoris regimen.* Præterea ex alexipharmacis, nostro scopo infervientibus maxime eminent nitrum & camphora, quæ, si ita combinantur, ut ad drachmam unam nitri scrupulum dimidius camphoræ addatur, excellentissimum exerunt effectum. Nitrum enim, sanguinem & serum fluide reddit, humorumque acridinem & scibilem asstum temperando, balsamum sanguinis conservat; camphora vero effluvia suis tenuissimis salium morbosorum & particularem obstruentem exhalationem promovet quomodo optime. Hæc tamen circa usum horum remedium tenenda velim, ut primo in paulo largiori & repetita dosi offerantur, quia præsens periculum præstanteum sanguinis emendationem urget; deinde ut, si à causa interna malum succreverit, plus ipsa, quam externis omnibus fides habeatur.

§. V.

Hæc methodo qui aggreditur gangramam & sphacelum, scilicet ipsi ejus sanatione procedit, & vel ulteriore mali progressum impedit vel partem putredine jam tactam, naturæ beneficio concurrente, resiliat. Sanguine enim tam internis quam externis jam benigniori reddito, natura loco carnis emortuæ novam carnem prognerat: modo observetur, ut resiliens jam in parte gangramosa sanguinis circulatione, illud quod emortuum aut corruptum est, maxime si grandis sit molis carneque substantiæ, ope chirurgici prudenter separetur & amoveatur. Varii autem varios separationis modos in Chirurgis æque ac Medicis libris ostenduntur, quorum mentionem incipere juvabit. Nonnulli causticis corrosivis eandem peragere tentant, & scarificatione profundiori inter linam & mortuam partem facta pulverem ex arsenico inspergunt, vel illum cum unguento ægyptiaco subactum applicant. Alii, ut *POLEGNINUS*, medicus Gallus, cujus meminit *Cheræ in pharmacop. reg. pag. 293.* byttrum antimonii cum corrosivo subtilatum remittunt in usum trahunt; alii id oleo vitrioli vel salis, uti *FABER in chirurg. pægyr. pag. 172.* præstare conantur, alii iterum actuali caustero infectam partem inurant. Denique recentiorum plurimi corruptum membrum enle rescindendum putant, ne pars sincera trahatur, & ideo novacula, vel alio instrumento incisorio quicquid peccat & corruptum esse resiliat. At vero, si omnibus pensatis, proferre debeam, quid sentiam, ego certe postremum separandi modum reliquis longe præferendum, maximeque adhibendum suadeo, si caro musculosa altius fuerit infecta. Hoc enim non modo totum illud, quod peccat, citius tollitur, sed recidiva quoque egregie averitur: ut taceam denique trista exempla, ubi caustica illa virulenta, ut arsenicum & mercurius subtilianus, externe applicata penetranti acrimonia sua in nervorum systemate servissima eaque funesta concitavit symptomata.

§. VI.

§. VI.

Quæ autem
operatio
ad se-
parandum
illam fa-
ciat.

Quod si igitur gangrena late proferens con-
tagio suo funis partis & inde corporis minatur,
totumque membrum occupavit & enecavit, uni-
cum & securissimum, licet miserum & crudele
est remedium amputatio, seu exsarpatio partis.
Quicquid enim ad vitam revocari nequit, opti-
me à viva parte separatur, præsertim quam du-
bia spes desperata salute melior, longèque con-
sultius sit, partem hominis, quæ totum homi-
nem funeri dare. Quo vero plenius de ipso rese-
candi modo consilii; opera pretium erit, ut, quæ
ante, sub & post operationem observanda sint,
breviser stricteque monemus. Primo itaque,
ut ordine procedamus, in quaestione venit: que-
nam remedia ad facilitandam operationem interna
propinari debeant; ubi sciendum est, desideratissimum asserere opem sic dicta confortantia,
spirituosa analeptica, quæ blandis sulphureis par-
tibus foeta vigorem sanguini & cordi addunt: quæ
virtute imprimis splendent aqua cinnamonum cum
vino Hispanico confecta, aqua florum auranti-
orum, hâctum convallium, alborum, rosarum, ef-
fentia ambrae, syrupus balsami Peruviani, spiritus
volatilis oleosus cum oleo corticum citri recentis
& cardamomi essentificatus; quæ invicem vel
per se, vel cum vino Rhenano bono haustu exhi-
bita egregie roborant. Conferri quoque tali in
casu commendare jussula bonæ noxæ resectoris
ex vino, jussulo carnis, vitello ovi, succo citri,
saccharo & cinnaomomo parata: multo vero certior
erit effectus, si hæc analeptica cum alexipharma-
cis supra dictis commixta in convenienti dosi pro-
pinentur.

§. VII.

Operatio-
nes deserv-
iæ.

Ipsum sectionem quod attinet, implorato sum-
mi Numinis auxilio, ante omnia Chirurgus pru-
dens, pius, & expertus & qui omnia ad hoc opus
necessaria instrumenta in promptu habet, eligend-
us est. Dein detineatur patienti vel imponatur
in scamnum conveniens, & Chirurgus trahat cu-
tem, musculos & carnem fortiter versus sanas
partes, ut operatione peracta ossi denudato ite-
rum obducatur. Postea vinculo valido &c,
ne facile relaxetur, satis forti, non tamen adeo la-
to, confringenda est curis, partim ut atrox dolor
in exsarpatione præcaveatur, partim ut enormis
hæmorrhagia, quæ pressio pede dissectionem am-
pliorum vasorum subsequitur, impediatur. Et
quævis primum vincula non sine gravi dolore
injiciantur, postmodum tamen omnes cruciatus,
qui ex sectione oriuntur, leniant & obdunt,
ut vix ullus doloris sensus percipiatur. Alii ma-
lunt, ut duo robustiores viri, præcipue in parti-
bus carnosioribus fortiter manibus constringant.
Locus, ubi applicatur ligatura, si aliquot, vel
duos tantum transversos digitos supra partem ab-
scindendam, ne secta carne ligatura decidat.
Prius autem quam sectio peragatur, filum atra-
mento tinctum circumligandum est loco incidendo,
qui ad minimum quatuor digitos transversos
esse debet supra carnem emortuam atque corru-
ptam; postea cultro falceato satis acuto cutis & caro
muculosa ad os usque una sectione est separan-
da: quo peracto proximus musculari ab osse tam for-
as, quam intrinsecus, satis amplo tamen spatio
sunt sejungendi, quo locus detur feræ, quæ satis
acuta, ossibus a periosio bene purgatis applican-
da & primo fibula, deinde tibia est abscindenda
cito satis ac tuto, agilitate dexteritatis octo vel no-

Frid. Hoffmanni Oper. Tom. III.

vem tractibus, hac adhibita cautela, ne nimio
motu & concussione aegroti sæva eveniant ma-
la. Et ubi in pede operatio suscipitur, pes bene
est extendendus, ita tamen, ut paulatim ad intra
inflexus teneatur, quo ambo ossa æqualiter ferri
possint præcindi.

§. VIII.

Peracta sectione, sanguinis profluvium sisten-
dum, quod variis modis Chirurgi præstare solent.
Nonnulli, uti PARREUS in chirurg. lib. I. cap. 20.
& 22. tenacula vel vollicella vasa apprehendunt,
acu transigunt & obducto filo deligant; quon-
iam tamen arterie post sectionem breviores sin-
t, & intra carnem se occultant, forcipe non
commode possunt teneri, & ad deligationem ex-
trahi: deinde cum ligaturæ arteriarum tempus &
moram, quam ægri imbecillitatis atque desectio
rato permittit, requirunt, ideo ipsum vinculum,
quod ad sanguinis fluxum collibendum fortiter
stringi debet, quandoque arteriæ tunica dissecat,
tutius est, à tali modo abstinere. Nonnulli cau-
terio actuali, seu ferro ignito carnem adurentes
fibras vasorum crispant & constringunt; sicque
remoram sanguini injiciunt: quod quidem reme-
dium improbare videtur HORNIIUS in microtech-
næ, quia tali cauterisatione crusta gignitur, quæ
postea decidens novo sanguinis fluxui anam præbet;
anam, quoniam facillimum & securum
est, in illis casibus, ubi moris periculum mina-
tur, vel remedia styptica non ad manus sunt, item
ubi corrupti quidpiam remanserit, omnino po-
test adhiberi. Alii stypticis tam solidis, quam li-
quidis, uti sunt vitriolum cyprium, solutio vitrioli
albi, liquor stypticus Danicus ex alumine, vitriolo,
oleo vitrioli & aceto paratus, item pulvis sty-
pticus HILDANI &c. sanguinem compescere stu-
dent: quam methodum etiam nos imprimis lau-
damus, eodemque fine potissimum & insar om-
nium caput mortuum vitrioli probe exsulum ex
mente HEURNII in commentar. ad HIPPOCRATIS
aphorismos, commendamus. Quod si autem
compositum desideraretur, ita poterit confici:
Rec. boli armeni uncias quatuor, sanguinis dra-
conis, aluminis, terra sigillatæ ana unciam dram-
semis, nucum, euphrasie, galliarum ana unciam
unam, capitis mortui vitrioli uncias duas. M. F.
pulvis. Ex liquidis, quæ facilius penetrando san-
guini coagulatum inducunt, omnibus palmam red-
dit dubiam liquor martis, quem oleum martis di-
cunt, quod ex capite mortuo florum salis amoniaci
marialium, aeri libero exposito per deliquescen-
tiam emergit, & quovis styptico est præferendus.
Imo quoque in levioribus lesionibus solus spiritus
vini omni phlegmate orbatus locum invenire po-
terit. Modus autem applicandi styptica hic est.
Turunda insignes ex lino discepto confecta al-
bumine ovi conqussato madefiunt & pulvere
styptico consperguntur, vel liquori styptico im-
mersæ ipsæ vasis applicantur, quæ prout ampli-
tudine differunt, diversas quoque magnitudine
turundas exigunt.

§. IX.

Sedato sanguinis fluxu opus est, ut vincula
superflua removeantur, curis remitteoda, quæ
os & bonam partem lesionis, imo nonnun-
quam totam contegit: dum enim pelle ista va-
sa conteguntur, partim & fluens sistitur sangui-
s, partim & consolidatio promoveatur. Hoc fene
Venetorum sclores, teste Barilehom. Mag-
isto, qui facinoroso homini manus abscindere

Quibus
sanguis
si debet?

Alii sicut
quatuor sin-
gulis &
euphrasie
di martis.

debent, pellem ad superiora trahunt, post amputationem vero illico laxant & diligenter circa juncturam consunt, vulnerique venientem gallinæ morientis adhibent. Quod quidem à GALENI sententia lib. V. *method.* non abhorret, ubi *sanguinis fluxum ex propria cutis superpositione refrenari* perhibet. In Belgio hic modus admodum est familiaris & multiplici usu comprobatus: nimirum tibia secunda musculus gastrocnemius, vel ejus portio adhuc salva non abscinditur, sed à reliqua parte separatur, qua deinde membrum fasciatum obvolvitur, & sic brevi tempore sanatio absolvitur. Imposito postea pulvinari linteo albumine madefacto ad replendam cavitatem, vesica bubula suis fortis & aquæ calidæ prius immersa toti trunco obducitur, donec hæmorrhagiæ metus transiverit. Tercio vel quarto die remota ligatura iterum pulvis stypticus cum albumine mixtus imponendus, operaque danda est, ut indurata & inglutinata emolliantur & escchara decidat: ad quod egregie facit digestivum ex melle, teretibithina, pulvere aristolochiæ, iridæ Florentinæ, thure & spiritu vini paratum. Escchara delapsa vel filo vulneris os latius futuris constringendum, vel per emplastra cutis atrahenda: Luxurians & spongiosa caro coerenda est inspersio pulvere radices iros & aluminis usui. Tandem cicatrix emplastro diapalma, item de cerussa, nec non unguento delicante rubro inducenda est.

CAUTELE ET MONITA PRACTICA.

§. I.

Cautela circa scarificationes.

Quod si ad meliorem remedium externum io gangrena operationem scarificationem est indicatio, cavendum est, ne ipsæ in partibus tendinosis, manuum pedumque digitis, vel ubi maximus adhuc ætus cum rubore conficitur, insinuantur. Sed longe feliciter id fit in partibus carnosæ jam corruptæ, vel corruptionis proximis: in his enim scarificationes, vel etiam profundiores commode inveniunt locum. Et sane mirandum est, post scarificationem peractam in partibus valde tumentibus illico desumescere sensibilem cum flatuum emissionem deprehendi, baculato iudicio, non tantum infarctum humorem, sed & expansam elasticam vim grandiores hos tumores gignere.

§. II.

Circa interne si scarificetur.

Varia à nobis commendata sunt interna alexipharmaca & diaphoretica, quæ in malo, præsertim à causa interna ortu mitigando non parum præstant utilitatis. Si quando vero simul scorbutica labes concurrat, specifica admisceantur antiscorbutica; & si lues gallica originem malo & sustentationem suppeditet, remedia hæc morbo accommodata in usum trahere expedit.

§. III.

Circa amputationem qua consideranda.

Prius quam amputatio membrorum sphacelo infectorum suscipitur, varia probe consideranda erunt momenta. Ante omnia vero deliberandum est, an sine vitæ periculo exstirpatio partis fieri queat? Quod si enim latius partes sphacelus adoritur, quæ aut non commode deligari possunt, aut amplioribus arteriis & venis instructæ magnam sanguinis viamque sub sectione faciunt profusionem, satius intermititur. Deinde

examinandum est, an vires ægri consentiant? Vires enim, quæ vitæ conservatrices sunt, merito in subsidium vocari debent, quia metus, terror, dolor, hæmorrhagia, adhuc majorem earum infirmitatem jacturam. Ubi itaque vires ex vehementia morbi jam succumbunt, pulsus arteriarum debiles micant, & defectio animi jam præsens, vel metuenda est, ibi cautiissime cum auxilio hoc crudeli mercari oportet.

§. IV.

Plurimi ex vulgo Chirurgorum & Medicorum ad præcavendos dolores in operatione metuendos opiata, vel in dupla dosi propinant, sed iniquo sane ausu pessimoque effectu. Nam ordinaria opiatorum remedia non modo atrociam dolorum vix avertunt, uti sæpenumero observare mihi licuit; verum etiam, si in excessiva quantitate offeruntur, metum injiciunt, ne sopitos ligatosque spiritus somnus sequatur sempiternus. Deinde opiata, dum sulphure suo vaporoso liquidi nervorum tenuissimi activitatem & elaterem obtundunt, vires destruant, & quo minus venenum gangrenosum foras propelli possit, efficiunt. Idem tenendum arbitror circa usum opii post operationem peractam, de cuius noxa HORSTIUS lib. IX. obs. 20. notabile, sed tragicum refert exemplum. Quæ cum ita sint, nos in utroque casu usum narcoticorum penitus damnamus, longeque rectius ac securius remedia supra præscripta analeptica temperata commendamus.

§. V.

Circa locum, in quo operatio celebranda sit, *Circa locum, ubi operatio fluenda.* variz inter auctores viget controversia. Multi in articulo amputationem insituere suadent, quoniam ibi nec hæmorrhagia metuenda, nec ossium fit nudatio. Verum enim vero, non desunt prægnantes rationes, quæ contrarium magis suadent. In articulis enim ossium junctura non tam prompte invenitur, nec cicatrix facile inducitur; imo etiam malum non semper in articulo, sed sæpius in medio membri hæret, ideoque tam altam resectionem raro possit. Aliter autem res sese habet, si digni articulus est rescindendus, quod optime in juncturis, & quidem scilicet peragendum est. Porro, altera oritur quæstio, utram in parte sana, an emortua operari liceat? Nonnulli quidem, uti sunt GALENIUS lib. II. *de curandi rat.* cap. 9. VIGO lib. IV. *chir.* cap. 7. FALLOPIUS & AQUAPENDENS &c. in emortua parte, qua sanam partem vicinam attingit, id fieri debere contendunt, & ita incidendum membrum sanum statuant, ut aliquid corrupti remaneat, quia tunc minor dolor & minor quoque hæmorrhagia pertimescenda esset. At vero, consilium hoc periculosum videtur, quoniam malum illud, quod relinquitur, ex facili se multiplicat, sensim obrepit & ulterius inficit. Rectius itaque judicat, si bique peritissimorum Chirurgorum ad sensum conciliavit CELSEUS lib. VII. cap. 33. in hunc modum: *inter sanam vitiatamque partem incidenda scalpello caro usque ad os ejus sit, ut neque contra ipsum articulum id fiat, & potius ex sana parte aliquid excidatur, quam de ægra aliquid relinquatur.* Regula tamen exceptionem patitur in tibia; in qua si sphacelus sit supra malleolos, prope genu præcisio est facienda: quod enim relinquitur frustum, nullum usum, sed magnum potius incommodum ægro affert, dum ligneo crure ipsa utendum sit, & pars otiosa in posteriora vergat.

In brachio tantum conservetur, quantum commodè alligandæ & apandæ manui ex metallo confectæ sufficere. In pedum manuumque digitis, ut diximus, in articulo id ipsum fieri debet, ubi nervi & tendines incidi sursum attrahuntur & carne obteguntur.

§. VI.

Ad feliciorum operationis successum hæc observandæ sunt cautela. Primo omnium Chirurgus debet cavere, ne exponendo instrumenta, timorem ægroto incutiat: novi enim plures panico quasi terrore sic correptos & porne exanimatos. Deinde, nec vacuo stomacho, nec nimis repleto aggredienda res est; quoniam ille sæpe molestiam accersit syncopen, hic sæpe causa est, ut cibis propter agitationem corrumpatur: tutius tamen fuscipitur horis matutinis quam pomeridianis. Postea, denudatæ partes & ossa non diu aëri sunt exponenda, ne hic conglutinationem impedit, & corruptionem nigredinemque ossi inducat. Neque minus post operationem insistentium est remediis internis reosillantibus & alexipharmacis temperantibus: quo nomine imprimis mixturam, quæ ex vino, oculis cancerorum, aqua cinnamomi, mellis, corticum citri, nucis & paucis theriacæ coactis granis constat, commendare lubet. Denique ad crustæ, vel medicamentis, vel ignito ferro inducæ, à carne resolutionem non properandum est, ne inde profluvium sanguinis denuo proreueret. Quam autem putredo cessaverit, nec amplius sanguinis profusio metuenda fuerit, ea, quæ crustam detrahunt, applicanda sunt. Et ubi post crustæ casum, adhuc inflammatio adest, unguentum diapompholygos, omnis calidis & acris, adhibere conuenit.

§. VII.

Tandem de symptomatibus operationem subsequenibus, quales sunt syncope, hæmorrhagia, febris inflammatoria cum phrenitide, delirio, & de novo gangrena de sphacelo, pauca addicere expediet. Syncope, quæ potissimum timori & terrori, nimisque sanguinis profusione debetur, vel in sphacelo à causa interna nato propter malignitatem, liquidum nervorum tenuissimum inquinatum oritur, & sæpe sudorem frigidum seridumque comitem habet, analeptica & alia excitantia requirit, quorum seriem longius hic recensere supervacuum erit. Si hæmorrhagiæ, ut facile fit, de novo repetuit, videndum est, ne æger multum se commoveat, sterneret, vociferetur, tussit, aut corpus culcitris multum oneret, vel alius sanguinem commoventibus utatur; imo quoque ipsi dormienti semper vigilans adsit minister, qui cuncta observet. Neque tamen semper necesse est, ut ad talem hæmorrhagiam superimendam prior admoveatur apparatus, sed tantum aqua frigida inspersa, stuppa cum pulveribus stypticis & si vires id permitunt, venæ sectione in parte opposita tentandum est, an cohiberi possit. Illud autem maxime meretur observationem, non solum post graviores membrorum contusiones, verum etiam post illorum amputationem frequentem narum contingere hæmorrhagiam; quæ, me iudice, à sanguinis circulatione, ex arteriis in venas non rite procedente derivanda est. Magna enim arteria vel amputata, vel parte ejus ligata & obstrueta, necessario sanguis, qui partem emortuam & detrahendam transiret, & per venam reverteretur,

ad alias partes per arterias magno cum impetu ruit & qua data apertura effluit. Hinc optime annotavit HELDANUS lib. de dyfent. cap. 1. quod sanguines dyfenteria in iis, quibus membrum aliquod abscissum est, ex eadem causa proveniat. Febris inflammatoria, quæ propter sanguinis & feri flasin & corruptionem omnibus graviter vulneris jungi solet, iis remediis debet tractari, quæ suo loco cum debitis cautelis in medicina hac systematica indicavimus.

ENARRATIONES MORBORUM.

OBSERVATIO I.

Vix generosissimus &c. annorum, temperamenti languinei corporisque habitus spongiosus, qui juvenutem vitæ militari addictus inter multas molestias, labores, varietatesque in castris præcipue Hungaricis ita consumerat, ut nullo incommodo valetudinis affigeretur; quem abdicato illo vitæ genere, canonicatu sat pingui, licet in loco paludinoso gaudens, commodius viveret, incepit arthritide laborare, ad quam accepisse dispositionem à premitibus viciat. In victu delectabatur sumo induratis & salisauria conditis, nec non supra modum dulcibus. Vixit multum antea usum nunc videbatur non carere posse; imo etiam veteris usui, animique affectuum intemperantia excedebat. Mature confugebat ad usum fontium, bibique Carolinas calidas & Tœplices balneum adhibuit. Accidit autem 1715. ut eo ipso tempore pedem ligno alliceret, leviterque vulneraret. Continebatur læsio. Sed altero die, cum ex loco calidiori ad humidum concedebat, febriis symptomata emicabant, vultus inflammabatur, margo sphacelo obducitur. Parebat tamen tunc morbus auxilium, ut post septimum mensem vultus perficeretur. Anno sequente 1716. vir illustri per plures menses catarrhis, ventriculi debilitate, soda, intestinorum inflammationibus & variis capitis molestiis vexatus tandem ad fontis Egrani usum accedebat. Potaverat jam octo diebus sine incommodo. Sed quam tibialis aliquando detraheret fervor, illud madere deprehendebat. Pes examinabatur, qui inter digitum quartum & quintum levem quandam erosionem prodebat, sine ullo dolore. Post aliquot dies totus quartus digitus à colore naturali desceverat. Advocatus Chirurgus, post multa adhibita, ossicula sine sensu exinebat, tandem totum digitum, tanquam emortuum excipabat. Serpebat corruptio sub tota planta ad calcem: accedebat febris vulneraria vehemens & glandularum inguinalium tumor. Tali rerum statu consilium expetebatur nostrum; mittebatur consilium, quo interna & externa præsidia offerebantur. Sed ipsemet æger celerrime se huc à Varsicorum finibus advehendum curabat, ut propius ipsi assiderem. Adventabat satis misero statu, febris valde vexata, viribus autem omnino fractis, appetitu amisso, somno fere nullo. Alvus diu clausa clystere subducebatur, unde meliuscule habere coepit. Adhibebantur duo perici Chirurgi, qui ex præscripto meo adhibebant remedia externa. Ipsemet pugnavi internis, quibus vire sustinerebat & humores depurarentur. Dieta recte consuevebat. in prandio optimi vini Hungarici, vel veteris Rhenani portunculæ præbebatur; post coenam essentia aurantio-

Sphacelus
in pede à
causa interna.

Circa operationem
syncope.

Circa symptomatibus
traclacem.

rum ex corticibus recentibus parata. Mane infuso urebatur theiformi, in quo decem guttas balsami nostri liquidi, quod etiam iuxta grandium offerebatur, capiebat. Subinde præbatur pulvis bezoardicus nictolus cum cinnabaris pauxillo remixtus, sæpe etiam pilule nostræ balsamica exhibebantur. Mirum quam cada-verosum odorem primis his diebus exspirabat æger, quoties vel leviter infudabat. Glandulis inguinalibus imponebatur emplastrum ex cepis assis, veneto saponē, farina levis Græci, cera, resina.

Pedis ulcus tale erat, quom alveniret. A digito quarto pedis dextri per plantam excurrebat cavitas ad talem protensa. Circa utrumque malleolum rubor erat, jam ad livorem tendens, juncto non magno tumore. Gangrænam lentam & seguiorem, non podagræ, ut agrosus putabat, significationem hanc fuisse, post aliquot dies cognoscitur, quippe sphacelus manifestis signis sese probebat, ut incisione corruptæ parvis opus esset. Incisus locus replebatur carnis linteis imbutis liquore ex spiritu vini purissimo, cum cuius uncia una due drachmæ olei caryophyllorum puri & genæni erant mixtæ. Hoc uno præsidio externo post aliquot dies omnino auferrebat puritatem progressus, & corruptum blande faciliq; secedebat. Quam secello illa facta esset, magnitudo diffusæ prius corruptionis demum cognoscitur, quæ super malleolos ad palmæ longitudinem adscenderat, sic ut facile posset anterior manus inter tendinem magnum, qui chorda Achillis audit, & ossib; intrudi. Secefferat enim præter uicem tendines malorum musculorum per hanc regionem progressi, ut peronæi tam antici, quam postici, nervi etiam multi, quorum aliqui, in quo corruptio ad superiora serpebat, non sine dolore excidi in sana parte debebat. Planta, quoniam fultor eam cavitas decurrebat, incisione longa usque ad digiti quarti locum debebat incidi, ut mundificantiæ melius possent adhiberi. Ossa sic satis libera manserant, præter partem calcanei, quæ aliquid palli erat, & satis tardè cariem suam demittebat.

Quam corruptio jam constitisset & emendata esset, prædicto liquori adhibebatur balsamus Peruvianus; tandemque ad extracta vulneraria & myrrinæ succinque essentias veniebat. Sed caro, quæ primum enalcebat, hebes erat, donec proventus ejus ex illis paribus, quorum nervi remanserant, ad claudendum tandem magnum hoc ulcus feliciter & ex voto succedebat. Atque sic vir ille plene convalebat, ut non solum pedibus suis insisteret, sed deambulare, quin scalas ascendere valeret. Atque hoc statu per triennium duravit; ubi factum est, ut incommoda tempestive molestiæ iter susciperet, & in pristinum malum, cui nunc lethalia symptomata accedebant, relaberetur.

Epietis.

Affectus ille gravis, quo æger afflictus fuit, species sphaceli chronici est, qui CELSO canceri nomine venit, & à causa potissimum interna suam petit originem. Videamus jam, quamnam in generoso patiente ad hujus genesis multum concurrerit. Deprehendimus autem, ipsum inter strenuus militiæ labores commode degisse; hoc autem vite genere in quietibus mutato, arthriticis infestum esse cruciatibus, cum pancreatico

cepit vivere, & ob appetentiam vegetiorem alimenta non modo copiosiora, sed & temperata humorum incongrua, nimis dulcia, salia, acida, fumo indurata, adsumsit, & vinum quoque meracum copiosius ingessit. Maximum autem pondus attulerunt animi graviore & diutius affligentes perturbationes, quarum impetu nihil valentius est, ad motuum vitalium æconomiam turbandam, ad digestionis & chylosificationis negotium pervertendum, & ad sanguinis & humorum massam corrupendam. Nec aëris vitium renecari debet, qui illo loco, ubi vir generosus à multis annis domicilium fixit, copiosis aquis, lentissime decurrentibus & multis spatiis per totum annum stagnantibus cinctus est. Dolores arthritici, ad quos dispositionem à parentibus accepit, fuit correptus, quia debilitas generis nervosi nativa quasi laboravit. Aquarum mineralium usu magis læsus, quam adjutus fuit, forsitan intempestivo & non satis circumspetto usu. Plura enim novimus exempla, ubi quidam vel natura, vel morbo aliæque causæ, ut senio debilitati, non sub debita preparatione, aut non conveniente regimine mineralibus fontibus uti fuerunt, & gravem noxam, imo artuum sphacelationem incurrerunt. Nam aquarum multo potu spirituose in sanguine partes, quæ pauciores jam sunt, dissipantur: unde vi lyssalica mortice, quæ fluida debet impellere & in circulum agere, in minutis stagnationibus humorum, quæ in corruptionem abeunt, in remissis maxime paribus, ubi fluidorum progressus semper tardius procedit, contingunt. Nostri ægri pes leviter vulnerabatur cum modica contusione, & postero die, ubi movebatur corpus cælo sereno & æstuoso ad locum humidum, horror febrilis cum subsequente calore indigni corripiebat: qualis febris species ad erysipelacem referri debet, quæ arthritici & podagricis valde est frequens atque solennis, & juxta CELSUM lib. V. cap. 26. magis perniciosa, si levi vulneratione supervenit. Testatur enim de copia materiæ peccantis, quæ hunc motum febrilem excitat: quam etiam exinde judicare possumus, quia patiens catarrhis, imbecillitate ventriculi, soda, flatulentis & variis caput adfigentibus malis per aliquot continuos menses fuit afflictus, antequam ultimo ad fontium usum pergeret & loco speratæ sanitatis tantam calamitatem reportaret. Hanc febrim erysipelacem utroque tempore passus est generosus ægrotus; sed in posteriore morbo insignis rubedo fuit in utroque latere cruris inferioris. Gangrænam hanc fuisse, eventus docuit, sed admodum segnem & lentam, qualis à causâ interna, ex ingenti humorum impuritate, sine sensibili dolore, oriri solet. Hujus generis exempla videri possunt apud DODONÆUM *medicinali observ.* 30. 33. & 37. His à Dodonæo notatis addicere possumus EUGALENI observationes, qui pag. 125. in medium affert senem supra septuagenarium, longa morbosia consuetum, in quo vulneratio pedis simul ac semel à pullula levi incipiebat sine præcedente dolore, inflammatione vel febre, & per duodecim hebdomades serpendo tandem interfecti. Apud eundem auctorem videre licet plures historias eorum, qui ulcera gangrænosæ & sensim emorientia sine dolore habuerunt. Quod etiam PAUL. BARRETE in *sua cætergia* annotavit, ubi recte meminit, si ex scorbuto sphacelus post maculas subnigras oritur, partis fluxum & tandem mortificationem sine ullo dolore

lore succedere. Denique quod in nostro agro corruptio longius à vicinis partes diffusa fuerit, id metā quidem sententia factum est, quod nervi ac tendines copiosius in extrema pedis parte concutunt, qui subtilissimo fluido, quod à cerebro ad ipsos influit, orbatī, quam facile labem ulterius serpentem suscipiunt.

In curatione allaboratum fuit, ne gangrænosa corruptio ulterius propagaretur, sed id quod jam corruptum, à sano dīcederet. Erat ad compescendam putredinem celerī & efficaci auxilio opus, quod ex voto attulit spiritus vini optimē rectificatus, balsamica & longe penetrante virtute olei caryophyllorum non adulterati imbutus. Interne ex medicamentis roborantibus, putredini resistentibus, & quæ simul transpirationem promoveant, ad meliorem externorum operationem balsamum nostrum liquidum, ex præstabilissimis & puris oleis nervinis cephalicis, cum spirituoso vehiculo maritatis constans, fuit exhibitum; quod medicamentum nervoso generi amississimum viribusque roborandis apissimum corruptionis humorum ulteriori non modo resistit, sed & circulariorem sanguinis, sub quas fordim putridarum mediantē transpiratione fit excretio, promovere efficit. Haud dissimili virtute etiam bezoardici pulveres, qui ex diaphoreticis fixis cum refracta dosi niri & camphoræ remixtis constati sunt, spondere solent. Ex alimenis pauciora oblata sunt, sed digesta & in chylum re-lacta facilissima: impura enim corpora quo magis nutriuntur, eo magis læduntur. Concessus etiam fuit vini Rhenani generosi veteris ad vires collapsas restituendas haustus. Pulchre enim Celsus lib. V. cap. 26. de præsentī affectu monuit: *præcipue in hoc casu petendum non à medicamentis solum, sed etiam à vitibus rationis præsidium est.* Præter hæc, locus sphacelatus à mortua carne & reliquis corruptis partibus eodem externo remedio liberatus est, quo putredinis vis fuit infracta; nisi quod balsamo Peruviano & aliquibus extractis vulnerariis fuerit temperatum eo sine, ut leniora hæc & ex parte emolliensia fibrarum semī corruptarum resolutionem & separationem adjuvant. Neque illud reticendum, sed potius ceu singulare commemorandum est, carnem, quæ nova regenerata est, sensu omni penitus caruisse; quod aliunde vix derivandum est, quam quod nervi hæc decurrentes & sensum scientes, vi putredinis exciderint: quæ quid vero non semper accidit, siquidem exemplo paralyticis nervi possunt affici, vel à violenta vulnereione concindi, & tamen pars adhuc vita & aliquali sanitate frui. Quam in rem notatu dignus est casus, qui in *Epileptid. N. C. dec. II. A. VIII. observ. 171.* de puero refertur, cui, pravā totius corporis lassitudine, defectu virium & capitis dolore, capilli primo defluerunt, mox futuræ cranii offisum à se disscellerunt, tandem ad reliquam corporis omnem compagem putredo proferpit; inter hæc tamen esculentorum & potulentorum appetentia cum alvi excretionē bene consistit, sine dubio, quia prægrandes ad stomachum abeuntes nervi difficiliter à munere suo cessant. Tandem quod tribus annis elapsis malum redierit tandemque corpori jam nimis exhausto lethum intulerit, non adeo mirandum esse arbitror; quoniam partes corporis debilitatæ facilius, quam sanæ, data occasione vitium contrahunt. Quod quidem axioma si unquam, certe de partibus gangræna & sphacelo tactis

valet; unde ego plures à divīs his affectibus relictos, tandem iisdem mortuos esse animadverti.

OBSERVATIO II.

Vir t. x. annorum, obesus sanguineque & fuscis valde turgidus, ob robustiorem corporis constitutionem, nunquam fere graviter per omnem ætatem agrotavit; nisi quod jam per aliquot annos à vita nimis sedentaria vinique Rhenani largiori potu varia expertus fuerit pathemata hypochondriaca, quibus abigendis aliquoties thermis vius est Carolinis, venarum secandum præbuit. Interim cum neglecta per biennium themarum potatione omniæque venæ sectione, præter spem omnium à suo, quo sangebatur, officio removeretur, gravi inde terrore ac mœrore diu affectus in pollice pedis dextri pustulam accepit rubram & dolentem, quam parum attendens barbaconiori ostendit, qui præter solum emplastrum, loco dolenti apponendum nihil prorsus adhibuit. Hic vero cum alicro die rediens totam partem affectam nigro colore tinclam & superne vesicula obduclam invenit, hæc discissa carnem subjacentem dolori plane ex ætem deprehendit, dato emplastro cataplasma superinvoluit, sed sine effectu. Accessit postea Medicus aliusque Chirurgus, varia applicuerunt remedia, quæ tamen ultcriorem sphacelosis corruptionē progressum prohibere non poterant, ut potius corruptela, ulterius serpendo, non modo totum pollicem, sed & reliquos pedis digitos eadem labe infecerit, omni- que sensu & motu privaverit. Rebus itaque tam misere constitutis duos exciderunt digitos, partique mortuæ unguenta illinerunt digestiva, ca- spe, in facta suppuratione eo melius mortui à vivis possint separari, partibus vero adjacentibus præter spirituosā imposuerunt cataplasmata; sed ne his quidem omnibus quidquam præstiterunt. Tandem & ego in re tam ardua & periculi plenissima adscitus primo omnium digitis e- mortuis à parte sana revoctis non affecte tantum parti, sed toti pedi immediate applicandum curavi hoc epithema spirituosum; *Rec. spiritus vini rectificati unc. duas, camphora drachmas duas, essentia scordii, myrrhe, spiritus salis ammoniaci anatica portione drachmas tres, storacis salis ammoniaci martialium drachmam unam.* Huic superadditum fuit emplastrum opodeldoch & cataplasma, cujus parandi modum supra in ipsa medendi methodo præscripsimus. Ex inter- nis remediis commendavi pulveres diaphoretico- nitrosos, camphora remixtos, nec non mixtu- ram analepticam putredini resistentem, quam paries superiori loco innuimus, per vices hau- riendam; idque tam felici successu, ut secuta fuerit suppuratio, optimum in sphacelo signum. Nihil tamen minus, quam remota hūc re- mediis, me inficio alia fuerit substituta, accide- prob dolor i ut aucta debilitate & anxietate, gra- vique terrore superveniente, æger animam non multo post exspiraverit.

Epitaph.

Plerumque cacochymici & senes, qui mul- tum viscosi sanguinis in venis alunt, præ reli- quis omnibus ad sphacelofam labem sunt dispo- siti, præsertim si diuturno afficiantur mœrore; quo nihil ad motum sanguinis, per se jam lan- guidum

Sphacelo- sis à causa potissimum

24

7

gulum retardandam, ejusque corruptivam finem inducendam, est potentius. Deinceps singularem interet animadversionem, quod sphacelo, in extremis etiam partibus oborta mox totum corpus gravissime ledat, notabilemque virium defectionem cum anxietate & inquietudine inducat, ita propterea, ut simile quid à gravius vulnerationibus, lacerationibus vel excoriationibus expectare vix liceat. Cujus phenomenon ratio in eo videtur reposita, quod patredo nature insensibilissima in instanti quasi suam communicet energiam cum sanguine, qui ubi jam ex aliis causis est vitiatum, perfacile inde penitus inquinatur, suoque motu iustissimo ulterius deficiunt. Præterea quoque addiscere inde licet, partem demortuam ea, qua fieri potest, celeritate, à sana esse removendam, sanguinisque progressum in parte afflicta remedium tam internis, quam externis spirituosis, balsamicis & volatilibus procurandam. Etenim, cum sfuodum progressivus motus, à quo vita & sanitas pendet, unicus sit, qui tetram putrilaginem à corpore arceat, in proclivi est, nihil prius esse debere Medico, quam ut hic vitalis motus rite promoveatur. Denique insignis virium languor, quem statim in principio morbi annotare licuit, non obscure indicat, corruptionem sphacelam, simul in quibuslibet visceribus internis delituisse occultam, quale exemplum non ita pridem in viro habui, cujus hepar sub sectione sphacelatum, & instar picis nigerrimum deprehendi.

OBSERVATIO III.

*Sphacelo
in brachio
senis
superius*

Vir sexagenarius, temperamenti melancholici, qui ob genus vite sedentarium & largam ciborum crassiorum comestionem sæpe molesta alvi adstrictione laborabat, intensissima quondam hieme iter aliquot miliarium faciebat; quo peracto præter omnem expectationem de nocte in ultimo digiti minimi articulo crudelissimo dolore cum rubore ac tumore puncto corripiebatur. Adhuc erat febris cum calore intensissimo viriumque præcipiti lapsu, & brevi tumor totum occupabat brachium, quod mox nigrescebat. Articulis, ubi dolor exordium sumferat, examinatus omni sensu privatus deprehendebatur; hinc forcipe ejus amputatio erat peragenda. Interne crebrius exhibebatur nitrum præparatum cum camphora, & tinctura bezoardica cum spiritui cornu cervi & niri remixta. Nec denique potiones analeptice consonantes ex aquis destillatis & pulveribus cordialibus omitebantur; idque per Dei gratiam hæc remediis obtinebatur, ut intra quatuor septimanas æger sanitati plenarie restitueretur.

Epietis.

1) Docet inprimis hic casus, quam facile gangrenosa & sphacelosa partis corporis corruptio oriri possit, si ab aeris ambientis frigore minimi ejus tubuli & canales contracti sanguinem crassum & acrem, ab inordinata vietus ratione accumulatum intus coercent & libere permeare non

sinunt. Quod enim si accidit, non potest non sanguis ibi subsistens coagulari, & nisi rursus in circularem motum redigatur, parit, cui fixus inhaeret, tetram putrilaginem cum plenaria viæ abolitione inducere.

2) Dein etiam hac morbi historia confirmatur, senibus maxime tales sanguinis & humorum stagnationes esse familiares, qui ob plenum crassumque victum & exercitationem corporis omniam multis impuris, viscidis & difficulter mobilibus succis starent. Neque minus partes extremæ tendinosæ præ aliis ad talem labem concipiendam sunt dispositæ, quia in ipsis, cetera cetera remotissimis plerumque tardior solet esse fluidorum circuitus. Quod autem sebris jungatur, hæc videtur esse ratio, quoniam particulæ malignæ indolis putridæ à venis valculisque lymphaticis resorptæ, cum sanguine communicantur, cujus totam massam inquinant & nisi cito remediis, sordium malignarum expirationem promoventibus internis succurramus, in eundem putredinofum motum conjiciunt.

3) Digni articulum, tanquam partem emortuam & vivis non amplius adnumerandam refecundum curavimus, ne putredo ad proximas regiones pertingat. Et notabile est, ipsam naturam emortui à vivo & sano separationem indicare, quod non modo exinde apparet, quod circulus ruber exquisiti sensus inter sanam atque mortuam carnem, & materiam albicans puris spissioris instar emergat; verum etiam integra sapientius membra, quod mirabile videtur, à corpore sejungantur. Sic integrum brachium, sine vitæ periculo, solius naturæ beneficio separatum legitur in THOM. BARTHOLOMIÆ *hystor. anat.* 69. cent. I. & P. *hystor.* 63. item in CAT-TIER *observ.* 13. Memorabilis quoque est casus, cujus mentionem facit NICOL. TULPIUS *lib. IV. observ.* 51. de consue septuagenario, qui tibia laboravit adeo corrupta, ut Medicus & Chirurgus ejus extirpationem, seu unicum vitam conservandi remedium commendaverint; quibus tamen monitis cum parere negavit vir imperio adjectus, sed misere perire maluit; factum est, ut tendinibus ac nervis ob diutinam moram ab acripure erosis, totus per vitiatum sedibus suis excident, & æger vitam reportaverit.

OBSERVATIO IV.

Militæ præfectus, æt. & aliquot annorum, Sphacelo
robustus in inferiori spinalis medullæ parte glo-
bulo plumbeo percussus quoad truncum ven-
tremque inferiorem, ut & pedes totus reddebat
paralyticus, omnique sensu & motu priva-
tus. Non adeo multo post musculi anni sat vasti
glutæi, quibus nullus inerat sensus, ad magnam
superficiem corripiebantur putredine, colore nig-
ricante & cadaveroso foetore. Latissime serpen-
te hac putredinis labe commendabantur carnis
omnis emortuæ excisio, & aliquot hujus carnis
libræ sine ullo dolore usque ad ossa acetabulum
excidebantur; dumque caro florida appareret,
ab aeris acceflu probe defendebatur stuphis lini-
mento balsamico imbutis, quod ex terebinthi-
na, myrrha, massiche, olibano, balsamo Pera-
viano, oleo lumbicorum terrestrium & spiritu
vini camphorato constabat. Interne exhibeban-
tur remedia putredini resistentia, & maxima ad-
miratione dignum erat, quod ingens hæc cavi-
tas intra quinque hebdomadarum spatium tota ire-
rum carne fuerit reclusa.

Epietis.

Epitjſis.

Quæ in nostro ægrotò conſiſtit ſphaceloſa muſculorum glutæorum corruptio, non aliunde eſt derivanda, quam quod influxus liquidi nervorum tenuiſſimi in has partes fuerit interceptus. Cauſam tam inopinatæ in corpore ſano cataſtrophes præbuit vulnus ſclopætarium, quod inferiorem medullæ ſpinalis regionem valde læſit, & denegato ibi liberiori ſpirituum motu paralyſin induxit, quæ ſe ad omnes partes, à læſa hac portione excurrentes extendit, ipſæque ſimili movendi impotentia affectæ. Quæ cum ita ſint, jam plenius confirmantur, quæ ſupra de paralyſiſ diximus, quos propter impediorem fluidi aëreo-ætherici motum præ cæteris ad ſphacelationis labem diſpoſitos pronuntiavimus. Cæterum, & hoc momentum ex præſata morbi hiſtoria in uſum phyſiologicum elicere poſſumus, ut videamus, quam neceſſaria ſit, ad ſanguinis circuitum promovendum tetramque puriſſimam à vivo corpore avertendam, debita & non interrupta tenuiſſimi huius fluidi cum ſanguineo latice mixtio; ut ideo ſoliditatis ſe ſaris accuſent, qui activiſſimum hoc fluidum vel in dubium vocare audent, vel parum ipſi activitatis & ad vitales motus ſuſtinentos utilitatis tribuere ſolent.

CAPUT III.

De purpura præſertim chronica ſcorbuti ſolote.

§. I.

Purpura deſcripta.

Quæ in nostro tempore paſſim graſſatur purpura, nihil aliud eſt, quam mali ſcorbutici progenies, cum exanthematum, peculiaris plane indolia, eruptione in ſuperficie corporis ſe manifeſtans, interdum cum febre ſatis acute & maligne, interdum ſine ea longiori tempore & benigniori modo functiones corporis noſtri pervertens.

§. II.

Diffinitio ab aliis exanthematibus diſtincta.

Purpura quam peculiaris exanthematum ſpecies ſit, operæ omnino præcium exiſtimamus, diſſerentiam illam, qua ab aliis exanthematibus diſtincta & diſtingui debet, primo omnium indicare. Characteres vero proprii quaſi & eſſentiales purpuræ ſunt ſequentes. Primo papulæ quæ effloſcunt, cum corrugatione, albedine & ariditate cutis juncæ ſunt. Deinceps nullum exanthema tam mobile eſt nature, ut tam crebro & tam celeriter ad interiora relabatur, & interpoſita mora denuo prodeat, quam hoc purpuræcum: neque ullum tam crebro, intercurrente mox æſtu, mox refrigerio, mox pruritu de punctura in corpore ſe prodiit, quam purpura. Cæterum, omnes exanthematum ſpecies, in omnibus æque corporis regionibus & tractibus in conſpectum prodeunt; purpura vero poſſimum in collo, pectore, dorſo & manibus ſe manifeſtat, rariffime partes inferiores occupat: quibus peculiaribus notis à variolis, morbillis, petechiis, maculis ſcorbuticis, roſaliis, febre urtica, herpete, ſcabie, phlycteno, impetigine &c. diſſerentur facillime.

§. III.

Effloſcentiæ in purpura multum etiam inter ſe ratione magnitudinis, figuræ & coloris differunt. Papulæ enim, quæ prodeunt, quandoque rubro, quandoque albo colore tinctæ ſunt; unde purpura diſtingui ſolet in rubram & albam. Illa veticulas habet magis vel minus laſas, quæ liquorem continent: alba vero nullas habet veticulas, ſed nodulos proſunde in cute hærentes, milii figuræ reſerentes, ad tactum alperos, humore ſpiſſiſſimo, quaſi purulento infarctos; unde purpura alba miliaris dicitur.

§. IV.

Præterea, purpura magis vel minus benigna & maligna obſervatur. Maligna eſt affectio magis acuta, cum febre continua & naturæ admodum inferis ſymptomatibus juncæ: benigna vero diutius ſine febre durat, & non adeo vite infeſtis ſe manifeſtat ſymptomatibus, atque his poſſimum notis incedit & progreditur. Præcedit levis horripilatio, quam ſubſequitur corporis exaſtuatio, cum languore vitiumque interdum apud imbecilliores ad lipothymiam uſque dejectione. Præcordia ſtringuntur & pectus angitur, adſunt alta ſuſpiria, anxietates, inquietudines, vigilæ, vel ſomnus mirum laborioſus & interruptus. Aëſtus & compunctioſus ſenſus in dorſo percipitur, alternante frigoris, horroris & caloris intra cutem affectione, in vola manuum maxime ſenſili. In puerperis lochiorum fluxus retinetur, & lac à mamma reſorbetur ac ſtillare ceſſat. His ſuccedit cutis aſperitas & inſtar aſtæinæ corrugatio, exurgentibus innumeris papulis, ſive albis, ſive rubris, ſive utriuſque ſibi invicem appoſitis, milii ſemen figuræ & exiguitate reſerentibus, quæ primum collum, deinde pectus & dorſum, ac poſtea brachia & manus occupant & obſident. Et his ſumma in cute effloſcentibus, graviora illa ante eruptionem pathemata, inprimis præcordiorum anxietas, cardialgia ſyncopica, inquietudo, pectoris compreſſio, cum ægra ſpitzione, admodum mingantur: pulſus, qui antea durior, contræctior & celerior erat, nunc molliſus, liberius & remiſſius manum vibet, animo vigor plane depreſſus & dejectus reſcit, arida cutis madefcit, & alvus antehac tam duriter compreſſa, ut nec ſtrobis tranſitus pateret, laxatur, & non ſolum hos, ſed nonnunquam etiam ſtercora, ſponte protrudit.

§. V.

Notabilis hæc ſymptomatum remiſſio, ſi in purpura, tam rubra, quam alba, vel utroque ſimul conſpicua, poſt eruptionem conſtanter perdurat, veticulæ ſenſim ſenſimque explicantur ichore ſœtido plene, neque ſtationem ſuam deſerunt & retrocedunt, urina quoque magis ſaturata prodiit, & ſudor ſingularis & conſueti in exanthematico hoc morbo ſœtore erumpit, ſanguis etiam per lochia fluxus reſcit, lac mammae repetit, alvus vel ſponte, vel clyſtere inuſo, aut ſuppoſitorio admoſto, facies vel flatus reddit, & intra ſeptem vel plurimum adhuc dierum decurſum, cum inſigni extenuationis pruritu, puſtulae diſparent & æger ſenſim ſenſimque ad ſanitatem reſcit. Hæc enim omnia ſubſtituant, non adeo enormi ægrum decineri imbecillitate, ſed ineſſe adhuc ſolidis paribus motu-
ceru

cem energiam motuque vigorem, neque universam sanguinis & humorum lymphaticorum temperiem destructam esse; ut adeo, hanc ob causam materia hostilis peregrina jugiter & æqualiter à vitalium humorum consortio separetur, & ex interioribus ad exteriora ablegetur.

§. VI.

— maligna
tubercles &
decussim.

Contra, aliter res sese habet in purpura maligna, ubi efflorescentiam sufficienter comparantibus, pulsus servat præternaturalem celeritatem, nec somnus redit, nec inquietudo sedatur, nec respiratio liberius succedit. Dein quoque ut plurimum nimis feri per sudores sunt profusiones, qui, si statim sub initium & per totum morbi decursum copiosius manant, virum colliquationem & cutis quasi paralyticam resolutionem subinducunt. Eiusdem quoque notæ sunt urinae pallidae, tenues & copiosæ, vel continuas ad mingendam stimulus, nec non si urina ante coloratior & crassior reddita, subitè limpida, tenuis & pallida prodit, ob spasticam retum & viarum urinarum stricturam.

§. VII.

Qui aliter
notæ ostendit.

Præter hæc insauso omine per sepe accidit, ut pustulae purpuraceæ modo appareant, modo disparuant, ipsorumque symptomatum atrocitas eodem semper infleat gradu: quæ omnia robur naturæ prostratum, vires deperditas & magni illius nervo-tendinosi ac porosi emundatori, quo universa sanguinis & humorum massa repurgatur, cutis tonum destructum esse testatur, ut ea propter ejus extrema nervæ sensibillior portio, mox ipsissimo contrahatur & crispetur, mox rursus laxetur & explicetur. Longe vero deterioris indicii est, si materia relapsa interioribus firmius inhaerescit, omnique ad superficiem corporis expulsiōni obstat; quo fit, ut acerbiora reddantur symptomata, pectoris cum fœtibus oppressio intendatur, virum prostratio increseat, præcordiorum cum inquietudine anxietas augeatur, & omnia in pejus ruunt; unde etiam omnes qui purpura decedunt, ob eam intro repulsam & inde ortum malorum & pathematum augmentum percant. Nam licet ante eruptionem purpuræ, materia illam gignens sit valde maligna & pernicialis indolis; attamen, si semel a sanguinis massa separata, & extra vitale consortium constituta sit, ipsa illa mora, longe deteriorem naturam induit; siquæ ad partes vitæ inservientes, maxime motrices & sensu exquisito præditas, redit, operationes veneni æmulas parat. Quare, sicuti in omnibus exanthematibus, ut petechiis, variolis & morbillis, gutta rosacea, scabie, tinea capitis, nec non podagra, arthritide &c. materia quedam, vitali corporis conservationi inimica, ad extrema semel propulsa longe vehementiorem efficit symptomatum insultum, si interiora repetit & vitalibus succis denuo permiscetur; ita ejusdem novæ & pernicialis facultatis esse receptas in corporis penetralia, purpura disparente, sordet, ipsa experientia luculenter testatur.

§. VIII.

Morbi insidiam in
purpure.

Funeſtum denique eventum mortemque haud longius abesse hæc nunciant: si similitudine intus obhaerescēte materia deletoria, interiora ardent & extrema rigida strictura detenta, co-

pioso frigido sudore perfunduntur; aut si vicissim extrema aestuant, & in abdomine notabilis refrigerationis sensus percipitur: si porro tendines subsultant, facies comparet Hippocratica, virum defectus crescit, indignabunda desperatio animum turbat, arteriæ duriter, inæqualiter & tremulo motu micant. Hæc enim si contingunt, sæpius brevi post æger lethali hypothermia succumbit.

§. IX.

Quamvis vero purpura cum, vel sine febre, sæpe numero primarius & idiopathicus morbus sit; non raro tamen, ut symptomata, aliis, & maxime continuis febribus, ad exitum vergentibus, non sine discrimine complicatur. Non novum enim, sed admodum familiare est, quod purpura rubra & alba, vel utraque simul, variolis, morbillis, synochis putridis, ardentibus, petechialibus quoque & petechizantibus aliisque epidemicis in declinatione accedat, & novam febrem cum diris symptomatum tormentis inducat: ita ut in vado propemodum possis acute febrientibus, mox ex improvviso horror, cum summa angustia, inquietudine, insomniis, æstu & intensâ virium prostratione oboritur, purpura demum in superioribus sparsim efflorescente; quæ tamen, vires à priori morbo jam fractas penitus exstinguendo, ægrum plerumque jugulat. Inprimis sæpius à nobis observatum est, purpuram hanc symptomatam funestam fuisse juvenibus acuta laborantibus iis, qui antehac intemperantius vixerant, largiori & quotidiano potui indulgerant, venereo exercitio vires consumserant, & peregrinam humoribus crasi & diathesin induxerant, nec non si sub ipsius morbi decursu alvus oclusa, per aliquot dies purgamenta retinuerat, aut inconsultâ medicatione, refrigerantia & aciculata, ut jalsapa & potiones, in nimia oblata fuerant copia. Ceterum, non tantum inclinantis morbis acutis purpura sese adjungit, sed sæpius etiam ab initio & primis diebus purpuracei exanthematis quidpiam, cum aspreddine, in variolis maxime & morbillis, prodit, & rarissime quidem cum bona & auspiciata morbi successione. Siquidem non una aut simplicis, sed varii generis excrementitia & exanthematia materia referant esse vitalium humorum massam, indicium hoc præbet propterea indubiatum. Denique etiam catarrhalibus febribus, cum tussi & spirandi angustia, subinde in infantibus sese associat purpura, vomitu vel etiam alvi fluxu stipata; quam, si inclinât morbus, pedum & quandoque abdominis intumescētia; cum, vel sine aridura superiorum partium, excipit, & ipsa, prout in locis montanis superioris silvæ Hercyniæ tractus observatum est, tandem sudoribus, vel sponte obortis, vel arte elicitis, ex toto cedit atque abigitur.

§. X.

Licet porro rubra purpura semper ab initio cum febrili quadam commotione ingruat, & semper vesperalescente celo gravius infleat; attamen longius procedente tempore, febribus cum pulsuum frequentia exspirat, symptomata complacantur, ipseque morbus benigniorem induit naturam. Quare si in principio imprudenter medicatio excipitur, & corpus valde impurum, sive cacochymicum offēdit, ad plures sæpe menses, non quidem sine insigni molestia & pathematum novo subinde recurſu, perseverat,

Rubra &
per febre
chronica.

verat, neque tamen funestum facile fortiter even-
tum.

§. XI.

*Causa ma-
terialis
variaque
purpura
generatur
indicatur.*

Purpuram scorbuti esse progeniem, supra quã-
dem innuimus; longe tamen clarius hæc eluces-
cet veritas, si utrique purpuræ causam mate-
rialem, quæ pariter ac in ipso scorbuti sanguinis
dyscrasia nititur, consideramus perpendimus. Nos
autem in illa designanda à vero non abluere
videmur, si dixerimus: purpuram & rubram, à
sero impuro salso, acri, sulphureo, excremen-
ticio; albam vero & acutam miliarum, à lym-
pha & sacco nutritio ad acido-vappidam puri-
dam naturam accedente, suboriri. Diverse enim
naturæ & discrepantis indolis ambo in corpore
nostri succi sunt. Videlicet iterum dicitur, ad-
mixtus ille sanguis humor, qui plurimis tali-
bus ac mucidis partibus, per innumera emun-
ctoria & colatoria, tum segregandis, tum eli-
minandis, refertus, cohsistentia tantisper spi-
ssioris ac varii coloris est atque saporis. Lympha
autem est pellucidus, insipidus & parvisquis,
cujus subtilior pars fluidi cerebri, medullæ spi-
nalis & nervorum, nec non liquoris genitalis
materiam præbet; gelatinosa vero solida omnis
generis partibus in nutrimentum cedit, & te-
rior aqua per lymphaticam vasculis valvularum
& glandularum conglobatarum, ad fontem purpuræ vitalis, cor, regreditur, illique
cum partibus sanguinis dulcoribus aëreo elasticis
rursus nuptus & quasi de novo animatus, una
cum illo quoquoqueverus amandatur, suisque in-
servit. Hinc descendentibus his à naturali sua
indole, quilibet illorum peculiarem suscipit cor-
ruptionem, ex qua differens postmodum morbi
emergeit genus, diversa symptomatum vehemen-
tia, & majus vel minus periculum.

§. XII.

*Consa
materiel.
purp. alba
speciatim
opendatur.*

Quod vero in purpura alba, lympa acore in-
fecta sit, plura sunt, quæ id confirmant. Lympha
redundans in lymphæ & sanguinis massa
acidum, ex nimia feri secessione huic morbo so-
lenni, & tantum non essentiali, dilucide paret
cit. Ea enim acidi vis atque facultas est, ut san-
guini induratum, ejus partes castiores in coagu-
lum mitat ac feri secessum faciat, quo fit, ut su-
dores largissimi erumpant, urinae tenues & co-
piose fluant, vel etiam salivationes, aut aquosæ
per alvum dejectiones, oboriantur.

§. XIII.

*Purpura
alba cor
puerperis
asecta &
plurimæque
malignæ.*

His suppositis, nostrum jam erit, ut clarius
exponamus, quam ob causam purpura alba ma-
ximè puerperis infesta, & plurimèque maligna
sit. Quemadmodum vero in genere omnes à,
qui lymphaticos & aquosos humores redundan-
tius in corpore alunt, ut sunt foeminarum plu-
rimæ, acide potius patent humores vappescen-
tiae, quam salino sulphureæ corruptioni, & hanc
ob rationem purpuram postillam albam nati-
ascuntur: ita de miliaris hujus febris in puerperis
frequentia hæc ex vero interponendam esse
sententiam putamus. Scilicet, in gravidarum tu-
tero, sanguinis tam progressus, quam regressus,
ob nimium eo appellum & vasorum distensio-
nem, valde languidus, tardus & difficilis est;
unde subsistente ibi diutius sanguine, lymphati-
cus humor, in vasâ ipsi vehendo dicina, magna
copia secedit, & in horum diverticulis quasi in-

carceratur hærens, ex longiori mora vappescit,
corumpitur & acorem contrahit, partibus subli-
rioribus spirituosius, quæ optimæ mixtionis sunt
conservatrices, avolantibus. Quandoque igitur
enixo scetu uti nus concidit, iterumque coar-
ctatur, neque squalidus lymphaticus humor cum
sanguine faculentio effunditur & exurgatur, ac-
cedente ordinario terro puerperii die mota fe-
brili, Germanis, *das Milch-Fieber*, in vasâ
majora is reprimatur ipique cordi infunditur, ex
quo, maligni indar fermenti, per corpus diffun-
ditur & serpit, totamque sanguinis & lymphæ,
tam nutritiæ, quam oervorum, massam inficit
atque inquinat.

§. XIV.

Si vero impuritas & dyscrasia feri & sangui-
nis talia acris sulphurea peccat, symptomata non
adeo exitialia urgent, sed efflorescentia magis
sunt chronica, facies inflata & coloratio, oculi
scintillantes, major pruritus, ardor & punctura
in cute est, neque tanta inquietudo & anxietas
spirandique angustia affligit, & major salus spes
affulget; nisi demum ipsi alba superveniat, vel
rubra in albam mutetur, quod sepiusculum ex ma-
lo regimine, vel medicatione pervertit, vel etiam
accidentibus gravioribus animi affectibus, con-
tingit, dum superabundans lympa corrum-
pitur, & tandem sub ipsa fibre & intestina calida
partium motione, spirituosæ, tenues, sulphureæ
partes avolant, relictis crassioribus acetosis vap-
pidis.

§. XV.

Uterius, si paullo propius spectemus origi-
nem & indolem materię, quæ purpuram facit
minus periculofam, eandem potissimum à par-
tibus salino-sulphureis acris feri, quod non per
emuoctoria, maxime cutis colatorum, ejicitur,
sed remanet & deteriorem naturam calido mo-
tu intestino induit, derivandum esse censemus:
idque plures ob rationes. Id enim experientia,
optima rerum magistra, subinde docuit, quod
chronica purpura maxime eos invadere solet,
qui sanguinis imperi copiam alunt, ut scorbuti-
cos, senes, seminas, quæ menstrui, & viros,
qui hæmorrhoidalis fluxus defectu laborant,
dieta salis, vinosæ, cerevisiæ crassioribus & ta-
baci fumo delectantur, & habitu corporis la-
tiore præditi, vitam agunt motus expertem.
Deinde causa mali hujus ut plurimum est per-
spiratio subito cohibita & cum ea repressæ for-
des, sive ab aura frigidiori poros comprimente,
sive à potu nimis refrigerato, aut teperrimo in-
casso terrore. Nam nota sunt nobis exempla,
quod ingesta corpori, nimio sudore diffuenti,
frigido interperantius haustu, tandem gravissi-
morum subsequens symptomatum choragium
in eruptionem purpuratam exierit. Novi-
mus enim plures, qui exæstuum prius in le-
cto, vel solis sub itinere ardore, aut etiam li-
co in casta salaria balneo, corpus auro frigidio-
ri, ex boreali plaga spiranti exposuerant, eadem
tentari sunt. Et ipsa quoque algida & borealis
aëris consuetudo, diutius regnans & perspiratio-
nis actum sufflaminans, in causa est, quod tam
crebro & facile hoc malum recidivet, & in pri-
mis post solstitium hiemale frequentius repetat,
præsertim mense Januario ac Febuario, & de
novo corpus infestet. Quanta enim algida &
ex septentrione spirantis auræ facultas sit, ad
excretiones etiam præternaturales per cutem

*Rubra in
puerperis
tam malig-
na non est.*

*Consa
materiel
purpura
chronica
speciatim
tractatur.*

corporis corticem succedentes, interceptas & reprimendas, notabili admodum exempli confirmat Læc. REXIUS *obf.* 13. memorans: quod puer afflicti fuerit impaigne, ichoralem materiam sudante, succedente vero boreali constitutione, suppreffam asse fecdam illam materiam, & in pulmonem convertam, asthma excitasse, idque defuisse recurrente constitutione aurali.

§. XVI.

*Is effectus
remedio-
rum regis-
matur.*

Nil vero luculentius peccantem salino-sulphuream in purpura minus acuta substantiam prodit, quam quod medicamenta, quæ salium spicula involvunt ac temperant, quæ virtute splendent serum lactis, lac caprillum & asinum, cum aqua Selteriana mixtum, nec non decocta temperantia, loco potus ordinarii usurpata, exoptatissimam in purpurea hac labe lpondeant medelam & utramque in ejus perfusione absolvent paginam. Et vicilium, quod huic purpure, licet omnis periculi sit expertus, si nimio calore externo, vel internis calefacientibus aut volatilibus pharmacis excipitur, eodem modo ac scabiei, pustulis ulcerosis & aliis cutis defecationibus, ex prava & falsa acri humorum diathesi provenientibus, doloris, ardoris & pruritibus augmentum accedat, & non raro sitis ac febris accendantur: eo quod falsa his acriora reddita, alius sese in cutis fibrillas insinuant, easque lancinant & vellitant.

§. XVII.

*Id chronicum
maiori
peractum
salino
acrimonia,
quam
de aliis.*

Accedit, quod chronicum hoc exanthema longe majori pruritu & ardore dissipatum atque mollescentum sit, quam album cum rubro maxium; id quod certe non nisi salinis & acerbis, insensibilem cutis substantiam pungentibus particulis tribui poterit. Eandem porro salinam humorem acrimoniam conspectius arguunt, hæc, quæ multiplici experientia comperta habemus. Videlicet sæpius observavimus, quod aquæ salutes dulces, salini elementi & purgantis facultatis expertes, ut sunt nostræ Lauchdaienses, a purpura habitali detentis potæ, insigniter alvum vacucent, & primis diebus, sex, vel octo quousque sedes moveant, materia sedecente tam acri, ut anum etiam arduat; quam elapsis aliquot diebus, gradatim purgans effectus exspiret, neque si insequenti anno potatio repetatur, alvum deiciens operatio eandem subsequatur. Neque reticendum nobis videtur, quod in purpura contumaci chronica scorbutica, post usum lactis vel aquarum mineralium temperatarum, non sine insigni emolumento balneum ex aqua dulci pluviali susceperimus; ita ut hoc aliquoties admisso, omnis punctura, omnis pruritus, omnis ardor in cute demeretur & efflorescentia disparerent: indubio testimonio, temperata interiorum humorum acridine, & evocatis per relaxatos in balneo poros, quæ sub cute obhærescebant, acerbis recementis, ipsum morbum abactum esse & perfunatum.

§. XVIII.

*Ratio, cur
purpura
chronica
removetur.*

Nunc vero reddenda erit ratio, quare nullum exanthema sanatum, tam facile & tam crebro revertatur, quam rubra purpura, sic dicta scorbutica. Duplex autem nobis videtur subesse causa: tum quod cutis tonus in hoc morbo valde lædatur & destruitur, tum etiam, quod purpuræ sæpius repetendis subiectum & se-

des sint glandulæ conglobatæ. Quemadmodum enim cutis universale omnium humorum emundatorium præbet, & ad sanitatem tuendam usus est longe præstantissimus: ita, maxima etiam certe est noxa, quæ viciata hac officina, in valetudinem redundat. Facile tamen vitium patitur, & plura sunt, quæ labem ipsi inferre possunt. Nam insinuat hoc corpori integumentum, non solum ex filamentis extremitatum nervorum sensibilioribus, componitur, sed etiam ob implantatæ extremæ arteriosorum, subtiliorem exhalabilem materiam vehentium ofcula, tonum tubulosum & poris pervium est: eaque propter, tam quoad suos tubulos & poros, quam quoad substantiam suam, non tantum subtiliori dilatationis & constrictionis motu ac tunc, verum exquisitiori etiam sensu pollet. Hinc quoque major cutis est sensibilitas, eo facilius etiam injuriis afficitur & vigens in illa motus perverti potest. In primis ad aeris frigidi borealis, vel australis humidus calidi allapsus, facile alteratur, contrahitur nempe vel relaxatur, & verum hygroinetron microcosmum constituit. Externe quoque causæ, quæ lædunt, pungunt, vel scindunt, aut acrimonia rodente prædicæ sunt, nec non medicamenta aciora, nimis calefacientia, refrigerantia, pinguis & inviscantia, naturalem hujus integumentum tonum interpolandi, quin plane subvertendi, eximia pollet facultate. Mutato vero hoc & destructo, non potest non graviter simul lædi, saluberrima pro hujus colatorii ofioli succedens perspirationis excretio.

§. XIX.

Quod si itaque aliquoties compages & conservatio cutis vasculosa & fibrosa læsa, & tonus ejusdem, cujus beneficio materia recementitia foras per exhalationem dimittitur, bonique succi revehantur, fuerit diutius: prava unica dispositio & imbecillitas fibrillis induitur, & firmitas insinuat, ut deinde quam facile impori humores eo adducti, rursus debili huic parti impingantur ibique subsistant. Et certe quam pertinaciter præternaturalis ejusmodi ad stagnationes dispositio cuti insidere solet, & quam ægre submoveatur, luculenter testatur gutta rosacea, quippe quæ, læsa pariter gravius, copioso deposito ichore, & depravata tenera & tubulosa cutis in facie textura, difficulter sanationem admittit & funditus exspiratur. Quare quam frequentiori purpuræ ad cutem accessu, ejus tonus, motus, robur & textura canaliculosa admodum immutatur & corumpitur: non mirum est, si collecta ibi de novo excrementitia materia, idem morbus iterato producat & purpura efflorescat.

*Quemadmodum
purpura
chronica
removetur
deja conf.*

§. XX.

His igitur expositis, quæ ad demonstrandam utriusque purpuræ causam materiale necessariæ vitæ sunt; proximum jam est, ut, quæ remote ad ejus generationem concurrunt, explicemus: quod quidem non melius fieri posse confido, ac si subiecta purpuræ considerantes simul ostendamus, à quibus causis huic morbo fiant obnoxia. Primo autem notari velim loco, quod si, qui sero plus abundant, quam sanguine, ut infantes & formæ, quæ spongiosa gerunt habitum & temperamentum sic dictum phlegmaticum obtrinent, purpuræ, præsertim diuturnæ, quam maxima sint obnoxia: ita tamen, ut quo magis

*Subiecto
purpuræ
causæ
removetur
deja conf.*

magis exundantes serofi hi humores à puritate & blanda sua natura ac temperata scheli discedant & sordide confusæ sint, eo difficilius quoque sanationis, etque magis ancipitis successus morbus exurgat.

§. XXI.

*Forma febrilis-
sima de qua
sero-
re in de-
delicata.*

Deinde, experientia compertum habemus, imbecillioris maxime & sensibilibioris naturæ feminas, nec non quæ vires, ob graves animi ægritudines, imprimis diuturnum mororem, attriverunt, vel cum nimis prodigis sanguinis, sub abortu aut mensium excessu, profluvio effuderunt, vel etiam præcedente quodam diu affligente morbo perfecerunt, purpuræ tam chronica, quam acutæ & febris miliaris malignæ, esse expositas. Nam in infirmis & debilibus ejusmodi corporibus, lymphatici, blandi, nutritivi humores, perquam facile alienam indolem & spurciciem contrahunt; eo quod labefactato solidorum robore, lenius ingreditur fluidorum cursus, & impedito legitimo secretionum & excretionum successu, cruditatum & sordium in corpore sœpius gignitur & coarcescitur.

§. XXII.

*Peripetia
purpure
acutæ
diu-
tina.*

Maxime omnium vero puerperis, febris, miliaris purpura stipata, nostra potissimum in oris familiaris & sæpius funesta est. Erumpit hæc ipsa tertio plerumque à puerperio die, quo febris lactea prodire solet, interdum tamen septimo, quandoque etiam decimo quarto denum die, invadit. Quod si igitur hujus ortum & causæ pervestigamus paulo scrutari velim, nulla rursus prætermittende erunt circumstantiæ, quo illarum beneficio, ad internam ejus naturam & veram gen sin pemolendam pervenire possimus. Jam vero constanti & ætenua observatione in propaulo est, feminas puerperas, rursus, minus delicatas, & quæ corpus motu ac laboribus crebris exercent, in puerperio hæc febre non affici: contra divites, teneras, sedentariæ vitæ, sonno, luxui & laetiori diutè deditas, nec non quæ paulo sensibilibioris naturæ, & in animi ex affectuum intemperantia commotiones proniores sint, perquam facile post partum in purpuram incidere. Præterea ad veritatem quam maxime accedere videtur, quod laetus & pollicibilis visus, qui rejectis durioribus paulo & salubris alimentorum generibus & odoratis, leves cibos, farinacea, placentas, dulcia, fermentescibilia, horæi fructus & nonnisi palato accepta & potulerna admittit; nec non aer minus sincerus, vapores multique sordidis & putridis halitibus, ex paludosis circumstantiis signis in aurum evectis, resectus atque corruptus, una cum aquarum impuritate, & squalore, uti omnium morborum, ita maxime hujus generationi, epique malignitati inducenda, multum vellicantur. Et ex his fontibus petenda urique erit ratio, quare apud nos perpetua hic morbus potissimum exclusus sit. Lij hæc, quæ situm de reliore, & ob adjacentium paludum complexu, aerem minus salubrem obinet, civique inollitur ac delicate viuentes alii: in Angliâ vero primam visus sit Londini, ubi eam vivendi ratio invaluit, eademque coeli & aeris conditio regnat. Neque dubium est, quod feminæ, eodem viæ genere alibi etiam fruantes, & in locis non adeo salubribus degentes, frequentem & malignam etiam hanc febrem experiantur.

§. XXIII.

Observavimus porro, gravidas, quæ alvi sunt adstrictioris & sub sedentario vitæ genere, neque medio gestationis tempore, neque ultimis mensibus, nimium valorem plenitudinem sanguinis detractione minuunt, in puerperio constitutas, graviter semper decumbere, & purpura hæc labe infestari. Quemadmodum enim prægnantes sere omnes, semper exundantem sanguinis copiam alunt, & ob canalium distensionem tonique in his relaxationem, lenius præcedente sanguinis & humorum cursu, partus quoque facta superfluum & sordium per secretionem & excretionem dicata officina secretionis succellive succos contrahunt & collipunt in purpura certe, si alimentorum minus congruorum usus accedat, & elementa, ad vires tendenda & valentiam sufficere tantam necessaria, vitium habent & temerata corpus subicit, longe major corruptela inducitur & imis penetralibus insinuat, quæ apertus postmodum sanitatem oppugnat, & lethalis nonnunquam morbus parit.

§. XXIV.

Deinde purpura, imprimis miliaris, solenniter tentantur puerperæ, si primò à partu dactibus lochiorum fluxus non rite succedit; sed vel protus deficiat & cohibetur, vel paulatim aras, vel jactatus derin, vel plane terrene, aut admodum liberius frigore, protius siliur atque supprimitur. Nam in gravidis, ob sanguinis & humorum redundantiam, uteri vasculosa valde & cellulosa compages mirifice expanditur, & facta compressione, oplesur, ut sanguis tardius & difficilius ibi circumagatur, neque penitus in alimentorum foras ablutum, in vasis uterinis flagnet, crassius & fœculentius evadat, donec tandem exclusio partus, vasis, quibus utero adhæret placenta, lochorum fluxu, rursus effundatur & evacuetur. Quod si hæc vel ex ipsius sanguinis viro, vel vigoris naturæ defectu, corruptus hic cruor non sufficenter expurgatur, sed inverso motus in vasa majora & nobiliora viscera, cor, pulmones & cerebrum transit ac rediretur, nequaquam certe mirum est, si inde febris cum magna feri impietate & corruptione, quibus nostra est, suppare, oboriantur, atque graviditas illa complicata pathemata succedant.

§. XXV.

Constantia præterea in praxi medica observationis est, feminas longe gravius & frequenter laborare purpura tum chronica tum acuta, quam viros, propter mensium negotium. Jure enim viros potissimum hujus mali sors dici meretur, qui DEMOCRITO teste, *ap. de nat. hom. ad Hippocrat.* mille ærumnarum mulieri auctor est: illudque rarissime feminis accidit: si menstrua sanguinis fluxus ad calculum, sufficienti quantitate expeditur, & per legitimum tempus durat; sin vero minus, frequenter eodem affliguntur. Hinc antea etiam experientia patet, diutius cum eodem conflictari, quæ ob provechorem atatem, aut alias ob causas, mensium plane non experiantur profluvium. Quin imo, si in junioribus tributum hoc lunare male ad calculum, aut parcius solvitur, accedentior præsertim aliis causis, purpura plerumque latitat, quæ demum sub variorum symptomatum choragio in conspectum venit.

§. XXVI.

*Foridus
fluor albo
intermittens.*

Neque semel, sed multoties certe, experientia docti famus, mulieres, fluiori albo obnoxias, hoc parcius stillante, vel per imprudentes inunctiones compresso & cohibito, purpura fuisse correptas; eaque curata, fluxum ex pudoris suu repetisse, succedente, ipso sublato, rursus purpura. Ut adeo vel ex hæc dilucide pateat, exanthematicum hunc morbum lymphæ esse progeniem; neque mirum sit, quod nostro ævo, quo hic fluor feminis longe familiarior, quem antea est, purpura quoque frequentius eandem atteret.

§. XXVII.

*Corpora
que dantur
in ab-
scessu
de
dile-
ctione, vel
a morbo
per se
hæ-
rent.*

Et quamvis immodica sanguinis redundantia, in his, quibus per mensium, vel hemorrhoidum fluxum eadem non diminuitur, neque per consueta sanguinis missiones exantlatur, ad generationem, chronicam præsertim purpuræ, multum conferat: attamen enata etiam ex boni sanguinis penuria crispis fieri impuritas, ad producendum eandem plurimum omnino valet. Id profecto crebriori observatu compertum habemus, quod ab inconsulta & immoderata sanguinis per venam sectam detractio, vel largissima ejus cum abortu profusione, interveniente præsertim gravi terroris aut itæ affectu, extremorum refrigerationes, animi deliquia, ventriculi cum anxietate inflationes, pectoris oppressio & alternatim frigoris & æstus in corice corporis sentis, fuerint suborta; quæ comparsæ tercio vel quarto post die purpureo exanthemate, iterum conquirere & mitigata sunt. Nihil enim (omnem, vim & robur solidæ partibus æque suffragatur & adimis, nihil tam promptè fluidis, jam tum impura, virulentam naturam inducit & ingenerat, quam animi turbæ, inprimis diuturnus angor & longius extracta morbositas. Quare, si utero gerentes, vel hysterici pathenatici afflicti, aut menstrui fluxus irregulari successu laborantes, enormi afflicti tristitia, haud fallax purpuræ, in puerperio deterioris futuræ, indicium, inde poterit desumi. Imo, benignioris & minoris ingenii purpura, in corpore imbecilliori & animi affectibus crebrius percussis, perquam facile malignitatem induit summamque intentat perniciem. Quid? quod plurimis exemplis confirmatum asserimus, viros sedentariæ vitæ nimium adstrictos & literarum studiis intemperantius invigilantes, accedente tantum pertinaciori animi exortore, purpuram contraxisse & per diuturnum tempus cum eodem esse conflictatos.

§. XXVIII.

*de hæmorrhoidibus
per se
aut de purpura
per se
epidemicis.*

Accedit temerata aëris, cujus usura homo continuo eget, nec non inordinata tempestatum continuatio, quæ omnino ad hujus mali generationem multum confert. Nam sicuti fluidi illius catholici, æreo-ætherei magna vis atque potestas, ad fluidissimi nervorum ac membranarum succi omniumque humorum schedin ac crasin pervertentiam; ita etiam ad tonam cutis & saluberrimam perspirationis excretionem modificandam & alterandam, facultas est: ita, quod ex illius impuritate epidemice grassantes progignatur morbi, & ipsa quoque purpura, plus vel minus maligna exurgat, non est quod dubitemus. Plures jam elapsi sunt anni, quam Saxoniam infriorem purpura epidemice pervagaretur, & cum ætatis illi septe puncta, infantes maxime infesta-

ret, quæ originem fuerat forita est antecelens diuturna nebulosa & pluviosa temporum conditio, quam frigidior ex orientali & boreali plaga spirans aura exceperat: prout pluribus memoratur in docta BOETTIGERI de purpura tubra epidemica, Helmstadii habita dissertatione. Simili ratione M. N. C. Dec. I. An. VI. pag. 145. fidem faciunt, quod infrequentem mollem & nimbofam hiemem vere, purpura maligna exorta, per totam æstatem populares habuerit circuitus, & infantibus maxime solennis fuerit æque funesta. Aëris quoque minus puri & variis alienis activæ indolis exhalationibus referri constitutio in causa est, quod nonnulla præ aliis loca hunc morbum facilius & generat & pertinacius foveant. Sic plurima animo obversantur exempla eorum, qui, purpura in nostra hac urbe correpti, & in loca alia salubriora profecti, sanitatem recuperarunt; simul ac vero hac redierunt, & aliquandiu hæc commorati sunt, in priorem morbum reciderunt. Hinc etiam præcipua duccenda videtur ratio, quare menses Martius & Aprilis, catarrhalibus, exanthematicis & purpuraceis febribus proferendis tantopere faveant; siquidem decurrentibus his, cæsum plerumque gravius, asperum & mutabile incumbit, & æmospheera teris est compluvius a nive discussa elevatis exhalationibus, inquinata est æque optata.

§. XXIX.

Hæcenus purpuræ subiecta & causæ perpendimus potissimas, quæ, in chronica præsertim, cum causis febribus ingenerantibus alimodum conveniunt. Peccat enim similiter in scorbutico sanguinis dykrasia acris, salis, sulphurea, tantum quod in purpura magis sit exaltata & subtilior redacta: conferunt ad ejus generationem habitus corporis laxior, diuturna animi ægritudines, atque naturales se & excretiones impeditæ; conferunt aëris intemperies vappida, loca humida & decitiora, cibi incongrui, duri, sanguinisque tum defectus tum redundantia, & hujus generis alia. Quæ vero quæ ita sint, hic difficultis oritur questio, cur purpura, præsentibus omnibus, quæ ad ejus generationem faciunt causis, ante aliquot decem lustra producta sit. In qua quidem re tam perplexa decidenda aperte fateor, communis malis, communem etiam esse causam. Jam vero in superioribus latius deduximus, in purpura chronica peccare maxime impuri salis, excrementitii ferij, in miltari lymphæ putridæ, vappidæ, acidæ copiam, & hanc materiam tam acidam, quam acrem salinam, in sanguine contentam, motu intestino calido longe pejorem indolem nancisci, ut partes nervosas gravius lædat, sollicitet, ac tandem cum gravibus symptomatibus febris expulsiæ gignatur. Necessarium igitur est, ut oculos circumferamus, nam in diætæ, de victu, qui humoribus vitalibus tam materiam, quam temperiem ac intemperiem suppeditat, quidpiam in plurimis Germaniæ locis admissum sit, quod ante quadraginta, & quod excurrit, annos ignotum fuit. Id vero, ut aperte loquamur, est ille fere universalis usus, seu potius abusus potuum calidorum, inque primis exoticis coffee. Adeo enim in patria nostra hujus potus usus invaluit, ut quasi coffee mania ubivis ferme regnare videatur, quum præsertim formine, nobilioris æque ac vilioris sortis, quotidianum illum habeant, & non solum mane, sed etiam post meridiem, domi & foris convenientes, eundem cupide sorbissent, quin ubiurbanum reputent, invientes

hac potione non ad saturitatem usque expleta dimittere. Et annotamus certe, quod ex eo tempore, quo fortitio huius potus adeo in consuetudinem abiit, nec non iam in locis, ubi frequentior usus est, plus etiam purpura regnarit & increverit.

§. XXX.

Obiectum
reflexum.

Verum enim vero, licet hæc observatio experientie suffragio adeo subnixæ sit, ut in dubium vocari nequeat; asserti tamen nostri veritatem tantisper labefactari videtur: quod in regionibus Asiaticis, præcalidis, tritissimi & pervulgati usus sit hic potus, purpureo tamen morbo ibi locorum plane silente. Sed speciosa hæc prima fronte obiectio facillime dilui poterit, si quis curatius perpendet, longe aliam his in locis esse victus rationem, quam in nostris oris; eorumque incolæ neque cibis calidioribus & durioribus, neque salitis uti; coelum quoque multo esse tractabilius & calidius & transpirationem copiosius & expeditius succedere; neque, quod maximum est, inquinamentum scorbuticum corporibus infidere, sed ignotam prorsus ibi esse hanc lueni. Scorbuticam enim impuram humorum diathesin, inter causas purpuræ generis ministrantes commemorandam esse, vel exinde diluatur, quod ibi in locis, ubi scorbutus familiaris est, ut in Anglia, Belgii, Suecia, & nostris quoque regionibus, purpura viget, & hinc etiam purpura scorbutica habitualis dicatur. Quin imo notatu perquam dignum est, quod ubi jam grassatur purpura chronica & incolæ affligit, dolores illi funtiones arduum, ulcera cacoethæ, putridæ & sanguinolentæ gingivæ, maculæque latæ & carulæ, quæ omnia & singula propria & essentialia scorbuti sunt symptomata, rarius, vel non in tanta frequentia & levitate amplius observentur, uti pluribus infra docebitur.

§. XXXI.

Quomodo
et purpura
generis
scorbutici
excreverit
alio colore.

Quomodo itaque hæc, quæ in aliis plagis & climatibus, nec non sub alio plane vitæ genere & corporum constitutione, coniungunt, ad nostrates nullo modo transferri & accommodari queant: ita certe longe clarius hæc omnia patebunt, si ipsam generationis modum, ex hoc fonte derivatum, exponemus. Notandum autem est, quod omnis generis impuritates excrementitiæ, ex universa sanguinis & humorum massa, imprimis biliozæ, latentes fermentescibiles salivales nature, ex glandulis pancreaticis duodeni & intestinorum, stillantes, nec non humores mucidi, in intestinis maxime crassius à sanguine secreti, ad intestina prolabantur. Constat porro, quod in anfractuoso hoc canali fræculentia, ex edulis variis sæpe generis, incongruis acidis, fermentescibilibus, semi corruptis, è mari desumptis, conflant & concurrant, & quod denique hæc omnia commixta & collecta, ut purgantia, per ani feculum excurrant, neque rursus humoribus vitalibus, tanquam plane incongruis & infesta commisceri debeant. Quæcumque igitur hanc recrementariam & valde perniciosam sortem per alvum excretionem impediunt, & ut hæc rursus sanguinis massam subeant, efficiunt; omni procul dubio ad ingentem sanguinis impuritatem inducendam faciunt, invehendo ipsi ejusmodi potissimum sortem, quæ ad cutis emunctorium una cum illo propelli quidem, non tamen ut sudoris materia promte diffusi possunt, sed ob acrem indolem sensibilem hanc officinam de-

struunt, ibique obhærentes, maculis sive pustulis protrudunt. Etenim quodiam observatio est, quod in cachecticis & scorbuticis, si alvus adstringitur, pustulæ, gutta rosacea & ulcerose cutis defecationes oboriuntur: nec non, quod alvina excretionem in ardentibus & acutis febribus suppressa, purpura sequatur; quum contra, qui in harum declinatione crisi cum alvi fluxum experiuntur, exitiali hoc exanthemate non corripiantur.

§. XXXII.

Jam vero, si ulterius rationes subducimus, Quomodo
et purpura
generis
scorbutici
excreverit
alio colore.
multiplici pariter constat experientia, omnem calide assumptum potum, theæ aque ac coffeæ in plerisque alvum, dum transpirationem augeat & sudorem pellit, supprimere: quin imo nimias alvi dejectiones sudorificis cum regimine accommodo datis, & potu calido infusi cujusdam, compelli. Hinc, si illi, qui in prima corporis regione magnam impuritatem & crassitatem alvo ejiciendarum sentinam gerunt, & frequentius ac largius positus calidæ herbæ theæ & coffeæ hauriunt, haud mirum est, quod sordes biliozæ salinosulphureæ, calore attenuatæ, & de novo aqueo humore solutæ, per vasa lactea & lymphatica, quæ passim etiam crassius intestinis implantantur, ad massam humorum vitalium redeant, & pejore ob moram & commotionem indole imbuta, nec non facultate nocendi aucta, peregrinam & valde perniciosam inenimperi omnibus humoralibus inducant & latius diffundant; nisi in corpore perspirabili, vestibulis probe tecto & sub aëre temperate calido, per porosum & tubulosum cutis crivrum statim sufficienti exhalatione dispellantur & abigantur. Ex quo certum id elicimus consuetudinem, quod omnibus, sive sequioris, sive nobilioris sexus, quibus sub potu insalubrem calidiorum, præsertim coffeæ, alvus non solvitur, sed obdormiat, cutis etiam ob varias causas sordes non emittit, is non tantum sit noxius, sed maxime etiam disponat ad genesis purpuræ, præsertim si jam prava humorum & scorbutica alidit diathesis, vel etiam affectus animi, ingritus, daturus intercor, & iracundia, quæ sordum biliosorum in primis viis accumulationi ingritus faver, accedant. Ex adverso calidus hic potus plane innoxius, immo salutaris est illi, quibus alvum fluidam & mollem reddit, & qui corpus ad perspirationem obtinent dispositum. Ac in his ad variis generis impuritates collectas, foras ejiciendas, symbolum suum utique conferat.

§. XXXIII.

Tacemus jam, ipsas fabas coffeæ, sub alio celo & in alio solo prognatas, etiam peregrinam quodiam, & quod naturali temperiei ac mixtionis blandiæ in nostris oris non adeo accommodatam, cuti dote, & sub adulatione, præsertim si more apud plerisque recepto fortius infusiuntur, siulim volatilis & sulphuris empyreumatici aliquid suscipere, quod nervosorum partium tono ac motui est inimicum, quo fit, ut in quibusdam tremorem manuum & anxietatem pariat: idque eo magis, quando largiori saporum nimis utarentur portione aqua non imbutur, sed prope infusa. Prætermittimus etiam, multum scæbari cum hoc potu assumi, quod in intestinis obhærens, neque mox per ani feculum ejecutum, fermentescit & cruditates maculas acidas augeat. Id potius ex omnibus his colligere sumis clarissi-

me elucescere speramus, neutiquam esse mi-
tandum, quod sub inconfucto alius, jam vero
communis, abusu frequentissime assumi potus
coffeae, ipsa naturalis & nativa trixio & crasis
panium sanguinem consuetum multum im-
mutetur, & nova plane ac alia ingignatur, qua
cum sanguine in utero materno in infantem trans-
fusa, ipsius purpurati morbi semina & ad illum
dispositio, jam latius propagentur & dispergan-
tur.

§. XXXIV.

*Confo. que
aut primum
coffeae con-
tulerunt, ut
L. plus pur-
pura pro-
deret.*

Et quamvis allatae à nobis sententiae, de luis
purpureae origine, refragari videatur, quod te-
ste WELSHIO differt. de purpura Lipsi. jam ante
sexaginta annos hic morbus Lipsiae introierit,
quo tempore potus theae & coffeae ignotus adhuc
fuit & inusitatus: eadem tamen neutiquam ex-
inde evertitur, quum asseramus, potus calidos,
inque primis salubrum coffeae, non tam materia-
liter, quam potius formaliter ad generis purpu-
rae concurrere, dum videlicet ob crebriorem ex
ipsis coffeae & calidae assumpti potus usum, im-
puritates priusarum viarum, alio adstrictiore
reddita, ipsi sanguini infundantur. Deinceps, si
paullo curatius victum, dactam & regimen,
quibus feminis gravidis & puerperis, Lipsiae de-
gentibus, illo quo purpura exorta est tempore,
uti moris fuit: omnia ita comparata fuisse lu-
culenter patet, ut morbus hic optimo iure inde
deduci possit. Noto enim notius est, quod tamen
citra injuriam florentissimae & inclutae hujus urbis
incolarum dictum volumus & intellectum, femi-
nas tam inhabitantes, voluptatibus admodum
onsequi, desideriosam agere vitam, somno longius
indulgere, & quotidie fere dulcibus, horis, fa-
rinaceis, cum butyro & saccharo frictis, cibis uti,
alvi esse adstrictioris & copiosae sub ingravitatione
colligere impuritates, eoque ad causam luis
re etiam alio frequentissime direxari. Pessima
praeterea consuetudine receptum tum erat, ut
puerperas non solum arctius lecto adstringerent,
sed etiam conclavibus calidis macerarent, primi-
que puerperii diebus jacula & potum nonnisi
fervida iis exhiberent, neque tamen alvum,
per multos dies adstrictum, clystere, vel laxante
solvere, neque etiam lochiis subtilissimis san-
guinem evocare auderent. Et certe, si quis hac
omnia probe expendat & conferat cum iis, quae
in superioribus diffusis exsequuti sumus, habebit
utique causam, quare in hac urbe ante usum po-
tus coffeae, hoc exanthematum genus fuerit ex-
clusum. Id quod experientia etiam postmodum
luculenter confirmavit. Postea quam enim no-
cumenta dedere documenta, & abrogato assuo-
so puerperarum regimine, laxantia, & venae se-
ctiones admittunt, longe minor ibi est hujus ex-
anthematis provenus, minus ejus periculum,
minorque inter puerperas strages. Quamvis igitur
potus coffeae non inculari possit, quod Lipsiae
purpuram genuerit: id tamen nullo poterit ne-
gari modo, quod per aliquot annorum decur-
sum, hujus tantum urbis pomoribus inclusus fue-
rit morbus, & introducto potus coffeae usu, de-
mum alibi exortus, ita, ut quo magis ille in con-
suetudinem abiret, & pluribus locis invehneretur,
eo majora quoque incrementa hac sumeret & lati-
tissimae se diffunderet: quinimo, quod singulariter
plane & antea non animadvertum est, plerum-
que acutis scie associaret febribus.

§. XXXV.

Satis itaque arduum me demonstrasse, qua ra-
tione calidi potus ad purpurae generis, seu scor-
buti in purpuram conversionem fecerint. Toti
autem negotio singularem accendit lucem, quae
sequitur observatio. Haec nostra civitas Hala tam
ob situm, quem obtinet, declivioris & aqua-
rum praerelabentium, ex parte flagrantium, ef-
fluvia, quam potissimum ob salinas, ingentem
continuo copiam vaporum aqueorum emitten-
tes, humida circumdatur atmosphaera; unde à
longinquo adspicienti se tota representat nebu-
losa. Et hinc causa videtur deducenda, cur à re-
motissimis jam temporibus scorbuticum malum
hic tam altas egerit radices, ita ut cives arthri-
de vaga, quam scorbuticam dicunt, doloribus
colicis, tumoribus & maculis scorbuticis, aliis-
que scorbuto propriis symptomatibus, quales
praecipue varii gingivarum affectus esse solent,
frequentissime laborarent. Idicid hanc partem
adhuc juvenis à beate defuncto D. Parente meo,
partim ab aliis Medicis, morborum curationi hic
loci vacantibus, qui vix ullum praescripserint
medicamentum, quod non unum alterumve in-
grediens scorbuto oppositum receperit; imo ego
ipse postea in agrotos, qui se curae meae tradi-
derunt, saepe incidi, ubi propter scorbuticam hu-
morum diathesin antiscorbuticis pugnare necesse
fuit, atque haec in curando prope omnes absolve-
runt punctura. Quamprimum vero civium plu-
rimi calidiores potus in deliciis habere, & praer-
ferentem Coffeam hanc laborare coeperunt, sensim
paullatimque, scorbuto disparente, purpura tam
maligna, quam benigna chronica hinc inde ap-
paruit, & inter initia, ubi veram hujus morbi
indolem paucissimi intelligebant, ingentem & di-
dit stragem. Neque vero hoc loco loium talia
contigisse memini, sed posthac etiam Ostriesae,
aliisque regionibus, scorbuto olim infestis si-
milis ab eadem causa evenisse comperi: ut arleo
de scorbuto, purpurae origine minus dubitan-
dum sit.

§. XXXVI.

Praeterea, hodie ad crebriorem purpurae loco
scorbuti provenum praecipue suum consert sym-
bolum peculiaris vivendi ratio, sive talia ciborum
selektus, quo majores nostri vel prorsus non, vel
moderatus tantum usi fuerunt. Nostra enim a-
tate, ubi proli dolor hominum plurimi desideria
lasciviaeque dediti nihil fere aliud cogitant, ni-
hil agunt, nisi ut gulae blandiantur, quotidie
nova ciborum genera artificiose excogitantur.
Imo vero, ne usi quidem sunt contenti, quae
sensibilissimum patrie solum suppediat, sed ad il-
la maxime stulta cupiditate feruntur, quae exi-
mar Indorum ore & fumosa nausfragis maria
ad nos mistant. Equidem suas cuicunque delicias li-
benter largitur, neque cibos exotics rejicere au-
deat; sed id tantum ceu noxium reprehendo,
quod plerique cibi hodie subacidi leniterque
pungentis esse delectant saporis, & ideo multo
sile, multisque aromatibus, alio, ceptis, pi-
pere & fungorum generibus praeparantur. Sic
enim parata alimenta, suavem linguae acrimo-
niam imprimendo, efficiunt, ut comedentes par-
tim ultra satietatem usilem se replant, indeque
magnam crudorum humorum copiam, non se-
cus ac scorbutici à crassioribus cibis, colligant; par-
tim majorem sanguinis effervescentiam sibi con-
trahant, quae largiori partium salino-sulphurea-

*Purpura
hinc jam
hinc pro-
venit
partim à
sensibilis
dilat.*

rum generationi admodum parocinatur, ut dein perfacile, concurrentibus aliis causis, purpura excludatur. Accedit adhuc, quod hodierno ævo frequentior sit visorum spirituosorum, quam antea, potus, qui adeo invaluit, ut parum superflui, quin apud nonnullos tota sanguinis massa in vinum convertatur.

§. XXXVII.

Atque huic nimis in cibo & potu luxurie tribuendum est, quod hodie variae sanguinis profusiones valde sunt familiares, & imprimis hæmorrhoidalis fluxus jam pluribus contingat: quare nonnulli Medicorum seducti, omnium morborum chronicorum originem, in feminis à mensibus non rite fluentibus, in viris ab hæmorrhoidibus impediatis, deducendam esse autumant; ideoque, si tales morbi ingruant, ad salutares has excretionem promovendas & in ordinem redigendas omnem curandi methodum dirigunt, ac præsertim pilulas ad exemplar Bercherianarum concinnatas, quas aloë, licet in refracta dosi ingredietur, frequentius, imò alementis diebus propinant. At vero, ut tacram, hancce hypothesein veritati minus esse consentaneam, ego certe adferere non dubito, quod creberrimorum pilularum usus, qui sub aliis circumstantiis aliquo tempore valde securus est, ad purpuræ genesin in nonnullis permittit conferat. Quod si enim ad sanguinis, præsertim per hæmorrhoides, excretionem nulla à natura est propensio; non potest non fieri, ut inde massa sanguinea valde exagitetur, commoveatur, & aucto insectimo motu, majore particularum salino-sulphurearum copia exerceatur, quæ purpuræ causam suppediat materialiter. Brevis, jam omnia adfunt momenta, & quæ contenta in sanguine partes salinas & sulphureas accumulanti, acriter reddunt, & altius in cutis fibrillas adigunt: unde non mirum, quod salinus ille morbus fluctuans, mutata indole sua, in aliterum plane morbum, qualis purpura est, degeneraverit.

§. XXXVIII.

Prognostica utriusque purpuræ jam supra, ubi integra morbi historia suppeditata fuit, intermiscuimus, placet tamen speciatim de purpura chronica pauca subjungere. Hæc autem, quia febre non stipatur, nisi plane præpostera medicatione corruptatur, periculum non intuscat: molestissimum tamen malum est, recitens, difficilis sanantiss, & quod mire torquere & sustinere solet & Medicos & ægros. Si enim minora purpuræ fixam in partibus solidis inique penetratibus collocavit sedem, non facile corpus deiecit, sed intus remanens; nec ad habitum corporis propulsa, graves ingignit afflictiones. Si vero nimis impetuosè exquiritur, sive rursus imminuit mala. Id autem maxime accidebat, quod quicquid genus nervosum obtinent, & in spatio stricturas, quibus sanguinis & humorum æquabilis cursus impeditur, prout sunt; quo fit, ut sanguis impurus abundans, modo ad caput, modo ad pectus, modo in articulos, impetuosè, nec minus periculose congeratur, & lævorum pathematum sœna adometur. Quod si enim ad caput impetus vergit, cephalalgia, aurium tinnitus, memorie debilitas, aphonia, imò quandoque furores, insanie, insultus apoplectici & lethargus ab intus resecta materia purpurea oboriuntur. Si ad pulmonem & sensibiles

les diaphragmaticas membranas fertur, asthma sequuntur spasmodica, nec non punctorii & lancinantes in pectore dolores. Si venarum membranis incumbit, summæ anxietates præcordiorum & cardialgiæ exsurgunt. Si intestina occupat, tormina & inflationes hypochondriorum cum molestissimo ardore sensu affligunt. Si ad artus diffunditur, sevis idem tractionibus & lancinationibus corripiuntur. Et si denique maligna materia tendinea & nervæ ossis coarctandis ligamenta obidet, malum excluditur ischiadicum. Hæc autem omnia, si visidua licet symptomata, vel ementiam suam ponunt & infestare cessant, simul ac materia acris caustica ad habitum corporis propulsa iterum fuerit & ablegata.

METHODUS MEDENDI.

§. I.

Quod ad præservationem attinet, nihil certe utilius & præstabilius in purpura, tam chronica, quam acuta misari, ad declinandam ejus recursum nobis invenit, quam primo ex sone dietetico abstinentia ab omni crevisiarum genere, quippe quæ, plane non accommodata sunt huic morbo. Nulla enim ex illarum tenui est, quæ, si vetus, acorem tum contrahat & nimis spirituosâ fiat, vel si recens, foeculenta non sit, & fermentativa, vel etiam, quæ non crassiores & mucilæ nutritivas partes vehat: omnia tamen hæc & singula, minus apta sunt, quæ officiant, obtinent: læ sanguinis & lymphæ depurationi, in qua omnis & præservationis & curationis cardo vertitur. Hinc calidus & æstivis temporibus, temperaturarum acidularum, ut Scliteranarum & Wikhungenfium, cum paulullo vini remixatarum, usum sustinimus. Brumali vero tempore, nec non iis, quibus aquas quinsodi medicatas comparare non fuit insequum, imperavimus, ut vel puram aquam fontanæ biberent, vel decocta conficerent, ex radice linæzoceræ, scilicet parillæ de cichoni, rapta coriæ cervi & hordeo mundo, addito paulullo seminis fœniculi, sustendo ad aquæ menturam dimidiam specierum unciam, indeque potus ordinari vice uteretur, ac si fors ferret, interdum vitum addiderit. Nonnullis tamen etiam propter consuetudinem cerevisiam tenuem & bene detectam concessimus.

§. II.

Deinde, in purpura chronica injunximus motum corporis per instituta ieiunia & mutationem aeris, ex locis depressioribus in excelliora commendo; animi oblationem & tranquillitatem, abstatis curis & omnis profundis cogitationibus ac meditationibus. Porro serio interdiximus omnia ea, quæ alvum adstringunt, quæ transpirationem suffocant, & nimium sanguinem ingenerant, reprobato simul largo carnium, imprimis suillæ, usu, & prohibitis cibis largiter aromatatis & pipertatis, nullius, *Spices von hohen gaut*. Denique, ut æstivis mensibus cura ex mero helle sinino, vel sero lactis bubuli & caprelli insisteretur iussimus, aut per mensem, vel sex hebdomades, Selterianæ, cum tripla parte lactis bubuli, vel caprelli remixatæ, in peregrino loco, interposito ex dulci, vel nostri Lauchhansienfis fontis aqua, balneo, potaretur, idque si altius radices malum egisset, per

per triennium repetetur. Viris etiam quibusdam habitioribus usum Sedlicensis aque præcepimus, ex cuius non adeo liberali dosi septem vel octo diebus vernali & autumnali tempore admissio potu, minora morbi per alvum exturbata est. Mulis quoque chronica, & foribrica, & habituali purpura æstentis, ut aquam Lauchsladem biberent manlavimus, qua, ut supra meminimus, fordes affatim evacuatæ sunt, continuo tandem ejus potu, donec alvina dejectiones cessarent.

§. III.

4) que in
arbitrio
reducitur
fluxum
menstruum

Quum vero purpura chronica, qua foeminae subinde contumacius laborant, in vino uteri & inordinato mensium successu fundamentum habeat repositum, ut ille in ordinem rediret, præcipua etiam nostra fuit intentio. Sæpius hunc in finem, præter ea, quæ jam dicta sunt, pulveres rhabarbarinos, & eluxi nostrum viscerales quotidie una cum pediluvio, aliquæ ante eruptionem dies adhibendis. Si vero spastica, ut plerumque fieri solet, suberant stricture, & inflatione ventriculi, anxietatibus præcordiarum, doloribus dorsi &c. se præbuerant, antispasmodicis usi sumus, quibus anueneramus pulverem Marchionis cum tantillo niri, & cinnabaris, & grano uno, vel altero castorei & extracti croci remixtum, nec non liquorem anodyni mineralis, essentia croci, castorei & liquoris bezoardico nupum, adornato simul ex aqua dulci & lacte balneo. Ad ipsum demque mensium fluxum efficiendum, propinavimus essentiam succini minus spirituosam, cum liquore alcalino extractam, & sic etiam hoc salutissimum vicium. Porro, ad præservationem purpuræ chronicae, in viris plethoricis & fluxu hæmorrhoidali non affectis, scarificationes & venarum incisiones, ad imminuendam nimiam sanguinis & humorum copiam multum faciunt, nec non iterata alvi apertio; quæ commodissime procurari poterit manna soluta, utpote quæ omnibus ex falsa acrimonia morbis obortis dicata est; addito simul stimulo salino, cujus generis est terra foliata tartari. Novimus etiam, quod sæpiissime nocturnos sudores, quibus in purpura proclives miserrime torquebantur, feliciter dispulsumus crebriori alvi solutione, clementiorum laxantium, ut passularum, rhabarbari, terræ foliatæ tartari, aut cremoris tartari ope provocata. Sed hæc de præservatione.

§. IV.

Caustica
medicinis
pessima
sunt, præ-
sertim cum
fluxibus
diaphaneis

Ipsum purpuræ chronicae curam facili & explicita ratione sic adornavimus. Præcepimus primo omnium, ut mox ab initio morbi, ægri in non nimis adusto lecto & conclavi, sed moderatissimo calore detinerentur & quantum fieri posset, è lecto se subducerent; & hæc ratione molestissimos sudores averti posse deprehendimus. Deinde, præter memoratum ad potum ordinatum decoctum, nihil ex medicamentorum classe magis ex usu fuisse testamur, quam pulverem diaphoreticum nervinum, ex cornu cervi usito, it. sine igne parato, lapidibus, sive chelis cancorum, matre perlarum, succino, nitro purificato & cinnabari confectum. Præstabilem etiam fuisse animadversionem liquoris anodyni mineralis virtutem, ita ut duobus his remediis, vel simul congrua dosi, vel quolibet illorum seorsim, pro variarum circumstantiarum dispositione, assumis, rejectis omnibus aliis me-

dicamentis, quancumvis dilaudatis, felicissime purpuram tam chronicam, quam etiam acutam superaverimus, ægris fortunante Deo brevi sanitati redditis.

§. V.

Progredimur ad præservationem & therapiam illius purpuræ, plerumque pueri notæ, quæ puerperi, vel sub initium, vel medium puerperii tempus, accidere solet. Hujus causæ & originem superius jam tenuimus, & ex incongruo gravidatum regimine, nec non admissis in dieta erroribus derivavimus; ideoque ad hæc aver-tenda & removenda curam dirigendam esse facile patet. Quod si igitur puerperas ad periculo-
hoc symptoma immunes præstare velimus, ne sub graviditate humorum copia, multo minus impuritas, ex stagnatione illorum circa ute-
rum onunda increfcat, neque generi nervoso imbecillitas inducatur, primaria utique erit inten-
tio, quæ nulla alia perfici poterit ratione, quam ut, si sanguine copiosiore corpus turget, it de-
trahatur, insinuta frequenter, ter vel quater, non
adeo larga tamen, in superioribus venæ sectio-
ne. Deinceps abstinendum est ab otio, diuturniori somno, animi turbis & edulibus dulcibus, fermentescibilibus, farinaceis; quin potius cibis
boni succi, & potu salubri, nec nimis parco, utendum, corpus motu moderate exercendum
& alvine excretionis successus, magis tamen at-
tentius, quam medicamentis, promovendus, ex-
hibendo etiam passulas rhabarbaricas, cum, vel
sine manna paratas, quippe quæ, gravidæ ap-
prine conveniant & ex usu sunt. Et quum imi
ventris refrigeratio utro gerentibus insigniter
noceat, & ad graves ægritudines ingerendas
sit aptissima, semper ut auctor fuit, ut inferiora
archus adversus aeris frigidioris accessum in-
tegumentis muniat, eamque ob causam braccas
optimæ cum successu gestandas fuit. Ad præ-
ciscindendas quoque nocivas humorum circa ure-
rum stases, magnopere expedit, ut abdomen non-
nunquam, præsertim post medium gestationis
tempus, prope fornacem calidam, embryonum
balneo, vel vino Rhenano, aut Hungarico ve-
tulliori & generosiori calefacto, insillatis aliquot
balnisi nostri vitalis guttis, inungatur & per-
fricetur. Et hæc summa cura tenenda sunt fo-
emini gestationis tempore.

§. VI.

Jam etiam dispiciemus, quantum ante & post Quamvis
partum & primis statim puerperi dietæ studio-
se servanda sint, ne in graves ægritudines & pur-
puram, sive diuturnam, sive acutam, incidunt
puerperæ. Quum namque multum ad hunc ali-
quid producendum & foeminas debilitandas im-
prudens pasturamentum tractatio faciat, dum ante
legitimum tempus summis conatibus & laboribus,
plane inopportune fortis expulso urge-
propterea etiam hunc in finem spirituosus & calidioribus
medicamentis: exquisitum ut in omnibus
teneatur moderamen æquo motum, ne vires
nimium frangantur, nec per extremos illos la-
bores, calidæ suggestæ analeptica, tota humo-
rum & sanguinis massa miserrime commoveatur,
exagitetur & simul feculentis illi & impuri, qui
circa uterum stabantur humores, in validiorem
motum abripiantur, sed potius lochiorum fluxus,
& alie excretionis legitime expediantur, ne
magis ad morbos fiat dispositio.

§. VII.

§. VII.

*Purpura
quomodo
trahenda
præsertim
de sin.*

Excluso autem foetu, & pacatis post exantlatos partus labores iterum secundo post die omnibus, necessarius ac utilis est, ut collectus in gravidationis tempore impurus, quo uterus adhuc turgat, sanguis, evacuetur, & humores vitales à contracta cacochymia liberentur. Quare omnis generis excretiones, maxime vero alvina, & quæ per cutis colatorium succedit, sedato nisi, non impetuosè, sed successivè promovendæ sunt: id quod accommodo & perutiliter his poterit obtineri & perfici subsidium. Evitentur summo studio nimius lecti & hypocausti calor, & potus quoque nec calidior, nec nimis perfrigens, sed tepidus præbeat. Abigantur omnes animi turbæ, & abie maxime terror ac tristitia. Aternis diebus deglutiantur quater pilule balsamicae & roborantes, quæ virtut nobiles sunt *Berberiana, Stahlianæ* de nostræ: quippe quæ, non solum multas impuritates alvo eiciunt, sed etiam loquorum fluxum promovere & diaphoresin eliciunt. Quod si vero sub initium nondum omnia sunt complacata, sed citatior pulsus cum interiorum æstu animadvertitur, amicum harum pilularum insinui potest consuevit cum pulvere præcipitante absorbente, qui pro dosi grana quatuor vel quinque nitri habet. Tum maximopere conducit, ut cum iussu tenuioribus, non nimis substantiis, ea assumantur, quæ ipsam lenius, sanguinem grumulosum coagulum resolvunt, & simul etiam liberorem sordium cum perspiratione diffusionem procurant: quo nomine laudem merentur, *liperna cœti*, oleum amygdalarum dulcium, infusum florum sambuci, chamomillæ, summatum millefolii theiorum, essentia corticum aurantiorum temperatior, juncta croci essentia, liquor noster anodynus mineralis, nec non pulveres bezoardici, diaphoretici, cum aqua analeptica propinandi. Inprimis etiam mixtura ex aquæ analeptica & diaphoretica, cum aceto destillato & lapidibus cancrorum, nec non syrupo acetositalis citri confecta parat, quæ in flagrante & coagulato sanguine resolvendo eximia usus est.

§. VIII.

*Si si purpura
trahenda
præsertim
de sin.*

Hic exacte observatis, non facile gravis & fuscus morbus puerperæ aggredietur, neque etiam metuendus erit purpura insulsa. Quod si autem his neglectis datis tantopere increvit seri & lymphæ corruptio, ut purpuræ febris, sive rubra, sive alba, immincat, aut jam urgeat, hac sæpe sæpius probata & experta utimur methode. Injuncto aquali, placido ac temperatissimo ratione caloris regimine, puerperæ purpuræ jam decumbentibus summopere commendamus decoctum avenaceum, (*die Haber-Gritze*) cum, vel sine infuso florum chamomillæ vulgaris, cujus essentia non longe præstantissimam deprehendimus. Avum in maligna & alba non facile simulantibus sollicitamus, neque etiam chlytre admodum. Mutationem quoque integumentorum de induriorum, quantum fieri potest, interdiciamus, & siudemus potius, ut jam trita ad formam calidam probe siccata, & fumigata injiciantur & induantur. Multo magis dissuademus erectionem stram vel ut est lecto surgant ægræ; eo quod facile incidunt in animi deliquium, & motu humorum ad interiora conver-

sio, exanthemata dispartes, pessimeque imprount symptomata: id quod latius ex observatione mea expositum est in *diff. de sin erecto in morbis periculosis* valde noxia.

§. IX.

Ex medicamentorum classe, pulveres bezoardicos, temperatos, quibus nonnunquam croci vel callorei momentum adjiciamus, repetitis vicibus ad scrupulum, vel drachmam dividiam exhibemus, eorumque ulum subinde liquoris anodynus mineralis dosi interpolamus, cujus nobilissima est facultas ipsas complacanda, motum intestinum calidum sedandi, & acrimoniam humorum demulcendi. Si vero ob varias causas antecedentes purpuræ atrocissimè moruenda, vel hæc jam fuerit lacta, admiscemus liquoris anodynus, quantum pariem liquoris benzoinici ad mentem *Bussii* parati, & in *observat. usfris physico-chymicis*, Lib. II, observo. 28, descripti: quæ mixtura egregie diaphoresin movet & materiam peccantem ad exteriora agit. Ad reficiendas denum vires, eorumque plerumque prostratas, in purpura alba majorem in modum commendamus potionem analepticam, ex aqua mellisæ, corticum citri, florum liliorum convallium, primulae veris, acaciæ, liliorum alborum & cinnamomi cydoniata, addita sufficienti quantitate marris perlangæ & manus Christi perlusæ, nec non insillatilis alogot spiritus nitri dulcis guttis: quo cum eadem, tanquam accommodo veliculis, pulveres exhibebantur, vel ipsa scorum ad cochlear aliquoties sumatur.

§. X.

Quum vero sapissime contingat, ut lochia in febre lactea vel purpurea subsistant, & sanguis, *Quid lochia
trahenda
præsertim
de sin.* nis raptus ad casus factio, lethalia obortantur symptomata, in questionem cadit: an, si lochia plane non, vel non sufficienter fluunt, si sebris est, si purpura imminet, venæ sectio tuto & utiliter admitti possit? Verum enim vero, quia hoc argumentum, jam in *diff. de venæ sectione prædicti* admissit. fusius excussi, & momentosis rationibus docui, quod venæ sectio non solum in febribus exanthematicis, sed comparentibus etiam jam efflorescentis nonnunquam sumopere proficua sit, allata ibi hæc non transcribemus. Id. tamen sanctè affirmare possumus, quod solus venæ sectionis, pro circumstantiarum ratione largioris, vel in pede, vel manu, instrumentæ ope, proximas jam morti puerperæ, & spasticis structis, quibus sanguis impetuose ad cor & cerebrum urgebatur, detentas, ab onci faucibus revocaverimus & præsentaneam opem attulerimus. Atque adeo haud immerito, si supprellis lochiis laborantes puerperæ decedunt, mortis causam in venæ sectionis neglectum rejiciendam esse putamus. Neque desunt ex clarissimorum auctorum numero, qui nostræ sententiæ calculum adjiciunt, & quibus nominasse sufficit *WILLISUM de febr. cap. XVI. WELSCHEM de purpura Lips. ROLFINGIUM lib. de ord. & meth. consulti. lib. IV. sect. II. cap. 6.*

CAUTELE PRACTICE.

§. I.

In utraque purpura, sive benigna, sive maligna, subtil tam perniciosis, & ad mali causam *Si utraque
purpura
benigna
sive maligna* Mm 4

408 Cap. III. De purpura præsertim chronica &c.

fim augendam, symptomatum & morbi vehementiam exacerbandam, & ex benigno morbo malignum reddendum, tam aptum & expectatum est, quam excussus in frigore & calore: siquidem si ullus alius, certe hic morbus, nec refrigerationem, nec nimium æstum perfert, sed in utroque exquisitum moderamen expolcit; ut hinc conclave, ubi aeger decumbit, & aer in eo, equali semper temperamento sint inflanda & custodienda. Quod si enim paulum frigidicula aura ad habitum cutis liberius accedit, vel tantum manus, antea sub lecto in temperato calore & odore detentæ, exporriguntur, illico inhorrescentia & perfrigerium univcrsum tangit corpus, & pustulae, subsequente magna anxietate magnoque languore, evanescentis: quod eo facilius eoque majori cum pernicie contingit, quo magis cubiculum antea nimis æstuosum, vel corpus stragulorum apparatu arctius tectum & tantum non obrutum fuit. Similiter in omnibus, maxime vero purpuracis his exanthematibus, nihil, præsertim in ipsius morbi vigore, damnosius est, quam inequalis & crebris immutatus calor, in hypocausti gradus: eo quod subitanea calidi in frigidum & frigidi in calidum mutatio, nervos sensibilem cutis subflantiam gravissime afficit, ejusque tonum, robur & motum misceat variat & perturbat, ut pustulae neque in conspectum prodire, neque, si demum ipsorum comparuerint, firmam servare queant stationem.

§. II.

1. nimis calidæ regionis.

Potum sintico admodum damno purpura laborantes maculat, immodicus cubiculi & hypocausti calor, nec non sulcatus per potum servatus assamatus, aut medicamentis calidiora, æstus: quandoquidem exagitatione sic, jugi præsertim ardore, omnibus, vires non solum franguntur, & pora cutis substantia nimis aperta & hianæ, humidæ major, quam par erat, diffilatur atque exhalat copia; sed ipsa etiam morbida materia, per induratum intestinum calidum motum, intensiorem subtilitatem, penetrantiam & acrimoniam suscipit, ut pruritus, ardor atque anxietas insigniter invaleant, tantum abest, ut complacentur & immunesantur. Hinc complures animadvertimus, manifestis damnis & accipiti pathumatum augmento affectos esse aegros, si infusum herbarum theæ, aut aliud ad ejus similitudinem paratum, calidius, & eo quidem larga in copia sortillarunt, vel etiam cibum & potum servidum ingesserunt.

§. III.

2. inmoderate calidæ regionis.

Multo vero minus interne calefacientia, vinum, liquores spirituosos, pharmaca sudorifera & expellens, essentia & tinctura betardica, alexipharmaca hic morbus ferre potest, sed potius ex illorum usu semper augetur magisque accenditur. Vidimus certe, mitioris alius ingenti purpuram chronicam, febribus & vehementibus symptomatum proflus exortem, admissis externis nimio æstu, & antiscorbuticorum, nec non decoctionum sic dictorum purificantium, inuncto simul ad sudorem elicendum archiori regimine, usum in malignam fuisse convertum; adeo ut febris postmodum calor, cum ciborum fastidio, virum languore somnique defectu, ægrum periculo affligeret. Ex in genere id quoque pro compario est, purpuram, quo citius & impetuosius, per medicamenta & calidum regimen ex-

pellitur, eo facilius & levissima de causa evanescere & interiora repetere.

§. IV.

Præsertim, in purpuraceo hoc cutis vizio, omnes per ani secessum factæ liberales evacuationes, admodum sunt nocivæ. Tam exquisitus enim hujus morbi est genius, ut alvum, nec nimis durum & confictum, nec nimis fluxilem, multo minus arte elicitis purgationes, admittat. Hinc, si alvus diutius officii obliviscitur, cohibita ad habitum corporis vergunt purgamenta, biliosa, mucosa & fermentescibiles icoriae, quæ per hepatis, pancreatis & glandulosas tractationum tunicas separari alvogue debebant ejici, ad cutis colatorium convertuntur, vel in longo illo & anfractuoso intestinorum canali collectæ & invicem commixtæ, mora magis corrumpuntur, & postea ad sanguinem cum succis chylis & alimentosis adveclæ, liberale morbi & materiam morbificam pabulum ac nutrimentum præbent. Quare, nisi alvina cum aliis excretionibus revocentur & in ordinem redigantur, ipse morbus rarius perfecte sanescit, sed aut crebrius recrudescit, aut diutius exsternitur.

§. V.

Contra vero, summo etiam cavendum est studio, ne acriori stimulo excretionum succellus proritetur & urgentur, earumque ob causam cunctis generis, missis etiam emeticis, omnia purgantia & laxantia, licet virulentia propius delinunt, salina quoque, sunt vitanda. Neque etiam semper tutum est clystere alvum admovere, vel suppositorium admove, præsertim aut eruptionem exanthematam & pulso post eandem. Etenim exstimalis hoc modo interioribus, omnis fluidorum, qui ad corporis peripheriam tendit, motus illico invertitur, per spiratio sufflaminatur, cutis pori coarctantur & efflorescentia evanescunt: interiora vero languore opprimuntur, ventriculus nausea corripitur, ejus subversio oritur, intestina torminibus & ardore torquentur & præcordia angore stringuntur & excruciantur. Ut adeo patet, summa cum cautione & provida circumspectione, ad alvi apertionem hoc in morbo esse descendendum.

§. VI.

Multum denique ad periculosum purpuræ retrocessum facit intemperata & inconsulta sanguinis missio. Nam plurimum certe refert, si cuti in omni exanthematum genere, ita maxime etiam hoc, sanguinem in convenienti quantitate, proportionem ad superficiem corporis accessu, ita moderari, ne ipse vel nimium exundet, vel deficiat. Utrumque periculum alit. Si quantitate excedit, ob ipsasque partium striduras, congestiones in loca illiora summo periculis sunt metuenda. Si vero defectu peccat, ad exitum cutis vascula & sudoris secretioni dicata organa appulsus urgeri nequit, & vitiosa materia per capillare hoc cribrum minus recte secermi & transmitti potest, sed summo cum discrimine in interioribus corporis penetrabilibus immota obhærescit. Quare via majus hoc in morbo metuendum est periculum, quam si ab imperito Medico inconsiderato sanguis exantlatur. Vidimus noimmet ipsi, tam infeliciter ali-

aliquoties cessasse quorundam aſum, qui in purpura chronica, qua hypochoſtriaci, ſpaliſci jaſmatibus obnoxii, laborabant, venæ ſectiōnem in pede largius inſtituendam ſuaſerant, ut exanthematibus ſubito diſparentibus, apoplectici irueret inſultus. Novimus quoque, admiſſa illa, ſeviſſimis ſubſequens eſſe artuum tractiōnes & convulſivos partium motus, & parum abſuiſſe, quin ægri letho aſſicerentur.

§. VII.

Inter auxilia chirurgica militari febri opponenda referuntur adhuc à quibuidam veſicatoria, ſi acida corrupta lymphæ peccat, quo eadem his mediamentis extrahatur, & fibræ deſaſate nervæ ſimul excitentur & ad contractionem ſollicitentur. Inprimis HAMILTON de febre militari, eadem ſcapulis iterato appoſita miſciſe dilaudat, ita pag. 150. Sydenhami rationes ſubducens: ad ſeruatorem minuendam optime reſpondent veſicatoria. Materia enim morbiſica ex aliqua parte eorum opte diminuitur, natura reliquam, via ſibi conſueſta, facilius amandare poſſit: tantum abeſt, ut puſtularum eruptionem impediatur. At vero, licet id remediū genus non adeo incongruum eſſe videatur, ingenue tamen ſatemur, nos nunquam eo eſſe viſos, ſed enumeratis præſidiis & auxiliis, purpuram aſſipiente Deo expugnari, ideoque aliis, ut periculum faciant linquimus.

ENARRATIONES MORBORUM.

OBSERVATIO I.

Vir Illuſtris, quinquagenarius, temperamenti ſanguinei, à longo hinc inde tempore animi pariter ac corporis conſtante vigore gaviliſ eſt. Aetate autem ſenſim ad ſenium vergente, quum prætermiſſo, quod alias conſueverat, motus exercicio, cibis alimentioſis multumque aromatizatis, ut & largiori vini generoſioris hauſtu magnam ſanguinis abundantiam accumularet, neque hanc per venam ſectam immiſuſerat; ipſa benigna natura, per hæmorrhoidium fluxum ſalutariter excitatum, à tanta machinæ obſtura mole ſe liberare annuſa fuit, eventu adeo ſecundo, ut à munda poſtea annis ab incommodis ſitis immunitas degerit: donec aliquando poſt longius iter ſub frigido hiemali celo inſtitutum, cœcas, quas appellitant, hæmorrhoides acceperit, quæ ante diſcuſſionem multas creant moſteſias. Circa æquinoctium vernale ejuſdem anni, hæmorrhoidalis non modo euſuſor & per tres ſere menſes durans rediit fluxus, ſed & varia ſe adſociarunt incommoda; ſiquidem vir illuſtris appetitus immutatione, atri & ſilla oculorum deſluxione aſſiciebatur, conſtrictivum in pectore & abdomine ſenſum, nec non preſſotum in oſſe ſacro dolorem cum ſummo ad matulam percipiebat, qui lumbarem quoque regionem & pedem affligebat. Ego tum tempora in conſilium accitus primo venam in brachio ſecundam fuiſſe, dein curam cum ſonge Spadano vel Selterano, ſub exacto dietæ regimine inſtituendam commendavi; poſtea vero crebriore corporis exercitationem, abſtinentiam à vino Hungarico, & liquoris mei anodynî cum pulvere præcipitante ex aqua uſum injunxi. Ex optime quoque ceſſe curatio. Sed annus effluixit, quum Februario menſe, in febrem incidereſt noſter, catarrhali primum annu-

lam. Appetitus aderat proſtratin, ſitis & æſtus intenſior, vomitus quoque & alia ſuſpiria, præcordiorum anxietates, cum reſpiratione difficili, cardialgiæ & compunctioris ſenſus, alternante frigoris & caloris ſentiu, pulſique durior & celerius micante. Hac inuena ego mox purpuram augurabar, & en ſuſceſſit cutis aſperitas, prodeuntibus innumeris puſtulis rubris, nulli ſemina figura referentibus: unde bezoardicum pulverem circa ſomni tempus, vomitui vero obviā eundi gratia liquorem anodynum minorem cum balſamo vitæ maritatum, & pro potu ſerum lactis dulce præpinaſam. Sic ſedabantur quidem moſteſie aſſictionum tumoræ, & purpura decidebat, ſed tanta in cute ad purpuræ eum hoc exanthema remanebat diſpoſito, ut continuo ſere ſub corporis quædam incalcſcentia maculæ effluſceſcerent, & æger per totum æſtatis & hiemis inſequente decurſum purpura cum inſigni pruritu juncta laboraret; præteritum quum plus juſto appetitui ciborum incongruorum indulgeret, viniſque plus juſtam quantitatem adſumeret. Circa vernum tempus, redeunte vomitu, anxietate, aliſque gravioribus ſymptomatibus, purpura copioſior in locis quoque inconſuetis comparebat, & hæmorrhoidales venæ denſæ ſat largam ſanguinis fundebant copiam. Crura hinc circa talos intumeſcebant, & maculæ diſparebant, craſſam, qualis in ſcabie ſerena ſicca conſpicitur, relinquentes. Venterculus pituitoſa quandoque materiam, quam fauces quoque ſtilabant, eſpicebat, ſomnus aderat multus, ſed parum reſiciens, pulſus mane frequens & validus, veſperi debilis micabat, urina craſſa rubicundo-bruni coloris mitebatur, imo omnia in ſumma erant perurbatione. Ut auxilium firmerem ægro, potus loco mox cereviziæ Duchſienſis, quam appetebat, cum gelatina cornu cervi permixta, mox gallinarum juſcula cum radicibus cocta, quandoque etiam ſarſaparilla decoctum, uſurpata fuere; ex medicamentis vero eſſentia ſtomachica liquoti anodyno nupta, poſt meridiem pulvis abſorbens cum pulvere caſtalliæ pennixus, & veſperi bezoardicus pulvis oſſeſcebatur. His & analepticiſ interpoſitis nihil proficentibus excrementa ſetido ſcedebant odore, virium proſtratio augebatur, & febriſ tandem inflammatoria corpus ſumme emaciatum ita aſſigebat, ut ægrotans illuſtris morbi vehementiæ daret manus debuerit. Peracta poſt mortem ſectiōne, panniculus adipoſus, una cum renibus, inteſtinis tenuibus & veſica urinaria, inflammatione correpta comparebant, lien putredine exceſſus, ita ut tactu in liquamen ſuſiceret; ventriculus ſtatibus diſſentis, vaſi gaſtrici ſanguine craſſo inſarcta; diaphragma ſiniſtrum latus corruptum conſpiciebatur. Pulmones inflammatione obſeſſi, colorem ex atro cœruleum induerant. Pericardium liquoſe carebat, cor flaccidum multo atro ſanguine turgibat. Glandulæ mēſenterii ſciritus inſeſſaræ. Hepatis gibboſa pars maculam inflammatoriā oſtendebat, cupus veſicula ſellea bile erat repleta.

Epiſtola.

Siſtit hic caſus purpuram ſcorbuticam, eamque chronicam & exitu letalem, cujus generandi modum, decurſum atque eventum paucis jam ad ductum hitoriæ morbi perpendere juvabit. Vir Illuſtris tum ob dietam laucioſiorem, tum

Purpura
chronica
per an-
norum
purpuram.

Purpura
chronica
per an-
norum
purpuram
chronicam
et letalem.

ob consuetam corporis exercitationem omisam in corpore nimiam sanguinis coarcevit copiam; quæ per convenientem venæ sectionem non diminuta ægrius per canales potuit circumagi: unde postea, salutaribus se- & excretionibus, quæ in senili ætate per se languent, cohibitis, tota sanguinis & humorum massa à partibus excrementis minus rite depurata labem contraxit scorbuticam. Jam insignis attulisset emolumentum multaque mala præcideret bonus hæmorrhoidalis fluxionis successus, nisi ipse Dn. ægrotus frigore imprudens corpori admissio eundem suppressisset, quo sanguis versus interiora magis coactus in valis mesentericis se accumulavit, & denegato per hæmorrhoides exitu, eodemque victus genere persistente, ibidem flagnavit; donec tandem calore vernali expansus vasa cum impetu disrupit, & effusus per tres prope menses promanavit. Nos itaque, sedata hac enormi hæmorrhagia, primo omnium eo respexit, ut fortasse obstructi viscerum tubuli referantur, quod debito fontis Selterani, vel Spadani usu præstandum allaboravimus. At vero, quum æger appetit denuo plus julto inhaerens novæ sanguinis accumulationi, ejusque in imi ventris visceribus stagnationi aniam præberet, factum est, ut impuris sordibus salino-sulphureis non segris gavis, ipsa purpurea materia ingeneraretur, quæ nervosis primum membranis insidens spissum excitavit febrilem, cujus ope ipsa purpura ad habitum corporis protrusa, omnique quietiora sunt reddita. Redeunte postea hæmorrhoidum fluxu effusio, vires jam antea debilitate omnino magis sunt depressæ: unde vi cordis & arteriarum systolica imminuta, non modo materia morbifica ad corporis corticem non amplius potuit propelli, sed & sanguis tenax & acris in minimis & capillaribus illis, lienis & pulmonum vasculis statim inflammatoriam, omniaque huic communia symptomata excitavit; ut adeo non mirum esse debeat, cur post mortem variae partes inflammatione sphaceloque obfessæ comparuerint.

OBSERVATIO II.

Purpura chronica inde et alia morosa.

Fœmina XL. annorum, nunquam puerpera, habitus corporis valde repleti, pinguis & spongiosi, alvo strictiori vitæque sedentariæ adfecta, admodum semper pleno & inordinato victus, consistentiori cerevisiæ nimisque Caffee potui indulgit: parum molestiæ inde percipiens; usque dum terrore aliquando percussa menses primo per dimidium fere anni plane amisit, postea vero parciore experta fuit. Ab hoc enim tempore sæpe insignem corporis gravitatem, tunc culculosam pectoris concussionem cum cutis quadam prurigne sensit. Hæc invicem mala ad vernali usque tempus durabant, ubi præmissa venæ sectione in pede motibus corripiebatur febrilibus, catarrhales, tum temporis grassantes amulantibus. Remedia ordinabantur huic statui accommodata, potus tenuis, & clystere quoque alvus clausa referabatur. Sed eni! improviso sine præcursu gravioribus symptomatibus in pectoris ambitu maculæ emergebant purpureæ, quæ sub pulveris leniter bezoardici, cum extracti castorei pauxillo remitti usu, in dorso quoque, & brachii copiose efflorescebant. Mitigabantur tum omnia symptomata, & sensim maculæ hinc & inde evanescere videbantur, quamvis tamen novæ mox recedebant. Tam peti-

naciter itaque inhaerente hoc exanthemate, à quo tamen præter pruritus pectorisque oppressiones, refrigerationem maxime subsequentes nihil patiebatur, ego curam suavi tenuem & excipientem hac ratione instituebam: ut præmissa venæ sectione, alvinaque regione per potionem mannatam, bis repetitam repurgata, per unum alterumve mensem ægra à nutriende victu se abstinent pane bis cocto, & carne magis assata in resecta quantitate vesceretur, poni decoctum radices satyriæ, chinæ & corticia ligni fossilas in largiori copia subfunderet, & ad robur ventriculi conservandum temperatum medicamentum stomachicum adhiberet; finita autem hac cura, scarificatione admissa, serum lactis dulcem tam mane, quam à meridie biberet. Paruit ægra confilio, & mirum erat, quomodo corporis mole decreverat, quantumque levaminis reportaverat, ita ut per autumnum & hiemem decursum à purpura ejusque molestiis parum affligeretur, præsertim quum salubres dietæ regulæ exactius observaret. Adpropinquante vere commendabam fontem Egramm per decem dies, & postea Selteranum tam sine, quam cum lacte remixtum per tres hebdomades bibendum, hisque finitis balneum Lauchstadiense externe adhibendum: unde mensium fluxus antea parcius justam servavit quantitatem, & ægra à malis suis liberata jam exoptata fruuitur valetudine.

Epicrisis.

1) Fœmina, cujus morbum exposuimus, ob vitam otiosam, pinguemque dietam statum sibi contraxit plethoricum, sub quo, vel levioribus causis, ut terrore accedentibus, salutaris mensium fluxus, ob nimiam valorum repletionem fluidaque propellendi impotentiam facile cohibetur: quo cohibito non potest non sanguis & lymphæ impuritate imbuti, & nimio potus Coffee usu alvique constipatione concurrente, purpuræ proventus ingenerari; sicut hoc supra satis ostendimus.

2) Annotandum est, quod homines spongiosa carne multaque pinguedine præditi, qui multum serosi sanguinis alunt, præ ceteris ad exanthematicum hunc affectum sint proclives, ideo quod serum, per excretionem cutaneam non laus depuratum, facile vappescentem acrimoniam induit. His vero subjectis nihil convenientius est, ad purpuram in prima, ut aiunt, herba suffocandam, quam accommodata cura per inediam, qua superflua pinguedo, quæ remorem sanguinis circulo depuratorio posuit, subtrahitur, & nimis relaxatus cutis tonus, qui in purpura tantum non læditur, roboratur, ut hic dein longe minus sordium per transpirationem eliminandarum retentioni & accumulationi faveat.

3) Aquas salubres commendavimus, ut reliqua etiam se- & excretionis organa suæ restantur integritati, maximeque ille sequiori sexui saluberrimus mensium fluxus in ordinem redigatur: quo sine etiam balneum Lauchstadiense subjungendum suavisimum, quod tum in vasis uteri flaccidis roborandis, sanguinisque fluxu promovendo, tum in cutis tono suavi restituendo, eximiam præstat unitatem.

OBSERVATION III.

Vix aliquot supra xl. annos natus, sanguinis & succi plenus, jam olim vigesimo ætatis anno à vita sedentaria multique ad feram noctem protrahis lucubrationibus malum passus est hypochondriacum, cum aliqua ad hæmorrhoidalem fluxum dispositione, qui succedente tempore sæpius quidem apparuit, certas tamen statasque periodos nunquam servavit. Trigesimo quinto ætatis anno in febrem incidit tertianam, qua brevi curata purpura corripiebatur febricitans: unde fuisse usus est Pyrmontanus, idque inde obtinuit, ut purpura mitigaretur, potius vero non evanesceret. Quum quadragesimo proximus adveniret officio, quod non modo vitam postulabat sedentariam, sed crebriores quoque animum commovendi occasiones præbaret, prægresso quondam iracundie affectu, doloribus corripiebatur colicis cum vomendi conatu, pectorisque angustia junctis, quibus compositis ictibus prodibat, pedes intumescebant, & macule purpuree, plus quam antea unquam, emergebant, hæmorrhoidibus nunc prius silentibus. Remittente colore flavo, pedum tumor nihil minus una cum purpura persistebat: quare denuo aquæ Pynnostane alibebantur, sed sine levamine, ut paxius purpura eadem permanente, tumor pedum altius à thorace simul ferretum & inguina occuparet. Ego consultus rem in anceps posuisti ratus, sequenti proposui. Primum, ablatog cerevisiæ potu decocto aperitivu substituumdum puli hujus dispositionem: *Recepta siccum* "aperitivum ana nunciam, Gaspari Plæ, glycyrrhizæ, cicloræ ana unciam dimidiam C.D.S. Species, quarum uncia una & dimidia in tribus ana masticis decoquenda, addis in fine parvulum cinamomi. Dosis, quavis tertio die pilulam balneicam xv. propinquantibus de his die ferat dos hanc pulveris, ex solutione oculorum cancerum, aream duplicatam, turti purificat, tartari vitriolati, ana drachmis duabus, radices arti, salis albi, cinabaris ana drachma composui capientes commendavi. Ut venarum proflueretur, præscripti elixir balsamicum temperatum ad lxxx. guttas in prandio lumbendum, ex extractis crataegi minoris, gentiane rubre, cardui benedicti, rhubarbari, terre foliatæ tartari ana drachma, in qua mentis unius quatuor lani calere soluit. In diæta suavi iussu carum tenuiora cum radicibus: potroliæ, felleri, taraxaci, graminis & cichorei decocta cerevisiæ addendum. Externe regione percutiebatur, mitigantia cataplasma, ex comis abfinthii, floribus chamomille romane & vulgaris, sanctui in vino de aqua calce vivæ coctis imponere, & lenigine ferreo applicare. Mitigantur quidem hæc omnia symptomata vehementius, & aliquando inter ipsorum usum motus incidebant febriiles, cum isova purpureæ protrusione, fed natura nun nimis imbecillis tandem succubuit.

Epicrisis.

Ferax est hic casus utilissimarum observationum, quarum prima est, quod purpura primum post febrem effluerit, cujus phaenomena ratio ita mihi reddenda videtur: sine dubio febris in tempestive curata labem quandam in abdominalibus visceribus, linguis depurationi servientibus.

maxime vero in liene & hepate reliquit : unde
bis forte infarctus sanguis à puribus sulphureis
non rite depuratus purpure materiam suppedi-
tauit. Imò ab eadem causa, seu à circulo san-
guinis per hanc vias impedito derivandus est
tumor pedum insignis, qui tantum non emi-
bras, viceris coequent sanguinei obstrucone la-
borantibus coitum esse familiaris. Icterus in nostro
aegrotò suam fundit originem tum ab infarctu
hepatis, quem dolor in hac regione prorsus
inter alia docebat, tum à ipsamodica ductum
biliariorum sub ira fibratura. Intercepto cum bi-
lis ad intestina curfu, hæc ad sanguinem refluxu
largorem materię purpureæ copiam ingere-
ravit, quę causa fuit, ut post aliterum rubre ni-
griores pustule confusius in cute effluerent : lu-
luculentio indicio, sulphureis indolis materiam in
purpura peccare, ideoque hanc ipsam variis à
bilis visio occurrent morbis symptomaticis jungi.
In curatione rite aformanda omnem medica-
mentorum energiam eo direximus, ut tamet
viscida anures obstiti viscerum tabuli reclu-
deretur, & sanguinis cum acri bile mixti inas-
peries immutaretur, quibus petachis purpura,
cui symptoma, sponte evanuisse. Quoniam ta-
men vis morbi tantum jam invaluat, ut vari-
tatem omnium, vel efficacissimum remedium
superaret, scilicet eis proli dolor, ut morbo tan-
dem succurrit acce, liquore.

OBSERVATION IV.

Honella hujus loci femina, tenera ac macilentia, L. æt aliquot annos nata, oritur fertilioribus antiquæ ad exandefcentiam propolis, per octo circiter annos semel vel bis in anno purpura corrupti fœvit chronica, ita ut nonnunquam per unius, vel duorum mensium spatium eadem laboraverit. Eamvero, quoties novus imminere infultus, per intervalla alia atque alia jungebantur symptomata, ut fere sunt virum ambecillia, capitis dolor cum auctum tinnitu, anxietas præcordiorum cum spirandi difficultate, somnus paucus ac interruptus, pulsuum cum celerrime junctis debiles, alacritas cum frigore æstus, & signis extremorum frigidius. Quamprimum vero majora purpuræ cum asphredine cutis & pagulis ab internis ad exteriora erat propolia, invicem illa placebantur symptomata, quandoque tamen, licet mitius, repetebat. Liberata fuit nostra à singulis hæcenus paroxysmis, beneficio temporis simul concurrente, data lenioribus bezoardicis & analepticis, quorum illa ex pulvere Marciandis, cornu cervi usito, philosophicè præparato, antimonio diaphoretico, nitro, cinnabari & pauillò camphoræ, in pulverem reductis conflant; hæc autem ex aquis mellisæ, cerasorum nigritium, florum tilisæ, sambuci, liliorum convallium, rosarum, cinnamomi sine vino, matre perlarum & syrupo acetositis citri, ut potionem mixtis conficiebantur. Potus loco commendabatur pitifana ex hordeumundo, rasura cornu cervi, radicibus scorzonæ & cichuris confecta, blandumque lecti calor ferri injungebatur, ne forte aëre frigido ad corpus admisso caruonosis oegocum turgentur. Præservandi sine vine scilicet bis vel ter in anno admittit, mediocri tantum sanguinis portione evacuata, fontem quoque Sciteranum cum tertia parte lactis caprini mixtum non sine succellu bibat; nihil minus tamen integre ab hoc morbo nootum convalescit, sed se-jus recidivæ

2) Discere inde licet, quantum noxæ afferat frigidior aura, improprie cuti admixta, maxime tali in casu, ubi natura materiam corpori infestam cum impetu ad superficiem corporis nititur propellere. Facta enim ad interiores, easque nobilissimas partes metastasi, non modo miserissimi intestinorum cruciatus, sed sæpe lethalia oriuntur symptomata, ut tragica exempla plurima ostendunt.

3) Notabile hoc loco est, quod spasmos abdominis & intestinorum per anodyna sedatos secuta fuerit insignis harum partium atonia, quæ inflationem peperit: unde facillimum est intellectum, quæ ratione subito inductæ per medicamentata mutationes magnis pathematibus causam præbere possint.

OBSERVATIO VIII.

*Purpura
chronica
exordiente
alba le-
thalis.*

Vir xlv. annorum sanguineus, natura sensibiliiori habituque corporis spongioso donatus, laeto & quieto vivendi generi adjectus, sæpe non solum fluxum expertus est hæmorrhoidalem, & coctis, ut aiunt, hæmorrhoidibus fuit vexatus, verum etiam per octo fere annos purpura laboravit chronica, tunc, cum indigni curis pruritu, circa verum maxime tempus infestante. Sensim paulatimque decrecente hac purpura, ultra biennium perdurante erant dolentia artuum tensiones, quæ mox in brachia, mox in pedibus ipsaque dorsii regione gravissime ferventes, plerumque tumorem in brachiis & circa pedum malleolos, cum insigni nonnunquam rubore & dolore junctum relinquabant. Et talis morbi erat facies usque ad primum mensem, ubi ægro necessarium suscipiendum erat iter; sub quo quum nimio se frigori exposuerat, domum inde reversus ab omni statim dolore & tumore liberatus in febrem incidit acutam, cum colliquativo eoque fecidissimo sudore, quem mox purpura sequebatur alba cum pustulis elevationibus, a collo usque ad pedes protensa. Vires erant dejectæ ad nonum usque diem, ubi omnia videntur meliora. Sed quum æger & lecto surgeret, purpura mox retrocedente summe oriebatur anxietas, deliria, summa virium prostratio cum spirandi difficultate, convulsivi motus, & ipsa denique mors.

Epiçrifi.

Admodum varius est hujus morbi decursus magnique ægritudine, se invicem excipientium quasi cumulus, quæ omnes ad summam machinæ perneciem, mortem tendebant. Primo adfuit hæmorrhoidum fluxus, ilque inordinatus & cum molestia venarum hæmorrhoidaliarum intumescens alternans, sub quo plerumque difficilior solet esse sanguinis per abdominis viscera, maximeque per hepatis & lienis substantiam circuitus: unde paulatim labescens salutari fæde excretionis negotio facile humorum impuritas, & inde apud nonnullos ipsa purpura progignitur, quæ, sicut in præsentæ ægroto, diu post hæerere, nec facile periculum minatur, nisi perverfis curationibus aliisque erroribus turbetur. Deinde prodierunt arthritici dolores, qui vix aliam habent causam, quam quod materia purpuracea ad cutem parcius propulsa sensibiles articulorum membranas obducit, vellicaverit & ad ipsas sollicitaverit. Tum quoque tu-

Frid. Hoffmanni Oper. Tom. III.

mor & rubor in brachiis pedibusque apparuit: quod quidem non mirum esse debet, quoniam observationum fide satis constat, quod in puribus spatio infestatis, post illum compositum plerumque atonia relinquatur, quæ sanguinis & humorum accumulatio, stagnatio, adeoque etiam tumoris ansam præbet. Tum quoque æger ex frigoris damno in febrem incidit, cum maxima sudoris profusione sitatam, quæ virium robur mirum in modum exhaustit, ut postea sub circulo sanguinis languidiori lymphæ facile corruptione & vappescencia poneretur inquinari; unde purpuræ albae origo. Tandem notabilis est subitanea morbi in pessimum statum mutatio; quæ, me iudice, egressui & lecto tribuenda est. Dicit enim vix potest, quantum in morbis sic dictis lymphaticis, ubi virium ingens adeo prostratio, nocere solet erectus corporis & capitis tam in lecto, quam extra ipsum situs; sicut in *disertatione nostra hac de re olim habita pluribus exemplis ostendimus & confirmavimus*. Tali enim ratione ob debilem cordis pulsuum minor sanguinis copia ad caput propellitur, & facile lymphæ incidit, sub quæ omnes motus ad interiora convertuntur, ipsaque materia per cutem excernenda retroPELLITUR; unde deliria, convulsiones, sphacelationes & mors.

Qui plures desiderant observationes, adeant *consultationes nostras viderint*, ubi casu CXCI. CXCLII. & sequ. multa notatu digna exempla recensentur.

CAPUT IV.

De lue venerea.

THESES PATHOLOGICÆ.

§. I.

Uem sic dictam veneream, in India occidentali endemicam, eo demum tempore in Europam esse advectam & per singulas ejus regiones disseminatam, quum Christophorus Columbus Insulam Hispaniolam anno 1492. detexit, communis auctorum, qui de pellicero hoc morbo scripserant, ut *Roderici Diaçi Hispanensis lib. de morbo venereo*, *Nicolai Monardes lib. de simpl. med. ex novo orbe allatis* est opinio. Licet vero certa experientie fide facta constet, perniciosam hanc hæc primo in Hispania, tum in Italia & Gallia, postea vero in ipsâ Germania per contagium, a coitu cum feminis impuris susceptum, fuisse propagatam; sunt tamen nonnulli auctores, atque inter hos præcipue *MINAÏUS lib. de virulentia venerea cap. XXIV. Nicolaus de BLEIGN Chirurgus Parisiensis in lib. Art. de guerir la maladie veneree*, & *Joh. Baptista SINIBALDUS de geneanthropia lib. IX. tract. 2.* qui existimant, morbum hunc citra ullum contagi virus in altero sexu posse oriri, si semina cum pluribus viria rem haberet, semperque esse grassatam apud scortatores infames. Tum enim ex diversi seminis stagnatione & corruptione virulenti nascentur humores, qui primum feminam, deinde viros, denique concumbentes inquinarent contaminarentque. Et quoniam hanc sententiam vero valde funilem penitus non recipiendam existimamus, sed potius, ex hac causa morbum

*De origine
hujus morbi
per judi-
cium.*

N a luà

lui Americanæ similem, generari posse concedamus; negari tamen minime poteris, quin allata ex America contagio majoribus stipata sit symptomatibus, longeque vehementius & malignius, quam malum ex vaga scortatione ortum faciat, ita ut non per coitum solum, verum etiam per contactum, e. g. manuum sudore madidarum, per oscula, & in lactantibus per affricum mamillæ & papillæ, imo per pocula quoque & vestes, quam aliis possit communicari, insuldeque plures interdum annos, ante quam libem suam exierat, in corpore latere.

§. II.

Definitio.

Est autem hæc lues dyscrasia humorum omnium, maximeque seroso-lymphaticorum, maligna & putredinosa, & intusmate venereo, per contagium intus suscepto oborta. His vero signis & symptomatibus prædit ac progreditur hic morbus. Qui ex impuro venereis usu eundem sibi contraxerunt, contagii vim maxime & primum experiuntur in pudendis, ubi inflammationes, tumores, dolores & ardores, exulcerationes, humorumque profluvia oriuntur. Postea vis veneni se diffundens primo vicinis & coniugis partibus, dein quoque remotioribus libem inurit. Quamprimum enim pessima ista & multiplicativa indolis inquinamenta in succos vitales, lympham & sanguinem transfusuntur, omnes tum fluidæ tum solide corporis partes, ob corruptionem inductam, pessundantur. Ita languor & lassitudo totum corpus occupat, vires notabiliter decrevissent, humore orbata adpectu facies maculis & pustulis, modo laticioribus, modo minoribus, in fronte præsertim defœdatur, varique generis tubercula sicca & humida, furfuracea seu squamosa, colore tamen & magnitudine, secundum locorum differentiam diversa, in toto corporis ambitu hinc & inde erumpunt; partes omnes nutrimento destitute emarcescunt, in partibus, ex carne & pinguedine consilias laticioribus ulcera generantur maligna, ad ossa usque serpentina; in articulis insignes sentiuntur cruciatus, arthriticos æmulantes; in mediis artubus circa periodia & in ipso osium medullis dolores grassantur osteocopi vix tolerandi, noctaque invalescentes; ino sapissime rophi & gummatæ, abscessus & caries in ossibus proveniunt, horumque substantiam & lamellarum compagem ita pessundant, ut soluto partium nexu plane erosa dilabantur. Præter hæc, pili quoque subinde desuunt, collicque, inguinarum & axillarum glandolæ, ob lymphæ, seminio mortuo contaminatæ stagnationem, tumores contrahunt, qui vel in scirrhum, vel in ulcera, si negligantur, degenerant. Quid? quod ex his denovo sexcenta alia procedunt mala, ut luem hanc non morbum, sed morborum illadem pronuntiare fas sit.

§. III.

-specificum in corpore.

In nulla vero corporis parte virulenti hujus fermenti effectus magis sunt conspicui, quam in ipso capite. Nam præter immanes, qui ibidem noctu maxime sentiunt, dolores, genæ, supercilia pilis nudantur, pustulæ & tubercula labiis, oris, palato innascentur, quæ in ulcera cancotheca abeunt; gingivæ aphthis & ulceribus oblate dentes vacillantes & cariosos efficiunt, planæque ex alveolis suis dimittunt; uvula, tonsillæ, totumque faucium peristroma ardent, dolent, inflammantur & ulcere exeduntur, ossa narium spongiosa, carie infecta abluuntur,

& vomere, à quo sustentantur, privata corruunt, fornice nasi depresso: unde simul putridus ex ore spiritus exhalat, & magna vocis ac loquelæ depravatio cum insanabili raucedine observatur. Neque aures & oculi à tali labe manens immunes, sed hi exterioris dolore, rubore, pruritu & lippitudine tentantur, interiori vero, humoribus obfuscat, splendore & visus acrimine privantur, imo nonnumquam suppurantur. Aures molles afficiuntur tinnitu & exquisito doloris sensu, & quoad internam sui substantiam exulcerantur, tetrague carie exeduntur. Imo sæpenumero cranii ossa arroduntur naphisque & gummatibus deformantur, cujus rei testem citamus RHODIUM cent. I. obs. 33. qui in rustico lue venerea laborante in dura matre tria candida annotavit gummatæ.

§. IV.

Et hæc sunt præcipua pessifera hujus lui symptomata, quæ, quantum totam corporis humani machinam omniumque ejus partium functiones in utroque sexu possint lædere, imminuere, & penitus tandem abolere, facile quisquam ex dictis colliget. Nolumus autem prolixiores esse in notis morbi circumstantiis secundum singulas ejus periodos & diversos gradus considerandis, quia otium nobis fuit celeberrimus SYDENHAMUS; qui in elegantia sua de lue venerea, epistola accuratam morbi naturam, adulti & senescens tradidit historiam, optimeque ibidem docuit, quæ ratione hoc terretimum mali genus inter initia prodent, & postea, alius corpori insinuatum latiusque diffusum distat etiam partes afficiat, labefaciet, pervertat. Hoc tamen non possum, qui paucis, ad meliorem rei intelligentiam, commemorem, non omnia hæcenus allata signa similibus in omnibus hac lue laborantibus deprehendi, sed quedam in his, alia in aliis annotari, neque ideo temere ex quibusdam tantum, sed ex pluribus simul sumtis, de morbi præsentia esse iudicandum. Nemo enim facile pudendorum tumores, exulcerationes aliisque labe, inter initia apparentes statim pro ipsa lue, quam potius pro lui principio vendidat; siquidem, si recte tractata tempestive curantur, luem nunquam ingerant.

§. V.

Equidem hi signis facile luem veneream dignosci posse confido; nihil minus tamen de morbis, quibuscum aliquam habere convenientiam videtur, pauca addere juvabit. Inter hos præcipuum obtinet locum scorbuto, qui perinde ac venerea lues languorem torporemque corporis, dolores vagos & fixos, noctu æstiones, nervorum contractiones, pustulas, tumores duros, variasque tam oris, quam ipsius penis, ut EGGLENS lib. de scorbuto tellis est, exulcerationes comites habet; ut nihil ideo mirandum sit, cur CHARLETON lib. I. de scorbuto cap. 4. tantam inter scorbuto & venereum italem analogiam intercedere prodiderit, ut communia quedam utrique morbo sint symptomata, à Medico etiam periculissimo, in locis maxime septiciorialibus & maritimis, Dania, Succia, Baravia, difficulter distinguenda. Quod si igitur duo hi morbi in uno loco simul grassantur, atenta opus est diligentia, ut ad rectum iudicium revocentur omnia: sunt enim centi omnino characteres, quibus arte periti pustulas, serpigines & ulcera venerea, cancri naturam æmulantia, ab impuritatibus scorbuto-

Signa dif-
ferentia
scorbuto
lue venerea
distinguitur.Lue venerea
signa
distinguitur.

ticis possunt discernere, qui tamen facilius discuntur, quam docentur. Interim EUGALENUS hanc tradidit differentiam, quod in venereis cauterio apertis materia pinguis, lardo infusato similia; in scorbuticis vero non ita reperitur. Accedat, quod macula scorbutice raro efflorescant, nisi prius gingivis exulceratis ubique livore nigrescentibus, quae similiter in lue nostra aliter se habent. Praeterea, ulcera scorbutica tota plerumque livent, cum venerea contra in ambitu rubra sint, colorem ex albo cinereum in ima cavitate referentes. Quod vero speciatim ad exulcerationes oris scorbuticas attinet, hae primum gingivas, tum fauces & tonsillas, lento tamen progressu, afficiunt; venereae autem primum fauces ejusque partes, & demum gingivas occupare solent.

§. VI.

Pariter quoque providendum est, ne herpetem, impetiginem, aliaque cutis ulcuscula statim ad luis occultae virus referamus, sed probe prius, an cetera consentiant signa, disquiramus. In eo autem maxime hae cutis vitia à venereis differunt, quod frons facta eruptione corporis inquiritudo & lassitudo desinant, quod tantam dolorum atrociam miomine junctam habeant, nec demum noctu, si auctiorem à lecti calore pruritus excipias, adeo invalescant. Eadem cautio adhibenda est circa rophos, nodos & ganglia, quae certe non à solo veneno venereo, sed quam maxime etiam à quacunque violenta nervulorum partium tensione ac vellicatione, uti post veros arthricos dolores interdum videmus, proveniunt: nisi itaque alia signa adsint, quae pondus & fiduciam addant, nunquam temere de venerea lue suspicandum est. Neque tandem sine adhibito discrimine omnes glandularum tumores pro venereis aestimari debent, quia illi multoties sine ulla clam latente venerei fermenti suspitione in variis corporis partibus visuntur; sicut ex solis fluxum animadvertere licet. Omnium tamen maxime Medicus, ne in iudicando hallucinetur, in quibuscunque morbus, huiusmodi analogis, respiciere debet ad vitam aegrotantis anteaclam, quae si luxuriosa fuit, & in lasciva fornicationum blanditium turba transacta, saepe non contemnendum virulentiae latentis perbet testimonium, maxime ubi reliqua consentiant. Neque minus aegri, praesente jam suspitione, curiose sunt explorandi, annon suscepti contagii modum norint, & ut suas tactorum suspiciones Medico darent amice hortandi; licet plerique vel pudore, vel timore perterriti originem morbi & progressum dissimulent, nolintque, si aetatem jam maturiorem adfuerint, juventutis errores relegere. Si qui autem à conceptu per coitum venereo se quondam gonorrhoeam, penis exulcerationes, aliaque genitalium vitia habuisse profirantur, quae ratione huius malis occursum fuerit, disquirendum est; unde facile iudicium poterit formari.

§. VII.

Nunc ad causam luis venereae considerandam progrediamur. Hae autem quum in Europaea orbi parte, uti §. I. inveniunt, soli contagio & misamini morbosico, ab aegris ad sanos dimanante tribuenda sit; paucis nunc perpendamus, quo principio hoc perniciosissimum & subtilissimum indolis virus suum in corpus nostrum violentiam exerat. Jam in eo quidem auctores conve-

niunt, ut his maxime modis virulentiam veneream ab infectis in corpus sanum admitti statuant, cum vel per frictionis motum sive contactum sugendo, osculando & lactando, pora parium insinuat, vel exhalando, insilat halitus, vicinis paribus inspiratur, vel, quod plerumque fit, per coitum, ex alterutra concumbentis parte impurum communicatur; sed in specifica huius contagii natura ejusque agendi modo determinanda adhuc toto, ut aiunt, caelo differunt. Alii ab acrimonia acrirodente & coagulante; alii à sale alcalino corrosivo; alii à specifica quadam acrimonia exitiales derivare effectus contendunt. Sed hac dicendo nihil reapse dicunt, quia ipsi effectus, seu producta veneni pro ipsius causa declinant. Et profecto, si meam interpretationem licet sententiam, equidem sollicitum hoc scrutamen sapervacaneum esse arbitror. Nam plura sunt in rerum natura, tenuissimae indolis admodumque parvae molis, quorum interna natura ac crasis, & ab hac immediate dependens vis agendi, mirisque effectus, in sensus incurritur producenti, caput nostrum & intelligenciam plane superant. Videmus hoc in contagio pestis, morbo varioloso, lepra, si abie maligna, morbo canis rabidi, & huius generis aliis; ubi veram veneni peccantis causam & indolem exacte demonstrare nunquam haudtenusdicat. Sufficiat igitur moderati scopo, ut tantum perniciosissimum veneni effectibus resistendo impediamus, quo minus suam in corpore humano potentiam exerant; praeterim quum in rebus alioribus ignoranciam profiteri consilium sit, quam aliquid adscribere, quod satis probari nequeat.

§. VIII.

Placuit mihi hac de re quam maxime FERRELLII prudens limatiusque iudicium: hoc in morbo, (venereo) inquit, alibiq; venenatis plurimos videtur capta, eaque admodum inveni, ratione saluti, quod, dum videtur symptomata, hae omnia cum humoris ejusmodi (acidi, acris) vitio insulare, nihil prater humorem acidum in se putant, nihil magis animo concipiunt, neque acris animi acie perferantur, non aliud quidpiam in humore subsistit, in quo praecipua affectionis causa subsistat: quale procul dubio si sensu non cernimus, potest certa ratione ac intelligentia comprehendi, alioquin in maxima rerum ignoratione versamur. Accedit, si absurdas istas de specificis agendi vires contagii multiplicativi ad manifestas qualitates, v.g. ad acrimoniam acidam, salinam, vel alcalinam transferre velimus, quod multos postea errores in ipsa remedium applicatione commissuri essemus. Minime enim difficile esset humorum, cujuscunque etiam generis, acrimoniam per appropriata remedia tollere; quod tamen in nostro affectu veritati minus respondet. Eaque propter etiam à multum mihi hallucinari videntur, qui argentan vivum, quod specificum huius morbi antidotum est, elemento alcalinae naturae penetrantissimum suum in acido peccante domando virtutem exserere audent.

§. IX.

Ne tamen omnia ad hanc rem pertinentia silentio praetermittere videar, non abs re fore confido, si meam de ejusmodi venenis penetrantioribus, mole quidem tenuissimis, sed virtute acutissimis sententiam declarem. Sufficiat itaque ratione inductus longaque experientia confirmata assero, veneni contagiosi indolem in tenuissi-

— & alia morbi

Causa et contagium

De veneni indolis et effectibus

egregium prolat exemplum apud FERNELIUM cap. XV. in Dominis de Mesieres.

§. XIII.

Ne tamen artifex in cognoscendo morbi exitu gradipatur, respiciendi sunt diversi morbi gradus, sive symptomatum complicatorum vehementia, uti jam pridem tulit usus. Sciendum itaque, quod, quā in primo tantum gradu, seu in limine constituti gonorrhœa virulenta, flore albo maligno, bubonibus, testium tumore, & inde ortis capitis arduumque doloribus nocturnis vexantur, adeoque vitium in fluidis tantum habent, facile ad sanitatem reducuntur. In secundo gradu, sub quo penis & faucium ulcera, pustulae & furunculi per totum corpus diffusi, quos variolas magnas dicunt, aliisque ulcera externa comprehenduntur, & ubi jam solidae corporis partes labe quadam afficiuntur, curatio quidem admittitur, sed longe difficilior est, nisi alia tam circumstantia, ut vitæ genus, vires ægrotantis & morbi complicati plane prohibeant. Maximus, isque tertius gradus, qui cariem ossium, profundiorum palati, ossiumque nasi & pulmonum exulcerationem, comites habet, vitæ minatur periculum, & concepta salutis spes merito evanescit. Quo enim nobiliores sunt partes, quæ corruptuntur, & quo magis munus ad vitam necessarius destinatus, eo gravius est illi periculum; quod similiter dicendum est de partibus quibuscumque aliis, quæ remediis parum obvia ferro, si opus est, excidendi nequeunt. Pari ratione, si corpus laborantis impurum sit, & scorbuticus infectum humoribus, aut viscera quadam præcipua, ut pulmones, lien, hepatis, uterum corrupta, conclamata sunt prope omnia, quia tum temporis heroicam salutaris remedium tuto adhiberi vix possit: unde fit, ut morbus per se non semper lethalis vitam multiplici ratione auferat. Nonnulli enim, qui simul scorbutus & viscerum imi ventris corruptela laborant, hydrope, nonnulli, quorum pulmonibus ulcerosa infidet labe, phthisi & hæctica consumuntur; quidam alii, quorum ossa ichor venenatus carie erodit, cruciati intolerabili pereant, quidam sphacelo, cancro palati & uteri extinguntur, putridumque & lacerum cadaver tandem abijcit, pabulum fæci ingratum, & vix ventibus jucundum.

THESES THERAPEUTICÆ.

§. I.

Indicatio-
nes curatio-
nis.

Quoniam in hoc diro admodumque difficili morbo universa sanguinis & lymphæ massa à malignæ indolis immutata seu fermento plane aliena & nature prorsus adversaria, putridam, vapescientem ac viscidam induit crasin; à qua, seu à fonte omnium in hoc affectu evenientium symptomatum ratio unice petenda est; certe ad causam hanc principalem removendam vix melior excogitari potest indicatio, quam ut tota corruptorum humorum massa ex universo corpore & minimis ejus vasculis seque & recessibus per omnia emunctoria foras expellatur. Ita enim futurum est, ut gravissima illa symptomata, qualia sunt glandularum se- & excretoriarum obstructions, ossium omniumque partium solidarum inflammationes & exulcerationes, tanquam effectus causæ sponte conquiescant & removeantur. Duo vero ulique eo innoterunt modi, quorum beneficio tota humorum iniquitatem colluvies

Frid. Hoffmanni Oper. Tom. III.

ex intemis partium solidarum latibus ejici & expurgari possit, videlicet per largiorem pauloque diutius durantem sudorem, & per copiosum, debito tempore institutum salivæ profluvium: quare de utroque modo pauca commemorabimus.

§. II.

Quod ad priorem curandi methodum, quæ per sudoriferam absolvitur, attinet, monendum hoc loco est, quod non omnis generis remedia sudorem pellentia huic scopo apta sint & idonea, sed ea requirantur, quæ non tantum meatus cutis excretorios aperiant, humores viscidos diluant, resolvunt ac digerunt, sed maxime etiam, motum vasorum cordis & glandularum sympathicum augendo & intendendo efficiant, ut humores ibi residentes valde tenaces & corrupti in motum & progressum ciantur, commodoque ex imis partium latifundis excutiantur. Quo nomine, ob specificam virtutem, primum celeberrima sunt lignum & cortex guajaci, radices chinæ & sarsaparillæ, lignum & cortex sassafras &c. si paratum ex his decoctum sudoris efficiendi fine utitur. Hæc inter vero quam maxime eminent guajacum cum cortice suo, qui ipsi etiam Americani suis curationem institunt optimeque absolvunt, eo quod illud subtili quodam, acris & resinoso gaudet principio, quale omnino requiritur ad irritationem solidorum præstandam. Sic enim ex hoc ligno per spiritum vini rectificatissimum tartarifatum paratur essentia valde resinosa, quæ cum dimidia spiritus tartari parte mixta, calidoque cum vehiculo exhibitâ sudorem efficaciter movet. Longe autem frequentioris tartaricique usus est decoctio ligni & corticis ex aqua ita instituta, ut ejus uncia in tribus libris medicis per horæ spatium decoquantur: qua ratione tantum subtilis resinosa & balsamica extrahitur portio, crassior resinæ substantia relicta. Siquidem idem decoctum ad siccitatem leni evaporatione consumissimum pulverem relinquit bruni coloris, odoris & saporis opobalsamum æmulans, acrimonie tam penetrantis, ut vel dimidiâ grani portio naribus suscepta, vehementem movendo stimulationem, modicissimam ex narium fistulis, si quid aliud, potenter sine incommodo excutiat.

§. III.

Ex qua operatione satis licet colligere, decoctum guajacinum debita quantitate debitoque tempore interne sumtum principio suo acris subtili balsamico inertes ad motus fibras & tunicas vasorum ac glandularum nervas stimulando, humorum & lymphæ progressum, aucta & intensiori reddita virtute sympathica, egregie promovere. Commode autem tale decoctum pro circumstantiarum ratione ad mensum unum, duos vel tres mane in lecto, lenem postea sudorem expectando, calide bibitur, tam felici sæpe evenit, ut ego hoc solo plures phlegmatico temperamento habitusque corporis spongiosius præditos à periculis in arte viris sanatos sciam. Nonnulli etiam, ad nimiam humorum tenacitatem eo melius dissolvendam, idem decoctum cum balneo laconico, quod cum spiritu vini accendo paratus, inspersare suadent; neque ideo taxandi videntur, si modo debitam cautionem justamque circumspectionem adhibeant.

§. IV.

Quod si vero sint temeriores, macilentiores sensibilibusque nature subjecta, decoctum hoc guajaci

N. 3

Carissa
per sudorem
cum
guajaci
decoccto.

Modus ad-
hibendi
guajacum.

si cum
temperato
spiritu vini
decoccto.

ci, ob majorem, quem in humoribus excitat motum & ebullitionem, non congruam semper est remedium, ad lucem extirpandam, sed tum præferenda sunt decocta, quæ ligna & radices temperiores ingrediuntur, cujus generis sunt radices sarsaparillæ, chinæ, lignum sassafras, & ex nostris regionibus lignum juniperi, radix cichorei, saponariæ, bardanæ, glycyrrhizæ, & alia, quæ in formulam redacta medicinalem, oleo tartari per deliquium, ad meliorem extractionem, possumus imbui; siquidem hoc sal quasi clavis est, quæ firmior, resinosâ & viscosâ lignorum compages recludit. Longe vero præstantior horum decoctorum in debellando malo est effectus, quando antimonium crudum in petia ligatum in coctione additur, vel etiam, ut quorundam mos fert, argentum vivum additur. Atque tum eadem species & decocto iustitiori mane bibendo, & loco potus ordinarii hauriendo inserviunt, ita tamen, ut si hic finis intenditur, in tripla majori aquæ quantitate decoctio instituitur, additis pro re nata passulis minoribus, &c, suavioris conciliandi saporis gratia, cinnamomi paulillo adjecto.

§. V.

Formule decoctionum.

Ad meliorem mentis nostræ evolutionem præscribere placet unam alteramve decoctionem formulam: *Recipe plantæ rursæ ligni quatuor uncias, corticis ejusdem uncia una, radicis sarsaparillæ, chinæ una libra dimidia, cichorei, glycyrrhizæ una uncia dua, salis tartari uncia dimidia, C. C. D. S. species, quarum uncia una & semis cum duabus drachmis antimonii crudi in petia ligati in tribus aqua mensuris coquenda, & sacca colatura tertia mensura pars, ad sudorem pellendum haurienda.* Relictis à coctione specibus, additisque passulorum minorum duabus vel tribus uncias aquæ tenuis affunde mensuras tres, fiat per horam decoctio in vase clauso: colat. D. S. pro potu ordinario. Si quis vero decoctum paulo temperatius desideraret virtutis, sumat modo radices sarsaparillæ libram dimidiam, chinæ, scorzonera singulorum uncias quatuor, cichorei, glycyrrhizæ una uncias binas, corticis ligni sassafras unciam unam, salis tartari drachmas tres, eademque species in aqua quantitate, sicut in priori, instituat decoctionem.

§. VI.

§) cum alia sudoriferis.

Residet profecto in convenienti horum decoctorum usu magnus auxilium, magnitudo in principio morbi vincendo præsidium. Ubi vero jam alius inhaeret malum, temporisque diuturnitate obfirmatum fuerit, & jam fluidis æque ac solidis partibus infectis misceæ pellimorum symptomatum syndrone adenatur, eadem non adeo semper mercedem expectationi & ægro tantum votis respondere experimur, sed postulat morbi gravitas, præsertim in locis septentrionalibus & majori frigori obnoxio, ut virtus illorum discutientiæ & resolvendi additis efficacioribus remediis augeatur. Quod quidem nostra methodo auspiciatissime perficitur, si cum ejusmodi decoctis medicamentum ex minerali regno petimus, quod mercurialis vel antimonialis est proprietas, debita dosi offeratur. Atque hoc nomine & virtute commendatissima sunt æthiops mineralis, vel sulphur antimonio saturatum, ex lixivio scoriarum reguli antimonii cum solutio-

ne auri præcipitatum, quod ad tria quatuordecim grana sumunt, ad impuritates omnis generis è sanguine eluendas, remedium est potentissimum. Huc quoque pertinent tinctura antimonii acris, vel sal antimonii sulphureum ex icoribus reguli simplicis arte paratum vel etiam pulveres, ex duabus partibus cerussæ antimonii & una parte cinnabaris ejusdem confecti: quæ singula, cum decoctis superioribus debito regimine sudorifero exhibita humores viscidos, tubulorum minimis impactos foriter colligant, dissolvunt, & tam per subcutaneum, quam reuale cribrum copiose educunt.

§. VII.

Verum enim verum, ut cura hæc sudorifera optatissimo gaudeat effectu, opus esse æor, ut corpus ad eam sine noxa perferendum bene prius præparetur. Quo fine primo omnium necesse est, ut, urgente plethora, conveniens sanguinis quantitas per venæ sectionem detrahatur; deinde, ut prima regio, totumque corpus a viscosorum humorum sabura per alvum depleatur. Quoniam tamen obtinendo huic scopo non omnia sine discrimine laxantia & purgantia, sed tantum selectiora nonnulla, eaque magis appropriata inserviunt, scire licet, hunc censum maxime subire gurgulium resinolæ, uti sunt gummi amanoniacum, sagapenum, opoponax, galbanum &c. quæ cum extracto rhabarbati, hellobori nigri & mercurio dulci roborant, mediante essentia ligni quajaci, vel balsami Peruviani in formam pilularum possumus redigi, sumendo pro dosi drachmam dimidiam. Peracta cum hisce pilulis, ter vel quater circa athenum diem sumtis, purgatione, suscipienda est cura sudorifera, & simul idoneum diazæ regimen servandum: cujus ratio in eo præcipue continetur, ut victu exquisito tenui utentes ægri panem bis coctum, moderatam carnis assæ portionem cum passulis exacinat, & tenuiora carnis vitulina, vel gallinarum julecula cum lactuca, endivia, asparago, selleri &c. decocta comedant; ceteroquin vero, quantum fieri potest, sibi temperent, quo minus pinguis, carnis elixia, pilulis, lacticiis & farinaceis malum inhaerent.

§. VIII.

Altera luis venereæ curatio, quæ mediante salivatione perficitur, locum tum invenit, quum malum aliis infixum nec stricta diæta, nec cura jam laudata sudorifera evelli potest, quia tunc unique alia, majoris efficacis remedia & quæ morbis giganteis debentur, heroica usum arceferenda sunt. Huc spectant medicamenta ex argento vivo parata, quæ revera specificum rebus hujus luis antidotum suspiciant, eo quod præter mercurium in universa rerum natura nec certius neque efficacius deitur remedium, quod subtilitate sua terribissima, penitus in intimos corporis recessus penetrando, tenacem, viscidum & in tubulis quasi coagulatum humorem tam potenter resolvat fluxilemque reddat, & ad congruam emundationem, palati & faucium glandulas, ad faciendam illi excretionem, propellat.

§. IX.

Prostant autem varii, mercurium ad salivationem adhibendi modi, quos breviter strictimque indicabimus. Veteres per suffumigata, mercurium

Regula adhibendi cum alia sudoriferis.

Constitutio præparandi ægri.

vel suffumigata per alia sudoriferis.

aurum in vapores resolvendo, curationem morbi peragete contendant, sed minus commode, quia crassius denique hi vapores nervoso generi sunt inimici. Tutior, isque frequentior est usus per unguenta, quibus argentum vivum probe subactum corpori applicate solent. Atque hæc methodus in Gallia maxime hæcenus obtinuit, & à Chirurgis ibidem degentibus hac potissimum ratione instituitur: unguentum rosarum & pomatum, æquali ad unciam portione sumtum cum uncia mercurii vivi, in sufficiente quantitate terribinthinæ extincti incute miscetur, additis pro lubitu olei lavendulæ guttis decem, & dimidia balsami Peruviani drachma: quo unguento juncturæ pediculi malleoli & genæ quoque, si opus est, mercurio tempore & ventriculo à cibis vacuo ad fornicem per tres quatuorve dies probe inunguntur, donec salivæ sequatur profluvium; non omisso interea decocti lignorum temperationis usu.

§. X.

Sunt dein ex Medicis & Chirurgis peritioribus nonnulli, qui salivationis cura per inunctionem seposita in rebelliori malo tuniorem existimant modum, per mercurialia interne sumta salivæ fluxum promovendi, atque hac methodo utuntur. Mercurii dulcis rite parati quatuor vel quinque grana, cum agemonii diaphoretici & cancrorum lapidum eadem quantitate in pulverem redacta cum conservâ rosarum in jusculo avenaceo, vel infuso thei formi propinant, augendo circa alterum diem mercurii dosin ad duo vel tria grana, & paulatim ita ascendendo, donec ad drachmam dimidiam perventum sit, & salivæ fluxus oriat, qui in nonnullis, præsertim sensibilibus, septimo, in aliis nono vel undecimo die incipit. Quod si vero in corporibus natura segnioribus, torpidioribus & phlegmaticis non ex voto succedit operatio, tum per aliquot diurnum spatium subjungunt externa mercurii inunctio; unde saliva tam largo prodit flumine, ut sæpe ad duas vel tres mensuras ejus accedat quantitas. Tum vero abstinendum est ab ulteriori tam interno quam externo mercurialium usu, nihilque, salivæ fluxu rite procedente, innovandum, sed potius curandum est, ut abacto omni frigore æger in temperate calido servetur regime, quod peragenda huic curæ accommodatissimum est; sicut etiam ideo æquabilem veris temperiem quam maxime eidem favere deprehendimus. Deinde fructus visentur horæ, ne diarrhoea excutatur, potus sumatur nunquam frigidus, neque bibantur cerevisiæ, multo minus spiritusæ, sed potus loco decoctum radicis chinæ, scorzonæ, & glycyrrhiæ cum passulis adhibeatur. Atque hæc salivatio per duas vel tres circiter hebdomades tamdiu est continuanda, donec clara & limpidæ ex ore saliva profluat, nec amplius molestissimus oris fœtor observetur.

§. XI.

At vero, quum multum omnino referat, ut corpus ad generalem salivationis curam rite præparetur, primo omnium hoc sine sanguinis infuso in plethoricis instituenda & corrigentibus remediis humorum ipsurasis emendanda est: cui usui præter decoctum temperatioris diluentia & pulveres absorbentes leniter diaphoreticos, præcipue inservient laxantia supra præscripta, ut iidem superflue serosæ lordes ex habitu corporis extenuentur.

CAUTELÆ ET MONITA PRACTICA.

§. I.

In omni venereæ lue curatione rite insinuanda nunquam certe non corporum laborantium habenda est ratio, ita ut debiles, pueros & mulieres, præsertim gravidas, à robustis & valentioribus discernendo videamus, quæ utrique pro diversâ corporis constitutione conveniat sanatio. Nec minori opus est cautione, ut malum recens & inveteratum multisque gravioribus stipatum symptomatibus distinguamus: siquidem diversus morbi gradus diversam requirit curationem, eamque vel remediis mitioribus, vel vehementioribus perficiendum. Atque utilissima hæc monita nisi exacte observentur, periculum est, ne vel ægruot sine ope miseros à nobis dimittamus, vel in majorem præcipitemus perniciem.

Cautela circa salivationem in corpore lue venereæ.

§. II.

Speciatim vero heroica salivationis cura, nisi recte administretur, funestum sortitur eventum: quare multæ sunt cautiones tam ante ejus usum, quam sub ipsâ cura observandæ. Quando igitur lues in corpus incidit cacoehymicum & scorbaticum, observatio paullo subtilior adhibenda est, ante quam salivationem intendamus. Quod si enim impura ejusmodi corpora mercurialibus velimus tractare, ipsique salivam movere, longe deteriora sunt symptomata, quæ mercurius salibus adfocis valde rodentem acquirit facilitatem. Tutius itaque in hunc modum procedere juvabit: evacuatis prius cum laxante mannato & chabarbarino primis viis, scum lacis dulces cum succis herbarum antiscorbaticarum, cochleariæ, fumarie, beccabungæ, naturæ aqzati imprægnatum, vel etiam decoctum lignorum temperatum cum lacte mixtum per integri mensis decursum bibatur; & postea demum ad decoctâ lignorum sudorificâ, vel etiam, si necessitas urget, ad mercurialia deveniatur. Similis cautela adhibenda est in iis, qui ex viris ad affectiones psalmodico-hypochocondriacas, ex foeminis ad passionem hystericas, sive ex utroque sexu ad effluens sanguinis congestionem, ejusdemque per nares, hæmorrhoides & pulmones evacuationes sunt dispositi, quibus omnibus sola salivatio nunquam conducit. Multo vero minus in illis debet suscipi, qui viscera qualicunque labe afficta habent, quia metus est, ne auctis inde obstructionibus ad lethum ducantur ægri.

Cautela circa salivationem in corpore lue venereæ.

§. III.

Deinde, corpora siccâ & macilentiora non adeo bene ferre solent mercurialia: quapropter insignis stratagemata est, ut humores prius fluviis reddamus, fibræque rigidiores & ad spasticas stricuras proclives relaxemus: quod optimo consilio perficitur per balnea aque dulcis temperata, duas vel tres ante salivationem hebdomades una cum decoctis lenioribus adhibenda. Atque his præmissis optime blandæque sæpe agere vidimus mercurialia.

Cautela circa salivationem in corpore lue venereæ.

§. IV.

Dira quandoque sunt, quæ curationi mercuriali adfociantur symptomata, ut dentium nigrescentium à nimia gingivarum relaxatione indurta vacillatio, lingue fasciumque intumescentia cum masticatione & deglutitione difficili, ap-

Cautela circa salivationem in corpore lue venereæ.

petius prostratio, somnus ob salivæ fluxum, not-
ctis etiam durante valde interruptus, & nota-
bilis virium defectio: quæ omnia partim ab im-
petuosa salivæ laticis profusione valideque seri
ab extremis & infernis partibus ad fauces impul-
su, partim vero ab immixto alvi & urinæ fluxu
proveniunt. Quapropter, si nimium urget & vi-
res plane destruit salivæ profluvium, humorum
motum ad inferiora derivare juvat per pediluvia
dextre adhibita, per clystera, per laxantia man-
nata & rhabarbarina, vel, si hæc non sufficiunt,
per pilulas nostras balsamicas cum extracto pan-
chymagogo *Crollii* interdum acutas, vel etiam
per pulverem rhabarbari, cum diagrydio sulphu-
rato vigorem, & cum syrupo cichorei cum
rhabarbaro in electuario redactum, quod simul
roborandis gingivis egregie inservit. Neque tam
laude sua carent insula theiformis, ex veronica,
scabiosa, floribus sambuci & salivæ parata cru-
briciusque oblata, quia istidem humorum motus
ad extimam corporis superficiem dirigunt, &
saluberrimum transpirationis negotium perbelle
promoveunt.

§. V.

Circa vi-
sibilem
dentium
laxationem.

Præter hæc interna derivantia quod speciatim
attinet ad externa, in oris fauciumque vitis sub
pyralissimo evenientibus, applicanda opportuni-
tate adhibentur gargarizantia, ex speciebus pu-
rificantibus leniterque confringentibus compo-
sita, quarum præcipue sunt bacce & folia myr-
thi, flores balaustiorum, rosarum rubrarum,
herba menthae, mellisæ, cortex cascarillæ, ma-
stix &c. quæ in aqua sorum sambuci, plantagi-
nis, vel vino rubro decocta siphonis ope possunt
injeci, istilensque os farynx collui. Ad nimiam
vero gingivarum laxitatem dentiumque lapsum
præcavendum essentia teræ catechu, tinctura
laccæ *Myrsicetis*, vel balsamum nostrum viæ
cum syrupo granatorum, vel auranciorum mix-
tum, caraque gingivarum crebrius admotum,
egregiam præstare opem.

§. VI.

Circa de-
lucem in
gumma
vagantes.

Incidit sæpius, ut mercurialia pro salivatione
cienda propinata dolores excitent interstissimum
admodum feroces: quare tum protinus danda sunt
theriacalia, ut theriacæ coelestis aliquot grana
cum emulsione amygdalarum dulcium & uncia
dimidia syrupi diacodi. Atque ejusmodi emulsi-
ones cum aquis antispasmodicis paratæ, & cum
syrupo papaveris albi edulcoratæ commodum
etiam habent locum, quando nimia & assidua
vigilia auxilium urget, quia tali in casu fortiora
dare hypnotica nunquam securum est, sed lemo-
ra tantum hæc sufficiunt.

§. VII.

Circa
post salivati-
onem.

Ipse salivationis cura nonnunquam ad triginta
& sex dies, imo longius protrahenda est; quibus
exactis nihil minus sæpe ægri certam mercurii
dulcis dosin omni septimana debent sumere, & se
dantius adhuc ab acerbis, pinguisque cibis ab-
stinere. Et quomodo plectra salivatione sint
samelici, omniaque velint ingurgitare, nimiam
quoque ciborum abundantiam vitare decet ægros,
quia instar infantum sunt considerandi. Etenim,
quoniam verus sanguis fere omnis per salivæ fluxum,
mercurialium ope excitatum, fuit educatus,
sanguis & succi benigni nunc de novo sunt substi-
tuendi, quod per alimenta pauca, eueptia & eu-
chyma perficiatur, simulque tali ratione recidiva

præcaveatur. Sunt quoque, finita salivatione, ma-
tanda vestimenta, quoniam haud raro fomes ve-
nereus non penitus exstinctus quasi in cineribus
latet, qui novos postea tumultus fulcitare valet.
Quam in rem legendus est *HILDEBRANDUS* *centur. V. observat. 115.* ubi præstantissimus hic auctor etiam
alias salutares suppeditat cauteles, circa salivati-
onis operationem observatu necessarias, imprimis,
quod ante eam topi ossium sint emolliendi, car-
ies tollenda, ulceraque, quantum fieri potest,
mundificanda.

§. VIII.

Virus venereum quam facile sese adlocat of-
ficialis narium spongiosis, & palati quoque offi-
culis firmiter inhaerens partes has teneriores ve-
hementer corrodit, exedit, & in fragmenta pu-
treline dissolvit. Quo in casu mercurialis saliva-
tio parum sola proficit, sed potius intra nares cum
siphone fieri debent injectiones liquorum putre-
dini resistentium, ex aqua d'*argueuse* (ade), essentia
succini, myrtæ, balsami Peruviani, additis ali-
quot olei caryophyllocum guttulis, compositorum,
quibus mirabile certe levamen excessu huius parti-
bus affertur solet. Quando enim non cito satis ter-
rentina ista putredo sistitur, ossa palati exulce-
rantur & carie ita exedantur, ut foramina fiant,
mundificamina, præsertim potentia per nares
regerantur.

§. IX.

Exossetos & caries ossium non semper per me-
curium cito curantur, sed melius sæpe per gua-
jaci decoctum, in magna quantitate, ad aliquot
mensuras in die haustum. Externa vero ope ut
simul subveniamus, caries ossis & nigredo pri-
mum est abradenda, dein pulvis euphorbiæ im-
perspersionis, vel loco hujus aliquot olei guajaci,
caryophyllorum, vel cinnamomi non adulterati
guttulæ cum gossypio applicandæ. In occulta au-
tem carie juvat carnem, quam cariolum locum
connegit, putrescentem vel scalpello, vel cath-
etico separare, ut os oculis remediisque adhiben-
dis pateat.

§. X.

Non tam accidia, ut ipsa ossium compages, *Circa*
præsertim tibiarum, à sulcepto intus virulento
humore in tumorem attollatur, acque in dura
abeat tubercula, quæ, quia inde sensibilibus perio-
stii membrana rumpitur, vehementer dolent. At-
que tum pariter externis succurrere decet, ex
quorum numero emplastrum *Vigæni* cum mer-
curio, vel emplastrum manus Dei, seu miracu-
losum, debita additione mercurii vivi & balsa-
mi sulphuris terebinthinati, sive juniperis vi-
goratum, ob extimam opem summam meretur
commendationem. Quo etiam spectat empla-
strum emolliens *Agricole* in chirurgia ejus par-
va descriptum.

§. XI.

Enimvero, mirum fore culpam esse posset, *Ratio*
ipsa quoque ossa, seu corpora sensus expertia &
tam solida, ut ferro vix findi possint, hæc in lue
graves læsiones, tumores, inflammationes &
apostemata, imo dolores fere intolerabiles pati.
At vero, quia ossa nutrienda, crescunt & aug-
menta sumunt, omnino influxum recipiunt hu-
moris narii lymphatici tenuis: unde non mi-
randum est, cur etiam putredine & apostemate
inici possint. Quandocunque enim acres jcho-
res

res in ossum poris coacervantur, acedine sua illa corrodunt, non secus ac teredo vermis lignum solet perforare. Hanc ulcerosam ossium affectionem AVICENNA, unus ex principibus Medicorum antistitibus, ventositatem spinæ appellavit, & ita exoriri docuit, quando ichoris putridi, in ossium caverna accumulati pars grossior in tubera & tophos concreveret, altera subtilior sua acrimonia ossa & panniculos ejus arderet atque dissunderet, quorum panniculorum ope ossa dolerent & quasi terebra perforari viderentur. Quod vero noctu præsertim atrociores hujus morbi dolores osteocopi ingravescant, id ea ratione fieri arbitror, quia sile occiduo, ob motum fluidi ætherei leniores, humores magis sunt viscidati tenaces; lecti vero calore acres corrodentes subtiliores partes magis in motum cientur, ut membranas, tendines & nervos graviter vellicent, & vaporoso statu dissendant.

§. XII.

Pustule venereæ in fronte & mento efflorescentes, sanienque & ichorem puridum acrem fundentes difficulter tolluntur & consolidantur, nisi veneno venereo probe retulo, omnique symptomatum ferocia refragata. Neque etiam linimentis, unguentis & emplastris semper cedunt, sed ab applicatione unguenti digestivi, ex vitello ovi, myrrha & cerebinthina Veneta parati, & cum æquali portione balsami nostri vitæ remixti singularem vidi effectum consolidantem.

§. XIII.

Gonorrhœa virulenta albiq; fluoris ex mulierum pudendis stillicidium mercurialibus non sistitur. Urgent tamen nonnunquam auxilium; quo fide præter ea, que suo loco in capite de gonorrhœa innotuimus, injectiones tam in uterum quam in urethram immittit proficiunt; quales ex aqua calce vivæ secunda, cum aqua rosarum vel sambuci facta, & cum aqua d'arguebusæ mixta possunt confici, quibus in gonorrhœa nonnunquam sacchari saturni pauxillum potest addi. Neque tumores testium salivatione proprie curantur, nisi simul idoneis succurrantur externis remediis, quæ in scotibus & vaporibus, ex herbis & floribus emollientibus in lacte coctis paritque affectu adscitis, nec non emplastro *Vigani* cum mercurio potissimum consistere debent.

§. XIV.

Restat autem peculiaris medendi methodus, quæ, si internam speciem operi, non modo jam dictis genitalium adfectibus, quando nec cura sudorifica nec mercurialis sufficit, egregie opitulatur, verum etiam in debellandis aliis hujus morbi symptomatibus, ut fere sunt putrida ossium squamosorum corruptio, polypus & ozæna, pessimum stilang faciem, mirifice prodesse solet. Hæc enim mala tam pertinaciter inhereant, ut curationem omnino singularem possint, que nostra methodo & experientia per medicamenta quidem mercurialia, sed eadem valde correctæ & virtute diaphoretica exaltata, sine largiori salivæ ad aliquot hebdomadas durante profusio perficitur. Jam fere triginta elapsi sunt anni, quum ego dissertationem de morbis rebellibus chronicis sine salivatione curandis conscripsi, ibidemque docui, qua ratione mercurius æterna auri vel stanni admixtione diaphoreticus

reddi possit. Siquidem hæc metalla singulari quadam & quasi propria pollent efficacia, penetrantem volatilem, partibusque nervosis insensam mercurii indolem curandi & ita temperandi, ut ne ad intimum membranarum compagem penetraret, sed tantum vim vasorum systolicam augendo, circumit sanguinis & lymphæ insecundant, quo mediante ad ambieum corporis cutique spiracula vitiosi humores ducuntur & inde evacuantur.

§. XV.

De ipso autem præparandi modo scire licet, quod alter mercurius diaphoreticus ex amalgame mercurii & stanni, aut conficiatur, ut desuper abstracta aqua forti edulcoratio cum aqua fiat, alter vero ex commixtione mercurii, auri, & æquali portione reguli antimonii, desuper abstracta aqua regis, iudemque facta edulcoratio, præparetur. Atque cum medicamento hoc diaphoretico, auri imprimis combustionem præparato curatio non frustranea ita institui debet: primo pilulis mercurialibus supra descriptis aliquoties alvus est solvenda, deinde, humectato prius corpore per balneum, ex aqua fluviali suffurbuique triticeis paratum & aliquot dies adhibendum, mane & vespere mercurius ille cum antimonio diaphoretico, vel in conferva rosarum, vel in forma pilularum ad scrupulum unum per aliquot dierum spatium officatur, postero die mane superbibendo decoctum lignorum temperatum cum regimine diaphoretico. Tutior tamen est hæc medendi methodus, si peracta ciborum digestionem circa horam pomeridianam quintam vel sextam æger quotidie per mensem in balneo descendat & cubitum suus medicamentum dicto modo sumat: qua ratione non raro tam expeditus obtineat effectus, ut aliis dein curationibus ioternis non semper opus sit, ad perficiendum illud vinus ex corpore eliminandum; si modo ægri simul rectum conjungant victum, debitamque potuum temperationem copiam, quam sat magnam esse decet, adsumant.

ENARRATIONES MORBORUM.

OBSERVATIO I.

Vir XL. annorum, sicæ temperaturæ corporisque macilentioris, jam dum à multis annis, ob victum durum & salsum, non modo scorbuticam humorum diathesin sibi contraxit, verum etiam elapso nunc biennio post concubium cum impura femina celebratum gonorrhœam incidit virulentam, quæ adstringentibus & terebinthinaceis tractata feliciter quidem subsistit, sed acerbum capitis dolorem, noctu pleniusque turbidior, cum alvo strictione & arida reliquit. Consultebatur Chirurgus, qui primo quidem lignorum decocta cum regimine diaphoretico potanda commendabat, sed brevi post, nihil his proficientibus, mercurialis in excessiva dosi ad drachmam dimidiam per aliquot dies propinabat; unde tam copiosæ alvi dejectiones excitabantur, ut ingens virium jactura vite periculum minaretur. Reversis paulatim viribus alviq; fluxu cessante, capitis dolores nihilo minus magnam figebant crucem; unde cura per annum inunctionem salivatoria instituebatur; qua nondum penitus finita quum æger diæte strictioris impatiens parum sentiret levaminis, adibat Medicus, qui decocta lignorum sudorifica diligenter commendabant; à quo-

concreta circa peristalticam

diva vitæ pudenda- rum sub salivatione.

Curetis facti cum mercurio sine salivatione.

Exim præparatio de auri.

Lari- terna ex gonorrhœa male co- clata.

quorum usu mox in universo corporis ambitu maculae procrebant rubicundae, ob ardorem & pruritum molesta. Varia hoc sine dabatur refrigerantia & nirosa, idque inde obtinebatur, ut maculis ad tempus dissimulatis, tantum levis cutis ardor remaneret. At vero, redeuntibus non adeo multo post maculis, dolores capitis & artuum lancinatorii, somnum plume turbantes plurimum aures usquam aegrum affliciebant; alvus plerumque adstricta non nisi dura & pauca dimittebat scybala; imo in ipso abdomine, flatulentius turgido, tormina saeviebant spastica cum urinae difficultate & ardore juncta. Tandem pedum tumor insignis accedebat: quare aeger de vita sollicitus meam postulabat opem.

Epicrisis cum consilio.

Pessime sibi consulunt, qui lascivo veneris stimulo perciti eidem promissae illicito ausu indulgent, atque sic non modo totum corpus coarctant, verum etiam cum scortis impuris cocuntur idem in se malum derivant. Exemplo sit praesens agrotus, qui ob vagam libidinem primum molesto liquoris seminalis stillicidio laboravit, & hoc domum cohibito acerba lue venereae symptomata expertus est. Deinde reprehendi meretur iniqua Chirurgi methodus, quam in sanando agro audacius jussu adhibuit. Nam quum corpus siccum & macilentum per balnea prius & decocta debuisse humectare, statim mercurialis in nictia dosi propinando, totam curationis opus pessundavit. Quod si enim hac medicamenta vel minus rite praeparata, vel in immoderati dosi exhibit fuerint, nec salutare diatae regulae observatae; miserie plerumque tonus & robur soliditatem, imprimis nervolarum partium, quas inter ventriculus & intestina primas tenent, labefactantur, ut postea multa opera multoque tempore opus sit, si omnes naturae motus à regula deflectentes in ordinem redigere, suaeque restituere integritati velimus: unde discere licet, quod perversa lue venereae curatio valde difficilem, imo propterea dubiam reddit perfectam mali sanationem. Si quando obveniunt ejusmodi aegri malis curationibus corrupti, caveat sibi Medicus prudens, ne eisdem sine habito respectu sanandos recipiat, quia saepe oleum & operam cum fama perdit. Verum enim vero, quum penitus deferere agros sepe religioni sit, id maxime agendum est, ut serio juncta strictiori diata noxios humores per sudorem elicere studeamus, subiectis in fine roborantibus. Quo nomine commendare licet sal volatile cornu cervi, & spiritum cornu cervi succinatam cum spiritu tartari, camphora & croco mixtum, qui cum decocto lignorum temperato, quod etiam ordinario potui inservire potest, exhibitus poterit sudorem pellere, praesertim si regimen in lecto diaphoreticum accesserit. Cavendum tamen summo opere est, ne excessu peccetur: quare per aliquot tantum dies sudare, postea quiescere & corpus bonis succis reficere, idque aliquoties alternatim repetere juvat. Inter haec danda est opera, ut alvus, quae plerumque clausa est, aperta servetur: quem finem tum per clysteres emollientes & oleosos, tum etiam per rhabarbarum, mannarum & senae folii, stipitibus denudata, imo in nonnullis per sola alimenta lubricantia, ut sunt prunella, poma Borisdorffensia cocta, & passulae tum riores quam majores excitatae, obtinere licet.

OBSERVATIO II.

Puerum, xxi. annorum, jam ante biennium gravis & lancinatosus artuum dolor afflicerat noctu tam vehemens, ut somnum capere vix poterit. Non multo post serosa, salsa & acris, cum dolore & ardore juncta defluxio interiorum narium substantiam occupabat, quam parentes pro coryza habentes negligebant; donec auctus doloribus humoris mox leni & viscosi, mox viscidulenti & sanguine tincti sequebatur effluxio, ad quam abigendam Chirurgum advocabant, qui ad demulcendam humorum acrimoniam non modo mucilaginem naribus attrahendam praescribebat, sed & pulveres siccantes ex bolis confectos, cum aqua solani & rosarum mixtos siphonis ope naribus infundebat. At vero, foetidissima illa narium corruptio ita invalescebat, ut materia alius serpens non tantum narium concamerationes, sed faucium quoque ossa l. hoc purido & plus minus sanguinolento, depallescere: siquidem innumeri fragmenta ossis squamulis quotidie externis ossa tubinata & cartilagine sere omnes intra annu spatium consuebantur. Adjungebatur Medicus, qui probata nendum methodo, à Chirurgo haecenus adhibita, nihil omnino, praeter medicamenta quaedam sanguinem depurantia propinabat, sed sine ullo meliori effectu; ut potius illi horum usu os palati carie exesum, stat lato foramine hineret, & dentes aliquot carioli ex superiori maxilla exciderent. Exterius quoque in facie prope hares tumor emergebat, percutie simul omni odore & tactu sensu, ut nihil prope à filo, profundius naribus immisso, perciperetur. Inter haec puer graviter conquirebatur de doloribus osteocopis, qui somnum sere omnem, ciborum appetentiam, viriumque robur abigebant; & jam eo rea devenerat, ut & Medicus & Chirurgus malum desperatum nullaque ope sanandum pronuntiarent. Quare patens perterritus ad me confugit; unde ego ineptissima hac curatione, quae refrigerantibus absolvetur, reprobata, ad purandum ulteriorem avertendam remedium summe efficax praescribebam, ex olei caryophyllorum non adulterati, balsami Peruviani aequali portione compositum, quod saepius de die cum linteo carpo narium cavitati intrudebatur. Dein quoque decoctum agrimoniae, fusiculae, millefolii &c. cum tinctura myrrhae, vel aqua sclopetaria impraegnatum spiritu attrahendum, vel siphone infundendum praecipiebam, ut inde narium interiora quoque eluerentur. Quoniam tamen cetera, quae jugebantur symptomata, simul internam postulare opem videbantur, eandem hac ratione serendum judicabam. Praemissa leniori alvi laxatione, mercurium diaphoreticum solarem cum conserva rosarum subactum ad tria grana alterius diebus mane offerri jussi, superbibendo decoctum lignorum, lenemque postea sudorem in lecto expectando. Inter cibos & ante somnum obtuli elixirum balsamicum, quod chylificationi sanguinisque depurationi egregie interservebat. Neque demum temperata decocta, in potus locum haurienda, nec balnea vespertino tempore adhibenda omisimus, idque adipiscante gratia divina obtinuimus, ut non modo sensim paulatimque sordida narium ulcera persanarentur, sed & dolorificae artuum lacerationes cum reliquis symptomatibus feliciter exspirarent, miserieque antea adfectus aeger exacho mensis spatio iterum

ferum suis fungi actionibus valeret, nihil sentiens molestia, præter quod loquelæ impedimentum remaneret, quale immediabile erat infortunium, fortique ideo animo ferendum.

Epiſtola.

Mirum forte videbitur, quæ ratione puer tam infons venerique experti in gravissimum lue venereæ adfectum incidit. Sed mirari desinent, qui secum perpendent, optimum hunc puerum cum patris famulo intimus esse versatum, qui virulenta gonorrhœa, bubonibus, aliisque malis diu laboraverat; unde concludere licet, per contagium ipsi venereum virus fuisse inspiratum. Non enim novum, sed fas compertum est, tenuissimum tale miasma ab uno in multos alios ita posse transpirari, ut singuli fiant eadem labe contaminati; uti hic loci notabile prolat exemplum, quum tota quedam familia à sola nutrice infecta mediante contagio fuit inquinata. Maxime vero omnium, tenerrima infantum corpora ad suscipiendam hanc labem sunt disposita, sine dubio, quod roror de laxior ipsorum textura expeditus, quam densior & compactior virulentiam admittit: quare, si ullos alios, certe infantes & pueros ab infectorum sodalibus arcere debemus, ne contagi participes evadant. Si curationem spectamus, me iudice temeraria ista de imprudens fuit, quam Chirurgus & Medicus susceperunt, medicatio; siquidem nihil magis, quam topica refrigerantia fevitiæ morbi potuissent augere; cum contra, si statim ab initio efficax remedium fuisset oppositum, nunquam æger in tantam incidisset perniciem. Quandoquidem ut in omnibus gravioribus malis, ita maxime in fevissimo lue venereæ affectu multum interest, ut in tempore veniendo sit potentem medelam astramus.

OBSERVATIO III.

Loquens
miser
puerum
pro
fuit
cre
buit.

Juvenis xx. & aliquot annorum, temperamento prædictum sanguineo-phlegmatico habituque corporis spongioso, variis genitalium affectibus, ut gonorrhœa maligna, penique exaceratione sat diu conflictatus aliquando ingentem corporis languorem percipiebat, quum vox rauca, & insignes capitis, tibiarum & brachiorum dolores, noxiom tempore celoque nebuloso ingravescerent excipiebant. Post adsumtum cochleariæ spiritum, cum spiritu Cornu cervi combinatum oon modo dolorum atrocitas augebatur, sed pustula quoque per faciem reliquamque cutim sparise adparebant, fusiem gradatim intus colligentes. In naribus ardor, ficietas & pruritus sentiebatur, succedente cornipi foetidique ichoris sanguine tincti excretionem: faucium anteriora & glandule, quas ob similitudinem amygdalæ dicunt, foetidis ardentibus obducuntur ulcuscunt: in ossibus prodibant tubercula, & jam plurima venereæ lue signa aderant. Duo in consilium adhibebantur Medici, qui hujus morbi primordia à scorbuto derivantes martialia, lignorum decocta, purgantia, magnæque antiscorbuticorum farraginem initio propinabant; donec accedente narum & faucium erosionem de lue venereæ presentia edocti pilulis gummosis mercurialibus contra eandem pugnabant. Sed parum his proficentibus mercurius præcipitatus bene elutus cum theriaca ostendebatur, ad pyralisum excitandum unde tam inhumanus vomitus pectorisque anxie-

tates oboriebantur, quæ nisi calidi lactis potu temperari haud poterant. Dabantur itaque ex nostro consilio decocta tam saturantia, ex speciebus alexipharmacis conficta una cum tinctura animonii acris, ad sudorem eliciendum mane capienda, quam secundaria temperata, potus loco haurienda, circa lecti vero ingressum cinnabarina in largiori dosi cum resina guajaci & sale volatili viperarum commixta ostendebantur. Symplicia dextra cruribusque & brachiis famulosum illud Vigonis emplastrum, aucta mercurii quantitate, camphora & balsamo de Peru vigoratum imponebatur, & subinde balneum adhibebatur Laconicum. Quibus remediis per duos menses continuatis, adjuvante Deo, æger sine ulla salivatione & mercurialium usu exortæ resistebarat sanatus; nisi quod membrum scirrho cancriformi oblitum adhuc aliquam postulare medelam videretur, quam externo linimento, ex aqua calcis vivæ & sambuci, spiritu vini camphorato, saccharo saturni de mercurio præcipitato albo parato ex voto præstitimus.

Epiſtola.

Docet insipiens hæc morbi historia, quod incipiens lue in insolis, ubi frequentior scorbuti progenies est, sæpe facum ossifragia vel oculatissima; præterea si hoc morbi genere tentantur viri, qui sumam sine labe obtinent, & sanctioræ vitæ instituta superbiunt, vel quorum vitam ante æstam perquirere venerandæ habendum est. Facilis tamen morbi erit cognitio, si præter ea, quæ superiori f. IV. curationis innuimus, hæc probe attendantur: in scorbutico affectu raro in capite, fronte & ossibus tubercula dura valde dolentia prodire, neque raudinem tam diuturnum adesse, neque etiam ossa rariam spongiosa, sicut in lue venerea, occupari. Et profecto, permittunt tam ad prognosin ræ formandam, quam ad curationem recte instituentiam refert, ut verum utriusque morbi indolem exacte cognoscamus. Sicut enim venerea lue infecti antiscorbutica raro impune ferunt; ita contra scorbutici à mercurialibus, in quibus genuinum lue antidotum residet, plerumque graviter læduntur. Quare non mirum esse debet, quod à cochleari spiritu in nostro aggroto mox pustula copiosiores effluerint. Præterea, id quæ maxime ex hoc casu ad usum nostrum convertere licebit, quod in mercurialibus prognandis admodum caute debeamus procedere, & ab usu eorum statim abstinere, quam primum ini venitis tormina & vomitus succedere videntur. Ita enim variæ lue indoles in diversis subiectis, ut interdum non aliis, nisi mercurialibus remediis cedere velit, interdum vero eadem plane resipiat, & solis deorsus sudoriferis interpositisque laxantibus, præterea inter initia expugnari linat.

OBSERVATIO IV.

Nobilis quidam marti & veneti strenue dedimus, xxvi. annos natus, post immanes pedum, capitis, omniumque artuum dolores, in crure utroque tuberculis obducuntur squamosis & pruriginosis. Commendabantur aque salis, quibus per duo de viginti dies epotis infusis ascaridum copia per alvum primo externabatur, & mox venereæ pustula non modo in facie, sed in manibus quoque & pedibus expellebantur: unde sepositis his aquis mercuriale remedium, ex conferva rosarum, theriaca &

Loquens
miser
puerum
pro
fuit
cre
buit.

urpetho minerali compositum offerebatur, quo ter adsumto magna oriebatur diarrhoea & vomitio cum ingenti virium pectura. Lactis quidem & dialcordii *Fraxinifolii* ulsa dejectiones illae feliciter cohibebantur, sed dolores ac pustulae fixius inharebant. Quare denovo dabatur electuarium modo dictum, eo quidem effectu, ut fati largi promoveretur salivatio cum oris fauciumque exulceratione, tetrinum siccitatem spirante. Gar-garisma aliocum efficacissimum ulteriorem ulcerum progressum vix poterat retardare, ut potius hac latius stiperetur interiora faucium depallescere, dentefque male habitos ex alcoholis suis deturbarent. Tandem ad decocta lignorum temperata, quae etiam papaveracea habebant, deveniebatur, quibus in maxima quotidie copia adsumtis, simulque laxantibus, ad diverendum salivae fluxum, interpositis aeger tandem Dei gratia exoptatae reddebatur sanitati.

Epicrisis.

Exhibet hic casus plura, tum ad penitus cognoscendam morbi indolem, tum ad curam rite instruendam necessaria, quae jam paucis expendere lubet. Inprimis autem notatu perquam dignum est, quod verminosa progenies lubentissime morbo nostro adhaeret, non aliam ob causam, quam quia ex putredine humorum corruptione, quae in venerea lue admodum graviter peccat, seminum illud verminosum facile generatur. Jam quidem ad ingratos hosce hospites ex intestinum latebris efficiens, aquis salis nihil est praesentius. At vero, sicut falsedo, seu reclusa falsa humorum acrimonia venereum virus in scorbuticis corporibus valde acuite atque exasperat; ita etiam in praesenti a groto aque salis potus minime fuit utilis, sed potius noxius: siquidem inde non modo pustulae magis rodentes sunt expulsa, sed postea quoque, mercurialis remedio superingesto, copiose per os & alvum dejectiones cum summa virium aetonia excitatae. Ea enim medicamentorum, ex hydragyro paratorum est indoles, ut salium conebant manus amice intant, sed facile corrosivam & virulentam adsumant naturam: quare omnes scorbutici, & quorum prima regio salis & acidis scaturit succis, scio cavere debent mercurialia, nisi severissima incurere velint symptomata. Quod tandem ad plenariam hujus mali sanationem attinet, rectissime hac decoctis humectantibus & papaveracis, magna in copia haustus fuit peracta; siquidem haecce remedia rodentem humorum acrimoniam demulcendo, & per congrua emanatoria expellendo, non modo symptomatum atrociam egregie mitigant, sed causam quoque sustulerunt felicissime.

OBSERVATIO V.

Pichia curata.

Vir xxx. annorum, constitutionis tenerioris & macilentae, per fat longum temporis spatium de magna virium imbecillitate corporisque ad motum subeundum impotentia, de tussi, respirandi difficultate, & acerbis artuum ipsorumque ossium cruciatibus, noctu praesertim auctioribus conquereretur, putavit ex ore ejicienda copiosam & incidam. Satis cito consultabatur Medicus, qui phthisicam pulmonum labem suspiciens praemissa venae sectione multa pectoralia, decocta ex lignis temperantibus cum anodynis mixta, laxantia quoque & alia demulcentia pro-

pinabat, sed sine ullo subsequente laetiori effectu. Accedente denum molestissima raucedine, pluribusque pustulis ulceratis in facie & capite efflorescentibus, primum venerea malignitatis indicium aderat; & facta inquisitione deprehendebatur, aegrum jam per triennium gonorrhoea, a scoto infami contracta laborasse, eamque denum cohibitam virulentae vestigia in sanguinis & humorum massa reliquisse. Quod quam animadverteretur, ad extirpandum hoc virus mercurius dulcificatus ad aliquot grana cum rosarium conservata per aliquot dies, interposito largiori decoctorum usu, offerebatur; unde quidem alvi fluxus protibatatur fat copiosus, hoc autem per convectiva remedia sedato, sua sponte pyralismus quatuor hebdomadam subsistebatur, quem secundum vires aegrotantis ita moderare studebamus, ut sensim paulatimque graviora illa cum metu phthiseos supata symptomata feliciter exspirarent, aegro plenissime restituito.

Epicrisis.

1) Ex praefata morbi historia paulo clarius elucet, reliquia gonorrhoeae, praesertim male curatae, diutius in sanguine posse hospitari, admodumque varium morbi schema exhibere, aucte quam a Medico cognoscatur. Si quando igitur in artis exercitio talis medicus morbus obvenit, cujus originem & generandi modum noscatis valet perspicere, juvat omnino ad luis venereae virus animum mentemque incedum aliter, praesertim si symptomata quaedam huius morbo communia adsint, quae suspitionem pariant. Quod ubi minus ubervaretur, metus est, ne ea adhibeamus remedia, quae cause morbi adversa missos aegrotos in majus precipitant periculum.

2) Discimus, mercurium dulcem, in minori etiam dosi oblatum, saepe effectum edere praestantissimum, idque eo magis, si serum adlit copiosum & fluxile, quod facillime in motum citetur. Quoniam vero de interna humorum constitutione ac crasi non satis adeo certe & determinate judicare Medico licet, semper minori mercurii dosi salivationis curam inchoare, & per gradus ad majorem ascendere, quam statim inter initia fortiori impetu uti, praestat. Accedit magna naturarum, ratione roboris & imbecillitatis, differentia, quae sicut omnium medicamentorum; ita etiam mercurialium diversam requirit dosim, eamque, ut tutius procedamus, initio semper minorem. Luculento possunt esse testimonio vel sola purgantia, quae in magna etiam portione exhibitae, nonnullos parum commoveant, alios contra ita enervant, ut inde gravissime, vel cum vitae periculo aegreant.

OBSERVATIO VI.

Juvenis xx. annorum, sanus & vegetus, ex impuro concubitu gonorrhoeam incidebat virulentam, quam parum assmans non modo illicita venere, sed & aliis in diata commissis erroribus ita depravabat, ut exacto quatuor mensium spatio tumoribus inguinum, quos bubones dicunt, cancriosis penis ulceribus, & variis item penem quam anum obfidentibus afficeretur condylomatibus. Adhibebantur remedia gonorrhoeae dicata, & aperto bubone aeger per decem integras hebdomadas decocto utebatur purificante, quod tum potus loco, tum mane in lecto calide sub-

Paris huius
venereae
symptomata
non tam
periculosae
reliis reme-

regi-

regimine diaphoretico, una cum tinctura antimoni acris, effluvia pimpinellæ & succipi bibere debebat. Præter hæc, quinto quovis die dabatur pilulæ mercurio dulci vigorate; & hac quidem ratione condylomata sensim marcescebant, ulcerosa canceriformia & bubo consolidabantur: sed neglecto accuratiori vitæ regimine æger per totum corporis ambitum scabie suffundebatur venerea, quæ cum molestissimis brachiorum pedumque cruciatibus, & nocturno capitis dolore stipata magnam flegebat crucem. Jungebatur simul tumor glandularum colli sit pertinax, fauces ulcusculis obfidebantur ardentibus & dolentibus, ipsique oculi lippitudine deformati rodentem & acrem fundebant lympham. Unicum iaque auxilium, præter decocta radicum & lignorum tam saturatiora, quam temperata, in salivatione videbatur positum, quam ita infligendam curavimus, ut a tribus mercurii dulcis granis cum lapidibus cancerum oblati sit scrupulum prope unum paulatim ascendendo, ptyalismus quinque hebdomadam excitare ut tam copiosus, qui per priores tres septimanas intra nycthemeron tres vel quatuor mensuras æquabat. Saliva, ut fieri solet, ejiciebatur viscida eaque foetidissima, donec magis magisque limpidior & fetoris experta proflueret, & subjunctis in fine laxantibus orisque collutionibus cum gargarismate, quod radicem tormentillæ, flores rosarum rubrarum, herbam salviæ, folia myrthi & rob diamorion, papaveris rhœodæ habebat, penitus cessaret. Hi ex voto peractis pustulæ venereæ evanescerant, & lancinantes capitis artuumque dolores expirabant, remanente oculorum lippitudine, & insigni glandularum colli tumore, quem frustra adhibitis per unum alterumve mensem externis discutientibus & emollientibus tandem scalpello incidere consulti sumus ducebamus; unde primo gryfæ, dein purulenta effluat materia. Ad vulnus infectum à fordidis repurgandum commendavimus effentiam myrthiæ & aloes cum balsamo Peruviano adplicandam, imposito exterius emplastro BARBETTE saponato & bene camphorato, cum oleo hyoscyami malaxato: qua methodo interjectis aliquot hebdomadibus æger à molestissimo hoc affectu liberatus nunc exoptata gaudet valetudine.

Epistola.

Fidem prope omnem superare videtur, qua ratione miser ægrotus tantam symptomatum, se una quasi serie excipientium catervam sine vitæ periculo perferre poterit. Sed me iudice, vera hujus rei ratio derivanda est a validiori ægrotantis natura, quæ non modo graviora recte valetudinis incommoda facilius toleravit, verum etiam medicamentorum energiam insigniter adjuvit, ut opinione celerius sanitas fuerit recuperata. Interim ex diri hujus morbi decursu & feliciori eventu addiscere licet, multa sepe in arte medica evenire salutaria, quæ desperata habueramus, admodumque felicem esse illum Medicum, cujus curæ ægroti robustiores & necessarii ad morbum superandum viribus instructi commendantur.

OBSERVATIO VII.

Juvenis erat XX. annorum, qui, ut ipse prætexebat, ex pollutionibus nocturnis, vel, ut rectius augurari licet, ex insupero amplexu fat

Frid. Hoffmanni Oper. Tom. III.

magnum accipiebat tumorem testiculæ dextri, cum rubore & dolore stipatum. Dissimulabat primo æger non levi sui damno hoc mali genus, sed accedentibus in scroti ambitu octo ulcusculis superficialibus, foetidum ichorem plorantibus, virum chirurgus penitissimum consulebat, qui, peracta corporis cum pilulis mercurialibus aliquoties sumtis purgatione, decocta ordinabat sanatoria, cum tinctura antimoni acris mane calide haurienda; exteme vero cataplasmata ex speciebus resolventibus & emollientibus parata in lacte cocta crebrius applicanda, tam felici successu, ut intra quatuordecim dies non modo testiculus magnitudine decreveret, sed & ulcuscula, scrotum obfidentia ex voto consolidarentur, relicta tantum aliqua duritie & intumescencia, quam emplastro de ranis cum quadruplo mercurii mixto sensim paulatimque abigebat. Elapsis aliquot mensibus hic molestus testiculæ tumor redibat, quem alius Chirurgus variis tam externis quam internis remediis per sex hebdomades sanare tentaverat; sed ausu plane frustraneo. Si quidem jam tumor mirum expansus in peripheria aliquot ulnas æquabat, & vasa utriusque lateris spermatica ad duos pollices inflata conspiciebantur. Ego consultum tumorem probe visitabam, qui speciem herniæ, quam sarcocele nominant, referebat; unde mox pristinum Chirurgum, arte sua non incolebrem, accersendum curabam, qui ex meo consilio interne decoctum anti-venereum bene saturatum, exterius fasciculos discutientes, probe camphoratos in forma sicca adhibebat, cum insigni ægrotantis levamine & tumoris diminutione. At vero, quam mali pertinacitatis rationibus hiic remediis penitus cedere renuebat, non abs re fore putabam lenem salivationem cum mercurio excitandam. Quo fine præmissa purgatione, per quinque dies plantæ pedum & testiculæ cum unguento mercuriali fortiter illinebantur; de en, sexto die prodibat saliva, cujus fluxus per mensem ita moderabatur, ut non tantum vasa feminalia ad naturalem crassitiem redirent, verum etiam testiculorum tumor remitteret. Ne tamen in loco hoc debilitato facile nova fieret humorum stagnatio, & ut tumoris reliquæ penitus abigerentur, fasior eram, ut emplastrum BARBETTE saponarum & bene camphoratum per tempus adhuc gestaretur. Atque hac ratione æger a vexatissimo hoc malo impofterum liber remansit.

Epistola.

Mirum profecto est, quantum testiculus si dictus venereus & medentis ægrotantis facessat negotii, si in-tales incident, quæ magna viscidiorum, & difficulter mobilium succorum copia scatent. Sicut autem varia celerioris sanationis sunt impedimenta; ita, me iudice, hæc præcipua sunt, quæ ex ipsa partis structura pendet. Tam enim angusti sunt, & in ductus mirum contortos & anfractuolos abeunt innumeri testiculorum canaliculi, ut nonnulli tenuissimam & delatissimam lymphæ partem, quæ feminis nomine insignitur, fecerere possint. Quam primam vero à succo crassiori distenduntur, amissio robore suo facile scirrholam labem contrahunt, quæ postea difficulter curatur; maxime cum ob declivorem testiculorum situm valde difficultis sit humorum regressus, qui per se nunquam sere non varii generis stagnationibus ansum præbet largissimam. Si curationem spectamus,

O o discere

discere inde licet, quod saepe pyralismus, maxime per mercuriiunctionem excitatus, insignem hos tumores discutendi habeat potentiam: imo interdum à sola scroci cum mercuriali unguento inunctione ego tales tumores feliciter scio discutulos, quos nec validissima alia remedia, nec ipse mercurius interne datus unquam potuissent resolvere. Hæc scribenti in memoriam incidit casus, ubi raucedinem veneream, cum tumore glandularum colli compicatarum sola inunctio plantarum pedum mercurialis ex voto sustulit, postquam antea innumera remedium genera irrita effecta fuerunt adhibita.

CAPUT V.

De pustulosis & pruriginosis varii generis affectibus cutis.

THESES PATHOLOGICÆ.

§. I.

Labium
rubeum.

Quam ordinis ratio postulet, ut nunc de pustulosis & pruriginosis cutaneis adfectionibus dicamus, quæ pruritu, dolore, ardore, inflammatione & exulceratione, varique generis symptomatibus molestant, à sero impuro acri, inter vasa exhalantia & nerveo-tendinosos cutis fibrillas flagrantem, & easque erodente oriuntur; hauri in limine hujus tractationis monendum esse ducimus, singula hæc cutis vitia pro diversa materie peccantis acrimonia, & pro differente subcutaneæ læsionis gradu, admodum varia fortis nomina; dum scabies humida & sicca, serina & maligna, venerea, pсора, serpigo, lepra & impetigo, elephantiasis, herpes miliaris & exedens, tinea capitis, gutta rosacea &c. denominantur, quæ jam breviter strictimque explicabimus.

§. II.

Defectus
scabiei
rubeæ.

Mitissimus harum adfectionum gradus est benigna tam humida, quam sicca scabies, quæ in artubus potissimum inter initia proveniens sensim paulatimque ad reliquas corporis partes, capite tantum excepto, transingrat. In humida quidem, quæ infantibus maxime & pueris, sanguineo-phlegmaticis & habitu corporis spongioso præditis insæta est, pustule magis humore turgent famoso purulento, atque major jungitur inflammatio, quæ ex circulo ambiente rubicundo manifesta in suppurationem abit: quo etiam ulcusculis illa capitis manantia, sive achores infansum, jure debent referri. In sicca autem, quam potissimum macilentis, senes, & qui temperamento possent melancholico-cholerico, experiuntur, minoris molis pustule, paucæ chore serioso sunt replete, quæ tenuissimas nervorum fibrillas sub caustula irritando, ardorem & pruritum inferunt fere intolerabilem.

§. III.

Impetigo
genæ.

Sicca scabies quando squamosa atque crustosa est, & post cuticulæ, vel epithelii abrasionem stigmata sub cute cruenta relinquens, accedente calore dolorificum & vix tolerandum adfert pruritum, & discitillime sanatur, vel sanata ex saul reveritur, impetigo appellatur, sive scabies serina, germ. die Raute, quæ scorbutica

maxime & cacochymia serosa laborantibus est familiaris, & si in majori est gradu, pсора leprosa vocatur: de quo affectu legi potest BARRETTE in sua chirurgia lib. I. cap. 8. & WEFERUS observ. 214. Atque in pessimo hoc morbo caput etiam sepius male adducitur, crustaque circum circa obducitur, ne facie quidem, labris, manibus exceptis. Præterea, tota cutis ulcerosa sanem profundè serosam corrosivam, cuticula abscedit continuo, ut frusta arida sine negotio detrahantur, cute subiecta obscure rubra, madorem acrem plorantem; unde sator adeli, & agri ciborum valde appetentes de intensâ siti conqueuntur.

§. IV.

Quod si hæc scabiei species gonorrhœam, bubones aliasque genitalium vitæ excipiens non modo univerſum corpus, sed potissimum etiam faciem occupat, atque nodos & tophos in variis corporis partibus comites habet, & si dolores, qui sociantur, rodentes, terebrantes, & acres quasi moriſ inducentes noctu exacerbantur, venerea dicitur & maligna.

§. V.

Herpes miliaris, dum serpendo se propagat, nonnullis serpigo audit, & cuius tantum superficiem certis in locis, ut sunt pedes, femora, manus, scrotum, perineum &c. occupans, multas exiguas in cute eminentias, seu pustulas parvas pruriginosas, mili feminis magnitudinem adæquantes sine humiditate excitat, quæ squamulis depositis evanescunt quidem, sed certis temporum periodis facile in iſdem locis recurrunt. Interdum quoque caput ipsum à tali herpete infestatur; licet testis est HELWIGIUS in observ. physico-medice obs. 38. Refertur huc debet porriginis species, senibus maxime familiaris, quæ sine pustulis & papulis pruritu fere intolerabili cutim occupat, & perpetuum scalpum cum digitotum unguibus expetit: quandoque etiam pubem frontisque scrofim obidet, interdum intestini recti exitum, præsertim quando hæmorrhoides vitio ætatis, aut errore quodam cessare incipiunt.

§. VI.

Herpes exedens, qui absolute herpes ab HIPPOCRATE, à CRISO autem lib. V. cap. 28. facer ignis nominatur, nec erysipelati ulceroso dissimilis est, totam cutim ad suppositam usque carnem ulcere exedit, & in squamas nunc crassiores, nunc tenuiores, maxime etiam circa pilos capitis partes resolvit; evanescens autem duros in membro affecto tumores relinquit.

§. VII.

Quando autem herpes mali moris pectus spectat & præcordia occupat cum cardialgia, calore præternaturali, pruritu, cutis inflammatione & dolorifica exulceratione, pustulique parvis & lucidis instar cinguli ad manus latitudinem in pectore dispersis, affectus vocatur Zona ignea, Vid. Marcus Aurel. SEVERINI lib. IV. de affectibus cap. 9. Nicol. TULPIUS lib. III. SCHULZIIUS, avu. III. Ephem. obs. 4. qui lethalem vidit, & Jo. LANGIUS, qui ex ulcere cruris intempessive consolidato lubortum annotavit.

§. VIII.

§. VIII.

Scabies crustulosa & squamulosa, quae pedes maxime ad genus usque invadit, elephaniasis nomine à quibusdam insignitur, dum pedes instar faccorum tumidi sunt, super quos crustae sat laevae eminent, quae abradit stigmata relinquunt rubiginosa, pruritu & ingenti vellicatione molesta, ipsiusque humorem fundentis, qui mox in novae squamae & crustae condensatur. Vera autem lepra Arabum, sive elephaniasis Graecorum morbus longe magis abominabilis est, cuius descriptionem optime tradidit ARYTAUS lib. IV. cap. 13. & CELSUS lib. III. cap. 25. in hunc modum: *ignotus autem pene in Italia, frequentissimus in quibusdam regionibus is morbus est, quem barbari Graeci vocant; isque longis annis numeratur. Quo totum corpus afficitur ita, ut ossa quoque vitari dicantur. Summa pars corporis crebras maculas crebrosque tumores habet. Ruber eorum paulatim in alium colorem convertitur. Summa cutis inaequaliter crassa, tenuis, dura, mollisque, quasi squamis quibusdam exasperatur, corpus emacrescit; os, sicut, pedes intumescunt. Ubi vetus morbus est, digitis in manibus pedibusque sub tumore conduntur; febricula oritur, quae facile tot malis obrutum hominem consumit.*

§. IX.

A scabie & lepra plane differt adfectus iste ulcerosus, dum videlicet ulcera fœdida multulas potissimum partes, ut dorsum, brachia, scapulae, furas, lumbos occupantia, putridam plorant sentem, & mox in altero membro recrudescunt, mox in altero adolefunt, multos saepe annos durando. Atque tale morbi genus plebeis, mendicis, & infimae sortis hominibus, qui impuro vitae genere utuntur, imprimis solet esse familiare, & vulgo dicitur *Wundseiden*; quo morbo etiam Lazarum laborasse multi ex Medicis criticis adieciunt. Sapiens etiam compingatur vermes, qui ulceribus insigni multitudine inacidulantur, ut nullis fere remediis deleri queant.

§. X.

Omnes hi subcutanei pustulosi adfectus contagio maxime serpunt & inficiunt; ideoque facile per concubitus, per lectos, per indusia, fœdo pingui sudore imbuta, maxime vero omnium per pelles animalium & vestimenta ex lana contexta, (*volle Tücher und Strimpfe*) propagantur. Lana enim aptissimum est medium, quod ob raritatem laxam atque porosam impuras istas exhalantes particulas potest absorbere & diutius retinere, ne mox in auras dispergantur. Sicut enim odores, à quocunque etiam fragrantie emissi, linteaminis, chirothecis & vestibus diu inhaerent; ita quoque in morbis contagiosis, ut peste, variolis, morbillis, petechiis &c. effluvia putrida, quae fermenti vicem obonant, rebus istis porosis, praesertim ex lana confectis, altius sese insinuando, per longum temporis intervallum saepe delitescunt, prius quam infectionis potentiam exerant.

§. XI.

Sedem morborum haecenus enumeratorum in tubulosa & ex variis fibris contexta cutis compage, quae universale corporis emunctorium est, constituendam esse, vel ipsi sensus sanis evincunt. Verum enim vero, ut specialius nostram men-

tem determinemus, nos in hac firmiori sumus sententia, membranam cutis pinguedinolam praecipuam esse sedem ac locum, ubi humores materiae impurae & corruptae primario residunt, quae, dum per cutis poros & tubulos exhalantes libere transpirare nequit, diutius ibi subsistit, & per longiorem hanc moram acrior redditae nervosae cutis fibrillas rodendo, pungendo & inflans mendo, varias pustulas & papulas ingenerat. Nulla enim in universo corpore, sive solida sive fluida pars est, quae fœdum vappidumque humorem, salva sua crassi, diutius possit retinere, & occultare, ante quam motu fermentativo per visiolam quandam aeris constitutionem ex tritica illis & latebris exsolvatur & protrudatur, quam ipsa pinguedo, in qua, ut ego quidem arbitor variorum & morbillorum, purpurae & luis venerat, aliorumque similium adfectuum semina per longum tempus abscondita latent. Accedit, quod teste observationum fide, corpora pinguedine multum repleta non modo diutius & gravius cum hisce cutis morbis conflictentur, verum etiam iisdem sanatis facilius in pristinum labem recurrant, aperto indicio, in ipsa pinguedine mali fontem delitescere.

§. XII.

Quod si subiecta harum cutis adfectionum consideramus, infantes maxime & pueri, ut variola, morbilli, achoribus capitis & omnis generis cutis defœdationibus; ita etiam imprimis scabiosis & pustulosis adfectibus sunt obnoxii, non tantum propter mollem & spongiosam soliditatem partium subilantiam, & imbeciliores transpirationem, sed potissimum hanc ob rationem, quia ob desiderium mulierum gravidarum vitam & digestionis imbecillitatem, succi, quibus adhuc in utero nutriuntur infantes, minus sunt temperati, sed impuri: unde non mirum est, tenera etiam infantum corpora sordibus conspurcari, & superfluis visiolis redundare humoribus; qui quomodo longo post tempore ex adversa aeris constitutione, vel virtute semini contagiosi, aliisque ex causis in motum fermentativum adiguntur, innumera mala cient, atque imprimis externae corporis partes variis exanthematibus deturpant.

§. XIII.

Hæc scribenti in memoriam venit communis illa traditio, achoros, tineasque capitis & scabiem infantes & pueros à morbillis & variolis praeservare, vel minimum, ut mitiori succedant gradu, efficere. Verum enim vero, si desideraretur, ego multa contraria possem allegare exempla puerorum, tam scabie, quam aliis ulcerosis cum vitis laborantium, qui à molestissimis hisce morbis non ita pridem liberati in variolis confluentes & morbillis mali moris inciderunt: ex quo non adeo obscure licet concludere, quemvis ex pustularibus his morbis peculiarem & quasi specificam visiolae & corruptivae materiae habere indolem, quae sub peculiari pinguedinis involucro delitescit.

§. XIV.

Jam reddenda erit ratio, qui fiat, ut cutis vitia in variis subiectis adeo multum inter se varient. Sed id magna ex parte, quantum ego quidem assequi possum, à diversis aetatis periodo derivandum est. Etenim, quoniam textura cutis ratione aetatis valde immutatur, dum alia in puerili

O o 2 &c

elephantiasis

morbi Lazari

Cutis adfectus contagiosus

Cutis adfectus contagiosus

subiecta

à variolis & morbillis non sunt liberati

Differentia cutis effectuum praedictorum aetate

& juvenili, alia in virili & femili esse solet: inde enim efficiunt, ut pufillius illi, qui cuem diverfimodo affligunt, morbi aliam aequè aliam naturam & genium induunt, variiſque modis ſe exſtant. Ex phyſiologiis enim pro certo aſſendum eſt, in pueris & juveni corpore plures in cute canaliculos eſſe minimos, copioſiora autem in ejaſ ſuperficie poros & foramina hianſia, quam in adultis & ætate creſcente, ubi tubuli magis anguſtati, coaleſcunt & ſolidiſcunt. Ita in ſenibus interſtitia membranarum celluloſa ut in toto corpore, ita præcipue inter cutem & ſubſpectas partes humore pingui minus replentur, ſed rugæ ſeniles formantur: unde ob pinguedinis defectum vaſcula exhalantia & pori cutis contorquentur, curvantur, comprimuntur. Quibus ſuppoſitis, jam facile reddi poterit ratio, cur in ſenili ætate ſcabies ſicca, ſeryiginis cum intolerabili pruritu herpes miliaris &c. præcipue ſint familiares; contra vero in infantibus & pueris ſanguineo-pituitosus & obſeſ, ob feri & pinguedinis copiam, magis talia affectiones, quæ multum ſarſit fundunt, proveniant. Accedit & hoc, quod in juvenili ætate & corporibus junioribus, languini maxime temperamenti, ſanguis cum pinguis, chyloſus & nutritivus partibus intime mixtus ſi, atque hac ratione materiam & alimentum non modo ſanis corporibus, ſed etiam eroſis & corruptis largius præbeat, quam in ſenibus ſcorbuncis & cacochymicis, quorum ſanguis multis particulis ſalino-ſulphureis & viciſſis lenſcentibus ſolet eſſe repletus.

§ XV.

Curiosamente, a análise estatística não revelou diferenças significativas entre os grupos.

Deinde ut sciamus, quam ob rem in certis loca certa prodant exanthemata, & in aliis superiora, in aliis truncum magis & inferiora petant; silendo non praetermittendum esse artior, ut plures alios morbos, sic quoque prava cute passionis solentem fieri modo, & quales microcosmica lege secundum aetatis differentiam partes invadere. Haec observamus, in infantiis & puerili aetate favos, achores, tinea capitis, ophthalmias purulentas, epiphoras & serpagines squamosas in frons & mento producentes, admodum esse frequentes; in juvenili & virili aetate periodo scabiem, herpesem, siliagoque vitis ingrimis namus, brachion dorsum occupare; & decrecente dentium aetate virgine, seu ingruente senio pruritus in ano, in scrotis & perineo sentiri, atque ipsam lepraem & elephantiasin cum erysipelate pedes ulcibus reddere. Nolumus in praesentiarum notatu dignis hujus phaenomeni rationes suas persequi, sed B. L. ad differentiam notam: de aetatis mutatione, morborum causa & remedio dimittimus, ubi haec ad rem pertinentia fuit dilucide explicavimus.

6. XVI.

107

Tum quoque non sine fructu disquirendum est, unde veniat, ut in diversis subiectis ipse vitiosus humor, qui perignioribus & pusillioribus tum morbos iussit, tum acrimonia, tum glutinofitate & reliqua sua consuetudine mirum in modum differat. Ar vero, me iudice, huius rei ratio similiter à diversis cutis, ejusque toni constitutione dependet. Hinc, ubi spongiosius, mollius & rarius cutis habuit, ut in lingua ejus, major ichoris, tanquam de matrice purulente quantitas in vesiculis collecta conspicitur, quæ exsiccata in squamas & crustas abit. Sequendum dupli-

cis naturæ humor in cutē continetur & fecerunt; alter mucosus, qui in spongiosis cellulis corporis reticulari, cuticulari immediate suppositis intercluditur; alter fatuosus, qui ex cutaneis valculis lacrimisque sensim emittitur. Quando igitur nervosæ fibrillæ, quibus cuticula cuti jungitur, ab humore acri lacerantur & eroduntur, laxata epidermis in vesiculas minores ferò salso repleta inflatur, quæ postea in ulcuscula deficiunt. Aliæ vero rei evenire solet in cholericis, compactiori corporis habitu traditis, & senibus, qui scabie magis fæci, alitque pustulis & papulis, vel nulla, vel exigua humiditate plenis adhiæcent; & hi quidem propter largam humoris lentiscentis progeniem & tubulorum cunctis angustissim, à depresso naturæ robore indeclatam, quod non modo omnium functionum gignit, sed & præcipue pulvis tarditate ac debilitate, quæ tardioorem sanguinis & humorum circumum demonstrat, abunde foris se exierit.

§. XVII.

His itaque expositis, quæ ad generaliorem cutis morborum tractationem pertinere videntur; proximum nunc est, ut specialius de veris causis agamus. Vera autem, proxima & immediata horum morborum causa nulla alia est, quam ferum impurum, viciidum & acre, quod in tenuissimis cutis tubulis stagnando, nervosæ fibrillæ lacerando, & levem ibi inflammationem producendo, varias rosiones, pustulas & excoriations, efficiere, adeoque singulos istos cutaneos morbos cum omnibus hæcenus enumeratis symptomatibus, excitare valet. Quam violentæ autem & virulentæ indolis sit corrupta illa sub cute stagnans materia, vel ex eo facti perspicue apparet, quod omnes sere gravissimi & lethales tam chronici, quam acuti morbi, &que potissimum in systemate nervosorum partium radicati materia ejusmodi virulenta ad habitum corporis propulsa possint folvi, & eodem contra ad interiora revulla, excitari.

¶ XVIII.

Docet hanc veritatem ipsa experientia. Sic enim innuere possunt observationes subtorum fide dignissimum, quæ afflitta spasmoticum, arthriticum, podagrum, & alia plura mala per solam scabiem soluta, eademque ex scabie sup-
pedita oborta commemorantur. Ita febrem contin-
nuam, ceterasque & epilepsiam tali ratione pro-
ducit, testatur SENNETUS in *paralipse. pag.*
176. & SERBIUS annotavit feminam scabie la-
borantem, quæ cingulo adhibito tam enormem
lingue tumorem experta est, ut hæc extra bu-
ces propensa cum metu gaugente vix ad pulvis
redigi quantitate posset. HAGENDIUS
crit. I. hylor. 9. & M. N. C. dec. 1. ann. II.
sf. 21. suffocationem a scabie renouilla ortam
docuerunt, & *cent. II.* mentionem iniungit sca-
biæ scorbuticæ, mercuriali unguento tractatæ,
quæ in arthriticum definit, & alio tempore guttæ
quoque ferene causa exiit. AMATUS LU-
SITANUS *curat. med. cent. II. curat. 33.* me-
mor est juvenis, qui, quam scabie, univer-
sum corpus occupare foredaret, ex unguento
qui arsenicum mixtum erat, se illicui, & in auro-
ra lecto decubans mortuus a don efflatus in-
ventus est. Alterum novit, qui ob furilem inunctionem
in infaniam devenit, & in alio tubercula qua-
dam dicit exorta curatu difficilissima. Neque omis-
tenda sunt, quæ HOECHSTETTERUS *Dec. VIII.*
observat.

observat. habet: *Servat*, inquit, *juvenis scabiosa nititur unguento aliquo mercuriato, non purgato prius corpore, quo malitiae intra in corpus rejectae pedes ambos a coeundae resolvit, ut immobiles insular paralyticorum deprehenderentur. Solvitur alvus, dantur humores praevarianis, sed nil his adjuvis cavellitur & sterilitatem efficit spirituum. Et idem auctor Dec. VIII. casu 2. à temeraria pustulorum affectionum curatione febres noctias & malignas proditiile refert.*

§. XIX.

Neque minus ego in sensibilibioribus subjectis à perverso exsiccantium topiçorum usu in curandis morbis dyspnoiam, plethisin, appetitus prostrationem, & lumnas praecordiorum anxietates observavi, imò quoque hydropem anasarcam, & scroci tumores inde suboritur novi. Praeter hæc vero, nostram de materiae peccantis qualitate viciâda & acri sententiam melius adhuc confirmat sola venarum in ejusmodi morbis suscepta scissio, qua sanguis tam viciâda & in coagulum quasi densatus deprehenditur, ut vix possit separari. Idem luculentissime docet notatu digna observatio de effectu retropulsi scabiei notio, quam celeberrimus hujus notitiae Academiæ Professor SCHWARTZ Vol. I. A. N. C. infestit. Homo videlicet vitam sedentariam à multis annis egerat, scabie humida graviter & diu vexatus, qua externi remedij vii simul ac femel liberatus mentis mox vacillationem experiebatur: postea sentit, quum nullo studio scabies recitari poterit, motus hemiplegicos, convulsivos & sopores. Secto cadavere peritoneum valde crassum cum omento agglutinatum scedis atro-ceruleis & livida stris totum repletum offendit, tæterremum odorem de se spargens. Intestina flatibus distenta & crebris coeruleis exanthematibus repleta deprehendit, & ventriculorum, hepatis, lienem, intestinum colon & duodenum adeo coalita in massam unam, ut nullam eorum partem sine cultro aut dilaceratione distrahare poterit. Lien magna crassitie & duritie erat, foliiculus scilicet crassus & viciâdo humore repletus, insular solutionis guttae gunni immixtionis.

§. XX.

Nihil itaque dubiū est, quin in cutaneis pathematibus ingens ferè glutinosi & tenacis impuri & corrupti abundet copia. At vero, si causas mediatas & remotas, ad ejus generationem contribuentes paullo curatius velimus indagare, primo statim se nobis offert robur solidorum debilitatum & ad facis vegetam contractionem non sufficiens: quo unimuto, sanguinis circulatio, & ab ea pendens se- & excretio superfluorum humorum decrevit, partes fluidæ cum solidis non satis invicem miscentur & attenuantur, sed successu temporis multum à pristina blanda temperie secedunt. Accedit, quod sub tali imminuto sanguinis motu structura organorum & viscerum, tam sanguificationi quam bonorum succorum secretionis destinatorum, ut sunt hepar & lien, mirum in modum depravatur: unde vasæ & vias angustioribus redditis, particulae acres, salæ, sulphureæ & viciâdæ minus rite segregant ipsam sanguinis mixtionem ingrediuntur, eamque impura diathesi, quae largam nostris morbum materiam suppediat, inficiunt, contaminant, corrumpunt. Atque ideo etiam fieri deprehendimus ut hypochondriaci, scorbutici & cachectici.

Erid. Hoffmanni Oper. Tom. III.

ci, qui simili sanguinis & viscerum labe laborant, in varia externa curis vitia incurant. Quae singula quum non tam facile possint emendari & ad pristinam conditionem revocari, simul in apriço est ratio, quare non modo impediuntur si labor, ejusmodi adfectus, si tempora longinquitate alias radices egerint, penitus tollere, verum etiam cur ferè curati ex facili recrudescendo pristinam adornant tragediam.

§. XXI.

Ad tam gravem vero & fonticam partium solidarum, ipsorumque viscerum in nonnullis depravationem variz concurrunt causæ: ex quibus agmen ducunt suppreffe sanguinis in nobiliori lexi per hamorrhoides, in lequiori per mentes, in juvenili ætate per nases excretiones, nec non omniæ in plethoricis subjectis consuetæ venæ sectiones. Etenim, quum sub tali rerum statu, praeteritum si lautum vivendi genus accesserit, increfcens sanguinis & humorum copia tardiores circulationem, & impediam locorum vitalium depurationem efficiat, non potest non inde sanguis sensim paulatimque impuritibus variis repleri. Id quod eo magis lolet accidere, ubi saluberrimum transpirationis negotium ab aere frigido, humido & vappido, noxiisque vaporibus repleto retardatur: quare etiam homines demissis & vapidis domesticis inhabitantes, paludibus & locis aquarum inundationi obnoxii accolentes, item carceribus inclusi, & populi ad frigidum-humidam septentrionis ætem spectantes, præ omnibus aliis tam crebro scabie & reliquis cutis deturpationibus tentantur. Nec aliud quidquam, quam humida & inequalis aeris constitutio, quæ vere & surturno regnat, in culpa est, quod his anni conversionibus hi cutis adfectus praeterim prodeant, vel recrudescant; & quod certis temporibus majorem prurinum ardoremque excitent: sicut M. N. C. Dec. III. ann. IX. obs. 205. tale quid crescente luna factum esse commemorant. Atmosphæra enim, seu ambiens nos aer cutis tonum, & inde pendentem transpirationis succellum vel confringendo, vel relaxando misfice moderatur, & sicut bonus, purus & elasticus aer humum boni sanguinis crasin conservat; ita impurus & vappidus contrariam plane effectum exierit. Qua de re optime olim cecinit elegantissimus poeta LUCRETIVS lib. VI. vers. 1112.

Est elephas morbus, qui propter flumina Nilii
Gignitur Aegypto in media neque præterea
usquam.

§. XXII.

Nihil quoque solennius est, quam quod substantiæ aeris mutationes, & susceptæ ex puriori leviorique aere ad densiorem transmigrationes varia cutis male adfectæ pathemata inducant; licet non negandum sit, quid etiam ciborum, aquarum & cerevialium mutatio, quæ aliam sanguinis schefin inducendo, novas particulas, easque forte colatoriorum diametris minus respondentes, ingenerat, suum conferat symbolum. Hinc ego plures scio, qui ex Gallia & regionibus trans Rhenum sitis, aliisque locis viciâdis, tubiliori aere donatis, ad nostras oras, ubi duriorum & rigidiorum atmosphæram habuerunt, profecti, exacbis aliquot mensibus scabie sunt correpti. Rectissime igitur LUCRETIVS loc. cit.

O. 3

mal-

Ex acribus
probatum.

Causa re-
motæ scabiei
per gressus
excretionis
suppreffe.

— aer hu-
midus &
vappidus.

Causa me-
diata.

— schi-
fina aëris
& data
mutatio.

multorum morborum originem ab aëris mutatione derivat, his verbis:

-- Inde alius alius locus est inimicus
Paribus ac membris: variis concinnat id aere
Proinde ubi se calum quod nobis forte alienū est,
Commovet, atque aer inimicus serpere cupit;
Ut nebula ac nubes paulatim repit & omne
Qua graditur, conturbat, & immutare coactat.

§. XXIII.

Præter hæc, inter causas remotiores numerari debet mala alimentorum digestio, quæ fit, dum vel boni cibi in nimia quantitate devorantur, vel incongrui, ut scire sunt carnes salis, infumata, suillæ & porcinæ, nimis pingues, dulcia, fructus horæi, ut pisca, fabæ &c. adsumuntur: quo etiam varia potus genera, imprimis vina acida, cerevisiæ nuxteræ, & ipsæ aquæ impuræ pertinent. Tali enim ratione non possunt non multæ cruditates viscidæ, salis & acres in primis viis accumulari, quæ in sanguinem delectant non satis intime miscentur & digeruntur, nec per colatoria, imprimis per cutis cribrum satis depurantur: unde sanguis, ob difficiliorem circuitum, cacochymicus redditur. Idque eo magis evenit, si præter animi pathemata, ut tristitiam & anxiam sollicitudinem, quæ magnam in remorando & incrassando sanguine potentiam obtinent, etiam vita deses & sedentaria coniungitur: quare etiam textores & fartures scæda scabie manum, imo crurum & tibiarum crustosa cum facie pallida & corpore subitumido, ob vitæ genus agreste & motus omissionem, frequenter labrant.

§. XXIV.

Prognosis. Prognosis, quam nunc paucis expendere volumus, secundum adfectum varietatem ipsa variat. Ex primo quidem sciendum est, semper facilius esse sanationis scabiem per contagium communicatam, quæ superficialiter tantum inherens non adeo profunde cutim occupat, quam illam, quæ ex indigena sanguinis & humorum dyscrasia originem fuisse. Melior quoque & levior esse solet humida scabies, easque præsertim non adeo diffusâ, quam sicca pruriginosa: siquidem hæc dies noctesque intolerabili fere pruritu egrotantes fatigat, & somnum intermittendo vires debilitat. Patientia itaque injungenda est, quoniam tanta impuritas lacis serosi, acris & lixiviosi non tam subito temperari, dilui, corrigi & blande adiaci potest. Deinde, omnes externi habitus adfectiones adhuc recentes faciliorem recipiunt sanationem, quam quidem inveterata, temporisque diuturnitate & ægrotorum incuria confirmata: eademque iterum facilius negotio in junioribus, ob liberam transpirationem, quam in ætate provecioribus sanantur; utpote qui, Cæsar effuso, longis morbis quam maxime patent. Quæ ex interna viscera labe oriuntur cutis vitia, non modo difficilia, & nonnulli subdita visceris corruptela solvantur, sed facili quoque renovantur & repullulant; imo nonnunquam in heclicam & hydropem degenerant. Unde facile iudicare licet, quale serendum sit præfagium, si tales morbi post febres intermittentes, variolas, morbillos & luem veneream invadant. Tum quoque omnes subcutaneis adfectus sunt periculosiores, si in partibus muscularis & pinguedinosi dorsi, brachii &c. parvi noduli ad modum glandularum

externis invisibiles interius palpabiles, instar cicercum, fibarum & pisorum observantur, luctuoso indicio: quod non tam glandulæ curis indurata, sed quod humor viscidus in membranis & cellulis pinguedinosus flagrans causam præbeat. Speciatim vero de elephantiasi, quæ scire maximus externorum morborum gradus est, ARÆTUS lib. VIII. cap. 13. sequentem fert prognosin: *Omnia conferre simul oportet, medicamentum, & viscus rationem, & ferramentum, & quænam. Hæcque si novo & orienti affectui adhibueris, sanationis spes asulget. Sin ad summum sua creaturam adferat, in visceribusque stabilis sedes, nescipit & in faciem invadat, tunc de agri salute spes omnino absque est.* Quandoque herpetem miliarem, caput instantem cum odontalgia, cephalalgia & catarrhis defluxionibus morbilli vel variole sequuntur, res non sine periculo est; & interdum post morbum spatum in verice morbosum, denigratum & sphaclatum invenum fuisse novimus. Lepra omni tempore valde contagiosa fuit habita; ideoque leprosus ab hominum consorcio segregandus, & ex urbibus ad externa loca relegandus consuevit medici. Ego autem aliquoties, & nuper modo literarum vidi, qui venis leprosis symptomatibus adfectus per annum & ultra cum suis domesticis sine horum noxa versatus est. Alii vero res sic habet in Græcia, ubi hoc morbi genus longe magis est contagiosum: & per placet mihi ideo ACTIUS, qui lib. XIII. cap. 25. ita scribit: *non absurdum fuit, pueros gignendos gratis per rara intervalla coire; neque in totum contagiosa successerit huius adfectionis in omnibus fuit.*

THESES THERAPEUTICÆ.

§. I.

Quod ad rectam & securam modendi methodum attinet, sciendum omnino est, antiquissimos artis nostræ antilines in pluribus cutis adfectionibus tam rite dignoscendis, quam persanandis fuisse præstantissimos; idque eo magis, quum duo præcipua mala, lepra & elephantiasis, quæ maximum quasi gradum morborum cutim instantium constituunt, in ipsorum regionibus frequentius obvenerint, commodamque præbuerint occasionem, non tantum speciales horum malorum characteres penitus cognoscendi, sed & veras remediatorum vires melius explorandi, ut nobis jam facile sit, inde ad minores gradus, levioresque cutis morborum species concludere. Ex omnibus autem quam maxime mihi placet, & imprimis nostro inservire scopo videtur accuratissimus ille observator, ARÆTUS, qui in aureis suis de re medica monumentis multa notatu dignissima habet. Quid enim elegantius potest excogitari, quam illa lib. II. cap. 13. inserta elephantiasis descriptio, ubi tam graphice & ad vivum quasi horrendæ huius pelis indolem atque decursum depingit, ut clarissime eluceat, totam sanguinis & humorum massam profusè esse viscidam, tenacem & siccæ coagulata, omnemque spiritus ascensum succorum vitalium penitus depresso, ut inde cohibitis salutaribus le- & excretionibus totus homo tenacibus, acerbis & corruptis humoribus scaturat.

§. II.

*Elephantia-
na curatio
probandum
demonstrat.*

Atque his causis abigendis hanc egregiam proponit medendi methodum: præmissis sanguinis missionibus, lac cum quinta aquæ parte mixtum, ad alvum molliendam, potui dandum, & veratrum, sub quo helleborum album intelligit, alterius diebus vere & autumnis offerendam suadet. Dein, cæu sapientia magno in pretio habet dentis asurgam rasiuram cum vino dandam, carnemque viperarum vel in pastillis redactam, vel cum squilla & jussulo coctam; imo omnia medicamenta ex viperis parata summopere laudat. Inter externa ea commendat, quæ detergant & tumores resolvant, & sapone sordes in balneo abluerentur, vel etiam balneum, cui lapatham acutum & sulphur incoctum fuerit, quo summum detergens præstabit. Ad tumores axungiam leonis & urti, aquis portionibus cum sale alcalino mixtam; ad acres vero fluxiones mitigandas & exulcerationes leniendas decoctum feniæ græci & hordei, oleumque rosarum, tum abstergendi, tum madefaciendi sine proponit: & si carnes liveant, prius, quo locus succulentus reddatur, scarificandum jubet. Inter cibos, quos simplices, boni succi & concocti faciles esse decet, decoctum brassicæ cum cumini liquamine, in cornu staphylinum, sive daucum Germanicum, ex marinis offiis, ex piscibus fixatiles, ex avibus perdicæ & columbas, ex fructibus horæos & vitæ dulcia &c. summopere commendat. Neque minus rationem habendam statuit in somno, vigiliis & locis ad dormitium deligendis, æque ac in corporis exercitiis, quæ per cursum, per vocem & varias corporis conversiones insinuat, & citra lassitudinem congruenter intendere jubet. Nec denique reticendum est, ARETÆUM albi hellebori vires in hoc morbo non satis posse dilaudare: siquidem illum omnium purgantium efficacissimum dicit potentia & qualitate non vitio, qui per exiguum portionem & modicam dosim ventriculorum morborum omnium, radicibus firmis inherens, unicum esset remedium, & ex difficili respirazione facilem, ex pallido vultu floridum efficeret.

§. III.

*— & Cel-
sum*

Curacionem non dissimilem, profliganda elephantiasis opportunam proponit Celsus lib. III. cap. 25. Protinus inter initia sanguis per biduum mitti debet; aut nigro veratro venter solvi. Adhibenda triduum, quanta sustineri potest, inedia est; paulum deinde vires rescindenda & ducenda abens; post hæc, ubi corpus levatum est, utendum est exercitatione, præcipueque cursu; sudor primum labore ipsius corporis, deinde etiam siccis sudationibus evocandus; scissis addibenda; moderandumque inter hæc, ut vires conserventur; balneorum rarum esse debet: cibis sine pinguibus, sine glutinosis, sine insaturis. Vinum, præterquam primis diebus, recte datur. Corpus contra plangit & illa inerti optime videtur.

§. IV.

*Indicationes
et medicamen-
ta.*

Ex hisce omnibus probe expensis trocinatisque optime judicare licet, neam medendi methodum omnique remedium facillitatem eo debere collinere & quasi conspirare, ut corruptum, glutinosum, & actum humorum massam per sufficientem sanguinis missionem & inediam, per purgationes tam leniores, ut lac est, quam

per fortiores, ut helleborum, è corpore detrahat; deinde, ut congruis alimentis delectaque victus ratione boni & naturæ amici succi ingereretur, & denique, ut externis quoque remediis detectis, consolidantibus & radicanantibus partes à doloribus, tumoribus, pruritu & ulceribus liberentur. Atque profecto eximia laude dignæ sunt hæc curandi intentiones, pariter ac propolite istæ medelæ: quare non abs re fore confido, si Veterum insipientes vestigia non modo elephantiam curare, sed ex hujus quoque curatione minores cutaneos morbos, ut scabiem, herpetem, guttam rosaceam &c. sanare discamus. Quoniam tamen singuli hi adfectus exanthematici, ulcerosi & pruriginosi ratione locorum, corporum & temperamentorum, nec non ratione habitus corporis & vitæ generis multum inter se differunt, æque eradio hoc seculo aris nostræ salutis efficacioribus instructa est remedia; optine nobis consilium sumas, quando Veterum curandi methodum certis limitationibus & nonnullis in nostro climate annotatis cautelis includimus atque perficimus.

§. V.

Et primo quidem, quod attinet ad prævos humores per varias sanguinis detractiones minuendos, tenendum est, copiam sanguinis venæ sectione evacuari pro differentia ejus redundantia secundum ætates, vires & consuetudines, æstimandum esse. Neque senilis, qui aut ventilationibus sanguinis artificialibus, aut naturalibus adjuverunt, ejusmodi diminutiones penitus sunt dissuadendæ: siquidem cognita nobis sunt exempla senum tam virorum quam mulierum, jam supra octogesium annum natorem, quibus insigni cum fructu in variis cutis morbis vena fuit incisa, vel naturales sanguinis excretiones per fluxum hæmorrhoidalem cum levamine revocata. Quod si vero subjecta sunt pingua corporis, ubi spongiosiori prædita, ubi plerumque ingens venarum copia & exitus deprehenditur, præstent ego tanquam esse observavi, sanguinis & humorum massam per scarificationes, convenienti tempore institutas diminueri, præsertim quando vires, ob morbi diuturnitatem ubique inappetentiam depressæ, parciores desiderant depletionem. Neque hoc remedium genus semper sufficit, ubi hypochondriaci & hæmorrhoidalibus adfectis molestis ejusmodi morbos incurant. Sed tum temporis debitam sanguinis vacationem per sanguifugas ano applicandas tentare & moliri præstat.

*Vitæ
Senis
in cura
essetibus.*

*— scarifica-
tiones*

*— sangui-
fugarum*

§. VI.

Interdum evenit, ut corpora nonnulla, in quibus plethora magis serosa peccat, quam sanguinea, copiosam sanguinis missionem agerint searant. Quare tum aliud inire decet consilium, & si nimia alimentorum voracitas, ut sapissimæ sit, primam mali causam & originem dedidit, curam per abstinentiam commendare, optimisque regulis adornare. In eo autem quam maxime utilissimæ hujus curæ consilii methodus, ut ægri ab omnibus carnibus pinguibus, elixis & glutinosis, ut sunt porcinæ & bovinæ, a lacticiis, omnibusque insaturis & multum alimonie præbentibus abstinendo, carnibus magis assatis & levioribus, ut sunt avium, perdicæ, gallorum, columbarum &c. paræque bis cocto utantur, interpositis nonnunquam, ad alvi lubricitatem conservandam, avis majoribus passis,

*Cura per
inediam.*

passis, prunis Damascenis coctis, pomis Borsdormianis, & hujus generis aliis lubricantibus. Quoniam tamen nocere solet quavis subitanea victus mutatio, ita insitruenda erit hæc inædie medela, ut ne simul ac semel, sed paulatim potius, & quasi per gradus ægri à pleniori victu ad tenuem & parciozem descendentes huic sensim sine damno adjuvant, eaque pro circumstantiarum ratione per aliquot dies, vel septimanas continuent. Quod nonnumquam haud minus necesse est cura finita, ne subito ad plenum victum denuo ascendamus.

§. VII.

— requirit
diesis

Præter hæc, sub toto hujus curæ decursu cœvisiarum potus, aliis familiaris, debet removere, subtilis in potus locum sit larga & sufficiens quantitate decoctis, quæ species humorum depurationis & edulcorationis infervientes, succique superfluis exsiccandis & solidis partibus roborandis accommodatæ ingrediuntur, ut sunt temperatior quædam expertæ virtutis & familiarissimi usus radices, chinæ, salsaparillæ, leptahti acuti, scorzonæræ, cichorei, glycyrrhizæ, polypodii, cortices ligni falsasas, calcarillæ, cinnamomi, viscus quercinus, rasura ligni falsasas, fantali rubri, & plura hujus generis alia, quæ pro varia inventionis inter se mixta in aqua pura in decoqui possunt, ut ad specierum unciam unam libras duæ, sive mensura aque recipiatur.

§. VIII.

— de le-
moria.

Sed non parum quoque expedit, ad hanc curam feliciter auspicandam, & perficiendam, ut prius prima regio à vitioliorum humorum colluvie per leniter purgantia liberetur: id quod similiter aliquoties tam durante, quam finita hæc curatione repetendum est. Quo huc optime potiri licet per æmudia blande evacuantia, quorum censum merito subeunt insula cum aqua & vino facta, quæ ex marina, thabarbato, foliis fenicis, cremore tartari, sale cathartico amaro, cassia, herbis fumaricæ, ephedri, radice cichorei, polypodii &c. optime possunt parari.

§. IX.

Refra-
ctus morbi
fuit pa-
stis par-
gentia.

Quod si vero invalens & refractarius morbi status malignitatis suspicionem incipiat, vel in quibusdam emaciantem curam respicere videatur, opere omnino pretium est, tam ex purgantibus, quam ex diaphoreticorum sanguinemque depurantium classe validiora & efficaciora in usum ducere remedia, ut tenaces vitiosque humores, quibus ipsi viscerum meatus infarciunt, & continuum morbo pabulum suppeditatur, eo melius ac citius tam per alvum, quam per omnia corporis emunctoria ejiciantur. Jam quidem antiquissimi medicæ parentes, Hippocrates, ARETEUS, GALENUS & alii, ex purgantibus validissima, maximeque helleborum tam album, quam nigrum, colocynthidem & scammonium trinitricæ hoc sine laudarunt. At vero, quum nostris temporibus efficacia quidem, sed tutiora sint cognita, non immerito illis dimissis radicem & resinam jalappe, extractum hellebori nigri, elaterium cum mercurio dulci, vel æthiope minerali permixtum, gummi ammoniacum, & ex compositis extractum panchymagogum Crosti in pulveri forma commendamus; vel si pulveris forma magis aridet, hic ex aliquot granis resinæ jalappe cum toti-

dem granis angydalarum dulcium subactis, & cum æquali mercurii dulcis portione remixtis, addita simul una & altera olei macis, vel ligni falsasas gutta opportune potest parari.

§. X.

— de ju-
visis.

Ex classe eorum, quæ solidas partes ad motum excretorium stimulando, paulo potentius humores tenaces colligunt, omnibus aliis præferendum est lignum guajacum cum cortice suo; quod sicut recto usu sapientie huius veneræ penitus eradicandæ vel solum sufficit: ita etiam in subcutaneis adflicibus, qui adhuc mitioris sunt nature, evellendis non contemnendum est remedium. Præter hoc vero imprimis huc referenda sunt medicamenta ex mineralium regno petita, è quibus eminent tinctura antimonii tartarizata & acris, regulus antimonii medicinalis, sulphur antimonii Glauberiana, vel nostra correctum methodo, cinnabarina, &c., si veneræ malignitatis suspicio subest, antimonium crudum per coctionem usurpatum: quæ remedia in convenienti dosi & matutino tempore cum decoctis purificantibus in lecto potandia exhibita, vel aliis diaphoreticis adjecta præstantissimam ferunt opem, dum lympham commovendo, obstructions in angustissimis glandularum tubulis existentes reserant, adeoque sanguinem & lympham egregio effectu depurant.

§. XI.

— de mor-
moria.

Licet vero propostæ hæc ad depurandam sanguinis & humorum massam curationes magnæ sint efficacitæ, & excellentis virtutis; suppetunt tamen calis & exempla, ut in elephantiasi & veneræ scabie videmus, ubi altius infixæ venenæ indolis causa parum inde commodi & emolumenti repetitur, sed validiori adhuc remedio opus est, quo præter argenti vivum & parata ex eodem medicamina, si vires ægri consentiant, nullum datur potentius, ad perniciatissimæ externi habitus morbum vincendos ac debellandos. Siquidem subtiles ejus particule intima vasorum penetralia subeundo & penetrando, impauctos iidem humores viscosos corrigit, extrahit, dissolvunt, & aucta fibrarum in toto corpore vi systolica, per omnis generis emunctoria, alvum, sudorem, & præcipue per glandulas & ductus salivales, mediante salivæ copiosiori fluxu eiciunt. Atque hæc solenni & quasi universali evacuatione solent contingere, ut omnis impuriorum humorum fabrica brevi tempore, licet cum molestia quadam eliminetur, toto inde corpore repurgato & quasi renato.

§. XII.

Sunt autem variæ à Medicis hæcenus propostæ mercurium adhibendi modi, quos jam paucis perstrabimus. Ita sunt alii, qui ex mercurio vivo cum unguento pomadino probe subacti, additis floribus sulphuris & camphora unguentum faciunt, quocum articulis, malleis, genibus, cubiti ipsaque pedum plantæ, ad salivationem movendam, fortiter fricantur. Alii vero tutiorem & meliorem efigunt usum internum, dum præparato prius per alvum, temperantia & evacuantia corpore, mercurius dulcis rite præparatus cum dupla quantitate lapidum cancrorum & antimonii diaphoretici permixtus à granis tribus vel quatuor ad scrupulum usque, multis paulatim adtendendo, ostiatur: unde sit largus salivæ fluxus proritur, quem sub debito

Ma dicit ad-
hibendi
mercurium
de.

debito regimine & cautelis, interpositis simul decoctis sanguinis depurantibus, per unam alteramve septimanam pericere decet. Huc quoque ex mercurialium familia scopo abstrahit & diaphoretico spectant mercurius iolaris & jovialis, cujus aliquot grana cum rotarum conferva semitrita per hebdomadas nonnullas matutino tempore cum fructu deglutuntur, superbibendo postea in lecto sub diaphoretico regimine decocti liberam ciceret unum. Sed sciendum est, ut singulae hae curantionis species acrem probe temperatam & diatam parcam, tenacem, omniumque carnisum pinguium, coctarum vel acidorum expertem deliderent.

§. XIII.

Lactis curi quando mercurialis?

Non raro autem incidit, ut longe mitius lenitiusque procedendum sit, & neque purgantia, neque copiose sanguinis milifines, neque decocta cum exsiccante diata, nec ipsa mercurialis tuto admitti queant. Quando enim aetas est infansilis vel senilis, corporisque & virium robur debilitatum, vel nervorum systema nimia sensibilitate praeditum; item si corpus magis exsiccum & macilentum, quam pingue & laxumprehenditur; vel si humorum acrimonia & mordacitas magis, quam crassities & viscida tenacitas delinquit, tum prorsus alia in medendo via ineunda est; aequae in tali morbi statu non solum antiquissimi, sed omnes etiam sapientiores nostri avi Medici lacticia, & imprimis lac asinum, serum lactis bubuli & caprini, lac cum aqua mixtum non satis laudibus possunt extollere. Ita praeter HIPPOCRATEM, CELEUM & ARISTAEUM, qui insignem lactis virtutem in scriptis suis tribuunt, maxime DIOSCORIDES lib. II. cap. 75. curam cum lacte convenienter infinitam utilissimam censet in superficiali corporis molestia pruriginis, in maculis & scalo ibi vitioso humorum decubitu: scorfim vero lib. c. i. a. ro serum lactis ad cutaneos adfectus his verbis commendat: datur (lactis serum) iis, quibus sine vehementia declinatione molitur adversus lepraem, elephantiasin & efflorescentias per itum corporis habuum erumpentes. Et profecto, eximiae sunt hujus diastetici remedi vires: siquidem non tantum crassos, viscidos & serne coagulatos humores diluit & fluxiles reddit, mentus viticorum obstruatos referat, & acrem humorum salcedinem contemperando partes sicciore humectat conficiendas relaxat; verum etiam per urinam & alvum noxios humores placide educit, expellit, evacuat.

§. XIV.

Quomodo si resisteret?

Quoniam tamen non parum interest, ut tum quantitas, tum justum tempus bibendi lactis equique seri determinetur, optime nobis consulemus, si Veteres in eo duces eligamus & sequamur. Ex his autem princeps & quasi antesignanus est ipse HIPPOCRATES, qui in lib. epidem. VII. lac asinum, vel lactis, imprimis caprini serum per plures dies bibere praecipit: & lib. IX. de intern. adfect. lac per quadraginta & quinque dies, tertia aquae mulisae parte addita se propinabile refert. Serum lactis per menses & ultra adsumi posse, testes sunt gravissimi SYLVATICUS aequae RIVERIUS, qui eodem in gravissimis adfectibus ad XII. XX. & XL. dies humo cum enulamento usi, plurimum sunt in commendando ejus potu. Nec aliter sentis doctissimi AUGUSTINUS epistol. & consulat. medic. Tom.

II. lib. 1. qui ad magnum & antiquum totius corporis prurium mitigandum seri lactis in majori quantitate potum ita suadet: qui exiguum illius quantitatem potant, frustrantur sine alterationis & expurgationis. Sit quantitas usque ad libras octo & ultra. Et lib. citat. tom. I. lib. XII. epistol. 1. se consuevisse adserit serum hoc dare, quemadmodum aquas solent medicatas offerre. Ita e. g. primo die exhibet libras sex cum syrugi rotarum solutivi uncis tribus, sequenti die simplex dat serum, & dosin successive augendo usque ad libras IX. vel X. per viginti continuos dies pergit.

§. XV.

Quandocumque exanthematici hi morbi a lue scorbutica vel hypochondriaca adfectione, ut pluris evenit, foventur & sustentantur, longe major obinebitur fructus, quando jam memorata lactis cura ita instituitur, ut ipsa complicatis huius malis allevandis simul dicata & idonea sit. Quem finem vix melius licet obtinere, ac si aquae medicatae, inque primis aciculae temperiores, elemento spirituosio & salino turgidae, quales sunt S. beranica, Tonicum, Wildungensis, vel etiam Egranae, cum dimidia vel tertia lactis parte mixtae sub exacto vitae victusque regimine, & praemis pariter ac interpositis evacuantibus aliisque medicamentis bibuntur.

Usum lactis cum aceto modo citato.

§. XVI.

Quod si vero harum aquarum deest copia, eodem sine saluberrimum est, si cum ipso lacte vel ejus sero, tam dulci, quam a. idulo herbae sanguinem depurantes dictisque vitis speciem dicat decoquantur, cujus generis maxime sunt: sumaria, epythymum, cuscuta, melissa, scolopendrium, trifolium fibrinum, beccabunga, taraxacum, borrago, endivia, cicchorum & ejus radix, aliaeque plura, quae parum sale volatili penetrantiori instructa humores viscidos incidunt & dissolvunt, impuros depurant ac debentum sanguini balsamum restituant; parum principio amaro balsamico languenti ventriculi digestionem succutendo, ad boni sanguinis regenerationem egregie faciunt. Neque idcirco ite ipse sua frustrantur, qui, preparato prius corpore, succi ex modo dictis herbis recentibus & confusis expressi unciam unam, aut plus cum sero lactis per aliquot septimanas propinant.

Usum huius herbae purgantibus aceto.

§. XVII.

Denum, inter optima graviorum cutis adfectionum auxilia refertur etiam viperarum cura, quae tam apud venerandam antiquitatem, quam apud recentiores Medicos est celebratissima, ideoque minime a nobis praetermittenda. Enimvero penes HIPPOCRATEM, si scripta ejus evolvimus, nullus, quod scio, reperitur locus, quo viperarum usus adstrui possit; verum ARISTAEUS, GALENUS, AETIUS, & ex Arabibus RHASES & AVICENNA, horum animalium virtutes in lepra, elephantias, & omnibus a maligna impuritate prohibentibus cutis vitis sanandis non satis possunt deprecari: quin ino mirabilem totius corporis renovationem inde promittunt. Celebris ille Neronis Archiater, ANDROMACHUS trochiscos & vipera paratos pro principali theriacae suae, seu summi alexiterii remedi ingrediente constituit: & hos omnes locum praestantissimi Italiae, Galliae & Germaniae Medici,

Viperarum cura.

Medici, MERCURIALI, QUERCETANUS, SOLENANDER, BALLONIUS &c. similiter viperis magnas tribuerunt laudes; donec *Julius PALMARIUS*, Constantinus Medicus Parisiensis, lib. de morb. contagios. cap. 9. Veterum in hoc genere promissa & animum credulitatem acriter perfrinax, addito in testimonium *Jeanne FERNELIO*, qui adieruit: medicamentis ex vipera more veterum adparatis, elephantiasi laborantibus adhibitis nullum subsecutum fuisse salutarem effectum, cum neque vicerum consilio hoc modo melior facta, nec verrucosa tubera, nec incrementis cutis deformitas fuerit emendata, sed omnia potius symptomatica exasperata. Nihil tamen minus & fuerant, & adhuc sunt ex modernis plurimi, sique clarissimi Medici, qui veteribus & longae fidei fidem habentes, peculiarem & quasi specificam contra cuseanas defecationes virtutem in viperis, & patas ex indidem decoctis vel jusculis delitescere sibi persuademus, & quaeque propter viperam, magno sapientia summa ex Italia conquisitas, variis modis, ut pulvere, trochiscis, jusculis, vel etiam in forma salis volatilis chymice extracta sub spe optatissimi effectus propinant.

§. XVIII.

De eadem
judicium.

Ut vero libere & ingenue hac de re meam profiterentur sententiam: nihil certe solidi, quod operae pretium faceret, auxilium ab hisce viperinis medicamentis in impurissimis sanguinis corrigendis peti & expectari posse, firmiter ego ob plurimas observaciones, praegnantibus etiam rationibus confirmatas credo. Neque ulla in tot Veterum aequae ac Recentiorum scriptis accurata & completa occurrat observatio, ex qua quis specificas de dictis morbis directe oppositas viperarum virtutes certo cognoscere & adhibere possit; maxime cum alia plurimae medicamentis admixta, vel simul in usum vocata fuerint, quae effectum valde dubium reddunt. Ita mihi plurima cognita sunt exempla, ubi in atrophis, phthisi, plora leprosa, scabie, tinea capitis, aliisque hujus generis malis varia ex viperis confecta medicamenta vel nihil praestiterunt, vel si quid boni praestitum fuit, id potius aliis admixtis ingredientibus, & conjunctum datis medicamentis in acceptis referri debuit. Si quis itaque effectus salutaris à viperis provenit, certe non alius est, quam qui à reliquis omnibus animantium partibus scaccatis, gelatinoso quodam, blande sulphureo & vaporoso succo praeditis, expectari potest: unde excessiva viperarum encomia exigui sunt valoris, quia solo auctoritatis praedictio nituntur. De medicamentis viperinis legi meretur notata dignissime *ZWOELFERTI* annotationes in *pharmacopoeiam Anglicanam* pag. 211.

METHODUS MEDENDI SPECIALIS
CUM CAUTELIS.

§. I.

Cura def-
fieri prece-
ditur cum
sanguine de-
fectu.

Quoniam admodum diversa est naturarum & humorum peccantium constitutio, differre quoque solet ipsa horum adfectuum curatio. Ne igitur in quocunque delinquamus, praecipue omnium causa, quae induxerunt malum, probe sunt inquirenda & distinguenda. Ita, si ob nimiam voracitatem viamque delidum humorum abundantia in culpa est, abstinentia & exer-

citio ante omnia opus est; si crudi, visceris humores, sub temperamento maxime phlegmatico caussam suppediant, evacuantia per alvum, mediante insuso vino proficiunt, subiungendo illa, quae transpirationem leniter movent; si corpus est plethoricum, & ab omnia sanguinis missione, vel critica sanguinis fluxione cohibita ejusmodi sordae cutis asperitates & exulceraciones oriuntur, initium curationis à sanguinis per venae sectionem vel cucurbitularum destructione facere, & quae subiungere remedia oportet, quae salutare has excreciones convenienter revocant; si corpus est juvenile, macilentum, & cholericæ complexionis, plurimum proficiunt, ceteris paribus, diluents, acrimoniam temperantia & depascentem alvum refrigerantia, ut sunt serum lactis, acidula cum lacte, nitrosa & per alvum evacuandi scopo potiones mannae; si viscerum & ventriculi imbecillitas regenerationi succorum imputorum favere animadvertitur, ventriculum roborantia, quae digestionem adjuvant, insignem ferunt operam. Quod si autem prohibita intensio per poros transpiratio & tubulorum cutis obstructio causa mali praecipua est, insusis thesauris, leniter diaphoreticis & frictionibus recludere oculos pororum hiatus medicum decet.

§. II.

Quando per scabiem & cutis varia exanthemata chronice & difficiles aggritudines, tanquam per crin terminantur, maxime opere cavendum est ab omni generis evacuans per alvum, urinam, imo quoque à sanguinis missione, ne ex habitu corporis ad interiora materia virulenta retrahatur. Elegans hanc in rem locus exstat in *Joann. LANGII* epist. 16. Tom. I. *Ego scabiem, inquit, & crurum edemata cum post aliarum febrium, tum praecipue quartanae febris crin abortiva sponte exalescere cura omne medicamentorum subsidium plus centies vidi. Quod si tum plethoricus scabie insisteret, aut phar-macum exhibuimus, ingens fuisset periculum, ne per eas venas, per quas materia morbi expulsa fuerit, prorsus ad interna viscera retrahatur.*

§. III.

Atque utilissima hac cautio similiter necessaria est, quando natura exanthematum propulsi-onem salutari modo instituendam molitur, nec sola eidem perficienda sufficiens videtur. Si quia enim tum temporis talia vult propinare, quae impuritates, ad curam amandandas, retinent, vel retroagunt, ut fere sunt paulo largiores sanguinis missiones, quaevis purgantis, adstringentis, & in languidioribus subiectis refrigerantis, inque primis nitrosa in majori saepiusque repetita dosi oblata, pessime sane aggratantum saluti consulet, morbumque benignum in malignum itaque ausa convertet. Multo magis tum excitanda sunt naturae in expellendis impurissimis vires, & leniter diagnocis succurrendum, quae activo quodam sulphureo principio, systolicam fibrillarum nervearumque partium actionem intendendo, celeriore humorum cursum efficiunt, eumque ad extimam corporis superficiem dirigunt, ut hac ratione excrementitiae sordes per cuticularem exhalationem ex corporis sphaera eliminentur. Atque hanc sibi viam ipsa natura, quam in medendo ducem sequi debemus, eligit; sicut non modo ex spontaneis & in largissima

Causa
exanthemata
scabie
causa

Exanthemata
causa
scabie
causa

giffima fæpius copia profluentibus fudoribus; verum etiam exinde satis concludere licet, quod multa habeamus exempla, quæ testantur, scabiei aliæque cutis vitia, si præsertim à contagio, vel ex aliis morbi præcedentis reliquiis, ut febribus intermittentibus & continuis, podagra, colica convulsiva, affluente &c. originem sumferunt, sponte subortis vel arte excitatis fudoribus fuisse sublata.

§. IV.

Splendens autem diagnosa virtute, sanguinemque & humores semel fluxiles reddunt insula theiformia, ex herbis benedicti, veronice, scabiose, fumarie, cardui benedicti, floribus sambuci, radice pimpinellæ & lapathi acuti confecta; quæ largiori in copia hausta in promovenda materie malignæ expulsiõe egregie se gerunt. Huc quoque ex compositis spectant, dictisque infusus vel jungi, vel interponi possunt, mixtura simplex, liquor noster anodynus mineralis cum spiritui beaardico *Bugsi* &c. cornu cervi succinato ad tertiam partem remixtus; vel etiam pulveres diaphoretici, ex antimoniõ diaphoretico, cerussa antimoniæ, &c. huic analoga materia *Krigneri* perlata, additis in refracta dosi antimoniõ cruo, regulo antimoniæ medicinali, sulphure stillicio & ejus floribus, cinnabari, æthiopi minerali, &c. hujus cæsus aliis, quorum fupra jam in ipsa curativa methodo §. X. mentionem fecimus. Atque tales pulveres vespertino tempore, sicut liquida spirituosâ matutino, vel ex aqua, vel ex vehiculo aque florum sambuci, cardui benedicti, fumarie, scabiose &c. possunt propinari.

§. V.

Ipsi quidem curationi fociari & interpolari debent medicamenta diaphoretica, sed sola non sufficiunt; atque curatio positive diaphoretica, præsertim in ficioribus subiectis, tantum abest, ut ad salutem quidpiam præbet; ut potius malum exacerbet, & ex simplici prurigine pustulosum adfectum cum pruritu incremento producat. Quæ cum ita sint, necessitas omnino postulare videtur, ut non modo appropriatos potus, quales sunt in cholericis corporibus decocta temperiora & lacticia, in phlegmaticis laxioribus saturiora decocta, in sufficiente quantitate haurienda ordinemus; verum etiam remedia primarum viarum seburram evacuantia, & simul visciditatem feri ac lymphæ incidentia, ut sunt pilule mercurio dulci vigoratæ, vel in debilioribus leniora insula laxantia præscribamus, eademque post sex vel octo dierum intervallum semper repetamus. Infantibus autem & pueris scabiei vexatis speciatim commendandum est hocce purgans: *Recipe pulvis Cornachini serupulum unum, mercurii dulcis grana octo, Syrupi eicborri cum rhabarbato drachmat duas, aque fumarie unciam dividiam. M. F. haustus, qui pro ætatis ratione offerendus.*

§. VI.

Sæpe pruritus, maxime si lignorum decocta & sudorifica accedunt, ad lipothimiam usque augetur, quia ichorosi halitus & salia subtilissima acris horum ope ad habitum corporis majori in copia propellantur. Quod vero fit incidit, merito abstinendum est ab omnibus exagitantibus; & potius lac cum aquis herbarum antiscorbuticarum, ut nasturtii aquatici & fumarie mix-

tum, serum lactis vel solum, vel virtute herbarum alterantium imprægnatum, nitrosa, emulsiones, & balnea aque dulcis debent administrari.

§. VII.

Scabies & aliæ cutis defecationes si ante tempus recedunt, vel externis sulphuratis, mercurialibus, refrigerantibus tractantur, mox pellimorum symptomatum syndrome solet adornari. In quo casu præter ea, quæ superiori loco expellendi fine commendavimus, optime se gerit mercurius dulcis, alterante magis scopo, quam laxante datus, nec non flores sulphuris ad oculo, vel decem grana cum absorbente quodam propinata; hæc tantum adhibita cautela, ut sub curi exhibitione sulphuris usum omittamus: ab utroque autem abstinemus, si scabiei quidpiam, ut sæpe fit, concurrat.

§. VIII.

Licet mercurius specificè quasi fermentescens scabiosorum adfectum indolem everat, & frustra sæpe auxilium ab aliis remediis speretur, nisi id per mercurialia interna obtineatur; saluatio tamen in morbis his exanthematicis omni cautione suscipienda & tractanda est, præsertim si corpora sunt cachectica atque scorbutica, in quibus ipsa insiliunt. Nisi enim præmissa fuerit debita humorum correctio & præparatio, salivæ fluxus non modo impeditus succedit cum faucium inflammatione denique casu & denigratione; verum etiam vomitus, ventris tormina, cardialgie, diarrhoeæ, dyspnoeæ, aliæque plura accedunt incommoda. Quoniam autem nunquam fere non huic medicationi tonsillarum fauciumque intumescencia, gingivarum relaxatio & difficilis deglutitio jungantur; fauces præcipue lenientibus ac tonicis gargarizantibus sunt præparandæ, corpus in perpetua diagnosi effi conservandum, ex medicamentis omnia calida & acriora diuretica sunt fugienda, & demum in diæta victuique regimine frigoris accessus, potus frigida, omnia acida, salia & cruda alimentia, quantum fieri potest, evitanda. Præterea limatori opus est iudicio, ne ultra individui salivantis vires medicatio protrahatur, neve ex altera vel Medici, vel ægrotantis parte effectus prædeat insufficientis, atque formicæ remaneat, quod novum morbi fabulum suppediet. Quo igitur in utroque casu tuto procedamus, probe debemus considerare molem corporis, temperamentum, durationem morbi, materie morbose quantitatem, symptomatumque gravitatem.

§. IX.

Infantibus quidem absorbentia fixiora, laxantia & depurantia tunus adhibentur, quia iisdem nervosum genus debilius esse solet, quam quod mercurialia impune ferre queat; tamen, si dicta mitiora remedia nihil juvant, & scabies maligni est genii, mercurialia etiam sine noxa oblata memini, modo grana mercurii annorum numero attemperant, & debium regimen, quod rarius stricte observatur, potest injungi.

§. X.

Si herpes præcordia invadit inflar zone, quod sæpius in hypochondriacis & arthriticis evenit; imo in omni zone & herpetis genere, speciatim diaphoretica fixiora indolis, cum aquis diarrhoeis prædilectis sunt eximium; ceteris tamen remediis non penitus omittenda. Eadem quoque locum

In nervo-
cessione
mercuria-
lium quod
foculandum

Mercuria-
lium afas
prodeunt
collyriarum
dus.

An infan-
tibus pro-
fuso dispo-
nunt.

Curatio
non est
necesse.

Diapho-
retica her-
barum præ-
parata.

Hic jam-
pantur &
interpo-
nuntur de-
cocta &
laxantia.

Nimius
pruritus
quomodo
reducatur.

locum obtinent in perinacibus ulceribus & abscessibus internis: siquidem hac ratione vitiosi & acres humores commodè alterantur, temperantur, & blande educuntur.

§. XI.

*Externa
de curis
ulceribus
proprie.*

Neque topica sunt prætercunda, quorum conveniens usus in perfecte sanandis cutis defæcationibus & ulcerationibus plurimum confert emolumentum. Quoniam vero diversi adfectus alia atque alia possulant remedia, breviter jam stricteque præcipua denominabimus. Quando pustulæ humide ulceratae manantia exsiccationem, & ob nimiam meatuum cutis laxitatem lenem constrictionem expetunt, sulphur vivum stillidum, quod exigua tantum mole inunctum cutim coarctando, ulcerosam excrementorum cutis proventum impedit, ideoque ab antiquissimis, AETII, AREÆI & ORIBASI temporibus commendationem sibi comparavit, omne prope absolvit punctum, si in oleo lini, aut axungia porcina dissolurum, debitæ quantitate ceruilla & tutie in unguento quassum redactum adhibetur; licet quoque, ad nimiam humiditatem absorbendam, unguentum de alabaistro cum tutia mixtum non minore præstet utilitatem. Si dolor, rubor, ardor & pruritus juncta sunt, unguentum de cerussa, quod ex solutione lithargyrii cum aceto acris confecta, cerussa, pinguedine porcina constat, omnibus aliis videtur præstendum; maxime si eidem flores sulphuris, & aliquot guttulæ olei ligni Rhodii, jucunditatis conciliandæ gratia, adjiciuntur. Ad scabiem siccam & valde dolorificam emolliendam & temperandam, mucilago medii corticis tilie cum aqua rosarum extracta, vel etiam cum oleo lini, cerussa & paucillo croci, ad imitationem diachyli simplex in emplastrum redacta, mirabilem exiit efficaciam. Quod si autem ulcuscula profundiora purificanda sunt & consolidanda, dictis unguentis addi possit oleum juniperi & lauri destillatum, vel balsamum sulphuris cum iisdem oleis & æthiophe minerali remanet adhiberi. Denique non negligendum est unguentum cosmeticum, in omnibus cutis adfectibus finita curatione utilissimum, cujus parandi modum infra in observat. VII. docuimus. Præter hæc vero, huc etiam referri merentur non nullæ antiquiorum Medicorum non inæpræ curationes, atque imprimis HIEROCRATIS qui *lib. epid. II.* ad impetiginem & lepram aquam calcis commendat, quam autem ex monito SPONTI ita temperatam esse decet, ut ne magis ulceret. Neque minus mihi semper placuit SYLVATICI methodus, *crut. I. conf. 22. 23.* reperienda, ubi ille post usum feni lactis caprini, cum succo citri per 15. dies, ad libras duas quotidie sumit, externe unguentum ex sulphure, nitro, mercurio & oleo amygdalarum dulcium consecutum maximeper laudat.

§. XII.

Tinea capitis curatio.

Quod speciatim attinet ad capitis tinea externa oje sublevandam, prænulla universalibus cacochymiam resistentibus, sequens unguentum maxime solet esse efficacis. *Recipiuntur olei vitellorum ovorum uncia una, pulvis pyrisabaci, storum sulphuris, ceruilla porcionis drachma dua, essentie benzoei & balsami Peruviani ana uncia dimidia. M. F. unguentum*, post cujus inunctionem per aliquot dies continuatam caput lavandum est decocto, quod ex æqualibus

paribus vini & lixivii cum scordio, aristolochia rotunda, musco terrestris, floribus lavendulæ & myrrha coctis potest apparari. His nihil proficientibus, nonnulli interne mercurialia potrigunt, externe mittere ex pice navali & balsamo de copaiva constatam capiti imponunt, sicque totum capillitium detrahunt, consolidationem posses cum oleo vitellorum ovorum peragentes. Quando tamen violenta hæc curatio tuto admitti possit, aliis expeririendum relinquo, hoc tantum commonefaciens, quod desperatum ejusmodi remedium, nisi in desperatis casibus nunquam sit adhibendum.

§. XIII.

*Balnea
rura etc.*

Inter externa recensenda etiam sunt balnea, tam naturalia, quam artificialia, quæ ex sola aqua dulci, cum radicibus helenii, enulæ, lapathi, herbis fumarie, scabiozæ, saponarie &c. decocta, peropportune parantur, atque in psora leprosa & elephantiasi, præmissis internis sanguinem purificantibus, tum ad cutis tonum roborandum, tum ad impuras & squamosas fordes abluendas, insigni cum fructu adhibentur. Nec minore merentur commendationem balnea, ex foecis metallicis martialibus & venereis confecta, quarum illæ de terreo-salina & sulphurea martis substantia participant; hæ vero sulphurea multo & sale vitriolico turgidæ sunt, adeoque in roborando parium fibroslarum tono insignem exerunt efficaciam. Atque ex hoc fundamento maxime sese probantur ejusmodi balnea in morbis cupancis, a nimia spissitudine & corruptione humorum seroso-lymphaticorum oriundis, quales sunt, scabies, serpagio, herpes & achores &c. sicut hæc de re nonnulla exstant exempla in dissertatione sub præsidio meo habita de *balneorum artificialium ex foecis metallicis usu medico*: ubi herpetem malignum pag. 13. scabiem pag. 18. & lepram pag. 20. iisdem sublata diversis exemplis comprobavi. Imo demum huc merito ducenta sunt balnea aque dulcis thavatiæ cum fufuribus decocta, delinæque lactis recentis admixtione temperata, quæ præsertim in scabie sicca, omnibusque adfectibus cum insigni cutis aspreddine junctis, & speciatim quidem in molestissimo senum pruritu auxilium ferant præstantissimum.

§. XIV.

*Cum
crat
speciem
aliam de
serpagio.*

Quam nullum prorsus medicamentum, nisi recto usu juvet, plurimumque in omni curatione rite perficienda intersit, quo ordine & quo tempore remedia administrantur, utilissimus erit labor, si genuinum methodum jam allegatis topicis utendi cum debitis cautelis suppediemus. Probo itaque sciendum est, remedia externa semper in postremis esse collocanda, & nunquam applicanda, nisi tota sanguinis & humorum massa vitiosa, acris, corrupta debius internis corrigentibus ac depurantibus ad blandiorem temperiem fuerit redacta. Neque facile sub usu exteriorum negligere prorsus decet interna, præsertim diaphoretica, sed hæc potius eo fine sunt continuanda, ut quæ forte intus remanserint impuritates expellantur. Quæ utilissima monita sin Bocci penduntur & minus observantur, mille oriuntur mala, prioribus longe majora, & sæpe cum vite periculo conjuncta. Ita crebrius annotare mihi licuit, particularem scabiem, quæ speciatim quædam loca, v.g. manus, pedes, nucham & faciem occupavit, præpostera methodo per liumenta conso-

consolidatoria suppressam graves nervosi generis affectiones, ut spasmos cynicos, epilepticos, passionem iliacam, febres inflammatorias cum delirio, cardialgias, asthma, & hydropicos tumores excitasse, quæ vix aliis modis, quam reverte-
rente priori morbo quieverunt. Huc etiam refe-
rendi sunt casus *medicina mea consultatorie* in-
serti, ubi *Cent. I. casu 28.* male curatam scabiem hæmorrhoidalem & epilepsiæ causam attuli, & *cent. I. casu 9.* in epistolis ad vertiginem consulisse demon-
stravi. Majori vero & certiori damno ple-
rumque adhibentur unguenta mercurialia. Mi-
rifice quidem mox post inunctionem aliquot die-
rum, paucis tantum in locis tendinosis & nervo-
sis instituta evanescunt exanthemata, quia sine
dubio fibrillares & nervæ cutis partes à medica-
mento hoc activiori stricthuram quandam patiuntur,
quæ particulæ humoris vitiosi è tubulis sub-
cutaneis partim expelluntur, partim ad interiora
repelluntur. At vero, si corpus non sufficiens
antea ab impuris sordibus fuerit depuratum,
transpiratio immittitur, & vis materie morbificæ
imperfecte ad interiora, maximeque ad partes
nervo-tendinosas convertitur; unde præter alia
mala, arthritidem fixam subortam novimus.

§. XV.

Guttu-
sive in-
doles.

Supereff adhuc peculiaris vitis depravationum
species, cujus facienda erit mentio. Nominatur
illa gutta rosacea, quæ nihil aliud est, quam facie
defectio & decoloratio cum rubedine, squa-
mulis, & interdum pustulis tuberculisque inæ-
qualibus junctâ, à sero sanguineo plus minus im-
purò, copiosius ad vasa capillaria faciei adfecto
enata. Sunt autem varis gutte species, quarum
levissima est, si tantum naturali major rubedo
circa nasum, in fronte, vel certis locis faciei
observatur; pejor, si in squamula abit, pessima,
quæ pustulis & tubercula est obita. Asque hi
diversi gradus à differente causa in variis subjec-
tis dependent. Siquidem non omnis gutta ro-
sacea præter & impuros succos, quos natura sin-
gulari beneficio ad partes extremas humanæque
curis faciei amandet, pro causa agnoscit, sed
potius in nonnullis à turgescencia & distensione
vasculorum minorum capillarum, vel etiam
lateralium, quæ nullam alias lympham colorem
vehunt, derivari debet. Aliter vero res esse
habet, si causa hujus exanthematis in materia
subtili activa acri querenda est; quæ quo vola-
tilior est, eo plus penetrat in nervosorum mem-
branarum texturam, inque iis corporibus, quæ
geometris nervosi debilitate & scorbutica sanguinis
diuturni laborant, longe majorem exercet tyran-
nidem.

§. XVI.

— & cura
his, sine
interitu

Levior hujus mali indoles in subiectis sanis,
vegetis, nullaque fontica impunitatis labe infectis
leviorem quoque & minus sollicitam postulat
curam; sed in iis plerumque à majori san-
guinis ebullientia ad superiora motu proveniens
sepe solis temperantibus, diluentibus & derivan-
tibus feliciter tollitur. Longe vero pertinacius
scorbuticus inhaeret corporibus, in quibus sine re-
mediis sanguinem purificantibus nihil mitigatur.
Ego igitur in ejusmodi casibus optimo cum suc-
cessu ordinavi sequentem potionem per aliquot
hebdomadas adsumendam. *Recipe aqua sumaria,
beccabunga, nasturtii aquatici, acetosa,
ana libram unam, feri laticis caprini libras tres,
arcani duplicati drachmas tres, nitri depurati
Frid. Hoffmanni Oper. Tom. III.*

*drachmam unam. M. D. S. potio cujus libra una
mane & à meridie, si consensit ventriculus,
haurienda. Aliis eodem depurandi fine præscri-
psi sequentes species: capiantur herba sumaria,
scopolendrii, scabiosa ana manipulus unus, radi-
cis ciccorei uncia una, corticis capparum uncia
semis. C. D. S. species, quarum uncia una in dua-
bus feri laticis caprini mensuris decoquenda, &
inde, facta celatura, quantum libet, bibendum.
Evacuandi scopo semel vel bis in septimana cum
dicto medicamento drachmas duas infundere
jussii harum specierum: *Recipe polypodi unciam
dimidiam, rhubarbari optimi drachmas duas,
agarici trochiscati, mechoacanæ albæ ana drach-
mam unam, nitri purificati, arcani duplicati,
seminis feniculi ana drachmam dimidiam. C. D.**

§. XVII.

Neque præter hæc, in succulentioribus maxi-
me subiectis, scarificationes in nucha, scapulis,
dorso infundendas, neque temperata pediluvia ex
aqua fluviali cum furfuribus decocta omnissum,
in potus locum substituendo præsanam temperan-
tem, vel solam aquam fontanæ cum cornu cer-
vi ulso indito deoratum, vel cum farina triticea,
vulgo *Sterck* decoctam, saccharoque & citri
conicibus palato accommodatam. Facto demum,
his omnibus præmissis & reliquis consentienti-
bus, ad externa transitu, ego sequens episthema
instill omnium inveni præstantissimum. *Rec. aqua
spermatis ranarum, storum sambuci, sabaum
anatica portione unius binas, aqua d'arquebuse
de unciam unam, magisterii saturni drachmas du-
as, sacchari saturni scrupulos duos, vitrioli Cy-
prii grana octo. M. D.* Maxima vero cautio de-
bet adhiberi in omnibus topicis applicandis. Do-
cui enim peohl dolor experientia, perversum
eorum usum in subiectis impuris & sensibilibus
pessima subsequenda fuisse symptomata. Sic
ego inde ophthalmias, cardialgias, & à solo epi-
themat ex aqua spermatis ranarum, mucilagino
sem. cydon., succo citri & floribus sulphuris coo-
cto hæmorrhagiam observavi. *Vid. consp. medi-
cæ. mearum cent. I. casu 163.*

— quæ
sunt
cum in-
terit.

ENARRATIONES MORBORUM.

OBSERVATIO I.

Vix quidem ætatis consistentis, tribus abhinc
mensibus, medio hieme, sub nuptialibus festivi-
taribus, salando corpus insigniter commovit, at-
que postmodum aëri frigido, humidoque die ex-
positum. Hinc eadem adhuc vespera cauterii fau-
cium adfectione iostitutus, elapso triduo podagra
prehenditur, satis mihi, & post diem quatuor-
decim decursum evanescente. Sub hac ex im-
proviso, dolore quodam circa dorsi spinam in la-
tere sinistro noctu corripitur: quem locum, cum
expergefactus leviter inflammatum conspiceret,
lieticeque calefactis fovet curaret, obdebat
pustulæ cum insigni dolore. Sequenti nocte à
spina dorsi per sinistram abdomen erumpent
efflorescent; instat lichenus: tumque seque-
bantur pustulæ, in majores sensum velicas coeun-
tes; quæ ob insignem, quem inferebant, pun-
gentem dolorem, diffecæ iterum plorabant livi-
dum. Nullus in externa cute adaptatus tumor;
molles autem intus vexabat sensatio, ponderis co-
jactam, cutem inter ac musculos innati, quod
ad levem contactum acutissimas exhibebat fun-

Afflicti
passiones
frangunt
sem.

duris; atque jangebantur alvi segnicies, perpetuæque vigilis.

Oppugnabat hæc symptomata medicinis leniter diaphoreticis, antispasmodicis, externe cataplasmatibus ex herbis emollientibus, quæ ingentem excitabant pruritus; & frictions per calidiora lintea, dolore relinquerebant, quales acus cuti inferunt: spirituosæ vero præter exasperabant malum. Mane loco infusi herbes Theobois, decoctum radicis chinæ, sarsaparillæ, pimpinellæ, hermodactylorum, atque ligni sallæstas potabat; & ex hoc ter quotidie triginta guttas elixirii nervino-stomachici, quod essentiam corticum aurantium, calcarillæ, gentianæ rubræ, liquoremque anodyum habuit, adfufebat. Quibus votis nondum respondentibus, novissime dolenti regioni applicabat emplastrum diachylon compositum diaphoreticum, cum spermate ceti, castoreo, camphora, atque croco subactum; quod loci illius sudorem, majoremque pruritus movebat, mox vero insignem letamen inferebat. Interim quum in dicto sinistro latere adhuc pressio fit locus, qui tensum, & ad quemvis contactum, pungentem refert dolorem: ad hunc pruritus expugnandum, salubre arthelæ consilium.

Consulatio.

Singularis, quo cum per aliquot menses, vis spectandissima conficitur affectus, non alius est, quam pustulosis scorbuticus, à dyscrasia humorum, salis, acris, impurisque sordibus referentem originem trahens. Hanc in sanguinis massa jam diu delinisse, vero est simillimum; quum autem æger sub memoratis nuptiis, gule forsan nimium indulgit, dein corpus vehementiori salutatione exagitavit, ac brevi post sub frigido diutius versatus aëre, salutarem perturbavit transpirationem; commovit unique, ac quasi sulcavit silentem hæcenus hostem.

Unde catenales primum facium adfectiones, ac podagricos pedum dolores expertus; his per metastasin ad dorsii spinam retrocedentibus, in molleum illum, quo adhuc laborat, pustularem pruriginosumque incidit morbum.

Quum vero illæ efflorescunt, salutaris plane consilio, ad cutis superficiem sint compulsi: eo respiciere decet medentem, ut naturæ ductum sequatur, in potissimum utatur remediis, quæ integram sanguinis ac humorum massam depurandi, salisque scorbutica attemperandi, ad exitum disponendi, & per alvum cutique è corpore proferendi virtute possint. Quo quidem fine in hisce casibus pro potu ordinario præscribere sive decoctum, ex radice scorzonæ, sarsaparillæ, liquoritæ, rasura cornu cervi, semineque ferulæ paratum. Deinceps, bis quavis hebdomade corpus infuso manato, rhabarbarino, cremori tartari nupto purgari; reliquis diebus mane liquorem meum anodynum, cujus tres partes cum una spiritus bezoardici *Bugis*, vel tinctura bezoardica sint remixtæ; vespere vero, ad promovendam transpirationem, pulverem diaphoretico-cinnabarinum adhiberi curo. Non minus is, quorum ventriculus fert, potum feri lactis cum insigni fructu commendare soleo. Ex topica emplastrum *Barbette* camphoratum, cum oleo hyoscyami subactum, vel solus spiritus vini, leviter rectificatus, partique dolenti inunctus, egregium adfere observantur adjumentum. Quibus remediis, per aliquot hebdomades continua-

tis, si persisteret hæc molesta adfectio; excellentissimum in totum corpus inde resulabat emolumentum.

OBSERVATIO II.

Juvenis xx. & aliquot annorum, habitus corporis spongiosi, qui lacte & saccharo conditus valde semper delectatus, æstare quondam maxima in copia fructus ingessit horros, sub infectionem autumnum, postquam præteritum cum scabioso in uno decubuit lecto, magno afflicto pruritu, & pustulis indies magis efflorescentibus, quæ de nocte multum creabant molestias, & intra unius septimanæ spatium per totum corpus diffuse saniem æque copiosam æque acrem stillabant. Medicus consultus ad depellenda hæc incommoda vehementer præscribat purgans per singulos dies sumendum, cujus quidem usu ultra sexaginta ferme sedes intra triduum provocat vires mirum exauriebant, sed simul mirabili spectaculo omnis prope scabies disparebat, pustulis egregie exsiccatas. Quæ perfecta videbatur sanitas non multo post denuo labascebat, dum æger omni adpetitu & somno deficiens in interioribus insignem experiebatur ardorem, cum maxima debilitate pulsuumque celeritate junctum. Dabatur itaque ex meo consilio medicamenta blande diaphoretica, maxime autem nitrum cum camphora & antimonio diaphoretico mixtum, substituto in potus locum decoctio cornu cervi calida. Qua methodo id efficiebatur, ut insensibilis hæc symptomatibus evanescentibus denuo nova prodibant cutis excrementa, quæ postea per decoctum veronicæ in copia haustum, pulveribus leniter absorbentibus & temperantibus, uoguent sulphurato & balneo perfecte sanabantur.

Episcia.

1) Docet inprimis hæc morbi historia, quod scabies sit contagiosa, facileque possit cum illis corporibus communicari, quæ jam sanguinis quadam dyscrasia, ob perversam vultu rationem, laborant. Frequentissimum autem hujus morbi proventus in autumnum solet contingere, quia, sub hoc anni tempore turbulento, & quoad tempestates inconstanti, per facile saluberrimum transpirationis negotium impeditur, magnæque sordium excrementarum copia in sanguine accumulatur.

2) Notare licet, vehementem alvi purgationem retropellere posse scabiem, dum sic humorum motu ad peripheriam corporis immittitur, cutisque colatorio spasmotico quasi contracta, si illa causæ indolis acris per sudorem non amplius eliminantur, sed retenta & intus rejecta facile febiles motus suscitant. Equidem non nego, in scabie omnibusque subcutaneis adfectionibus primam regionem à biliosa amarca esse repurgandam, sed ut remediis per episciam & pusillam agentibus, uti sunt infusa vinosa, id fiat, etiam atque etiam moneo.

OBSERVATIO III.

Fœmina terrentissima constitutionis, biliosa & xx. annos nata, tempore adhuc frigido ad acedulas Pyrmontanas profecta, iisdem per quatuordecim dies sub coelo frigido & humido sine ulla valetudinis noxa utitur. Domum autem reverfa elapsa aliquot hebdomadibus maximo totius

Scabies
tallidum
purgans
et felix
curatio

Scabies
post alvum
accedens
non frigida
et pusillam
agentibus
et felix
curatio

corporis pruritu exercitabatur, quem inopinato sua multae pustularum efflorescentiae in manibus, cum tumore & dolore inflammatorio sequebatur, quae succedente tempore ingentem saniei copiam stillabant. Consultus vir chirurgiae peritus pulvere exsiccante, ex tutia, creta & cerussa composito manus perpetuo ichore madidas diligenter conspicebat. At vero, loco sperati salutaris effectus tulla oriebatu'r vehementissima cum summa praecordiorum anxietate, & in ipsis muliebribus, quae valde intumescabant, agra intensissimum sentiebat pruritum. Ego igitur in consilium adhibitus, quum singula haec mala à materiae peccantis in corpus repulsionè enata facile augurabar, remoto pulvere fiovante, tincturam antimonii tartarifatum cum infuso radicis enulae, quod fortiter expellit, quotidie adfumendum commendabam; ad tumorem autem dolorificum in podendis abigendum, emplastrum emolliens cum paululo camphorae mixtum ordinabam. Nec spem felicitatis haec curandi ratio: siquidem tulla inde composita, reliquisque symptomatibus sublati, rursus in partibus extremis plurimae efflorescebant pustulae, quae postea decenti corporis purgatione, subjunctisque in fine unguentis sulphureatis & balneis ex voto deciderunt, pristino cui nitore per unguentum nostrum colmeticum reddito.

Epieris.

Quae praesentem aegrotam graviter vexavit scabies ex intempestivo acicularum usu suam duxit originem. Quod si enim aquae ejusmodi frigidae sub frigido-humida aëris constitutione in copia hauriuntur, non potest non inde liberior transpirationis succellus suspensio, atque magna impuratum salinarum & excrementarum copia colligi; quae deinde, calidiori aëre accedente, cum impetu ad extremam corporis superficiem expelluntur, ubi ipsi sua inflammationem & varii generis exulcerationes produciunt. Jam aequum justumque fuisset, naturae in expellendis & corrigendis his sordibus interna ope succurrere. At vero, quum Chirurgus externis siccantibus materiam corpori insculum retroegerit, non mirum est, pessima suborta esse mala, quae nisi revocatis exanthematibus, & acri materia de novo expulsa abigi non poterant.

OBSERVATIO IV.

Accidit aliquando hic loci, ut tota domus scabie inficeretur maligna, quae tamen in primis maribus in pedibus quae ac manibus miserrime vexabatur. Erat ille quadragenarius, constitutionis gracilis & macilentae, temperamento praedius cholericus, paululumque ad melancholicum inclinante; victu delectabatur duriore, potu consistenti, studisque nemis inveniunt vitam agebat sedentariam: quamobrem non poterat non sanguinem generare spissorem, & deinceps scabie infectus alia longe gravior & diutius de cumbere. Manus enim & pedes innumeri obidebantur pustulis, quae pruritu fere intolerabiles per plures septimas impediabant, quo minus pedibus incedere, vel manibus quicquam prehendere valeret. Enimvero, ad submovenda haec mala venam secandam praebuit, pilulis aliquoties ventrem purgavit, sudavit, & balnea adhibuit, sed sine ullo constanti effectu; ut potius scabiei illae pustulae, quae membra derelinquere videbantur,

Frid. Hoffmanni Oper. Tom. III.

brevi post pleniori resisterent agmine. Ego quum primum advocaret, Carolinarum usum suadebam; hoc vero consilio neglecto, sequenti ratione aegrum divina gratia restitui. Primo omnium praescribebam pilulas lupae compositionis: *Recipe extracti penchymatogi Cralli, gummi ammoniaci, mercurii dulcis, cum absteris nativae preparata, singularem de achmam dimidiam, sulphuris antimonii aurati, felis succini ana grana decem, olei ligni sassafras gutt. decem. M. F. L. a. pilula ex scrupulo uno numero xx. quarum duodecim singulis tribus diebus mane capiebantur, superbausto & interposito infuso veronica calida.* Inde mitigabatur quidem pruritus & pustularum plurimae exsiccatæ squamulas deponebant, sed novae subinde propululabant; & quod notabile erat, in brachiis non minus, ac in pedibus duri & insignis magnitudinis nodi, sub cute desiccantes conspicebantur, qui glandulas tumefactas referebant. Quae quum animadverterem, malum difficulter sanatum iri dixi, nisi grandioribus his tumoribus simul sublatis; eoque sine unguentum illinendum nodis commendabam, quod balsmum sulphuris antimoniatum cum mercurio vivo subactum recipiebat. Interne priora continuabantur remedia, & eni simplici hac methodo, cui in fine balnea subjungebamus, id per Dei gratiam obtinimus, ut aeger à molestissimo hoc adfectu liberatus iotegra redderetur sanitati.

Epieris.

Non raro in artis exercitio observare licet, quod non modo scabies, sed & alia externa cutis vicia valde sicut rebellant, omniumque remedium vim penitus eludant. Quod vero si evenit, non obscurum solet esse indicium, magnam lymphae subesse impuritatem & visciditatem, quae obstruções glandularum vel subcutaneorum, vel mefaraicarum, ipsorumque viscerum pro causa agnoscat, in quarum partium alternata fermentum quasi residet, quod diuturnos hosce adfectus alit atque sustentat. Cujus rei plenissimam faciunt fidem observationes corporum, vel lepra, vel aliis pertinacissimis morbis demoriturum, ubi glandulas praesentem mefaraicas, valde magnas & tumefactas per sepe invenit. Quae cum sit sint, in usum praedicum haec eximia redundat cautela: omnem frustraneam esse sanguinis depurationem, quantumvis alias probatam, nisi id Medicus perficere satagat, ut penetrantioribus ex minerali regno petitis remediis obstruatas glandularum minimorumque tubulorum vias reterat atque recludat.

OBSERVATIO V.

Vir consistentis aetatis gente Judaeus, habitu corporis macilentus incedens, jam per septem fere annos scabie sic laboravit cum pruritu per totum corpus molestissimo, eoque de noctu mirum in modum adaucho. Nihil haecenas profecerant fomes purgationes vel saepius repetitae, nihil scarificationes & venae sectiones, nihil denum sudorifica, utat ingenti in copia devorata, magnoque ubivis pretio à plurimis medicis coemta. Multo magis sanietatis loco res eo devenerat, ut se aeger vera lepra adfectum, & ad mortem usque miserum crederet. Tandem vero veniebat ad me supplex, ut sua miseriae medicamentorum ope finem facerem, quem alias solum mortem esse allaturum credidisset. Ego igitur, singulis

Pp 2

Scabies maligna cum rubeo-actis in rubeo.

Scabies foveo-actis in rubeo.

his probe asinatis, facile augurabatur, tam perver-
sam de nimis liberalem vivendi rationem, tum
iniquas Medicorum curationes, quas possimum
calidioribus medicamentis & decoctis ligni gua-
jaci exsiccantibus succiperant, haftenus exopta-
tum morbi exitum retardasse. Quare ego leiori
procedendum via ratus praecipue omnium in diae-
tae victusque regimine cibos duos, salios, acres
removendos praecipiebam, commendata in potus
locum pitiana ex rasura cornu cervi & radice
scorzonerae confecta. Deinde, ad sanguinem di-
luendum & purificandum commendabam senam
lactis caprini per mensem de ultra mane calide
bibendum; vel huius loco sequens decoctum sub-
stituendum: *Rec. radices albae unciam unam,
rasura cornu cervi uncias duas, herba veronica,
malva, hedera terrestris ana manipal. unum, flo-
rum sambuci pugill. quatuor, seminum cydonio-
rum, papaveris albi ana unciam semis. C. D.* At-
que huius decocti mensuram unam & dimidiam
ager quotidie calide hausit, senem postea sudo-
rem in lecto mane exspectando. Ad alvum aper-
tam servandam potio dabatur mangata, quae
semel in hebdomade haurebatur: unde intra men-
sis spatium non modo pruritus mitigabatur, sed
pustulae quoque siccae iocifera pusillatimque eva-
nescentes, maxime cum balneo aquae dulcis tem-
peratioribus, atque balneo sulphuris amygdali-
no externam simul opem praestabantur.

Epierysis.

Judaei propter genus vitae sordidum, paucio-
rem potum & malum tabaci fumum; imo, quod
maximum est, propter alii inter cibos conestio-
nem facile scabie sicca tentantur, quae licet per
se satis molesta, semper tamen majorem exercet
tyrannidem in subjectis macilentioribus, quae
praefens fuit aegrotis. In curatione rite peragenda
cane pejus & angue fugienda sunt calida volatilia
& serum magis defraudanda, ut scire sunt essen-
tiae calidae & decocta ligni guajaci; quibus non
modo symptomata mirum aegrentur, sed malum
quoque pertinacissimum redditur. Multo magis
ea in usum debent proponi, quae spicula acia in-
volvendo impediunt, quo minus ipsa in partes
sensibiles tam violentem possint agere, & spicu-
lam quasi cutis constrictionem inferendo, sordem
impuram & salinarum exhalationem re-
morari. Verum enim vero, ut eo clarius pateat,
quantum damni sicut ex omnibus calidiori-
bus & acutis medicamentis; ita quam maxime
ex decocto guajacino in corpora scabiosorum re-
dunder, allegare atque huc transcribere placet
singularem & dignissimam notam observationem,
quae *Henrici* ab *HEER* in *abservat. med. pag.*
200. suppeditavit. *Anno 1608. venit ad me juve-
nis temperamento cholericus, lacrimosa, & alius
rimis pervia per totum corpus cute, non aliter,
quam si claris ferreis acutissimis, canabris aut li-
ni instar, pectus fuisset. Credebam illum lepra à
me indicium, vel consilium petitarum, illo enim
leprosiorem per unum diem vidi neminem. Re ab-
initio examinata, invenio illum apud septem chi-
rurgos, guajaci decoctum septies, qualibet vice, ad
dies quadragesima potasse, cumque initio parum ma-
li haberet, tam longo guajacina scobis potu, tantum
non perfectam lepram incurrisse. Saepè etiam ob-
servi melancholicos, nimio guajaci usu elephantia-
cos factos. Tum quoque paucis interjectis curam
suppeditat in hunc modum: jubet illum quotidie
mane summa sequi drachma crystalli montani pra-*

*parati cum succis foliorum nymphae, ribes & ber-
berum, superbibere feri lactis, cum tantillo saba-
prunella, quantum possit. Deinde in stramineo lec-
tulo, sub altissimo molendinis jacere, stillicidium
ex alia in hepatis regione cadens excipere aqua
gelidissima, neque motu, neque solaribus radiis ca-
lescere. Hoc cum mane & vesperi hor a ante cenam,
aliquot dies fecisset, sanguinis & pulcherrimus est
factus. Et profecto, si dicere licet, quod res est,
nihil perniciosius potest excogitari, quam subje-
ctis cholericiis, macilentis & scabie sicca labo-
rantibus decocta guajacina propinare. Causam si
quis quaerat, in promptu est. Etenim, quam exo-
ticum hoc lignum abundanti, etoque subtili resi-
no & acerrimo sale, quod etiam vehementer
mover stercutationem, praeter aliis scateat; judica-
tum facillimum esse arbitror, hoc ipsum fibras cor-
poris, per se jam rigidas adhuc magis intendere,
& de una cum sudore, quem plerumque largitus
mover, bonos succos effundere, qui tum viribus
sustentandis, tum acris salium spiculis contem-
perandis inservire debent.*

OBSERVATIO VI.

Vir XLIX. annorum, temperamento sangui-
neo-melancholico, habitu corporis spongioso &
animo mobiliori praeditus, qui praeter defluxio-
nes catarrhales levioresque talem, in juventute
perpeffam, sub vita sedentaria & moderatiori
dieta nulla sortita valetudinis incommoda ser-
vavit, inopinato scabie corripiebatur saniosa, quae in
simul ac semel increfcebat, ut totum corpus ma-
dore sanioso ferre diffunderet, novoque quotidie
indulso opus esset, ad nimiam humiditatem exsic-
candam. Praeter haec vero, oris sutor aderat in-
tolerabilis fere, & ab admitta frigidiore aura mor-
summe percipiebatur angustia. Ad nos itaque
confugiens uxor ejus sequens reportavit consilium.
Primo omnium praescripti insulsum, quod sequitur
laxans, cuius unciae aliquot per triduum tam ma-
ne quam vespere bibebatur. *Rec. radicis uchi-
ner, pimpinella ana drachmas tres, herba cusu-
ta, epithymi, fumaria ana manip. unum, foliorum
senne sine stipitibus, rhubarbari clesli ana unciam
dimidiam, mannae electae, unciam unam, salis ama-
ri Sedlicensis drachmas sex, cardamomi feripul-
vis drach. C. D. S. Speciei, quae cum mensura aquae ser-
vide per noctem infundantur, salique dein ex-
pressioni, cum aequali portione vini boni Mosellani
remiserantur.* Deinceps ordinavi pulverem dia-
phoretico-absorbentem, ex lapidibus cancriorum,
antimonio diaphoretico, conchis preparatis, sic-
cino, floribus sulphuris & nitro compositum, una
cum infuso theiformi, quod herbas scabiosas, ve-
ronica, hederae terrestris, radices chiochrei & gly-
cyrrhizae recipiebat. Pro potu ordinario adsumebatur
decoctum radices chinae cum pasculis, idque
hac methodo exactis duobus mensibus obtinebat-
tur, ut multum a ferocia sua adfectus remitteret.
Ad plenariam igitur sanationem, quam aeger cum
suis anxie anhelabat, praestandam, exterius com-
mendavi unguentum, ex unguento linbargyrii,
floribus sulphuris & mercurio virgo confilatum,
carpis manuum applicandum; necque tamen alvi
purgatione, neque diaphoreticis sub ejus usu pe-
nitus omisit. Et sic licet omine eveniente, ut for-
da scabie sensim pusillatimque exsiccaretur, &
aeger ex voto sanatus ab eo tempore optime sibi
coadaret, omniumque morborum expertus plures
supra sexaginta annos attingeret.

Epicrisis.

Perquam notatu dignum est, quod adfectus hic pustulosus anno climacterico septenario septimo contigerit: eamque ob rem non inepte climacterica scabies appellari mereatur. Licet vero annorum climactericorum in corpus humanum potentia non adeo sit cognita atque explicita, ut vera ejus ratio cuique pateat; nihilo minus tamen negari minime poterit, his etiam periodis multa notata digna in machina nostra accidere, & varios ingrimis actus depuratorios à natura insinui, quæ, si superantur, ad sanam & longiorem vitam multum conferunt momenti. Sic enim copiosa proflant exempla: sub his climactericis annis diarrhoeas, sudores chronicos, scabies tum siccas quam humidas, hæmorrhoidalem fluxum, aliaque plures excretiones fuisse excitatas, quæ præceter moderatæ plenam sepe & perfectam valetudinem attulerunt. Quod si vero saluberrima ejusmodi crisis in corpore oboritur, circumspici sane methodo opus est, ut ne ullo modo naturam in operationibus suis, ad bonum finem tendentibus, turbemus, ac forte violentia vel repellentibus remediis perniciem sanitati intendamus, quæ nulla unquam opè in melius potest converti. Sicut autem temperata corrigentia & evacuantia in tali rerum statu optima & securissima sunt remedia; ita è contrario nihil potest esse perniciosius, nihil pestilentius, quam externa unguenta, ex sulphure & argento vivo nimis cito & interpeffive adhibere; quibus materia vitiosa foras propellenda ad interiora convertitur, varique generis mala accedunt, ex quibus eluctari, vel nunquam prorsus, vel difficillime licet.

OBSERVATIO VII.

Scabies epidemicæ. Anno 1716. ob æstatem valde humidam & frigidam, à medio Augusti mensis ad finem usque Octobris innumeri fere cujuscunque sexus & ætatis homines in hac nostra civitate, aliisque vicinis locis, præsertim Islebæ, non modo scabie, sed & aliis subcutaneis adfectibus, tum epidemicæ grassantibus insolio plane more, corripiebantur; hoc tantum discrimine, quod scioris temperatæ subiecta scabie potissimum pruriginosa & terpiginosa; spongiosi vero habitus corpora humida potius adtingerentur; atque in multis, ubi malignam induerat faciem, duri sub cute noduli & glandularum, præsertim axillarium tumores jungerentur. Neque etiam pueri, qui vix ante menses aliquot variolosum superaverant morbum, immunes relinquebantur, sed ipsotum alii profundiores, difficillimæque sanationis exulcerationes ad periorum usque experiebantur; alii erysipelate capitis & faciei adfecti, post hujus curationem scabiosi fiebant, malo ab humero ad manuum carpum serpente. Præter hæc vero, quod notabile est, plerique his malis laborantes, ciborum erant avidissimi. Curatio ita maxime fuit instituta & ex voto peracta. Primo omnium natu majoribus insusum vel potio præscribatur temperatè laxans; pueris autem hoc, quod sequitur, purgans: *Recipe pulveris Cornachini scrupulum unum, mercurii dulcis gran. novem, syrapi cicbori cum rhubarbaro drachmas duas. M. D.* Expurgatis hac ratione primis viis, vespertino tempore pulvis dabatur diaphoreticus, *Frid. Hoffmanni Oper. Tom. III.*

qui ex tribus partibus pulveris bezoardici nostri, vel ad Ludovici mentem confecti, & ex una parte æthiops mineralis confusæ, mane autem insusum theiforme, ex herba veronica, scabiosa, fumaris, floribus sambuci, radice glycyrrhizæ & conice ligni sassafras fortillari debebat. Mensis circiter spatium inter hæc exacto plurimis insunctiones præcipiebant artuum & ligamentorum cum linimento quodam exsiccante, ex unguento pomato, æthiops minerali & sanam saccharo compositum. Tandem quoque, ut alfredo cutis & rigiditas in illis locis, ubi pustule stigmata & delormes sui notas reliquerant, tolleretur, videlicet & naturalis corpori color redderetur, sequens unguentum cosmeticum, quod ego in omnibus cutis vitis, ad cujus inequalities removendas, curatione finita utilissimum deprehendi, ad fornacem calidam illinendum commendabam: *Recipe pluvædinis omenti vitulini, aque post hujus collectionem insantis unciam unam, spermatis ceti, cere albae una unciam dimidiam, balsami de Capiva drachmam unam, olei ligni Rhodii guttas decem. M. & per triturationem in mortario cum aqua rosarum fiat unguentum. D.*

Epicrisis.

Omnia pustularum genera frequentius autumnali & vernali proveniunt tempore, ob atmospheram frigidam humidam & subitanæ aëris mutationes, quæ virtuti elasticæ fibrarum, pororum, omniumque meatuum valde inimicæ saluberrimum transpirationis opus facile cohibent: unde ex retentis illis sordibus impuris, salinis, & de novo coeuntibus, tanquam ex fonte pustulosi cutis morbi propullulant. Multo vero magis periculæ ejusmodi excrementitiz in succis vitalibus accumulantes hieme frigido humida; quando ob prægressam calidiorem tempestatem perspiratio fuit intensior. Tum quoque infantes præcipue vernibus solent laborare, quoniam autumnali tempore per fluctus horarum in copia concisus magnam succorum viscidiorum & acidulorum colluviem in primis viis collegerunt, quæ postea, majorem ciborum appetentiam excitando, corruptionem humorum magis magisque promovet. Atque tantum refert, anni temporum constitutiones bene intelligere: quare optandum est, ut Medici ad præternaturales tempestates magis attenti aëris & venosorum mutationes per barometra & thermometra diligentius observarent: qua ratione futurum esset, ut multi graviores & epidemicæ grassantes morbi promtus possent prævideri, congruæque diæta & paucorum remedium opè in tempore averti.

OBSERVATIO VIII.

Vir illustrissimo loco natus, septuagenario major, habitus corporis macilentioris & vasculosi, qui à primis juvenutis annis diætæ vinolæ additus, quotidie tres vel quatuor vini mensuras potaverat; omnem prope vitam, excepsis levioribus, quas catarrhales dicunt molestiis, integra gavissus est valetudine, maxime cum corpus strenue semper exerceret, sanguinemque ter vel quater in anno detrahendum curaret. At vero, quum superato septuagesimo ætatis anno decreta virium robur vix amplius fortiori corporis exercitationi sufficeret, sed vita magis sedentaria eligenda esset, persepe dolorem in hypo-

Affectus cutis leprosum aetate annuam.

chondrio sinistro gravulum percepit, cum respiratione difficiliore; qui tamen mala oedematoso pedum tumore accedente exsuarunt. Commendabatur itaque acidularum Egranarum potus, debito cum regimine vernali tempore insiluentibus; quo per aliquot dies adiuncto mox pedum tumor increfcebat, & exactis sub hac cura quatuordecim diebus ad genua usque ascendebat: iungebatur simul prunus, & ex poris hiantibus ichor viscidus magna in copia promanabat. Omisso acidularum potu nihil minus pedes inflat faccorum tumidi manebant, humorem continuo stillantes tenacissimum, qui in squamas & crustas sat latus coibat, super quas pustule rubiginosae eminebant. Posthac, in femore quoque & brachijs pustulae oriebantur valde pruriginosae, & rodentes, quae scalptu cum digitis cum lacerabant. Ceterum appetentia ciborum integra, spiritatio facilis & praeter vigor satis bene constabant. Durabat morbi vehementia per duodecim fere anni, & haec, quae sequitur, insilliebatur curatio. Interne dabatur laxantia maionia & rhabarberina, iuscula ex carne vitulina & gallinacea, cum viperarum carne, radicibus chiorae, scorzonerae, herba chaeosoli, endiviae, & borraginis decocta: in potus locum subsilliebatur decoctum radice chinae, farfaparillae, polypodi, glycyrrhizae & chiorae cum passulis & pauxillo corticis ligni assafras: nec solum lactis cum succis fumarie, nasturii aquatici & beccalungae alteratum omittabatur. Ex medicamentorum classe singulis diebus mane tinctura antimonijs acris cum essentia pimpinellae & scordii remota; circa noctem vero pulvis praecipitans nitrosus ex aqua ossebatur. Ad exteriorem medellam quod attinet, hanc ipsam quidem initio ferebamus epithemate, quod aquae calcais vivae unciam unam, aquae florum sambuci, plantaginis & spermaris ranarum anaemica portione libram unam habebat, superposito dein emplastro diachilo simplici cum mucilagine medii corticis tiliarum remixto. Tum quoque lintea, decocto huius corticis aquoso immerisa insigni cum fructu applicabantur, & elixirae sequenti insilliebantur unguento: *Rec. litharyrii libram dimidiam, acetii accervini libram unam, nistri purificati unciam unam. Coque per horam, sacra deinde colatura fiat cum sufficiente quantitate olei liliorum alborum, cerussae, tincturae, et hiopsis mineralis, olei tartari per deliquium & liqui Klodii in unctuario unguentum. D.* His tam interne quam externe adhibitis toti corpori pristina redibat mundities, & serenissimus aeger per longius tempus spatium egregia fructuaria valetudine. Verum enim vero, quam stricte ista dieta impatiens non modo cibis plus iusto se repleret, sed vinum quoque sub vita motus experte largius hauriret, factum est prohi dolor, ut sequente hieme frigido-humida maxime sentiret vinum prostrationem, urinam redderet copiosam, albam & turbidam, & pereunte ciborum appetentia, insigni hypochondrii sinistri dolore, tumidis labijs, vertigine aliisque capitis molestijs vexaretur. Neque tamen illustrissimus gravioribus his malis succumbebat, sed denuo convalescens ad veris usque initium spiritum prostrabat, ubi lactu affectus doctissimo in profundum decidebat soporem, qui cum loquace omniumque tam internorum, quam externorum sensuum abolitione iunctus septimo post invasorem die in mortem terminabatur. Secto corpore id notatu dignum erat momentum, quod huiusmodi magnitudinis valde inflatus, turgidus, & liquamine atro-sanguineo repletus fuerit inventus.

Epietris.

Quum ego ad plurimas serenissimorum Principum aulas evocatus saepe consilio & auxilio prodesset debui, propositum habui occasione, paucitatem vivendi rationem penitus cognoscendi, atque varias colligendi observationes, quae sanctorum virorum dietam & valetudinis statum accuratius declarant. Id autem quum maxime annotare mihi licuit: complures, inordinatae licet dietae crebrique vini compositionibus adiectos constanti sanitate fructu gavisos esse, quamdiu corpus motu exercuerint; invalescente vero senio, vel alijs de causis ad vitam magis sedentariam redactos, mox varia valetudinis incommoda, & maxime quidem vertiginem, visus imbecillitatem, apoplexias, pectoris angustias, appetitus prostrationem, molestos hypochondrii, imprimis sinistri dolores, imo antridum & oedematosos pedum tumores incurrisse, scissique post mortem corporibus lienem plerumque ita se praesentasse, qualem supra docuimus. Ratio in proclivi est. Quamdiu enim sufficienti motu & exercitatione succi vitales aequaliter per corpus distribuantur, & saluberrimum se & excretionum negotium in ordine servatur; tandiu perverse dietae noxa facile avertitur, nec statim morbi, in humorum flagrationibus fundati ingruunt. Quamprimum vero, mutato vitae genere mobili in immobile, pristina laeta vinolique dieta continuatur, non possunt sane non, circulo sanguinis retardato, visceribusque sensim infardis, graviora inde mala & fortice valetudinis laciones in corpus redundare.

Ceterum morbus, quo serenissimus noster laboravit, lepram Arabum aeternae videtur; & notabile est, quod huius tam magnus fuerit reperiens: unde nos recte in sententia nostra confirmamus, periculosiores & valde rebelles externe cutis adfectiones nunquam fere non nobilioris eusdem visceris laesorem pro causa & fundamento agnoscere.

OBSERVATIO IX.

Vir XL. annorum, temperamenti sanguineo-plegmatici, dietae addictus crassiori, & in hoc leprosum ^{leprosum} septentrionem versus spoliante aere utrum humido, vappido & scorbuti generationi appropinquante, ante annum & quod excurrit in sinere comprehensus lecto incubuit, in quo forte scabiosus contagii sui miasma reliquerat: unde non multo post in atro ingentem percepit prurum, quem quam digitorum scalptu mitigare voluit, levis intumescencia & tedium materiam humida, colore albede ex poris stillicidium exceperunt. Vocatus Medicus aquae Chirargus facculos herbis discutientibus repletos & in vino rubro coctos applicaverunt; unde tumor quidem remisit & humiditas siccata fuit, sed non modo pruritus idem permansit, verum etiam per periodos, modo longiores modo breviores, acerbis & pungitivi accesserunt dolores. His ita constitutis ordinatae sunt purgationes aeternis diebus repetendae, data decocta larga in quantitate haurienda, & exterius epithemata ex calcais aqua adhibita, sed sine omni saluberrimo effectu; ut potius siccato & repulso scroci exanthemate, nunc in lumbis & pedibus pustulae minime effluerint, quae ingenti pruritu maximam creantur molestim. Tandem & meum implorabatur consilium; unde ego primo omnium, quod ad dietam victu-

viſulque regimen perinet, miſſis falſis, acris, acidis & pinguibus alimentis, leves & concoctu faciles cibos, in refracta tamen portione adſumere, loco cereviſiæ conſiſtentioris, vini & ſpirinis vini decoctum radicis farſaparillæ, eichorei & glycyrrhiæ in copia hauire, & inſuper corpus eundo, curru & equo vehendo, aliſque exercitiis movere ægrum juſſi. Præter hæc vero, circa æquinoctium, quod inflabat, vernaſes ſcarificaciones ſuaſi in dorſo, brachiis ac pedibus inſinuendas, tumque per menſem & ultra curam, quæ ſequitur ſuſcipiendam. Bibebatur ſcilicet ſingulis diebus mane ſerum lactis dulce, vel aqua calca cum lacte temperata, ſumendo ſimul in prandio ad vim ventriculi concoctricem adjuvandum octoginta guttas elixiri noſtri viſceralis, & circa noctem alterius diebus, ad ebullitionem ſanguinis componendam, pulveris abſorbentis nitroſi ſcrupulos circiter duos. Inter hæc ſemel vel bis in hebdomade prima regio laxante pulvere, qui habebatur electi drachmam dimidiam, cremoris tartari ſcrupulum unum habebat, repurgabatur, & demum ſinita hæc cura loci affecti unguento illinebantur, cujus nobis uſus eſt in omnibus ejuſmodi cutis vitis exſiccandis, præmiſſis præſentendis frequentiffimis: *Rec. unguenti de linbarryrio unciam unam, ſorum ſulphuris drachmas duas, olei troſcyami drachmam unam. M. F. unguentum. L.* Atque hæc ratione ægrum divina annuente gratia ſanitati reſtituimus.

Epitriſia.

1) Præſens ægrotus ſcorbutica ſanguinis & humorum dyſcracia laborans, quam ſibi procul dubio viſtu duro, vita ſedenſaria & aeris vappidi uſura contraxiſſe videtur. Næm ea eſt harum rerum indoles, ut ſanguinem ſpiſſum, viſcidum, & ad liberiores per omnes partes circulationem inaptum ingenerent; unde deinceps facillime ſuccorum inutilium excretionem retardantur, multaque ſordes impuræ, falſæ & acres accumulantes, quæ proximam cutis abſceſſum caſum conſtituunt, maxime ſi contagioſa quedam infectio, ut in præſenti hoc caſu acceſſerit.

2) Merito taxandus eſt Medici pariter atque Chirurgi in curanda ſcroti ſerpigine error, dum iniquo plane aulæ ea adhibuerunt remedia, quæ obſtupati cutis poris, liberum materiæ acris exhalationem impediverunt; ut ideo non mirum eſſe debeat, cur deinde non tantum maior prurigo, majorque partis abſceſſus durities ſubſequuta, verum etiam, cur facta materiæ ad alia loca meſtaſi, tam lumbi quam pedes puſtuloſi excrescentiis deſectari fuerint. Longe itaque melius longeque tutius eſt, inter initia ſtatim præſcribere medicamenta, quæ ſanitati inſentiam humorum ſpiſſitudinem diluant, acrimoniam temperant, & obſtruſti cutis poros referendo, malignitatis eliminationem promouent. Quorum ex numero in iis, qui ſerte poſſunt, lacticiſia emittunt, ſive etiam aqua calca vivæ cum lacte temperata, cui jam ab HIPPOCRATE & optimo ipſius interprete, SPONTIO emiſſa in diluendis & depurandis humoribus virtus tribuitur.

Vid. conſulta. med. ſeſſ. IV. caſu CXXII. CXXIII. &c.

CAPUT VI.

De omnis generis ulceribus tam benignis quam malignis præſertim cancroſis.

THESES PATHOLOGICÆ.

§. I.

Dixi in priori capite de illis vitis, quæ ſum-
mam cutis ſuperficiem potiſſimum occu-
pant, variis generis puſtulis, pruriti & in-
flammatione moleſtis exalperant, et odunt, exul-
cerant. Nunc ad ea veniam, quæ profundius ſerpendo, ipſas partes cui ſubjacentes male adſciunt, & ulcerum nomine à Medicis inſigniri ſolent. Sunt autem *ulcera a partium ſolidarum cum æritate quadam minori, ichorem tenuem, ſuſum & acrem fundente, diſſolutionis & craſſioris, à ſero extraſaſo & corrupto originem ducentes.*

§. II.

Diſſerunt ulcera ab abſceſſibus, dum in hiſce major, quam in illis deprehenditur cavitatis, atque non tam ſanies aquoſa, falſa & acris, quam poſius pus laudabile bene coctum à ſanguine in partibus muſculoſis ſtagnante & mora corrupto gignitur; licet negari miſime poterit, ulcera ſepe ex apoſtematibus oriri, quæ in principio meri fuerunt abſceſſus. Diſcrepat quoque verum ulcus à tetra oſſium carie: hæc enim oſſa tantum, illud molliores corporis partes invadit; quinvis in eo convenire videantur, quod utrumque malum materia corrodeute putrida exſionem corruptionemque partis adſectæ inferat.

§. III.

Veram tam abſceſſum quam ulcerum ſedem omnes humani corporis partes laxæ & molles, ſive internæ, ſive externæ conſtituunt. Siquidem, teſtanteſ auctorum ſide digniſſimorum obſervationibus, non modo in capite, facie, naribus, labiis, uvula, faucibus, thorace, mammais, dorſo, inguine & pedibus; verum etiam in hepate, ventriculo, utero, in teſtino recto, pulmionibus, renibus, veſica, meſenterio & pancreate, imo ipſo in cerebro, cujus molliſſima tenuiſſimæque textura eſt, variis generis exulcerationes; roſignantur: etiã ſi probe tenendum ſit, alteram præ altera partem ad ulcera citius ſuſcipienda magis eſſe diſpoſitam, quale quid præſertim in locis, obſcurum canaliſm concurſum ſacculentioribus, inguinum, abdominis, anis, uteri &c. animadvertere licet.

§. IV.

Ulcera inter ſe ipſa diſcrepant: quam differentiam paucis juvabit exponere. Sic alia in profundum abeunt, ut ſunt ſiſuloſa & ſinuoſa, alia in latitudinem ſerpunt, & dicuntur ſerpiginoſa, alia vero æqualitatem ſervant. Deinceps, alia ſunt benigna, alia maligna; & illa quidem, quæ pus non adeo ſtupidum & corruptum, ſed magis album & ſincrum fundunt, remediis quæ facilius obeemperant: hæc vero, quæ ichorem acrem, tenuem, lividique coloris foetidum alunt, & partes conteminas depaſcendo, non tantum pinguedi-

uem & carneas fibras, sed tendines quoque cum ossibus agglutiantur. Atque horum fere singula curata sunt difficillima, & Græcorum loquendi idiomate phagedæna, dyscolpota, chironia & cacoethea appellantur. Possunt igitur moris ulceribus adnumerari debent cancrosum, ex partium glandularum tumore livido, ramulique venarum insignibus stipato conspicua, qui apertus celerissime proferpit, partesque vicinas & substratas putredinosa corruptione depascit, sinus formans & foveas, cum oris labisque turgidis, duris, & interterabili fetore terrique coloris materia junctis. Male quoque indolis esse solent cariosa, ubi ossa incipiunt corrumpi & ita exodii, ac si vermicibus sufflent erosa: id quod & nigredo & difficillima ossium coactio luculenter satis declarat. Refertur hæc etiam debent fistulosa, ex variis sinibus, si-ve canalibus callosis, indolentibus composita, & orificiis sæpius æstis, prædura & callosis cincta; quæ si cicatrice interdum obducuntur, materia copiosa acris, alias querendo vias, novum plerumque orificio foras prorumpit. Sed de his in sequenti capite sigillatim.

§. V.

— causa
formalis
spontanea

Causa ulcerum proxima & formalis à plerisque hodierni ævi Medici acidæ corrosivæ esse naturæ statuunt. At vero, quoniam in sanguine purum acidum nunquam detur, neque ullum ulcus, si sit exedens cancrosum vel cariosum, abforbentibus, quæ acidum facillime tollunt, sanari possit; nec denique fetor acidit præsentiam subindict; veritati magis consentanea illorum videtur sententia, qui omnis in ulceribus exfectionis causam non tam salinæ admixtæ acrimonie, sed potius formalis humoris putredinis adscribunt. Ea enim vis est ac potentia putredinis, ut non modo intestino motu texturam & unionem solidorum plane dissolvat ac destruat, particulisque sulphureis a terrearum partium vinculo secedentibus leetorem excitet teterrimum, verum etiam mirifice sese multiplicando, humores & partes solidas accedentes eadem putredinis labe inficiat, contamineat, corrumpat.

§. VI.

— quæ
generata
decurrit

Verum enim vero, quoniam putredo, motu intestino fermentativo, fecunda salium & sulphuris genitrix fit, minime certe peregrinam salino-sulphuream indolem in ulceribus sinuosis excludimus: odor enim, pruritus & celerissima sanæ partis corrosio ejusmodi salino-sulphureum & acce principium clarissime demonstrant. Tum quoque in putredine vera latet ratio, cur ulcera difficilis sint curationis, ossiumque caries, si semel radices egerit, multo labore longissimoque tempore exterminari vix queat; cum tamen, si simplex tantum acidus & corrosivus humor veram ulcerum causam perficeret, in facili negotio posset corrigi penitusque inverti. Secus autem fieri observamus in putredine, quæ, si semel in corpore siue animali, siue vegetabili fixam occupaverit sedem, ægerime excutitur, sed ulterius serpendo se propagat, nisi corruptæ à sana parte exscissio instituatur. Et quid multa, vel sola ulcerum curatio de putredinis præsentia nos plenius potest convincere. Hæc enim quam medicamentis balsamicis & sale volatili oleoso subtili turgidis, quæ extinguendæ putredini accommodatissima sunt remedia, quam optime perficitur, facile potest judicari, putredinosa esse indolis materiam, quæ in ulceribus præcat, tantarumque molestiarum causam suppedi-

tat. Verum enim vero, quoniam eadem sit sphaceli atque ulcerum ratio, & in utroque morbo putredo accusari videtur; non immerito in questionem venit, quomodo ulcus à sphacelo possit distingui. Nos itaque fundatis adducti rationibus in sphacelo magis puritatem sanguinis corruptionem, quæ propter copiosum alcali celerissime se propagat; in ulceribus autem ferrosi potius laticis corruptionem, qui ob falsedinem, quo scatur, non tam subito in putrefactionem ruit, accusandum esse censemus, nec quoniam facile delicturum esse credimus, si hæc in discernendo cautionem adhibuerit.

§. VII.

Sequitur jam, ut causas, quæ putredinem hanc ulcerosam in corpore suscitant, difficiamus. Jam vero certissima docet experientia, ulcera sæpius à prægressis abscessibus, vel voloribus perperam curatis suam mutari originem. Atque hoc fieri maximeprehendimus, si vel apoplemata non mature aperiuntur, vel si vulnera profundâ foribus non rite purgata nimis cito cicatrice obducuntur. Tum etiam materia purulenta intus retenta in fistulam abijt purulaginem, & sinuositates formando, cum vicinis partibus similem labem communicat. Neque minus ex inflammata quadam parte frequenter apoplemata & ulcera gignantur. Sic enim in tris exercitio non raro solet contingere, ut interna phlegmone pulmonum & pleura in empyema; inflammatio pancreatis, renum, vesicæ, intestini recti & utrumque, in ulcera mali moris transeat. Eodem modo externe ab erysipelas scorbutico, unctuosius male tractato, ulcera oriri jam olim HIPPOCRATES *secl. VII. aphor. 50. & lib. epidem. VI. secl. III. §. 35.* eleganter docuit. In partibus quoque glandulosis tumores duri scirrholi, vehementer dolentes, inveterati, vel male tractati, propter sanguinem nimis viscidum, frigidum & ad dissolutionem ineptum succellâ temporis exulcerantur, & tum perfacile, nisi prudentis Medici opera accedat, in pessimæ indolis ulcera fistulosa & cancrosa degenerant. Cuius quidem rei testes sunt luulentissimi mammae, parotides, glandulae subaxillares, maxillares & colli, mulculo mufoides infiltratæ & sublatæ, nec non glandulae inguinales, quæ ex copiosis & angustissimis canaliculis tam sanguineis, quam excretoriis, folliculisque membranaceis contextæ, ob stagnantem & coagulatum inibi humorem, duritiem induunt, & in scirrhum abeunt, qui perfacile inflammatur, & post inflammationem malignum ulcus relinquit. Accedit demum violenta partium confusio, quam pressio ut aiant pede, humorum sequitur stagnatio, inflammatio & ad putredinem propensio: quam ob rem etiam in extremis maxime partibus, ut manibus & pedibus, à graviore quadam confusione frequentes, easque periculi plenas ulcerationes deprehendere licet.

§. VIII.

Ut vero ulcera violentam plerumque externam causam prægressam habeant; nihilo minus tamen à causa etiam interna, seu viscosa humorum viscerumque labe suam ducant originem. Sic GALENUS *lib. IV. de comp. med. firm. 20.* lienem & jecur male adfectum viscosi humoris in ulceribus genuinum esse causam judicat, & perite addit: his antea provis ad consolidandum ulcus veniendum esse. Neque hujus rei ratio

Difficilis
sphaceli: ab
ulceribus

— causa
mutata

— viscosi
humoris
& mali
periculi

ratio è longinquo erit repetenda. Etenim, quando impeditur sanguinis per hepar & lienem circuitus, fordes excrementarie non satis à massa sanguinea segregantur, non possunt certe non maxime in omnes humores impuritates redundare; quæ dein per stagnationem, in subjectis præteritum languidis, facile ad majorem corruptionis gradum evehuntur. Atque ideo etiam fieri observamus, quod hypochondriaci, mensium vel hæmorrhoidum suppressione laborantes, cachectici, scorbutici, hydropici & hectica tabidi, qui talem viscerum corruptelam intus plerumque a-luunt, præ aliis ad ulcerum generationem sint dispositi. Quo etiam illi debent referri, qui post variolas, morbillos, febres & inflammationes ulcera extrinsecum parium cariosa dyspeptica, internarum parium apoplematoda experiri solent; vix aliam ob causam, quam quod consumpta sanguinis parte balsamica, tenui & nutritia, reliquæ cruor difficiliter circumagitur, ideoque facile in effretam ac putridam abit diathesin; licet non raro usu veniat, ut à prægresso morbo in sanguine materie relicta sit copia, quæ tanta posthæc mala excitare valeat.

§. I X.

Præter hæc vero, ætas juvenilis, infantilis & senilis, habitus corporis laxus, spongiosus seu copiosis & exilioribus vas donatus, temperamentum sanguineo-phlegmaticum, immoderantia in victu, aer squalidus & humidus, & vita laboris experta &c. mirum in modum ulcerum generationi velicari solent. Horum enim omnium ea est indoles acque potentia, ut sanguinem copiosum, & ob languidiores excretiones impurum, multaque humiditate præditum ingenerent: quæ ratione non potest sere non accidere, ut exinde tardior, segnior & impeditior sanguinis succedat circuitus, qui omnis cacochymie & impuritatis mater est fecundissima; sicut è contrario vegeti sanguinis circulus omnes heterogeneas partes à mixtione animali procul arceat, putredinemque egregie avertit.

§. X.

Denique causa ulcerum temeris jure etiam accenseri debet contagium, cujus beneficio plurimæ exulcerationes in sana corpora transferuntur. Enimvero, exillimare quis posset, annon ulcera infectionis contagiosæ sint expertia: at vero, quod ipsa perspicue, accedente immediato contactu, sui indolem propagent atque multiplicent, non modo inoumentis confirmatur exemplis, verum etiam vel unico ex comparatione morborum, qui eandem cum ipsis originem agnoscunt, elucere potest. Non enim rarum, sed in artis exercitio frequenter obvium est, phthirum, scorbutum, luem veneream, scabiem, variolas &c. per familiare consorrium & immediatum contactum in alios derivari; & Severinus *tract. de viperâ pag. 350.* mirabilem refert historiam poelle, oculo corpora infensit, ut plures adhuc alios notari dignos casus silentio prætereamus. Neque adeo obscura est hujus phenomenon ratio. Etenim, quum omne contagium à sola putredine proveniat, omnesque morbi, qui putredinem ulcerosam junctam habent, contagiosi habendi sint; nihil certe dubii est, quin etiam ulcera, quæ putredinosi quid intus alunt, contagio inficere, aliisque corporibus vapore exhalante teterrimo similem intestinum motum imprimere possint.

§. XI.

Provisis omnibus, quæ ad universa ulcerum genera pertinere visa sunt, jam ad singulorum explanationes transiam. Ex his autem præcipua sunt, & quam maxime medicam desiderant considerationem, ulcera caecroformia sive cancri, qui nihil aliud sunt, quam tumores scirrholi dum, in putridam corrosivam corruptionem partis solidæ, quam occupant, abeunt, & plerumque lethales. Ita vero oriri & succrescere solet cancer: Primo nodulus sentitur durissculus satis exiguus, vix pisi, aut avellanæ nucis magnitudinem superans, qui tamen ob spasticam fibrarum adhaesum nervearum stricturam subinde puncturas, arduentes & lancinantes dolores, per intervalla recrudescentes, inferre solet, fatigatque diu in hoc statu persistere potest, donec majorem humoris viscidii & impuri accessu, factaque ibi collectione, canaliculi obstruantur, & demum nimium infasculi rumpuntur. Unde tumor non solum in ingentem sæpius molem attollitur, sed & sanguis in vas coagulato per cutim transparente, colorem prorsus lividum & plumbeum induit, vasque circumjacentia in varicosam turgescientiam explentur. Quæ omnia si ita sunt certique signisprehenduntur, cancer adesse dicitur *oculus*. Quod si vero, vel propter improvidam emollientium & acrim irritantium applicationem, vel ob majorem massæ sanguineæ orgulum, major tenuium humorum adfluxus proritat, & hoc modo coagulum ipsium & acido-corrosivum nimio humido dissolutum fermentationem concipit putredinosam, tunc utrique circumjacentes, & dein etiam profundius sitæ partes sub atrocium dolorum concursu putrida corruptione depauperantur, saniesque & ichor suberosus scissilissimè ac vere cadaverosi odoris funditur; imo quandoque larga sanguinis sinceri ex vas erosi contingit emanatio. Atque talia ulcera *canceris exulcerati* nomine insigniuntur.

§. XII.

Quo majores vires cancer hic exulceratus recipit, & quo magis corruptio increfcit, eo pejora accedunt symptomata, ut sese sunt: hectica febris cum insigni corporis extenuatione, ciborum fastidium, summa virium prostratio, inquietudo, assidue vigilie & anxietates, imo demum crebriora animi deliquia. Etenim, vaporibus putridis per poros & vas venosa reforescit fluidum tam sanguineum, quam nervosum tenuissimum & purissimum inficitur, adeoque tonus, robur & vis partium solidarum systoleica minime labefactatur.

§. XIII.

Occupant præcipue pessima hæc ulcera mammae feminarum, quæ ex copiosis sanguiferis, lactiferis, lymphaticis & valde angustis canaliculis, in sparsæ & plicas coactæ contentæ sunt; ubi quam facillime sive humor sanguineus, sive lacteus & lymphaticus stagnare, colligi, & infusus manens summam actionem & putredinem concipere potest. Siquidem sanguis motu suo privatus in angustis meatibus non aliam, quam iphacelofo-putredinosam alcalinè indolis corruptionem induit; hæc vero & lymphæ subsistens in corruptionem potius acidam & corrodentem abit: quæ dum putredini quodammodo resistit, fieri solet, ut non tam subito, sed per eximiam sepe moram, putrida consumio serpat, partemque vici-

Descriptio canceris oculi.

de opo-

Canceris symptomata.

Canceris mammae symptomata.

nas erodit, & exulceret. Neque vero tantum mammae, sed etiam quaecunque aliae, copiosis vasculis instructae, glandulosae & fibroso-nerveae partes, ut facies, labia, genae, nasus, oculi, lingua, gingivae, membrum virile & uterus, tam extrinsecus quam intrinsecus ejusmodi tumoribus malignisque ulceribus tentantur, quae tamen magis inter excrecentias & carcinomata corrosiva excedentia referri debent.

§. XIV.

Hactenus generalem canceri historiam descripsisse sufficiat. Verum enim vero, quum omnis cancer in principio verus fuerit scirrhus, seu partium glandularum tumor praeternaturalis, durus, asper & doloris expertus; videamus primum, quarum cause ad hujus generationem, sive ad materiae in locis glandulosis stagnationem, spissitudinem & coagulationem contribuant, & deinde, quae scirrhomam duritiem in ulcus convertant. Ad primum quod attinet, crebriori constat experientia, quod semina potissimum, quibus menstrua circa quinquagesimum aetatis annum deficiunt, vel quae spasmoticis hypochondriaco-hystericis pathematibus laborant, facillime diutius illis tumoribus adficiantur: id quod si militer evenire solet virginibus & mulieribus, etiam nondum adeo adultae, si quando diuturna mensium suppressione aegrotant, neque minus us subiectis, quae fluxui haemorrhoidali adiecta, hujus defectum sentiunt. Quod si enim sanguis huc derivatus non externi amplius potest, ad alias partes regurgitat, & deinceps ob languidiorem motum spissior factus, variaeque ad loca glandulis obstita depoluit, facile scirrhum in utroque sexu producit.

§. XV.

Maxime autem omnium tale quid contingere dependendum, si diuturnus moror & acerba tristitia, vel etiam terror inopinatus excitatus concurrat; quoniam nihil fere magis, quam graviora haec animi pathemata sanguinem crassum, & ob transpirationem aliasque excretiones cohibitas, simul impurum ingenerare valet. Et hinc est, quod multi longa tristitia confecti scirrhus in pancreate, mesenterio & hepate habeant, atque foeminarum plurimae ex repentino terrore, circa mensium fluxum oborto, scirrhomam mammarum tubercula retinuerint: quale quid etiam in mulieribus ulcera praebentibus observare mihi licuit, sine dubio, quia hac per terrorem repulsum & in ductibus lactiferis accumulatum stagnando spissum subit coagulatum, & scirrhum procreavit, cujus certa signa saepe non prius, quam desinente menstruo fluxu se manifestarunt.

§. XVI.

Pertinet huc quoque victus durus, austerus & saluus, ut sunt carnes fumo induratae & multum salatae, pisces marini, lentes, pisa, fabae, acetariae, ut & potus parvus & consilientior, cum omnibus reliquis, quae crudum ingenerando chylum, sanguinis massam lentore & spissitudine inficiunt. Longe vero major inde noxa redundat, quando sedentaria & experti laboris vita accesserit: unde fieri observamus, ut virgines vestales & cenobitis inclusae, ob vitam desidiam facile mensium suppressionem & cachexiam; abhinc vero non raro in scirrhus, inipnis mammarum, incidunt. Aliquid tamen simul temperaturae hominis in hoc casu tribuendum est, quae si melancholica

est, & succi in corpore viscosi minisque temperati foveantur; major semper & certior metus est scirrhi, quam in aliis, quorum succi satis sunt fluidi & in justa temperie constituti.

§. XVII.

Neque praeterea in tumoribus glandularum in-
generandis parum sibi vendicat ipsa haereditaria dispositio, quae sicut morbos in vicio solidorum fundatos perfacile ex parentibus in liberos traducit; ita quoque plures ad scirrhomam labem facilius suscipiendam reddit proclives; quod quidem plurimis exemplis familiarum, certa aetate scirrhum & cancerum incidentium, probare possumus, si latius excurrere inditi ferret ratio. Si quid vero denique ex omni causarum serie ad frequentem horum tumorum generationem contribuit, sunt profecto externae violentiae, per contusionem, compressionem, lapsum, puncturam, vel aliam quamcumque vim illatae. Sic enim novi foeminas, quae inter jocos cum marito à sola sororis mammarum contractione loco jucunditatis perpetuum morbum & luctum reportarunt. Sub talis enim contusione, utut levis, vascula minima quasi rumpuntur, & humor folliculis glandulosis inclusus comprimitur, moraque diuturniori spissescit, & in duram massam abit; unde scirrhi origo.

§. XVIII.

Quae scirrhum in ulcus cancerosum convertit
causa, iterum variae sunt, & quidem ex his nonnullae, quas jam attulimus. Tum autem cancer oriri solet, quando scirrhus, qui colore albus est, fit rubicundus, cum dolore lacerante & summe urente, ac si ferum candefactum per partem duceretur. Quod enim si accidit, indicio est, scirrhi inflammationem fieri in margine, & vasis per ipsam decurrentibus, quae adhuc aliquam admittunt circulationem. Dein tumor fit cinerius & lividus, & vasa sanguinea varicosa atro sanguine turgida intra cutem & pinguedinem apparent. Denum talis tumor aperitur & labia acquirat praenecida, aspera, retortida, dura & inaequalia, sanien fundens putridam tecti odoris atque tam acrem, ut adjacentes partes & linera exeat, quasi essent combusta. Unde facillimum judicatum est, quod inter causas cancerum inducentes primo omnium referenda sit inflammatio, & ad hanc quae conferant causae, scirrhum quoque in cancerum possint convertere. Ex harum vero numero sunt: sanguinis, ob deficientes menses & haemorrhoides major ad partem debilem adflectam regurgitatio, nimis animi & corporis motus; ex alimentis dura, salia, acris, allisceae, aromata, piperata, fructus acidi, acerbis, austeri & immaturi copiosius comesti, item quae alvum constringunt; ex potulentis spirituosae, ut vinum & spiritus vini, ad ebrietatem usque hausta; ex medicamentis interitis omnia exagitantia tam sudorifera, quam fortiora purgantia, ex externis omnia caustica, vesicantia, humefactantia & emollientia; & ex reliquo vitae regimine aer frigidus borealis, improvide laboranti parti admixtus. Namque haec omnia ita sunt comparata, ut humorem motum ad partem scirrhomam magis determinando, facile inflammationem, quae proxima veri canceri causa est, excitent atque accendant.

§. XIX.

§. XIX.

Quæ au-
tem re-
solvuntur.

Longe vero citius longeque certius scirrhī in cancrum sit mutatio, si ægroti sunt cachectici, vel ad talem provecti ætatem, quæ impuris & terrestribus succis in corpore progignendis favet: quoniam sub tali corporis dispositione indes malum augetur, tantum abest, ut medicamentis obediens quicquam de ferocia sua remittat. Contrarium vero contingit in euchymia, seu bonos humores habentibus, in quibus cancer occultus per plures annos tolerari potest, si modo omnia motum sanguinis nimis augmenta provide caveantur. Ita TULPIUS recenset exemplum femine, quæ per plurimos annos in sinistra mamma durum & inæquale gessit carcinoma, sine ulcere, sine ulla graviore noxa; donec tandem incrementum post tot annos dolore & pruritu malum hæcenus quietum à medicamentis erodente per empiricum applicato in carcinoma ulceratum brevi degeneravit, cum labiis inversis, crusta cinerea, sinu deformi, tubere inæquali, colore livido, sanie cadaverosa, acerbissimo dolore, vigiliis, animi deliquis, aliisque conclamati cancri nota. Præter hæc, notatu dignum est momentum, quod in sequiori sexu scirrhī ut plurimum non prius in cancrum inclinent, quam mensibus per ætatem terminatis, sine dubio, quia tum temporis plurimæ feminarum sunt cachecticæ, & sanguis, qui antea salutariter excretus fuit, nunc retinetur. Quantum autem saluberrima mensium excretio in tali calu præstet commoda, inter alios testis est BALLONTUS, qui lib. I. epid. pag. 57. exemplum profert abbatissæ, mammarum scirrho laborantis, cui sub nimio menstruorum fluxu mammae detumuerunt, & malum miscere visum est, suppressis autem mensibus denuo increvit.

§. XX.

Scirrhī &
canceri utri-
usque descriptio.

Quod speciem ad malignum uteri scirrhū & cancrum atinet, hujus quoque causæ breviter erunt suppediandæ, præmissa tamen antea divi hujus mali historia, quæ ita se habet. Primo dolor oritur in inguine continuus, qui sensim paulatimque totum hypogastrium ab osse pubis ad umbilicum usque occupat; hunc postea sequitur glandularum, circa collum uteri, & maxime orificium ejus internum confidentium tumor durus, compressioni renitens, rotundus, inæqualis, qui, si contractetur, ad ægræ sensum dolore pungitivo molestus est. Urina redditur crassa, confusa, & alvus ingestis minus respondens adstricta est. Si inflammatio accedit ulcerosa, crebra ad lipothymias, utut leviores, adeit propensio, materia profluit putrida, fetida & saniosa, flavi & cineritii coloris, cum sanguine mixta, quæ adeo acris est, ut non modo uteri membranas ardat, sed & ad intestinum rectum descendens hoc excedat, ut sterora cum flore uterino prodeant. Ingravescente demum malo, pulsus fit magnus & celer, accedit tabida corporis consumtio, seu atrophia, jungitur febris hectica, & tandem omnium miseriarum finis, mors. Sectione post mortem instituta uterus inflammatus & sphaerulatus cum infami odore deprehenditur, & perrupto utriusque pariete, in vesicam & intestinum rectum aditus sapissimè patet; unde urina cum fœda uteri sanie, vel cum alvi excrementis commixtio.

§. XXI.

Inter causas ad terribissimam hæc adfectionem concurrentes præcipue referri meretur diuturnum fluxus albi stillicidii, vel mensium fluxus suppressus in feminis melancholicis, hypochondriacis, cachecticis & ætate provectionibus. Sæpe etiam talis scirrhosa uteri labe subornatur, si nimius mensium fluxus adstringentibus improvide fuerit cohibitus; unde etiam ovarium & Fallopianas tubas scirrhosæ occupat & sæpe sterilitatem mulierum perpetuum infert; sicut aliquot mihi cognita sunt exempla. Præcedit quoque, præsertim in puerperis, uteri inflammatio; quare in artis exercitio frequenter annotare licet, quod pars uteri inflammata, ob frigus externum accedens, quam facile in scirrhū abeat, qui dein exulceratus cancer uteri fit insanabilis. Idem quoque malum experiantur mulieres post exaltatum difficultatem partum, quo uteri, ejus colli & vaginæ parietes nimis compressi persicilie duritiei contrahunt, quam succellu temporis verus cancer sequitur.

§. XXII.

Hic ita expositis, quæ ad ulcerum cujuscunque generis generandū modum pertinent, sequitur jam, ut in prognosi serenda proprias notas explicem, quæ vel spem, vel metum insinuant. Hoc autem in genere notari velim, omnia illa ulcera, quæ in articulis, capitibus muscularum, malleolis, tibis, partibusque tendinosi & nervosis tam pedum quam manuum oriuntur, temporisque diuturnitate vel in fistulas, vel cariem & consumptionem totius partis abierunt, nullius, aut difficillimæ esse sanationis; quoniam ob doloris acerbitatem in ejusmodi locis nec secare, nec canales ampliare licet, sed partem adfectam abscindere præstat, si quando æger talem operationem sustinere & velit & possit. Pariter quoque in lingua difficillimæ sunt sanationis ulcera, ob continuum, quod juogi solet spiritum viscidū & glutinosū laticis, difficulemque deglutitionem & doorem lancinantem, qui ad aures lateris adfecti quandoque porrigitur: unde verissime scriptit CELSUS lib. VI. cap. 12. quæ in latere lingua nascuntur ulcera, diutius durant. Pestima quoque sunt aurium ulcera. Præcedere hæc solent inflammationes & dolores intolerabiles fere, qui teste CELSO ad dementia morientemque ipsam non raro præcipitant: id quod potissimum de juvenili & virili ætate, non item vero de infantili, valet. Propterea itaque inter initia succurrendum est hisce ulceribus, quia, si inveterata fuerint, & putredo jam ipsa ossa infecerit, plerumque sanationi nullus superest locus. Perinatiter quoque medelæ resistunt ulcera, quæ narium & facium ossa, uvulam, ossiumque capitis sinuositates, in nares se terminantes occupant, præsertim si ex luis venerent, & scorbuti male confirmati reliquis oriuntur, quod genus morbi Græci ozanem appellant. Plurimum vero crustas odoremque fœdissimum habent, & tenerima ossicula per cariem in fragmenta resolvunt, quoniam ad affecta loca latentia virtus externorum minus apte potest peringere. Demum quoque prava sunt inveterata parotidum & glandularum maxillarum ulcera: persicilie enim in fistulas degenerant.

§. XXIII.

Præter hæc curatu difficillimis accenseri debent, quæ vesicæ innidulantur ulcera, & ex assiduo peri. &c.

Prognosis
ulcerum
generis.

Prognosis
ulcerum
capitis &
peri. &c.

perinari dolore, crebriori, & dolorifico mictu atque sedimento urinæ sanisimo gravolente cognosci solent. Aegerrime enim ad ipsa remedium accedit virtus, & omo modo liquorum injectiones facile laedunt partes, sed & perpetuus urinæ acris affluxus consolidationem impedit. Accedit, quod vesica Veterum loquendi idiomate pars frigida, seu pauci sanguinis particeps sit, ad quam nec interna quidem remedia facile possunt penetrare. Ardua identidem est intestini recti prope sphincterem ulcerum sanatio. Facile enim callosa, profunda & fistulosa fiunt; & ob continuum sordium & humiditatum adfluxum & transitum exurguntium & consolidantium emergia labefactantur. Ulcus quoque in urethra ex gonorrhoea natum non exigui est momenti, & nisi cito curetur, pessime junguntur carunculae, quæ urinæ motum obstruunt multum facili negotio. Non tamen vesicæ & urethrae ulcera, ut facile fit, soter se confundantur, sciendum est, in hisce pus urinam præcedere, & dolorem inter omnem mictionem acerbum adesse, membrum tensum fieri, & ad infernum curvari, cum è contrario in vesicæ ulcere non tam siveus & continuus inter mendum in urethra adsit dolor, nec pus sensim, sed cum urina excernatur, lotiumque fæcat.

§. XXV.

— ulcerum
à causa
interna.

Tandem in genere & axiomatis instar practici habendum est, omnia ista ulcera, quæ ex causa proveniunt interna, & magna fucorum serosorum impuritate sustentantur, nunquam sere non difficilis esse sanationis. Tellantur hoc ulcera semina, scorbuticorum, hydropicorum, cachexia laborantium, vel ex hæmorrhoidum & mensium defectu ægrotantium, in quibus depravata & à naturali crali longe multumque deflectens sanguinis & humoris est conditio, quam nisi quis susceperit, quod tamen longum requirit tempus, incassum laborabit. Optimus medicinae parens HIPPOCRATES sua jam ætate id ipsum satis intellexit, quare de hydroicis hæc ait Selt. VI. apbor. 8. ita censet: *agna inter eorum laborantibus exorta in corpore ulcera non facile sanantur.* Cui addentur GALENUS, qui lib. V. de atra bile per elegantem scribit: *ubi adsit calida intemperies, aut lienis vitium, maligna sunt ulcera, & difficiles curationes, quia corruptis visceribus ingens continuus impuritas succi infunditur.*

§. XXVI.

Prognosis
certa.

De cancro utroque breviter sequentia annotasse juvabit: scirrhus quo cordi est proximior, & quo majora habet vasa arteriosa, eo plus est periculi, ne in cancerum abeat; quo minor vero est, & quo minus asper, eo melior. Cancer quo deteriorior spirat odorem, & quo magis corrosivum fundit saniem, eo pejor est. Tuo enim vera adsit putredo. Elidendum autem est canceri periculum ex loci, in quo residet dignitate & ad vitam necessitate. Sic enim pejus est cancerosum ulcus internum, quam externum, idque eo magis, quia intus nec licet scire, nec utere, nec aliud quidquam tentare. Præterea, omnis cancer in ea parte, ubi glandulae plures communicant, est pessimus, & facile ad aliam partem transiit. Ita scimus, quod mamma una extirpata malum ad alteram perpexit, sive axillares glandulas occupaverit. Hæmorrhagiæ quo largiores sunt, ut sæpe fit ex utero cancroso, eo celerius ægroti intereuntur; id quod similiter

fit, si febris lenta & hæctica accedunt, & crebriora animi sunt deliquia, quæ mortem plerumque post se ducunt.

CURATIO.

§. I.

Qui ulcerum curationem susceperit est Medicus, primo omnium debet animadvertere, num à causa interna foveatur, & utrum plethora sive cacochymia præfens sit. Hæc enim nisi prius amoveatur, omnis externorum usus, vel exigui, vel nullus erit effectus. Quod si igitur simplex adsit plethora, quæ felicem curationis successum impedire videtur, sanguinis copiam vel venæ sectione, vel in laxioribus subiectis scarificatione juvabit detrachere: sanguine enim deficiente secundum HIPPOCRATEM lib. de humoribus sect. XI. §. 7. *ulcera gracilescunt, sciciora sunt, & nimia: prohibet enim hoc maxime, talia ulcera humectari.* Quin etiam in nonnullis sola fusticorum applicatio ulcerum consolidationem permultum adjuvat, quia tali ratione ex parte feri impuri fit derivatio, ne tantus fiat humorum ad ulcera adfluxus. Quoniam tamen à coniectis sanguinis evacuationibus sive per menses, sive per hæmorrhoides suppressis ut plurimum molestat illic cutis & carnis defordationes oriuntur; videndum est, ut, quantum licet, solennes istas excretiones in ordinem reducantur. Quo fine vel rem pedis sperire, vel in viis hirudines ano imponere expedit, quarum usum jam probatum invenit AVICENNA teste Guidone tract. VII. de plebot. cap. 1. *hirudines, inquit, profunt in ulceribus malis emmorrhoricis & difficili maturationis, inque partibus, quas teneritudo veretur attingere, quales oculi sunt & nares, & gingivæ, pudentia, manus, pedes & partes deinde carne, ut junctura, & denique in pueris.* Necque daim præter hæc omittenda sunt medicamenta interna, sedatæ has excretionis revocantia; quæ virtute ipsius pilulae leniter aloetica, ad Becheri, Stablii & nostram methodum confectæ, splendete solent.

Cancer
interius
situm
sanguinem
molestum.

— fustica
—

§. II.

Tum quoque, præsertim in rheumaticis subiectis, serum copiosum impurum, quod nocens suo adfluxu consolidationem moratur, per alvum debet educi: quam in rem egregia sunt verba HIPPOCRATIS loc. cit. sect. IV. §. 6. *depurgatio ventris diarrhoea plurimis ulceribus confert, & in vulnibus, quæ sunt in capite, & in ventre, & in articulis, & in quibus corruptionis periculum est, & in his, quæ cuncta sunt, & in exadentibus ac serpentibus, & in aliis inveteratis ulceribus.* Quoniam tamen non omnia promiscue pharmaca hoc fine profunt, ea maxime in usum deest vocare, quæ balsamica & simul aperiente pollent virtute, ut sere sunt infusa vinosa, ex speciebus balsamicis & leniter laxantibus confecta, nec non pilulae sic dictæ balsamicae, ex extractis amaricantibus & gummatibus balsamicis paratæ, atque interjunctum cum mercurio purificato remitte, quæ repetito usu eximiam præstant opem. Quod si autem in ulceribus curandis purgationem vel phlebotomiam varie præbent circumstantiæ, magnam profecto præsidium residet in abstinentiæ, seu mediæ curæ, quæ humores superabundantes minuit, impuros depurat, lentosque & viscidos dissolvendo, hos ad trapiendum per minimos vires

— pro
tumidum

viscerum canaliculos aptiores reddit: quam ob rem ab antiquissimis medicis temporibus simplex hæc curandi methodus magno in pretio fuit habita, & a nobis quoque in omni cachochymia evitenda summo cum fructu adhabita sapientissime.

§. III.

Quando speciem scorbutica, salino-vici-
humorum dyscrasia causam ulceribus & nutri-
mentum suppeditat, vel si pessimæ lui vene-
reæ reliquæ accusandæ sunt, nec datur melior,
neque securus hisce malis occurrendi methodus,
quam per decoctæ sanguinem depurantia, largi-
ori in copia haurienda, quibus in languidio-
ribus subiectis, si præteritum venereæ scissillule
emicare, quajacum potest adici, cujus sal tenue
resinosum cum copiosa aqua in sanguinem dela-
tum, fibras vasorum animando, viscosos humo-
res attenuat, & per omnis generis emunctoria
egregie educit. Quis quidem in re & mea ip-
sius experientia, & Nic. MASSÆ subactum ju-
diciū, in epist. XXX. prolatum, satis me
confirmat, ubi insignis hic auctor ita dixerit:
*decollio ligni indicis per conveniens tempus, vide-
licet per quadraginta dies, summe necessaria est.
Darem vesperi & mane cyathum unum aqua pri-
mæ decolionis; secundo vero decolionis aquam
darem ante prandium & per totum diem ad libi-
tum, etiam in nocte, si bibere valuerit, quoniam
hoc universale est, maxime in ulcere diuturno,
quod quanto plus eger biberit, tanto melius libera-
bitur.* Non raro autem incidit, ut in scissillimis
ulceribus, ex venereæ maxime lue oriundis, hæc
decocta non sufficiant: quare tum omnino ad
potentiora tam antimonialia, quam mercurialia
remedia deveniendum est, quibus sine molesto
salivæ profluvio gravissimi hi morbi sanantur tu-
tilissime. Spectant autem hæc mineralium familia
huc maxime tinctura antimonii acris, regulæ
antimonii medicinalis, cerussæ antimonii &c. &
mercurius noster diaphoreticus, cujus parandi &
adhibendi modum supra jam in cap. de lue ve-
nereæ satis ostendimus.

§. IV.

Si quid vero ex omni interiorum remedio-
rum classe ad curationem ulcerum feliciter per-
agendam multum contribuit, est profecto aqua
vel pura, vel spiritu minerali imbuta, quæ li-
beraliter hausta scorbuticæ sanguinis impuritati
emendandæ apprime quadrat, atque ideo ab
HIPPOCRATE lib. de ulcer. sect. I. §. 8. eximie
commendatur, dum adserit: quod modicus ci-
bus & aqua quam maxime omnibus ulceribus
conducerent, magis tamen recentioribus, quam
vetustioribus, & si quod aliud ulcus inflamma-
tum esset, aut inflammationem minaretur, vel si
periculum esset corruptionis. Nobiliorum autem
virtutum unique exferunt in ulceribus omnibus,
inque maxime a viscerum quadam labe profici-
entibus sanandis acidulæ & thermæ, ut nomi-
natum sunt acidulæ Egræ, Pyramontæ, Spa-
danæ, Selteranæ, & thermæ Carolinæ, quarum
usus in tali casu penes omnes scriptores est decan-
tatissimus, & effectus longe saluberrimus; siquid-
em copia & fluxilitate sua obstructos meatus re-
ferant, viscidos & falsos humores diluant, & im-
puritates per alvum & urinam commodissime
elimant. Exemplo sit vel solum ulcus vesicæ,
quod inter rebellia & pertinacissima solet refer-
ri, & nibilo minus fontis Spadanæ, vel Sel-
terianæ. Hofmanni Oper. Tom. III.

terani cum lacte usu persape feliciter sanantur.

§. V.

Perlustravimus hæcenus ea, quæ internæ ul-
cerum curationi subveniunt; nunc, quæ extrin-
secus opem ferant, dispiciamus. Jam vero in
omnibus fere ulceribus quadam occurrunt im-
pedimenta, uti sunt foridities, inflammatio, hu-
morum adfluxus, carnis excrecencia, scissus,
necnon cavities, laboriorum durities, caries, ossis
fragmenta & similia, quæ prius sunt removen-
da, ante quam à sarcocicis & exsiccantibus lau-
dabilis sperari possit consolatio. Primo autem
omnium expedire inflammationem tollere, de qua
GALENUS meth. lib. IX. cap. 12. hæc præcipi:
*Si ulcus carnis junctum sit cum inflammatione
partis circumstantis, nisi inflammationem auferes,
ulcus fiet fordidius & magis carum.* Atque tali
in casu consistit internæ dyscrasie humorum
cum aqua florum sambuci exhibitum; extrin-
secus vero parti adhaeræ saturnina cum campho-
ra decet admove, quæ omnibus reliquis in tali
negotio sunt anaeferenda: sicut contra in rheu-
maticis ulceribus, ubi perperitus in partem im-
becillam feri adfluxus consolidationi resistit, sac-
cie siue ligaturæ, vino aultero rubro imbutæ,
totique membro involutæ, partem firmam &
hostile humidam averte, omne absolvent
punctum.

§. VI.

Si ulcera sunt dyscrasie, & labia nimis
humida cum cavitate paulo majori, vinum cum
lichargyrio, thure, myrrha, bolo &c. coctum
excellenter se gerit. Quod si autem nimia, quæ
in agglomerate magnoque ulcere adest, cavities
ignis scatet foridus, quæ agglutinationem
prohibent, ad mundificandum totique ichores
absorpendos spiritus vini injectio, præsertim in
putridis & senilis experibus antiquis ulceribus
optima est, cujus usum in tali casu efficacissimum
deprecatur VALLERIOLA lib. P. obs. I. his verbis:
*mira profecto vis est in detergendis ulceribus &
glutinandis, præsertim nervosorum partium, ut
diuturna observatione nobis est comprobatum, qua
nihil proficiamus. Idem quoque probabilissimum
auctor loco citato in sinusque magnis ulceribus ef-
ficacem commendat injectionem, quæ quia uti-
lissima, crebroque usui a nobis explorata est, huc
transcribi meretur: Rce. ligni sancti subtilissimo
pulverisati, corticis ejusdem ana uncias duas,
aristolochia longa, centaurii minoris, absinthii,
agrimoniae, canle equine, foliorum oleæ, myrrhi,
pompinellæ, consoldæ majoris ana manip. unum,
cort. thuris, myrrhæ, sarcocollæ ana uncias dimi-
diam, vini rubri libras tres, mellis despumati un-
cias quatuor. M. fiat omnium decollo: ex cu-
jus colatura fiat injectio in ulcus, addendo hora
injectionis aqua vite eadem unciam unam pro qua-
libet vice. Quandoque etiam, ubi ingens foridi-
ties, putredo & corruptio adfuit, ego aquam,
cum viride æris decoctam, aut lixivium scorru-
ti regulæ antimonii, eximium tulisse opem me-
mini. Mox enim hæc ipsa corrodat & nigre-
dinem inferunt, sicut in unguento ægyptiaco
animadvertere licet, quod dentibus admovent,
hos protinus nigro colore inficit.*

§. VII.

Ad duritiem & carnis excrecenciam exstir-
pandam, nihil adhuc præstantius invenit lapi-
de infernali, & mercurii præcipitati, alumina-
tis & nigris.

Remedia
ad internam
curationem
ulcerum
adhibenda.

Remedia
ad externam
curationem
ulcerum
adhibenda.

Remedia
ad internam
curationem
ulcerum
adhibenda.

— decoctio
parochian-
tibus.

— remedia
ad internam
curationem
ulcerum
adhibenda.

— aqua
communi
& mercurio.

niſque uſi pulvere. Caries autem, quæ tam of-
fiſibus quam ulceribus ſumma eſt perniciæ, ſeli-
ſſime ſæpe, licet diſſicillime, tollitur oleo puro
& minus fucato caryophyllorum, quocum ali-
quoties, non neglecto internotum uſu, invete-
rata & pro inſanabilibus habita narium & ſau-
cium ulcera ævoto perſanavi. Miſiſce enim
oleum hocce æthereum puredini reſiſit, & ſub-
ſtantiæ ſuæ in minimis oliſum rubulos penetran-
do, ulteriorem putredinæ progreſſum impedit.
Sed neceſſe eſt, ut in tempore & proxime ad-
fecta parti adhibeatur, ſi inde auſpicatus obti-
neri velit effectus. Quod ſi autem admodum
magni & profundi adſunt ſinus, & ſicut in ſiſtu-
lis, canaliculi ocullei hinc inde diſſorti, tunc cer-
te res majorem exigit dexteritatem, & optimum
ſolet eſſe annilius, ut oculcule & latebroſe hæ
vix vel diſſcindantur & aperiantur, vel etiam op-
portunis turundis, amplexor, quarum omnium
opina & per diſcurſum experientiam probata
eſt, ex oleo & cera aſſatis facta & compreſſa.
De ſcirrhis autem & ſiſtularum calloſitatibus in
ſequentiſ ſcôrſim dicetur.

§. VIII.

Remotis igitur obſtaculis, quæ ſanationem
prepediunt, aggredienda eſt ipſa ulcerum occlu-
ſio & curatio, ubi ſtatim ſe oſſert quaſtio, an
ſtatim ſarcoticis exſiccare, an prius prius movere
conveniat. Quod ſi vero meam interponere li-
cet ſententiã, minime certe pro ſanando ulcere
protinus topicis ſiccantibus uſi ſtauo; quæ qui-
dem in re inter alia plura exempla confirmat me
inſignis SANCTORII locus, quon de Indicantium
aquilibus lib. XV. cap. 7. habet: viduunt in
Hæmorrhoidibus, qui ex huius morbi inſeſ-
ſum miſerunt ulcerum arum hominum te aliovi. Hic
erat miles ulcere ſordidiſſimo cum phlegmone cor-
reſeque; empiricum utebatur exſiccantibus. Hu
ulcus modo videbatur ſanari, a modo ſordidiſ
& magis cavum eſſe, & nunquam poterat ad
ſanationem pervenire. Tandem me in conſilium vo-
cavit. Novi inflammationem magis valere, quam
ulcus & cavitationem, eamque alio modo non tolli
quam ſuppurantibus. Juſſi itaque, ut ſarina, lœ,
& pinguedines applicentur, poſt quorum uſum
brevis apparuit albus pus, quod erat ſignum, hu-
mores eſſe commoſos & ſuppuratos. Atque utiliſ-
ſima hæc curatio, in quavis ulcerum curatione
merito debet attendi, perſeque generatio exſicca-
tionis præmitti, ſi modo caveamus, ut ne un-
guentis pinguibus id perſiciamus, prout rectiſſi-
me docet HIPPOCRATES lib. de ulcer. §. IV. qui
oleum & quæcunque mollia aut oleoſa medica-
menta ulceribus applicare negat, niſi jam valde
ad ſanationem tendant. Multo magis totum cu-
randi negotium eo redit, ut in ulceribus, quæ
nervofas, tendinoſas & membranofas partes oc-
cupant, metâ ballamica adhibeamus, ex quibus
eminent eſſentia ſuccini, balſamus Peruvianus,
ſulphuris, oleum hyperici & ſimilia, quæ vel
ſola, vel melle temperata omnia explent, quæ
ad expeditam conſolidationem contribuant. Si
vero carnoſa loca patiuntur, unguentum ex te-
rebintina, gummi elemi, myrrha, vitello ovi
& melle conſectum omne abſolvit punctum.
Demum, ad incarnationem præſtantiſſimum eſt
balſamum Peruvianum; & ſi nitrâ adſuerit hu-
miditas, terra viſioli dulcis, oculi cancerum vel
anthonium diaphoreticum inſperſum in exſic-
cando egregie ſe gerunt. Neque emplaſtris care-
re poſſumus, ex quibus ſaturatum, diapompho-

lygos, opodeldoch & ſtipiticum maxime in pen-
ſenti negotio debent commendari.

§. IX.

Sunt quoque, præterſim Chirurgorum pluri-
mi, qui cataplaſmata in ſanandis ulceribus mul-
tum prodeſſe contendunt. At vero, quid de
horum uſu ſtanuendum ſit, edocere nos poterit
HIPPOCRATES, qui lib. de ulcer. ita perſe diſſe-
rit: quædam ulcera cataplaſmata ſerre nequeunt,
magis autem recentia, quam vetuſtiora & quæ
ſunt in articulis, & in lib. de medico ſect. X. §.
4. hæc habet: cataplaſmate per ambum ulce-
ris utaris. Nam hic uſus cataplaſmatum & ar-
tificioſus eſt, & multum prodeſſe poſſe. Vide-
tur enim ulcera opſulari viſi eorum, quæ cir-
cumponuntur. Linteum autem contendendum eſt,
ac emolliendum, quia partibus extra vulnus cir-
cumſiſtis cataplaſma prodeſt. Quibus divus ille
Senex videtur innuere, non eſſe hoc remedi
genus proxime parti adſicere, quam potius ad am-
bitum ejus adſpiciendum. Si quidem cataplaſma-
ta, ex herbis diſcutientibus, ſale tenui oleoſo
turgidis & in vino coctis parata magnam obti-
nent potentiam, humores in vaſis vicinis ſlag-
nantes corrigendi, & ballamica virtute ad prom-
torem motum melioremque temperiem redu-
cendi, ſicut vel unice in diſcutiendi tumoribus
licet animadvertere.

§. X.

Aggredimur jam morbos diſſicillimos ſanandos, ſcirrhum atque cancerum, quæ ubi ſemel
vires ſunderunt, omnem reſponſentem artem ad le-
tuum ducunt miſerum ægrotos. In ipſis au-
tem, ſi internam ſpectamus opem, omnia pro-
pe ſimiliter conveniunt remedia, quæ in gene-
rali ulcerum curatione prodeſſe diximus. Pro-
fundum enim decoctâ diluentia & ſanguinem purifi-
cantia, proſunt diaphoretica & lenior laxantia,
ut ſere ſunt potiones, quæ ex ſoliorum ſennæ ſine
ſtipitibus drachma una, rhubarbari electi ſcrupu-
lus duobus, cremoris tartari drachma una & di-
midia, manne electæ uncia una & ſemis, iu-
icem in aque communis uocis octo ſolutis pro
una doſi conſici poſſunt; non excluſis demum be-
ne præparatis mercurialibus, quæ ad lympham
viſcidam & ærem diſſolvendam ac corrigendam
poſcente neceſſitate tam laxantibus in forma pila-
lari, quam ſudoriferis poſſunt admitti, ita ta-
men, ut ne corpus fortiter commoveant, ſed ut
tantum humores ſpiſſos & ad coagulatum pronos
liqueſciant: nam omnia motus augentia hic ca-
ne pejus & angue ſunt ſugienda.

§. XI.

Quod attinet ad uſum externorum, quæ in
duris & ſcirrhoſis glandularum tumoribus, can-
croſum virus in ſinu ſoventibus, ullo modo ſper-
petias ſerre, verumque ulcus cancerum aper-
tere poſſunt; ſcire licet, ſi unquam, certe in hiſce
carcinomatibus, accipitis eſſe eventus remedia
externa; utpote oleoſa, pingua & emollientia,
corroſiva acris, ſpiritoſa volatilia & campho-
ra, quæ alias in inflammationibus & ſphacela-
tionibus arcendis præſtantiſſimi ſunt uſus, ma-
lum plerumque exasperant & citius interficiunt.
Ex omnibus vero, quæ innoxia deprehendimus,
eminet emplaſtrum Barbette ſaponatum, cum
camphora & oleo hyſocyami malaxatum, nec
non reſolvens Joannis Agricole, quod in chi-
rurgia eſt parva deſcriptum exiſtit. Quo etiam
pſi-

Cataplaſ-
matum
uſus.

Sicut &
omniſ
remedi-
um.

Scirrhi
moleſe ex-
ternæ.

Sanatio
an pri
moveri-
bus pro-
mittenda?

pertinent emplaftra & linimenta refolventia temperiora, ab HILDANO commendata, quæ neque ex nimis calidis & acerbis, neque ex nimis mucilaginosi & pinguibus conflata medio quasi modo se habent, & ita parantur. *Rec. gummi ammoniaci unciam unam, olei amygdalarum dulcium, liliorum alborum, pinguedinis gallinae ana uncias duas, succi cicute uncias quatuor, aceti scillitici uncias duas. Misce & digere per diem & noctem, denique igne tractes, ne nimis cito succus & acetum absumentur, & spissum fiat linimentum.* Sic etiam tale præscribit emplastrum: *Rec. emplaftri de mucilaginis & mellis anatica portione uncias duas, gummi ammoniaci in aceto scillitico soluti unciam unam & dividiam. M. & si opus est, cera adde parum.* Nonnulli etiam ad impediendum tumoris incrementum, doloreque & ardore leniendum misrice æstimas plumbei laminæ, mercurio vivo inunctam & impositam; alii iterum fumos acidos parti scirrhosæ admittendos refolvendi sine commendat, & hujus generis plura. Si ullum vero remedium tuto & cum emolumento potest applicari, est profecto simplex cataplasma milii in lacte cocti, pluribusque linteaminibus involuti, ut ab omni humiditate liber maneat locus adfectus. Et a domestico hoc remedio, si ter vel quater in die sub cura thermarum Carolinarum fuerit adhibitum, ego in principio tumorum cancrorum in duabus virginibus miram vidi effectum, quem antea nec præfiosissima fumoque studio exco-gitata medicamenta præstare poterant.

§. XII.

Singula hæcenus dicta provide administrata interdum efficiunt, ut non modo inflammatio, quæ proximè ad cancerum gradus est, satis diu à scirrho avertatur, morbusque tolerabilis fiat; verum etiam, ut materia stagnans folliculisque glandulosis impacta sepe in principio per venas reorbeatur, & sic scirrhus vel evanescat, vel in ulcus benignum abeat. Lique eo magis potest obtineri, si diæta conveniens jungatur, quæ in eo potissimum consistit, ut in lex rebus non naturalibus iusta servetur temperies; quo sine omnia debent caveri, quæ noxia esse in theoria ulcerum docuimus.

§. XIII.

Longe vero strictius servari debent duriores diæte regulæ, quando cancer jam apertus in ulcus mali moris depascens abiit, quoniam præter accuratorem diætam pauci sunt medicamenta, quæ sufficientem opem præstant; nisi id fatagat Medicus, ut pro circumstantiarum ratione supra commemorata interna præscribat. Extrinsecus vero, ubi verus multumque protuberans cancer, facta per cutim apertura, instat fungi excrefcit, & à parietibus compressus ichorem fundit tenuissimum summeque rodentem, non sine fructu inperguntur antimonium diaphoreticum, cerussa antimoniæ, crocus martis aperitivus, & pulvis sanarum exsiccatarum, superposito emplastro diaphoropolygos cum sanumini, vel emplastro *Barbette* cum camphora & hyosciami oleo subactio, quæ partem ichorem imbibendo exsiccat, partim scirrhosam materiam refolvunt, putredinemque arcent. Ad dolores, qui per intervalla gravissime fiunt, leniendos, externe in locis quæ admittunt, cum insigni levamine applicatur aqua solani cum albumine ovi & sacchari sacrum paulillo conqualata, *Fried. Hoffmanni Oper. Tom. III.*

extracto simul croci, papaverisque rheodas addito. Quod si vero, ut sæpe fit, ramus vasæ sanguiferi apertus largam sanguinis copiam distilat, nimiumque fluxum cohibentia expolcit, tum fortiter adstringentia hic locum minime inveniunt, sed præstat spiritum vini rectificatum adhibere, vel terram virioli edulcoratam, quæ ex spiritus virioli destillatione remanet, cum ovi albumine miscere & adponere, vel etiam sanguinem draconis, cum albumine ovi mixtum, itemque pulverem radicis consolide majoris sauciatis vasæ admove.

§. XIV.

Nunc peculiaris excutienda est quæstio, an scirrhus & cancer excidendi possit? Nos in sentendo iudicio ita sentimus, quod omnino talis exstirpatione in certis casibus admitti debeat, quin non modo gravissimi ærum chirurgico-medicearum auctores eandem aliquoties scilicet peractam commemorant, verum etiam ex verissimo Cæli effecto remedium anceps experiri præstat, quam nullum. Si quis vero scirrhum & cancerum eradicare cogitet, cogitare simul debet, an nullo alio medicamento possit mitigari, aut curari, & annon æger in peiorem statum conjiceretur, si malum exstirpandum præberet, quam si retineret. Deinde magnitudo & duratio horum adfectuum debet attendi. Parvus enim & incipiens scirrhus vel cancer operationem admittunt, magni autem & vetusti recusant. Neque manus locus debet examinari, in quibus scirrhosa labeis residet. Sunt enim loca, ut præsertim inguina, uterus, nares internæ, fauces, parotides &c. quæ exstirpationem plane denegant ob arterias, venas & nervorum furculos circumfusi, sive piossupposi; unde facile hæmorrhagia suscitatur lethalis. Tum quoque vires ægræ decet explorare, an tali operationi sustinende sint suppetes, & qualis interna humorum sit constitutio. Hæc enim si cacochymia est, nihil juvabit exstirpatio, quia in alia parte malum facile repullulat; sicut ego scirrhum in una mamma abscissum, postea in altera mamma & glandulis axillaribus renatum vidi. Idem valet, si scirrhus & cancer duas partes, licet inæquali magnitudine, simul occupat. Tum quippe in uno loco excisus, in altero incrementum sumit. Immo denique multum refert scire, an mobilis adhuc & liber sit scirrhus & cancer, quod cognoscitur, si digitis pressis in omnem partem potest moveri, & si cutia manu atreptu potest elevari. Quæ ubi aliter se habent, indicio est, quod jam cum aliis vasæ & membranæ callosis in unam coierit massam, ideoque minime debet attingi, maxime cum ignoremus, annon magna vaia per ejus corpus divaricentur, quæ dissecta sanguinem ad mortem usque fundant.

§. XV.

Varii autem hæcenus innotuerunt exstirpandi modi, quorum omnium optimus videtur, qui ferro peragitur, dum scirrhus v. g. in mammis manu, vel instrumento quodam prehensus, & a corpore abstractus una sectione totus abscinditur, vel si facta transversali in crucis formam incisione ex inæguitate, in quibus libere hæret, eximatur, & à membrana adiposa, cui interdum in inferiore sui parte adhærescit, separatur; quod facile fit, quando hæc nondum viciosa est. Alii, in magno scirrho e. g. mammarum eradicando infra scirrhum furcam, vel magnas acus filis

Exstirpatione in cruentis abstinenda

Exstirpatione in cruentis abstinenda

Diæta simul vero habenda.

Cancer aperiens raro in cruentis.

instruñas transigunt, & tum mammam infra elevationem cultro abluunt; alii iterum, facta cruciformi in integumentis sectione, scitrum per fila ceracea, cum duabus acubus ipsi transversum inducta elewant eo fine, ut hac tractione panniculæ adiposæ eo melius citiusque separaretur. Reliquæ operandi methodi, quæ per partis scirrhusæ compressionem, per ligaturam, per corrosivâ & ignem absolvuntur, raro inveniant locum, nisi in minoribus scirrhis & canceris, quales e. g. in labiis oriuntur. Ita enim abusione & corrosivis mox effluvia emergunt, quæ vim ignis vel corrosivi ulterius adhibendi in magno scirrho minuit; dein scirrhus & cancer admodum raro tam angusto prominent collo, ut ligatura possint consiliri & sensim removeri: in compressione autem metus est, ne adjacentes sanæ partes simul emoriantur.

§. XVI.

*Scirrhi de
canceris uteri
tr. medice.*

Maligni uteri scirrhi & canceri magis possunt præcaveri, quam curari. Profundi autem in principio, ante quam malum vires receperit, ex consilio MATERNÆ balnea aquæ dulcis cum herbis emollientibus parata & lenel de die adhibita. Tum non cum eodem auctore commendamus venarum hæmorrhoidalium in foeminis apertionem, si mensum fluxus restitui nequit, ad quem alias reparandum, præter leniora interna tali in casu usitata proficuntur pelvi uterini, qui apparari possunt, si pulveres artemisæ, gentianæ rubræ, aristolochiæ, myrrhæ, sabinæ & hellebori nigri terui sacculo inclusi & vino malvatico humectati utero admoventur. Quo etiam referri merentur samis, ex livio sciorum animonii in uterum excepti: quibus remediis omnibus egregie inefficacitas obstruenda vasculâ referandi, hæmores tenaces minimisque tubulis inhaerentes dissolvendi, ipsæque venarum oculâ aperiendi, ut sanguis menstrualis, vel fluor albus, quorum suppeltilio plerumque causam præbuit, rursus suum fontiaur exitum. In ipsa ulceroâ uteri labem, quam ex saniole pariter ac foetidissime materie profusione cognoscere licet, non tantum pudenda à rosione sunt defendenda, & a tumore, qui plerumque jungitur, liberanda per emplastrum *Barbette* cum floribus sulphuris vigoratum; verum etiam cum fructu suscipiuntur injectiones liquorum balsamico consolidantium hujus compositionis: *Rec. aquæ d'arquebuse uncias quatuor, essentia succini, myrrhæ, balsami de copiva, gummis elemi aut drachmas duas, mellis rosati unciam. M. D.*

§. XVII.

*Canceris
uteri
tr. medice.*

Præter hæc vero, circa hanc curam probe debet attendi, quod non melior salus, quam ex thermis Carolinis in tempore potatis possit obtineri. Etenim hæc aquæ, prout innumeris constat observationibus, in uteri visis, à quacunque fere causa abortus diviam plane opem exerant, dum obstructions removendo, liberiores sanguinis & humorum circuitum, sicut per universum corpus, ita etiam per vasculosum uteri viscus efficiunt, adeoque in impuris sordibus per omnis generis emunctoria eliminandis excellenter se gerunt. Et licet sole non semper sufficiant, nec totum curationis opus absolvant, scire tamen licet, quod ad reliquam curationem felicitas peragendam commodam sternat viam; nisi jam morbi vis ita invahuerit, ut omnem hominum medelam penitus spernat.

§. XVIII.

Coronidis loco de reliquis glandularum tumoribus & ulceribus pauca addere placet. Probe enim sciendum est, non omnes glandularum glandulosarumque partium tumores in ulcerationem abeuntes statim pro cancrois habendos esse; sed ab osdem in eo maxime differre, quod laudabile, album, coctumque pus fundant, dolorem minorem manusque pungiuntum habeant, neque venas circa tumorem varicosas gerant & curationem admittant. Minime tamen negari potest, quod hi tumores inter se ipsi discrepent, & plus minus benigni vel maligni æstimandi sint. Ita malignis acutis accenseri debent pestilentialia, malignis chronicis bubones, ex gonorrhœa quocunque modo suppressa, vel ex impuro coitu suborii: alii enim à prohibita transpiratione, vel dolore colico excitatis inguinum tumores melioris semper indolis esse solent. Saepè ejusmodi glandularum subaxillarium, parotidum, maxillarum & inguinalium tumores morbis præsertim acutis superveniunt, & vel cum febris symptomatumque decremento critici salutare, vel cum augmento symptomatum juncti, symptomatiaci esse solent: saepè etiam sine omni febre, licet non sine febrilibus commotionibus sua sponte exurgunt. Id quod sepiissime fieri deprehendimus in corporibus impuris cacochymicis, sive seroso-scorbuticis, si consuetæ & criticæ excretiones per menses, hæmorrhoides, sudores largiores, coryzam & rheumatismos deficiunt, nem in iis, quibus ex utroque sexu erysipelas sordaque scabies ad habitum corporis propelli definit. Similes tumores, præsertim in parotidibus experiantur infantes, pueri & adolescentæ, succulentiores, qui coryza, vel narium hæmorrhagiis non amplius tentantur, & qui à primis annis longo tempore tinea capitis vexati fuerunt.

*Tumores
glandularum
tr. medice.*

§. XIX.

In curatione rite peragenda aut discussio, aut si hæc obtineri nequit, suppuratio est promovenda. Atque ideo interne conveniunt decocta sanguinem purificancia, sudorifica, interpositi laxantibus cum mercurio dulci vigoratis; externe vero discutendi sine sub ipsa sudoris expectatione applicare expedit cataplasmata, quæ opime fiunt, ex radice sigilli salomonis, farina fabarum, herbis charrefoli, petroselinis, floribus sambuci, semine cymini, bacis lauri, juniperi, croco &c. in vino coctis. Neque usu suo caret, præmissis emollientibus & antipainificis, qualia sunt emplastrum de mihloto cum spermate ceti, croco, oleo hyosciami & camphora subactum, postea demum cataplasmata discutientia adhibere, quia sic stagnans humor tenuior & mobilior factus dein per poros melius vel transpirare, vel per vasa potest reflueri. Quod si vero non amplius discussionis locus est, sed propter auctam magnitudinem, dolorem, & majorem humorum affluxum, natura supurationem molitur, hæc non melius poterit promoveri, quam per emplastrum diachylon simplex, vel cum gummatibus, vel rectius adhuc & citius per cataplasma, ex cepis sub cineribus coctis, radice lithoum alborum, ficibus, farina fabarum, mella, croco, vitello ovorum invicem mixtis constat. Quando maturus est abscessus, cito aperiatur, ne materia acris purulenta ad interiora coarctata via sanabile ulcus producat. Facta apertura purificatio ulcers & consolidatio optime per-

*Quædam
tr. medice.*

perficitur balsamo vulnerario, quod ex aloe hepatica, succino, myrrha, gummi elemi, floribus rosarum, balsamo Peruviano & de Copaiva, melle, cum spiritu vini extractis, & cum oleo hyperici vetustio, paucisque guttis balsami sulphuris antimoniati, vel terebinthinati remixtis parari potest; vel etiam balsamus *Arcei*, item oleum vitellorum ovorum & hyperici vetustum, in quibus myrrha soluta, vel cui terebinthina & liquidambra admixta sunt, in tali casu adhiberi possunt, superposito semper emplastro *Barbette* emolliente.

§. XX.

Sæpe accidit, ut propter magnam duritiem & materie immobilitatem tumor ad suppurationem pervenire nequeat; tum vero videndum, ne cancrose indolis fiat, ut maxime menandum est in parotidibus & glandulis colli, si in cachymia, scorbutica & ætate provectionibus oriuntur. Optime autem averti potest periculum, si præter remedia interna depurantia, extrinsecus emplastra & gummi, ut est emplastrum manus Dei, vel emolliens quoddam cum oleo cornu cervi, vel tartari sorbicis malaxatum, item emplastrum *Agricola* ex cepis, imponuntur. Quod de parotidibus valet, valet etiam de reliquis glandularum tumoribus, si in imo delitescentes magis ad interiora vergunt, & si valde duri, resistentes & dolorifici sunt. Hi enim omnes difficiliter discutiuntur & suppurantur, quam qui molliores sunt, & non adeo dolent, ut in sanguineis, sanguineo-phlegmaticis & ætate junioribus.

§. XXI.

Nec denique omitti debent molesti testium tumores. Licet autem testes glandulis accenseri non possint, nihilo tamen minus, quia in eo cum glandularum fabrica conveniunt, ut ex innumera fere capillaribus vasculis invicem convolutis contexti sint, pariter ac ipse glandulae duris & scirrhosis tumoribus sunt obnoxii. Conferunt autem externe fortis ex lacte cum floribus sambuci & chamomillæ cocto affectæ pari crebrius admissi, nec non emplastra emollientia, cum floribus sulphuris, stygioque balsamo sulphuris & mercurio præcipitato albo remixta, quæ cum internis diluentibus & purgantibus combinata eximiam resolvendi, incidendi & discutiendi præstant energiam. Plura ad hanc rem pertinentia reperire licet in capite de lue venerea.

CAUTELÆ ET MONITA PRACTICA.

§. I.

Ulcers, quæ à causa præsertim interna originem & sustentationem recipiunt, curationem raro admittunt, nisi hæc convenientibus internis adjuvetur. Pecant in hoc maxime Chirurgorum plurimi, qui nimis audaces utplurimum sine Medico soli perarduum curationis opus aggrediuntur, & posthabitis internis sanguinem purificantibus remediis secant, ununt, ungunt, & quævis alia tentant: quæ ratione non modo nihil profunt morbumque diutius proterahunt, sed ægros quoque in majorem sæpe perniciem conjiciunt. Quod vero sicut malignosum proboque viro indignum est; ita ego, ne quis solis externis fidens interna negligat, etiam atque etiam monco.

Frid. Hoffmanni Oper. Tom. III.

§. II.

Ulcers cujuscumque generis in subjectis impuris minime cito debent excidari: his enim sæpe sanitati sunt, & non secus ac fonticuli corpus à malle aliis malis immune præstant. Quæ quidem in re audiendus est SEVERINUS, de novissi. observatis abscessibus capite XXX. ita differens; *singulare genus est eorum ulcerum, quæ consilio naturæ providentiæ parantur, quæ quoniam in nostram salutem excitata sunt, facinus esset, ipsa aut amoliri aut temere cobibere. Tameñ etiam haud criticum est illud opus, si nullo minus quia cum projectu animalis su, amplectendum est beneficium. Si quis vero temerario ausu consolidationem insitit, morbos sæpe peiores eoique insanabiles accersit; unde ego post talia ulcera intempestive oculula pleuritidem, asthma, coctatem, vertiginem, mentis alienationem aliisque plura mala vidi subnata. Et hinc etiam est, quod inter pessimas notas de instantis moris præstigia referri solet, si ulcus, quod antea fluxu, siccum & vel lividum vel pallidum evadit. Hoc enim si fit, designat vim naturæ nimis depressam; quæ pereunte morus & influxus sanguinis membra à corde remota deferit; unde hæc coarctantur, horrent, frigent & arida fiunt; adeoque etiam ulcera manare desinunt.*

§. III.

Si à signis supra recensitis sciri indicatur exstirpatio, corpus antea bene est præparandum commodo victu debitisque medicamentis; quia corpore non repurgato, facillime sanguis impurus in alio loco scirrhosam labem resuscitat. Animus quoque ægroti spe boni eventus sit lætandus & prudenter firmandus ad operationem fortiter sustinendam. Quo autem vires resocillantur, porrigere deest analeptica, quæ inter evinet vinum bonæ notæ Rhenanum, cum cancro tum lapidibus & theriaca remixtum.

§. IV.

In ipsa operatione omne morbosum est eradicandum; alioquin si quam miniatum relinquatur, malum recrudescit, & ex scirrho dein cancer fit. Si quid vero præter culpam Chirurgi operantis remanserit, ad radicem exstirpandam labem pulverem mercurii præcipitati adhibere expedit, cavendo tantum, ne salivatio exciteatur. Tum quoque post exstirpationem per sat longum temporis spatium interna sanguinem depurantia & relicta seminum corrigentia cum accuratiori vivendi ratione sunt continuanda, ne pus, quod tum generatur, per venas sanguinem ingrediantur, aut si quid forte ingressum sit, de novo elatur. Quod vero ut eo melius fiat, cavendum simul est, ne per remedia foris suppurantis nimia fiat puris generatio. Ceterum consolidatio, sicut in alio ulcere fiat.

§. V.

In cancro patente & exulcerato si febris lenta accedit & hæctica, commendari mereantur ad nimium calorem refrænuandum, emulsiones temperantes, ilac asinum & jussula nutritiva medicamentosa, nec non gelatinæ ossium, ex rasura cornu cervi & eboris cum succo citri & vino Mosellano confectæ. Denique, si crebriora animi deliquia moris periculum indicant, portiones analeptice ex aquis destillatis paratæ, & modicus vini haustus cum externis

Q q 3

æscocilian.

Quid generis, si remedia respiciant.

Tumores testium quomodo curandi?

Causa circa morbum in ulceribus.

— circa consolidationem.

Quid ante exstirpationem faciendum?

Quid post eandem?

Et si febris lenta, vel dyschymia accedat.

refocillantibus languentes spiritus paulatimodo
fufcitant.

§. VI.

Causa rari-
ca anody-
na.

Interne, si dolor canceri excessivus est, & æ-
gri opem nimis urgent, ad hunc placandum ad-
mitti possunt leniora anodyna. Sic ego in acer-
bissimo uteri cancerosi dolore mitigando, sum-
mam anodynorum ad tempus vidi efficaciam,
atque in primis poconiz, liborum, convallium, sy-
rupi papaveris albi & paucis guttis essentiz anody-
nz præsens attulisse levamen. Qua quidem in
re me confirmat experientia RIVERII, qui in præ-
s. lib. XV. hæc habet: *vidimus, inquit, mulie-
rem cancerosa mamma laborantem, quæ singulis
mensibus per quatuor menses laudani opiatæ grana
duo vel tria inuxit & cum maximo solatio fuisse.*

ENARRATIONES MORBORUM.

OBSERVATIO I.

Tumor
fungiformis
apertus &
seleucus
consolidat-
us.

Vir generosus septuagenario major, robustus
& obsecr. constitutionis, non nisi semel in anno
venæ sectionem admittens, nocte aliquando in
tenebris urinz reddendæ gratia assurgens in hu-
mum prostermitur conclusis, gypso lapide strati
& unde ingenti percussus terrore non multo post
de gravi cruris dextri circa genu dolore conquie-
ritur. Intra biduum sublequebatur tumor, qui
paucorum dierum intervallo ita crescebat, ut
capitis humani magnitudinem æquaret. Voca-
bantur auxilii ferendi causa Chirurgus & Medi-
cus, qui conspectum tumorem, doloris exper-
tem paucaeque rubedine cinctum, extrinsecus tra-
hebant emplastro de sapone camphorato, de-
super imposito cataplasmate, ex herbis rutæ,
scordii, cardui benedicti, floribus sambuci, cha-
momillæ, baccis lauri, juniperi, &c. in vino
coctis, & cum spiritu salis armoniaci remixtis.
Interne tinctura offerebatur bezoardica campho-
rata & pulvis lapidum cancerum cum vino,
sed nihil inde aperi sensiebat levaminis: ut po-
tius, aucta tumoris magnitudine, totius corporis
lassitudinem experiretur. Ego itaque cum re
probe pensitata, cuius inter & musculos mate-
riam extravasatam iudicabam, tumorem scal-
pello aperiendum præcipiebam; unde purus san-
guis effluebat ad libras fere duas, subsequente
sero purulento sanguine tincto. Tumor detur-
mensens facta cum filo ceraceo (*einen Wack-
Steck*) exploratione, amplitudinem cavitatemque
sat magnam nactus videbatur: quare consi-
ciendum curavi liquorem traumaticum, ex
myrrha, aloë rosatæ, gummi elemi, tacamahaca,
floribus rosarum, hyperici, millefolii & bal-
samo Peruviano cum spiritu vini rectificato di-
gestis, & in essentiam redactis vulcerariam,
quæ cum melle rosato remista, ad uncias fere
duas quotidie siphonis ope iniciebatur, superpo-
situm emplastro & cataplasma jam laudatis. In-
ternam ferebamus opem elixirio nostro balsami-
co pulveribusque bezoardicis; & ad vires resi-
ciendas, quæ cum appetente ciborum, inter-
currente sudore frigido & anxio, valde labasce-
bant, modicus subinde haustus vini optimi Hun-
garici permittebatur. Vinculis postea laxatis,
loco sanguinis indies magis magisque pus efflue-
bat optimi coloris & consistenz, & intra quin-
que septimanas æger consolidato ulcere exoptatè
reddebatur sanatus.

OBSERVATIO II.

Tumor
fungiformis
apertus &
seleucus.

Non possum, quin observationem subjungam
aliam, præcedenti non nisi eventus dissimilem,
quæ ita se habet. Vir LX. anoorum podagri-
cus, vitæque sedentariæ & anxii semper cu-
ris addictus, in dextro brachio tumore corripie-
batur, duro, dolorifico, lividamque colorem
referente, qui frustra adhibitis variis generis ex-
ternis, mutata sede, ad dextri lateris pectus circa
mamillam prosperabat, exigua tantum duritie
livescente in brachio relicta. Jungebantur
brevis post virum & appetitus defectio, pedes
tumidi & tussis cum spirandi difficultate vhe-
mentissima. Accesserunt Medicus atque Chirurgus
apertionem tumoris confiderenter suadebant, quam
ego ægro, cum & meum flagitaret consilium,
senio dissuadebam; quoniam perstrutata ipsius
constitutione morbiq; indole, non purulentam
inibi materiam, sed potius humorem valde ro-
dentem putridum contineri prævidebam, & ex-
terni aeris admissione internam putredinem ad-
auctum iri augurabar. Atque eventus respondit
præfagio. Medicus enim, amicum respuens con-
silium, me abente tumorem fat magna incisio-
ne ipse aperuit; unde loco expectati puris, sangui-
nis valde dilutus cum acri ichore mixtus ultra
mensuram effluxit. Insecta quidem essentia myr-
rhæ aquosa, quæ etiam interne adsumebatur;
sed altero die rursus similis promanavit mate-
ria, donec tertio die tanta successit hæmorrhagia,
quæ nullo sibi auxilio poterat, sed sangui-
nem cum vita exhaustiebat. Tumore aperto ca-
vitas sat ampla repenebatur sphacelo corrupta:
in thorace & abdominis cavitate serum conspi-
ciebatur collectum, & pulmo in laere sinistro
putrida ac purulenta materia totus consumtus.

Epicrisis utriusque casus.

Varii generis tumores in corpore oboriuntur,
quorum naturam & tractandi modum & Medi-
cus & Chirurgus probe debet callere peritæque
distinguere. Nostri, quos adduximus, dicendi
sunt sanguinei, qui à flagrantè sanguine enati
largam suam copiam per sectionem fundere so-
lent. Atque in eo discerni debent ab abscessibus
vel apostematibus, quæ ex præcedente in-
flammatione oborta pus intus fovent, ideoque
minus alunt periculi. Merito autem ejusmodi
tumores distingui debent in *benignos & malignos*.
Benigni sunt, qui, sicut in priori casu ob-
servavimus, in subjectis sanis à contusione, vel
alia quacunque externa causa prægressa, intra
breve tempus subsancuntur, ne ullis quidem in-
terne inflammationis notis præcedentibus. At-
que hi maxime eveniunt in sanguineis, quorum
minima vasa sanguine repleta surgunt, quæ vi
externa disrupta brevi tempore effuso sanguine
in musculorum & tunicarum interstitia ingen-
tem formare tumorem possunt. Nisi tum ex-
travasato sanguini per incisionem parietur exitus,
non modo hic longiori flasi corruptus & ac-
rior factus partis læsæ consolidationem impedit,
verum etiam à putrido humore per vasa
resorpto, corporis virumque debilius & lentius
hecticus calor subsequitur. Neque in sano ho-
mine, cujus humores blanda gaudent temperie,
pertimescenda est apertio, sed speranda inde
potius melior salus & exoptata consolidatio; id-
que eo magis, si in cavitatem balsamici inji-
ciuntur

ciuntur liquores, qui non modo putredinem arcent vasculaque aperta occludunt, sed & consolidationis negotium eximie promouent. Alia vero tumorum *malignorum* est ratio, qui non tam in corpore puro & sano, sed in impuro, cacochymico & scorbutico, per varias antea ægritudines debilitato emergunt, neque externam lesionem, sed potius internam humorum depravationem pro causa agnoscunt, qui extravasati summanque acredinem adepti vasa & substantiam fibrarum erodunt. Accedit, quod maligni hi tumores non in instanti, sed sensim paulatimque producuntur, sicut in posteriori casu animadvertere licet, ubi tumor per plures menses subsistit, ante quam humore ad pectus transalato mamillam occupavit, id quod utique internam substantiæ carnes erosionem per totum brachii tractum offendit, qui etiam corossus, facta sectione inventus est. Enim vero, negari minime potest, quod omnes hi tumores lethales habendi sint certoque certius mortem inferant, quæ tamen eo citius accedit, si aperio acceleratur. Namque admissio aëre atmosphærico vel humorum putredo partiumque adiacentium sphaclatio promouetur, vel hæmorrhagia excitatur incompehibilis, quæ vires cum vita brevissime admittit. Quod vero si metuendum est, nulla in re magis reperire licet auxilium, quam in injectione liquoris balsamici non aquei, sed spirituosius, quo non modo fasciata vasa contrahuntur, sed ulterius quoque putredinis progressus & sphaclatio ad tempus avertitur.

OBSERVATIO III.

*Ulcus post
hum moris
in collo.*

Vir generosus sexagenario proximis, habitu corporis pingui & spongioso præditus, jam per decennium viduus, laute semper & vinoſe diæta indulſit, nullaque ſonica valetudinis incommoda, præter catarrhales deſluxiones experius eſt, maxime cum bis in anno circa æquinoctia venam ſecundam præbuerit, fontemque fœtorem Pyramontanum per aliquot ænos potaverit. At vero cum officiis, qui admovebantur, ratio poſceret, ut ſub vere maxime & æſtumno, tempeſtate frigido-humida & nebuſoſa in ſylvia circa aquarum flagna commoraretur, & inſuper quoque venæ ſectionis ſtrictioriſque diætae impatiens ad genium ſuum inordinatè viveret, accidit proſ dolor ! ſuperiori anno menſe Novembris, ut circa tempora ſupra autem dexteri lateris tumore afficeretur inflammatio & ulceratio inſtar cicæ, quem dicunt ſurunculum, *einen Schwürzen*. Leve videbatur malum & vix medela dignum, ſed brevi poſt, cum noſter in convivio ſe cibo & potu nimium repleverat, æſtque vespertini injuriæ expoſuerat, tumor ille cum dolore valde increſcebat, qui ante maturitatem à Chirurgo apertus, ichorem fundebat ſanguinem, labia recipiens ſubrumida & ſere cruſtoſa. Fugit me, quam ſibi in medendo viam Medicus æque ac Chirurgo tum temporis elegerint; poſtea vero, cum ego conſilii ſerendi cauſa advocaret, hæc erat rerum facies: tumor ille dolorificus denuo valde auctus, jam glandulas occupabat parotides, quare ex meo conſilio emphaſtium imponebatur dachylon, item *Barbette* cum camphora oleoque hyoſcyami ſubactum. Ex aure dextra materia promanabat ſanoſa, & maxillam tumore compreſſam æger nec poterat movere, nec ſolidi quicquam deglutire. Exacto triduo poſt aures iogens fiebat

abſceſſus, qui denuo quidem aperiebatur; ſed nihilo minus materia purulenta ad colli glandulas deſcendens, ibi novum formabat tumorem, qui reſcuſa incifione ſponte diſſeſtus in ulcus alibit vere crancroſum, tamque profundum, ut ibi decurrentes nervi, arteriæ & venæ, imo denique oſophagus & aſpera arteria, abſorta ſenſim pinguedine, denudata conſpicerentur. Dabantur in principio ad alvum, quæ clauſa erat, ducendum, impetumque humorum à capite divertendum leſiora laxantia, medicamenta ſanguinem purificantia, & ſulcula herbarum antiscorbuticarum medicamentofa; extrinſecus vero liquores baſſamici ſyphoniſis ope inſundebantur. Sed omnia hæc ac ſingula imminuentem ſanguinis corruptionem avertire vix poterant, ut potius invaleſcente calore, ſi & inquietudine, hinc & inde in toto corporis ambie ulcuſcula prodirent ſubſtrida, ipſorumque digitorum extremitates inflammatione prebenderentur. Tandem ſub inſigni virium decremento, crebriores accedebant lipothymia, & imminens morienti neceſſitas novo die omnium miſeriarum exoptatum aſſerebat finem.

Epiſiſis.

Varia in præſata morbi hiſtoria occurrunt momenta, quæ ſingulariter merentur conſiderationem.

1) Si tot tantorumque in noſtro ægrotæ malorum ſcrutatur originem, nullam certe aliam invenire licebit, præter ſcorbuticam ſanguinis & humorum dyſcrasiam, quam ſibi procul dubio lauta & inordinata vivendi ratione, aeris frigido-humiſi uſura, & omiſſa conſueti ſanguinis miſſione contraxit. Tali enim ratione ſanguis in viro, ætate jam multum provecto, non ſolum copia & ſpiliitudine increvit; verum etiam, cohibita tranſpiratione facile pravam induit diatheſin, quæ deinde variis tumoribus & exulcerationibus anſam præbuit facillimam.

2) Merito reprehendenda videtur Chirurgi in aperiendo primo tumore ſeſtitatio, quæ proſ dolor ! factum eſt, ut ichor tenuis acrior & magis nocivus redditus vicinas partes arroſerit ſimulque labe inferret. Id quod in ſubſeſto ſenſi, ac impuro in paribus multa pinguedine obſiſit, ut collum eſt, eo citius poſuit obſingere. Namque digna notatu obſervatio eſt, quod corruptio in pinguedine oborta, & à ſanguine inibi ſtagnante illata, celerrimo ſerpit progreſſu, vixque ulla poſſit ratione cohiberi: quare non mirum eſſe debet, cur etiam in præſenti ægrotato ſubſorta in pinguis locis cornuſis mox tantas ſuſmerit vires, ut conſumatis partibus ſuppoſitis, arteriæ, venæ & nervi in conſpectum prodierint.

3) Notabilis eſt ulcuſcutorum in variis locis proventus, digitorumque inflammatio, quæ ſummam ſanguinis corruptionem indicat ſuculentiffime. Augmentum vero ipſa recepit à materia purulenta in ſanguinem delata, quæ hunc tetra putrilagine inquinavit, & in motum coniecit putredinoſum; unde febris, inflammatio, lipothymia & vitæ clauſula mora.

OBSERVATIO IV.

Fœmina generoſa, XXXVIII. annos nata, Temperamenti phlegmatici, & integra ſemper valetudine gaſſia, ante ſeptem circiter annos in

Q 9 4 puerpe-

puerperio à nimio lochiorum fluxu varia exper-
ta fuit symptotata, maximeque hemicramam
dextra lateris, passiones hyftericas, cordis palpi-
tationes, & rheumaticas faciei artuumque de-
fluxiones per tres fere annos ab eo tempore per-
fuerit debuit. Confuluit itaque harum pericula
moleftiarum medicamentum, qui faluationem fua-
fit mercurialem eo effectum, ut admodum vebe-
mens frigoris fenfus, quem ne calidiffimum qui-
dem conclavis vel lecti regimen mitigare pote-
rat, remaneret, atque molefte artuum deflu-
xiones, cum tumore & exulceratione iunctæ æ-
gram miferissime difcruciarent. Adhibita ligno-
rum decoctis cum inedia parum tulerunt leva-
minis, ut potius dein in media mamma finiftræ
regione fupra papillam durus accesserit tumor,
qui fipera externorum ope brevi ita increvit, ut
ovam anferium magnitudine emularetur, & in-
noueris venarum ramificationibus cœruleis
cinctus dolores pungitivos & prope lancinan-
tes, præterit ab applicato emplastro de cicuta
inferret. Ceterum, ægra nondum lecto affixa
bene appetit, & quantum per dolores licet,
animi est hilaris; præferendi autem scopo
meum postulatit auxilium.

Epistola cum consilio.

Affectus, quo præfens laborat femina, tu-
mor est cancerosus, qui non modo ex colore li-
vido & lapide duritie partis glandulose, verum
etiam ex doloribus pungitivis fat clare cognoscitur.
Prima hujus mali origo deducenda videtur
à puerperio, ex quo plurime mulieres refurgunt
morbofæ, si vel faluberrimæ diætæ præcepta
quoad victum, regimen & animi affectus mi-
nimas rite fuerint servata, vel si lochiorum fluxus
quocunque modo peccaverit. Potiffimum
vero in præfenti casu largiffima sanguinis in par-
tu profusio accusari debet, qua corpus debilita-
tum postea loco sanguinis boni ac laudabilis mul-
tas serofas & excrementitias collegit cruditates,
que minus recte à massa sanguinis segregatæ
variis subinde moleftiis, & speciatim quidem
rheumaticis faciei & artuum defluxionibus, glandu-
larumque tumoribus ansam dederunt. Jam
quidem hoc fine utiliffima sunt lignorum deco-
cta cum inedia, omniumque remedium vim
longissime fuperat tempestivus thermarum Car-
olinarum usus. Si quis vero in tali cacochymi-
co corporis statu falvæ profluvium mercuriali-
bus temere molitur, plus semper nocet, quam
prodest. Etenim, cum validiora hæc medica-
menta spaffica partium nervosarum & glandu-
lofarum strictura agant, fieri aliter non potest,
quin spaffini, si jam in corpore fenfibili & debi-
litate adfunt, mirum in modum augeantur: unde
non modo præfentes vasculorum minutorum
obstructiones confirmantur, verum etiam occlusis
in cute vasculis frigoris fenfus inducitur, &
de cohibito transpirationis negotio majores in cor-
pore impuritates accumulatur. Res autem quo
clariorem accipiat lucem, probe meretur atten-
di, quod falvatio plerumque frigus partium ex-
tremarum iunctum habeat, quod eo quidem fine
fieri arbitror, ut per inferiorum partium stric-
turam lymphæ & falivæ majori nisu ad fup-
eriores, maximeque ad glandulosum faucium com-
pagem delata eo melius excremetur. Sæpe ve-
ro peracta etiam falivatione, si hæc vel nimia,
vel intempestive adhibita fuerit, externæ partes
molesto teneantur frigore, quod nisi mitigatur

& ad justam redigatur temperiem, multa fac-
cedunt incommoda, quæ in præfenti etiam casu
metuenda sunt, ubi durante frigore ad affectum
mammarum major humorum fluxus affluxus. Ego
itaque in consilio ferendo primo omnium fualior
& auctor fui, ut alvo, quæ sæpe similiter clausa
erat, subducta extrinsecus diligenter adhibeantur
frictiones, & ægra per intervalla in balneum
aque dulcis descendat, ut sanguinis in externas
partes influxus revocetur. Deinde, commenda-
vi curam cum fonte Egrano tepido instituendam,
& servandam præcepti accuratiorem diætæ,
vivando falia, acris, dura & motus aug-
mentia, substituto in potus locum decocto puri-
ficante. Extrinsecus tumori duro imponendum
fuafti emplastrum *Barbette* saponatum & probe
camphoratam cum hyocyami oleo malaxatum,
superposito cataplasmate ex semine milii cocto;
unde abscessus benignus fiebat, qui secundum
artem tractabatur.

OBSERVATIO V.

Femina generosa quadragenaria, tempera-
mento cholero-sanguineo prædita, semel tan-
tum felici partu filium exclusit sanam & vege-
tam, cui ipsa mammas per annum præbuit. Ab-
lato infante in finiftra mamma tuberculum re-
stinuit parvum, & avellane magnitudinem vix
accedens, quod doloris expert per quinquennium
sine moleftia tulit; donec ante aliquot menses
post perperillum tristitia affectum tumor fenfis
increvens per intervalla dolore adficebatur pun-
gente, majusque præfigebat periculum. Chi-
rurgus acerbatur artus probe peritus, qui tu-
morem durum, scabrum, & duobus in margi-
ne tuberculis cinctum extrinsecus spiritum vini
camphorato & crocato, aliquoties in die appli-
cato tractabat. Interne à Medico insulam præ-
scribebatur vinofum laxandi virtute pollens, &
vespertino tempore pulveres absorbentes nitrofi
offerebantur: neque decocta instillare potanda,
neque pilule seniores balsamicæ ad men-
sium fluxum, qui adhuc integer erat, in ordi-
ne conservandum omitebantur. Tantum vero
aberat, ut vel minimum tumor ille scirrhosus
magnitudine decreferet; ut potius cum tubercu-
lis novissime obortis in unum corpus coales-
cens instar manus latus & longus appareret,
colorem ex bruno rubicundum punctisque albi-
dis interflinctum referret, & doloribus pun-
gitivis per intervalla redeuntibus magnas crearet
moleftias. Quare ego in consilium adhibitus
ægram ab omnibus tam corporis quam animi
commotionibus abstinere, cibos acidos, salios,
duros & multis conditis aromatibus evitare, bis
in hebdomade ad alvum laxandam pulverem
rhabarbarinum fumere, & in potus locum deco-
ctum ex radice chinæ, scorzonæ & rasura ligni
falassas ana uncis tribus, rasura ligni fantali
rubri & citrini ana uncia una & dimidia con-
fectum substituere iussi. Quo vero univerfa sangui-
nis & humorum massa eo melius diluta ab im-
puritatibus liberaretur, serum lactis caprini cum
cremore tartari paratum, succique herbarum
antiscorbuticarum cochlearis, beccabungæ &
nasurtii aquatici exprellis remanent per men-
sem & ultra primo mane haurire, & ventricu-
lum juvandi gratia elixirium meum temperate
balsamicum inter epulas ad octoginta guttas capi-
piendum commendavi. Externe tumori scirrho-
io, qui in perperuo tempore conservari debebat,
impo-

imponendum suasi emplastrum emolliens camphoratum, superpedio semine milii ex lacte cocto, duplicatiloque lente involuto, ne humiditas ad partem affectam pertingens noxam inferret. His ita per tempus observata mitiora videbantur omnia. At vero, brevi post in infima tumoris extremitate exiguus locus cuticula denudatus paucam plorare humiditatem videbatur, & circa instans mensium tempus progressus phlogosis, pectoris angustia, partiumque infernarum refrigerationibus, in ipso tumore vas aperiebatur sanguineum; unde sanguis circiter octo profluebant unciae, ante quam spiritus vini redificato fisti poterat. Quae cum animadvertentem, suasor eram, ut alvus clysteribus crebro subduceretur, ad sanguinis ebullitionem sedandam pulveris temperantis, ex osse leporis, conchis preparatis, succino preparato & nitro confecti drachma circiter dimidia cum paucis liquoris anodynii guttulis ex aqua, vel emulsione temperante interdum sumeretur; circa mensium vero periodum pilulae ad methodum *Becheri* confectae una cum pulveribus temperantibus exhiberentur. Singula haec tamen prohibere vix poterant, quin ictericia haec excrecentia in ea parte, ubi humidum stillabat, in veram abaret putredinem, verumque ulcus canerosum formaret; quod labiis valde tumidis ac duris praeditum, brevi tempore magnam acquireret crassitatem, magnamque materiem ichorose, odore terribissime fundebat copiam. His accedebat, quod per periodos sat larga recurreret haemorrhagia, quae multum semper sanguinis exhaustiens non inane minabatur periculum; maxime cum vicium robur cum ciborum adpenitentia magis & magis decreveret, & ambo pedes tumore obiderentur oedematosis. His ita constitutis ego denique consultus ad avertendum, quantum licebat, putredinis progressum, externe oleum myrrinae per deliquium applicandum, & alternis diebus antimonium diaphoreticum ulcersi inspergendum commendabam, superimposito semper emplastro *Barbetti* saponato de probe camphorato. Interne ad vires resuscitandas ordinabam mixturam analepticam, ex aquae cinamomi sine vino, melle, corticum citri sine vino, rosarum, filorum convallium, ceralonium nigrorum anatica portione uncias tribus, matris perlarum drachenis duabus & syrapi acetositarum citri uncia dimidia, invicem probe mixtis paratam, & denique iusculis alimentosis, ex iusculo gallico cum rasura cornu cervi decoctis, succoque citri vel aurantiorum alteratis agram reficiendam praecipiebam. Verum enim vero, conversis in pejus symptomatibus, agra vi morbi superata succubuit, & sicut audivi, lethali syncope extincta est.

Epietis.

Sistit hic casus integram caecori tam occultum, quam patentis ulcerati historiam, ut eo melius inde cognosci possit, quae ratione hic corpori humano infensissimus morbus oriarur, latiusque proferendo sese multiplicet. Primo autem omnium quoad originem notari meretur, quod hoc mali genus in ista corpora praecipue cadat, vel in his exacerbetur, quae longa tristitia premuntur. Nam inter decem cancro laborantes vix unum datur individuum, ubi non gravis morbus praegressus fuerit. Deinde plenius inde confirmatur, quod satis diu scirrhusa durities, nisi

irritetur, in glandulosa parte gestari possit, ante quam periculum corpori intenteat. Quam primum vero pellicula summa erosa humor tenuis & aquosus plus minus acris exsudat, jam cancer serpere incipit, atque tum caro quae procedit, putris apparet, dolor cum calore intenditur, & ora rubent, tument ac fere exulcerantur, venisque disruptis multum sanguinis effundunt. Ubi notabile est, quod, quo calidiora adhibentur medicamenta, eo color magis ad livorem tendat, tumorque & dolor augmenta sumat. Tandem febris jungitur, quae paulatim cum reliquis omnibus viris summa tot malis obrotos aegrotos interficit. In tali rerum statu cura tantum palliativa tam in quam externa locum invenit. Interna talis est, quam supra commendavimus, vitando tam in diata, quam in medicamentorum oblatione omnia exagitantia. Externa eo maxime abolvitur, ut partem affectam tepide habentes medicamentum praescribamur sine, quod ulcus sordidum repueret, cavitateque repleat; licet dolendum, quod raro, imo nunquam fere hi scopi obtineri queant. Parari autem tale medicamentum potest ex olei olivaceo partes una, aceti vini & lithargyri ana parte dimidia, sub leni ignis gradu & continua agitatione ad lithargyri solutionem & aceti consumptionem coctis, & dein cum oleo rosarum, plumboque ulio ac leto in mortario plumbeo in unguenti formam redactis, & applicatis. Expe- dit quoque eodem fine, nisi jam dictum medicamentum ad ima laeis perungere possit, liquorem infundere, qui ex aqua spermatis ranarum, rosarum, succi solani recenter expressi ana uncia una, mellis depurati uncia dimidia, & sacchari saturum aliquot granis confectus est, cui interdum etiam, si opus est, unguenti basilici portio addi possit. Sic saepe humor sat multus effluit, qui limbo multones contoroso superposito excipiendus est, ne partes adiacentes aggre- diatur. Quod si vero ob orificium angustius sordes elui nequeant, scalpello dilatato debet induci. Ubi labia ulceris ita intumescunt, ut in his venae disrumpantur, sicut in praesenti aegrotata, multum sanguinis ad plures uncias & libram usque emittant, spiritus vini redificatus vel solus, vel cum terra vitrioli dulci mixtus prodest, maxime si linteum multiplicatum, quod superponitur, commoda fascia satis adstringatur. Sed quid juvant omnia vel acutissime excogitata remedia, nisi ut vitam miseram tolerabilem reddant? Moriendum est abominabili hoc affectu certissime; gerunt enim eodem laborantes putredinem, quam alii post mortem demum subeunt, in corpore adhuc animato, quae paulatim sanguinem & tenuissimum nervorum succum inquinans lacerum corpus humo tradit.

OBSERVATIO VI.

Erat hic loci femina, ex gente Judaea, quae ab onere dorso imposito, indeque forsitan una alteraque vertebra subluxata nimium uteri protrusa experiebatur, ita ut fere continua sanguinis proflusio extra statum mensium tempus cum dolore hypogastricae regionis circa umbilicum & matricem summas crearet molestias. Medicamentis internis adhibitis mitigabatur quidem fluxus, sed in locum ipsius fluxus albus succedebat saniosus, cum ventriculi inflatione, dolore intestinorum stultento, alvi strictura & abdominis dura insular tympani elevatione junctus.

*Uterus uter-
is cum mor-
bo cancri.*

Postquam varia sine effectu medicamenta per dimidium anni ægra adhibuerat, auctor eram, ut thermas adiret Carolinas, quibus per mensem & ultra sub debito regimine usû, magnam materiam tenuioris, ac minus quam antea scetidæ ex utero excrevit copiam, unde simul alvus aperta status liberius emitebat, dolores expirabant & abdominis tumor ex voto detumescibat. Curatione hac peracta infusum theisticæ, ex agrimonia, consolida saracemica, salvia, melissa, millefolio, & floribus hyperici singulis diebus mane bibendum, & bis in septimana medicamento alvum ducendam commendabam. Ante omnia vero siphonis ope injiciendum curabam liquorem balsamicum & consolidentem cum melle remixtum, & extrinsecus emplastrum emolliens floribus sulphuris nuptum imponendum: qua methodo per singularem Dei gratiam pristina restituta sanitati denuo concepit.

Epiçriss.

Sistit hic casus uteri ulcus feliciter sanatum, quod raro contigisse exemplo arbitror. Tractavi enim plures similiter laborantes feminas, sed sine fructu, sine successu; ut porius hæctica superveniente decederent. Interim discere inde licet, ejusmodi uteri ulcera non semper unius ejusdemque esse indolis, aliasque præ aliis esse maligniora, ut potissimum evenit, si summa humoribus cacochymia insidet, à qua tamen agrosti nostra, quæ sibi malum ab externa causa contraxit, libera adhuc fuisse videtur. Alias in curando, multo vero magis in avertendo hoc morbo summam merentur commendationem thermæ Carolinæ, quæ in obstructionsibus uteri referenda fortissimè impuris eluendis egregiam præstant energiam, sicut ego aliquoties vidi. Sed adhiberi debent in tempore, ante quam substantia uteri nimis erosa, & depalcis corruptio præsens est, item si nonnullum fibræculæ jungitur. Nec sperandi sunt effectus decocta vulneraria, qualia huic ægrotae finita Carolinorum cura præscriptissima, quæ, si nimius genitalium ardor urget, cum radicibus altheæ, glycyrrhizæ, peronizæ, & aliquor papaveris capitibus possunt temperari, vel cum lacte alterata adhiberi. Externe profunt injectiones balsamicæ & putredini resistentes; si dolor vero ardorque infestant, liquorem instillat emulsionis, vel etiam hac chalybeatum tepide infundere præstat. Nec omittenda plane sunt ulcus purgantis, si hoc in usum est, ut talia commodè admittat: quo siue commendari merentur pessaria, siue lintæola contorta, cum essentia quadam balsamica, ex gummi elemi, myrrha, massiche, aloë hepatis & similibus in spiritu vini extractis madafacta.

OBSERVATIO VII.

Uterus la-
tus infir-
mus, sine
menstruo.

Vir illustri loco natus, LXX. annorum, iracundus deditus & calidiori semper conclavi adfuetus, qui magni Principis Consiliarius complures annos vita sedentaria in consiliis dandis ac conscribendis consumerat, ex improvise per gentis acuti mortui inferiori labio illatum tuberculum sibi contrahebat durum & dolorificum, quod sensim paulatimque disruptum ulcusculum formabat non adeo bonæ indolis serpens, ichoremque purulentum fundens. Qui auxilium ferendi causâ aderant Medicus & Chirurgus, negle-

cta curatione iocerne, folis externis curationem moliebantur, eoque siue potissimum digestivum cum balsamo de Copaiva & melle rosato mixtum adplicabant. Ego autem, cum per litteras & meum requireretur consilium, primo omnium venæ sectionem, quam vir illustris ob invalefcentem senium diu omiserat, in pede administrandam iussit; post hæc vero totum curationis negotium eo direxi, ut universa sanguinis & humorum massa, quæ in senili corpore, & sub vita motus experte non exigua impuritas labe inquinata videbatur, debitis internis remediis depuraretur; idque eo magis erat necessarium, cum totus corporis ambitus instat ictericorum flavo colore defœdatus minoribus passulis summoque pruritu vexaretur. Quare ego præmissis & interpolatis laxantibus rhabubarinis & mannatiss, decoctum ordinavi purificant, ex radice pareiræ bravæ, sarsaparillæ & chinæ cum passulis confectum, quod tum mane ad sudorem movendum calide, tum potus ordinarii loco frigide hauriri debebat; subjunctis interdum vesperino tempore pulveribus diaphoretico-cinnabarinis. Externe oleum myrrhæ per deliquium, liquidambræ nuptum commendavi, atque hæc omnia tum solici successu, tum æger intra mensem integra gauderet valetudine.

Epiçriss.

Præsens labii ulcus, à causa externa subortum, non adeo multum sinit periculi, licet non negandum sit, quod ab interna sanguinis & humorum impuritate pabulum subinde & augmentum receperit. Quare non sine fundata ratione curationem internam simul adordandam & persiciendam commendavi, ut subtrahendo morbi pabulo exterosa remedia eo liberius operari potuerint. Præter hæc sciendum est, quod ejusmodi laborum ulcera non adeo expeditè sint sanationis, partim quod non omnia ferunt remedia in aliis ulceribus proficua, partim quod loquendo ridendoque labia facile irritantur, ut inde non raro deductus cum dolore nimis sanguis ciceatur. Accedit demum, quod continuo salivæ laticis affluxu tale ulcus madafactum non adeo bene à sordibus possit repurgari; unde non potest non diutius protrahi consolidatio.

OBSERVATIO VIII.

Virgo erat generosa, XX. annorum, macilentæ, quæ ob vitæ genus sedentarium, puriorum potum & largiorem acetariorum inter cibos usum inordinato mensuum fluxu & symptomatibus cum eodem conjunctis laborabat. Brevis post in altera mamma tumor exsurgebat durusculus, qui ex parvulo incipiens sensim paulatimque crescebat. Circa ejus ambitum, quin aliquando in ipso, aliqua quasi puncta sentiebantur, quæ brachium illius lateris in doloris coösentium duceudo, optimam virginem de salute valde sollicitam reddebant. Veniebat itaque ad me duplex, ut ipsi & consilio & auxilio succurrerem: unde ego petitis annuens ad sanguinis massam depurandam mensumque fluxum, qui ultimis periodis penitus cessaverat, revocandum, thermas Carolinas cum debito regimine potandas; externe vero emplastrum emolliens camphoratum cum cataplasmate milii imponendum commendabam. His ita per tempus adhibitis redeunte menstruo, tumor quidem detumescere

Uterus la-
tus infir-
mus, sine
menstruo.

tumescere videbatur, sed paulo post in ulcus terminabatur, quod interpositis internis decoctis sanguinem depurantibus, subiunctoque ad catamenia in ordine servanda elixirio balsamico, externe balsamica, & deinceps unguento tractabatur, quod oleum recipiebat rosaceum in mortario plumbeo, donec nigrescebat, tritum, & cum cussilla & sargyrio remixtum, superposito emplastro manus Dei. Atque hac ratione aegra successu temporis exoptata reddebatur sanitati.

Epierysis.

Varis, & mammarum quoque affectibus preternaturae mulierculæ, cum menstrua non bene respondent, vel ex toto ferri desinunt, non autem illæ, quæ, quia lac præbent, à mensibus defectæ sunt. Quod si enim sanguis superfluit per uterum excremandus lotus retinetur, tum ipse ad alias, maximeque superiores partes regurgians varii generis incommoda, ut in imo ventre spasmos & flatus, in pectore angustias cum difficili respirazione, in capite gravitatem, vertigines, cephalalgias, imo non raro in mammis, quibus magnus cum utero consensus intercedit, tumores scirrholos ulceraque tam benigna quam maligna suscitât. Idem tulit farum præcæna virgo, quæ ex mensium fluxu propter vitam sedentariam, potus inopiam & acidorum comestione suppressio molestem mammarum tumorem & ulcerosam labem obtinuit. Erat autem hoc ulcus benignæ indolis, licet in comparatione cum aliis ulceribus curatu difficilium, quod vel ex eo tunc appareat, quia pus aluit & cicatricem recepit. Tantum enim abest, ut omnes partium glandulosarum tumores & exacerationes in cancerum, seu malignum ulcus semper abeant; ut potius felici omne abscessum sæpe benignum faciant, curationemque admittant. Id vero potissimum solet contingere in subiectis sanis, vegetis nullaque fontica, vel tamen facile emendanda humorum dyscrasia infectis; sicut quidem in nostra ægrotâ animadvertere licet, quæ resistito mensium fluxu depuratiq; paululum succis alacrior reddita vim morbi felix superavit.

Plures observationes evolvi possunt in observat. & responsis meis medicinalibus casu LVIII. LIX. CIX. CLXXI. & alibi.

CAPUT VII.

De circumspēcta ulcerum fistuloso- rum curatione.

THESES PATHOLOGICÆ.

§. I.

Nulla externarum partium læsio Medicis æque ac Chirurgis plurimum facit negotiū, summisque operandi difficultatibus pressa est, est profecto ipsa fistularum curatio. Nam præterquam quod hæc ulcera specie valde sint diversa, admodumque difficile ab aliis ulceribus distinguantur; quam maxime etiam hoc accedit impedimentum, quod sæpe in iis locis sedem occupent, ubi remediis & operationi, manu peragendæ vel difficilis vel nullus plane datur accessus. Verum enim vero, quam frequentius

hoc mali genus occurrat, plurimumque interfir, qua ratione rite cognoscatur, & ad sanationem perducatur; operæ facere pretium exilimo, si succinctam, sed experientia fundatam de fistulis doctrinam huic operi subiungam.

§. II.

Est autem *fistula ulcus sinuosum, inveteratum, oblongum & circa officia artium, interius non minus quam exterius callosum, doloris maxime expert.* Suum accepisse nomen videtur fistula à cavitatibus istis oblongis & induratis, quæ in longum reptando, aliqua ex parte cum aliis arundinum vel fistularum cavitatibus conveniunt; unde etiam à Græcis *σπῆλη*, à germanis *eine Fisteel, einen Röh- oder Hohl-Gefäß*, à *fistulariter Schade* non inepte hæcenus appellari consuevit. Quo tamen eo melius adhuc de peculiari fistularum indole consistet, scire omnino licet, fistulas ideo maxime ad ulcerum genera referri, quia sædam continui solutionem, seu filamentorum, quibus solide partes consistant, dilacerationem junctam habent, quæ deinde cavitatem, lenta, putrida & mali odoris lymphâ repletam progignit. Atque in eo etiam ab abscessibus vel aliis generis ulceribus discrepant, quia non tam bonum coëquumque pus faciunt, sed potius ichorosam & acrem materiem stillant. Verum oblongæ quoque sunt, varinque & multiplices sinus formant fistulæ, ita quidem, ut in principio suo cum oris præduri, tumensibus & quasi inversis, artius coeant, in profunditate ampliora fiant, & latius se extendant. Imo demum callus, seu concretum præternaturale durum & membranaceum à fistularum natura non debet excludi, quo superficia ductuum sinuosorum obducitur, ipsaque mali sanatio non parum impeditur. Licet enim quandoque ora prædure & callosæ cicatrice induantur, hæc tamen denuo disrupta ulcus facile renovat, vel etiam materia acris contenta, alias querendo vias, per novum orificium foras prorumpit.

§. III.

Omnes fere ac singulas machinæ humanæ partes solidas invadere solent fistulæ. Necque enim solum in carnem extendendo faciunt, sed glandulas quoque earumque vasa, arterias, venas & nervos, tendines & cartilagineas occupant, & acerbis sæpius dolore commovent, ne offibus quidem exceptis, quorum primo tenella, dein solidiora putrida carne ita dissolvunt, ut materiam pessimi odoris fundant, difficillimamque sanationem efficiant. Enimvero, dubitare quis posset, an omnes, quas enumeravimus, partes fistularum subiectum constituant. Sed qui altius secum perpendit, quod tota corporis fabrica ex meris fibris artificiosissime inter se connexis & coactis constata sit, quarum prima lamina & filamenta prout magis vel minus crassa, vel tenera existunt, laxiusque vel compactius coherant, varia constituunt organa; facile profecto concedet, omnes solidas partes, quæ ex uno constant principio fibroso, fistulis posse affici. Unicum tantum remanet dubium, an fistulæ etiam ossa aggrediantur, quæ dura sunt, fortiterque resistunt. Sed responderemus, quod omnino in mali consortium trahi possint ossa corporis fulcimenta: siquidem plurius auctorum Chirurgicorum observationes idem faciunt, ex ulcere fistuloso fragmenta ossa fuisse extracta. Imo,

Imo, si meam ipsius experientiam interponere licet, ego vix adseverare possum, me aliquot finiles annotasse casus, qui de fistularum in offeis partibus sede certos nos reddere possunt; quamvis libens lubensque concedo, quod non tam in principio, quam potius in mali incremento tale quid soleat contingere.

§. IV.

- differ-
tia.Descriptio
lacrymalis.

Differunt fistulae secundum partes, quibus insensae sunt, & in singulis quidem propria quaedam signa habent, quae annotari metuitur. Hinc etiam diversa pro partibus affectis fistularum fluxerunt nomina, ut habeamus lacrymales, maxillares, genae, colli, pectoris, abdominis, ani, & ejusdem generis alias, quas nunc scorsum spectabimus, orti à fistula lacrymali, cujus vera sedes est sacculus ille lacrymalis, qui in majori oculi angulo sinus oculum quasi refert canalis, per quem liquor profluens à lacrymali glandula in nasi cavitatem prolabitur. Neque labe vacant partes proxime adjacentes, maximeque sinus ethmoidales, qui in nasum producti mucosum ibi materiam deponunt. Quo etiam spectat os unguis appellatur, quod totidem interdum perforatur. Namque tenue illud est & exiliter circa internum oculi angulum, ad osium canalis nasalis situm, ubi etiam positi sunt rami ex arteria carotide & vena jugulari decurrentes, itemque nervi a quinto & sexto pari emissi. Quandocumque igitur canales lacrymales, & sic dictus sacculus, una cum partibus, quae his proxime adjacent, ulcere maneat, sinusio & callosio occupantur, vera adest fistula lacrymalis, adeoque haec commode simul distinguitur à simplici, quae fistulam plerumque amittit, obstructione & superficiali exulceratione viarum lacrymalium, nec non à tumore quolibet inter oculos & malum conspicio, quem anchiropem dicunt, neque minus ab erglopo, seu anchilope versus exteriora aperto & leviter exulcerato, nondum tamen callo obduco distat.

§. V.

- oculi,

In fistulis maxillaribus & genae totum tractum à glandulis parotidis & apophysi mastoidea ad anulum primum arteriae aënae pro subiecto agnoscimus. Quo referri etiam debent praeter cutem externam & pinguedinem vasa sanguinea, musculi buccinatoris portio, musculi laborum maxillae & bivenae, qui omnes vel labiis movendis, vel motui maxillae inferioris dicati sunt; neque mirus posset illis glandulae cum insignibus ductibus & vasis salivabibus. Conglobatarum enim innumere in labiis & palato deprehenduntur, conglomeratae autem sunt parotides, quae totum illud spatium replent, quod angulo posteriori mandibulae inferioris & apophysi mastoideae interjicitur: imo infra quoque maxillares internae, seu Warthonianae locatae sunt, quae si laesae fuerint, lympham puram eamque copiosam fundunt. Neque demum inepte huc referri possunt dentium fistulae; siquidem in vulgus usque notum est, nullam ferme genae fistulam absque dente carioso fieri, quae per artem extracta sponte malum evanescit.

§. VI.

- mastoi-
dis & genae.

Sequitur ordine fistula in collo, per quod productionem thoracis, ab atlante, seu prima prope caput vertebra, usque ad primam thoracis vertebra, quae eminens dicitur, exoritur.

significamus. In duas autem partes, alteram anteriorem, alteram posteriorem collum dissecatur, quarum illa guttur, haec cervix appellari solet. In cervice fistula rarius, in gutture frequentius gignitur, utpote quod praeter vasa sanguinea jugularia & carotidalia, lymphatica ac nervosa, oesophagus quoque & arteriam aënam complectitur, quae posterior similiter nonnunquam diti huic malo subiecta est, sicut testis est MARCHETTE in *obs. chir. obs. XXXVII*, qui fistulam per duos arteriae aënae annulos transeuntem describit. Atque notandum est, quod interdum talis fistula multis sinibus ad ipsas clavículas subrepat, qualem observationem descriptam legere licet apud SCULLIUM *armament. chirurg. part. II. obs. L*. Praeter haec vero levum hoc morbi genus pectus quoque solet adhibere, quod ex triplici substantia, ossis, cartilaginosa & carnea eo maxime sine coalitum est, ut non modo cordi & pulmonibus tuendis inserviat, sed etiam aënae sui ipsius extensioni ac compressioni congruenter sufficiat. Saepè enim tale fistulosum ulcus per pectoris cavitatem transiens ipsam cordis substantiam erodit & perforat, quale notabile existit exemplum apud MARCHETTE *I. cit. obs. XLVII*. Neque umbilicalis ad intestina pertingens fistula rarissima est, sed jam antiquissima Hippocratis temporibus celebrata fuit. Id quod inter alia insignis locus, *epid. lib. VI*, reperit indicat, ubi mentio injicitur fistulae umbilici ex vulnere subnatae, ex qua per intervalla magnus prodiit lumbicus, indeque iudicatum fuit, intestinum simul fistula esse tactum, ex quo perforato lumbicus ille prodierit.

§. VII.

Restat adhuc exploranda illa fistula, quae circa sedem oritur, & an fistula nuncupatur. Occupat haec maxime vasa venosa haemorrhoidalia, quae anum corona quasi cingunt, sanguinemque per arterias allatum revehere debent. In his enim facile sanguinis contingit stagnatio propter suum perpendicularem, ubi aditus semper est difficilis. Accedit luxor intestini repleti compage: unde ob non debilitatem sanguinis ibi subsistens tenues vasorum tunicas distendit, & incarcerationis corrosivam induit naturam. Sequuntur hinc saepe pressio, ut aiunt, pede haemorrhoides coeae, seu dolorifici tumores inflammatorii, qui si non cito discutiuntur, vel a grosso sanguine per scarificationem aut incisionem liberantur, facillime in apostema abeunt, quod si scalpello incisionem non tempe sitive aperitur, ac deterisivis & traumaticis consolidatur, in ulcus degenerat; unde dein saepe originem sumunt fistulosi ani & partium circumjacentium, ut musculorum ipsiusque sphincteris sinas. Crur enim serofus extrinsecus summa acedine imbutus intestini recti membranas, reliquasque coarctatas carnes facile perodit atque exedit, unde fistulae origo.

§. VIII.

His ita perspectis videndum est, quamvis causae horum ulcerum generationi velintur. Ex his autem praecipuum obinet locum, succorum vitalium, maximeque lymphae impuritas, ex improbo victu, viriisque viscerum & emundiorum enata. Quod si enim ab incongrua dieta multae impuritates in corpore accumulatur, & emundiorum oppilatis fordes excrementitiae salino-

- pelm.

- al.

Causa p
analis
laron.

salino-sulphureæ à succis vitalibus minus rite fecernuntur, non tantum sanguinis & humorum massa fauisti aduersum induit diathesin, verum etiam concitantes motus & fibrarum irrationes producuntur, quibus dein peregrinæ indolis saliva fortius attrita & ab involuero suo nudata maiorem acredinis vim acquirunt, ut carneas fibras discindant, angustissimos glandularum aliorumque vasulorum tubulos, quibus se intromittunt, arrodant, nervasque & membranaceas partes magno cum dolore & cruciatu consumant; imo demum ipsas ossium lamellas acrimonia sua exedant atque carie depalcant. Probe tamen hoc loco notari velim, sicut omne ulcus, ita etiam in principio fistulas inflammationem partis antecedere, quæ nil nisi minorem vasulorum à flagrantem sanguinem vel lympham obstruendo est, cui dolor, ardor, rubor, tumor & arteriolarum dilatatio junguntur: unde dein corruptio & pus generatur, quod acrimonia sua partes magis corrodit, cavitatemque & sinum format.

§. IX.

Ex dictis jam facile patet ratio, cur scorbutici, hypochondriaci, cachectici, lue venerea affecti & alii, quibus viscera minus salva, sed infecta vel corrupta sunt, ob fucos impuros & largam fordem salino-sulphurearum progeniem tam frequenter vari generis ulceribus, ipsique fistulis corripiantur. Neque dein minus constabit ratio, cur omnia illa, quæ ad viscidam & acrem humorum impuritatem contribunt, ut fere sunt, aut crassus & vappidus, viscus salinus & viscidus, potius parvus vel consistenter, omniumque maxime excretionum naturalium retentio vel suppressio, ulcera ejus generis non modo producant, verum etiam producta foveant. Ita non raro evenit, ut à suppuratis mensibus vel hæmorrhoidibus, ob retenti sanguinis stagnationem, fistulæ uteri & circa anum prodiant, sicut exemplis docuit HILDANUS *centur. II. obs. 61. & 75.* & DOLEUS in *encycloped. chirurg.* qui post lochiorum fluxum suppressum vidit mulierem copiosissimis, usque fistulosis crurum ulceribus infestam.

§. X.

Sæpiissime etiam fistula natales sunt ab ulceribus præpositæ tractatis, ut inter alia fistula lacrymalis ex agiolo, & ani ex hæmorrhoidibus exulceratis docet; neque minus ab abscessibus maturis vel non satis cito, vel in loco inconvenienti sublimiori apertis, item si non legitime depurantur. Materia enim purulenta ichorosa, non satis commodeeducta & per moram acrior reddita, partem gravitate, partim acredine, fibrillas, membranas & vascula disconiungit, sinus sibi efformat variæ figuræ ac magnitudinis, ichorosa materia repletos, & vel intrinsecum, vel extrinsecum patulos. Maxime autem tale quid solet contingere in abscessibus & ulceribus glandularum maxillarum, parotidum, inguinalium &c. ubi, ob difficilis ductus lymphaticos, perpetuus est affluxus humorum, quibus nisi liber conceditur exitus, vapescunt, acedinem contrahunt, & per facile sinus angulos, oblongos & callos obductos producant.

§. XI.

Tum quoque ex vulneribus progeneri solent fistulosi sinus; quod possimum uti venit, si
Frid. Hoffmann Oper. Tom. III.

quis in situ curvo vel inflexo constitutus ita vulnus accepit, ut instrumentum lacerans non recta, sed obliqua via transitum fuerit. Tum enim facile cavitates formantur, quæ non satis rite à stagnantibus humoribus depurate callos recipiunt, & materia in alio loco decliviori prorumpit. Idem accidit, quando curationem vulneris Chirurgus protrahit, quia tum non raro symptomata complicantur, quæ sanationem multis modis impediunt, fistulamque impingunt. Sic hoc locorum in fistulo quodam Gallicæ lingue infirmatoris fistulam lacrymalem olim observavi, quæ originem debebat vulneri per catum ab alto excitato; unde os unguis rursus, quod valde rarus ac spongiosus est, carie perforatum medelæ nullum relinquebat locum. Spectant huc quoque remedia acris & nimis calida in ulceribus & vulneribus adhibita, quæ partim maiorem humorum adfluxum ac fluxum producunt, partim remnes fibrillas constringendo, occasum fistulæ præbent.

§. XII.

Singule tamen fistulæ speciales quasdam causas habent, à quibus originem suam mutuatur. Videre hoc maxime licet in fistula ani & lacrymali. Hæc enim non semper ab externis lacerationibus, vulneribus & ictibus provenit, sed sæpiissime inflammationem faciei erysipelatodem, quæ simul texturam viarum lacrymalium turbavit, excipit, vel etiam ophthalmiam sequitur, quia ductus lacrymalis non solum proxime cum peristio, sed & cum ipsa oculi tunica adnata coherentes in ophthalmia & cephalalgia facile in consensum abijciuntur. Idem malum contingere solet post variolas, quæ meatum in naso & palpebris orificia vel mole sua, vel ichorosa materia comprehendendo, consuetas feri excretionem impediunt; unde facile obstruendo, & ex hac neglecta sæpe exulceratio oritur, quæ fistulam parere potest, si ulcerosa sanies stagnans saccum lacrymalem, & quod subest, peristilium erodit, novoque subinde sinus format, qui sensim callo involuitur. Interdum etiam, ut in scorbuticis & lue venerea infectis videmus, polypti & oræna, aliæque ulcera serpentina naribus immittuntur, quæ ductum nasalem rodendo, vel sanie ulcerosa implendo, ferum lacrymale exitu prohibent; unde hoc glutinosi vel subsistens has partes facile arrodit, corrumpit & exulcerat: sicut hæc omnia perdoctæ ostendit celeberrimus Academicæ Lipsiensis professor D. PLATNER in eleganti dissertatione de fistula lacrymali olim habita. Ad fistularum anni generationem multum plerumque facit sortior motus, equitando præsertim institutus. Siquidem hac ratione facile nimia vasorum hæmorrhoidalium distensio & apertio efficitur, quæ in ulcus desinit. Idem in fequiori sexu citre valet gelatio factus, & nimis parturientium mias, dum à venis compressis & inde retardata sanguinis per ipsas circulatione, hæmorrhoides eoræ in nonnullis excitantur, quæ perperam curatæ sæpe principium ulcerum fistulosorum in ano constituunt. Aliæ fistulæ pro sita suo iterum alias agnoscunt causas, quas tunc, quia scopo nostro minus inservire videntur, studio prætermittimus.

§. XIII.

Jam etiam pauca dicenda videntur de rationibus phenomenorum, quæ fistulas assidue comitari solent. Primò autem omnium se offert callus, seu

— remedia
a rite &
callosa.

— remedia
a rite &
callosa.

— & cal.

Callus
eius &
indolens

— ulcera
& abscessus

— vulnera

ficu caro indurata, indolens, ulcerisque consolidatorem impediens, cuius naturam paucis evolvemus, videndo primum, quæ ad duritiem concurrant causæ. Hæc autem me iudice deducenda videtur ad externi aeris accessu, qui sinus & cavitates fistularum intrans immediate fibris carnis incunab, poros coarctat, & circulationem humorum per has partes compressas retardat, vel penitus suffocant: unde ipsæ sensu ac motu privæ callositatem contrahunt. Namque satis, ut arbitror, ex physiologicis constat, quomodo per omnes corporis canaliculos & poros fluidum iusta in copia fertur, tandem partes molliæ suæ, debitaque textura gaudent; simul ac vero pori, ut ab atmosphæra ambientis poudere sit, comprimuntur, fibrillæ, ex quibus partes confasæ sunt, archus conjunguntur, fluidique itus ac redivus impeditur, tum prius illas partes majorem sensum, & duritiem acquirunt. At vero, ad duritiem istam callosam in fistulis, etiam vis acidis ulcerosis coagulans permalum contribuit; quod fluidas partes coagulando in motu sistit; unde hæc sibi invicem magis ac magis appositæ callo originem & incrementum suppeditant. Præter hæc vero notabile est, quod callus sensatione caret; quod quidem exinde derivandum arbitror, quia ipse ex fibrarum lamellis finnius sibi per coactionem connexus cunctis, per quas nullus neque sanguinis neque aliorum succorum vitalium viget transitus, adeoque sensu & motu non potest non destitui. Denique etiam callus in fistulis omni resistit sanationi, quia materia nutritiva, quæ partium ad se invicem conglutinationi intersere debet, per callosos poros non penetrare, neque sistas coadunare valet: quare nisi callo per autem remoto nulla fistularum contingit sanatio.

§. XIV.

Sequitur jam cavernarum sinuque obliquo- rum consideratio, qui à materia acti, rodente, in partium solidarum tubulis flagrante, & ex his loco præclusi proficiuntur. Tum enim, ut supra jam meminimus, materia tam sua ipsius gravitate, quam aeris incumbens pressura viam sibi præparat, & poros vicine carnis intrando, filamenta ipsius dilacerat, & quæ duriora ossa, cartilaginea, arterias, nervos tam subito periclitare nequit, novam sibi cavernam efficit, ex qua deinde iterum novi canales prodent. Quod vero officium fistularum exterius multo durius, multoque angustius sit, quam canalis interior, non alia est ratio, quam quod materia aeris ichorosa gravitate sua in profundum magis & ad latera ferens non tam facile ad ostium ulcers peringat. Cui accedit, quod aer frigidus exterior ipsas ulcers oras plerumque rursus durioresque efficit; unde oriuntur magis coarctatur, cui se facile vicinior applicant, quæ materie ichorose effluxum impediunt, hanc ad internas cavitates magis determinant.

§. XV.

Præter hæc quoque pro diversitate subiecto- rum & partium affectuum materie variz curantur effluxus, ita fere, ut in nonnullis pus album coctum, in aliis nigricans & graveolens, in aliis tantum ichor tenuis & aeris, malo odore varique colore præditus appareat. Alium coctumque pus, quod bono iudicio est, plerumque in recumbentibus fistulis, vel tum temporis con-

spicitur, quando materia partes sanguineas & carneas occupaverit; albedo vero puris debetur commixtioni particularum acidarum cum gelatinosis & succi nutritii oleosis, non aliter, atque extra corpus contingere videmus, si forte acidum cum oleosa substantia miscetur, ubi mox albicans prodit color. Graveolentia, quæ jungitur, intus partium salino-sulphurearum combinationi, seu putredini dissolventi in acceptis ferenda est, quia indurata experientia fide constat, quod ipsa putredinis labes ab ulceribus, præsertim vetustioribus, excludi maxime possit. Denique consideranda venit summa materie effluens acro, quæ sæpe tanta est, ut lintamina ardeat, & vix aliunde, quam ab humore flagratione & corruptione progignatur. Omnes enim corporis animalis succi extra legem circulationis positi & durius crassifcentes, flagrando, plase alienam induunt crustem, maximamque acquirunt acrimoniam: unde non mirum esse debet, cur etiam in fistulis similia videamus contingere.

§. XVI.

His iam expositis proximum est, ut accuratius determinemus, quæ ratione exploranda sit fistularum præsentia, & propria cujunque indoles. Optime autem id primo efficitur, si digiti exploramus, an dura adfit productio, an illa per lineam rectam vel curvam in cute proferat, & an paucus vel nullus doloris sensus percipiatur. Dein formam fistularem specillo, seu instrumento exploratorio inquirimus; unde facili negotio cognoscitur, quantum fistulæ sciatur productionem, quamque habeant directionem live sursum, live deorsum, vel ad latera tendentem. Quam in rem cetera sunt, quæ protulit PARÆUS lib. XII. cap. 23. multis, inquit, cuniculis & in labyrinthum anfractuosa judicatur fistula, si non alio descendit specillum, & nibilo minus plus famini est, quam tam exigui ulceris ratio ferat: an vero ierina sit, opus est, ut id velle cognoscamus. Præstat autem id ipsum virgula quadam ceræ vel instrumenti tali, quæ solet vulgus purgare suas tabaci fistulas: hæc enim ad quamque lacerata se flexere & ad fistulæ figuram se accommodare possunt. Quod vero specillo, vel instrumento exploratorio explorari jubent CÆSUS atque PARÆUS, id HIPPOCRATES lib. de fistulis per alii recentem scriptum experitur, quam ego methodum auctori suo relinquo, & illis, quibus occasio observandi faverit, expeririendam commendo, id tantum commonefaciens, quod præter hæc omnia de fistularum præsentia aliqua ex parte certiorem statum, si ulcus jam diu daverit: quæ enim annua sunt ulcera, in his cicatrices cavas fieri necesse est.

§. XVII.

Speciales fistulæ iterum speciales habent notas, ex quibus cognoscuntur. Ita fistulæ lacrymalis indicium est, si circa angulum oculi internum fistulosa canalicula exulceratio deprehenditur. Sæpius tamen sola intermedia cum rubore consistit, quæ compressa lenies ulcerosa aut scruum acre, alium & vicium vel oculum verius vel nares perurrit. Necque omittenda est peculiaris ADRELLII vias lacrymales explorandi methodus, quam specillo argenteo quoad extremitates ex quibus globulis minuto perficere solet, cuius dejectionem & usum tradidit Excell. PLATERUS. Fistulam maxillarem indicat plerumque

Fistulam explorandi methodus.

— & 30. —

rumque materiae inter manducandum & oscitan-
dum effusio, praesertim si vasa lymphatica jam
sint concolata. An fistulam manifestant ante aper-
tionem maxime dolores, rupto vero abscessu ichor
effudit summi fortioris. Si ulcus inestini recti
substantiam tantum perforat, paribus externis
instructis, ichorosa materia per anum tam ante,
quam post facum alvinarum rejectionem pro-
funditur, prout fundus fistulae, vel superius, vel
inferius laesit. Supra autem fundus solet hære-
re, quando ante facum leniter saltem indurata-
rum fecesione ichorosa acris materia expellit-
ur; inferius autem, quando ichoris stillicidium
excrementorum dejectionem sequitur, vel si in-
terculum ad tubedinem vergens exterius prope
ani foramen confpicitur, eo praesertim tempore,
cum fundus ichore repletus est, quo effuso tur-
mor evanescit. Sin intra intestini tumcas fistu-
la proferpat, foramine exterius confpicio, dig-
noscitur exploratio candela cereae, vel instru-
mento accommodato; si hoc intra membranas
urgetur, lamella digitis immixtis & stylo in-
terjacet. Intestinum si interius quoque aperta
gaudeat, instrumentum adactum digitos proxi-
mè attingit, materiaeque partim per ani fore-
men, partim excrementa & flans per orificium
fistulae prodeunt, itemque liquor per ani fore-
men inchois regurgitat, & per fistulae nam aper-
tam exijit. Fistula sphincterem ani perforans
apparet, quando digiti apex ano contracto in-
trahit haud fortiter comprimitur, sed in amplius
valoque dilatabilem cavitatem recipitur.
Quae vero fistula multis cuniculis praedita est,
exploratur candela cereae, vel instrumento Becili.
Praeterea fistulae ani partes saepe continenas in-
fectant: nam multoties non solum ad vesicam
tendant, ubi vel urina per anum prorumpit, vel
ichor & excrementa cum urina profiliunt, ve-
rum etiam in liquore seu ad uterum repant,
in quo casu faeces cum sanie ichorosa per uterum
egrediantur. Quae vero ad coxendicis vel coe-
cygi ossa pertingunt, difficilioris sunt cognos-
citur, nisi os carie infectum, quod ex ichore gra-
viter & nigricante effluo concluditur.

§. XVIII.

Prognosis
fistulae, quae
interius &c.

Restant jam pauca de prognosi, sive eventu
affectus nostri dicenda. In quo quidem per-
ficiendo primo omnium attendi meretur sedes fi-
stulae, partiumque affectarum structura. Sum-
matim tamen adserimus, fistulas ad interiora
pertingentes periculi nunquam esse expertes,
admodumque difficilem admittere sanationem,
quoniam non adeo facile à sordibus possunt
mundari, nec omnibus sine discrimine remedia
adjuvari; unde facile fit, ut pars quaedam no-
bilibior arrodatur. Sic lethalis est illa, cujus men-
tionem facit MARCHETTE *obs. XLVII.* ubi ex
vulnere ossis sterni fistula exorta ad ipsam
cordis substantiam penetravit. E contrario fistulae
extrinsecus spectantes & visui obviae non tan-
tum in sanando habent discriminis, sed ipsam,
si superficialiter & cutaneae sunt, saepe intra qua-
tuordecim diem spem contigit sanatio.
Quae ad muscularum tendines, arterias, venas
& nervos penetrant fistulae, periculo non va-
cant; cum contra curatu faciliores sint, quae
in mollibus carnosissimis partibus existunt: unde
jam HIPPOCRATES in *Caec.* hoc tulit iudicium,
quod fistulae, quae in cartilagineis & excarni-
bus locis sanantur multum sanis funderent, &
carunculam in osculo continerent, omnem fere
Erid. Hoffmanni Oper. Tom. III.

medelam respuerent. Similiter etiam quae circa
articulos oriuntur fistulae, ægerine sanantur,
partim ob molestem synoviae adhaesum,
partim ob continuum harum partium motum.
Hinc insanabilia pronuntiat ulcera fistulosa
HILDANUS *obs. 48. cent. IV.* quae circa jun-
cturas mandibularum contingunt; quod tamen
ita leniamus, ut ipsa potius curatu difficillima
declinemus, quam ut omnem sanationis spem
ipsam praecindamus; siquidem non ejusmodi
fistulam circa juncturas maxillarum obortam,
& continuo lymphae inter ossa mallicandos in-
ficandamque adfluxu molestant in virgine olim
felicitur sanam novimus. Denique difficilis,
admodumque longum est illarum fistularum sa-
natio, quae oculi canthum, intestina, vesicam
& canalem urinarium occupant, quoniam non
tantum singulae hae partes exquisitum habent
sensum, verum etiam medicamentorum appli-
cationem difficilem admittunt.

§. XIX.

Porro diversa quoque nascitur prognosi quoad
amplitudinem vel angustiam cavitatum. Sic
enim fistulae, ampliori raeliae orificio, majorem
spem sanationis ostendunt, quam quae in
angustum coeunt. Quae in breves desinunt ca-
vernas, unam quasi ductum in alium immit-
tentes magnam in medendo molestant creatae,
& vix absque magna opera medelam recipiunt.
Quandiu os cariosum & callus in fistula re-
manet, frustra speratur salus, quia os sideratum
semper partes vicinas in labi consortium tra-
hit. Hinc etiam fistulae, à carie ossis subnatae,
omnem respuunt sanationem, nisi prius caries
fuerit sublata: cum contra aliter res sese ha-
beat in iis, quae ab ulceribus, abscessibus &
vulneribus origine duxerunt, utpote quae cu-
rationi facilius obtemperant. Praeter hæc vero,
periculosa quoque in ere, ut in prognosi fe-
renda susceptorum fistulis laborantium rationem
habeamus, quia regulæ instar practicae tenen-
dum est, in scorbuticis & cachecticis, ut om-
nia vulnera & ulcera, sic etiam fistulosa diffi-
cilius cicatricem recipere. Siquidem largiori
succorum inutilium adfluxu continuum malo pa-
bulum suppeditatur, quo nondum subtrahit,
irritus est omnis medentis labor. Denique de
accidentibus quibusdam, in fistulis obvis hæc
est prognosi, quod, si e.g. lapides ex fistu-
losis sinibus excreantur, ut SCHULZIIUS in
ephem. N. C. anno IX. & X. obs. 185. annota-
vit, vel si vermes iidem innidulantur, ut BE-
RELLIUS in *obs. medico-physic. cent. II. obs. 48.*
testis est, & ego ipse observavi, item si hamor-
rhoides per fistulam intestini recti, & menses
per fistulam uteri excreantur, nunquam fere
non longum requiratur tempus ad curationem
ex voto perficiendam.

THESES THERAPEUTICÆ
CUM CAUTELIS.

§. 1.

Ante quam ad ipsam fistulis medendi me-
thodum nos accingimus, operæ esse pretium
ducimus, nonnulla praelibare & excutere, quae
circa fistularum curationem obijci à quibusdam
solent. Plurimi enim de Medicorum & Chirurgorum
in dubium vocare ausi sunt, utrum fistulae
antiquae tuto consolidari queant, & an non potius
Re a sicut

→ ratio
alterum
circum-
stanciam.

Fistulae co-
lique in
cicatrice

sicut à fonticulis diu manantibus & occlusis major inde noxa in agrotantes redundet? Equidem de componenda hac līe follicitis probe scio, quod splendidissima illa medicina sidera, GALENUS, PARÆUS, HILDANUS, BARBETTE, *Vidus VIDIUS, Fabricius ab AQUAPENDENTE, SCULTETUS, & AMMANNUS* negativam sustinuerunt, multisque fūctis exemplis noxiam harum fistularum occlusionem comprobaverunt. Verum enim vero, licet libentissime concedam, quod ulcera illa antiqua & fonticuli diu gellati, in corpore impuro ante debitam sanguinis & humorum depurationem occlusi lævissima inducere symptomata valeant; neminem tamen inficias ire cōfido, quod citra ullam sanitatis detrimentum consolidatio possit inficui, si prius internis remediis tam corrigentibus, quam evacuantibus, & aliis depurationi infervientibus impura humorum massa ad meliorem, blandiorem & naturæ magis amicam reducā fuerit temperiem. Quæ quidem in re plenissime me confirmat & fide digna peritissimum Medicorum, & mea ipsius experientia, quæ plurimis me exemplis docuit, citra ullam noxam, aut subsequenter graviorum symptomatum syndromen, sæpe etiam sine scrupulo internum usu fistulas etiam antiquissimas fuisse sanatas. Multo vero magis ponderosis inducibus rationibus credo, fistulas neglectas & sine curatione relictas in ingens vitæ discrimen agrotantes conjicere. Exemplo sit fistula lacrymalis, quæ nisi opportune tractatur, humorem oculi aequum nutrimento suo privat & in perniciem denique cōcitatem definit. Accedit tandem, quod in fistularum sinibus cōtinua generetur acro, quæ excedendo & corrodeso innumeros fibi canaliculos efficit; unde succellu temporis ingens humorum corruptio, imo ipsa demum splacellatio produci potest.

§. II.

*Id est: natura
corro-*

Ipsa ulcerum fistulosorum sanatio his maxime absolvitur indicationibus: ut I) si quædam humorum dyscrasia peccat, hæc commodis remediis corrigatur; II) ut callus & scirrho durities, sine cujus remotione nulla expectanda est constans curatio, perite tollatur; III) osium, si adeat, caries austeretur; & denique IV) ut fistulæ mundenur, fibræ conglutinentur, & cavitas nova carne repleatur.

§. III.

*Cura
interior.*

Primo quidem scopo, siue debita humorum correctione optine potiri licet, si in id maxime incumbit prudens Medicus, ut nimiam sanguinis redundantiam vel venæ sectione, vel in spongiosis pinguibulque subiectis cucurbitulis cum scarificatione apertis imminuat; quod eo magis videtur necessarium, quia tub plethorico corporis statu non modo sanguinis impuritas promoveatur, sed major quoque, quam par est, humorum affluxus ad affectum parient prestat. Posthæc vero in humoribus acris contemperandis, scroliis per commodam emunctoria ejicienda, & stagnans univerſa massa depurata sūvenam meretur commendationem decocta ralicum, lignorum & corticum tam leniora, quam furantiora, per longius temporis spūm haurienda, quorum integra laus & utilitas ab antiquissimis temporibus ad nostram usque ætatem le propagavit. Quo etiam spectant insula vulneraria, ex herbis & floribus sic dicta vulnerariis, hederæ terreſtris, agrimonæ, un-

tice mortuæ, faricula, scorci, floribus chamæmeli, millefolii, bellidis, radicibus aristolochiæ rotundæ althææ, rāsura signi fissilæ & similibus confecta, quæ prioribus virtute minus cedunt. Tum quoque interponere decet leniora laxantia rhubarbarina, mannata & sennata, vel etiam in nonnullis pilulis cum mercurio dulci vigoratas, quarum ope depurationis opus perbelle sæpe periclitatur. Nec denique omnino carere possunt probe paratis mercurialibus, si lymphæ insigni peccat coagulo, & pertinaces ductum minimorum obstructions addū, vel si hæc venereæ subest suspicio. Séd modo videndum est, an vitæ imbecillitas & reliqua agrotantis constitutio hæc remedia tuto admittat. Quæ alias ad internam fistularum curationem adhuc spectant, ex capite precedenti de ulceribus possunt desumi.

§. IV.

Secunda indicatio, quæ callositatem tollendam præcipit, non potest expleri, nisi remedia callum abutimenta immedie calli applicentur, quod tamen exterior fistularum angustia plerumque prohibet: quare primo omnium orificia debent dilatari, ut per viam magis patentem medicamenta commodius possint peringere. Dilatant autem gradatim & æstas horum ulcerum oras, quæ humorem inhibendo le lapus expandunt, ut fere sunt medulla sambuci, spongia cera probe imbuta, quæ mihi videtur optima, radix consolide & gentiane in figuram pyramidalem efformata, partemque acuminata in fistulam intrusa. Séd propicere decet, ut in extractione harum turundarum eam viam, ne illæ forte frangantur & portionem suam relinquant, unde læva & dolorifica oriri symptomata possent. Quapropter perite monet SOLINGEN in *chirurg. part. II. cap. 3.* turundas ex singuli materia nunquam esse confectandas, eaque filo alligandas, ne intimius sese fistulis infincent.

§. V.

Dilatato, quantum sitis est, orificio de ipsa calli remotione cogitare expedit, quam quidem Chirurgi vel medicamentis, vel instrumentis rasare solent. Medicamenta in his locis adhibenda sunt, ubi nec incisio, nec usio commodum invenit locum, vel si recentes sunt fistulæ, & callo non adeo duro & crasso munite. Verum enim vero, quum varii sint generis septica eaque vel magis vel minus acris & corrosiva, quæ pro ipsa calli conditione applicare decet: unde breviter jam præciqua enarrabimus. Inter mitiora, ad tenuem recentemque callum eximendum proficua, referri maxime debet succus mœtiæ, radix ari & helleborus albus, cui posteriori ad tertium diem fistulæ immittit HOLLENIUS in *assūtu. chirurg. libr. III.* indigne tribuit laudem. Mediæ indolis sunt ammoniacum, alumen ustum, vitrum antimonii, unguentum ægyptiacum, rubrum Felis *Portæ*, apocoinum, aqua viridis *Hartmanni*, crocus martialium, lapis corrosivus & luyrum antimonii cum limatura martis ad temperiem rectatum. Ex valentissimis sunt mercurius sublimatus, lapis infernalis, & similia. Præter hæc vero huc etiam pertinent aqua à TAGAULTIO *lib. III. de ulceribus* commendata & ex mercurio sublimato, unguento ægyptiaco, aqua plantaginis & rosarum confecta, nec non ex

Calli san-
ta peria
apocoini
de-
lucum.

— medi-
amentis
per
etc.

SOLIN-

SOLINGEN offitio turundæ ex pergamento li-
quore quodam corrosivo imbutæ. Neque reci-
ere possunt, quod sæpe mercurius sublimatus
cum unguento camphorato remixtus, item ein-
plastrum ex butyro antimonii & cera confectum
egregium præstiterint effectum. Probe tamen
circa singula hæc remedia notari velim, quod
liquida sint injicienda: solida autem, ut pulve-
res, cum unguentis in spissam formam redacta
sub specie turundarum applicanda; idque tam-
diu, donec callus mortificatus se a carne sepa-
ret, exitumque afficiet. Deinceps acris illa sa-
lina caustica in partibus membranaceis, tendi-
nosis ac nervis cautiissime debent adhiberi, ne
forte inflammatio cum dolore acerbissimo accer-
satur, quod fimitur tenendum est de mercuria-
libus, quæ certe, ubi ossa adfecta sunt, mag-
nam requirunt cautionem.

§. VI.

— inprimis
urgendum.

Præter dicta restat adhuc aliud remedium, in
absumendo callo præstantissimum, cuius usum
sepius iterumque probatissimum inventi. Est au-
tem illud simplicissimum viride æris, quod nul-
la manifesta acrimonia corrosiva imbutum nec
graviores dolorem inflammatorium, nec alia
excitat symptomata, sed intra tres quatuorve
dies callum durissimum non modo ita exedit,
ut totus separatus extrahi queat, verum etiam
acidum ulcers corrosivum egregie absumit, ut
extracta callosa substantia optimum generetur
pus & ex voto succedat consolidatio. Uti vero
ita debet adornari: viride æris in pulverem
contusum & cum liquido, vel sola saliva subac-
tum in turundas redigatur, quæ in cavitates fi-
stularum callosas, quantum licet intruduntur. Se-
culus autem fit, si recepto inter Chirurgos more: vi-
ride æris cum unctuosius, oleosis permiscetur.
Licet etiam una vice totus callus hoc remedio
non possit eximi, ob obliquum & anfractuosum
cuniculorum ductum, poterit tamen repetitis vi-
cibus scilicet auferri, si modo profundius turun-
dæ in cavernam immittantur. Sed cauta sit in
locis nervosis applicatio.

§. VII.

— instrum-
entis.

Instrumētis quoque vel acutis, vel ignitis
callositas solet tolli; & his quidem dum elichara
callo inducitur & ipse mortificatur; illis e con-
trario, dum circulus ille callosus è medio tollitur,
ut postea fibræ carnes se iterum possint conne-
dere. Ex acutis optima sunt cultri falcati, qui
se ad tortuosam fistularum figuram facile accom-
modant, quale est syringæotomum Dñi SOLING-
GEN, modo id prudenter de circumspēcte ob-
servetur, ne arteriæ vel nervi refecentur. Quo-
modo ignita applicanda sint, optime docuerunt
SOLINGEN, VIGO, PARÆUS, SCULTETUM &
alii, qui de instituto hanc curandi methodum
tractant.

§. VIII.

— Caries ossis
quomodo
tollenda?

Operam haud minorem requirit tertia indica-
tio, quæ eo tendit, ut caries ossis, si quæ adest,
denetur; siquidem hæc durante sumis pinguis &
copiosa ex osse plorans semper novum generat
ulcus, quod esse ad cicatricem perducitur, caro
tamen superveniens est flaccida, mollior & mi-
nus bona. Cognoscitur autem ossis caries, si
vel nudis oculis se manifestat, vel si specillo in
fundum ulceris immisso asperitas percipitur: vel
exinde concluditur, si os denudatum fiat pin-

Frid. Hoffmanni Oper. Tom. III.

guis & successu temporis nigrum, post nigre-
dinem vero hinc & inde perforatum. In tali re-
rum statu vel ipsi ossi immediate medicamenta
debent applicari, vel si os profundius est, sibi po-
tis ope insidendi. Quo nomine commendari me-
rentur medicamenta sale volatili oleoso insinua-
ta, quæ non modo minimos tubulos, ex quibus
ossa constant, penetrantia sua facile mutant, sed
quoque acidum ulcers corrigunt, ut præcipue
sunt oleum caryophyllorum, cochlearia, cina-
moni, & præstantissimum omnium pulvis eu-
phorbi. Sæpe etiam necesse est, ut prius os cari-
osum lima teratur, vel scalpello tamdiu roda-
tur, donec punctula apparent rubicunda. Ne-
que dein minus utilissime & funditus quasi ca-
riem delere solet serum candens, ossi crebrius
adhibendum, quod tum ratione evaporationis aci-
di, tum ratione alterandi acidum operari vide-
tur, quia foetidus odor post ferri applicationem ple-
rumque solet evanescere. Ossis autem sic denuda-
to adspargatur pulvis mastiche, myrrhæ, aloes,
radicum ieros florentinæ, aristolochiæ, vel pulvis
zocum. Sculteti ex balsamici confectus: qui-
bus superimponi possunt filamenta carpta & dein
unguentum digessim. Si liquore opus est, opti-
me in potest confici ex aqua calcis vivæ, aloes,
myrrhæ, essentia euphorbi & spiritu vini cam-
phorato. Interdum tamen accidit, ut scissæ os
sponte sua relinquentes fimitur lateribus carnis
& calli adhaerescant; ubi expedit, cum instru-
mento chirurgico stoculis lintis obvoluto, quod
dicunt eis Stramb. Esen, os sæpius attingere,
ut illud liberum inde evadat, & forcipe extimi-
queat.

§. IX.

Remotis itaque obstaculis cura adhibenda est,
ut fistulosa cavitas repurgetur, bona carne im-
pleatur, & cicatrice orificium obducatur, quod
ipso sæpe accidit, si fibræ non adeo nimis à se
distant & serum bonum nutritium præfuit, si
superposito tantum empastro, totum partis fir-
mante & ab æris injuria defendente. Quod si
autem fistula nimis ampla est, decoctum ex vi-
no, myrrhæ, aloes, floribus rosarum rubrarum, radice
aristolochiæ rotunda, scordio, centauro minori
syringa sepius injiciendum est, ad fordes plenius
detergendas, putredinemque arcendam, & oc-
clusionem promovendam. Sed tunc temporis
fistula aperte servari debent, quæ pus exire pos-
sit, quod alias stagnando facile novos facere fi-
stulas, novumque producere callum potest. Hoc
autem perficitur commodis turundis, vel cana-
libus argenteis, tamdiu in ulcere servatis, do-
nec durities omnis ablata, & cavitas novis fibris
ad orificium usque est repleta, quo peracto ci-
catrix emplastro statimino inducitur. Ipsa car-
nis generatio solius quidem laudabilis materiæ
nutritiæ, bonique sanguinis opus est, nihil mi-
nus à medicamentis sarcoticis, quæ vi balsamica
humidum excessivum absumunt, partes robo-
rant, acidisque & salis partes contemperant,
insigniter adjuvant. Quæ virtute inprimis pol-
lent balsamum Locatelli, Peruvianum, Copa-
ivæ, gummi anime, elemi, styrac liquida, mas-
tichæ, myrrhæ & similia. Neque laude sua caret
essentia incarnans elegantissima, quæ ex floribus
rosarum rubrarum hyperici, millefolii, aloes, myr-
rhæ, mastiche, gummi elemi, balsamo Peruviano
cum spiritu vini digestis & cum melle remanens,
optime componitur.

Rr 3

§. X.

§. X.

Cura de
fistula lacry-
malis.

Jam demum, quæ de singulis fistulis, maxi-
me de lacrymali & ani seorsim tenenda sint,
brevier tradam. In lacrymali nondum perfecta
commode locum invenit methodus illa, à beato
celeber. STABLIO descripta & ab ANELLO ma-
gis exculpta, quæ in eo consistit, ut partim spe-
cillis argenteis in puncta lacrymalia immis-
sa materia sacco lacrymali impacta amoveatur;
partim subtili syringa huic usui idonea liquo-
res ulcus purgant, quas ex solutione salis neu-
trius cum aqua vel communi, vel destillata, ad-
dita aloë & myrrha conficiunt, injiciantur:
qua ratione, in leviore exulceratione, si vel pla-
ne nulla, vel exigua tantum callositas adest, per-
multum proficitur, malumque deterius præca-
vetur. Ipsa autem operatio peragitur, si agri in
sella demissiore collocato palpebræ sinistra manu
ductæ versus canthum oculi externum recta-
humur, & dextra suspensa specillum paulo in-
curvatum per puncta lacrymalia sensim intro-
ducitur; modo id post inflammationem super-
est, & post opthalmiam correctam demum institua-
tur. Major tamen salus contingit, si abundanti
seri lacrymalis adfluxui & tenacitati simul prospi-
citur: quo scopo præter interna derivantia & re-
solventia, externe sierrumata, vel vesicatoria
nuchæ apposta proficiunt. Si verum adest ulcus fi-
stulosum, sectione eo magis opus est, quæ præ-
missa per laxantia, venæ sectionem & similia
preparatione, & oculis per colliria defensis in æ-
gro demissius collocato mediante scalpello falcato
vel acipiti in semicirculum à radice nasi per
medium fistulæ tumorem ad radicem usque pal-
pebræ inferioris insinuat, vitando, ne tendinea
musculi orbicularis particula lædatur. Post hæc
scalpello obtuso vulnus dilatatur, sanguinisque
profluviu sistatur. Neque vero ipsius lacry-
malis sacci remotio negligi debet, transversim in-
cidendo ad locum, quo ductus lacrymalis eidem
inferitur, quia alioquin destillantes lacrymæ de-
nuo stagnantes facile corruptuntur, & novæ fi-
stulæ animum præbent. Tum quoque vel ferro ig-
nito, vel specillo falcato os unguis est pertunden-
dum, & novus canalis formandus, qui turunda
foramini immisssa, aut tubulo argenteo inserto
aperius servans lacrymis ad nares devolvendis in-
servit. Impositis remediis inflammationis &
hæmorrhagiam sedantibus callus absumatur, vel
per ejus incisionem, vel per scarificationem, vel
per ussionem aliaque remedia corrosiva. Ulcere
à callo & fordibus per debitas injectiones purgato
cogitandum est, qua ratione præstare velimus,
ut latex lacrymalis per illum ductum arte exci-
tatum ad nares stillet. Quo fine, cannula minor
ex argento subretracta, exterioris clausa novo du-
ctui accommodatur, postea vero consolidatio pro-
moveretur, & illud instrumentum quiete per tem-
pus geritur. Alii vero hujus molestiæ pertaxi di-
ligentiori furia per puncta lacrymalia expressio-
ne impedire possunt, quo minus pus noccat. Ur-
gente olliis unguis carie cauterium actuale prodest,
cavendo per cannulam argenteam in forma nu-
clei olivæ adhibitam, ne oculus à ferro candente
lædatur.

§. XI.

— et ad
per ligatur-
am &
aperturam.

Ani fistulæ curatio peragitur vel ligatura, vel
cauteriis & corrosivis, vel incisione. Quæ liga-
tura fit, ita instituitur, ut ægi ventre inflexo cu-
bantis femora ministrorum ope diducantur, &

operator indicem digitorum oleo amygdalarum dubi-
cum inunctum intrudat, altera vero manu stylium
vel acum flexilem ex argento optimo paratum, si-
no quinuplicato ad palmam longo & pilo equi-
no circumdato, vel filo ex pilis equinis contor-
tunitam in fistulam dimittat, eamque pertun-
dat; postea vero extracta acu, filoque relicto ex-
tremitates filorum extra anum pendulas deli-
get, singulisque diebus restrictionem suscipiat tam-
diu, donec fistula fuerit discissa, & callositas poterit
removeri. Corrosivum medicamentum calloso fi-
stulæ ori turunda ex linteo carpto, exceptum ap-
plicatur, postea vero alia turunda, ex spongia
compressa cera imbuta ad dilatandum fistulæ si-
num intruditur. In fistula profundiori septicum
linteo carpto tamdiu est admovendum, donec
callositas absumta, & ulcus consolidari queat.

§. XII.

— per in-
cisionem.

Omnium autem optima fistulas sanandi ratio
est, quæ incisione ita perficitur. Ægroto com-
mode collocato operator indicem & medium di-
gitum, oleo liliorum alborum madidum, intrudat,
altera manu cultrum incisionum vagina recondi-
tum, styloque flexili argenteo præditum recipit, &
hunc fistulæ ori immittit, donec ad fundum fi-
stulæ sinus styli acies pervenerit. Hoc facto styli
aciem ad digitos ventis intrusos, tamque per il-
lorum interstitium adigendo fistulæ sinum pertun-
dat, postea digitorum apicibus stylium recurvat,
& cultri aciem manubrio absconditam altera manu
detegit, cultrumque manubrio arreptum pro-
trudit, & digitis extractionem styli molientibus
succurrit. Stylium extractum sequitur cultri acies,
qua, cooperante utraque manu, uno ictu fistulo-
sum ulcus dividitur. In fistula externis & in
sphincterem terminatis hanc præstat insinere
operationem. Chirurgus cum ex sinistra luna
paratum, spithamæ longitudinis, constanter manu
sinui fistulæ aperto intrudit, eique fundum per-
tundit, postea cuspide recurvata acum per fi-
stulam traducit, & ad ejus medium extremita-
tes acus committit, commissuræ firmæ tenet
una, altera vero manu mediane cultri incisioni
fistulæ partem ab extremitatibus acus compres-
sam rescindit, ut portio acui adhærescat. Ne-
que demum laude suæ caret Do. BASSIERES se-
candi methodus, quæ per cultrum, acie quadan-
tenus incurvata, dorso rotundo & polito, collo
oblongo & rotundo, inferius lato, superius in
mucronem sensim abeunte, globuloque parvo
pisi magnitudinis munitum in fistulis externis
ani sphincterem obfidentibus peragitur.

ENARRATIONES MORBORUM.

OBSERVATIO I.

Matrona illustrissima diu olim vexabatur ul-
cere genæ fistuloso, quod omnibus frustra ad-
hibitis remediis ad sanitatem perducere non pote-
rat. Ego igitur consultus suspicabar primo den-
tem cariolum, sed hoc non invento, & levi tan-
tum gingivæ tumore conspecto, hunc protinus
lanceola aperiendo curabam. Unde mox in
conspectum se dabunt due fistulæ: & radices à
dente olim extractæ relicte, quibus extractis
demebatur simul longa ac rotunda membrana,
fistulosum ulcus externe guttulas aliquot sangui-
nis fundens brevi tempore ex voto sanabatur.

Fistula ge-
næ curata.

Epitaphia.

Epicrisis.

Habent id peculiare & quasi proprium fistulæ genæ, ut plerumque à cariosis dentibus foveantur, quibus exentis, sponte sæpe aut levi tantum medicatione adjutæ, sanescunt. Idem evenit in præsentis casu, ubi fragmenta à dente quondam evulso relicta impediverunt, quo minus facilius feliciores obtingeret sanatio. Simile quid olim observavi in virgine, quæ fistula lacrymali laborabat, cujus orificium in eminentia oculi maxillaris ad latera colli exstans, & per medium glandulæ Warthonianæ transiens in dente molari extremo terminabatur, quo evulso primum sanguis, tum lymphæ exillabat pura, & tandem sanatio, licet ob lymphæ fluxum difficilis, procurabatur.

OBSERVATIO XI.

Fistula mammae.

Fœmina ex gente Judæa tumorem mammae sinistræ habebat, qui suppuratione facta à Chirurgo aperiebatur. At vero, cum insignes ductus lactei lassi erant, continuo fere lymphæ cum pure mixta chylosa exillabat. Neglecta purificatione humor exedendo ingentem formabat sinum intus leviter, sed non adeo graviter durum, qui totam prope mammae substantiam fistulosam reddebatur. Quare ego in auxilium vocatus brevem canalem argenteum orificio fistulae, ad puris fluxum derivandum, immitti, & ulcus decocto, ex myrrha, aloë, floribus rosarum & vino parato aliquoties de die syringa injici præciperem, eo effectu, ut ægra simul internis depurationibus adjuta exoptatæ reddere sanitati.

Epicrisis.

Hoc quidem ulcus nondum vera fuit fistula, quia callo duro adhuc caruit, nihilominus in parte cordi propinquiori periculo non vacavit: Mali autem origo debetur Chirurgi imperitiæ, qua commissum fuit, ut humor purulentus non rite eductus sibi finis efficeret: sicut plerumque fieri deprehendimus, si materia intus retenta per stagnationem majorem acquirat acredinem majoremque profundius penetrandi potentiam.

OBSERVATIO XII.

Corripiebatur olim vir plebeius malo, ut putabatur, ischiadico lateris dextri, cui nulla servata diæta, nullisque adhibitis remediis ulcus superveniebat, quod quinque digitis infra articulationem ossis femoris cum coccyge apertum ingentem materiæ copiam fundebat, & neque internis, neque externis tractatum remediis in fistulam desinebat, quæ æger per longum temporis spatium summis cum tormentibus vexatus, accedente tandem tumore scroci & adjacentium partium aquoso, miserrime moriebat. Per sectionem cadaveris, maximeque ulceris, circa caput ossis femoris, & ipso capite acetabulo ossis coccygis acerrima, caustica, & tartarea materia insigni in copia deprehendebatur, quæ ligamentum illud, os femoris cum coccygis acetabulo connectens exesum, imo, quod maximum est, ipsa cartilaginosa substantia, quæ hæc ossa in articulationibus investiantur, consumpta, ipsaque ossa summa carie corrupta cernebantur, luculento indicio, potentissimum & acerrimum ibi latuisse acidum. Ut ideo plenius adhuc confirmetur, quæ de summe acridinis in fistulis præsentia supra commemoravimus.

Fistula ischiadica.



FRIDERICI
HOFFMANNI
SUPPLEMENTUM
MEDICINÆ RATIONALIS
SYSTEMATICÆ.
DE
MORBIS INFANTUM PRÆCIPUIS.

CON-



CONSPECTUS

CAPITULUM.

PRÆFATIO.

- CAP. I. *De morbis infantum in genere.*
II. *De regimine recens natorum & præservatione à morbis infantilibus.*
III. *De pathematibus ex dentitione difficili.*
IV. *De torminibus infantum & flatulentis.*
V. *De aphthis.*
VI. *De variolis & morbillis.*
VII. *De epilepsia & convulsione.*
VIII. *De tabe seu atrophia infantum.*
IX. *De rachitide.*
X. *De vernibus.*
XI. *De aliis infantum morbis.*





P R Æ F A T I O.



UUM jam in eo sit, ut in publicum prodeat hæc mea de infantum adfectibus opella, equidem contra ritus auctoribus librorum solemnes me facturum existimò, nisi antea instituti rationem brevibus exponam. Prius vero, quam ad illud perficiendum me accingo, momenta quædam notata inprimis digna, sed neglectui plerumque habita, ob oculis ponere lubet, quæ Numinis divini singularem, circa infantes tam nascendos, quam recens natos, providentiam luculenter admodum demonstrant. Primo autem loco,

ad ipsum generationis negotium respicientes obstruimus, qui fiat, ut ex puncto quali, seu tenuissima, rudi & incondita vesicula, per expansivam genituræ virilis virtutem fecundata, homo prodeat, qui spiritu immortalis, variisque organis sensoris artificiosissime fabricatus præditus maxima Dei opera in hoc universo perstruere, indeque ad creatoris venerationem pervenire possit. Et si vero abstrusum & à sensu nostro remotissimum formationis hominum opus penitus sibi relinquimus; summam tamen Numinis divini sapientiam vel ex eo abunde satis cognoscimus, quod omnes sexus feminini partes ita sapientissime contruxerit, ut ad hominem progignendum aptissimæ sint. Nonne etenim summa admiratione dignum est, quod facta imprægnatione sanguis ille menstruus, in sanitatem mulierum antea excrucis, nunc copiosior ad uterum hoc sine contuat, ut inde succus temperatus & gelatinosus, per spongiosam uteri substantiam transcolatur, mediantem placenta uterina & funiculo umbilicali, ad nutriendum sævum impendatur, donec hic ex angusto uteri ergastulo excludi, hominumque cœtui adnumerari queat. Hæc ipsa autem fœtus per partum exclusio non minorem mereri admirationem videtur, dum mensile plerumque nono solari, uterus matris à mole fœtus grandioris dilentus, & quasi ad spasmodicam contractionem lacessitus, aeris inspirati, musculorumque abdominis adminiculo, contentum fœtum inter anxios conatus expellere nititur. Superatis partus laboribus statim natus, nulla edoctus arte, suis ipsius viribus aërem, cujus usura in utero caruit, libere inspirat, & quod omnem fere fidem superat, ipse sanguinis per cordis & pulmonum vasa circuitus, via aliunde directâ, non amplius ex dextro cordis ventriculo per foramen ovale ac auriculam sinistram abit, sed clauso isto foraminulo tam itum reditumque eligit, qualem in adultis fieri deprehendimus. Id quod vero sicut luculentum, & plane admirabile mechanisimi sublimioris documentum exhibet; ita clarissime arguit, quantus ille sit auctor atque effector, à quo hæc omnia, cœu effectus à sua causa pendent. Abscisso dein funiculo umbilicali mirandum est, quomodo hæc operatio in tenello corpusculo tam feliciter cedat, ut, si idem quis in adultis experiri velit, omnino metus sit, ne hi graviter inde luant multumque damni recipiant: ne dicam, qua ratione umbilicalia vasa sensim paulatimque tam belle coalescere possint, ut tandem verum ligamentum tendinoso-nerveum constituent, quod vix pristini status memoriam relinquit. Tum quoque ex benignissima Dei providentia hoc inprimis beneficium recens natis concessum esse videmus, quod ipsa vitalis auræ inspiratio sordium alvarum in utero collectarum excretionem, qua nihil utilius est, aptissime promoveat. Etenim, quum per reciprocam pulmonum actionem, septique transversi & musculorum abdominis motum ipsa intimi ventris viscera paulummodo conquassantur, non potest fieri, quin etiam excrementa inibi contenta, accedente simul bilis expressæ stimulo, ad exitum disponantur. Sed longe adhuc majus divinæ providentiæ specimen se manifestat per sufficientem lactis in mammais puerperarum accumulationem, dum quippe ita sapientissime provisum est, ut sublata post editum fœtum renitentia, elasticum uteri viscus sponte angustatum redundantes humores ad mammas diverstat, ubi lacteus ille chyolus liquor separatur, qui primo

P R Æ F A T I O.

mo quidem abstergente sua facultate meconii eliminationem adjuvat, postea vero alimentum teneritudini infantum apprimè congruum constituit. Neque dein facile quisquam infantes ideo imperfectionis accusabit, quod caput in superiori parte patulum, quod fontanellam dicunt, in lucem adferant: siquidem hæc laxior cranii ossum cohesio partim eo servit, ut inter angustum vaginæ uteri transitum aliqua ipsorum compressio fieri, & sine magna matris molellia partus facilitari possit, partim, ut cerebri moles, nutritione aucta, sese extendere commode valeat. Imo etiam in clamoribus, crebrisque vagitibus, quos sæpe infantes sani, nullisque doloribus stimulari edunt, magnum sanitatis latet præsidium. Quum enim tenelli, ob vacillantia membra, se ipsi loco movere nequeant, optime profecto hac naturali corporis concussione deficientis motus noxæ avertuntur, atque fluidorum per univèrsum corpus circuitus egregie promovetur. Si vero ætate jam paululum processerunt pueruli, quot quælo! fracturas, luxationes, aliaque subinde mala inter saltationes variisque lusus incurrerent, ut aliquando claudi, languidi, membrisque mutuli rebus publicis præessent; nisi ad hæc omnia præcavenda ossa tenellis flexibilia O. M. Deus concessisset? Denique, notatu perquam dignum est, quod homo infans ceteris animantibus fere omnibus imperfectior videatur, dum ipse longe diutius parentum ministerio, quam quidem animalia eget, quæ brevi tempore sui ipsa de alimentis prospicere, & nociva insidiantium tela propulsare valent. Verum enim vero, re altius assimata, summum profecto beneficium ex hac apparente imperfectione elucet. Etenim, quum homo rationis princeps immentam creatoris sui potentiam, bonitatem & sapientiam ex absolutissimis operibus suis cognoscere, debitisque celebrare laudibus debeat, opus omnino est rationis cultura, ad quam dillicite admodum sine linguæ usu, ad hæc vero agerrime sine longiori hominum, præsertim parentum, consortio pervenire licet. Et quis denique singula enumerare valet, quæ à summo Numine generi humano, maximeque infantibus concessa divinam providentiam clarissime evincunt? At vero, homines sumus, ex materia ad corruptionem admodum prona constati, quos Deus mortalitatis conscios, suoque imperio subiectos esse voluit. Quid mirum inde, si ne pusilla quædam à vitæ molellis liberi varii generis morbos rectaque valetudinis læsiones repeteri debent; maxime quum tenera ipsorum constitutio admodum facile nocivam illarum rerum impressionem admittat, quibus ad vitam necessario opus habent. Quæ autem maxime mala teneros adficiant, præsens hoc opusculum, supplementi loco medicinæ systematicæ additum, luculentius docebit, in quo ego præcipuos infantum morbos recensere, cum causis suis explicare, rectamque & genuinam methodum suggerere allaboravi, quam hæctenus in longinquo artis exercitio ad præventionem aequè ac curationem idoneam maxime deprehendi. Noli autem præter necessitatem verborum ambagibus uti, sed brevibus tantum thesibus præcipua cujusvis morbi momenta complecti, ne partim opus in majorem molem excreseat, partim, ne alio loco & tempore jam satis pertractata huc repetere videar. Adjiciendum deinceps curavi indicem rerum locupletissimum, quæ in posterioribus medicinæ systematicæ tomis continentur, ut inde commodior fiat totius operis usus. Nec demum illorum deesse petitionibus volui, quibus de vita mea plenius informari volupe fuit. Suscepit autem hunc in se laborem celeberrimus Fridericianæ nostræ Professor medicinæ & eloquentiæ D. D. SCHULTZIUS, qui notatu digniora vitæ meæ facta litteris consignata hic cum B. L. communicat. Nolit autem ideo quispiam me vanæ arrogantiae reum existimare; utpote qui ab omni fastu laudisque inani strepitu remotissimus, nihil aliud hac vitæ meæ recensione quæro, quam ut inde lector singularem Dei providentiam, quam in moderandis mortalium rebus adhibere solet, penitus cognoscat, forteque aliquod imitandi exemplum sibi sumat. Etenim, si ullus unquam, ego certe ancipites fortunæ casus, fluxilemque rerum terrenarum indolem expertus, optime tulari possum, quem Deus ordinem inter mortales servet, ut æternam nominis sui gloriam, hominumque salutem stabiliat. Utinam modo singula fini à nobis prælixo respondeant, multumque utilitatis adferant! Dabam Halæ Magdeburgicæ a. d. 1. Maii MDCCXLI.

CAPUT PRIMUM.

De morbis infantum in genere.

§. I.



Tantumque prob dolor I
maieris undique cinctum
est mortale hominum genus,
ut pervidri nequeat, quæ
cura, quæ sollicitudo & di-
ligentia sufficere possit ad im-
petum tunc simul & diversi-
mode invadentium morborum avertendum, aut
quis artium apparatus jam intricatis malignitate
partes expedire, suæque restituere integritati va-
leat. Docent hanc nostram fragilitatem suo in-
primis exemplo infantes recens nati, qui vix
cum ejulata miseriam hanc salutarunt, quam
jam innumeris obfessis periculis de salute quotidie
decernere coguntur. At vero, quo majora &
frequentiora impendunt pericula, eo sane minus
huic teneræ & tantum non omni orbatæ præsi-
dio ætati concessum est, remedia tollendis mor-
bis idonea conquerere, aut mali sui conditionem
& magnitudinem indicare; nisi forte miserrimo
ploratu, aliisque obfcuris signis aliorum miseri-
cordiam moveat. Quæ cum ita sint, quam ma-
ximè videtur Medico salutis humanæ cupido con-
venire, ut ingenio attentoque studio imbecillæ
ætatis causam suscipiens penitus disquirat, quæ
mala hanc ætatem adgredi soleant, quibus sig-
nis dignosci & quasi prædicti quædam, quæ cau-
tione præcaveri, & demum, quæ arte, quibusque
præsidii debellari debeant? Atque his induc-
tus rationibus ego, post tot labores in medicina per-
polsenda feliciter exaltatus, non potui omittere,
quin etiam opusculo, de infantum ægritudinibus
conscribendo mentem manusque admoverem;
præsertim cum ab aliis, qui in eodem studiorum
genere delusarunt, multa sunt inacta & non sa-
tis digesta, aut certe emendatione quadam dig-
na relictaprehenderim. Nec minorem mihi
fructum ex hoc meo suscipiendo labore polliceor,
quam quem, Deo annuente, jam ex reliquis
medicinæ meæ systematicæ tomis satis abunde-
que conspexi: siquidem non vana, non imagi-
naria & falsa opinionum commentis fundata,
sed vera, & tum rationi, tum experientiæ con-
formia proponam, quæ in artis exercitio per di-
midium sæculi & ultra occupatus constanti me-
ditatione & observatione didicisse gaudeo.

§. II.

Primo autem omnium præcipui infantum
morbis erunt indicandi, antequam ad causalium
nexam, ex quo illi procedunt demonstrandum,
nos accingamus. In quo quidem perficiendo du-
cent eligere placet præstantissimum artis nostræ
patrem, HIPPOCRATEM, qui ætatis morbos
lib. III. apbor. 24. 25. & 26. ita pro more suo
elegantè & concise describit: *Qui in ætate
cadunt morbi, hujusmodi fere sunt: pueruli &
nuper in lucem editi apthæ, vomitiones,
tussis, vigilæ, pavores, umbilici inflammatio-
nes, aurium sordes humide, quibus nos ventris
tormina addimus, sunt familiares: cum jam
desuere coeperit, gingivarum molestis pruritus,
febres, convulsionem, diarrhæa, maximeque cum
Erid. Hoffmanni Oper. Tom. III.*

*edunt caninos dentes, & iis præsertim, qui inter
pueros crassissimi sunt, alveoque adstrictæ, eve-
niant. At vero, cum ætate præceterunt, quod
ab anno quarto ad decimum usque & longius
intelligendum est, consiliarum inflammationes,
vertebræ, quæ est ad occiput, introsum luxatio-
nes, asthmata; calculi, lumbrici rotundi, asca-
rides, verrucæ pensiles, satyriasmæ, struma
& alia tubercula, præcipue vero prædida male
adstrictæ. Hæc qui altius secum reputat, faci-
le perspicit, cuivis infantum ætati morbos
quosdam esse familiares, qui corpus aliter at-
que aliter adiciunt, longius vel brevius durant,
& plus minus periculi præsignant. Siquidem
mutata corporum, propter ætatem, textura,
mutatoque vivendi genere, non potest non ipsa
subjectorum ad suscipiendos morbos dispositio
immutari & postera ægritudinum ratio a pristinâ
valde recedere. Quamobrem etiam, si de
infantum adfectibus differendi animus est, si-
mul omnes ætatum periodos debemus complecti,
minimeque omnium strictiori tantum infans
infantes in lucem vix editos considerare; sed
proveciores etiam, qui ad decimum usque an-
num pervenerunt, intelligere; ne forte aliud
morbis genus explicemus, aliud silentio præter-
eamus.*

§. III.

Sic igitur ex HIPPOCRATE puerorum mor-
bos enarravimus præcipuos, quorum nonnulli
quidem per se statim patent, nonnulli autem di-
fficultius cognoscuntur; quare proxime jam sup-
peditanda erit accuratior illorum diagnosi; quæ
tamen adeo difficilis, abscondita & inexpectata
est, ut sæpe vel oculatissimi in judicando hal-
lucinentur. Neque enim pueruli ipsi, ob vocis
articulæ defectum, morbi sui indolem & no-
cendi potentiam nobis possunt enarrare, neque
ex urina vel curiosissime examinata, neque
pulsuum ictibus, vel accuratissime observatis,
neque tandem ex habitu externo, qui ut facile
in pejus, ita subito in melius mutatur, firmum
stabileque judicium potest desumi. Nam urinae
minimorum recte valentium perinde ac morbo
quodam laborantium sæpe sunt crassæ & turbidæ,
& pulsus ab innumeris fere causis potest
mutari, & vel accelerari, vel retardari, ut explo-
rantibus plerumque imponat.

§. IV.

Ne tamen utraque ex parte dubius relinquantur
artifex, mulierculæ adstantes, quæ curam pul-
lorum gerunt, probe sunt explorandæ: an infan-
tes ejulatus educt, corpus inquieti jactent, &
vigiles diem noctemque transigant; an tussis
sive acidos, sive ridosos explodant, vomendi
conatus ipsosque vomitus, & quales habeant; an
singultu nervorumque agitationibus convellantur,
an tussis & respirandi difficultate laborent,
an flatas & feces libere dimittant, quem excre-
menta colorem referant, quam consistenciam ha-
beant & similia? Præter hæc vero, inquirenti
Medico permultum accendens lucis, si corpus
à capite ad calcem inspicienti probe examinet;

S.

an

Infantum
rati.Hæc
morbis
infantium
ex Hippo-
crate.Diagnos
est diffi-
lis— quæ modo
est diffi-
lis

an extrinsecus rubedo cuiusdam partis inflammatoria, an quedam exanthematum species, aut aliud vitium se manifestet; item si ore diducto disquirat, num fervidum halitum tenelli emittant, fauces pustulis obfessas habeant, vel gingivæ quadam intumescencia & phlegmone laborent. Siquidem ex his omnibus tanquam ex principis cognitis ad incognita non obscure licet concludere.

§. V.

Conspicuum est i) mollescentiam & suppuratorem generis nervosi.

In causam serie explicanda à vero haud aberrabimus, si causam adfectuum infantilium formalem & materialem 1) tam in habitu corporis laxo & molliori, quam in redundante lucorum pituitosorum copia, admodumque delicato fibrarum & membranarum sensu reponimus. Etenim, quum in prima hac ætate solidae partes propter mollescentiam, qua gaudent, ténacitatem, fluida non satis vegete possunt propellere & per tenuissimos canaliculorum ductus circumagere; facile inde potest sanguinis & humorum circuitus retardari, & saluberrimum excretionum negotium cohiberi; quod si accidit, non tantum succi magis evagisque copia incrementum, verum etiam spissi evadunt, & crasin plane alienam, sulino-acrem addunt. Quid vero inde? ex tali humorum plenitudine non modo sunt stagnationes, variaeque fluidorum subsistentium corruptelæ, sed etiam à nervorum subsistentium pressione, aut distensione violenti concitantur spasmi, quorum vehementia omnes tam solidae, quam fluidæ partes cum tota functionum œconomia perturbantur, & tenella infantum corpora, quæ ad recipiendas vel levissimas impressiones valde disposita sunt, in morbos & repetitos & vehementes concipiuntur facillime.

§. VI.

Quod conspicuum generis nervosi.

Neque adeo difficilis erit labor, ex jam allegatis phenomenis præcipuum ægritudinum infantium veras reddere rationes. Supposita enim humorum pituitosorum abundantia & stagnatione, facile potest concipi, quam ob rem ad crebriores defluxiones catarrhales, rheumatismos, pectoris appletiones, liquidas alvi dejectiones, diarrheas, tumores glandularum, aurium sordes humidas & similes affectus tenera ætas sit proclivis. Supposita succorum depravatione & acrimonia, facile patet, cur frequentius aphæis, variisque cutis exanthematibus pueruli afficiantur; & supposita demum exquisita nervosi generis sensatione, haud minus clare apparet, cur tam vehementibus partium tam internarum, quam externarum torsionibus ac spasmis torqueantur, si vel levissima irritatiois causa præcesserit. Ita enim, propter sensibiles fibrillarum intestinalium texturam, in dolorifica ventris tormina, in permolestis ventriculi & intestinorum vel distensionibus, vel constrictionibus incidunt; propter faciem membranarum, cerebrum & spinalem medullam incessantem irritationem, percrebro motus epilepticos & convulsivos artuum subtilius experiantur; propter tenuissimam nervorum propagines, ad pulmonum viscus decurrentes, sæpius tussit convulsiva & asthma cum suffocationis metu conjuncto, ac demum, ob exquisitum tunicarum sensum, quæ ori intus obtunduntur, pessima symptomatibus ex dentitione difficili laborant.

§. VII.

Neque dein 2) in constituenda causa materiali parum valet acidum longe multumque præpollens, cui optimus morborum infantilium interpret D. D. HARRIS tantum tribuit, ut omnes fere ac singulos adfectus, teneræ ætati familiares, inde deducere nullus verentur. Et profecto, in plurimis tam ex ructibus & vomitibus acidum redolentibus, quam ex fecibus, subjectos etiam pannos arrodentibus, acidi præsentis copia non obducere potest suboleri, aut vel ex eo satis dijudicari, quod non modo lac, unde vivunt infantes, persicillit aciescit & coagulatum subit; verum etiam ipsorum succi, qui tenues atque lymphatici sunt, vix magis in aliam, quam in aciescentem diathesin inclinant. Sicut enim homines adulti, phlegmatica temperatura præditi, magnæ succorum pituitosorum copia turgidi, in nocivam lymphæ coagulationem præ aliis proni evadunt, admodumque facile in purpuram albam, quæ ejus progenies est, incidunt; ita eo minus dubitandum est, quin in infantibus acida humorum intemperies longe citius facilliusque possit contingere.

§. VIII.

Proxime nunc etiam causas infirmis præcatarrhicas. Jam quidem, si debile solidiorum robur intuemur, deprehendimus, omnes omnino infantes ex sua ipsius natura adultis esse imbecilliores, & sensatione exquisita præditi; nihilominus tamen causæ quadam subesse debent speciales, quæ ad insignem generis nervosi debilitatem & mobilitatem imprimis contribuant, ut in his magis, in aliis minus perverſi motus ciantur. Nihil vero, me judice, ex omni causarum classe magis hac confert, quam dispositio quadam hæreditaria, à parentum alterutro in sobolem propagata. Quare sæpius usu venire solet, ut à parentibus non ita bene valentibus, aut crebrius veneris usu & rerum abstrusarum investigatione confectis, aut senio fractis, aut luxu corruptis infantes progignantur, qui à primo conceptionis actu infirma valetudine untur, & vitia quædun connata habent, quæ nulla unquam arte aut solertia possunt removeri. Id quod nisi obflaret, minime nos haberemus tot ubique podagricos & calculosos, qui suæ miseræ solationis anxii apud Medicos frustra querunt.

§. IX.

Si qua autem labe mediante generatione in teneram progeniem tradatur, à matre profecto uterum gerente hoc maximum partem fieri solere deprehendimus. Dicit enim vix potest, quantum prægnantium plurimæ, nisi maximo virtutis studio teneantur, in appetitus omnino depravatos prone sint; quamque inanibus curis, vagis desideriis & imaginationibus, terrore, timore, moestitia, iracundia, fastu, vindictæ cupidine, aliisque mentis motibus agitentur: unde non potest non sanguinis circulus vario modo turbari, atque tenerimis & quasi adhuc tremulis fetus flammis inimica quadam vis imprimi. Idem mali permesendum est, si generices intemperantiæ dedit multa cibus, iique sæpe incongruis, ventriculum obruunt, aut poribus spinuosos plethoram, sub graviditate collectam, sæpe commovent, nec tamen ejus copiam venæ sectione detrahi patiuntur.

2) Acidum percolens.

Conspicuum est i) mollescentiam & suppuratorem generis nervosi.

— Imprimis quædam à matre contrahitur.

tiuntur. Quo etiam ille pertinetur fœminæ, quæ morbus hysterici valde sunt obnoxie, & peracta conceptione viros citius admittunt; siquidem frequentior coitus, nonnullorum testimonio, ad morbosam debilemque prolem gignendam perniciosum conducere creditur.

§. X.

In ipso etiam partus labore tenera proles sæpe infirmatur, dum aut matres segnitie sua fortis exclusionem retardant, aut impatentia accelerant. Idem periculis remediis calidis partum promouentibus, aut ab inconsulto obstetricum ministerio per violentam fœtus extractionem, & qualemcumque læsionem; siquidem ab improvidis istis mulierculis fœtus capite laxo coherentem ita sæpe comprimuntur, ut inde epilepsia, paralytica, aliaque horrenda male cum mortis periculo conjuncta concitentur.

§. XI.

In infantibus utero jam exclusis perfacile etiam sensibiles nervorum fibrillæ ad anomalos motus stimulantur, si quando aut ipsi pusilli terrore quodam inopinato, ut per repentinos clamores, excitationem ex somno, item per jocosam nutritricum impressionem, verbis & gestibus factam, percutiuntur; aut si lactantis pravo quodam animi affectu & maxime quidem terrore ac iracundia perturbata sugentibus mammis nimis cito offerunt. Hinc nihil est solennius, quam quod vari generis spasmi, nervorum vellicationes, arthroses, ardores, torminosi intestinorum dolores & inflationes &c. pressio, ut aiunt, pede excipiant, quæ se per inquietudinem, vigilias, manuum pedumque pectigationes, pavores, epulans, imo etiam per epilepticas convulsiones abunde satis manifestant.

§. XII.

Præter hæc vero in debilitatum commovendoque solidorum robore multum sibi vendicat excessiva aeris, præsertim frigidi, intemperies, aut substantiæ caloris & frigoris se invicem excipientium vicissitudines, quæ sicut natu grandionibus, nervorum quadam imbecillitate laborantibus, ob transpirationem suppressam, ingentem in modum adveniunt: ita longe magis infantibus, qui aeris injuriæ ipsi accere nesciunt, maxima imitantur damna.

§. XIII.

Nec denique è contraria parte excludendum est nimis curiosum, calidum & delicatum tenellorum regimine, item crebrior medicamentorum sine necessitate usus. Sic enim non solum pusilli, liberioris aeris influxui vel levissimas auras ægrius ferunt; verum etiam a medicamentis, inique præsertim activioribus, valde plerumque alterantur, ut deinde natura in moderandis motibus quam maxime perturbetur. Et quum horum præcipue ac divites petulum hunc morem plerumque teneant, plane non mirum est, cur ipsorum proles longe debilius sit, longèque frequenter ægrotet, quam pauperum, admodiculis his delictorum.

§. XIV.

Hæc autem omnia non solum de pueris lactentibus valent, sed eodem quoque jure de illis intelligenda erunt; qui ætate jam paulo processerunt. Debilitato enim solidorum robore, suscep-

Frid. Hoffmanni Oper. Tom. III.

taque aut in utero materno, aut ex vicio nutriticis ad morbos dispositione; facile judicari poterit, nec minores nec pauciores morbos, facta etiam ab lactatione, posse succedere; sicut prob dolori innumera paucorum male adfectorum exempla docent luculentissime.

§. XV.

Causæ, quæ ad ingignendum acidi proveniunt conferunt, iterum variæ sunt, atque ex his etiam nonnullæ, quæ jam enumeravimus. Quam maxime autem hac referre decet omnia, quæ lac aut in ipsa nutritice aut in sugentibus corrumpunt, idque crassum & impurum efficiunt, aut in coagulatum præstus condensant. Id quod ex parte nutriticum variis modis potest accidere, & maxime quidem, si ipse, præter inordinata animi pathemata, fructus horos, caseum, acetaria, acida, acris, & salsa copiosius ingerunt, vinarie acida & spiritum vini liberalius hauriunt. Siquidem his omnibus lac viciatum & crassum ingeneratur, quod infantibus oblatum facile accescit, & non modo ad pertinaces primarum viarum & mesenterii obstructions disponit, verum etiam calculi in vesica generationem, quæ non infrequens hæc ætati est, oppido promovet: ne dicam, largiori spirituosorum usu lac repente æstum concipere, & per mammam lactantibus transmissum febres ardentes posse accendere. Neque sola ciborum qualitas, sed quoque excedens ipsorum quantitas valde nocere solet; dum se nutriticis cibis, quamquam optimis, supra modum saginant vel cerevicias consistentiores, easque parcius bibunt; neque tamen corpus sufficienti motu exerceant in alio propterea oio commode vivunt: quæ ratione non potest non crassior lactis consuetudo conciliari, idemque salubris dispendium induci.

§. XVI.

Similem nocendi potentiam habet validum frigus, improvide mammis admittit; utpote quod lactiferis mammarum tubulos coarctando, lac ad spissitudinem haud parum disponit. Neque dubitare licet, quin etiam lacteus ille liquor ingentem in modum alteratur, & ad pravam indolem in sugendum ventriculo succipientem disponitur, si quando matres vel nutritrices lasciviores, durante lactationis tempore, intemperiosos mariti amplexus crebrius admittunt; aut si menstrua, quæ alias in gravidis & lactantibus cessant, præter consuetudinem experiantur. Tum enim parvuli plerumque languidi, lacrymosi ac imbecilles fiunt, siquæ gestibus suis indicare videntur, lactationem tum diu esse differendam, donec, obturato hoc fonte sanguine, pristinus matri vigor redeat. Neque denique lac parum corrumpitur, si nutritrix passionibus hysterici patet, si alvo adstricta laborat, & propter spasmus ac flatum in primis viis collector variis sanguinis & humorum ad varias corporis partes congestionibus affligitur.

§. XVII.

Ex parte infantum multa pariter accusanda veniunt. Inprimis autem ipsi valde lædi solent, si namum alimentum debent assumere, & quandoque male habent, præter voluntatem mammæ lacte turgidas exhaustæ, vel etiam si pulcritudine viciatorum plus jussu inficiuntur. Quando enim infantes, itque præsertim parvi ac teneri, tantam alimentum uolem in ventriculo non sibi

Conferunt
accidit
con-
trahit
per
la-
ctationem

Quæ
dum
inducit
causam.

— ex parte
infantum
causam

— debilitatio
in ipso
partu.

— animi
affectus
in ipso
partu.

— aeris
modum
excessum
frigus.

— regimine
nimis
calidum
&
delicatum
medicamentorum
abusus.

— eadem
necesse
abstinere.

possunt subigere, hæc plerumque in acidum magna facillit; unde tonus ventriculi & intestinorum destruitur, maximaque sanitatis damna, ut fere sunt inflammationes stomachi cardialgica, pectoris angustiae & similia, in teneram prolem derivantur. Quam in rem egregia sunt, quæ B. ETTMULLERUS in diffinitione, quam *valentinianum infantile indicit*, ex vero protulit: *lactis superflui & tantum non coacta infusione matris pueror suis nimis alendo, sæpe necant, & domi lactant, molliant. Sicut enim omnis nimia repleto, ut panis adultis, sic lactis recens natis pressura est.*

§. XVIII.

*— & quali-
tas.* Sic quoque valde peccatur, si cibi varii & sæpe incongrui, acidi, acres, salsi, multaque carnes præter necessitatem devorantur; vel si vitium, ut pancreaticus mos est, ad roborandum & ploratus componendos, sæpius propinatur: si quidem hæc lacti admixta, coagulationem inducendo, ventriculum valde infirmant, variorum morbos excludunt. Quo demum pertinet crebrior lactis cum nutritibus mutatio. Sicut enim adultus non aequè bene mutationem potus & cibi ferre possunt; ita hoc simili ratione, longeque magis de sensibilibus infantum corporibus prædicandum esse, per se liquet.

§. XIX.

*— etiam in
adultis.* Hæc omnia lactationis tempore commissa plerumque etiam in pueros ablactatos redundant, aut certe tunc demum temporis vim suam sanitati adversariæ exhibent; maxime cum, neglectis diætæ regulis, à teneriori alimento ad crassius, ad carnis esum, variaque incongrua subito transscendant; utpote in his omnibus præcipuum morborum puerilium fundamentum residet.

§. XX.

*Prognosis
respectu
naturæ &
regimenis.* In prognosi ferenda primo omnium probe tenendum esse arbitror, quod infantes, qui non à teneris, delicatis, corporeque & animo morbidis parentibus, imprimis matribus geniti fuerunt, præ aliis corpore & animo firmi, vegeti atque robusti esse soleant, nec tam facile damna à rebus externis rependant, neque morbis tam cito implicentur, aut etiam impliciti felicius inde evadant. Idem fieri deprehendimus, si bene valentes non adeo bene & delicate in victu & regimine observantur, sed tempestive perferendis mutationibus sensim paulatimque adsciscunt. Possunt enim consuetudine à teneris ita formari, & quasi indurari, ut ne ab externis injuriis tam facile ledantur: sicut quæ maxime in infantibus rusticorum & ex infima plebe natorum videtur licet; utpote qui neque lenitatis incommoda tam repente sentiunt, neque morbis tam graviter & tardius, quam quidam magnamque delicatuli, laborant.

§. XXI.

*— & etiam
in
adultis.* Tum quoque sciendum est, omnes infantum morbos, licet immaturi sint, faciliorem promittere sanationem, quam adultorum, si rite illa instituantur. Nam prout teneriorum infantum corpora à rebus adversis facillime impressionem recipiunt nocivari; ita è contrario à medicamentis & rebus naturæ amicis libenter admittunt meliorem, ut ideo tot puerorum funera deplorare non opus esset, nisi sæpe Medici ipsi nocendo illa pararent. Præter hæc, conficiantur est

observationis, infantes corpulentiores & spongiosiori carne præditos, item qui lacte copioso velcuntur, aut nutrimentum habent succi plenam & corpulentam, præ aliis frequentius morbis adfici, maximeque rachidii, tussi convulsivæ & aphthis esse obnoxios; cum contra macilentiores frequentius febribus & inflammationibus pateant. Qui alvi sunt fluxilioris, plerumque melius se habent, quam qui sunt adstricti: & denique, quam convulsivi membrorum subtilitas, epilepsie & tormina maximam infantum partem vita privent; scire licet, pessimum esse indicium, si ista mala cum diuturnis vigiliis sint stipata, æque vel dantius durent, vel crebrius revertantur.

CAPUT II.

De regimine recens natorum & præservatione à morbis infantilibus.

§. I.

*Infantis
morbus.* QUicumque avertere cogitat graves infantum morbos, præcipue omnium eo debet respicere, ut à primo nativitatis momento omnes abigat causas, quæ morbos possunt ingenerare, teneraque infantum corporcula periculis objicere. Operæ itaque pretium fore confido, si in præsentis capite breviter singulimque doceam, quæ circa victum, regimen, ceteraque res non naturales tam ex parte infantis, quam nutritis tenenda sint; ne forte ingruentis horum usu innocui infantes pessimum multorum morborum fontem extra omnem sui culpam nimis cito suscipiant, æque prima mox ætate fundamenta valitudinis labalcentis jacent. Multo vero magis hæc doctrina videtur necessaria, quia genetiâ quædam præmonenda sunt, quæ deinceps in speciali cujusvis morbi explicatione abhinc repeti & in usum converti poterunt, ne unum idemque proferre opus habeamus.

§. II.

*Infans ab
lacte.* Quamprimum in lucem editus est fortis, statim debet, post vasorum umbilicalium ligaturam & resectionem, in balneo tepido abluï, quod vel ex sola aqua, vel ex aqua & vino similibus mixtis paratur, huncque simul usum præstat, ut æqualis sanguinis distributio per totum corpus promoveatur. Inter hæc quoque obstricti commodus conceditur locus & tempus, ut, si quid à partus laboribus male conformatum in capite, aut aliis corporis partibus compareat, ab eadem in melius effluatur, & in naturalem formam restituatur. Quare artus omnes blande contrectando explicet, crura & pedes sæpius contrahat & expandat, ut, quid in articulis muci, vel lentoris repletus, dissipetur: neque minus inferiorum partium ventrem vola manus frequenter mulceat, & partes excretionibus dicatas, leniter fricando, ad sordium eliminationem excitet.

§. III.

Tum vero ante omnia dispiciendum est, an firmus, robustus & perferendis mortalium vi-

*— & etiam
in
adultis.*

diffinidinis idoneus, an vero debilis ac infirmus sit partus. Id quod vel ex debili ejus voce & respiratione, vel exinde judicare licet, si ipsa mater puerpera tenerae mortidaeque est constitutio, & sub graviditatis decursu variis corporis animique aegritudinibus male fuit affecta, si aggratio factus in utero adhuc existentis debitor jussu se manifestavit, vel si partus difficilis, & ante justum pariendi tempus septimo aut octavo mense contigit. Siquidem his omnibus infantes multum infirmantur, & ad morbos reduntur proclives, dum ex sapienti Celsti effatu imbecillitas omnibus morbis patet. Quod si igitur recens natus praefer naturam debilis ex dictis signis concluditur, utique eundem rufocillare expedit: quod optime perficitur, si more inser obsterices recepto in vino tepido ablutus, leniter fricetur, pectorisque, dorso & vertici spiritus quidam analeptici invungatur, vel si halitus caryophyllis aromaticis, aliisque aromatibus maffica vigorati ori infundatur, vel paupillum vini Rhenani, vel aquae cinnamomi infundatur.

§. IV.

At vero, quum tener quoque partus ab aëris injuriis mollioribus linetis & commoda fasciarum involutio praeveniendus sit; probe cavendum est, ne ex negligentia vel ignorantia damnum inferatur, & magnorum successu temporis malorum causa stabiliatur. Praeterea enim, quod infantes saepe ex nimia pectoris per fasciam constrictione gibbi fiant, tabem incurrant, vel saepius vomant, & herniosi evadant; multa etiam impedit circulations incommoda vagitusque nimis, ab imprudenti archoque nimis corpus tenella involvenda modo proveniant.

§. V.

His ita observatis, proximum est, ut infantes, qui ob denegatam alvi in utero exonerationem, intestina malis sordibus repleta in lucem afferunt, tempellive expurgentur; jam vero ipsi quam primum spiritum ducere aëremque ambientem pulmoibus haurire inchoant, mutua illa & crebrius repetita diaphragmatis muscularumque abdominis actione non modo ventriculorum & intestina sua comprimunt, contentasque in ipsis feces ad exitum disponunt, verum etiam hoc salutari respirationis actu bilem in intestina, maximeque in duodenum urgent, quae dein propter virtutem, qua pollet, abstergentem & stimulantem sensibiles intestinorum tunicas, leniter irritando, ad majorem contractionem & excernendas sordes animat, ut non raro vomitibus & alvi dejectionibus sponte obortis tenacia ista recrementa ejiciantur. Quod autem si minus etiam contingeret, & debilis tenellorum natura non sola sibi sufficeret, singulari divini Numini providentia factum esse deprehendimus, ut puerperis lac primum tenuis, serosum & subdulce, quod colostrii nomine insignitur, concesserit, cujus abstergens diluentisque facultas melius longe ac tutius, quam saepe selectissima evacuantia, alvum subducit. Et licet ex Medicis plurimi colostrum, seu lac impurum teneroque infantum ventriculo summe nocivum rejicere suadeant; aliter tamen ego, contraria inductus experientia, statuo, & nulla inde damna pertimescenda credo; nisi fortasse lacteus ille liquor ex impuro fonte promanet, si puerpera vel contagio sit infecta, vel jam ante partum insigni quadam

Erid. Hofmanni Oper. Tom. III.

sanitatis labe laboravit, vel sub duris partibus laboribus convulsivis agitata fuit motibus, & adhuc male habet; vel si quando aliae concurrunt circumstantiae, quae tale medicamentum, a natura ipsa in mammis mulierum elaboratum, interdicant.

§. VI.

Quod si autem papillulae mammarum matris lactantis sint exiguae, ut tener lactens easdem ore suo haud commodè excipere, & non nisi vehemènti attractione quidquam ex iis alimentis elicere possit; aut si essent crassae nimis, ut ipse capere nequeat; vel etiam si mater puerpera partum lactare recuset, aut lac in mammis non satis cito concipiat; tum omnino primis viginti quatuor horis aliis interea congruis laxantibus alvum à meconio suo liberare praestaret, quam mox post partum nutrici robustus & obesus, infantem iugendum tradere. Etenim, quam lac forminarum, quae diu jam lactarunt, plerumque spissioris sit indolis, multumque alimentosae & pinguis substantiae contineat; non potest non teocellus ventriculus valde eodem obrui, & inde cruditati acida lactisque coagulo promptissima stappediari occasio.

§. VII.

Sunt autem varij alvum ducendi modi. Sic etiam plebs nostra tum usu, tum Medicorum praeceptis edocla mel cum butyro non salito vel saccharum Penidum in oleo amygdalarum dulcium solum primis à partu diebus propinat. Galli ac Batavi vinum cum saccharo edulcoratum, alii alia eodem scopo, nec infelici successu offerunt. Sed quia intentioni haec non semper respondent, optime tam in parva quantitate efficaciora, ut syrupus rosarum solutivus, cichorei cum rheo, florum persicorum, manna cum aliquot cremoris tartari granis in jusculo data & similia conducunt. Neque mihi illorum displicet ratio, qui eodem laxandi fine leniora suppositoria, aut, minus his quidquam efficientibus, clysteres commendant. Intestinum enim rectum in infantibus tam exquisitè est sensatiois, ut leviter saltem vellicatum fices contentas cito reddere solet. Unde B. Boerhaavius in apb. de cognoscendis & curandis morbis §. 1347. clystera ex sero lactis saponato aut mellito recte injicere suadet.

§. VIII.

Enimvero sunt ex Medicis nonnulli, qui meconium non tam cito expurgandum esse contendunt; quia nulla facile impuritas ante conceptionem & nocendi aptitudinem è corpore ejicienda esset, nullaque ratione offendi posset, quomodo haec infans feces, quae per tot menses sine ulla noxa intestinis inhaesissae, statim ut noxae cathartico expelli deberent. Et profecto, re penitus examinata, deprehendimus, qualiter tam acrem & venenatum meconio non inesse, ut vulgo putatur. Illud enim per tot menses in teneris alimentari fistula fovetur, neque tamen intestinorum inflammationem aut rosionem parit, neque ad excernendum illa irritat, nec colon, quod sua copia potissimum replet, ad cellularum elevationem valvularumque contractionem stimulat; neque etiam putredine concepta sordes flatus & exhalationes

S: 3 emittit,

emittit, nec calore exsiccatur, sed, ut sectiones infantium statim à partu mortuorum institutæ docent, consistentiam mellis habet & odore caret.

§. IX.

Hactenus dicta quamvis verissima sint & ipse ego præmaturam & coactam infantum purgationem jure rejiciam; aliud tamen statuendum esse arbitror, si neque infantes suo ipsius robore, neque colostri adnuculo impuras sordes à matris nutrimento residuas eliminare valent. Tum enim omnino leni stimulante succurrere expedit; maxime cum ex segnorii meconii evacuatione gravissima tormina, inquietudines, vigiliæ, cardialgicæ passionēs, herniæ, pertinacissimæ alvi obstruccionem, morus spasticos & convulsivos atque symptomata originem duxisse noverim; quia sordes istæ non modo intestinorum tunicis se tenacissime insinuant, ipsorumque tunicas non raro conglutinant, sed etiam concursu lactis vel optimi crasini plane alienam, etiamque nocivam induunt; unde etiam muliercularum plurimæ permotæ recens natos per viginti quatuor horas elutite, & interea mel cum butyro propinare jubent, metuentes, ne purgato nondum corpore lac in coagulum densetur.

§. X.

His ita provisus, commodus infantibus victus debiturque regimen ordinandum est. Metibz autem lac præcipuum & quasi universale constituit alimentum, quia & cibum & potum simul supplet, ventriculo aridet, & hoc sine ab optimo creatore tam sapienter constitutum est, ut mulieres sanæ statim post partum sufficientem ejus copiam in mammis accumulent. Quum autem vel à matre, vel à nutrice hunc in finem constituta, infantes à matris nutrantur; eo certe à parentibus, & quibus teclorum concubina est salus, respiciendum est, ut lac putum & temperatum generent. Id quod vix melius obtineatur, ac si lactantes femine exactam dietæ rationem observant, eaque omnia fugiunt, quæ sui vestigia, vel in sensibus abscondita, in dulci lacte relinquunt, & in notis in superiori capite ceu noxia inter causas morborum sunt relata. Speciatim vero nutritrix, si hanc eligendi necessitas postulat, sit sana, ætatis vigentis ab anno vigesimo ad trigessimum, gracilis potius quam obesa, bonis quoque moribus instructa, animi tranquillitati dedita, nec melancholica, iracunda, vel ebriosa: neque si occasio fuit, primipara, nec demum lac nimis vetustum aliat. Præter hæc vero, similiter bonaturatur dieta: & quum plerumque pauperes ac vilioris conditionis mulierculæ nutritric munice fungantur, sedulo videndum est, ne ipsæ subito à pastio vivendi genere, seu victu duriore & parco ad mollem, delicatæ & plenum transierint, sed paulatim potius eis adiacuant. Si quando ipsæ, ob infantum inquietudinem, somno per noctem satis frui non licet, eundem matutino tempore resarciant, cavendo tantum, ne nimium, iusto ipsi indulgeant, vitæque otiosam ac desidiam agant.

§. XI.

Hæc qui secum perpendit, facile perspiciet, quantum illæ matres delinquant, quæ citra pe-

riculum, vel ob scorbuticam humorum impuritatem & virium debilitatem, vel alias ob causas, quas præteritum, teneram suam progeniem nutritric mercenariis in dubias valde manus immisericordiam quadam, brutam superante, erudunt, & ne pessi quidem habent, an sanam, an cacochymicam, an bene moratum, an protervum nutritricm conducant. Quid igitur mirum, quod fidem faciant innumera probatissimorum auctorum testimonia, infantes à nutritricibus malo victu utentibus ulcera, scabiem, tinea capitis, crustam lacteam, aliaque cutis vitia reportare; à lac venerea infectis, eadem lac, aut ut ego observavi, pustulis & crustis contaminari, imo quoque mille aliis modis miserrime adfici.

§. XII.

Verum enim vero, mediante lactis vehiculo & pravo consortio non tantum corporis, sed & animi vitia latius serpunt, quare non adeo rarum, sed frequenter proli dolor! obviunt, infantes ab optimis etiam parentibus genitos pessimis nonnunquam moribus corrupti. Sic scio ex nutrice bibula infantes admodum siticulosos: neque magnatum quorundam bibacitatem, & crudelitatem multi auctores aliunde, quam à nutritricibus, eadem vitiorum pravitate inquinatis derivare contendunt. Egregia hæc in rem sua verba WINDHILM, in medic. spirit. lib. 1. cap. 25. §. 6. alienis lacte nutritrix, inquit, ut plerumque degenerat, & ad nutritric naturam naturalisfuit; ex lacte & spiritibus nutritric adsumunt naturam nutritricam & mori: lacte humano circumstant ferocissima animalia; ob spiritus temperatos, quos una cum lacte sugunt; in contra homines ferio lacte educati ferri sunt & feroces, ut Romulus testatur exemplum & Remus.

§. XIII.

Quantitas sugendi lactis exacte determinari nequit; solent tamen mulierculæ plerumque infanti primis à partu mensibus subinde à biberio, post tres quatuorve menses fixas aut septies, & demum bis tantum, vel ter in die mammam præbere, donec anni spatium fuerit emensum. Hic tamen in genere notari velim, sciri cavendum esse, ne nimis crebro & præter necessitatem mammam offerant mulierculæ, sed omni potius ratione nimis appetentes abstrahant, quia ipsi, quousque bibere debeant, ignorant, alias ista mala possunt suboriri, quæ in superiori capite evenire diximus.

§. XIV.

Sæpe incidit, ut lactis temperies variis ex causis corrumpatur: quare, ne damna inde impendeant, præcavendum erit. Maxime vero omnium, ut supra diximus, lac à terrore lactantis virum solet contrahere; unde, ne statim à terrore mamma offeratur, optimum terroris noxam avertendi præsidium est. Idem scire licet de iracundia: & quum labes à vehementiori lactis insinuatæ post longiorem etiam moram tam lactenti, quam ipsi nutritrix e. g. in mammis, varia minetur pericula, opus est, ad ipsa præcavenda, tempestiva lactis emulsione.

§. XV.

Mulierculæ
delictum
dicitur.

merita
re
corpo
ria.

- & animi.

Quantitas
sugendi
lactis.

Præservatio
damni
in lac
redundans
ex terrore.

- & iracundia.

Nata ex
nutritricibus.

§. XV.

*Alimenta
lactis sub-
stentanda.*

Nonnunquam etiam accidit, ut vel infans ad lac è mammis sugendum impotens, vel nutritrix ob morbum aliaque causas ad lactandum minus capax sit: quo in casu alia nutrimenta appropriata debent propinari, inter quae referenda sunt serum lactis dulce, jufcula hordeata, avenacea, emulsionis amygdalinae lactiformes, vel ex crepatura hordei, addito vitello ovari, emulsioni similis mixtura &c. familia.

§. XVI.

*Pulmentum
vulgaris esse
& abijci.*

Eadem profunt, & in usum duci possunt, si lac solum ad nutriendum non sufficit; licet eodem sine, pro varia regionum & populorum constitutione etiam alia excogitata sunt alimenta. Maxime autem hoc scopo apud nostrates celebrantur varia pulmentorum genera, dum farina cum lacte vel aqua cocta in pulvis tenacis ac glutinosi consilientiam redigitur. An vero infantes, praeteris illustrium ceteros, ob ventriculi debilitatem, cibis huius viscidioribus probe resolvendis supparet sint, hoc est, de quo valde dubito; ut potius inde sepiissime viam ad viscerum & mesenterii obstructions sterni credam; sicut etiam HILDANUS *Crit. VI. obs. 34.* desperatam pylori obstructionem à tali pulviscula observasse legitur. Multo minus debili ventriculo tali pulviscula debet valde repleti, vel intemptive, priori alimento nondum subacto, nova ejusdem quantitas denuo obtrudi, quia hac ratione innocuum prolem multum laedi docuimus.

§. XVII.

*Pulmentum
terrenum m-
eritum m-
briano.*

Neque probare ego vellem perverfam mulierularum consuetudinem, dum infantibus pulmenta ore prius voluta & saliva commixta exhibere solent. Et licet hac massa, saliva sanæ matris impregnata, in chylum infantili ætati amicum facilis converti posse videatur; ego tamen vix possum adduci, ut huic opinioni penitus subscribam, his motus rationibus; quia tali masticatione non modo tenuissima pulmenti portio sugendo absorbitur, sed etiam salivæ dentiumque corruptorum vitia, quæ ob summam materię peregrinæ subtilitatem vix possunt percipi, facile cum teneris communicantur.

§. XVIII.

*Post ablu-
tionem
infantum
que obse-
rvanda.*

Quando sub hac dieta infantes ad talem pervenerunt habitum, ut aliis alimentis capiendis & digerendis apti videantur, quod intra anni spatium aut ferius adhuc contingit, ab lactari possunt. Tum vero non minus, quam antea curiose sunt observandi, ne mala antea evitata pleno nunc agmine irrumpant. Inprimis autem ciborum multitudo, varietas & consilientia fugienda est; siquidem cibi nimis salii, viscidii, austri, acidi & pingues copiosius ingestii manifeste sunt concessi largiori, crudiatum acido-viscidarum proventui favent. Sic etiam æstate nocent fructus horari, crudi & immaturi, qui plerumque in particularum suarum contextu acidum recondunt, quod fibras intestinorum irritando & ipsamodice affligendo, diarrhoeas, dysenterias, tormina &c. alia mala, adventante præsertim autumnio, excitare valet. Quo denum pertinet panis non rite fer-

mentatus, aut nimis recens, non exclusis faccharatis & dulcibus, quorum interventus chylus ex facili in viscidum abit magna, quo deinde in lumbri, ventris tormina atque diuresis &c. invitantur.

§. XIX.

Nunc propius quedam de præservandi methode dicenda restant, quæ paucis explicabimus. Nihil vero ad præcavendos infantiles morbos deprehendi unius, quam, non modo nutritici, sed & tenello, paulo etiam largiori quantitate frequentius offerre infusa herbarum sanguinem edulcorantia cum aqua facta. Quem in finem non possumus non vehementer laudare infusum radicum scorzonæ, liquoricæ, herba veronice, feminis fœniculi & similium. Ita etiam lac tempe ac fluidum redditur, quo minus angustiora vascula obstruere, sed per omnes corporis tubulos valdeque anfractuosis glandularum ductus ferri possit liberius. Neque etiam illæ sibi male consulant, quæ quandoque post passum feminis fœniculi & anisi lac augmentis, atque tormina infantum præcaventis portionem comedunt.

*Remedia
preparanda
lactis
substantia
propria.*

§. XX.

Quoniam in ventriculo & duodeno lac flagrans facile accescit, corrosivum evadit & coagulatur, siquæ mille gravia excitat mala; omni profecto cura & diligencia propiciendum est, ut lactis illa tam periculosa coagulatio præcaveatur. Cui quidem scopo egregie serviunt pulveres, qui lapides cancerum ovarum tellas, radicem ireos florentinæ, crocum, semen anisi vel ejus oleum, sperma ceti, cinabarium & solutionem oculorum canceri recipiunt, de quibus bis vel ter in hebdomade dosis cum euphoria potest offerri. Sed, quam exoptatum sanatis infantilis negotium maxime etiam in debita & sufficiente secum per alvum egressionem veretur, & ut tonus ventriculi ac intestinorum conservetur, interdum quoque leniora laxantia, si opus est, sunt interponenda, quibus lactis coagulati noxæ haud parum quoque avertuntur.

*Remedia
lactis co-
agulatum
propicienda.*

§. XXI.

Hic vero omnia purgantia fortiora & acria, ut resinam jalappæ, scammonium, elleborum nigrum &c. similia, infans & infantibus absolute noxia declaro; siquidem non modo ad tormina & alvi adstrictiones, sed & ad atrophiam & adfectus convulsivos disponent. Ab aloe quoque, ob nimiam, quem excitat, fervorem & ebullitionem, item à senne foliis abstinere infantes; quia, quo plus remediis alvus ad excretionem irritatur, eo major egerendi postea difficultas, alvi-que sensio subsequatur. Imo quoque non tantum puerulis, sed etiam nutriticibus talia exhibitâ plurimum nocent; siquidem lacti admixta tenellos sæpe convellunt. Hinc recte SYDENHAM, *epilepsia*, inquit, *puerorum primo mense sæpe aggr-
datur à frequentibus nimis alvi dejectionibus*: & GALENUS sua jam ætate prudenter adseruit, quod corpora puerorum non deberent purgantibus ellectari; quia alioquin incrementum prohiberetur. Et protecto, quantum recens natorum ventriculus tener ac debilis à purgantibus lædatur, dici vix potest. Hæc enim medicamenta propter suam, qua possent, virtutem fibras irritantem, ventriculum & intestina ad ipsamodice confri-

*Cautela
circa pur-
gantia.*

476 Cap. III. De pathematibus ex dentitione difficili.

Etiones excitant, eademque, cum debilitas succedere solet, laessunt, suoque tono ac robore privant, ut dein, turbata digestionē, facili negotio lac acceat & corruptatur.

§. XXII.

— circa
purcatio-
nem

Ex mercurio, quocunque etiam modo parata remedia, praesertim in pulvere, pauloque majori & repeita dosi infantibus lactantibus oblata, jure meritoque deleteria judicamus, partim quod gravitate sua hinc inde plieis ventriculi & oesophagi firmius adhaerescunt, partim etiam, quod accellu bilis acrioris, & corrosivi acidi, vehementiorem, eamque plane corrodentem naturam induunt: unde tonus intestinorum mirifice non tantum laeditur, sed ad morbos quoque, ex debilitate generis nervosi & ipsius oriundis via panditur; idque eo magis, si infantibus, qui corrosivam colluviem, ex secum virose & torminibus judicandam, fervent, temere propinantur.

§. XXIII.

— circa
absorptio-
nem

Idem valet de aliis metallicis remediis, ut auro fulminante, martialibus, veneris & antimomialibus, ut mercurio vitae, pulvere *Musckii* & similibus, quibus cum profecto cautissime agendum est; quia admodum infida & infecura sunt remedia, quae quatenus ab humoribus in prima regione relictis solvantur, operationes vel minori, vel vehementiori modo exerant, imo fere prorsus enecant.

§. XXIV.

— circa
tenues

At vero, non sola potentiora haecenus recensita gravium malorum causam subministrant, verum etiam ipsi syrupi & pulveres nimis crebro & copiosius oblati, teoreta infantum corpuscula saepe valde laedunt. Quae de re audiendus est *CARDANUS*, qui de malo recentius *Medicorum medendi usu cap. 48.* graviter sui & nostri temporis morem de syrupis & pulveribus exhibendis ita reprobat: *error est, inquit, cum noviter natis, auxiliandi scopo, alii syrupos, alii pulveres, alii aliud consulunt; cum tamen esset, tam mollia membra nulla debere permutari qualitate, sive purgante, sive adstringente. Tenella enim ista membrorum campages, nihil fere innoxium, laesse excepto, recipere possunt.* Temperatum quoque oleum amygdalarum dulcium cum saccharo saepe exhibitum haud penitus noxa caret, prout fidem facit *HARNIUS in apario obs. med. 99.* ubi refert, infantem quendam, cui muliercula a partu oleum amygdalarum saccharo nuprum sequentius exhibuissent, torminibus fere continuis, & demum epilepsia correptum elapsis aliquot septimanis obitum; in eoque post sectionem non solum viridia, qualia etiam vivus egressus, excrementa fuisse inventa, sed etiam intestini ilei portionem inferiorem manifestam gingivae adhaesum. Nec dissimile exemplum infans ex oleo amygdalino, alternis diebus dato simili morbo defuncti recenset *Witzius in dissert. de abusu purgantium in recens natis.*

CAPUT III.

De pathematibus ex dentitione difficili.

§. I.

Den-
titione

Noluit provida natura hominem cum dentibus nasci, sed optimo potius consilio, ad praevendendas lactantium inter sugendum molestias, providere, ut dentes sensim paulatimque succrescant; quorum prima, & in utero jam posita rudimenta initio quasi mera sunt filamenta membranacea, quae succo nutritio repleta, in mucum inspissantur, ex mucu in cartilagineum indurantur, & ex cartilagine demum in osseam firmitatem abeunt. Quamvis vero non unus idemque in omnibus dentitionis sit terminus, sed ipse pro subsectorum ratione differat, dum alii tertio, quarto, septimo vel nono mense, alii autem vix intra anni spatium dentes accipiunt; nihilo minus tamen hic solet in eruptione ordo praeterquam servari, ut dentes incisores, qui etiam risorii & lactei dicuntur, a papillarum inter sugendum affricu praeter ceteris maturentur, & in inferiori maxilla priores erumpant, his deinceps canini succedant, & hos iterum molares excipiant.

— longae
eruptione

§. II.

Licet haec dentium eruptio opus & res plane naturalis sit, infantibusque nonnullis sine ulla graviori molestia evenit; pluribus tamen propter varia, quae jungi solent, symptomata, ingentes creat molestias, unde demum difficillia laboriorum, quae non nisi tardior & dolens dentium ex maxillarum alveolis per gingivas eruptio esse solet, atque his maxime signis cognoscitur: infantes calore praeternaturali exardescunt, pavore tentantur, in somno, qui inquietus est, subsiliunt, plorantibus desistantur & vigilis, lac ex uberibus avidius sugunt, ipsaque mammae papillas mordent, & manus ori crebris admovent. Tum quoque gingivae in anteriori oris parte intumescunt, tumentes aut albicant, aut rubent; saliva ad fauces copiosius destillat, ductilique lymphae ex ore saepe pendet, & alvus vel obstruitur, vel per diarrhoeam colliquescit. Imo demum his symptomatibus junguntur alia, eaque longe graviora, ut fere sunt acutae febres, motus convulsivi & epileptici, graves maxillarum torsiones, & similia; quae tamen aliter atque aliter addiuntur, prout gradu solet differre ipsa dentitionis difficultas, & subsectorum sensibilitas.

Nihil
dentium
difficili

§. III.

Causa dentitionis difficilis aliquando in dentibus ipsis, aliquando in gingivis esse deprehenditur. In illis residet, quando dentes exitum molientes vel grandiores acutiorisque sunt, ut canini & oculares; vel quando segnius excrecendo, gingivae diutius rodunt, vellicant & terebunt; vel etiam quando plures simul impetuosiori motu proeurguntur. In gingivis vero causa est querenda, si ipsarum crassities firmiorque textura pertinaciter obstat, quo minus dentes, in maxillarum localis latentes, libere possint exitum moliri.

— causa

§. IV.

§. IV.

CURATIO.

§. I.

Quum vero à tali violenta dentium proerutione valde sensibilis gingivarum caro, quæ ex variis fibris, nervis ac membranis contexta est, non potest non insigniter lædi, pungi & inflammari; haud mirum esse debet, cur non tantum pruritus, calor & dolor gingivarum cum signis dentitione conjungatur, verum etiam, ob irritationis vehementiam, factamque inde systematis nervosi commotionem, pavores, subsultus, inquietudines, vigilie, vomitiones, asthma, tussis, imò ipsi convulsivi & epileptici motus coocurrant; idque eo magis, si infantes nativa quadam, vel acquisita cerebri nervosque generis debilitate, & ad spasmodicas contrictiones dispositione jam antea laboraverint, quæ dein, dolore acuto cum febre urgente, in actum deducitur, multumque augeatur. Neque ex longinquo repetenda erit ratio, cur præter naturam alvus sub dentitionis difficultate vel supprimatur, vel fluida nimis exsiliat. Etenim, sicut omnis vehementioris doloris, ita etiam ejus, qui ex dentibus nascitur, ea solet esse natura & indoles, ut universum corpus spasimis exagitando, simul etiam primas vias male afficiat; unde lac facile accedit & corrumpitur, indeque pendens libeta alvi exoneratio aut retardatur aut nimis acceleratur.

§. V.

Prognosis.

Quoad prognostica dentitionem in pueris periculosa sæpe ac funesta esse, satis prob dolori compertimus. Gravia enim & atroces illi adfectus, quos non raro aut supervenire, aut jungi eidem diximus, sæpe tantam virium imbecillitatem adducunt, ut expediunda dentitionis pugna infans evadat impar, & perinde reliqua symptomata majus incrementum sumant. In primis vero gravis dubiusque eventus esse solet dentitio infantibus plethorica & succi plenis, itemque iis, qui immodico sermo velut marcent; utpote quibus malum omen adfuturæ convulsionis prænuntiat HIPPOCRATES lib. de dentitione. Tum quoque idem gravissimus auctor dentientes cum tussicula tardius producere dentes, inque perforatione conspicienda laborantium magis extenuari adserit; sine dubio, quia tum per se tussis vires ad protrudendam necessarias enervat, tum etiam magnam succorum viscidiorum & acrim in corpore præsentiam indicat, qui oon possunt non dentientibus, gingivas vehementius irritando, graviter obesse. Similiter etiam pejus adiciuntur, qui alvi adstricti laborant, quam qui alvum laxam & fluidam sæpe deponunt; licet pariter experientia confirmatum habeamus, quod non minus hi, quam illi præ dolore in ipso febri paroxysmo convulsi moriantur. Porro multum quoque interest nosse, an subjecta ægrotantia valde sint sensibilia & forte à parentibus inacidis genita: quod enim si ita fuerit, semper certiores sunt convulsionem, magisque dubii eventus; quamvis non omnes convulsione correpi moriantur. Denique, quo difficilior, & quo longior tempore dentes erumpunt, eo majus est periculum, ne natura nimis debilitata tandem succumbat: quæ autem diu ille senex HIPPOCRATES citato loco amplius prodidit, quod febre acuta laborantes convulsionem effugiant, & hiberno tempore dentientes facilius convalescant, id aliis experiendum committo.

Qui consilio & auxilio imminenti bus infantum morbis vult occurrere, primo omnium temporis dentitioni à natura dicatur, ut fere est tertius, quartus, septimus mensis, accurata computatione debet advertere, operaque laudabili ante ipsam dentitionis difficultatem infanti adesse, ut nec hæc quicquam cibi vel solidioris, vel calidioris ad mandandum porrigatur, sed tenuissimum potius victus; maximeque tenuiores sorbitiones propinentur. Quum vero insigni simul auxilio esse solet nutritio sugentis temperantia, & conveniens præceptorum dieteticorum observatio; eo sane pariter respiciendum est, ut hæc omnia caleficientia, vinum, aromata, & quæ sunt ejusmodi alia, maxime fugiat, & sibi potius usum alterantium & humectantium, ipsiusque aquæ potum sedulo familiarem habeat. Neque vero hæcenus dicta tantum ante molestem dentium eruptionem locum inveniant, verum etiam sub ipsa possunt ac debet adhiberi.

§. II.

In ipsa curativa methodo id maxime agendum est, ut dolor & inflammatio, quæ febricula, convulsionem & diarrhæas plerumque committit, placide fistatur, gingivæ laxentur & emolliantur, sicque dentium eruptio promovetur. In quo quidem scopo obtinendo, si interna primum spectamus, præcipitanda & maxime quidem gelatina Cornu Cervi in potu dissoluta, cum essentia papaveris rhæodis, item liquor noster anodynus mineralis, ad aliquot guttulas interducimus oblatas, omnibus palmarum reddunt dubium. Neque præclaro suo usu caret mixtura crebrius exhibita, quæ ex aquæ liliorum convallium, florum tilie, primulae veris, singulorum uncia una, pulvis Marchionis & animonii diaphoretici scrupulo uno, croci granis aliquot, & syrupi de poronia, seu papaveris rhæodis drachma una, additis liquoris & spiritus salis ammoniaci paucis guttis, confari potest.

§. III.

Sicut autem in gravibus infantum morbis nutritici sæpe, quam infanti medicamenta dare præstat; ita quoque hoc similiter observandum est in vehementioribus retardatæ dentitionis symptomatibus; quo sine ego insignem sæpe operam vidi ex medicamentis antispasmodicis nutritici oblati, ut sunt pulveres, qui radicem pæoniae, Cornu Cervi sine igne, unicornu fossile, facinum, castoreum & similia continent.

§. IV.

Nihil fere magis humorum ad superiora impetum concitat & augeat, quam diuturnior alvi adstrictio, & quæ inde pendet flatuum atque spasmorum in nervoso intestinorum tractu progenies. Quamobrem nihil prius esse debet Medicis, nihil posterius, quam ut tum infanti clysteribus emollientibus & oleosis, tum ipsi nutritici convenienti medela alvi libertatem restituat, ne forte reliquis morbi præsentis curatio à tali fontica causa retardetur vel prius suspendatur.

§. V.

Dente in te dentem, non & sub te venient.

Cervicis autem fons per internam.

nutritici præsentis.

Alvi aperta for-tanda.

§. V.

Remedia
externa.

Sed externis quoque remediis ad ipsas gingivas applicatis juvare decet; quo fine ad gingivas emolliendas & relaxandas egregie coniecit lactis cremor, item butyrum infusum tam solum, quam cum melle mixtum; neque minus prodest, in ipsa illa parte, ubi dens prorumpere conatur, atque tumorem, dolorem & ardorem gignit, sicum per medium disiectam admoveat, medullam crurum vituli, vel mucilaginem feminis cydoniorum cum vitelli ovorum tantillo, aqua rosacea & syrupo violarum dissolutam, vel etiam cerebrum leporinum, quod specificè in tali casu laudari solet, adhibere: sicut pariter insigni juvandi energis pollet linimentum, ex spermate ceti, syrupo papaveris albi, oleo amygdalarum dulcium, croco & nitro paratum, carnoque gingivarum dolenti inunctum. Quo denum perinet mica panis albi cum lacte cocta, additoque oleo rosarum & croco remixta, quam nonnulli, si anodyna propter dolorem & inflammationem poscuntur, mirifice commendare solent.

§. VI.

Sed et
gignorum.

Quod si vero dentes erumpere plane renuant, sectione ipsis parandus est exitus, & scalpello membrana, cui extremitates dentium incumbunt, incidenda: quod ego experimentum saepe ex voto successisse memini.

CAUTELÆ.

§. I.

Causa
vera
dentium
eruptio.

In dentitione difficili imprimis nocent omnia calidiora purgantia, externa quoque valde spiritusosa naribus oblata, vel adstringentia gingivis inuncta, quia inde, dum omnes in toto corpore motus auctiores sunt, hi facile exacerbantur, & febris, quæ frequentissimus & sere individuis doloris comes est, magis adhuc accenditur. Unde simili ratione peccant matres, quæ infantes in his morbis, cum dolore, febre & inflammatione junctis, nimis calido regimine tractant, & lectis aut conclavibus nimis calidis includunt.

§. II.

— circa al-
vi, tunc.

Quam alvi libertas, etiam paullo major, minusquam sere non majorem facit spem sanitatis recuperandæ, nulla tamen ratione tum temporis alvum roborantia vel adstringentia debent propinari. Alias enim res periculosæ esse plethysima, & convulsiones cum aliis symptomatibus longe citius certique subsecutas esse recordor.

CAPUT IV.

De torminibus infantum & flatulentis.

§. I.

Torminum
signa.

EX canclis, quæ teneros cruciant infantes, adstrictionibus vel tunc ab abdominis dolore & insulsa moris inquietudine occurrunt, quæ his maxime signis se manifestant. Primo ægri valde impaici hac illic se jactitant & torquent, pedi-

busque calcitrant; marmas averlantur, & continuum sere ploratum edunt: venter flatibus turgidus conspicitur cum spirandi angustia: ructus interdum impetuose ex ore prorumpunt, alvus plenumque est adstricta, & si deponitur, excrementa ut plurimum viscida, tenacia, plus minus colore viridi & æraginosa tincta, mox aquæ instar leviter flavescens fluida reddita; mox vero instar albuminis vii indurati grumosa dimittit, quod vernacula ovie *Eyerghacktes* exprimitur; saepe etiam tam acris & corrosiva ejiciuntur, ut inde pedes cum perpetuo tenefmo excorietur.

§. II.

— causa
proxima.

Causam immixtam harum passionum proximam & continentem potissimum spastica intestinalium membranarum, quæ nervosa valdeque sensibilis naturæ sunt, stricture constituant, quibus præsentibus & diu perseverantibus naturale intestinum mbar, tonus & motus peristalticus ita labefactatur & pervertitur, ut non modo excretiones tam statum, quam excrementorum retardentur, sed ingestorum quoque digestio, correctio & conveniens secretio impediatur. Quamvis vero hæc intentiones membranarum nervosarum constrictiones & crispaturæ per se valde dolorificæ sint; nihilominus tamen, quia statum, cetera individui spasmorum effectus, simul retinent, magnanque intestinum distensionem inducant; sit omnino, ut inde omnium in toto corpore functionum œconomia mirum in modum perturbetur.

§. III.

Causam harum affectionum mediatam ut plurimum graves animi commotiones, per iram, terrorem, metum & trislarum in lactantibus suppeditant, quæ proximæ & immediate in partes corporis nervosæ, maximeque in ventriculum & intestina operato, naturalem & æqualem ipsorum tonum, majori vel relaxatione, vel auctiori constrictione pervertunt. Et quandoque matres, durante graviditate, fonticus istas animi perturbaciones crebris gravibus expectæ sunt; infantes mox à partu & gravius & diutius diutius ventris doloribus adiciuntur.

Confer-
atur a
1) dñm
adfectum
lactantem

§. IV.

Sunt etiam ventris torminum & inflationum hæc infrequentes causæ graves aliarum partium dolores & spasmi. Ita enim ordinario sere dentitionem infantum difficilem & dolorificam molesta abdominis flatulentia & tormina cum excretionibus alvi præternaturali & penitus immutata comitantur. Neque raro accusari debet frigus, improvide ventri pedibusque admissum, quo non modo liberior transpirationis successus impeditur, verum etiam ipsa fibrillarum nervarum textura lædatur, & ad stases concipiendas disponitur.

2) Dolores
& spasmi.3) Frigus
externum.

§. V.

Sarpilline etiam sit, ut crebrior laxantium, multoque magis incautus purgantium usus commodam huic malo occasionem suppediet. Idque non tantum in infantibus, sed etiam adultis observare mihi licuit; quippe qui, si quid gravius sentientes purgantibus fuerunt tractati, non modo intolerabilibus ventris doloribus sunt cruciati,

4) crebris
laxantibus
& purgan-
tibus us.

Cap. IV. De torminibus infantum & flatulentis. 479

ciati, verum etiam abdomen tumidum & inflat tympaniticorum inflatum sepe receperunt, ut postea sensibilibus alimentorum canalis in flatum naturalem vii maxima cura potuerit restitui.

§. VI.

Si causas intuemur remotiores, deprehendimus, torminosos intestinorum dolores saepenumero à meconio diutius retento, neque satis per colostrum vel aliud lenè evacuant expurgati proficisci; utpote quod tum mora & copia accumulatum fibras intestinorum distendit & flatulentiam excitat, tum à lacte superingesto acris redditum sensibiles intestinorum membranas ad dolorificam constrictionem stimulat. Eandem subire censum videtur lac ipsum in primis viis corruptum, accensum & in grandinosos quasi globulos coactum, quod bilis & succorum fermentescibilium admixtione causticam induens naturam intestina pungit, rodit, lancinat. Satis autem hæc nociva secum accedo de acido-caustica indoles se manifestat non modo per viridem, quo ipse tinctus sunt, colorem, & per vasorum, quibus excipiuntur, arrosiones, verum etiam per illud maxime experimentum, quum ab olei tartari per deliquium adfusione viridis excrementorum color in flavum convertitur; ut silentio denique prætereamus, quod canes, qui alioquin lacteas infantum fordes lubenter absorbent, plane tum à viridibus his excretis abhorreant.

§. VII.

Tandem in infantibus, præsertim ab lactatis, permultum ad dolores intestinorum spasticos contribunt fructus horæ, mellita, nimia saccharata & alia, quibus pueruli libenter se obstrunt. Facta enim inde in primis viis fermentatione, facile succi acerrimi generantur, & accedente iracundia, corporique refrigeratione, magna sordium inutilium copia accumulatur; unde præcordiorum angustia, vomitiones, vehementes intestinorum lacerationes; imo ipsæ febres biliosæ suam mutantur originem.

§. VIII.

Prognosis. Quoad prognosin hæc maxime annotanda censuimus. Quo diutius atrocitas intestinum tormina sæviunt, & quo crebrius sensibilia tenellorum corpora infestant, eo solent esse graviora & periculosiora; quam facile enim febres, paralysis, asthma, epileptica convulsiones & alia funesta junguntur mala, quæ, nisi cito convenientibus compellantur remediis, facile ad lethum miserum ducunt. Qui à verminosa colluvie proveniunt intestinorum dolores, raro feliciter cessant, nisi verminibus ipsis exturbatis. Neque in eventu præiudicando parum interest, ut subjectorum laborantium ratio habeatur; quæ si à parentibus imbecillioribus, & matribus inprimis ad spasmus hystericos dispositis prognata fuerint, metus est, ne malum & vebementius infantem torquent, & multo crebrius recurrat.

CURATIO CUM CAUTELIS.

§. I.

Cautio medicis. Medico torminosos infantum cruciatus curaturo primo omnium incumbit, ut acidum prima-

rum viarum corrosivum absorbere, corrigere & blande educere litagat. Quo fine, si malum, ut plerumque fit, à lacte corrupto & quibuscunque de causis vitio originem traxerit; quam primum necesse est, ut nutrit vel profus mutetur, vel serio cavcat, ne tum temporis cibus flatulentis, fructibus horatis, leguminibus, vinis acidis, feculentis, aliisque lactis temperiem immutantibus indulgeat; quia his omnibus vel multum augetur, vel pertinacior redditur affectus. Tum quoque nutriti, si alvi adstrictione laborat, leniora profunt laxantia, inter quæ maxime recensetur rhabarbarina, si e. g. drachma dimidia extracti rhabarbari in uncia dimidia liquoris terræ foliatæ tartari & aquæ cinamomi soluta mane & vespere ad xl. & plures guttas adsumitur. Neque tum minus nutritum adjuvant medicamenta carminativa, item insula theiformia, in paulo majori quantitate hausta; utpote quæ in lactis crassitie diluenda & resolvenda excellenter se gerunt.

§. II.

Quod vero speciatim ad opem infanti ægrotanti præstendam attinet, primo omnium eo debet respici, ut acidum primis in viis obhærens ad justam temperiem reducat. Quo fine hic, qui sequitur pulvis expensæ virtutis meretur commendari, qui ex lapidum cancerum, matris perlarum, animonis diaphoretici, radice ireos florentinæ, ana drachma dimidia, croci grana tribus, olei anisi, macis guttis duabus conficitur, & singulis bihoris ad grana quinque vel sex in decocto cornu cervi, vel aquis antispasmodicis & analeptica virtute præditi, ut florum tilie, cerasorum nigroreum, mellis &c. cum paululo diacordii *Fracasterii* remistis, cum fructu propinatur.

§. III.

Nihil autem fere magis misere adfectos solare, præter clysteres, qui tum blando tepore suo spasmus intestinum relaxant, tum etiam flatus, qui plerumque torminum causa vel comites sunt, egregie discutiant & erebunt. Quo fine ego laudatissimo sepe effectu applicari iussi enemata, ex herba majoranæ, floribus chamomillæ & feminibus carminativis cum jusculo tenui avenaceo decoctis parata, & addita olei chamomillæ vel anethi cocti sufficiente quantitate, adjectisque aliquot olei anisi guttulis efficacius reddita.

§. IV.

Interne data alvum tensam optime referant rhabarbarina, ut syrupus de cichoreo cum rhabarbaro, medicamentum nutriti supra præscriptum in minori dosi oblarum, & electuarium, quod ex rhabarbari electi & lapidum cancerum aequali portione cum syrupo cichorei vel rosarum solutivum subacta componitur & in decocto hordei, adjecta convenienti manne quantitate, per intervalla propinatur. Neque possum, quin hoc loco approbem, valdeque laudem methodum *HEURNII*, qui in *method. ad prætin lib. II. c. 26.* adscribit, se usu comperisse, à teminis anisi scrupulo uno, grosso modo comminuto, jam recens natos puerulos commodissime à viridi bile & piruita sorda purgari, simulque clamosos ventris dolores sedari, si cum primo cochleari pulvis saccharata offeratur.

§. V.

§. V.

— per
sternu-

Si verum in intestinis nidulantium suspicio adest; ea omnino dare expedit, quæ inimicis huius hospitibus enecandis & educendis accommodata sunt remedia: de quibus infra in peculiari capite dicendi locus erit.

§. VI.

— per
sternu-

Tandem etiam externis contra vim morbi simul pugnare expedit. Quo scopo egregie se gerunt emollientia, ut sunt flores chamomillæ, sambuci, meliloci, verbasci, semen fœni græci, anethi, crocus &c. ex lacte cocta, & vel vesicæ fuisse indici, vel linteo exceptæ, abdominiquæ applicatæ. Nec mihi illorum displicet methodus, qui exterius ventris regionem circa umbilicum oleis destillatis cumini, carvi, anisi, fœniculi, chamomillæ & similibus, cum oleo nucisæ expresso, chamomillæ cocto & axungia quadam exceptis ac temperatis inungunt.

§. VII.

Cautela
sine per-

Quod tandem ad cautelas in hoc morbo necessarias attinet; utique consultum est, ab omnibus salis, acribus & fortiter stimulantibus, præsertim purgantibus abstinere: admodum enim intutum est, laburram acerrimam sine præmissa ejus correctione per longum intestinorum canalē educere velle. Maxime autem omnium insigni nocendi qualitate pollent resinosa, ut resina jalappæ, quæ sine imprudentiissimè infantibus ex lacte corrupto & acri agrotantibus propinatur; & licet copiam humorum aliquoties ejiciat, continuo tamen stimulo & intestinorum irritatione spasmos facile adauget, & debilitatem relinquit. Si vero repurgatio, quæ tamen raro expolitur, opus est, pulsivis mechaconne albe aut aliquot grana cum syrupo dandi prodest, aut potius collectam ventriculi & duodeni faburram absorbentibus & corrigentibus altare, & dein mannæ, rhabarbaris vel clysteribus ejus excretionem moliri juvat.

§. VIII.

— circa
malum &
spasmus
erunt.

Sæpenumero hæc intestinorum tormina non tam à causâ materiali primis in vus latitante, quam potius à formali, seu vehementi nervorum agitatione, e. g. à gravi in aliis membris dolore per consensum producuntur: quo in casu, remotis laxantibus, primo unum ad spasmos & dolores sopiendos dirigenda est curatio.

§. IX.

— circa
alvum
constitutum
proprie
tatem.

Si usum remediū genus ob insignem, quam præstas, utilitatem meretur commendari, sunt profecto, ut supra jam inuimus, clysteres, qui immediate ad intestina pertingentes, & tam sedando quam statim discutiendo insigniter operantur, si modo attendatur indicatio, ob quam repida hæc fomenta necessarios, ut in his apparandis aliquam habeamus dilectionem. Ita enim, si excreta alvi sunt usque, sicut lactis acerrima, ut non modo gravia ventris tormina, sed & potius excoarctationem intant, profusa clystera ex lacte cocto chartæ, vel terebinthina in vitello ovi soluta, quæ acutissimum temperando, inte-

stini crassi & potidici rogonem avertunt. Quod si vero amurca vitulica in intestinis oberrans, torminibus & flatulentis aniam suppeditat, locum potius inveniunt enematæ majores quadam refolvendi virtute prædita, quæ stimulo intestinæ crassæ addito efficiunt, ut qui in reliquis intestinis hæret mucus, eo facilius possit descendat. Ita parari potest clystera ex decocti florum chamomillæ uncia una vel duabus, additis mellis rutæci una alterave drachma, saponis veneti drachma dimidia, oleique anisi aliquot guttulis.

§. X.

— circa
sternu-

Solent tandem mulierculæ plurimæ ejulatum pertæse ad somnum in hoc morbo provocandum, varia sedativa, ut mithridatium, requiem Nicolai & alia propinare; sed pessimum plerumque ausu & effectu; nam præter multa gravia marisica mentis hebetudo improvidum opiatorum usum sæpe sæpius solet excipere.

CAPUT V.

De aphthis.

§. I.

Quæ infantum os, fauces & oesophagum obfident pustulæ cum inflammatione quadam conjunctæ, iō Medicorum scholis dicuntur aphthæ, & nil nisi ulcuscula sunt parva, vix milii aut cannabis semen excedentia, quæ nonnunquam, propter ardorem & dolorem, non modo inquietudines & clangores clamores excitant, sed lacrimas quoque sustinent ipsamque deglutitionem valde reddunt difficilem.

§. II.

— circa
sternu-

Differunt hæc oris pustulæ ratione graduum; siquidem aliæ sunt indolentes, rubræ vel flavæ, & tantum per gingivas, linguam & buccas in superficie dispersæ, ideoque benigne dicendæ; aliæ contra sunt valde dolorificæ, lividæ vel nigre, ad uvulam, fauces & oesophagum usque extensæ, ut sæpe totus oris ambitus quasi exulceratus videatur. Atque harum indoles plerumque est maligna, adeo, ut carnes sæpe subjacent profundius ad ossa usque exedantur.

§. III.

Materia, quæ aphthas excitat, omnino est acerrima, penetrans & causticæ indolis, quæ in sanguine prognata, & in glanduloso faucium peristromate, ope glandularum, segregata tenerim palati carnem rotat, inflamat, exulcerat: unde pustularum & complicatarum cum ipsis symptomatum origo.

§. IV.

— circa
sternu-

Inter causas vero mediatas, quæ ad ingignendum tam virulentam aëriam disponere solent, maxime omnium referri debet hæc vel in potu & nutribus, et incongruam victus rationem, per morbos complicatos, & turbulentos animi affectus corruptum, vel in ipsis lactentibus variis ex causis coagulatum, & accestibilibus

bilis acrioris impurum, valdeque acre redditum: quod cum sanguine communicatum, non potest non totam maffam fanguineam acrimonia quadam nociva imbuere, & ficut malis pluribus alijs, ita etiam aphthis occasionem præbere largiffimum.

§. V.

Quæ cum ita fint, haud mirandum eft, cur aphthæ varii generis morbis, à fanguinis impuritate provenientibus vel jungi, vel fuperveni- re folent, ut fere fit in febribus acutis & malignis, tuffi, diarrhoeis choleroideis, affthmate, dentitione difficili & fimilibus. In febribus enim, ob nimium calorem, fanguis plerumque temperata & gelatinofa fui portione privatus admodum facile falfo-fulphuream diathefin acquirit; in reliquis vero morbis ætæ nominatis acris quedam & vellicans materia peccat, quæ tuffim, diarrhoeas, affthmas, excitat, adeoque etiam aphthis progignendis apta nata exiftit.

§. VI.

Sæpe etiam aliæ quedam cauffæ externæ & occasionales ad aphtharum progeniem conferrunt; ut maxime quidem intermiffa faucium & linguae abfterfio, perversa febrim & aliorum morborum per calidiora medicamenta curatio; aut fi corpora infantum æftuanda frigido exponuntur aëri, qui transpirationem cõhibendo, for- diam falino-fulphurearum accumulationi inprimis favet. Neque hic excludenda funt alia, quæ immediate laxiori faucium compagi vim quandam inferant; ficut potiffimum faciunt turunda, ex linteo conorto cum mica panis vel faccharo repleta, nec non frullula panis cerevifiæ intincta, & infani ad fugendū oblata: quem morem non modo noftros vilioris conditionis mulierculæ perperam fequuntur, fed LENTILIUS quoque *Epemerid. German. Dec. III. anno 3. appendice obf. 94.* in Suevia potiffimum annotavit, graviterque reprehendit. Nec fine ratione; fiquidem inde partim fortiori afflictu, partim mutata faliva temperie facile mollior oris interni cuticula arroditur, & puſtula excitantur; quæ tamen, niſi interna humorum acrimonia concurrat, placide decurrunt, & medentibus animam dederunt, ut aphthas vel à cauffa interna, vel externa deduxerint.

§. VII.

Quæ per oris fuperficiem rarius funt difper- ſæ aphthæ, itemque indolentes, rubræ & flaveſcentes remedijs facilius obſcundant, quam quæ totas fauces occupant, ad nigredinem vergunt, proſunde exulcerant, foetidumque odorem ſpargunt. Neque multum periculi alunt, ſi ab externa potius cauffa, quam ab interna proficiuntur, prævarique ſuccorum diatheſin pro fundamento agnoscunt; quales funt, quæ ſymp- tomatice febribus acutis, aliſque gravioribus morbis junguntur. Peſſimis quoque accenſeri debent, quæ magnam inflammationem, ſpirandi & deglutendi difficultatem junctam habent, quæ in morbis malignis funeſtum prænuntiant eventum & ſæpe poſt mortem per totum œſophagum ad ventriculum ulque diſperſæ ſubſe- cutione conſpiciuntur.

Frid. Hoffmanni Oper. Tom. III.

CURATIO.

§. I.

Curatio aphtharum pro ratione cauſarum va- riatur. Nam, ſi ſulphicio ſubſeſt lactis vel in ma- tre, vel in nutrice corrupti, tum illud omnino debet corrigi; quod optime perſicitur, ſi non tantum nutrient formina omnia ſalâ, acia, ſpi- rituofa & acida, animique adſectus ſerio fugit, ſed & remedijs utitur ſanguinem purificantibus & temperantibus, ut fere ſunt decocta radicum & herbarum temperatiora, diaphoretica, abſor- bentia, & alvum leniter ſubducentia, quorum à nobis jam ſæpius facta eſt mentio.

§. II.

Si ipſe infans mali formitem continet, per in- tervalla, ſynapo mannato, vel cichorei cum rha- barbaro ad drachmas ſex paulatim dato debet purgari, & iſdem circumſpecte tractari, quæ lactis coagulum impediunt, ejuſque acrem in- tempericem emendant, vitando limul omnia, quæ aphthis anſam præbere ſupra docuimus. Tum vero, ad acrimoniæ humorum temperandam optime proſunt decocta avenacea cum ſaccharo nitrique pauſillo remiſta, & ponis loco oblata.

§. III.

Quæ morbis acutis vel alijs junguntur aph- thæ, nunquam curantur, niſi morbo ipſo, cu- jus ſymptomata ſunt, vel mitigato, vel peni- tus ſupcrato. Minime vero in acutis multis la- xantibus natura in opere ſuo debet turbari, & potius leniora diaphoretica & emulſiones tem- perantes ex feminibus iv. frigida & papaveris pauſillo, paratæ omne abſolvunt punctum.

§. IV.

Sed quoque externis rodentem aphtharum a- crimoniam placare decet; quem in finem lau- dem merentur linctus ex diamoro, ſucco gra- natotum & melle parati; itemque ſuccus rapum cum vitello ovorum & ſaccharo ſubactus, vel cremor lactis cum ſynapo papaveris albi, vi- tello ovi & tannillo nicti mixtus, & vel digitis limbo involutus, vel penicillo applicatus. Nec minorem præſtat operæ vitellum ovi, cui aqua roſarum & ſaccharum admixtum, item mucila- go feminis cydoniorum cum melle & pauſillo croci remiſta puſtuliſque illita. Quæ demque ad os colluendum præſcribantur gargariſmata, pu- ſilli ſuadere nollem, upote qui ad gargariſan- dum minus ſunt apti.

CAPUT VI.

De variolis & morbillis.

§. I.

EQuidem jam in quarta medicinæ ſyſtema- ticæ parte, ubi de omnis generis febri- bus agit, variolas æque ac morbillos ſeorſim conſideravi; nihilo minus tamen de ſingulis jam pauca addere placeat, quæ partim alara

T t magis

Phenome- ni explicat.

— confa- cernata

Progenies

Curatio mali ex- terna no- mine.

— ex totis reſultat.

Curatio aphtharum ſymptomati- carum.

Remedia externa.

Infinita pauca.

magis dilucidabunt, partim eo fervient, ut totum rei negotium, quo exopata horum adfectuum curatio abolivna, breviter in conspectum veniat.

§. II.

*Variolae
et
morbilli
differunt*

Variolae quidem & morbilli, si primum invadunt, ratione symptomatum valde inter se conveniunt, dum utroque morbi species cum febre accedit, exanthematica & contagiosa est, epidemice grassatur, & universum corporis habitum cum alicui curia elevatione deformat; progrediente vero morbo differentia facile advenit, dum in morbillis longe minor cutis elevatio apparet, pectus maxime maculis obfidetur, tussis excitatur atque totus morbi decursus minor & benignior deprehenditur, citiusque terminatur: cum contra variolae caput, manus & pedes potissimum occupent, maculae in dies majores fiant, & rubrae, quae deinceps suppurantur, albescunt, exulcerantur & exciscentur, ad quod perficiendum non solum plures dies requiruntur, sed vehementiora quoque symptomata accedunt, & vestigia saepe indelebilia in cute remanent.

§. III.

— Symptoma

Nunquam aut variolae, aut morbilli sine febre eveniunt, certisque temporibus plus minus benignae vel malignae sunt; nihilo fecius tamen, si aegrius erumpunt, laborantes ut plurimum delirant, somnia in somno terrificia experiuntur, magnas pectoris angustias ipsiusque gutturis dolores sentiunt, urinae albam mingunt, nihilque alvi deponunt, quia diversis aliunde humoribus feces exsiccatae remanent; imo saepe epileptici convelluntur subsulibus & morris periculo expositi sunt; nisi his omnibus in melius conversis symptomatibus quietiores fiant, & liberior exanthematum eruptio facilius succedat.

§. IV.

*— Symptoma
morbi
variolae*

Symptomata cum utroque adfectu conjuncta ut plurimum a febre & abhinc pendente sanguinis impuri ebullitione proveniunt; quam ob rem non mirum esse debet, cur sanguinis cursu ad superiora impetuosis directo pectoris anxietates, tussis & cordis palpitationes, in capite cephalalgiae, deliria, oculorum & faciei inflammationes, lacrymarum fluxus, rancidines, salivationes &c. eveniant, & praeterea, propter nervorum a materia caustica rodinae vellicationem tormina, epilepsiae, tremores, nervorum subsultus & similia pessimum ludant tragœdiam.

§. V.

*— Maligna
variola
et
morbilli
differunt*

Multum omnino refert, ut sciamus, quam variolae praeservant indolem, & an malignae, benignae, an medice sint naturae. Pessimae autem sunt, si depreltae cum foris, vel etiam valde ardentes, acuminatae & simul confluentes conspiciuntur; si violaceae, lividae aut prorsus nigrae, & vel petechiis vel purpura, praefertim alba, interstinctae apparent; si febris post eruptionem magna cum anheliis difficultate permancet, & vel mictus cruentus, vel narium haemorrhagiae, cruentae alvi dejectiones sociantur. Pessimae quoque indolis sunt, si in vesiculis sero vel acri, vel sanguinolento repletas desiliunt, & ad suppurationem tendere renuant, aut si demum in lenas & bene

febres desinunt, malique moris ulcera & abscessus relinquunt. Benignas contra adjudicare licet ex remissioni symptomatum vehementia, pusillus debito modo & tempore erumpentibus, suppurantibus & arefcentibus; quae vero medice naturae dicuntur variolae, inter utraque obtinent medium malignitatis gradum, uti nos pluribus in capite citato de variolis ostendimus.

§. VI.

Morbilli perinde gradu differunt, semperque mali haberi debent, si quando ipsa alia exanthematum genera immiscuerit, si tussis nimia, rancido, & febris diutius durans, morboque declinante gravia remanent symptomata, quae morbis chronicis anam praebent facillimam.

§. VII.

Pendent autem hi diversi malignitatis gradus ab ipsa subjectorum laborantium constitutione & natura. Ita enim saepius iterumque observare mihi licuit, quod pueri succulenti sanguineque copioso praediti, maxime si a parentibus morbidis fuerint prognati, & propter victum incongruum impuros in corpore humores collegerint, sub morbofa coeli iniquitate praeter ceteras variolas & morbillos malo ordine decurrentes incidere soleant. Etenim, quo major materiae impurae intus latet copia, & quo minus naturae robur eidem fore propellendae sufficit; eo eam difficius est morbus, cujus unica certe modica in decente materiae peregrinae ad habitum corporis propulsione, debitaque exhalatione consistit.

§. VIII.

Tum quoque ad augendam horum adfectuum malignitatem non parum conferre solent, perversum aegrotantium regimen & commissi in dieta errores, itemque aliae, quae praeter morbum junguntur circumstantiae, ut praecipue sunt vermes, qui naturam in morbus salutariter instituta saepe adeo turbant, ut omnia in pejus ruant symptomata; siquidem ego non raro spasmodicas artuum tractiones, cum aphonia, ventris torminibus & nimia salivatione concitatas novi, quae nunquam subsequae fuissent, nisi verminosa progenies anam suppeditasset. Saepè etiam diarrhoeae & salivationes nimiae, incongruo tempore obortae statim pejorem asserunt; licet moderate haec evacuationes, si in principio & sine morbi cruce incidunt, plus plerumque prosint, quam obfint.

§. IX.

Qui pernicialibus his morbis pereunt, ut plurimum inflammatione partium internarum, & subsequente sphacelatione, vel suffocatione, per anginam & catarrhum suffocativum moriuntur; dum scilicet acris caustica materia vel non satis expellitur, vel expulsa recedit, & in sensibili nervorum systema graves spasmi, imo epilepticas convulsiones excitat, quae, si post factam eruptionem aut perdurant, aut revertuntur, multum plerumque alunt periculum. Nonnunquam morbus videtur declinare, & de sua feroa confessione remittere; quod vero non est indubium moris praebet indicium, quia tum

*— et
morbis*

*Gradus
variae
et
morbilli*

*— et
circum
stantiae*

*Contra
morbis
prognosis*

tum materia plerumque ad partes nobiliores re-
vertitur; unde extrema frigen- & subito fa-
ciei, totiusque cutis innumescentia subsidet.

§. X.

*Sectio an-
atomica.*

Demortui, cultro anatomico dissecti perſepe
exhibent viſcera pluribus paſſulis & maculis
lividis obſecta, vel etiam ventriculorum cum in-
teſtinis magna copia variolarum quoad ſuperfi-
ciem conſperſum; ut ipſe ego non ſolum cre-
brius annotavi; ſed alii quoque auctores ob-
ſervarunt ſapillime. Vid. KERKRING. *ſpicileg.*
obſ. 62. FARNEL. lib. II. c. 12. de abſciſſis rerum
cauſis.

CURATIO.

§. I.

*Curatio per
diaphore-
ſes &
emulſio-
nem.*

Totus curationis cardo in eo poſſiſſimum
vertitur ut materia acris & cauſifica temperetur,
corrigitur, & a partibus internis ad exter-
nas propellatur. Quo ſcopo præcipuum merentur
commendationem pulveres abſorbentes & blande
diaphoretici, qui ætimoniam corpori in-
fecitum in variolis & morbillis non modo com-
temperant, ſed optimo etiam effectu eandem
ad externum corporis habitum propellunt. Hi
vero ex cornu cævi philoſophice præparati,
ali, lapidum cancrorum, antimonii diaphoretici
ana drachma una, ſucci præparati, niri
pulveris ana drachma ſimilia, cinnabaris,
corricis caſcarillæ ana granis quindecim, olei
maſis guttis quatuor commode poſſunt parati,
& pro ætatis ratione debita doſi exhiberi. Ne-
que tum laude ſua carent emulſiones tempe-
rantes, vel dictis pulveribus interponende, vel
cum iſdem conjunctim propiandæ, quales
ex ſeminum cardui marie, frigidiſorum majorum,
papaveris albi ana drachma una, aque
cardui benedicti, ſorum ſambuci, ceraſorum
nigrorum, roſarum, ſorum riliæ ana uncias duas,
coſificare hæſtenus conſuevimus. Huc quo-
que eadem intentione pertinent decocta cornu
cervi & hordei, avenacæ, pulſanæ hordeacæ
cum ſicubus parææ, ſorum lactis dulcis & ſimi-
lia, quæ tum in acrimonia temperanda, tum in
placidiore exanthematum eruptione promovenda
maxime merentur laudari.

§. II.

*per be-
zoardica &
baſium.*

Hæſtenus recensitis abſorbentibus, diaphore-
ticis & demulcentibus, ſi prudenter admini-
ſtrantur, totum curationis opus ſcilicet abſolvitur,
niſi vel in retardata exanthematum
eruptione dictis pulveribus bezoardicis tantum
myrrhæ ac croci adſpicere, vel parum li-
quoris bezoardici, ut ſpiritus Baſis & liquor
noſter anodynus eſt, propinare, vel, durante
ſuppuratione liquorem myrrhæ aquoſum cum
ſale tartari paratum ad acrimoniam temperan-
dam offerre velimus; quod medicamentum
ſimul pectus, ſi tuſſis valde urget, egregie
ſolatur.

§. III.

*Curatio
variolis &
morbillis.*

Inter ſymptomata cum variolis & morbillis
conjuncta imprimis referri debent terminoſi in-
teſtinorum cruciatus & teneſmi, quibus vix
melius poſſumus mederi, ac ſi oleum amyg-
dali. Hofmanni Oper. Tom. III.

§. IV.

Quando raucoſo cum tuſſiculofa pectoris
concuſſione valde urget, optime conducit ele-
ctuarium, ex oleo amygdalarum dulcium re-
centi, ſpermate ceti, ſyrupo violarum & croco
paratum, & cum potu calido crebrius exhibi-
tum, non excluſis decoctis avenacæ cum ſac-
charo cando & vinello ovi parandis.

§. V.

Hæmorrhagiæ ſi incidunt, cauſiſſimus ſit
adſtringentium uſus; ſed tantum, ad impetum
ſanguinis moderandum, proſunt modico myrrhæ ex
aquis antiſpalmodicis, diſcordio Fracaſſorii
nuptæ, & cum pulveribus præcipitantibus leni-
ter nitroſis oblata.

§. VI.

Variolæ faciem præcipue petunt, aciemque
oculorum facile lædunt: quare, præſervandi ſi-
ne, commendari meretur hoc muliebre aqua
roſarum dilutum & cum modico myrrhæ &
croci remixtum; vel aqua roſarum & ſorum
ſambuci cum tertia parte liquoris noſtri anody-
ni mineraſis, & momento camphoræ vigorata,
oculiſque applicata.

§. VII.

Nihil plerumque magis à Medico expoſci-
tur, quam ut faciei-toria & pulchritudinis
conſervandæ curam gerat, ne profunda relin-
quantur cicatrices faciem deturpantes; quod
ieri plerumque videmus, ſi materia acris ni-
mis profunde cuti inheret. Licet autem raro
in totum evitari poſſint tædioſe iſtæ cutis de-
ſecrationes; aliquid tamen petitionibus dan-
dam, & linimentum commendandum eſt,
quod ex axungia humana recenti, cum ſolu-
tione lithargirii in aceto ſacta paratur; modo
caveatur, ne nimis cito, ſed areſcentibus de-
mum papulis adhibeatur.

§. VIII.

Nares ſæpe internæ variolis obſidentur &
obſtruantur, quo minus dein liberior æris in-
& expiratio riſe poſſit ſuccedere; quam ob-
rem, ſi opus eſt, iſtæ commode poſſunt illini-
ri oleo amygdalarum dulcium cum oleo lini
Rhodii & tanſulo camphoræ remixto; quod re-
medii genus locum pariter invenit, ſi faucis ex-
ulceratæ opem expoſcunt.

CAUTELÆ.

§. I.

Si ullo in morbo accuratum vitæ regimē ten-
endum eſt, obſervari quam maxime debet, in
variolis & morbillis. Præſertim autem æris re-
gimē ita moderandum eſt, ut nec argotantes
nimis calidis tegumentis prope ſumacem coope-
riamus, nec in hypocaustis humidiſſimis & fri-
gidis detentis frigoris injuriæ exponamus. Urum-
T t a

484 Cap. VII. De epilepsia & convulsionibus.

que enim periculosissimum est, dum altera ex parte, ob facilem internorum inflammationem auctamque materię peccantis acrimoniam: hæmorrhagię & alia mala concitantur; ex altera vero exanthematum eruptio vel retardatur, vel pusillę retroaguntur.

§. II.

*in alia
gustum.*

In principio & statu morbi carnes vitę decet, omniaque alimenta multum sacci præbentia; nisi majorem accerere velimus putredinem. Vitę quoque nimis dulcia, eaque præsertim viscida, quia humorum viscositatem augent. Id quod in morbillis similiter valet de acidis temperandi ardoris grada cum potu datis; siquidem talem, quę fere individuum hujus morbi comes est, plerumque vehementiorem reddunt.

§. III.

*Ubi fric-
tione.*

Veteres Medici inter morbi initia, ad materiam hostilem à partibus internis evocandam, externe frictions parium extremarum cum panis calidis valde commendarunt; quod remediũ genus nec ego rejicere ausim; quoniam ad meliorem cutis perspirationem haud parum conferre arbitror.

§. IV.

*Castoreo
vix so-
luta.*

Remedia alvum ducentia magis præservandi, quam curandi scopo utilia sunt; nihilo minus tamen crebrius ego in morbi principio, si propter summam sanguinis ebullitionem humores vehementius ad caput & pectus propelluntur, clysteres ex decoctis hndei, saccharo, & oleo amygdalarum dulcium paratos applicari jussi; idque inde obtinui, ut exoptata symptomatum remissio subssecuta fuerit.

§. V.

*Reliqua
morbi quib-
us solen-
de?*

Sæpe, licet omnia diligentissime observentur, in fine morbi nocivę permanent reliquę, quę peculiarem opem exposcunt. Ita si ulcera mali moris resistant, unguento de cerulla camphorato vel lichargiis sunt tractanda, vel isilem balsamica, ex essentia succinũ, myrrhę, balsamo Peruviano confecta, vel balsamum nostrum vitę aquę scopetarię nuptum injicienda. Quicquid vero mali evenit; semper tamen internis purificandis debet insisti. Quem in finem non modo alvũ lenioribus laxantibus, ut siccatura habebatur, per intervalla debet subdaci, & saluberrimum transpirationis negotium debito regimine insussum herbarum calidis veronice, scordii, scabiosę, radicis glycyrrhizę & seminis feniculi, pulveribusque diaphoreticis promoveri; verum etiam temperatis balsamicis, e. g. essentia myrrhę aquosa & aliis, deperditã sanguinis temperies restituere. Juvat hic quoque exaditã diatę ratio, quę in eo consistit, ut inter cibos dura, salia, sterculentia fugiantur, ponique decoctum radicis chinę, sarsaparillę, glycyrrhizę &c. sublinatur.

§. VI.

*Præser-
vandi re-
ba.*

Hactenus commendata interna remedia similiter præservandi scopo ex usu sunt, si quando propter inordinatam aëris consuetudinem vel

propter aliorum jam ægrotantium contagium, hæc exanthemata sunt perimiscenda. Nam multum omnino refert, ut corpus ad morbi impetum feliciter sustinendum antea bene præparetur.

C A P U T VII.

De epilepsia & convulsionibus.

§. I.

Veram tam epilepsię, quam convulsionum ideam jam in parte III. tom. IV. Medicinę systematicę fulius suppeditavi, ibique argumentis sat ponderosis evici, causam morbi alterius in spasmu durę matris; alterius in spastica membranarum, medullam spinalem investientium strictura ponendam esse. Nihilominus tamen, ut seorsim innoteceat, quanam maxima causę infans horrentis evici, adfectibus subiacent, quibulque remediis depelli illi debeant; à se fore arbitror, ut, in præcens morborum insaniilium disquisitione, specialia quadam, & magis ad infans pertinentia adjiciam.

*Infans
raret.*

§. II.

Solent autem epilepsię & convulsionem totam ætatem, quam ab anno primo ad septimum extendimus, præ ceteris frequentissime in- quere; non aliam ob causam, quam quod in infantibus partes nervosę membranaceę sensuque exquisitori prælixe ex teneris, admodumque mobilibus fibrillis sunt compositę, quę levissime tantum irritatę, in spasticę & irregulares commotiones facillime conjiciuntur. Quam ob rem etiam usũ venire solet, ut, quo tenerior & ætate minor est infans, & quo majorem à parentibus vel animi adfectibus ductus, vel eodem olim morbo adfectus, obtineat sensibilitatem, eo etiam facilius ac vehementius tam epilepsius, quam convulsionibus corripatur.

*Infans
raret.*

§. III.

Tum quoque truculentis hi adfectus facile solent accidere, si non modo matris uterum gestantes salutare diatę lege, neglexerint, sed etiam nutrices lactantes hythericis vel aliis nervosi generis pathematibus laborant; si acetaria, acia, fructus horreos aliique incongrua copiosius devorant, spirituosã liberaliori manu assument, vel lacte copioso aque ac crasso, & in ventriculo accescente pusillos sibi demandatos nutriunt. Neque adeo rerum, sed mihi aliquoties obvium fuit, persicille sugentes in epilepticas convulsionem, eisque difficulter curabiles, incidisse, quando nutrices vehementi animi adfectu, præsertim ira, terrore & timore percussę mammę statim antea debitam lactis emulsionem & correctionem offerunt; qui si quando mensuras purgationes, quibus ab initio lactationis ad tempus caruerunt, denuo expertę fuerunt.

*Infans
raret.*

§. IV.

Deinceps experientia demonstrat, nonnquam tam comitalem, quam convulsivum morbum suboriri, si partes quadam nervosę spasmis

*Infans
raret.*

mis vel doloribus agitantur, & consensus lege ipse meningum & medullæ spinalis membranæ simul adficiuntur. Fieri hoc maxime deprehendimus a meconio in primis viis retento, & per moram acri reddito; item à ventris torminibus & vermibus, sensibiles intestinorum tunicas lancinantibus, nec non à doloribus ex demissione difficili subortis, & à purgantibus fortioribus, inique præteritum crebro oblatis; siquidem hæc omnia ita sunt comparata, ut in subiectis infanone paulo majori præditis facili negotio motus epileptico-convulsivos ciere valeant.

§. V.

Sicut illi denique pueri ab epilepsia & convulsionibus præcauentur vel liberantur, quibus savi, crusta lactis & scabies cum pustulis supervenientes ita hîcse impuritatibus improvide retrospectis sæpe sæpius hi gravissimi morbi originem debent; quod finaliter valet de variolis & morbillis, quorum vel impedita eruptio & nociva retrocessio, vel-improvida cura infantes numero plurimos epilepsia & convulsionibus enecat.

§. VI.

Quæ febribus acutis, petechialibus, morbillis & variolosis supervenienti convulsionibus & epilepsia, mali sunt omnia; nec etiam periculo carent, quando ex demissione difficili & ventris torminibus subortæ diutius adligunt. Quibuscumque hi morbi, teste HIPPOCRATE *secl. III. aph. 28.* & experientia, circa annum septimum non solvantur, iis plerumque usque ad aliam ætatis periodum misere inhaerent. Nec denique minus ex ipsa paroxysmorum frequentia prognosis petenda; ubi sciendum, quod quo crebriores sunt accessiones, eo magis timendum sit, ne natura demum superata succumbat.

CURATIO.

§. I.

Sicut in omni morbi genere, ita non minus in nostris adfectibus tota medentis intentio ad causas debet esse directæ, unde ipsi fuerint subortis. Quod si itaque ex vicio nutritis per terrorem aut vehementem iracundiam commotæ malum originem reperit, sepositis omnibus spirituosus, acerbis & irritantibus, ea dare expedit, quæ inordinatos & spasmodicos nervos generis motus placide compescunt; ut ingravis faciant clysters, ex floribus herbarum emollientium & seminum carminativis parati; itemque pulveres antispasmodici, ex pulvere Marchionis, cinabari & moschi tanillo confecti, & vel soli, vel in vehiculo aquarum, sedante quadam virtute præditarum, horum tilia, liliorum convallium, primulae veris, aurantiorum &c. propinati.

§. II.

Neque parum differt curatio, quando à lacte in ipso infante corrupto & corrosivo reddito mortuus proficiuntur; siquidem tum pariter præter clysters demulcentes, egregius pulverem absorbentium cum croco, moscho vel momento extracti castorei remissionem est usus; maxime si simul decoctum cornu cervi paulo spissius propositu adsumatur. Quod si vero simul primæ viæ

Frid. Hoffmanni Oper. Tom. III.

à fordibus acido-erosivis sunt purgandæ, fieri id commodè potest decocto manne succutivæ dato, cui aliquot guttulæ olei tartari per deliquium insillentur.

§. III.

Quando lac crassum & copiosum mali causam suppediat, infans pauciori lacte alendus, & talia nutrimenta præbenda sunt, quæ illud fluidius & serosius efficiunt. Sæpe etiam in tali statu ventriculus à lacte stagnante & coagulato multum est infarctus; ubi sæpe lenè emeticum extra paroxysmum oblatum prodest, quod ex tertia vel quarta parte unius grani tartari emetici cum syrupo violarum & aqua quadam destillata remixti componi potest.

§. IV.

Meconium primis mensibus non rite expurgatum, & subsistendo acris factum, quando anam malo porrigit, debet illud lenioribus laxantibus cum absorbentibus junctis evacuari, maxime vero per electuarium, ex syrupo cichorei cum rhabarbato, extracto rhei, lapidibus cancrorum & pulvere Marchionis compositum. Vermes contra per remedia ipsa accommodata sunt intericiendi & expellendi.

§. V.

Si quando epilepticum malum ex repressio- ne scabiei, cinæ capitis, vel aliorum exanthematum subortitur; ea debent propinari, quæ materiam impuram ad habitum corporis revocandi virtute pollent; imprimis autem vesicatoria nuchæ applicata in tali casu sæpe usum præstirisse novimus. Atque hoc etiam experientia FERNELII videtur confirmatum, qui multos epilepticos per fonticulos & fistulas curatos refert.

§. VI.

Solent nonnulli, nec adeo incelebres Medici ad sedandos vehementissimos solidorum motus interdum opiata, ut massam pilularum de cynoglossa, theriacam coelestem atque alia commendare; sed sæpe insaufum inde vidi effectum; Quare cum hîcse cautissime mercandum esse censeo; quod idem valet de volatilibus, quæ etiam extrinsecus adhibita sæpe sæpius nocent. Ceterum plura ad curationem pertinentia ex parte III. Tom. IV. Medicinæ systematicæ hac possunt referri.

CAPUT VIII.

De tabe seu atrophia infantum.

§. I.

INTER morbos infantibus familiares non infimum tenet locum tabes, quæ est paulatina universi corporis consuetudo cum abdominis inflatione & insigni functionum lesione plerumque conjuncta.

§. II.

—diffinitio.

Incipiente malo artus tam inferiores quam superiores incipiunt flaccescere & marcescere, abdomen vero distendi; adest spiratio difficilior, lassitudo corporis, alvus modo strictior modo solutior, appetitus vagus, cibis maxime frigidis datus: incretente malo facies propter tempora collapsa est, adipectus misera & pallida, palpebre post fomum tument, costae protuberant, caput alarum inflat prominere, cibi plerumque semidigesti excreantur, & dolores circa umbilici regionem lancinantes saepe percipiuntur; urina mingitur crassa modo, modo rubicunda; fomus est turbulentus & circa noctem lentus calor cum oris siccitate & siti accedit.

§. III.

—differentia ad alios morbos.

Minime vero hic noster adfectus debet confundi cum gracilitate corporis quae macilentia, quae a pinguedinis defectu vel ejusdem propter varias causas consumptione oriunda saepe unam tantum alteramve partem occupat, neque tamen totius corporis functiones laedit. Tum quoque probe debet discerni à rachitide, in qua partes quidem nonnullae contabescunt, sed artus simul tumore, contractura & incurvatione deformantur. Neque minor cautio adhibenda est, ne talem cum primarium adfectum, pro illa tabescentia habeamus, quae cum symptomata aliis morbis, ut febribus, variolis, morbillis, diarrhoeis, lumbricis &c. supervenit. Tandem vera tabes minime est communis cum marcore, qui à defectu lactis dependet; facileque cognoscitur Joseph ex nutricis uteribus, si flaccida sunt & lactis omnino egera, si ipsae nutrices non bene appetunt, si infantes parum mingunt, plorant, vagiunt, sique alimentum oblatum, conquiescunt, & inanimas cupidi arripiunt.

§. IV.

—sistis antea morbo.

Qui perunt hoc morbo, in horum sectione plerumque glandulae mesenterii tumefactae, scirrhusae, vel ipsi abscessus deprehenduntur; hepatis quoque & lien raro sine labe, infarctu & magnitudine aucta conspiciuntur: musculi, praefertim abdominalis tam externi sunt, ut vix membranam referant; intestina contra valde inflata, & amara foetida, quandoque nigra sunt referta.

§. V.

—causa proxima & mediana.

Causam hujus mali proximam in succi nutritii temperata & gelatinosi defectu, vel ejusdem insufficienti ad partes solidas appositione reponimus: mediatas vero causas in depravata alimentorum digestionem, chylo impuro & crasso, indeque denegato per vala lactea ad ductum thoracicum ipsiusque sanguinem transitum collocandas esse statuis. Quam maxime autem hoc loco accusari etiam debet bilis defectus, vel inertia à praeternaturali hepatis constitutione inducitur, ob quam non modo digestio valde laeditur, sed oscula quoque tanquam intestinum villosae minus rite à mucositate sua liberata chylum acrius recipiunt & transmittunt.

§. VI.

Causae remotae & occasionales iterum variae sunt; plerumque tamen oblitivivimus, post peripetis variis generis morbos, ut variolis, morbillis, motus ex dentitione difficili convulsivos, & alios, gravem hanc & chronicam passionem saepius fuisse subsecutam; praefertim quando convalescentes gula nimium indulgentes alimenta crassioris texturae, ut caseum, panem poti rite fermentatum, farinae, placenta, fructus quoque horarum, cibos acidos & vina acida adsumunt.

—causa remota fuit ex longinquitate.

§. VII.

Nihil vero, prout frequenter habemus experientia, magis nocet, quam si infantes calefacti & sudore madidi noctu frigidum potum saepius accipiant, vel à somno in lecto calentes in frigidiorem aulam transferuntur. A suppressa enim transpiratione & contractis extremorum subtilissimis tubulis non modo succus nutritius aliunde divertitur, & à peripheria ad centrum & inferiores partes reprimatur, verum etiam prava, salia & acri insuperie imbutur.

—refrigerantia.

§. VIII.

Neque cum clarissimo Dno CRUDEN dubitamus adferre, infantes, nisi bene fuerint loci & à sordibus suis mundati, ob pororum cum occlusionem, tabem posse incurere: qui vero ex omnia lotionem vermiculos in cute neonatorum generari statuit, quos comedones *Miesler* vocant, magnamque boni nutrimenti partem subtrahere credunt, hi me eo non adducere possunt, ut ipsis fidem penitus tribuam, quia novam hanc additionem sufficienti experientia nondum satis habeo consummatam.

—fodina.

§. IX.

Neque inficiandum, ex praepostero medicamento, praefertim terreo, absorbentium & adstringentium, in diarrhoeis, febribus intermittentibus, torminibus, variolis &c. usu tabidos ejusmodi adfectus infantibus posse accidere. Nam tellantur, qui corpora hoc morbo defunctorum anatomice dissecuere, se tum in ventriculo, tum in adnexis intestinis tenuibus crusta quasdam solidescens materie invenisse, quam vix ab horum substantia divellere poterant: quod indicio est, non modo liquoris gultui separationem inde fuisse prohibitam, sed chyli quoque colaturam, osculis lacteonum oculis, retardatam.

—diagnostica.

§. X.

Tabes quoque recte statuitur scorbutica, si à parentibus impura humorum dyscrasia laborantibus progeniatur, vel à nutriticibus morbidis vel cachexia & alio scorbutico affectu aegrotantibus lactantur. Saepem etiam veneri quidam complicatum est, unde atrophía tanquam effectus à causa dependit.

—diagnostica à parentibus & nutriticibus accipienda.

§. XI.

Saepe etiam vermes, intestinorum volumini insidulantes, atrophiae causam constituunt, qui non

—vermes.

non modo partem alimentorum & chyli optimam præcipiunt, sed pravus quoque exhalationibus ipsium inibunt. Notabile sane exemplum A. N. C. vol. III. append. p. 161. de puero atrophico defuncto & dissecto referunt, in cujus intestinis plures vernium nodi, alii majores, alii minores, interiori tunica villosa tam firmiter adherere visi sunt, ut cum eadem veluti concreta conficerentur, nec sine læsione ipsius tunice separari poterint.

§. XII.

Non raro quoque infantes antea sani, & per omnia recte valentes aliquæ aliquæ prægræta manifesta causa languere, corporeque extenuari incipiunt. Atqui hoc patitur, quando à lacte matris vel nutritis ad solidiorem deferuntur cibum; cumque jam antea bene pedibus insisteret, suæque corporis molem sustentare valuerunt, nunc minus possunt consistere, & terram attingere detrahant; sed mox genua morbi indoles clarius se manifestant, quando penduli artus in sensus incurunt, habitusque corporis flaccidus & rugosus fit, ut in natibus maxime & femoribus conspicitur. Interea cibos sic laborantes continuo ingerunt, ut vix saturari possint.

§. XIII.

Nihil magis solenne & inter vulgus receptum est, quam, ut plurimi, adeoque etiam ex Medicis nonnulli, diutius perseverante hoc malo, causam in fascinationes rejiciant. At vero, sicut hæc ludæra & inanis excusatio non obscure indicat, hos homines, qui ad tam absurdum ignorantiæ alyum confugiunt, nec genuinas morbi causas cognoscere, nec commodis posse remedia eisdem abigere; ita nos hanc judicandam rationem ineptam & Medico philosopho indignam merito rejicimus.

§. XIV.

Quando ab imprudenti adstringentium, vel nimio salinorum usu malum originem suam repetit, longum ut plurimum temporis ad curationem requirit, remediisque relaxantibus & humectantibus diutius debet insilire. Quod si vero abusus absorbenitum suos debet natales, & jam diu duravit, ut soliditatem quasi materia inefflorum parietibus obducta acquisiverit, spes salutis sæpe dubia est, & multi ante crassæ sublationem morte præcipiunt. Si diarrhoea jungitur, & materia purulenta, admodum foetida cum sanguine mixta, cum insigni corporis emaciatione per anum exernitur, atque corpus insuper valde emaciatur est, malum difficili aut nullo plane negotio potest tolli; siquidem continuus alvi fluxus reliquas adhuc vires consumit, & materię spurciæ jam corruptionem in abdomine indicat, quam mors sæpe satis cito excipit. Quando inveteratum est malum, & viscera nobiliora, ut hepatis, lien, pancreas, mesenterium, renes atque pulmones sunt infarcti, vel prorsus scirrholi, tunc curationi vix superest locus: & si demum infarctus vel scirrhus in cauterationem abeunte febris supervenit hectica, quam ex urina flammea & rubicunda, crebriori actu ac phlogosibus post cibum maxime auctis cognoscere solet, tunc ægri certius citiusque succubunt. Denique tabem non

adeo inveteratam, aut nimio viscerum infarctu minus sustentatam per febres intermittentes sæpe feliciter sublatam observationes testantur. Res autem in vado est, & convalescentiæ spes affulget, si coctione ciborum emendata appetitus magis constans & regularis redit, tunc ab dominis decrescit, & vires antea deprecie cum animi vigore recolliguntur.

CURATIO CUM CAUTELIS.

§. I.

Curatio multum pro differentia causarum differre solet; generatim tamen in ablatis eo maxime respiciendum est, ut ejus generis cibi suppeditentur, qui corpusculo languido paritibusque emacidis nutrimentum & robur addunt. Egregia hunc in finem sunt juscula, ex conquisitis gallinis & caponibus suæ pinguedine & evidenti saliditate parata, item pulmenta, ex pomis Borifoeffianis cum visello ovorum & saccharo confecta, quibus cinamomi, macis & vini pauxillum addi potest.

§. II.

Quando oscula vasorum lacteorum & ductus glandularum mesentericarum ab amara tenaci obftructione patiuntur, brodia gallinæ veteris cum radice graminis recentis, formiculi, petroselinii, asparagi, fellerie &c. decocta, pinguedine remota, sunt omnium utilissima, quibus in refracta dosi spiritus nitri dulcis, vel vitrioli martis aliquot guttae, vel solutio oculorum cæcæ addantur. Sed debet hoc alimentum medicamento sum ad aliquot dies, imo septimanas continuari, ita ut singulis quatuor horis elapsis, tres vel quatuor ejus uncie ad sorbendum offerantur.

§. III.

Inter hæc medicamenta magnæ in hoc morbo efficaciæ deopplativa præcipuum etiam locum tenent liquores salini medice nature, si v. g. ex solutione oculorum cancri cum succo cimi, ex terra foliata tartari, & tartaro vitriolato in aqua petroselinii vel formiculi solutis parantur, debitaque dosi aliquoties de die offeruntur; à quibus remediis summam & mirabilem sæpe energiam expertus sum.

§. IV.

Ad laudabilem alimentorum digestionem promovendam, præsertim ubi bilis balsamica deficit, & acidum cum viscido prædominatur, elixir nostrum balsamicum temperatum inter cibos summum laudatissimum præstat effectum. Ubi vero tormina, dolores, inquietudines &c. complicantur, liquore nostro anodynus mineralis, cum solutione salis tartari tenuiori mixtus, & per intervalla oblatum, remedium præbet optatissimi effectus.

§. V.

Quando ab obftructione & infarctibus tubulis subcutaneis, seu transpiratione prohibita, malum dependet, balnea ex radice altheæ, filicis, betibis malvæ, meliloti, floribus chamomillæ &c. sapore Veneto, addita lactis portione, parata

Curatio per dietam.

— ubi ab obftructione.

Que amplius offeruntur.

— a perniciosa diarrhoea & emaciatione debilitata.

— a transpiratione prohibita.

piæstantissimam opem exerunt; modo non nimis calida adhibeantur. Namque observatum sæpius est; balnea iteratis vicibus primo post partum mense adhibita insigni præservandi energiae polleere.

§. VI.

Uti ex-
ternorum.

Externe, ad discutendum tumorem, oleum chamæmillæ & anethi coctum moderate camphoratum sua laude non caret: licet etiam alia pætorica hic commodum inveniantur locum.

CAUTELÆ.

§. I.

Caute
circa
dum
bucum.

Ex impuro scorbutico lacte si ortum traxerit ejusmodi tabes, nutritæ est removenda, & serum lactis dulce, vel etiam lac asinum cum aliquot guttulis olei tartari per deliquium ostendendum. Jungenda quoque sunt insula diluentia theiformia, ex veronica, hederæ terrestris, radice glycyrrhizæ, cichorei & similibus, quibus inter usum liquor quidam asperitius, ex solutione salis tartari & arcani duplicati paratus non adeo magna dosi poterit infillari. Quo sine etiam in ablatis loco cerevisiæ semper alius diluens potus est substituendus, ipsique simuliter oleum tartari per deliquium infillandum.

§. II.

— circa
— bene a
— mure
— abster
— beantur
— nia.

Si à nimio absorbentium usu adflectio suboritur, insula diluentia, junctis laxantibus ex mamma, rhabarbaro, syrupo cichorei cum rhabarbaro & similibus proficua erunt. Neque etiam minus interdum ventriculum a sordibus viscidis per pulverem iros Florentinæ in paulo majori dosi exhibitum deplere juvabit.

§. III.

— circa
— purgan-

Purgantia adflectum hunc magis exasperant, & ad hæcicam disponent, præteritum si subiecta sint sensibilia. Nam sæpe inde inflammatur ventriculus cum intestinis & post sequitur mors.

CAPUT IX.

De Rachitide.

§. I.

Rachitide
describitur.

Explicata jam tabe universali, progredimur ad particularem, quæ rachitis appellatur, & non nisi inæqualis nutritio est, quæ partes alia debito suo nutrimento orbate convalescent; alia plus jussu nutritæ augmentum recipiunt, & cum ossium spinæque dorso incurvatione majores fiunt.

§. II.

— Rachitis
— & de cur-
— sit.

Novum est morbi genus, & vix sæculo prioribus ad exitum propente in Angliā obnotum; posthinc vero per reliquas Europæ regiones septentrionem spectantes disseminatum, quod his maxime signis se manifestat. Accedente malo circa mentem ætatis novum, aut serius adhuc, sensum paulatimque irregularis fit plurimarum corporis partium proportio, cutis la-

xa, abdomen macrum, & quasi statibus turgidum; musculi atrophiam consumentur, juncturarum contra articuli in brachio, manibus, genu & pedibus protuberant; ossa ad sustinendum corpus minus firma & cum spina dorso sæpe incurvata observantur: unde motus & ingressus debilis, qui sæpe in movendi impotentiam terminatur. Tum quoque arteriæ jugulares & carotides intumescunt, caput est magnum, & ob colli sustentantis flacciditatem sæpe nutans, facies vivida, ingenium supra ætatem acutum; pectus vero angustum & a lateribus quasi compressum; cum sterno acuminato & extremis costarum nodosis. Invalescente demum malo jungitur febricula lenta, tussis, respirandi difficultas & alia, quæ plerumque ad mortem perdurant. Sed probe omnino tenendum est, quod certi denur rachitidis gradus & durationis modi, qui non eadem in omnibus symptomata, sed in nonnullis graviora, in nonnullis leviora producant.

§. III.

Qui hoc morbo defunctorum dissectuerunt corpora, aliud atque aliud viscus vitale labe corruptum invenerunt; siquidem alii hepar naturale grandius, scirrholium & diaphragmati coalitum, mesenterium glandulis induratis oblitum, & cum pancreate obstructum; alii pulmones pleuræ vel tergo adnatos, eosque vel lividos, vel vomitis repletos; alii pericardium aqua repletum se reperitæ testantur. Plerique tamen, inter quos tolerabilissimos corporum scrutatores GLISSONIUM, BOSETUM & inter recentiores celeb. HEISTERUM referimus, unanimi fere consensu asserunt; principium medullæ spinalis in hoc morbo solito esse durius & obstructum, caput inter duram piamque matrem aqua persusum, cerebrum mole majus, venas vero carotides & jugulares arterias maiores.

§. IV.

Quod si igitur his viris laude dignis fidem adjungere, nosstramque ipsius experientiam interponere licet; non possumus non causam hujus diri adfectus proximam in impedito succi nervi in spinalem medullam vel compressam vel obstructam influxum reponere; unde necessario eam partium omnium, ut brachiorum, pedum &c. perit nutritio, quæ nervos ex spinali medulla recipiunt: contra vero illæ plus nutriantur, quæ vias habent apertas & sufficientem succi nutritii admittunt copiam, sicut, teste anatomica experientia, in capite rachiticorum conspicimus, quod ob denegatum lymphæ nutritiæ in medullam spinalem influxum, plus nutrimenti accipit, atque ideo non solum in majorem molem excrescit, sed & faciem bene coloratam exhibet. Neque aliunde derivandum est vividum ingenii acumen, quam à cerebro & cerebello illari, necque suis nutritis surgente; quare etiam partes, ad quas nervi inde abeunt, plerumque recte solent esse constitutæ.

§. V.

Facile quoque patet, cur ossa incurvantur & circa epiphytes nodis deformentur. Nam quia musculi eorumque ligamenta, quibus ossibus annecti solent, minus rite in hoc adfectu nutriuntur.

Rachitis
describitur.

nutriuntur, sed alimentum copiosius per arterias ad ossa devehitur; fieri solet, ut eorum extrema, quae in infantibus mollioris plerumque texture sunt, ob minorem resistentiam distendantur, & tubercula accipiant. Quoniam vero, perseverante hac nutritione, ossa perpetuo incrementum, & musculi cetera minores, brevioresque sunt; facile omnino ipsa ossium extensio à multis alligatis retardatur, & incurvatio contingit; idque eo magis, cum ossa in hac ætate admodum sunt mollia & flexibilia. Nec denique distortio spinæ dorsæ aliam agnoscat causam, quam processuum ossicorum, cartilagineum, ligamentorum & musculorum vertebrae dorsæ connectentium flacciditatem, totumque naturalem depravatum: quo præsentem hæ partes sub corporis inclinatione latius à se invicem secedunt magisque distendantur, quam iterum recedere, & in pristinam statum possunt reverti.

§. VI.

Causa morbi.

Causam hujus morbi medietatem constituit viscida succorum tenacitas, quæ à sanguine spisso segregati ad medullam spinalem deponuntur, ejusque meatus compungendo vel occludendo impediunt, quo minus liquidum nervorum tenuissimum in spinæ medullam rite possit influere, & abhinc per nervos amplius dispensari.

§. VII.

Causa morbi sunt diætae errores.

Ex causis vero remotioribus ad humores inspissandos ex diæte vitio hoc fire conferunt omnia, quæ inter causas atrophicæ in priori capite à nobis sunt relata. Quæcumque enim digestionis negotium turbant, chylumque crassum, viscidum & ad nutritionem ineptum ingenerant, ea quoque, suffragante experientia, huic nostro adfectui velascuntur.

§. VIII.

Quædam sunt causas morbi.

Si quid autem speciatim ad ingenerandum hoc malum potens existit, est profecto aer, qui teneros ambit, frigidus, nebulosus, variisque exhalationibus peregrinis rebus, qui partem earum tonum debilitando, sordes pituitosas in corpore retinet, partim pulmones relaxando impedit, quo minus in hoc viscere intima sanguinis mixtio, ejusque per totum corpus distributio rite possit succedere. Luculentum hujus rei testimonium illustre totius Angliæ emporium exhibet Londinum, quod non tantum propter maris circumfluentis exhalationes, sed etiam propter minerales quasdam ex carbonibus fossilibus emissas particulas imprimis rachitidi producendæ & sustentandæ idoneumprehenditur. Neque ideo mirum esse debet, cur ex eadem causa in locis paludosa & maritimis, itemque vere & autumnis frequentior hujus mali sit proveniens; & cur hic Halæ, quæ tam ob Salæ præterlabentis & salinarum effluvia, quam ob sulphureum carbonum fossilium fumum atmosphaera valde humida cingitur, pueri rachitici se nobis crebrius sanandos offerant.

§. IX.

Neque dubitarem adferere, quod ad faciliorem humorum in medulla spinali stagnationem

multum contribuat prava quarundam muliercularum consuetudo, quæ infantes pallo involutos sepe diu nocturne brachiis gestant, & non modo spinam dorsæ in situ incurvato diutius retinent, sed pedes etiam inæqualiter flectunt; unde non tantum gibbera & pedes vari prodantur, sed & nostro morbo occasio datur apertissima. Quod similiter fieri deprehendimus, quando teneri ex improvido ictu & lapsu vim quandam externam spinæque torsionem patiuntur; unde etiam gibbosi facile sunt rachitici.

§. X.

Morbos quoque prægressos ad tabem non minus quam & rachitidem disponere, nihil dubii est; ex omnibus tamen hi præcipue hoc concurrunt, qui humorum ad medullam spinalem decubitus efficiendo, liberum fluidi tenuissimum retinereque suspendere valent. Ita in atis exercitio non raro solet occurrere, quod hanc ob causam post variolas, non rite tractatas, item post scabiem crustasque lacteam & capitis tinea retropullam dicitur hic adfectus originem receperit.

§. XI.

Morbis invalescens si super quintum ætatis annum aut diutius inherat, difficulter curatur, & corpus plerumque languidum ac deforme juveni tradit, & nisi accedentibus juvenis annis, ubi totum corpus maximam patitur mutationem, penitus tollatur, per totam vitam nullam sanationis spem admittit. Nec minorem habet difficultatem sanatio, si per hæreditariam dispositionem morbus fuit inductus, aut mox primis à nativitate mensibus oboritur. Denique, si phthisis cum hectica febre, hydropicus tumor, asthma vel diarrhoea superveniunt, spes in angusto est posita. Quæ vero ab aeris, aut vitæ vitio oritur rachitis, aut variola, scabies, aliaque cutis efflorescentiæ subsiquas habet, nec cum tanta ossium spinæque dorsæ incurvatione & motus impotentia conjungitur, faciliorem recipit medelam.

CURATIO.

§. I.

Quum humores viscidos, lentos & pituitosos, ad spinalem medullam depositi causam & fontem rachitidi præbeant, primo omnium eo respiciendum est, ut lentor succorum resolvatur, obstructions referantur, & liber fluidiorum motus per totum corpus promovatur. Quo fine primario, ad fontem mali, qui in primis visceribus residet, præsciendum, consensum leniora laxantia, non omittis, si opus est, nec tenera infantum constitutio obstat, lenioribus emeticis, ex radicis ipecacuanhæ aliquot granis, cum saccharo & aqua cinamomi sine vino datis, aut cum syrupo quodam in electuario redactis, vel etiam cum aqua calida infusis & oblatis: Si quidem hac ratione non modo sordes viscidæ, in ventriculo & intestinis collectæ, perbellè educuntur, sed etiam, addito hoc stimulo, debita humorum resolutio & tubulorum obstructorum refluxio egregie obtinetur; si modo caveatur, ne talia stimulantia in subjectis jam valde exhaustis, & magna viscerum labe, vel pertinaci mesenterii obstructione laborantibus adhibeantur; quia tum

— morbi prægressi

Prægressi.

Caveamus larvae & emetice lavare.

tum potius ea commendare expedit, quæ nos inter medicamenta deoppliativa & referantia in superiori capite de atrophis retulimus.

§. II.

-- per reser-
vament.

Hactenus dictis commodè possunt interponi alia leniter resolventia, ut fere sunt diaphoretica, tinctura tartari tartarifata antimonii acis, arcum tartari liquidum & cinnabarina, mercurialibus in hoc casu anteposenda, quæ partim per cutim, partim per urinam serofas impuritates evehunt, egregie se gerunt; maxime si cum infusus sanguinem diluentibus & purificantibus adhibeantur.

§. III.

-- per reser-
vament.

Specialim vero ad obstructionem medullæ spinalis referendum & liberum fluidi nervi influum restituendum, à variis auctoribus frictions cum lineis calidis in spina dorsi, brachijs, & pedibus una cum suffragiis ex thure, succino, musliche, olivano &c. insituntur commendantur. Si quid vero, mea ipsius experientia, commendationem meretur, sunt profecto balnea aque dulcis, cum herbis nervinis, majorana, floribus lavendula, chamomilla, ronismarini, serpilli, melisse &c. decoctis; quibus, si laborantes crebrius immittantur, & postea linimenta nervina, ex axungia humanæ, olei nucistæ expressi ana uncia dimidia, balsami Peruviani drachma una, olei rutæ, lavendula, caryophyllorum ana guttis xxx. composita. una cum frictionibus spinæ dorsi & artuum adhibeantur, sæpe tam exoptatus sequitur effectus, ut ego plures inde viderim mirum sublevatos, & tandem, cæteris paribus, ex voto restitutos.

§. IV.

-- per dia-
retica.

Ante omnia vero simul conjungendum accommodatum vitæ victulque regimen, quod in eo consistit, ut parci, remotis omnibus flatulentis, concoctis difficilibus, & viscidis, crebrius julecula gallinarum & vitulorum tenuis cum radiabus aperientibus ajuragi, feniculi, cichorei, apii, sellerie, petroselinæ & cancris fluviatilibus confutis decoctis assument, & ventriculi roborandi gratia temperata elixiria stomachica, ut nostrum viscerale est, inter cibos capiant. Tum quoque potus ossifatur tenuis, & durante lactatione lac bonum sansique dilatum, conjuncto simul conveniente & ætati accommodato motu, quasi vectura est, ut corpus segne paulum modo excitetur. Alvi liberus sit dehis. leni promoveatur laxante vel clystere. Et si denum prava nutritici dispositio malum vel induxerit, vel fuisset, huic similiter ea exhibeantur medicamenta, quæ infans in minori dosi propinanda commendavimus.

§. V.

-- per lig-
nula.

Nec denique reticendum est, ad spinam dorsi incurvatam & membra diversimode distorta commendabilem esse ligaculorum & thoracum applicationem, si modo caveatur, ne loco auxilii vim inferamus, & infans ex uno vitio in alterum sæpe gravius præcipitemur.

CAPUT X.

De Vermibus.

§. I.

Vermes sunt animalcula viva, varis figuræ, structuræ, & magnitudinis, quæ ex femi-
nio seu ovulo insecti cujaldam cum alimentis
addum. in cavo intestinorum nascuntur, & pu-
trilo quodam corrupto succo incrementum, corpo-
risque universi functiones mirum in modum la-
bescant & ledunt.

§. II.

Quamvis nulla hominum ætas ab exitialibus
hæce hospibus plane sit libera, maxime omnium
tamen infansilis & puerilis, hoc est ab abla-
tione ad decimum quartum annum illiæm obno-
xia est; quapropter etiam inter morbos infantiles
de lumbricis tractatio præcipue meretur insinua-
re.

§. III.

Varis lumbricorum species, ipsa experientia
teste, in corpore humano observantur, quæ po-
tissimum à Medicis tam veteribus, quam recen-
tioribus in numero tres distinguntur. Primo è
offertur rotundi, qui etiam tætes, Germanis
spublerer vocantur, & magnitudine, quæ
vix spithamæ æquat, ab alijs se distinguunt,
maximeque sedem suam in tenuibus superioribus
jejuni & ilei occupant; unde interdum ad ven-
triculæ progressu oretenus producant, vel vomitu
ejiciuntur. Atque hi fere sunt, qui teste HIL-
DANO cap. I. obs. 57. pueris maxime innascuntur,
& magno nonnumquam numero in globum qua-
si conglomerati ilco firmiter inhiænt, cujus
membrana per sæpe ore suo acuto perrodant, at-
que rependo in abdominis cavitatem penetrant.

§. IV.

Altera vermium species est eorum, qui ob fi-
guram suam, insiar fasciarum latum, lati & ten-
næ appellantur, admodumque longi sunt, &
duos, imo decem interdum pedes mensura ex-
cedant, & a PLATERO in adultioribus quad-
ginta pedes longi observati sint. vid. M. N. 1.
anne III. obs. 29. BARTHOLOMÆUS Hist. nat.
tem. Cent. III. obs. 14. Hi plerumque totum in-
testinorum tractum, præcipue vero ileon, occu-
pant, & non raro sine cauda & capite conspicui-
tur; siquidem non toti, sed frustulata per me-
menta, cucurbitæ vel cucumerum semen re-
ferentia, prodire solent, quæ interpretante SPI-
GELIO cap. XV. nihil aliud sunt, quam nodus
lumbricorum medius crassius, à lateralibus &
membranaceis suis appendicibus, putredine jam
absumtis superfluis.

§. V.

Tertiam lumbricorum speciem constituunt as-
carides, seu vermes parvi, exigui, graciles, Ger-
manice Maden, qui intestinis crassis maximeque
recto innidulant, hoc plerumque graviter cum
tinefio & molestia ad defendendum stimulo ro-
dunt,

dunt, vellicant, & incredibili saepe copia cum excrementis exeunt.

§. VI.

— *Agm*

Vermium in intestinis praesentia cognoscitur, si pueri in somno pavent, & excitati ab eo trepidant, si narium aditus pruritus, oris fetor, sitis, salivae fluxus, facies intercurrentibus phlogosis pallida, extremorum frigus, urina turbida, ventris inflatio, appetitus modo nimius, modo dejectus, irregularis alvi apertura & similia. Verum enim vero, cum signa haec non recondita aliis etiam morbis sint communia: nullum sane melius nullumque certius datur criterium, ac si vermes ipsi per alvum prodeuntes sui praesentiam indicant.

§. VII.

— *symptomata*

Symptomata verminosis familiaria pro ratione partium, ubi sedem peregrini holsperites obtinent, admodum plerumque variant; saepe tamen gravissima sunt: siquidem nonnunquam tam horrendae animae convulsiones excitantur, ut incantamenti suspicio non raro plebeis incutitur. Potissimum vero, si in ventriculo resident, nauseam, cardiacam, syncopen, corporis jectigationes, dentium fridorem, deliria, imo mortem denique ipsam inferunt: in intestinis tenuibus tormina, morfus circa umbilicum, faemem carinam, ventris intumesceniam, & alvi fluxus concitant; in intestino autem recto molestas titillationes, rosiones, fereque perpetuum tenebrum efficiunt.

§. VIII.

— *Morbi quibus junguntur*

Vermibus saepe junguntur febres putridae, anomales, lentae, quotidianis funiles: saepius autem infesta haec animalcula aliis se morbis, ut variolis & morbillis, immiscunt, vel hislem supervehiunt, & non tantum symptomata valde augent magnamque virum decrementum adferunt, sed indicia quoque diagnostica & prognostica, imo ipsam curandi methodum valde reddunt difficilem.

§. IX.

— *Vermium generatio- nis favent certa aetate & tempera & subje- ctis.*

Certis anni temporibus, praesertim autumno, quando sub valde humida & inaequali aeris temperie, febres catarrhales, variolae & morbilli epidemice grassantur, copiosior vermium solet esse proventus, non aliam ob rationem, quam quod tunc temporis humana corpora, ob labefactum solidorum robur, plus humiditatis inertis, viscidae & ad corruptionem pronae accumulant, unde seminum illud verminosum plus alimenti & sustentationis recipit. Ex inde quoque ratio petenda, cur infantes, pueri & seniores sexus, si praesertim vita sedentaria & prava diastae ratio accedunt, frequentius graviusque vermibus & inde oriundis morbis laborent, quam quidem juvenes, aetate provectiores & sexus nobilioris homines, qui majori solidorum robore, circuloque sanguinis vegetiore praediti non tam facile succos inertes & viscidos alunt.

§. X.

— *omni alimentis.*

Ex omnibus vero causis certa quaedam alimeta lumbricorum generationi favent, ut fere sunt ea, quae parum copiam succorum pituitosi-

forum & inertium ingenerant, parim infectorum ovula & semina secum recondita in corpus invehant; quorum pertinent laetitia, caries, fructus horati, panificia cum melle & saccharo condita, legumina, fumiacea, & hujus cetera alia, quae praeter ceteris intus nociva infectorum ovula continent, sine quibus nulla fit in rerum natura animalculorum progesis.

§. XI.

Comprobant hoc optime experimenta à *Francisco RHEZI & MALPIGHIO* soleriter instituta, qui laudatissimi viri media quondam efflate res putredini subjectas, ut pisces & carnes, diversis lagenis, quarum altera fortiter clausa, altera aperta servabantur, immiscunt, & praeterea non ita longo temporis spatio in eo vase, cujus orificium infectis & muscas patulum relictum erat, contentas res vermibus valde facientes invenimus: in ea vero lagena, quae clausa erat, ne unicum quidem vermem observavimus. Similiter quoque *MALPIGHIUS* commemorat, se saepius carni frustula humo sepelivisse, in quibus tamen nunquam, licet per longum tempus in terra condita fuissent, animalcula deprehendisset. Quae si ita sunt, ut nullus dubito, in agro jam posita videtur ratio, cur infantes solo lacte victitantes non prius lumbricis tententur, quam si demum alia edulia, verminoso semine foetida, accipiant.

— *Quid em- piam.*

§. XII.

Pro diversitate corporum magis vel minus valentium & sensibilibus, item pro diversitate materiae corruptae & vermium indole, ipsa quoque differunt symptomata supra §. VII. enumerata. Saepius tamen iterumque annotare mihi licuit, quod, si exanthematicis febribus, ut purpura, variolis, morbillis &c. se vermes immiscunt, placidus horum morborum decursus valde plerumque perturbatur, & praeter extremorum frigus, pulsus inaequalis ac debiles, animique deliquia, non saepe ipsa accerantur: quod tamen in pueris crebrius, in aetate provectis rarius contingit. Lumbrici variegati coloris, rotundi, nunquam fere non deterioris sunt notae; siquidem ad ventriculum saepe adscendunt, ejusque orificia lacinando, & interdum perforando, epilepticas convulsiones, suffocationis periculum, imo mortem repentinam inferunt. Tenuis, sive longi longiores inducunt morbos, & quandoque nondum cogniti vita privant. Ascarides minus periculosi alunt, quia in intestinis crassioribus, sensu non adeo acuto praeditis, residentes rosionibus suis minus nocere valent.

— *Progresu.*

§. XIII.

Circa meridiem & vespere plerumque acerbiora observantur verminosorum symptomata; quoniam tum temporis animalcula nervosum intestinum causalem à cibis vacuum morficando fortius adgrediuntur. Vermes momui si deiciuntur, ob lummam, quam arguunt, putredinem, periculum potendant; nisi forte a daris medicamentis fuerint enecati & expulsi. Ex ore prorepentes lumbrici in morbis gravioribus morinosos indicant egrotantes; maxime si saepeus & frigidus adfit anhelitus: neque tamen omnino mortem semper praenunciant, quia varia testantur

— *Ultimae Progresu.*

tur exempla, omnis generis febres expulsiōne vermium fuisse solutas. Quam in rem legi meretur M. N. C. *Vol. III. in append. obs. IV. p. 163.* ubi febris tertiana & continua pluribus expulsis ceteris vermibus sanata legitur.

C U R A T I O.

§. I.

*fluvi-
tina.*

Quamvis in ingenti vitæ discrimine infantes verminosi versentur, nunquam tamen desperandum est, quodcumque pro diversitate symptomatum, naturarum & rerum circumstantiarum debito tempore & ordine commoda adhibeantur remedia. Jam vero in nullo fere morbo tam diversa & activæ in solis medicamenta a Medicis laudantur & applicantur, quam in morbis, ubi vermes vel sunt expellendi, vel enecandi; quare operæ pretium fore confido, si in præsentis de anthelminticorum natura, virtute & usu sollicitus, breviter demonstrarem, quæ in iis exhibendis à Medico prudentia & circumspèctio sit adhibenda.

§. II.

*Anthel-
mintici
accrescendo
decidit.*

Primo autem omnium inter remedia vermibus & morbis inde oriundis dicata referri solent acida, qualia sunt succus citri, aurantiorum, limonium, ribium, berberum, granatorum, phlegma & spiritus vitrioli, cremor tartari, vinum, præsertim acidulum Rhenanum, ipsumque tandem acetum. Quæ si quæla profecto eo tempore, ubi æstus & calor præternaturalis jungitur, & febiles complicantur mores, commode locum inveniunt: siquidem non modo æstum egregie temperant, sed putredinem quoque, quæ semper fere comitatur, mirifice resiliunt, & periculosam symptomatum malignitatem avertunt.

§. III.

— acutis

Anthelmintici quoque remediis amara, ut absinthium, centaureum minus, scordium, trifolium fibrinum, ruta, & multo adhuc magis, quæ simul purgante facultate polleant, ut aloë, rhabarbarum, colocynthis, & parati ex ipsa trochisci alihanda. &c. accensentur. Licet vero hæc remedia vermibus non penitus sint adversa, dum non modo in rhabarbaro, & absinthio, sed in ipsa quoque vesica fellea, *teste HILDANO cm. I. obs. 160.* vermiculi proveniunt; minime tamen negari potest, quin amara insignem contra hæc animalcula præstent effectum: quia partim materiam erudam & viscidam, qua nutriuntur, vi sua balsamica corrumpunt, & fibras intestinorum stimulando corruptos humores una cum verminosa colluvie nonnquam evehunt, partim vero bilis inertiam, quæ sæpe causam vermium medietatem constituit, in pueris & subjectis humilioribus emendant.

§. IV.

— alijs

Tum quoque oleosis magna tribuitur efficacia, quæ maxime experimento *Francisci RHEDI* videtur confirmata, dum ille truscas & alia insecta variis liquoribus immersa in vivis permansisse refert, exceptis oleo peruviano & insulis, quæ invicem mortua vitam non receperunt, licet radiis solaribus fuerint exposita. Equidem libenter concedo, hæc omnia veritati esse con-

sona, atque etiam oleosa, ut oleum olivæ, raparum & amygdalarum dulcium, non sine fructu adhiberi: sed scire licet, minime illa eo unquam scopo posse offerri, ut vermes enecent, quia admodum magna oleorum copia requireretur, si immediate vermes, per totum intestinorum volumen dispersos, deberent exstinguere. Multo magis oleosa in gravibus à lumbricis symptomatibus ideo censentur utilia, quia sensibiles intestinorum tunicas ipsismo contractis relaxant, & mucilage quasi oblinunt aque descendunt, ut pollea aciora quædam & purgantia remedia magis secure & sine læsione exhiberi possint. Ita ego sæpius mirabili cum effectu, ad vermes enecandos & symptomata lenienda, oleum amygdalarum dulcium ad aliquot cochlearia, imo unciam unam vel duas circa lecti introitus, vel summo mane pueris præscriptis fumendum, subjungendo aliquot horas post pilulas ex extracto panchymagogo *Crollii*, resina jalappæ, & mercurio dulci paratas.

§. V.

Eximia etiam laude, ad exturbanda noxia hæc animalcula, celebrantur salina, tum quod tenerimæ horum animalculorum structura infesta sunt, tum etiam eorum exitum, intestina stimulando, promovent; idque eo magis, si io sufficiente aquæ quantitate fuerint soluta. Valet ita potissimum de salibus istis nervus generis amaris, & nominatim de sale Glauberi, Eptonienli, Seidlenli, Egranarum & Carolinarum aquarum, quæ cum vehiculo sufficienti sunt a continuato usu egregium præstent effectum; maxime si pueri & juvenes ea vermium specie, qui tanie & lati appellantur, laborant; quoniam hi non tam promptè purgantibus, quæ ipsismo agunt, quam potius per salia & fontes salinos facilius exterminantur. Quam ob rem non sine ratione soni Sedlicenli, qui sale amaro scatur, egregia vermes enecandi energia ascribitur, eisdemque virtus anthelmintica nostris salinis Halensibus à plebe tribuitur, quæ subinde largum salis potum pueris contra vermes propinare solet. Neque male sibi consulant populi maritimi, qui eadem intentione marinam potant, aut, si divites sunt, aquam ex ostreis recentibus, adjecto lunonum succo & capere, ebibunt, atque sic expulsis istis bestiolis à tabe aliisque pluribus morbis infantes liberantur felicissime. Ex quis denique aliis salibus, præsertim vitriolicis, sum in his morbis efficaciam antiquitus comprobant denegabit, cum per experientiam satis superque cognatum sit, aquas Pyrmontanas, quæ de sublimi martis vitriolo participant, adversus tanias vermesque turbatos seu ecurticinos tanto cum successu usurpari, ut ægri pluries instar incantamenti ab omnibus symptomatibus liberi evadant.

§. VI.

Si ullum morbi genus specifica, sive tollendo morbo appropriata admitti remedia, ea certe me iudice io vermibus enecandis & ex corpore eliminandis locum inveniunt. Quo nomine imprimis commendanda sunt ex gummosis alia fortida, opoponax, sagapenum, myrrha; ex herbis tanacetum, scordium, absinthium; ex radicibus bulbosæ ceparum & alli genera; ex fructibus amygdale amare & ex his elicium oleum

oleum expreffum; item ſemen fantonici, caſepui, camphora & ſimilia; quæ omnia ſulphureo illo graveolenti & ſpecifico, quem exhalaunt odore, vermes ſenſim paulatimque vita privant. Et proſpecto hæc tam neceſſaria ſunt, ut niſi convenienti doſi, aliis jam ſupra memoratis, fuerint admixta, vel combinata, rariffime optatus reſpondeat effectus.

§. VII.

Reſtat vero adhuc aliud non minoris energię ſpecificum ex minerali regno petitum. Eſt illud ipſum argentum vivum, quod peculiari quadam proprietate his animalculis adverſum vitalem uſtorum morum deſtruit; quamvis non tam accurate ex principis mechanicis hæc operandi ratio poſſit deduci. Hæcenus autem varii hoc anthelminticum propinandi innotuerant modi, quos pauci conſiderabimus. HELMONTIUS forſan primus fuit, qui experimentum cum cum hoc remedio inſtituit, dum illud aqua vel pura, vel quadam deſtillata decoxit, talemque aquam ſubtiliſſimis mercurii particulis imbutam maximo cum emolumento verminofis propinavit. HENRICUS MEIBOMIUS ſenior alium modum ſecutus, vinum Rhenanum argento vivo inſuſum per viginti quatuor horas ſine decoctione leni digeſſioni expoſuit, & poſtea præſentem adhuc effectum vidit. Chymica è contrario magis hæcenus placuit mercurius dulcis rite præparatus, quem, pro diverſa ſubjecti natura, ad aliquot grana cum purgante, v. g. ſcammonio ſulphurato, reſina jalapæ, extracto panchymagogi Croſſi &c. in pilulis non ſine laudatiſſimo effectû obtulerunt, vel etiam tandem muſco corallino mixtum cum & ſine purgante dederunt. Alii, ſecuriorem ingreſſi viam, adhiopem mineralem ex accurata mercurii vivi & ſulphuris mixtione, conſectum cum ſaccharo, ſicut HARRIS, utiliter propinaverunt. Nos denique ipſum argentum vivum bene deſuperatum cum ſaccharo cando in mortario exacte, miſcuimus, & præmiſſis præmittendis, ſub accuratiori diæta, longe efficaciſſe deprehendimus; maxime ſi poſtea ægri, ut præſervandi ſine commendavimus, à carne, piſcibus, lacticiis, dulcibus, caſeo aliſque nocivis abſtinerunt, & pro potu aquam puram, vel cum cornu cervi uſu decoctam, vel etiam ſeſternam ſubſtiterunt.

§. VIII.

Inter alia denique præparata multiplice experientia pilulis uſi humus ſequentibus: *Recipe aſe ſuſide, extracti rhabbarbari, tanacetii, aloë depurata, myrrhe electæ, mercurii dulcis ana ſcrupulum unum, extracti croci, caſtorei ana grana quatuor, M. ſ. ex ſcrupulo uno pilula numero XV. quibus pro ſubſellorum & atatis ratione ad numero V. VI. VIII. datis, plures vermibus miſcere veratrum ex voto ſanavimus.* Qui vero à pilulis abhorrent, eaſdem in ſyrupo capiant, vel etiam bis in die juſtam hujus medicamenti doſim ſumant: *Rec. liquoris terra ſolutoria, tartari ſocium ſemæ, extracti rhabbarbari, tanacetii, abſinthii ana drachmam dimidiam: M. D.* Nec denique minorem videtur effectum à ſequenti pulvere: *Rec. mechoacanthe albe, ſeminis fantonici, coralline, rhabbarbari, mercurii dulcis, ſcordii, cornu cervi uſi, niri purificati ana drachmam dimidiam, camphora gr. ſex. M. ſ. pulvis, qui pro ratione*

Frid. Hoffmanni Oper. Tom. III.

ætatis in varias doſes diſpenſandus, vel cum ſyrupo cichorei in electuarium reductus offerendus.

CAUTELÆ.

§. I.

Sed ut omnia recte adminiſtrentur, quoddam ſubjungere placet cautelas, quarum præcipua eſt, ut nunquam purgantia acriora, vel calidiora propinentur remedia, ſi febrilis calor ſubeſt, quoniam hoc inde facile augetur. Similiter quoque à mercurialibus, omnibus fortioribus abſtinentum eſt, quando duodenum acri, cauſtica bile ſcatet; ſiquidem inde ſymptomata non modo exacerbata, ſed inteſtinorum quoque inflammations accerſitas novimus.

*Conſilio
coco purgans
ſi
necesse
ſit.*

§. II.

Ad vermes ex tenuibus inteſtinis exturbandos prodeſt ante purgantium & ſpecificorum uſum clyſterem ex lacte & melle paratum ano inſundere, ut beſtiolæ iſtæ dulcedine allectæ ex loculis ſuis ad inteſtina facilius deſcendant.

*— circa
vermes
tenues
ſed
ſolent.*

§. III.

Aſcarides, ſi recto innidulantur, clyſteres detergentes lactei, quibus tanacetum, alium, vel ſcordii ſolia incocta ſunt, optimum præſtant effectum: quod ſimiliter etiam de illis valet, qui ex muria, cum marrubio, centaury minori & ſcordii decocta additoque electuario hæræ compoſito à nonnullis parari ſolent.

*— circa
aſcarides*

§. IV.

Neque minus tum temporis enemata commo- dum inveniunt locum, ſi, quando verminofa progenies poſt purgationem per alvum non ejicitur, quod ſæpius uſu venit, ſi in coco inteſtino nidum obtinet, quod purgans non valet attingere.

*— circa
vermes
post
purgationem
reſiſtunt.*

§. V.

Optime quoque dantur anthelmintica in electuario vel ſyrupo, qualis eſt cichorei cum rhabbarbo: quod optime norunt mulierculæ, quæ pueris verminofis ſemen fantonici ad ſcrupulum circiter unum cum melle ſubſectum ante luſæ vel increſcentis vel decreſcentis mutationes in lacte propinant; nec fine effectû, modo caveatur, ne ſemen illud ſit cariolum.

*— circa
anthelmintica
in electuario
ſyrupo.*

§. VI.

Non nunquam cum internis externæ utiliter poſſunt conjungi; quæ ſine laudem merentur emplaſtra vel epithemata epigaſtri & umbilici regioni applicanda, quæ ex abſinthio, ſelle tauri, aloë, colocynthide, ſucco centaury minoris & oleo ſorum ſpicæ conſtari poſſunt; quorſum etiam ſpectat unguentum de arthanita cum aliis.

*Extremum
notum.*

§. VII.

Si quid vero utile & imprimis neceſſarium datur monitum, eſt proſpecto hoc, quod cœcoridii loco adſcribere lubet, ut ſcilicet Medicus ante omnia vermium præſentiam certis ſignis habeat cognitam,

V u

nitam,

*— imprimis
mercurio
ſit.*

*— proſpecto
ſit.*

nitam, si remedia in vel enecandis vel exsili-
pandis apposita adhibere studeat; ne forsan, si
aegri ex alia causa, alioque morbo aegrotant,
plus noxae quam utilitatis adferat.

CAPUT XI.

De aliis infantum morbis.

§. I.

Aspirum Placet nunc pauca de adfectibus nonnullis
in uno capite collectionem sumis subjicere;
non quidem eo animo, ac si eosdem leviores
& speciales disquisitione indigere haberemus,
sed quia non tam longam & scrupulosam cau-
sationem evolutionem possunt, admodumque
pauca ex medendi methodo ad sanationem re-
quirunt, si modo recto tempore, ordine & de-
bito regimine adhibeantur.

§. II.

Cardialgia Primo loco se offert *cardialgia*, quae se ma-
signa. xime per insignes peccoris angustias cum respi-
randi difficultate junctas, per abdominis & pre-
cordiorum sub collis spuris inflationes, per in-
quietudines & saepe conjunctos ructus se mani-
festat; quibus etiam non raro febriculae & con-
vulsionum superveniunt.

§. III.

crassa Oritur hoc morbi genus a violenta & spasti-
ca ventriculi orificiorum strictura, & flatibus
inde inclusis, qui sensibiles ventriculi membra-
nas distendendo, summam anxietatem, inquietudi-
nes, & ob impedimentum diaphragmatis descensum,
respirandi difficultatem cum reliquis producant
symptomata. Ad hanc vero causam constitu-
endam maxime omnium meconium non rite
evacuatum, vel lac coagulatum & ragnans, vel
alii etiam humores viscosi in prima regione sta-
bulantes, & in flatu resoluti contribuant; non
exclusis demum aliis, quae nervosas ventriculi
tunicas irritando, ad spasmodicam constrictionem
animare, & nocivam flatuum retentionem
inducere valent.

§. IV.

crassa in paroxysmo, Praesente paroxysmo parum lactis offeratur,
& tam nutriti, quam infanti pulveres antispas-
modici absorbentes cum aqua quadam carmina-
tiva propinentur, datis simul potus loco decoctis
cornu cervi gelatinosus, & emulsionibus tempera-
mentibus. Quum vero debita flatuum diffusio &
eductio opum in tali casu praestet auxilium,
necesse est, ut per clysteres leniter carminativos
& emolientes huic scopo quamprimum satiasat.
Extrinsicus quoque adhibita paregorica multum
huc faciunt; quo fine insucciones abdominis
cum linimento, ex aqua reginae Hungariae unctis
duobus, theriaca veteris, & balsamum Peruviani,
ana drachma una, & aliquot guttulis olei
menthae vel caryophyllorum merentur commen-
dari.

§. V.

per carminativa. Alvo clysterum ope referata, leniora carmi-
nativa prout; nisi febricula auctior obstitit:

quamobrem nutriti essentiam corticum suranico-
rum, carminativam *Wadeli* cum liquore nostro
anodyno mixtam; infanti vero eleolacharum ex
aliquot guttulis olei anisi & chamomillae veri
paratum offerre expedire, superbibendo decoctum
avenae excorticatae calidum.

§. VI.

Extra paroxysmum, ad fomentum mali subtra-
hendum non modo nutriti, sed infans quoque
leniter debet a sordibus depleri; quod in hoc
casu optime perficitur, si per intervalla ad sex,
octo vel decem grana pulvis porrigitur, qui ex
rhabarbari electi, lapidum cancerorum ana drach-
ma dimidia, seminis cymini gr. sex componi-
tur; non omittis demum remedia roborantibus
stomachicis, ut est elixirium nostrum balsami-
cum viscerale.

§. VII.

Quando pueri vel nihil urinae reddunt, vel
guttrati & cum ploratu mingunt, *urinae je-*
pressio, urinae adeff *suppresso*, quae horrendis saepe cruciatibus affli-
git; quia tum peruramque teneri pra anxietate
& inquietudine lac avidius sugunt, neque tamen
ab ejus copia per mictionem se exonerare valent.
Oritur haec anxia mingendi difficultas, quando
lac nutritis per crassa, acida & acra edula est
corruptum, vel si ipsa, ob potus insalubres, dif-
ficulter mingit; siquidem talis solet esse infans
urina & mictio, quales sunt ejus humores, si-
que ea deprehenditur humorum constitutio, qua-
lis lactis nutritis succus, quem nutrimenti loco,
durante lactatione, ex mammis pusillus recipit.

§. VIII.

Saepe etiam causa ischuriae est calculus in vesti-
ca obhaerens, quo facile infans, ob largio-
rem iucorum acidorum progeniem, laborant;
maxime si per haereditariam dispositionem a pa-
rentibus acceptam ad calculi generationem incli-
nant. Haec vero causa si subit, exinde cognos-
citur; si infans genitalia digitis saepe scalpant,
& urina non modo guttata ac cum gemitu
emittitur; sed sabulosa quoque particulae simul
prodeuntes in urina adfervata fundum petunt.
Quod si vero signa haec omnia non sufficerent,
per artificialem explorationem praesentia calculi
facile poterit detegi.

§. IX.

In curatione id maxime curandum est, ut dia-
ta nutritis, durante adhuc lactatione, aut ipsius
infantis, si ab lactatu est, emendetur: quod op-
time fit, si omnes cibi incongrui, & potus minus
salubres serio fugiantur. Den vero, malum pleu-
rumque sustinentur ab impedito alvi excoeratio-
ne: quare haec ante omnia debet promoveri; nisi
impetum humorum ad vias urinarias majorem
efficeret veliosus. Quo fine vel passulae rhabar-
barinae inter cibos datae, vel clysmata ano injecta
profutur.

§. X.

His praemissis commodis tum nutriti, tum
etiam infanti potus est praestitendus, qui non
modo diluens, sed leniter quoque diureticus
est, qualis conficitur, si aqua levis cum radici-
bus

bus asperagi, dauci, petroselin, graminis, foeniculi, saxifragie, cichorei decocta mane calidae, & dein potus ordinari loco frigida exhibetur. Nec minor est efficacia feri lactis aciduli cum cancrorum lapidibus correcti, quod simul temperantem habet virtutem.

§. XI.

-- calculi
per intest.

Quando à calculosis ramentis urethram obstructis, & sensibilem ejus tunicam irritantibus urinae fluxus cohibetur, & horridi dolores calculosi concitantur, itidem profunt clysteres emollientes; interne vero, ad spasum compellendum, dare convenit decoctum dialtheae Fernellii cum sapone Veneto, & oleum amygdalarum dulcium cum aliquot liquoris anodynii guttulis in decocto hordei vel avenae calido; quibus relaxato spasm, subjungi possunt pulveres ex lapidibus cancrorum, testis ovarum utris, solutione oculorum cancri, & alia urinam leniter pellentia.

§. XII.

-- per
teret.

Extrinsicus, si dolor à calculo & ischuria valde urget, balnea quoque aquae dulcis, cui emollientia, ut malva, radix althaeae, flores chamomillae &c. incocta sunt, usum haud spernendum praestant. Neque de nihilo est, sacculos cum talibus speciebus repletos regioni pubis tepide imponere, vel eidem oleum icorponum inungere.

§. XIII.

Aserti ca-
tarrhales
unde?

Maxime quoque tenera progenies, ob largam succorum pituitosorum copiam, catarrhibus & serosis tentatur adfectionibus, quas inter coryzam, gravedines, rucedines, tussim, asthma, pectoris infarctum cum roncho & sibilu, parotides, oculos & aures manantes, crassamque lacteam recensemus, & jam breviter considerabimus. Singuli hi morbi generatim in eo conveniunt, quod ut plurimum ab aeris vitio, & subitanea temperaturae mutatione, nec non à suppressio transpirationis negotio suam nanciscantur originem.

§. XIV.

Tussis &
asthma
generata

Quod vero speciatim ad asthma & tussim, eamque serenam & siccam attinet, sciendum est: haec vitia cum magna anhelus difficultate & suffocationis metu non solum saepe epidemice grassari, sed imprimis etiam, experientia teste, dentitionis difficultatem comitari, si consensus lege ipsi respirationis nervi tenduntur & vellantur. Neque raro eveniunt, à variolis & morbillis improvide tractatis, & quando, superato jam morbo, nec alvi libertas, nec insensibilis transpiratio debito modo promovetur; vel etiam, si acris quadam excrementitia materia in erysipellate, purpura, crusta lactea &c. ad interiora fuerit repulsa. Tum enim ab humore viscido acri libenter pulmonum infarctus, & molestae nervorum pulmonalium iritationes, quas asthma & tussim concitant, produci solent. Denique, imprimis etiam haec mala solent adfigere, ob nimiam ventriculi inflationem, à lacte viscido ibi copiose stagnante liberumque diaphragmatis descensum impediendum inductam; unde etiam non raro usu venit, quod vomitus vel sponae abortus, vel arte provocatus tam tussim-

Frid. Hoffmanni Oper. Tom. III.

tibus, quam aegre spirantibus exoptatum ferat levamen.

§. XV.

Quoad sanationem tussis & asthmatis haec maxime tenenda erunt, quod interior absorbentia cum pulvere radice iseos Florentinae, glycyrrhizae, spermate ceti & saccharo cando data, item elixir balsamicum, ex insectura tartari, essentia myrrhae, croci, nucis, corticum aurantiorum & spiritu salis ammoniaci anisato consuetum, insigniter proficiunt. In subjectis vero sensibilibus, & ubi malum potius à materia acri nervos pneumonicos irritante, quam ab humorum visciditate fortium sustentatumque fuerit, rectius adhuc elixir pectorale temperatum, quod extracti croci grana quatuor in aquae veronicae & hyssopi ana uncia dimidia soluta, & syrapi papaveris albi drachmas duas habet in debita dosi propinatur.

-- curatio
per resor-
bentia per-
spirantia.

§. XVI.

His commodè interponi & subjungi possunt infusa herbarum pectoralium calida, quibus, regnante praesentim humida & frigida aeris incemperie, non modo transpiratio egregie promovetur, sed & resolutorius effectus penelle obtinetur. Atque haec fumilis, à lymphâ acriori laryngem irritante vel provenit, vel cum ea jungitur; maxime quando simul, ad acrimoniam demulcendam, sperma ceti in jusculo solum propinatur, vel cum oleo amygdalarum dulcium, saccharo cando, syrupo dialtheae Fernellii, croco & guttulis aliquot anisi in electuario redactum per intervalia deglutitur.

-- per de-
mulentia
&c.

§. XVII.

Si forte asthma cum tussi conjunctum à cruditatibus acido-viscidis in ventriculo fluctuantibus, & inde inducta ejus inflatione dependet, cum fructu saepius datur lene emeticum, ex grano dimidio vel quarta tantum parte tartari emetici cum soluta manna paratum, aut ex granis aliquot radicis ipecacuanhae cum aqua calida, infusus & syrupo quodam addito edulcoratis: quem usum etiam quam optime clysteres praestant emollientes & carminativi, qui flatibus infra exitum parando, ad felicitem morbi decusum haud parum contribuant.

-- per le-
viora eme-
tica.

§. XVIII.

Si repulsa materia acris excrementitia ansam malo suppeditat, praeter interna diaphoretica, saepe marabilem praestant effectum leniora vesicatoria nucha apposita. Extrinsicus vero in suffice pectoris adfectibus suppetias ferunt inunctiones cum axungia humana & spiritu salis ammoniaci vinolo institutae.

-- & vix
curatio.

§. XIX.

Achorea, vari & tinea, tubercula sunt ulcerosa, à vitio & corruptione feri salis, viscida in glandulis tubulisque subcutaneis subsistentis orinata, quae plerumque à nimia voracitate, lacte nutritricis corrupto, & suppressa per frigus admodum transpiratione, suam nanciscuntur originem. Quod finaliter valet de parocidibus, auribique & oculis manantibus.

Achorem
nona &c.
vix

§. XX.

— curatio

Singuli hi adfectus, ut & reliquæ defluxiones catarrhales, optime sanantur, si nutritibus partim infusa sanguinem & lympham diluentis ex radice liquorice, cortice & ligno sassafras, semine que feniculi parata; partim pilulas de succino *Cratonis* cum & sine mercurio dulci, item elixir pectorale superius descriptum propinamus: infanti vero pulveres ex animonio diaphoretico, lapidibus cancerum, iride Florentina, lacte sulphuris, pauxillo croci & oleo anisi confectos; nec non laxantes ex mercurio dulci, rhabbarbo & manna confusa porrigimus. Parotides vero, præter interna resoluenda, exterius emplastro diachylo simplici cum camphora remixto volunt tractari, & si tumor discuti renuit, cataplasmate emolliente ad maturitatem deduci. Sed hæc sufficiant, quia jam in quinta *Medic. System. parte Tomi IV.* de his adfectibus fusius egimus.

§. XXI.

Singulus
et vomitus

Singulus æque ac vomitus ex stomacho & cruditatibus in ipso coarctatis oriuntur. Quod si enim tenacior acidiorque mucus superiori ventriculi orificio firmius insidet, non modo ipse ventriculus ad contentorum depletionem, live vomitum stimulat; sed etiam propter contentum diaphragma quasi convellitur, & facta hujus sub inspirando contractione, singulus, subinde consumacilissimus, peroritur; unde etiam non raro singulus & vomitus simul ventillos cruciare solent.

§. XXII.

— causa

Evenit ut plurimum utrumque malum à nimia lactis repletionem, vel ejusdem in ventriculo corruptionem. Hæc autem fit prælo est, materia plerumque lactea vitiosi caloris malique odoris vomitu solet rejici. Sæpe vero exarum frigus debet aculari, vel etiam dentitio difficilis & dolorifica ansam potest suppeditare, si propter nervorum consensum diaphragma & ventriculus in mali consortium trahitur.

§. XXIII.

— prognos

Si à copia lactis adsumti vomitus & singulus proveniunt, nihil fere periculi præfigiunt, cum jam in vulgus usque notum sit, vomitu in hoc casu infantes plerumque levari. Si vero lactis corruptio causam mali constituit, pejus est, & sæpe epilepsæ ac convulsiones accedunt, quæ vitam hæud raro auferunt.

§. XXIV.

— curatio
generalis

Ad rectam sanandi methodum ipsæ nos causæ deducunt. Quod si enim hac copiose sumrum peccat, in postera ejus quantitas debet subtrahi: si vero depravata (quæ qualitas in vitio est), debitam ejus excretionem tam in nutrice, quam in infante procurare decet. Quæ autem ratione hoc perficiendum veimus, iterato in hac tractatione supra docuimus.

§. XXV.

— et sympto-

Speciatim vero in utroque adfectu prodeffe

solent, syrupus menthae & betonicæ, cum aliquot olei macis vel liquoris anodyni guttis datus, vel etiam aque florum chamomillæ, millefolii, menthae, cerularum nigrorum cum prædicto liquore nostro minerali oblata. Externescus non modo frictions cum pannis calidis, sed & inunctiones regionis ventriculi cum olei anethini uncia dimidia, menthae drachma dimidia, croci scrupulo uno vitelli ovi numero 1. egregio sunt levamina.

§. XXVI.

Alter ad
fistula
causa.

Alvus infantibus modo adstricta, modo nimis soluta est. Adstrictio contingit, quando infantes nimis sunt voraces, aut ipsæ nutrices, si adhuc sagunt, victu crasso & acido, potibusque spirituosius delectantur. Licet vero ex tardiori fecum excretionem non statim noxa redundet; sæpe tamen, si diutius retineatur, magnis gravibusque malis ansam suppeditant.

§. XXVII.

— sanatio

Ad alvum igitur rite solvendum, eo precipue dirigenda est intentio, ut nutrix victu levi & emolliente utatur, interpositis in cibo passulis minoribus cum rhabbarbo & saccharo in electuario redactis, vel cum pomis Borisdorffianis decoctis. Infanti vero succurritur partim synapochotei rhabbarbarino, cum aliquot granis mechoacannæ albae per intervalla dato, partim clysteribus ex decocto avenaceo cum melle & butyro factis, vel ex sero lactis & sapone Veneto paratis. Neque usu caret infanti ventris circa umbilicum inunctio cum oleo amygdalarum dulcium pulveri trochiscorum albandal nupto insitura.

§. XXVIII.

Diarrhoea
gravis.

Alvi adstrictioni opposita est diarrhoea, seu nimium alvi profluvium, quod infantibus numero pluribus ab ira & perversa nutricia diæta, à transpiratione prohibita, à vitata ciborum digestionem & inde inducta bilis acrimonia venit: unde feces varii coloris, odoris & consistentiæ, uno sæpe sanguinolente crebrius deiciuntur: non alia ex causa, quam quia intestina vel ipsum constricta contentus fordes exprimunt, vel propter æsoniam ipse dimittunt. Quare etiam non raro usu venire solet, ut ejusmodi frequentes alvi dejectiones non solum graves partium nervosarum spasmos ac dolores e.g. ex dentitione difficili comitentur, verum etiam atrophici & paralytici valde sint familiares.

§. XXIX.

— curatio
nutricia.

Licet vero sordidum hoc malum tum infanti laboranti, tum etiam aliis valde sit molestum, sæpeque timorem mali eventus injiciat; minime tamen statim debet sisti, præsertim si illud bene ferant pueri, nec inquietudine, vigiliis, ventris tensione, atrophia, aliisque signis opem sibi ferendam expectant. Quod vero si acciderit, primo omnium ad lac nutricia, si eodem adhuc utitur, est respiciendum, atque nutrix, si mali causam lovet, permutanda, substituendo in potus locum petianam cum succo cydoniorum roboratam, vel juscula gallinacea cum uerza & nilio decocta.

§. XXX.

§. XXX.

Epietij.

— rariore
definit.

Ipsi infanti laboranti pulveres ex bolo armeniae, succino & lapidibus cancorum cum aliquot granis corticis cascariellae interne dari possunt: quibus etiam pro circumstantiarum ratione, tertia pars grani theriacae coelestis pro dosi commodè potest addi. Extrinsicus autem linimentum ex olei nuciferae expressi, olei jelsmini ana uncia dimidia, balsami Peruviani drachmis duabus, olei menthae drachma una compositum, ventrique calide inunctum commendari meretur.

§. XXXI.

Chylorum
spas.

Præter hæc vero in tali morbi statu insignis est usus chyliferum ex sero lactis dulci cum milio & oryza cocto & transcolato pararorum; quæ simul tenefinum frequenterissime junctum egregie solantur: licet etiam huic ipsi diutius duranti optime & quasi specificè prodest suppositoria, ex vitello ovi afflato, cum croco, thure & uno grano opii confusa.

§. XXXII.

Cacalia.

Atque hæc sunt, quæ de morbis infantum præcipuis cum B. L. communicare volui. Deus O. M. qui non ignorat, me, præter sui gloriam, artis nostræ incrementum, & ægrotantium salutem, nihil unquam magis curæ cordique habere, hæc omnia reddat salutaria, ut suo tempore fructus ferant uberrimos.

ENARRATIONES MORBORUM.

OBSERVATIO I.

Veni pa-
thermam
ex des-
tinatione dig-
noli.

Infans erat VIII. circiter mensium, qui sanus & vegetus, præter omnem spem & expectationem variis adflegebatur symptomatibus. Noctes enim ducebat sub plane infomnes aut certe inquietas, & propter crebriores corporis iactationes, valde turbulenter, genæ rubebant, ardentem expirabat spiritum, dignos oris sæpius admovebat, & præter gingivarum tumorem caloremque, vehementi iussi, respiratione difficili & æstu interno cruciatur: unde parentes perterriti me in consilium protinus adhibendum statuerant. Ego vero, quem singula hæc mala a doloribus, ob difficiliorem dentium protrusionem obortis derivanda esse crederem; auctor etiam, ut aliquoties in die sex circiter grana pulveris Marchionis cinnabari remitti cum quinque guttulis liquoris mei anodynii ex aqua storum tilia, & cerasorum nigrorum offerrentur; extrinsecus autem carni gingivarum doleat leniter anodyna ac demulcens, ut butyrum insillum cum succo hyoscyami subactum, vel cremor lactis cum succo cancorum fluvianilium & niri paulillo remixtus, inungeretur. Alvus, quæ diutius iusto clausa fuerat, rescabatur chylifere emolliente oleo, & ad æstus situmque nimiam reslingendum interdum multo quadam, ex seminibus ty. frigidis, semine papaveris & aquis analepticis parata interponebatur. Nec inanis erat spes, quam conceperamus, sed hæc methodo per Dei auxilium gratiam id obtinebatur, ut aliquot denticulis & labiulis suis protrusis, seorsim paulatimque symptomatum remitteret ferocia.

Frid. Hoffmanni Oper. Tom. III.

Tanta dolorum in corpore humano vehementia est, ut si membranae vel tenuissimæ quæcumque de causa constringantur, extendantur vel lacerentur, statim reliquæ, in consensum abreptæ, idem mali experiantur. Docent hoc maxime dolores, ex demissione difficultis succedente infantibus familiaris, ubi subtilissimæ gingivæ invadentes membranae totum nervosorum partium systema vi consensu adficiendo, omnes corporis functiones mirum in modum lædunt, & labefaciunt. Quod vero si incidit, prudens Medicus nihil prius nihilque posterius habere debet, quam ut mitigata dolorum levitia ipsam dentium eruptionem debita ratione promoveat: siquidem cessantibus doloribus, omnia in melius convertuntur symptomata. Poterit autem hic scopus optime obtineri, si non modo remedia interna antispasmodica superius commendata per intervalla propinantur, sed extrinsecus quoque blandæ sedantia, quæ inter etiam cerebrum gallinæ, & ex plebis consuetudine, lardum ori immisissimum refertur decet, adhibentur. Quodsi vero compactior gingivarum textura dentes in erumpendo retardet, vel plures simul dentes prodire moliantur, plane non reformanda est carnis gingivalis ope lancetta aperitio, quæ jam supra suo loco à nobis commendata est, admodumque sæpe à Gallis cum fructu infirmatur.

OBSERVATIO II.

Regimen
pædagog.
diuturnum.

Serenissimi Principis filius, nunc annum & quatuor menses natus, habitu corporis laxiori, menteque vivida & membris firmioribus præditus, à prima nativitate ad præsens usque tempus hanc habuit dietam, & symptomatum diversimode adfingentium syndromem. Quamprimum lacem adipeit, syrupus de manna & cichorei cum rhabbarbo anatica portione ad drachmas duas in aqua fœniculi paulatim datus meconium per vomitum æque ac sedes commodè expurgavit. Paulo post, ob aliqua inquietudinis & tussiculæ signa, Medicus mox pristinum laxans, mox pulverem marchionis cum aliis absorbentibus mixtum in pulcra dedit, mox etiam chylina ex lacte chamemelino cum oleo amygdalarum & saccharo confectum applicari iussit; atque hæc omnia sæpius iteravit, non omisiss, urgente forsitan ventris inflatione, & inquietudine, pulveribus contra flatum nutrici oblatis, quæ semina anisi & fœniculi cum flavedine corticis aurantiorum & saccharo habebant. Sed quum læsans femina, quæ simul iracundia dedita, singulis mensium conversionibus multibrem fluxum experiretur, serenissimus quoque infans menstruas quasi ægritudines perpeti debuit. Siquidem circa hoc tempus anxius intestinorum doloribus & flatulentis frequenterissime laboravit; quamvis nec intermedium tempus ab omni molestia erat vacuum, sed fere singuli dies medicinis auxilia desiderabant. Inter hæc ad octavam mensis perventum erat, ubi purpureæ quadam pulsula, & insolitis gingivarum pruritus, ob accedentem frigidam dentendi peririodum, denuo opem exposcere videbantur, quam etiam Medicus tum infanti, tum nutrici, quæ similiter exanthematibus scorbuticis defebatur, pro virili præstitit. Nihilominus hæc omnia prohibere non valuit, quin mense

Vu 3 nono,

natio, prægressis in somno pavoribus, infuleus epileptico-convulsivi aliquotes accesserint, quos tamen, præter clysteres lenientes, pulveres ex lumbicis terrestribus cum absorbentibus mixti, & in aquis antispasmodicis oblato placarunt. Decimas mensis varia symptomata decidentibus familiaria, ut alvi difficultatem, ventris tormina, noctes inquietas, febriculam cum siti, inappetentiam, gingivarum ruborem & sensibilitatem &c. una secum attulit. At vero, postquam provisus omnibus, quæ necessaria videri poterant, remediis, undecimo mense duo dentes ex inferiori maxilla proruperant, omnia reddebantur mitiora; præsertim cum ante anni ad finem properantibus exitum, superior quoque maxilla duos denticulos in conspectum daret. Circa alterius anni initium, percutente paululum appetentia & colore faciei vivido, pone aurem dextram defluxio quadam humida apparuit, & ablatione deinceps instituta, ob mutatam videtur rationem, varia iterum pathemata, ut inquietudines & spasmi internarum partium, quas convulsiones internas appellant, accesserunt. Inprimis autem afflicta cum difficili respiracione & tussicula per periodos redeunte conjuncturæ se adscivavit, quod plus minus urgens, & sub decubitu in latum dextrum paulummodo mitigatum utique nunc omnia medicamenta resolventia & temperantia penitus elusit. Præter hæc vero notari meretur, quod Serenissimus à prima teneritudine anuolosa vomitibus & spontaneis alvi dejectionibus creberrime fuerit obnoxius, eodemque fine, ad corrigendas evacuandasque fordes, multis syrupis laxantibus, clysteribus, globulisque mollioribus & aliis medicamentis tractatus. Nunc tandem, quoniam in eo est, ut alter dentitionis terminus appropinquet, & metus sit, ne pristina mala vel recrudescant, vel præsentia augeantur, meum Serenissimi parentes consilium de Principis cura imposterum rite habenda postularunt. Quod ad diætam, qua Serenissimus usus est, speciatim attinet; scire licet, inter cibos maxime panem simalagineum cum aqua vel jure carnis in pulvis formam redactum, decocta avenæ, hordei excorticati & prunellarum, julsula carniem cum vitello ovi parata, vel cum oryza decocta, pulmones, cerebrum & carnem vituli, indeque artificiose preparatos passillos & puliculas, satis diligenter largiorique manu fuisse oblata; potui vero post ablationem crevisiam albam tenuem interviisse, quam etiam illa adhuc durante nocte sæpius Serenissimus acceptasse dicitur.

Epicrisis cum Consilio.

Sistit hic casus integrum fere catalogum morborum, quibus subinde tenra infantum corpora afflicta solent; & quoniam multa notata digniora momenta in ipso occurrant, quæ nos ad meliorem affectuum infantium curacionem perducere possunt; operæ fore pretium confido, si ipsis explicandis aliquam operam impendamus.

1) Nihil dubii est, quin Serenissimus infans naturam paulo sensibiliorem, magnamque sortum acutum & mucosarum corporum ex ipso materno utero secum in vitam adduxerit. Id quod, præter varia pathemata, statim à partu infantis, vomitus & dejectiones alvi spontaneæ, præsentia cutis exanthemata, aurium

defluxiones humide, motus epileptico-convulsivi & similia indicant luculentissime. Longe autem magis hæc omnia fuerunt aduocata à lacte impuro, quod tenello matris inacidum, scorbutica & mensium fluxui, contra lactantium consuetudinem, obnoxia suppediavit. Nec parum huic consilide videtur crebrior alimentorum nutritientium oblatio, quæ impuri corporibus præ ceteris valde nocet, item nimis tempestivus cerevisiæ, præsertim nocturnus potus, cui melius aqua cum pane simalagineo decocta, serum lactis dulce, aut decoctum avenaceum tenuius sive solum, sive cum anisi semine, vel amygdalis excorticatis per triturationem vigoratum substitui potuisset. Quæ vero quans neglecta fuerint, nihil mirum est, quod ad lactis in prima regione corruptionem & stagnationem una cum reliquis causis permultum consulerint; unde frequentes intestinorum inflationes, inquietudines, anxietates & dejectiones fortide latum innotata sunt originem. Imo etiam molestus pectoris affectus exinde derivari poterit, qui sicut à decubitu in latum dextrum paulummodo remittit; ita non non obscure indicat, ipsam à majore intestinorum à flatibus distensione & atonia ejus lateris proficisci.

2) Quod ad medicamenta à Medicis præscripta attinet, singula quidem, dum materia acri corrigenda ac temperanda, flatibusque discutienda & moribus blande sedanda dicata sunt, per se laudem merentur; nisi creberrime & fere nimis illorum usus justam aliquam censuram incurreret; maxime quoniam multa laxantia & clystinata tonum intestinorum non parum debilitasse videntur. Jam vero eo requirendum erit, ut talia in usum proponantur remedia, quæ alvi libertatem servare, debitumque intestinorum robur restituere apta sunt. Quo fine ego loco syruporum, laxandi scopo hætenus oblatorum, suaderem hoc, quod sequitur, medicamentum ad drachmam dimidiam propinandum: *Rec. rhubarbari electi unciam dimidiam, terre foliatæ tartari, salis tartari ana drachmam unam, quæ fortiora uncias tres. Fiat sub levi calore extractio & colatura.* Deinde commendarem hanc formulam pulveris, qui pulveris Marchionis, cornu cervi philosophice preparati, succini ana drachmam dimidiam, utriusque perisicati scrupulum unum, corticis cascarille grana decem habet, de quo decem vel duodecim grana in aqua cereforum nigrorum flororumque tibia propinquantur. Imo etiam, ad flatus discutandos, sex vel octo guttæ essentiz corticum aurantiorum, cum fiocula tartari & liqote anodyni mixta dari poterunt: hæc tantum adhibita cautela, ut ne sine necessitate crebrius offerantur. Extrinsecus linimentum, ex olei nucisæ expressi & æmule hæmatis notæ dimidia, balsami Peruviani drachma una, olei lavendulæ, majoranæ, caryophyllorum ana guttis viginti compositum, vel solum, vel cum aqua reginæ Hungariæ dilutum, ventri inungere curarem. Quibus si conjungatur temperatum regimen, sufficiens motus & moderatus ciborum usus, futurum esse spero, ut natura sensim roborata vires, ad dentes & labiulis suis protrudendas necessarias recipiat, quæ prius non redibant, quam cum motus naturales à spasmis & flatibus primarum viarum debilitati desinent.

3) Discere licet, in quem lubrico statu pretiosissima

filissima principum salus sit posita. Primo enim plerumque à parentibus tenerioribus nascuntur debiles ac infirmi, & quum omnibus facile morbis debilius patet, longe etiam frequentius præ ignobilioribus magnatum proles ægrotat. Accedit dein, quod nutricibus impuris, male moratis, vel lascivis, vel in alto otio viventibus, tradantur, quæ varia corpora & animi vitia una cum lacte communicant. Nec culpa vacat nimis accuratum regimen, & iusto subtilior sanitatis cura, quæ vel minimus vagiendi conatus statim vel alimenis, vel medicamentis debet competere, & sic natura per se iam infirma non potest non magis magisque debilitari.

OBSERVATIO III.

*Dentitio
difficilis.*

Puerulus quidam semestris, à parentibus sensibilibus naturæ genitus, præter consuetudinem aliqua valetudinis labefactens indicia præ se ferre videbatur. Dentitio, quæ circa hanc ætatis periodum incidere solet, tubesse putabatur, & protinus arcescebatur. Medicus, qui ob parvam gingivarum intumescentiam, & in superficie albedinem idem metuens, ad alvum referendam, pulverem præscribat, ex grano dimidio refinæ jalappæ, & tribus mercurii dulcis granis cum saccharo subactis compositum. Depiciebat quidem inde puer fex fedibus ingentem mucilagineque coagulati copiam; sed proh dolor! postea alvus non modo fortius adstricta erat, aut tantum viridia & coagulata reddebatur excrementa; verum etiam continuis fere epulatis, inquietudine, corporis torsionibus, pavore in somno, tremuloque artuum motu & singulis quadam specie tenellis corripiebatur. Inter hæc Medicus pristinum purgans remedium aliquoties repetebat, clysteres incipiendo curabat, & varique generis medicamenta strenue propinabat; sed tantum aberat, ut quidquam inde levaminis adferret, ut potius tandem vehementissimi motus epileptico-convulsivi, per integrum fere nycthemeron parva interjecta remissione durantes brevissimum vitæ filum abrupterent. Causa quidem mortis dentitioni difficili & laboriose tribuebatur; sed parum tumoris in gingivis, plures vero aphthæ in ore & vicinis faucium partibus apparebant, & proximo ante obitum dæ facies proflus nigra & foetidalis deieciabantur.

Epilepsia.

Equidem nullus dubito, quin in nostro puerulo primam adversæ valetudinis causam dentitio suppedita verit. Siquidem haud raro sub ipsa evenit, ut propter nervulorum oris vellicationem, vel intestina usque consensus lege propagatam, vel crebriores alvi deiectiones prorsintur, vel nimis eisdem adstrictiones affligant. Nihilominus, si quis symptomatum postea perpefforum sevitiam, funtulumque mali eventum soli dentiendi difficultati adscribere vellet, graviter profecto erraret: utpote quæ magna ex parte validiori purganti, ex refinâ jalappæ & mercurio dulci confecta debetur. Hoc enim, non semel, sed aliquoties, puero à parentibus sensibili oblatum non modo sensibilem alimentorum canalem, sed univervum quoque genus nervosum, in tenella mobilissimum, ad ipsas contractiones subeundas disponere omnino valuit. Eadem fuisse ratio videtur pessimarum oris pusillarum, quas aphthas dicimus,

quæ in nostris quidem regionibus usum medicinarum, vel emineti quadam acrimonia, vel calorem exciandi facultate præditurum, lubenter excipiunt. Nec dubitare licet, quin fortioris cathartici rodens indeoles, fuscitatis intestinorum phlegmone & sphacelatione, quæ ex feridissimo fecum odore simul patet, mortem tandem induxerit. Jam quidem remedia alvum subducenda in morbis infantilibus reprobare non ausim, sed hoc tantum commonefacio, quod, missis omnibus acrisioribus, leniora tantum in usum duci debeant. Quo fine, si propter alvum officii immemorem iusto lenior faccum excretio sit, laudem meretur interna alcalina, ut lapides cancrorum & oleum tartari per deliquium, quæ adstringens acidam, cujus generationi infansilis ætas inprimis favet, imbibendo, sal quasi medium constituunt, adeoque alvi libertatem egregie conservant. Tum quoque insigniter profunt rhabarbarina, ut sintura rhabarbari in subtiliata cum lapidibus cancrorum & oleo tartari mixtura, item syrupus chioræ cum rhabarbaro, cui majoris efficacie causa extractum rhabarbari vel mechocanna alba ad duo, tria, quatuor & plura grana pro diversâ ætatis ratione additum; extrinsecus vero clysteres emollientes & oleosi, qui simul spasmus sedandis apti sunt, quam maxime debent commendari. Sæpe vero etiam in tali casu, si infans præsertim sensibilibus est, egregie prodesse solent laxantia nutriti oblata: liquidem certissima constat experientia, illorum virtutem cum lacte communi etiam in lactentibus crebriores alvi deiectiones efficere.

OBSERVATIO IV.

Qui adhuc fugebat infans unius anni, à matre per itam valde commota manibus appositus protinus in sæva ventris tormina, & ingentes præcordiorum anxietates incidit. Siquidem continuos fere eulatus edens ex altero latere in alterum inquietus se dejicit, pedibus calcitrat, anxie respirat, dies noctesque infomnes ducit, vel leviter consopitus paroribus concutitur: alvus paucæ, eademque tantum crassa, coagulata & viridibile circumfusa reddit, abdomen flatibus distenditur, & singula ita sunt comparata, ut metum haud inanem convulsionum vel epilepsiæ supervenientis incuriant. Ego itaque in consilium adhibitis præscribo pulverem, ex pulveris *Marchionis drachma una, speciei cephalici drachma semis, croci & castorei ana granis quinque* qui in octo dosibus divisus ter in die ex aqua horum tilia & liliorum convallium sine vino præparata propinatur, interposito ad sex guttulas liquore meo anodyno, cum liquore tartari, & una alterave olei anisi guttula remixto. Neque minus, ad facces & fluxus educendos, fibraque intestinales spasmo contractas relaxandas, aliquoties incipiendum suadeo clysterem ita parandum: *Rex. forum tilia, mellea, violarum suumiatum millefolii ana pogoniles duor. Coque in f. q. aqua. Colatura recipe unciam unam cum dimidia, cui olei chamomilla colli uncia semis, pinguedinis castorei scrupulus, olei tartari per deliquium gutta decem admisceantur.* Abdominis tandem regio subinde inungebatur oleo amygdalarum dulcium, cui oleum carvi & camphoræ pauxillum nuptum erat, atque potui prius tam calide, quam subfrigide bibenda, item decoctum avenaceum substituebatur. Sed ut mater quoque paululum

*Ventris
tormina ab
ira matris.*

Vu 4 adjuva

adjuta lactationi denique apta redderetur, equidem ipsi ad complacandos spasmos, pulverem precipitantem nitrosum cum liquore anodyno ex aqua aliquoties sumendum, sordidesque biliofas cum pulvere rhabarbarino evacandas commendabam: aequae haec omnia tam felici eventu, ut mater cum prole sua integre restitueretur sanitati. Ne vero infanti nova pertimescenda essent mala, ablationem tardius differendam praecipiebam, donec pusillus, viribus sensim receptis, praeferenda victus mutationi suppar videretur.

Epileptici.

Summam meretur admirationem, qui fiat, ut infans incolamus & perfecte sanus à solo lacte matris atque nutrita vel iracundiae, vel terrore quodam percussa, in gravissimas adflictiones intestinorum spasmodicas & motus epileptico-convulsivos cum plenaria sanitate eversione, ipsoque moris periculo tam repente conjici queat. Tamen vero causae tam fustorum eventuum paulo abstrusiores sunt indaginis, nec facile ullius hominis ratio adsequi valeat, quomodo vehementer animi adfectus non solum in corpus, quod percellunt, verum etiam in aliis, quibus lac tantummodo sugendum datur, tam graviter operari queant: Medico tamen sufficit, si deceni auxilio pessimorum effectuum noxas commodè propellere noverit. Agunt enim animi adfectus instar venenorum celeriter non tam in fluida, ut in sanguinem & humores, sed potius in solidas, easque motrices corporis partes, quas subinde ad vehementissimas contrictiones ipsasque animant; unde dein omnes economiae vitalis motus non possunt non insigniter laedi. Quae cum ita sint, in tali casu nihil medenti prius, nihil posterius debet, quam ut nimios spasmos, qui praecipue sensibilem ventriculi & intestinorum tractum afficiunt, blande componere, & turbatos solidorum motus ad temperiem reducere studeat. Id quod à nobis optime praestitum est per appropriata antispasmodica, tam interne oblata, quam extrinsecus adhibita, quorum usum ipse lenissimus mali eventus comprobavit. Praeter haec vero, peculiare adhuc phenomenon explicandum erit, cur a lacte matris iracundia tacte statim faeces crassae, & colore immutato, virides apparuerint. At vero, quum ea sit irae affectus indoles, ut tonum & motum intestinorum peristalticum turbando, alvi excrementum supprimit, facie evenit, ut contenta in intestinis recrementa longiori mora acorem contrahant, bilisque admixtione corrosivam plane naturam cum virore induant. Quare tum temporis simul ad materiam acido-biliofam & corrosivam blande temperandam medentis intentio dirigatur rectissime. Ceterum, ne innocua proles a perversis nutritum adfectibus graviter laet, serio ipsis haec commendanda est cautela, ut post fonticam animi commotionem lac nunquam, nisi mammae antea emulctis, unoque & altero die interjecto, sugendum praebant. Nonnulla à canibus adhuc lactentibus lac sibi exsugere patiuntur, qui eadem non raro inde moriuntur, luculentum veneni accepti testimonium relinquentes. Neque tamen mediante lactis vehiculo sola animi affectuum noxa in infantes derivatur, sed idem quoque de aliis nutritum vitia arbitrandum esse velim. Ita enim se-

brem tertianam sugenti communicatam haud ita pridem vidi.

OBSERVATIO V.

Serenissimus infans, à matre editus tenera, morbofa, & non levi sanguinis & humorum impuritate praedita, ab ipso vitae primordio maculis purpuraceis, oculorum lippiitudine, capitisque achoribus laboravit; medicoriter tamen semper valuit. At vero, quum septem prope mensibus elapsis, nutriendi munere fungens femina in repentinum incideret morbum, nec facile in ipsius locum alia commoda nutrix posset substitui, optimus ille princeps, à dulci lactis succo abstractus, nunc calculus avenaceus aliisque alimentis educari debuit. Sed quae antea cautissime evitata erant mala, pleno nunc agmine irruerant. Siquidem tenellus, ciborum appetentia dejecta, subito inquietus reddebatur, in somno, qui tamen paucus erat, pavebat, difficulter cum sibilo respirabat, immo deo valdeque corrosivo alvi fluxu laborabat, tenerumque corpusculum inter alios clamores miseriter torquens adstantium misericordiam in se omnem vertebat. Quae singula quam truculentos intestinorum dolores satis clare indicarent; nihil profecto, quod saluti esse poterat, omitebatur. Dabantur enim interne pulveres antispasmodici, leniter absorbentes, dia-phoretici, ex pulvere Marchonis, cornu cervi usso, philosophice preparato, succino &c. confecti, quibus ad alvi fluxum moderandum cortex calcarius, & pro dosi tertia pars grani theriacae coelestis in vino prius soluti adjecta; extrinsecus autem abdomini parum lactulis roborantes in vino cocti, parum linimenta oleosa & spiritusosa, & ano demum chyliferi emollientes subinde applicabantur, non omisso sero lactis dulci potui substituendo. Sed inanis erat omnis medicinae energia, & supervenientibus epileptico-convulsivis motibus optimus ille princeps in vitae initio à vivis tollebatur. Instituta post mortem anatonica sectio-ne, intestinum colon, ubi finis erat ejus flexura ad rectum porrigitur, ad unam latitudinem valde erat contrictum & ita angustatum, ut vix tenuis stylus transire posset: in ea vero parte, quae mesocolo adheret, ad ventriculum usque, non obscura inflammationis praegressae indicia se manifestabant. Reliquos intestinorum tam tenuium, quam crassorum tractus valde erat dissecutus, excepto illo, cujus ambitus inde naturali minor conspiciebatur. Mesenterium quoque & concava hepatis regio plures inflammationis & sublequutae sphacelationis notas ostendebant, quae similiter etiam per convexam hepatis superficiem dispersa observabantur.

Epileptici.

Quis est, qui non videt, intemperatam passionis ablationem primam querelaram omnium occasionem suppeditasse. Equidem novi infantes numero plures, ab aliquam aut matris aut nutritricis imbecillitate à lacte maturus paulo abstractus, qui nihilominus robusti sibi quae satis coarctantes permanerunt. At vero, longe aliter res se habet cum tenerioribus, qui per infirmitatem ab uero contractum, alimentis aliis praeter blandum lactis succum digerendis minus sufficiunt. Si qua vero abla-

*Lactula
veneni
causa
fuit
dicitur
dilectio.*

Standi necessitas urget, optime lactis vicem gerit serum lactis dulce, secundum methodum nostram elaboratum, quod fluxile satis, omnique casaeola substantia orbatum facillime à ventriculo potest subigi, sicut ego exempla plurimorum edocui scio. Quod vero ad ipsam sectionis historiam attinet, scire licet, quod variae de causa morbi commotae fuerint lites, quam alii in naturalem intestinorum angustiam rejecere voluerunt. Sed ut paucis hac de remeant expromam sententiam, probe eequidem inter causam moris proximam, & causam morbi, quae tandem causa moris sit, distinguendum esse statuo. In hoc nostro casu nihil dubii est, quin mori à sphacelosa partium internarum corruptione; haec autem à spasmodica intestinorum constrictione & flatulenta tenuium distensione immediate dependeat. Eadem fere phenomena, maximeque nimias coli contorfiones, non modo in infantibus, epilepsia, immodica alvi fluxione & convulsione demortuis, verum etiam in adultioribus, nimia sanguinis vel per vomitum, & haemorrhoides, vel per menses & lochia fluxione laborantibus crebrius annotare mihi licuit. Brevi enim ante mortem intervallo in hisce, similibusque adfectibus saevissimae intestinorum convulsiones & spasmi accedunt, qui altera ex parte constrictionem, ex altera vero flatulentam distensionem inducunt, sanguinem hinc inde ad flasin inflammatoriam, indeque pendentes sphacelum disponere solent. Imo à tali perturbato sanguinis circulo, nec caput & pulmones sunt immunes, sed in his quoque, variae naturalis status laesiones & in dextro cordis ventriculo sanguinis coagulati grumi saepe saepius deprehenduntur; licet in praesenti sectionis historia nulla cordis & pulmonum facta fuerit mentio. Haec autem allegata moris causa à causa morbi & symptomatum longissime differt, quam eequidem naturae intestinorum angustiae, ut quidam putarunt, ideo tribuere nollem; quoniam, si haec connata fuisset, à prima nativitate crebriores morborum insidius debuissent accedere, nec forsitan optimus puerulus ad tantam, licet brevissimam, aetatem potuisset pertingere. Mulo magis veritati admodum consentaneum videtur, quod sanguinis & humorum dykrasia, quae antea purpuram, lepraedudum & achores induxit, nunc ob incongruam dietam, forteque prohibitam transpirationem, ad intestina magis conversa gravissimos ibi spasmos & inflationes produxerit; unde, suspensio circulationis aequilibrio, inflammatio, sphacelus & ipsa demum mors prognata fuerunt.

OBSERVATIO VI.

Simulus quidam, sanguine & succis turgidus, jam per menses aliquot crusta lactea capitiq; achoribus laboraverat, cui Chirurgus quidam prompte audaciae pulverem cerussae, boli armenae & terrae vitrioli dulcis capiti inspergendum commendabat. Exsiccebat inde quidem ulcuscula, sed infans pro dolor! languescens penique torpidus, pavoribus in somno percellabatur, pallabatur, & post levem corporis refrigerationem in universo corpore ita rigescibat, ut digitis in volam manusum collectis dentibus strideret, oculis apertis mirumque distortis vibraret, sub anxio anhelu spumesceret, rapidique motibus convulsus verum epi-

leptici habitum offenderet. Quae quum ita agerentur, parentibus ad me anxie advolantibus consilium dabam, ut, decocto cornu cervi, hordei & glycyrrhizae in potus locum substituto, per intervalla pulverem ex bezoardicis fixioribus constitutum in aquis analepticis cum mixtura simpliciter leniter imbutis propinquaret, alvum clysmate subducendum, totumque corpus probe fricandum curarent; his autem praemissis specifica antiepileptica, e. g. pulverem ex *humbricorum terrestrium granis fixis*, *antimoni diaphoretici* & *lapidum cancrorum ana granis* quatuor confectum subjungerent, non neglectis simul calidis spinæ dorsæ & annuum inunctionibus, cum unguento ex axungia canis, & callores, oleo nucis, menthae, caryophyllorum &c. confuso infundenda. Quorum remediorum effectus Deus ita clementissime annuebat, ut hostili materia ad summam cutem denuo propulsa, innocua proci à sevisimis epilepsiae insidiis sensim ex voto liberaretur.

Epilepsia.

Iustissimam meretur censuram haec perversa achorum repulsio, qua sordes ulcerosae, optimo naturae consilio eliminandae, versus interiora fuerant repressae, paribusque nervosis insidentes saevissimos spasmos concitarent. Eequidem capitis exulcerati cum aqua scopetaria, aliaque externis convenientibus abluitionem scilicet celsisse novi, sed probe cavendum velim, ne hoc ante debitam corporis per leniora laxantia, diaphoretica & insula calida repurgationem suscipiat, imo etiam cum ipso extenuatum usum remedia h'ande diaphoretica apud conjungantur; alioquin auxilii loco majorem faciem noxam inducimus. Vix autem melius symptomatibus ex retrocedente cutis ariditate oriundis succurratur, quam si neciviam materiam ad corporis habitum revocare annisimur. Id quod in subiectis paulo habitioribus externa epispastica leniterque vesicantia, in teneris autem calide frictions, & inaeque pulveres bezoardici cum insula theiformibus & diaphoretico regime daz commodissime praestant, ut deinceps remedia, specifica quadam virtute spasmos sedantia felicius adhiberi possint, inter quae maxime mixtura, ex aquis antiepilepticis, specifico cephalico, pulvere marchionis, liquore meo anodyno, uno insidii grano, & syrupo paeoniae confusae apud infantes laudem merentur.

OBSERVATIO VII.

Trium annorum puer, habitu corporis succulentiori praeditus, à praegressa refrigeratione nulli satis vehementi corripiebatur, pectus humoribus valde tenacibus insatctum rugidumque nihil fere, aut parum mucii viscidii laborioso conatu reddebat, & tandem ipsa convulsio accedens haud inanem moris timorem incutiebat. Alius quoque ejusdem habitus puerulus, cibo aliquando nimium repletus, circa decubitus de magna pectoris angustia conquirebatur, & noctu dein expectorata cibi quidpiam assummi, magnamque mucii viscidii quantitatem evomebat. Sed nihilominus, redeunte vomendi conatu, inter summas anxietates & suffocationis periculum nihil prope materiae viscosae vomitu reddere poterat; unde convulsus miserime habebat.

Epilepsia.

Epilepsia
ex achori-
bus repul-
sa.

Convulsio
ex casto &
affluente.

Epicrisis.

Disi hi affectus pro causa agnoscunt ventriculorum, tenaci humorum sibiurta repletum atque distensum; unde nervi praecordiales vellitati spirandi angustiam cum suffocationis metu & convulsivis artuum tractum inducunt. Quae vero si praesto sunt mala, vix melior datur melior, ac si viscidiorum humorum colluviem per lenem emeticum, in sufficienti liquidi quantitate solummodo exterminare contendimus. Quo fine pro diversa aetatis ratione tertiam vel dimidiam partem grani tartari emetici, in aqua cinnamomi soluti, vel aliquot grana radicis Ipecacuanhae cum aqua calida infusa, vel etiam, ut nonnullorum mos est, oxymel squilliticum subinde propinare expediat. Nec facile in tenellis succulentioribus reformidanda est emetici oblatio, ut potius mirabiles in sanando effectus ab usdem tempestive adhibitis sapissime observentur, & postea remedia blande resolventia, ut pulveres ex solutis oculorum cauteri & radicis ari granis tribus, radicis ieros Florentinae, animonii diaphoretici & sacchari granis duobus parati, subpanctis infusa herbarum pectoralium calidis, longe praestantiores habeant usum.

OBSERVATIO VIII.

Tabes.

Infans unius anni, nutrice usus morboſa, & ob vitam sedentariam, parciorum potum & acidiorum inter cibos usum spisso calidiorique lacte repleta, inopinato quondam gravibus ventris torminibus, alvi obstructione & insigni abdominis a flantibus distensione afflictebatur. Remittebat quidem malum convenienti medicina tractatum, sed ingens abdominis tumor relinquebatur, qui ad costas usque scrobiculum, & hypochondria latera extensus tanta duritie pollebat, ut digitis vix cederet. Inter haec simul noctes ducebantur informes, alvus mox excrementa dimittebat glutinosa & coagulata, mox nimis fluida, cibos appetendi facultas fere penitus erat dejecta, bibendi contra cupiditas intensior, totumque corpus modo frigens, modo calens, in paribus tam superioribus, quam infra abdomen suis indies magis marceſcebat, imo omnia ita erant comparata, ut verum tabem facie dilucide indicarent. Ego itaque consultus suaver fui, ut primo omnium intestinorum parietes ab amara viscida per pulverem Cornachium ad grana sex cum syrupo cichorei & aqua feniculi datum, liberentur; postea vero pulvis, ex ethiops mineralis granis quatuor, concharum citrinarum granis tribus, sacchari granis sex compositus singulis diebus mane offeratur, eodemque per ocliduum usurpato, pristinum laxum repetatur, & sic aliquoties alternando curatio per aliquod tempus adoretur. Praeter haec vero, potui vel decoctum ex radicibus quinque aperientibus paratum, vel serum lactis dulce, cui oclum tartari per deliquium infusatum erat, subministrabatur, & ad vim ventriculi concoctricem juvandam, bilisque balsamicis defectum explendum, inter cibos quindecim guttae elixir mei visceralis propinabantur; extrinsecus autem abdominis durities & flatulencia oleo chamomilla cocto & emplastro Barbette camphorato fovebantur. Atque hac ratione, maxime cum in dieta, relicis omnibus crassioribus, iustula tensiora cum radicibus ape-

ritivis decocta adhiberentur, puerulus sensim, licet lento gradu, a diro hoc malo citiusque imminente moriendi necessitate liberabatur.

Epicrisis.

Tumores abdominis cum macie infantibus familiares non aliam agnoscunt causam, quam viarum, quae chylum vehunt, a materia viscida obstructionem; unde non solum copiosius flatus, intestinorum canalem distendendo, abdomen tumidum reddunt, verum etiam, ob denegatum chyli subtilioris ad sanguinem transfusum, partes corporis succo alibili defraudatae contabescere incipiunt. Quum itaque in eiusmodi affectibus crassa intestinorum villosa tantum non semper materia crassa & tenaci obſtacula, ipsaeque mesenterii glandulae, sicut anatomicae sectiones docent, valde tumida & infarctae sint; eo omnino curantis dirigenda est intentio, ut expurgata intestinorum colluvie, talia remedia in usum proponant, quae aliqua humorum viscidos attenuandi & resolvendi energia pollent. Id quod, praeter alia deaplopiata, etiam ethiops mineralis egregie praestitit, upote quem D. D. HARRIS & alii, remediis fere omnibus colliquantibus longissime anteposunt. Sed ut convenienter simul victus ratio accedat, imprimis necesse est.

OBSERVATIO IX.

Puer octennis, a matre ad cachexiam proclivi genitus & enutritus, a primo mox orta ossibus tenerioribus carneque spongiosiori praeditus, valde languidus, facieque tumidus apparuit. Accedente dein ex aetatis periodo, quae alias infantes pedibus insistere solent, terram attingere detrectat, & licet quandoque ingrediendo aliqua potentia pollere videretur, brevi tamen iterum adeo debilitabatur, ut vix pedem movere posset. Ceterum bene appetens, digerens & egerens insigni ingenii alacritate, & statuta supra aetatem magna gaudet, praesertim tamen caput inusitata fere magnitudine quasi inflatum conspicitur, ut naturalis men brutorum convenientia fere penitus sublata videretur. Parentes, qui causam mali incantationi tribuebant, innumeris frustra adhibitis, a me tandem consilium expectabant, quod etiam hac ratione lubens suggererebam. Primo omnium, repurgatis primis vis, talem victus rationem praecipiebam, quae parca, tenuis leniterque exsiccans erat, ut scilicet puerulus in parva quantitate carnes tantum allatas cum pane similagineo comederet, pro potu decocto ex radice chinæ & rasura igni infusae cum passulis uteretur, mane in lecto sub decocti calidi usu leniorisque sudoris expectatione membra paucis calidis probe fricanda daret, & demum balneum lachryladiense per tempus adhiberet, subsequenti post singulos usus frictuibus, artuumque iunctionibus cum tali spirita nervino: *Rec. aqua reginae Hungariae uncias duas, saponis Veneti drachmas tres: solutus adde balsami Peruviani drachmam dimidiam, olei caryophyllorum, lavenderulae, majoranae ana guttas XV.* Quibus per aliquot mensis probe observatis eveniebat, ut puer magis magisque pedibus uti diceret.

Epicrisis.

Epileptis.

Referti hic casus videntur inter rachiticos, ob symptomatum convenientiam. Causa mali in nimia fucorum feroforum redundantia, partiumque solidatum flacciditate ponenda est; unde membra nimis laxata debita sua firmitate agilitateque caruerunt. Similem ambulandi impotentiam sepiissime in adultioribus observavi, qui fucis spissioribus præditi, intra breve temporis spatium paulo majus corporis incrementum crescendo ceperunt, ubi præter tenuem vitulum balneæ vel naturalia vel per artem cum herbis nervinis parata eximie profuerunt; licet interdum vix prius, quam altera ætatis periodo, indeque mutata corporis totius textura, membris recte uti valerent.

OBSERVATIO X.

Morbis quoque incongruis infantilis ætas patet, quod sequentes historię demonstrabant. Trium anorum puella, facie pallida, parumque appetens, non solum inter alvi depositionem una cum fœcibus cruoris paucillum excrevit, sed postea quoque tuberculum avellanæ magnitudine, tactus renitens, multumque molestitæ inter sedendum adferens in ano accipit. Quæ cum audirem, puellam ex mala ventriculi digestionē, indeque oris flautentis, majori sanguinis ad vasa hæmorrhoidalia congestione laborare judicabam. Quamobrem ad alvi libertatem servandam, sanguinemque purificandum præscriberebam insulam theiforme, alternis diebus mane hauriendum: *Rec. herbe hedera terrestris manip. unum, summitatum millefolii, florum chamomillæ vulgaris, papaveris rhæodis ana pugill. quatuor, foliorum fenæ sine stipitibus, eremuri tartari ana drachmas duas: C. D. S. species, quarum drachma una cum mensura dimidia aqua infundatur. Ventriculo præscriberebam elixir meo viscerali, ad viginti guttas in prandio & hora quinta vespertina dato. Denique vero tumoris causâ externe linteum vino calido rubro, *Pentack*, impregnatum applicari jubebam; idque tam felici successu, ut brevi hæc molestiæ ex voto disparet.*

OBSERVATIO XI.

Hæc scriptioni in memoriam venit casus de diabete symptomatice satis notabilis. Puella enim octennis, illustri stemmate orta, ingentem sordium alvinarum copiam, ob neglectam sorte alvi dispositionem, in intestinis accumulaverat. Accedebat dein crebris urinae stillicidium, cui Medici, quorum non pauci consulébantur, varia traumatica aliæque adstringentia audacter opponébant, & insuper fere habito alvinæ excretionis negotio, solum tincturam rhubarbari, vel Claudeni aperitivam timidi præscribebant. Sed aucto prob dolor! molestissimo urinae fluxu

corpus ita debilitabatur, ut superveniente demum materia purulenta excretionē, ægra ferbre hædica consumta decederet. Aperto per cultrum anatomicum cadavere, intestina tenuia mirum erant distenta, & in utroque hypochondrii latere intestinum colon durissimis, usque copiosissimis, scybalis repletum, ut duplo majus videretur. Non finitæ à superincumbente colo compressus naturalis major, & ex parte purulentum ichore refertus conspiciebatur. Unde facillimum erat judicatu, nimiam intestini colic distensionem, renis tubulis relaxatis, majorem humorum adfluxum, & æ urine separationem præstitisse. Quare officio defuerunt Medici, qui relicta causa, solum diabeten adstringentibus tractarunt; quum tamen clystinata aliæque interna emollientia, tempessive adhibita malum exitum arceret possent facillime.

OBSERVATIO XII.

Illustrissima puella, x. annos nata, admodumque sensibilibus ac tenera, nutricem habuit valde impuram, & à prima infantia genarum tumore, oculorum lippitudine aliisque malis, à sanguinis dyscrasia obortis laboravit. Tandem priori anno sine notabili causâ motus spasmodico-convulsivi cum vertigine, corporique totius rigore & tremore mox pedes, mox brachia mittere adiciebant, ita ut ægra, prægresso formationis sensu, mirum labefactata aliquoties per diem in terram caderet. Varia à variis præscripta erant remedia, sed sine omni effectu. Quum vero & ego in consiliis vocarer, puellam nimis voracem cibis maxime dulcibus, farinaceis & lactiniis delectari, quandoque ventris torminibus adligi, & olim vermium quædam signa præbuisse, comperi. Unde, mutato victu, ad primas vias vel à sordibus, vel à vermibus, si prælo essent liberandas bis in hebdomade octo vel decem horum pilularum præscripsi. *Rec. gummi ammoniaci depurati, extracti tanaacetæ, asa fœtidæ, boracis Venetæ, ana drachmam dimidiam, rhubarbari electi drachmam unam & semis, alois purissimi grana quindecim, extracti croci, castorei ana grana tria, M. f. l. a. cum terchiabina Veneta pilula ex scrupulo xxx.* Præter hæc quovis die mane in lecto insulam nervinum, ex herbæ melissæ manipulo, florum chamomillæ vulgaris, tilisæ, primulæ veris, salviæ, sambuci ana pugillis duobus confectum, inter corporis frictionem, blandique sudoris expectationem bibendum offerebantur. Circa decubium ex aqua antispasmodica pulvis temperans cum sex guttis liquoris anodini essentia croci & castorei myrti, & inter cibos viginti & plures guttæ elixir visceralis propinabatur. Quibus per aliquot hebdomadas usurpatis balneum nervinum, ex herbis mentha, majoranæ, salviæ, rosmarinis, summitatibus origani &c. cum debito regimine & unguenti nervini usu comode subungebatur.

Cerevisia
et moras
cum ver-
mibus
composita.

Hæmorrhoides
tam fluæ
tam cæcæ.

Diabetes
in infans.





INDEX LOCUPLETISSIMUS RERUM OMNIUM

I N

MEDICINA RATIONALI SYSTEMATICA

seu tribus prioribus Tomis contentarum.

Prior numerus Tomum, alter Paginam indicat.

A.



ABDOMEN, ejus minis decens ligatio post partum sæpe intestinum dolorum causa Tom. II. pag. 286. *Abdominis inflationes, vide Flatulentia.*

ABLACTATIO infantum, quo tempore fieri debeat? III. 474. Que post illam obser-

III. 475.

ABORTUS qui dicitur III. 177. Partu naturali gravior & periculosior est. I. 79. III. 177. quo tempore contingat? III. 177. quomodo fiat? I. 79. quandoque salutaris. *ibid.* differt à partu septimestri III. 177. ab hæmorrhagiâ abortivâ & minis tali *ibid.* signa III. 177. subiecta III. 178. que faciant? I. 79. non facile provocatur, quod auctororum testimoniis III. 177. & variis observationibus probatur. III. 178. cause occasionales sunt aeris viciosa confinitio, & prava diæta puerperarum III. 180. alvus adstricta III. 181. fluxus albus diutius infestans III. 351. hereditaria dispositio & abortiendi consuetudo III. 180. spasmi concitantes III. 179. Sanguinis defectus & abundantia. *ibid.* tussis convulsiva I. 306. III. 122. externæ violentiæ III. 179. terror I. 191. polypus uteri. *ibid.* & atonia I. 307. sanguinis vel feri viscidii profluvia post puerperium, vel abortum I. 353. abortum passivæ facili in eum recidunt I. 79. causa proxima III. 178. quando contingat in variolis & que paritæ symptomata? II. 55. & que illum sequantur? III. 180. ad eum proclivitas in quo consistat III. 179. disponit frequens abortus ad fluxum album III. 350. ad hæmorrhagiam uteri III. 226. ad leucophlegmatiam III. 335. crebrioris circa medium gestationis *Frid. Hoffmanni Oper. Tom. III.*

tempus contingentis exemplum III. 185. frequentis casus. *ibid.* venæ sectione in brachio præservatus. I. 457. III. 183. cum perperuo vomitu junctus III. 187. cum insequente hæmorrhagiâ uteri & venarum excretionem III. 183. cum symptomatibus hypochondriaci III. 184. nimia ad eum proclivitas cum molarum excretionem III. 187. indicationes curatoriæ & præservatoriæ. III. 180. que explentur venæsectione *ibid.* laxantibus lenioribus, III. 181. commodè uteri purgatione post partum. *ibid.* quomodo ex tempestate vitiosâ exacto vitæ regimine tractandus? III. 181. quâ ratione imminens arcendus? *ibid.* hæmorrhagia in illo quomodo tractanda? *ibid.* quomodo præcavendus in acutis morbis? III. 182. in dysenteria *ibid.* in hysterico malo? *ibid.* Cautelæ circa venæ sectionem *ibid.* & 183. circa partum & motum corporis III. 183.

ASCENSUS quid denotet & quodnam genus illius propriè sic dicitur? I. 356. ejus signa III. 463. à fortioribus emeticis coorti. I. 166. ex morbalis & variolis I. 164. & seq. post variolas I. 325. differunt ab ulceribus I. 326. III. 443. à fistulis III. 459. quantum sunt sæpe causæ III. 461. sanguinei cur sint frequentes II. 21. quomodo ex potu frigido sub paroxysmo febrili nascuntur? *ibid.* **Abfcessus** interni signa I. 325. internus ruptus mortis causa. I. 400. in abdominis integumentis quandoque subfistit. *ibid.* musculorum abdominis ex tertianâ. III. 20. aperti curatio III. 452. & seq. circa aurem oculus convulsiones læpe excitat III. 35. dorsi I. 325. ex hepatide orci casus II. 46. in parotidibus *ibid.* pulmonum facile recidiva I. 356. & an possit sanari II. 142. quando post peripneumoniam remaneat? *ibid.* renem I. 326. in sinibus frontis *ibid.* subfistit in thorace I. 325. **Mesenterii, Vesicæ, Uteri, vid. Mesenterium. Vesicæ. Uterus.**

X x

ASSOR-

ABSORBENTIA veteribus ignota I. 429. eorum apparatus I. 428. differentie *ibid.* amplissime utilitatis. *ibid.* correctionis materie dicata. *ibid.* cum acido in tertium cedant. *ibid.* præmittenda purgantibus. *ibid.* naturæ opus juvant. I. 413. quædam adstringunt I. 428. cur alvum ducant. I. 384. quatenus convenient in cardiagiâ II. 260. in febribus II. 14. 17. quomodo improvidè data astrophie infanilis causa? III. 486.
Absorbentium terrenorum usus I. 139. efficacia in averrendis morbis chronicis I. 253.
ABSTINENTIA & motu prius tentandi morbi quam medicamentis I. 139.
ACACIA fructus adstringunt alvum I. 261.
ACETUM antidotis annumeratur I. 201. alvum adstringit I. 261. vini optimum alexipharmacum I. 204. polyarthriâ laborantibus commendatur I. 252. specificum in peste. I. 450.
ACHORES quid & unde III. 494. retroculi quomodo sæpè asthma convulsivi & infantili causa III. 96. 494. epilepsie III. 10. guttæ feræ, III. 229. motuum spasmodicorum vagorum III. 37. tuilis ferina? III. 111. curatio III. 494.
ACICULA deglutita quæ mala genuerit? I. 237. deglutita atrocia ciet pathematâ. I. 312.
ACIDA nitrofa postponenda I. 429. cur inimica corpori humano I. 185. 189. quibus noceant & cur? I. 178. fenes lædunt. I. 134. sices alvina reddunt albas I. 66. primis viis sunt infestæ I. 107. earum tonam destruant III. 18. iis in primis viis copiosa qui cibi vitari debeant? I. 111. tenefimum concitant I. 66. diarrhoeam fuscitant III. 176. clysteribus non indenda I. 468. vermibus sunt inimica & quæ? III. 492. quomodo adhibenda sint in febre verminosa II. 187. acidum est plerumque causa morborum infantilium III. 470. ex quibus signis patet *ibid.* quoniam ad illud ingenerandum ex parte lactantis contribuant? III. 471. ex parte infantis *ibid.* in primis hypochondriacorum viis unde? III. 72. 82. cardiagiæ quæ ratione causa existat II. 260. quomodo tollendum? *ibid.* corrosivum non est causa ulcerum quod probatur III. 444. cum alcali & viscido non universales morborum causæ I. 17. & *seq.* an podagræ materia & causa? II. 341. acida ad sanguinem delata sunt salia I. 38. 69. feri feculentum faciunt III. 459. menses supprimunt III. 19. 459. pulsum mutant I. 369. sanguinem coagulant I. 374. acida optima sunt alexisteria I. 450. infensa sunt humorum progressui I. 428. eos incassant III. 176. 318. an in hæmorrhagia narium conducant? II. 198. quomodo præferent in pellilentia II. 95. laudantur in ea *ibid.* præsertim si bezoardicis terreis fuerint nuptæ II. 67. cur accendis misfmatibus aptissima? I. 204. laudantur in febre petechiali II. 87. & petechizante II. 77. in synocha putrida II. 106. an in tertiana? II. 13. eorum abusus in tertiana quartanam producti II. 29. acida temperantia I. 429.
ACIDULE præstastillium sanitatis præsidium I. 139. foeminas commendantur I. 243. qualia principia recondant. III. 290. cum lacte optimè misceri possunt. *ibid.* ante earum usum corpus ritè præparari debet II. 272. cur sub earum usu animi affectus maximè noceant II. 117. & fructus horreant III. 174. impuris subiectis magis quam thermæ profunt. III. 412. frigide potæ quibus noceant? III. 19. 100. improvidè usurpatæ febres intermitteutes excitant. II. 12. scabum III. 438. præsertim nocent in hydrope pectoris III. 100. hypochondriaci & spongiosa subiectis III. 73. non semper curant malum hypochondriacum I.

153. nocent à spafmo vexacia III. 75. in vertigine idiopathica III. 222. laudantur in asthma III. 100. calculo felleo II. 273. dysenteria, III. 158. in epilepsia, & quando conducant III. 15. nephritide? III. 149.

Acidula cum lacte profunt in doloribus intestinorum à moribus spasmodicis vagis III. 37. odontalgia II. 332. tussi hypochondriaci. III. 122. vertigine symptomatica. *ibid.* ulceribus III. 449. uteri hæmorrhagiâ II. 227. vide etiam *Aque Minerales*.

ACONITUM venenatæ est nature I. 210.
ACROMIONIA humorum quomodo generetur? III.

421. in infantibus unde III. 470. & senibus? III. 382.

ACTIONES naturales quæ sint? I. 54.

ACUTA febris in quo consistat. I. 407. & *seq.* plerumque inflammatione distipat *ibid.* cur recidit? I. 356. à naturâ sanatur. I. 407. quomodo per artem? I. 408. venæ sectionem poscit. I. 456. symptomaticæ malæ. I. 411. vid. etiam *Febris acuta*.

Acuti morbi quomodo differant à chronicis? I. 410. cautè tractandi I. 403. funesti signa. I. 391. & *seq.* causa mortis in iis sphacelus venteris & intestinorum I. 400. & *seq.*

ADOLESCENTIA quibus morbis exposta I. 184.
ADSTRINGENTIA externæ admoda capiti quomodo repellant humores? III. 130. gingivis inanità in demutione difficili nocent. III. 478. in erysipelate III. 142.

Adstringentia: interiorum indoles & effectus ingeneru I. 260. pollent repellendi facultate I. 207. quatenus adjuvant excretionem? I. 260. alvum præcitant. I. 441.

Adstringentia interna infusura I. 447. debilibus vicia I. 344. positive naturæ inimicissima I. 261. adeoque cautè exhibenda I. 262. quæ sint I. 446. quomodo agant I. 447. quæ methodo exhibenda? *ibid.* clysteribus non indenda I. 468. nocent ad abortum præcavendum III. 181. in alvi fluxibus I. 352. in convulsivis moribus III. 29. in dysenteria quæ cautione adhibenda III. 361. in expellendis exanthematibus III. 474. in febribus intermittibus I. 350. quomodo in tertiana cum fructu queant adhiberi II. 15. 17. roborantibus nupta quo in casu ad febres lentas commendentur? II. 181. nocent in fluore albo II. 206. in gonorrhoea I. 354. quæ tamen cautione adhibenda? III. 361. nocent in hæmoptysi à defluxione acii I. 354. II. 206. in hæmorrhagiâ I. 344. quatenus & quando in uteri hæmorrhagiâ conveniant II. 226. & *seq.* quâ cautione adhibenda in nimio hæmorrhoidum fluxu? II. 221. hydroperu signum I. 352. incaute usurpata in nimio menses fluxu malum hystericum concitant III. 61. polypos III. 282.

ÆGRI statim à morbo non nimis nutriendi sunt. I. 358.

Ægri aliquid concedant consuetudini I. 138.

ÆGYPTI cur dysenteria obnoxia III. 152.

ÆQUINOCTIUM venæ sectioni cur opportunum I. 454. & in convulsivis III. 29. cur circa illud auditus vicia exacerbentur? III. 241. quædam affectiones circa illud familiares I. 360.

ÆR, ejus natura I. 228. & *seq.* est universale menstruum I. 210. multum a se differt I. 103. nocivis exhalationibus quandoque scatet. I. 224. multa continet corpori humano infensa I. 207. ejus usus III. 429. ad sanitatem I. 104. sanitatem dispensat I. 101. duplex necessarius ad vitam & sanitatem I. 264. cur tanta ad vitam animantium conservandam

- servandam sit necessitas I. 156. ejus vis in corpus humanum I. 158. 253. tonum fibrarum diversimode afficit I. 35. magna pollet vi ad immutandum corporis habitum I. 156. mutat corporis functiones I. 291. pulsum I. 368. excretiones I. 381. morborum epidemiorum causa est I. 291. 334. ejus subtrahio quomodo necet I. 31. ejus naturam & vires nosse debet Medicus I. 258. quomodo aquarum inundatione salubris reddatur. II. 86.
- Air* in omnibus animantium succis reperitur. I. 264. quid in sanguine efficiat I. 45. & qualiter cum subeat I. 264. inspiratione non subit ipsum sanguinem I. 46. corpus tamen valde alterat. *ibid.* ejus in pulmones ingressu quare opus I. 45. per quas vias se corpori humano infuset? I. 211.
- Air* qualis conducatur puerperis III. 54. tabidis & phthisicis III. 294. variola laborantibus? II. 54.
- Air* qualis disponat ad abortum III. 180. ad auditus vitia III. 241. ad dysenteriam III. 154. ad febres exanthematicas II. 76. ad fluxorem album III. 68. ad purpuram III. 399. ad rachitidem III. 488. ad scabiem III. 427. ad scorbutum III. 373. ad singultum III. 124. ad sphacelum III. 389. quomodo frumenta corrumpat? II. 55.
- Air calidus*, ejus effectus I. 228. 334. debilitat I. 104. quid sub eo imperandum? I. 105.
- Air*, ejus constitutio praternaturalis quae in corpore pariat damna? II. 80. 82.
- Air crasser* impurus & infalubris I. 287. perspirationem mutat I. 288. 334.
- Air frigidus* qualis sit I. 470. ejus effectus. I. 228. 334. contrahit fibras I. 35. quibus cavendus. I. 134. valde frigidus & humidus cur noxius. I. 189. frigidus humidus perspirationi obest I. 228. 334. temperate frigidus praestat calidiori I. 104.
- Air humidus*, ejus effectus I. 228. 334. nocet. I. 105. humidus & calidus expandit fibras corporis nostri I. 35.
- Airis impuri* noxae quomodo avertantur? I. 104.
- Air incostans* repletionem interdicit I. 106.
- Airis imtemperati* noxae & quomodo avertenda I. 105.
- Airis mutatio* magnos ad nervosi generis sanandos morbos usus habet. III. 49. confert in asthma III. 101. in delirio melancholico & mania III. 262. in epilepsia III. 19. in scorbuto III. 376.
- Airis mutatis* subita nocet I. 105. 185. & 267. cutis tono I. 360. ad apoplexiam contribuit II. 242. ad odontalgiam II. 331. ad vomitum cruentum II. 213.
- Air purus* & temperatus qualis? I. 104. salubris est I. 287. tonum partibus solidis conciliat III. 373. quos effectus exerat in pulmones? II. 141. laudatur in tussi III. 114.
- Air ferens* excitat vires I. 33. 104.
- Air vespertinus* & nocturnus nocet. I. 211.
- Aenis viride* egregie callum abluunt. III. 465. quomodo adhibendum *ibid.* ejus aqua ulcerum putredinem arceat III. 449.
- Aetati* quos proferat morbos I. 266. quos gignat morbos I. 334. qualis in eo pulvis. I. 368.
- Aetate* abstinentium a tabaco I. 136. ut & venere *ibid.* quali victu utendum? *ibid.*
- Aetati* in historiis morborum necessaria I. 286. ad morbos facit I. 308. 349. pulsum mutat. I. 368. quolibet fusa peculiares habet affectiones. III. 65. 428. 469.
- Aethiops mineralis* quomodo conficiatur III. 493. confert in contusionibus ac sanguinis stagnationibus III. 18. gutta serena III. 231. luc venerea *Frid. Hoffmanni Oper.* Tom. III.
- cum aliis sudoriferis III. 418. refractariis morbis subcutaneis III. 432. tussi serena III. 114. vermibus extirpandis III. 493.
- AFFECTUS animi* alterant corpus I. 97. confecti minus nocent I. 138. gravide tangunt foetum I. 79. sanitatem affligunt I. 102. fenes valde laedunt I. 135. turbant negotium mensium I. 136. eorum noxae a medico indagandae I. 102. & seq. his affluet viscerum labe plerumque affecti sunt I. 103. ex iis mortui plurimi I. 102. animi sunt causae morborum proximae I. 173. aequè nocent ac venena, & cur? I. 189. 195. cur eos gravia symptomata comitentur I. 158. retropellendi facultate pollent. I. 207. Vide *Animi affectus*.
- ALBURNUS** I. 17.
- ALCALINA** in calculo renali praeservando laudantur, & quae II. 301. sanguinem fluidiorem reddunt I. 374. terrea absorbent I. 428. non soluta stomachum gravant *ibid.* alcalina salia celerissime solvantur. *ibid.* non penitus ab acido solvantur. *ibid.* soluta in tertium degenerant. *ibid.* eorum usus ad sanitatem tuendam I. 139.
- Alcalinum* sal urinum subit. I. 69.
- Alcali & acidum* non universalis morborum causa I. 179.
- ALEXIPHARMACA** quomodo ad genesin exanthematum contribuant? II. 118. in malignis minus proficua. I. 437. sola nocent in pestilentia II. 97. sed acidis nupta in eis conveniunt. *ibid.* nocent in petechizante febre II. 81. sed analeptici nupta interdum conveniunt. II. 97. nocent in purpura III. 408. laudantur in gonorrhoea cum aliis sudoriferis. III. 360. causae in dysenteria sunt adhibenda III. 158.
- ALIMENTA** cur homini tantopere necessaria I. 157. 246. eorum usu quotidiano egemus I. 106. sufficiens quantitas cur requiritur I. 246. eorum facultates ad tres classes commodè referuntur I. 107. naturam nosse debet medicus I. 158. opoma quoniam I. 105. sanitatem dispensant *ibid.* commoda vigorem praestant I. 33. etiam non optima parum nocent nisi quantitate peccetur I. 111. superato morbo parca danda I. 421.
- Alimenta noxia* quamvis? I. 109. eorum vitia quae generent morbos. I. 245. sensibus quae incommoda I. 134. villosam tunicam obstruunt I. 109. nocent in spasmodicis morbis. I. 320. valentis materiae debilibus noxia I. 421. acida nutritioni non quadrant. I. 108. finientem oppugnant *ibid.* coagulo obnoxia vitanda I. 109. constringentia nocent *ibid.* cruditatem generantia. *ibid.* duriora sunt incongrua I. 108. à quibus faciliè vincantur? I. 109. in primis viis fermentationem subeunt. I. 59. macida viscosa nocent I. 109.
- ALLIUM** remedium contra dysenteriam I. 232. ex lacte coctum remedium contra vermes I. 236.
- ALOE**, ejus virtutes I. 215. haemorrhoides movet I. 243.
- ALOPHRANGINARUM** pilul. insignis usus I. 216.
- ALOSTICA** quibus & quando conveniant? I. 434. cur infantibus nocent. III. 475. in defectu dispositionis ad haemorrhoides II. 292. haemorrhoidibus saepe nimium haemorrhoidum fluxum excitant. II. 219. nocent in vomitu cruento II. 215.
- ALPINUS** (Prosper) I. 21.
- ALTERANTIA** materiae correctioni dicata I. 427. quadruplici generis *ibid.* pro materia corrigenda variant. *ibid.*
- ALTERATIO** à natura non perficitur I. 413.
- ALTIO** &

ALTIORA loca aërem salubriorem habent I. 104.
ALUMINOSA an conveniant in febrium intermitten-
 tium curatione II. 15. 19.
ALVUS, ejus ratio in omnibus serè morbis habenda
 III. 217. ejus crebrior depositio salutaris I. 120.
 ejus libertati studendum I. 139. & quæ huc faci-
 ant medicamenta? *ibid.* ejus iusta successio plu-
 rimum confert ad tuendam valetudinem I. 157.
Alvus quomodo solvenda in abortu, III. 181. ar-
 dente febre, II. 215. calculo, III. 307. catarrha-
 li benignâ febre, II. 46. in colicâ, II. 289. convul-
 sionis motibus, III. 27. doloribus intestino-
 rum, II. 290. malo hypochondriaco, III. 55. 70.
 iliaci passione, III. 282. in luc venerâ III. 422.
 malignâ febre, III. 407. mictu cruento, II. 234.
 petechizante, II. 77. in puerperâ, II. 163. quan-
 tanâ, II. 28. quotidianâ, II. 35. semiterianâ,
 II. 42. tussî, III. 113. variolâ, II. 54.
Alvi adfritillus sanguinem ad superiora pellit, III.
 18. hinc congestiones ad caput salutaris, III. 267.
 est graviditatis familiaris, III. 181. morbos chroni-
 cos sustinet, III. 42. inducit sæpè à tincturâ
 antiphlogistica Grammanni, II. 287. vel ab acido
 in primis viis, III. 82. vel à convulsionibus in-
 testinorum III. 172. à dolore dentium; I. 168. ex
 difficili demissione; I. 237. à potu frigido; I. 233.
 à terrore oriunda, I. 191. incommoda capiti I.
 262. maxima est in cataplexi & unde? III. 43.
 disposit ad abortum, III. 181. aurium tinnitum,
 III. 241. mictum cruentum; II. 234. convulsio-
 nes suget, III. 29. maxime nocet in purpurâ;
 III. 408. quæ pariat symptomata in variolis II.
 54. 59. an fumo tabaci referetur? II. 290. est
 laborantibus quid faciendum vel fugiendum I.
 131.
Alvi aperitio quantum valeat ad morbos præscinden-
 dos? II. 39.
Alvi excrementa variant I. 66.
Alvina excretio non supprimenda I. 118. in morbis
 consideranda I. 288. 289. 384. multum ad sanita-
 tem facit. I. 288. 384. motus intestinorum in-
 dex I. 385. quæ evahet? I. 383. sub doloribus
 & spasmodis supprimuntur I. 320. nec non in capitis
 & nervorum morbis I. 386. sine noxiâ aliquan-
 do supprimuntur I. 383. in morbis prudenter mo-
 venda I. 386. tarda ex bilis defectu I. 384. ma-
 la: I. 385. involuntaria unde? I. 307. cur tur-
 betur à diuturnis meditationibus? I. 158. Vide
Purgatio.
Alvina facies motu peristaltico expelluntur I. 68.
 multum humidâ habent I. 66. earum examen
 chymicum *ibid.* Vide *Excrementa.*
Alvus quæ dimittit I. 66. infantum sit aperta I.
 133. pendet à conditione motus peristaltici I.
 67.
Alvi laxitas nimia nocet I. 118. nimia & inordi-
 nata quid indicet? I. 385. & seq. nimia quo-
 modo compensanda? I. 386. 443. fluxus quan-
 do, & quomodo in petechiali febre sit promo-
 vendus II. 87. quatenus conveniat in pulmonicis
 febribus? II. 139. nam eas solvat? II. 143. Quâ
 ratione in purpurâ sit dirigendus II. 71. quando
 in variolis sit procurandus II. 61. ejus fluxus à
 vermibus I. 235. temerè suppressus quæ pariat
 incommoda? I. 262. nimis fluxum habentes quid
 juvet? I. 131. quæ supprimant? I. 118. Vide
Diarrhœa.
Alvi plus iusto remota noxiâ I. 64. 66. ejus sup-
 pressio morbos inducit, I. 288. plurimorum mor-
 borum est matrix I. 203.
Alvi obftructio à spasmis intestinorum I. 304. suc-
 cus iniquat I. 320. varia pathemata inducit. I.

304. in febribus noxia I. 355. cur aliquando in-
 demnis I. 383.
AMARA; eorum usus I. 139. quo principio maxi-
 mè agant? III. 378. bilis defectum suppleant III.
 306. quomodo in quartana agant? II. 26. cur
 & quomodo vermibus inimica? III. 492. sæpè
 nocent in ictero, III. 306. laudantur in scor-
 buto, III. 378. putredinâ refistunt, & quæ? III. 390.
AMAUIROSIS, vide *Gutta serena.*
AMBRA grysea summum est analepticum, III. 14.
 ejus essentia quando in palpitatione cordis con-
 veniat III. 88. cum passulis decocta à Cratone in
 declinatione tussis laudatur. III. 113.
AMNISTIO quos effectus in corpus humanum infer-
 rat? III. 388.
AMNIO quid est ubi? I. 78. 80.
AMOR occultus & vesanus omnes animi & corpo-
 ris funciones perturbat III. 69. 253. sæpè epi-
 lepsie causa, III. 12. & delirium III. 253.
AMPUTATIO membrorum sphacelatorum ubi &
 quomodo sistenda III. 391. 392. quæ circa
 illam tenenda *ibid.* quæ ante & post illam conse-
 runt? *ibid.*
AMULETA quomodo operentur. II. 64.
AMYGDALE dulces, earum oleum certissimum contra
 venena auxilium I. 201. in doloribus & spas-
 mis utile I. 318. emersè in autium fociatè lau-
 datur. III. 243. vel ante, vel post anthesmatis-
 corum usum internè convertit III. 29. in calcu-
 lo renam & felles, II. 271. 300. dysenteria,
 III. 156. hæmoptysi, II. 205. intestinorum do-
 ribus à salivatione mercuriali, III. 420. ad-
 cum spermate ceti III. 112. 113. vel cum sym-
 po papaveris albi. *ibid.* ad fterora indurata ethi-
 cenda III. 70. cum anethi oleo in singultu III.
 126. cum spermate ceti in scorbuto doloribus
 ventris III. 380. crebro infantibus exhibitum no-
 cet III. 478.
Amygdale amara volucibus & canibus venena
 I. 198.
ANALEPTICA quæ sint? I. 444. quomodo agant?
ibid. liminate virtutis? *ibid.* pulsum mutant; I.
 369. motum resuscitant; I. 321. optima nutrien-
 tia; I. 444. quæ convenient gravidis ad abor-
 tum præcavendum? III. 183. laudantur in pes-
 silentiâ; II. 97. quando conducant in phreniti-
 de? II. 135.
ANASARCA hydrops quid? III. 323. differt à ca-
 chexiâ III. 314. ab hydropo polyo cordis jun-
 cto III. 328. à leucophlegmatia III. 323. signa
 III. 322. eo defunctum anastome III. 324. 4-
 tio symptomatum III. 325. cause occasionales
 III. 326. 334. ex asthma gignunt I. 352. à
 potione frigida. I. 234. prognosis III. 328. cum
 asthma juncti casus III. 338. cum tympaniti-
 de juncti & sanati exemplum; III. 334. indica-
 tiones curationis; III. 329. quæ aboluntur
 paracentesi, III. 329. & quando? *ibid.* purgan-
 tibus curatur, I. 436. III. 330. enemibus, III.
 330. & diureticis; *ibid.* quando sudorifica con-
 ferant? III. 331. balneis vaporosis discutiuntur. I.
 465. tertianæ succedens quomodo tractandus?
 II. 17. an venæ sectio io eo conveniat? III. 332.
 cautelæ circa purgatio. *ibid.*
ANATOMIA Medico necessaria I. 15. & 149. ejus
 neglectus aequè ac physices peperit sectas I. 15.
 & seq.
ANGINA quæ dicatur? II. 125. 126. ejus causa pro-
 xima & remotiores II. 126. ejus subiecta, II.
 126. sedes, II. 125. species I. 295. periculose,
 II. 127. quomodo gignatur? *ibid.* spatia debet-
 tur

ter I. 302. in quo differat ab aphthia, II. 126. ab inflammatione faucium levis, *ibid.* à prænellià *ibid.* à spasmus hysterici, *ibid.* quando in ea magis solida, quam fluida deglutiuntur II. 130. orta ex conciliu recenter calce obdusio; *ibid.* ex repellentium præposito usu discussa; II. 130. alvi fluxu soluta II. 129. mortis signa in ea II. 127. prognos *ibid.* suffocatione permittit I. 394. venæ sectione sub lingua levatur. I. 458.

459.

Angina epidemica quibus temporibus se extensit? II. 127. *externa* qualis dicitur? II. 125. *humida* & *sicca* qualis sit? II. 126. *symptomata* quibus ex causis oritur? *ibid.* & quibus accidat? II. 125. *vera* qualis dicitur? *ibid.* quomodo curanda? II. 127. quo pacto conveniant externa, II. 128. & sanguinis missio? *ibid.* *residivans* læpius sanata II. 130. ejus recidiva quomodo arcenda II. 129.

ANGLI cur phthisi obnoxii sint II. 293.

ANGUSTIA *vaforum* considerabilis I. 27.

ANIMA, ejus sedes quo loco statuenda? III. 45. & 253. arctissimum cum corpore habet commercium III. 45. quâ lege unita cum corpore I. 88. distinguitur nos à bruta; *ibid.* cum sensitiva non confundenda; *ibid.* & *sej.* sensitiva à rationali distinguenda. I. 88. quid sit. *ibid.* corpus alterat; I. 97. in mechanismo per mechanicas causas agit. III. 42. an sit causa proxima motuum & functionum vitalium I. 33. III. 270. in vitales & naturales actiones absolutum jus non habet. I. 97. non efficit omnes motus *ibid.* motus vitales ac naturales efficit. I. 102. spiritus *functiones* beneficio fluidi nervi sunt, III. 253. *irregulares* unde dependant? III. 10. utitur ministerio corporis I. 96. perperam à veteribus omnium motuum causa venditata I. 150. & 155. rationalis & consilii particeps non est consuetudinem principium medicinarum I. 152. sed est consentumum I. 151. non est medicinarum principium. I. 300. perperam dicitur natura I. 405.

ANIMALIA viva discussa imponenda morsis à cane rabido I. 179.

Animalium partes quenam difficultas consoquantur. I. 109. & *sej.*

Animantia *munda* lege lrasclitarum qualia I. 106.

ANIMI inclinationes multum pendunt à circulo sanguinis I. 52. mores sequuntur temperamenta I. 29. pathemata quomodo corpus alterent. I. 36. tranquillitas vitam sanam præstat I. 97. Vide *Affectus animi*.

Animi pathemata propriè afficiunt nervos partesque nervosas I. 310. effectus merè corporeos præstant. *ibid.* eorum effectus I. 287. functiones corporis turbant. I. 310. morbos pariunt I. 287. mutant pulsum I. 368. vires debilitant; I. 349. humores corumpunt. I. 319. ventericulum afficiunt; I. 313. & 319. excretionis critica fiunt; I. 288. ad colicam faciunt; I. 297. curationi obstant; I. 287. nocent in morbis exanthematicis I. 315. nec non inter & post pulsum, I. 319. post eas motus insubribis I. 412.

Animi affectus, quinam ad eos proclives? II. 323. pro varietate varios edunt effectus: III. 87. eorum nomina torâ motuum acconomiâ: III. 59. & 273. in nutrice & infantibus ad quos morbos disponunt? III. 15. & 471. morborum sanationem remanent; III. 412. morbos quiescentes sæpè revocant; III. 239. disponunt ad abortum, III. 179. cachexiam & chlorosin, III. 313. epilepsiam, III. 12. hypochondriacum malum, III. 69. lipothymiam, III. 269. motus spasmodicos

Erid. Hoffmanni Oper. Tom. III.

vagos, III. 37. spasmus œsophagi, III. 132. polyponam generationem, III. 282. quæ in febre petechizante pariant symptomata II. 78. & cur maxime sub usu aquarum mineralium nocent?

II. 117.

Animi deliquia differunt gradu; II. 268. in quo ab apoplexiâ & epilepsiâ? III. 269. à suffocatione; *ibid.* signa antecedentia & solutionis paroxysmorum: III. 268. subiecta & causa proxima: III. 269. medicarum causæ sunt animi affectus, III. 270. corruptio partis sphacelose; II. 271. dieta prava, III. 270. hæmorrhagie nimie, III. 271. hydrops pericardii *ibid.* morbi prægressi & qui? III. 270. opiata & narcotica, III. 271. polypos, *ibid.* venena, purgantis, & emetica; *ibid.* unde in passione hysterica frequentia, III. 53. & in puerperio? III. 276. & quomodo in his tractanda? *ibid.* prognos funesta & mala, III. 271. salutaria, III. 272. vid. plura in verb. *Syncope* & *Lipothymia*.

Animus in morbis considerandus: I. 287. conspirat cum corpore. *ibid.* ejus inclinationes à corporis structura, *ibid.* & progressu humorum per caput: I. 305. nimis sanguis ventericulum debilitat: I. 313. stupidus ex apoplexiâ unde? I. 350. ejus morbi hæmorrhoidibus solvuntur I. 343. **ANNI** humidæ & pluviosæ valde insalubres I. 209. tempora peculiare signant morbos I. 177.

ANNIVERSARIUM MORBI. I. 183.

ANODYNA mitiora I. 417. quæ sint & quomodo agant I. 448. quomodo utiliter adhibenda? I. 417. diaphoretici in doloribus nascenda I. 438. quenam sint lenissima III. 38. & 249. sub lingua detinere juvant in aphonia III. 249. laudantur in animi deliquis ab ira, III. 272. calculo scilico, II. 271. cancri enormi dolore, III. 454. delirio manico, III. 263. dysenteria, III. 157. singultu III. 127. spumo III. 313. vomitu, III. 145. quatenus ad peruronicas febres conferant? II. 140. in rheumaticis & arthriticis doloribus: II. 323. sicut sedant I. 60. eorum usus in progressu calculi per ureteres I. 71.

Anodyna cur genere nervoso debilitatis noceant, III. 56. cholera affectus III. 169. & in intermittentibus II. 17.

Anodynus liquor, vid. *Liquor anodynus*.

ANOREXIA ex nimis aquarum ardentium potatione I. 255. & *sej.* unde? I. 306.

ANTEPILEPTICA quenam sint? III. 28.

ANTHELMINTICA quoniam & quæ sint? III. 492. quæ optima? I. 452. variet eorum præparationes III. 493. num tantum circa novilunium porrigi debeant? I. 236. quid ante & post horum usum tenendum III. 29. & 493. fortiora quando in cardiagia verminosâ noceant? II. 262.

Antelminticus pilula, vid. *Pilula*.

Antelminticus pulvis, *sympus*: Vid. *Pulvis Sympus*.

ANTHRACES pestilenciales quæ dicantur? II. 94. quem possant curationem? II. 98.

ANTIDOTA optima II. 123. & III. 170. oleosa optima I. 312. & pinguis I. 430.

Apidatum universale veterum I. 201.

ANTINECTICUM Poteri sui in hœctica conveniat? II. 181.

ANTIMONIUM crudum specificum in passionibus rheumaticis I. 450. decoctum antivenereis cum fructu additur III. 418. in pulvere cum alio in arthritide inverteat II. 322.

Antimonii regulus medicinalis acres & falsas detractiones ardet I. 318. specificum in contumacia intermittentiæ I. 450.

X x 3 *Animas*

Antimonii sal sulphureum quomodo preparetur? III. 418. quod laudatur in lue venerea. *ibid.*
Antimonii sulphur auratum sudoriferis in lue venerea subjugatur. III. 418. in scribis salis defluantibus utile. I. 318. specficum contumacium intermittentium I. 450. & guttae serena I. 453.
Antimonii stictura acris cum aliis laudatur in capitis doloribus à feri vitio, II. 256. ad calculum renalem arcendum, II. 301. in lue venerea; III. 418.
Antimonii vitrum ventriculi inflammationem producit II. 123. cum alio ex ipso minus ritè preparatis cholera excitant. III. 167. bene preparata ex eo interne in ulceribus laudantur. III. 451.
ANTIPEPHTICA; quid circa illorum usum tenendum? II. 307.
ANTIQUARIUM Riverii quomodo preparetur? II. 26.
ANTISCORBUTICA quanam sint? III. 378. cur causè biliosas subiectis & juvenibus offerenda? III. 379. eorum succi optime cum sero lactis propinquantur? III. 39.
ANTISPASMODICA quæ sint? I. 448. quomodo agant? *ibid.* hæmorrhagias sistunt. I. 417. non solum curant malum hypocholestericum I. 317.
ANTONIARÆ aquæ cum lacte mixtæ in vesicæ vitio laudentur: II. 235. quando conferant in nimio hæmorrhoidum fluxu II. 221.
ANUS, ejus fistulæ sedes III. 460. causi III. 461. sæpe maturè consolidata phthiricæ causi III. 295. quomodo tractandæ? III. 466.
Anus procidentia sæpius fortiori sphincteris spasmio debetur II. 309. cur senibus & hæmorrhoidariis familiare symptoma II. 219. prolapsus balnei reprimatur I. 464. relaxatus involuntarius facit excretionem I. 307. Sphincteris valida constricção sæpe dolores colicos & flatulentos producit, & in quibus? II. 296.
ANXIETAS præcordialis unde suam trahat originem II. 122. in febre ardente. II. 112. quomodo à potu castè inducatur? III. 403.
AORTÆ fabrica cur notabilis? I. 41.
APHONIA quæ dicatur III. 247. unde I. 187. sedes ejusque causæ proxima III. 248. oritur à vermicibus I. 235. III. 248. à spasmio nervorum linguarum I. 305. & paralyfi I. 306. III. 248. in verminantibus obvis: I. 305. oritur ab ebrietate, III. 248. à ferro impuro stagnante, *ibid.* à sanguinis congestione ad linguam, *ibid.* prognosus, *ibid.* ex insultu apoplectico ortæ exemplum III. 251.
APHPHIA quomodo tractanda à paralyfi lingue inducitur III. 249. à catarrhali defluxione, *ibid.* quomodo sub salivatione mercuriali eveniens sit curanda? *ibid.* à vitio sanguinis orta quâ ratione tractanda? *ibid.* cautelæ circa venæ sectionem & spirituosæ. *ibid.*
APHTHÆ quæ dicuntur? III. 480. differunt inter se ratione gradus *ibid.* ab angina & in quo? I. 295. II. 126. causæ materialis & formalis III. 480. mediatæ & remotæ *ibid.* & 481. à cicuta aquatica usu sæpe producuntur: III. 93. symptoma ratio, III. 481. prognosus; III. 470. quomodo sint tractandæ? II. 129. præferunt in infantibus, ubi ratio habenda nutritia III. 481. & infans. *ibid.* quomodo in variolis? II. 53. 58. quæ externè in his conveniunt? III. 481. cautelæ circa symptomaticas. *ibid.*
APPOLEGMATITIA quæ sint & quando adhibenda? I. 442. laudantur ad arcendos malignos morbos. II. 86.

APPOPLEXIA, quot ejus gradus? III. 195. sanguinea & spasmodica quid & unde? I. 165. II. 240. levior. III. 195. *serafa* in quo consistit? II. 241. quo loco maxime accidet? II. 240. III. 195. signa antecedentia II. 241. symptomatica, atque effectus II. 240. eâ defunctionum anatome. *ibid.* in quo differat ab animi deliquiis III. 269. à pessone hysterica III. 52. è lethargo III. 210. à catalepsi I. 299. syncope *ibid.* *orra* vel *spuria* I. 299. 327. venæ causâ extravasatio; I. 299. 302. & 327. spuria causâ stagnatio; I. 299. 302. 305. & 327. vitam non admittit. I. 299. & 305. hysterics familiaris *ibid.* venæ sectione discutitur. I. 458.
Apoplexiam gignunt terror. I. 191. copiosius sumpta aqua Matthioli I. 256. pathemeta & affectus animi I. 182. II. 241. ita vehementior I. 191. ad eam disponunt debilitas generis nervosi, III. 197. excretiones sanguinea & serosæ suppresse III. 196. ex suppressione mensium I. 341. lochiolum I. 342. hæmorrhoidum I. 343. narium hæmorrhagiæ. I. 346. & *seps* ex scabie repulsa I. 336. podagra emanante. I. 338. mercurialis inopiè adhibita III. 197. quæ eam quomodoque progignunt; I. 220. à mercurialis in podagra datis exemplum III. 209. morbi epileptici ac convulsivi III. 197. polypi in vasis cordis & cerebri II. 242. III. 279. spasmii parium inferiorem III. 196. & duræ matris I. 305. fluxus cachectici II. 242. plethoricus II. 241.
Apoplexia cur non adeo frequens? I. 185. *pueri* rarior. *ibid.* sciam unde? I. 242. nonnunquam hereditaria I. 183. 349. cur præcelsissima mortis causâ I. 160. facile recidiva. I. 359. in paralysem transit I. 350. stuporem animi gignit *ibid.* qualis in ea pulsus I. 371. lethale in ea signum thoracis convulsus I. 306. spasmii suspensur I. 302. causâ mortis in ea I. 396.
Apoplexia exempla, ejus insultus in corpore purpurâ & podagra vexato; III. 207. levioris in lethelem mutatae casus; II. 245. à sinistro balnei calidi Carolinerum usu observatio, II. 244. fustellæ ex purgente acriori ortæ exemplum, II. 245.
Apoplexiam curandi methodus quæ clysteribus acrioribus absolvitur; I. 467. II. 243. externis & internis excitantibus II. 243. & venæ sectione congruo loco insitunt. *ibid.* & III. 198. cautelæ circa balsamica & apoplectice, II. 244. circa venæ sectionem: II. 243. præcaveatur alvum solventibus, II. 244. hæmorrhoidariis frictionsibus, hirudinum applicatione & exsiccis balneis, II. 244. venæ sectione, *ibid.* & exactâ victus ratione. *ibid.*
APOSTEMATUM generatio I. 165.
APPETITUS & digestio in omni ferè morbo laeduntur, I. 60. ejus causâ mechanica *ibid.* quibus de structus? *ibid.* è diuturnâ abstinentiâ perit; III. 50. à febribus acutis excitatur: III. 40. *nimius* à quibus causis oritur? III. 67. cur arte motuum spasmiodicorum invasionem audiat? III. 40. ejus defectu periculosa I. 246. plene dejectus in quartana quid indicet? II. 31. num bono consilio excitetur post febres malignas, II. 92. & intermittentes? II. 184. quibus revocandus? I. 467.
APRILIS cur catarrhalibus & exanthematicis morbis faveat. III. 402.
AQUA bona qualis I. 112. pro potu pura esse debet. III. 378. quomodo exploranda? I. 112. pluvialis subtilior reliquis *ibid.* medicine est universalis. I. 254. simplex optima medicina. I. 463. præcipue pluvialis, est præstantissima & medicina universalis.

salis I. 469. 476. aquae potus commoda I. 112. & seq. ejus potiores sani & longevi. *ibid.* cerevitiæ merito antepositur. I. 112. salubris, cur principio quoddam offendere videatur? I. 64. in salubris quænam. I. 112. coctione corrigitur. *ibid.*
Aqua calida potus commoda I. 111. à Zeechio pro secreto commendatur ad calculi renalis præventionem. II. 302.
Aqua frigida potus à variis auctoribus laudatur II. 293. ejus ad curandos morbos salubritas I. 470. sanat & præcavet morbos; I. 168. fibras roborat & firmat, II. 334. III. 139. acres humores temperat, & refert obstructions, II. 226. III. 377. sanguinis æstium reprimi, II. 294. frigidissima in febribus ad ardorem temperandum à Galeno est portenta I. 471. quomodo sudorem moveat? II. 54. non promittit exhibendus, II. 27. 295. 334. & quæ circa ejus usum tenenda? III. 32. quæ usum præliet in ardente, II. 113. in vitis partium externarum, ut arthritide, podagra &c. I. 475. in capitis dolore tam idiopathico quam symptomatico, *ibid.* in cardialgiâ ab ira, II. 260. in catarrho pectoris, III. 100. in cholera, III. 169. cholericis morbis, I. 472. II. 116. colicâ sanguinâ, II. 294. in passione colica & illiaca. I. 473. convulsivis III. 27. 32. in affectu spasmodico convulsivo I. 475. dyenteria I. 472. in ejectione vicidarum cruentarum I. 473. epilepsiâ III. 16. hæmorrhagiâ, II. 207. 210. hæmorrhagiâ ureri III. 38. in hæmorrhoidibus suppressis I. 473. major hypochondriaco I. 474. hysterico *ibid.* intestinorum doloribus I. 473. lithemia, III. 273. lippitudine oculorum III. 238. palpitatione cordis, III. 88. in pectoris affectibus, tussis &c. I. 474. in stomachi vitis, spasmus, ardore &c. I. 473. ulceribus: III. 384. 449. in vomitu bilioso diuturno. I. 472. nocet post emeticum III. 27. Morbis quædam Auctoribus ad usum illas pertinentia. I. 476. imperite à nonnullis Medicis hæc adhibita. *ibid.*
Aqua chalybeata à veteribus commendatur ad lienis morbos, III. 378. hæmorrhagias nimias: II. 220. vomitum præcavendum; II. 215. exterius & interius sunt proficue. I. 464.
Aqua minerales ædificiores sunt communi. III. 377. quænam principia recondant? III. 260. ingredientia ab Autore detecta I. 426. potissimam facultatem aquæ debent. I. 403. earum effectus & usus; *ibid.* & 377. balneis socianda. I. 464. continuato usu juvant. I. 423. quæ ante & sub earum usu teneoda? III. 71. 433. artificialis imitatio. II. 23. calidæ in subjectis impis cautè adhibendæ; III. 437. præcavent calculum, II. 272. polyposas concreciones, III. 283. erysipelatis recidivas II. 103. laudantur in cachectis & chlorosis III. 315. cutis affectibus, III. 433. in delirio melancholico & maniaco, III. 260. in malo hypochondriaco, III. 70. 71. in morbis à febribus intermittensibus incautè suppressis, II. 354. periodicis II. 168. morbis à sanguine impuro & spisso ortis, II. 265. in quatuordecim commaciaci, II. 35. quatenus in asthma convenient? III. 100. in febribus intermittensibus? II. 28. cum primis longis, II. 36. & cum eis conducant? *ibid.* quando in febre lentâ, II. 178. & quæ ita tunc præstidia surrogant? *ibid.* in phthisi, III. 300. infarctus & obstructions tollunt, I. 321. excretionem promoveunt; I. 348. succos depurant. I. 321. specificum in hypochondriaci & hysterici passione; I. 451. cum lacte quomodo cura insinuenda? III. 294. commendantur in arthritica & rheumatica doloribus, II. 322. 323. nimis

hæmorrhoidum fluxu, II. 221. purpura scorbutica, III. 405. rheumatismo scorbutico, II. 322. dia nimis utarpatæ quam noxam inferant? III. 71.
Aqua ad balnea quæ optima I. 464. quomodo emendanda. *ibid.* Aquarum infusus cohibet nimiam transpirationem. I. 120.
Aqua stagnantes & putrescentes noxia evitant æstivâ I. 207. & seq. quæ ratione inundationes ætrem reddant insalubrem II. 86. cur acrimoniam ingenerent plantis. I. 210. paludinosæ levissimæ I. 209.
Aquarum ardentium abusus quam noxius I. 255.
Aqua hydropicorum qualis constitutionis? III. 324.
Aqua intercus cur à veteribus ita dicatur & quid sit? III. 323.
Aqua laxans quomodo paranda? II. 23.
Aqua febrifera laudatur in externis capitis effusionibus, III. 18. mictu cruento, II. 312. cum balsamo vitæ in gonorrhœa ad injectionem, III. 363.
Aqua vite stomachica & carminativa an post cibum sumptum digestionem præmoveat? II. 291.
Aqua Antoniana, vid. Antoniana.
 AQUAGRANSENSIS *thermo* cur nimis calidæ sint? III. 244. ante earum usum corpus rièd præparari debet. II. 272. laudantur in calculo, *ibid.* ad polypos arceados, III. 283. in quibus morbis noceant? III. 244.
 ARARES quædam chymica reliquerunt; I. 21. argenti vivi usum docuerunt, *ibid.* bona remedia invenerunt. *ibid.* dyenterie sunt obnoxii & cur? III. 152.
 ARCANÆ adversus morbos specifica non dantur. I. 153. non semper effectus præstant. I. 290.
 ARCHEUS *Helmantii* signum. I. 17.
 ARDENS *febris* quæ vulgo dicitur? II. 111. quæ rectè dicatur? *ibid.* qualis in eâ pulsus, I. 371. sanguis? I. 373. & seq. ejus subjecta & causæ antecedentes; II. 112. causâ proxima. *ibid.* quibus regionibus rarior, quibus frequentior sit? II. 111. quam necessaria sit in eâ lingua insipida? II. 119. in quo differat ab aliis febribus continuis, II. 111. à marasmo simili, II. 119. à synocha, II. 111. quem exitum habent in febribus? II. 119. quid in eâ significant rigores? II. 114. in fene ex malâ curatione funesta: II. 119. copioso julepâ potu curata II. 116. quale regimen possat? II. 114. an in eâ conveniat venesection? II. 112. quomodo adhibendus potus frigidus? II. 118. imprimis aqua frigida? II. 113. & 115. qualis conveniat potus? II. 113. quomodo in eâ ducenda sit alvus? II. 115. cephalalgia tractanda; II. 114. finis fallenda: II. 115. continua in tertianam intermittentem mutata: II. 118. sanguinea copioso potu sanata II. 117. vide *Synocha biliosa*.
 ARDOR *ventriculi* unde oritur? II. 120.
 ARENA calida quâ ratione in intumescentiâ abdominalis confert? III. 345.
 ARGENTUM vitæ olim annumeratum venena; I. 197. nullam exerit in corpus operationem, nisi solum. I. 218. ex quo veri veneni nascantur induit? I. 197. 219. ut ex communibus veneni notis patet; I. 219. glandulas faucium afficit & salivalem lacrem copiosè ex eis ducit: *ibid.* cur tam vehementem producat in corpore humano effectum I. 220. vid. *Mercurius*.
 ARIDURA quibus tractanda. I. 431.
 ARMORACIA, ejus radix quale recondat principium? *ibid.*
 III. 378. laudatur in scorbuto. *ibid.*

- ARNICA** specificum ad sanguinem congruatum
I. 453.
- ARNOLDUS VILLANOVANUS.**
I. 21.
- AROMATA** insalubritatem alimentorum corrigunt.
I. 110.
- ARSENICUM** veteribus incognitum, I. 197. ejus patria: *ibid.* quomodo sumptum symptomata indicat & quæ? II. 126. 259. III. 142. eo extinctio anatome: III. 170. ad separationem corrupti in sphacelo minus tutum est: III. 390. ex eo fureto mors quomodo præcaveatur? II. 123. III. 170. externè applicatum nocet. I. 310. cum butyro capiti illitum sanefest peperit symptomata
I. 199.
- Arsenicum album** venenum fortissimum: I. 196.
- Arsenicus aqua** infamatum venenum. I. 198.
- ARTERIA** motu sunt instructæ: I. 41. tunicae crassiores deponunt caput vel cranium ingredientem. I. 84. II. 196. sunt venarum & valorum lymphaticorum radices I. 57. venis continæ I. 366. cur minores & pauciores venis? I. 41. uni in pedibus duæ venæ respondent; *ibid.* lyltaltico motu gaudent, I. 365.
- Arteria partis ligata** motus impotentiam facit. I. 36.
- Arteria bronchialis** secundum suam initium & progressum anatomicè describitur. III. 109.
- Arteriarum carotidum & vertebrarum** communicatio ad secretionem fluidi nervi facit I. 84. cerebri fibræ. I. 47.
- Arteria aspera** quæ dicitur? III. 109. ejus usus. I. 45. III. 109. ipsimum patitur I. 305. causa oppressionis pectoris. *ibid.*
- Arteriotomia** num in phrenitide conveniat? II. 32. num in dolore cephalico? II. 251.
- ARTHRITIS** quid veteribus & recentioribus dicitur? II. 317. ejus descriptio ab Aureliano: II. 340. causæ & incubabula I. 174. 179. 262. 298. ab acida. I. 253. causa proxima II. 317. 319. signa I. 298. prognos II. 320. 344. subjecta II. 319. sedes I. 298. quomodo gignatur? I. 302. causa materialis salina cujus indolis? II. 341. conferunt ad hanc animi adfectus, defies vita & luxuria II. 343. hæmorrhagiæ cessantes II. 319. excretiones sæpè naturales suppressæ. III. 343. veneris abusus. *ibid.* venæsectio neglecta. II. 317. differt ratione causarum, indolis, & gradu. II. 318. à rheumatismo; I. 298. II. 318. hæreditarius morbus. I. 349. quandoque anniverfaria, I. 183. benigna quomodo fiat maligna? I. 181. haud repente reprimenda. I. 263. facillè recidivas, I. 356. ipsam suppurat, I. 302. topicis excrucietur I. 298. 337. & seq. hieme magis affligit I. 336. cur autumno & vere maximè affligit? II. 319. cum colicâ sanguinè alternantem exemplum; II. 295. cum nephritide sæpè alternat. II. 259. transit in calculum I. 339. omnium morborum facillimè stationem suam deserit, atque ad alias corporis partes transit. I. 359.
- Arthritis celsam** sæpè ipsam vesicæ & dysurie causa. II. 309.
- Arthritis retro pulsa** sæpè cardialgiæ causa, II. 259. colicæ, II. 286. convulsionum, III. 25. hydropiæ, III. 328. lethargi, III. 318. palpitationis cordis, III. 86. rullis convulsivæ. III. 111. retrocedens peccat. I. 395.
- Arthritis vaga**, qualis materia in eâ peccet? II. 317. quomodo differat à motibus spasmoticis vagis? III. 34. vagæ specificum lumbicæ. I. 450. *ita unde?* II. 341.
- Arthritis universalis** incipiens unde? II. 321. sæpè ex rheumatismo. II. 319.
- Arthritidis præservatio** quâ ratione instituenda? II. 321. hæmorrhoidibus præservatur & solvitur. I. 343. balneis marialis levatur I. 465. curatus cur difficilis I. 298. curatio differt pro causarum differentiâ II. 321. & quomodo instituenda *ibid.* & 348. quæ conducant in imminente paroxysmo? II. 348. in cacochymicis subjectis, II. 321. 349. in hæmorrhoidaliis. II. 323. cautela circa anodyna & opia quæ tenenda? *ibid.* calidiora remedia & spirituosâ, *ibid.* lactis curam, *ibid.* & 349. topica, II. 322. & venæsectionem II. 323. & 349. Vide *Marbus articularis.*
- Arthritice febres** unde? I. 409. methodus sanandi eas. *ibid.*
- Arthritici** cur præ aliis ad venerem proci. II. 322.
- ARTICULORUM morbi** quomodo gignantur? I. 302. à spasmus ligamentorum; I. 303. topicis perpetram tractantur, I. 338. diureticis arcentur, I. 439. scarificatione levantur, I. 464. ligamenta nervotendinosa cujus naturæ, & quanam ob humorem heterogeneum in eis fiat? I. 360.
- ARTUS** imbecilles balnei firmantur, I. 465. eorum dolor singularis epidemicè grassatur, I. 298. ab arthritide distinctus. *ibid.* eorum dissensio in epilepsiâ unde. III. 12.
- ASA fetida** duplici nomine in hysterici salutaris, I. 448. specificum antheimimicum I. 452. clysteribus utiliter commiscetur I. 468.
- ASCARIDES** ubi maximè sedem suam habeant, III. 42. 345. 490. crassa incolunt; I. 332. eorum indicia, *ibid.* causæ & subjecta III. 491. prognos. *ibid.* sunt sæpè flatulentie causa, III. 445. motuum spasmoticorum: III. 42. quibus eliminandæ: III. 451. 492. Vide *Vermes.*
- ASCITES** hydrops quæ dicitur III. 323. differt à tumore gravidarum III. 328. ab hydropè polyop cordis juncto, *ibid.* verus à spurio; *ibid.* ejus signa, III. 322. morbi historia, III. 323. eo defunctorum anatome, III. 324. symptomatum ratio, III. 325. ejus ætus I. 168. ejus generis dependet ab hepatis vitio, *ibid.* & reliquorum viscerum labe. III. 326. causæ occasionales sunt animi pathemata, III. 327. diæta inconveniens *ibid.* à frigido potu in cachectico orti exemplum, *ibid.* & 336. dispositio naturalis, III. 326. exanthemata & ulcera retro pulsa & consolidata, III. 328. eventus, III. 329. Curatio infirmatur diureticis, III. 330. enematis & purgantibus, *ibid.* & roborantibus, III. 331. desperatus quomodo tractandus III. 332. quatenus paracemsi conveniat III. 329. scarificatio, *ibid.* & venæsectio? III. 332.
- ASSUKTA** senibus non mutanda temerè I. 134. & seq.
- ASSUMPTA** excretis debent respondere. I. 101.
- ASTHMA** quid sit, III. 94. ejus variæ species. I. 298. subjecta III. 95. 470. causa mortis in eo I. 397. eo defunctorum anatome III. 95. asthma tum incubabula I. 166. 168. 186. 187. ex æris vitio cum hydropè pectoris orti exemplum funefum, III. 104. variis causis I. 394. ex retro pulsa scabie, I. 336. & erysipelatè pedum III. 104. arthritide & podagrâ I. 338. à podagrâ retro pulsa lethale III. 104. ab exhalationibus calcis vivæ III. 106. à frigore vehementi enati casus. III. 107. suppressis mensibus I. 341. hæmorrhoidibus I. 343. à tumore & scirrhelentis tunica bronchiorum I. 398. specifica ejus I. 451.
- Asthma convulsivum** stricte dictum quid, III. 96. unde? I. 45. causæ, III. 96. ex repulsis faviis & aschoribus I. 336. prognos, III. 97. ejus signa ab

- ab Aretaeo descripta, III. 94. qualis in eo pulsus I. 371. funesta in eo signa I. 394. differt à suffocatione hysterica & catarrho suffocativo, *ibid.* I. 299. à pituitoso, III. 94. à sanguineo & humoralis I. 298. à polypo. I. 299. & 329. hydropem thoracis. I. 299. à materia lotus detenta podagrica orti exemplum; III. 101. à calculo velsæ felice subnata casus III. quomodo tractandum. III. 98. hydropem gignit I. 320. 352.
- Asthma flatulentum* quid & unde. I. 298. hyrochondriaci familiare. *ibid.*
- Asthma hydropici* funestis exemplum III. 104-338. I. 320. 352. cum anafarca juncti observatio. III. 334.
- Asthmatici infantilis* causa & curatio III. 495.
- Asthma pituitosum* à pulmonum atonia. I. 107.
- Asthmatici rheumatici* Carolicis sanati exemplum. III. 107.
- Asthmatici spasmodici* sedes. I. 168. ex potione frigida, I. 234. à victu post iram sumto, III. 103. à repulsa podagrarum; III. 106. à tuberculo in osse sterni, III. 108. spasmodicum cur rarius. I. 185. à spasma diaphragmatico I. 305. quomodo hydropem & oedemata pariat. *ibid.*
- Asthma spasmodico-cachecticum* quid? III. 96. à tumore pedum repulso casus, III. 103.
- Asthma spasmodico-flatulentum* quid? III. 96.
- Asthma spasmodico-hydrochondriaci* ab usu rasilicis squillæ sublevatum. III. 102.
- Asthma spasmodico-sanguinem* quid? III. 95. utriusque curatio; III. 98.
- Asthma suffocativum* perimie, I. 393. unde tardius producta suffocatio? I. 357. eo quinam oppressi soleant? *ibid.* à lachrye diaphragmatis ortitur, III. 96. à pectonis hydropis & polypo cordis, III. 97. quatenus in eo conducatur acidula & thermæ, III. 100. balnea mineralia, *ibid.* & diaretica & externa, *ibid.* emetica & purgantia, III. 99. & venesectio. *ibid.*
- Asthmatici balneis* leduntur. I. 305. & seq. quando se bene habeant, III. 106. cur ad apoplexiam prone? III. 142.
- ASTRONOMIA** an sit oculus medicinæ, I. 14.
- ATONIA** quid? I. 164. quæqueque? *ibid.* multorum morborum causa, *ibid.* Glandularum, quos edat effectus? I. 168. solidorum turbat functiones. I. 167. quæ spasmus sequitur plurimum phenomenorum causa. I. 169. III. 13. quid sit? I. 306. sequitur paroxysmus, I. 289. 321. spasmus deterior, I. 307. spasmus ingrat, I. 308. multorum morborum causa, I. 306. humores corrumpit, I. 320. novorum paroxysmorum causa, I. 321. balneis emendatur, I. 465. Viscerum ex quibus causa inducatur? III. 327. quâ ratione ad cachexiam & chlorosin disponit? III. 312. heclicos morbos; & quomodo tractanda sit? II. 182. hydropem. III. 326.
- ATROPHIA** ex scierho hepatis, I. 329. induratione pancreatis I. 328. nimis harmonia hâgit, I. 349. malè curatis alvi fluxibus, I. 352. balneis curatur. I. 464. differt à phthisi. III. 284. infantilis quid? III. 485. differt à rachitide, *ibid.* symptomata unde? III. 284. signa, III. 485. & seq. sectio est defunctorum anatomica, *ibid.* causæ mediatae & proxima, *ibid.* est sæpè scorbutica, III. 486. prognostic, *ibid.* quomodo tractanda, si à nimio absorbentium usu orta? III. 487. & seq. à pravâ digestionem, & transpirationem prohibita subnata quomodo sananda? *ibid.* à scorbuticâ materia labe oborta, quâ ratione tollenda? *ibidem.* cautela quæ circa purgantia tenenda? *ibid.*
- ATTENUANTIA** quæ sint. I. 429. quomodo agant? I. 430. variae virtutis sunt. *ibid.* cautiones in eorum usu. *ibid.*
- ATTRACTIO** non datur. I. 47.
- AUDITUS** quid? I. 91. ubi fiat & quomodo succedat? I. 89. 91. & seq. ejus organon auris I. 91. ejus vitia quæ? III. 239. differunt inter se *ibid.* quibus ledatur? III. 240.
- Audius gravis* unde? I. 92. & seq. gravitas apud senes unde? I. 242. difficilis oritur sæpè ab aurium ceramine induratio. III. 243. quomodo tractandus? *ibid.* à tubâ Eustachiana obstructâ, III. 240. quomodo sananda? III. 243. à laxitate partium acusticarum, III. 240. quibus remediis tollenda? III. 242. à spasma & siccitâte auris: III. 240. mediatae causæ sunt vitium ventriculi & intestinorum III. 241. ex vitio primarum viarum orti exemplum III. 246. decubitus seroforum humorum III. 241. ejus in femina senilis exemplum. III. 245. remotiores causæ III. 241. clysteribus revocatur. I. 467. *Continuatis* virtutibus purgantibus curati casus, III. 246. per inmedium sanati exemplum; *ibid.* abolitionis à mercuriali cura malè tractata, *ibid.* prognostic, III. 241. optimè sanantur diaphoreticis & diureticis, III. 242. laxantibus, *ibid.* pediluvii & vesicatoriis, *ibid.* quatenus in his convenient topica, *ibid.* & sanguinis missio? III. 243. quo modo tractanda catarrhalia *ibid.* & cum aliis morbis juncta? *ibid.*
- AVENA**, ejus decoctum quomodo parandum? II. 42 ad æstus & bilem temperandum in febribus intermittentibus; II. 14. laudatur in dysenteria, III. 156. nulli, III. 112. methodo Loweriana quomodo preparatur? II. 179.
- AVICENNA** laudat I. 21.
- AUSCULTUS** cordis motus in jam mortuis potest refinit. I. 31.
- AURIS** auditus organon I. 91. ejus anatomica consideratio *ibid.* & seq. à quibus rectè explorata? I. 20. structura III. 240.
- Aurium dolens* cur graviter ledatur? II. 336. vid. *Otalgia. fluxus purulens* unde II. 337 quomodo divertendus & exsiccandus *ibid.* tinnitus causæ III. 241. ex plethora exemplum, III. 243. in hamorrhoidario suborti casus, III. 244. post lethargum & intusum apoplecticum unde? III. 241. in purum inflammationem quomodo inducatur? *ibid.* in acutis febribus quid indicet? *ibid.* accedente afflatus & oedemate pedum levatur III. 102.
- AURIFIGMENTUM** veteribus arsenicum dictum, I. 197. sed pessime pro veneno venditatus. *ibid.* non confundendum cum arsenico chemo. *ibid.*
- AURUM**, ejus effectus in corpore humano II. 49. fulmians cur tutius in pilularum, quam pulveris formâ exhibeatur? I. 227. intusum laxans; I. 434. quâ ratione virulentum induat naturam. II. 282. quo in casu fit noxium? II. 49. infantibus quando perniciosum? I. 227. quatenus in singulis infantili conferta? III. 126. ejus fonticus effectus in febre catarrhal benignâ II. 49. in tenerioribus infantibus: II. 282. sanibus scilicet veneni naturam induit. I. 227.
- AUSTRIA**, cur ibi culica spasmodica endemia? II. 287.
- AUTOCRATIA** nature in quo consistat? II. 84. non nimis extendenda in medicando. I. 153.
- AUTUMNUS** easdem cautiones habet quæ ver: I. 135 cur adeo morbosus? I. 226. quos gignat morbos? I. 334. cur eo arthritici & rheumatici doles

dolores sint frequentes II. 319. 325. catarrhales febres II. 44. hæmorrhagiæ narium II. 325. tussis infantilis ? III. 111. 116. cur eo pejus habeant hæcilia II. 181. hypochondriaci II. 49. phthifici ? III. 286.

B.

BAGLIVUS I. 17. tonum fibrarum praxi accommodavit. I. 36.

BALBUTIES quid ? III. 247.

BALLONIUS I. 21.

BALNEA quando convenient ? I. 140. pulsum mutant. I. 369. eorum usus nostris parcius adhibendus *ibid.* commendatur veneno tactis, I. 201. in morbis contagiosis, præsertim chronicis, I. 205. calculo laborantibus. I. 226. quæ convenient in declinatione arthriticorum dolorum ? II. 322. in dispositione ad abortum ex pravo puerperii regimine ? III. 181. in calculo renali ? II. 300. capitis adfectibus, III. 223. cardiægiæ ex frigore, II. 266. convulsionibus, III. 28. cutis adfectibus, III. 436. fluore albo, III. 353. gonorrhoea benignâ, III. 359. gutta serena à variolis subsistentibus, III. 233. in hæcicis, & quando ? II. 181. illacæ passionis declinatione, II. 280. lentis infantum subitibus, II. 180. lue venerâ, III. 421. mensibus suppressis, III. 316. motibus spasmodicis vagis, III. 44. paralyti, II. 293. phthificorum symptomatum atrociam, III. 292. phrenitide, II. 133. pollutione, II. 359. purpura chronica, III. 406. quartanâ, II. 27. rachitide III. 489. recens natis, III. 472. rheumaticorum dolorum declinatione, II. 322. scorbuto, III. 380. singultu à transpiratione prohibita, III. 126. spasmus imi ventris, III. 267. vesicæ spasmò, III. diuturnis uteri morbis, II. 229.

BALNEA quibus nocent ? I. 140. post iram noxia ; I. 416. 465. nocent in cachexiâ, III. 316. in ordinate pedum, III. 322. plethoricis & spongiosis, II. 302. & quæ in his pariant symptomata II. 265. in adfectibus sporosis. III. 214.

BALNEA FRIGIDA, cautiones in eorum usu I. 465. perspirationem cohibent, I. 261. ex quâ ratione in chronicis morbis mirabiliter ferant opem ? I. 476.

BALNEA AQUE DULCIS quomodo paranda ? I. 464. III. 258. 436. tepida esse debent, III. 258. 306. quid ante eorum usum conducant ? III. 29. 258. horum virtus quibus adjuvetur ? III. 28. spasmos relaxant I. 464. III. 31. & æqualem sanguinis circuitum reddunt, III. 74. humores derivant. I. 463. perspirationem secundant, *ibid.* infaniam percutant, *ibid.* partum faciunt, I. 464. berotcorum operationem secundant ; *ibid.* in rachitide proficiunt, *ibid.*

BALNEA ADSTRINGENTIA quomodo agant ? III. 346. & quæ concitent damna in fluore albo usurpata ? *ibid.*

BALNEA NATIVA roborantia martialia quæ & ubi proficiunt ? I. 464. artificialia roborantia, eorumque usus : I. 465.

BALNEA VAPOROSA quæ & quando utilis ? I. 465.

BALNEA UTERINA ex quibus paranda ? III. 346.

BALSAMICA quæ sint ? I. 444. quomodo agant ? I. 446. varii usus. I. 339. & 446. bene temperata proficiunt, I. 176. accendis contagis inserviunt, I. 212. quamquam putredini resistent ? III. 390. subadstringentia laudantur in gonorrhoeâ. III. 360.

BALSAMUM DE COPAIVA cum saccharo in nephritide inveterata laudatur, II. 307. ipsius essentia sæpè

nocet in gonorrhoeâ.

BALSAMUM EMBRYONUM laudatur in alio ortu imminente, III. 181. in cholera, III. 169.

BALSAMUM PECTORALE egregie virtutis, III. 116. 292. laudatur in tussi habituali. III. 116.

BALSAMUM PECTORALE MEBOMII ex quibus preparatur ? III. 292. confert in phthisi. *ibid.*

BALSAMUM VITÆ præcipuum ex balsamicis ; I. 445. quales virtutes recondat ? III. 395. vires egregie refocillat, I. 318. 321. specificum in adfectibus ex debilitate cerebri nervorumque. I. 451. laudatur in abortu imminente, III. 181. auditus vitii, III. 242. cholera, III. 169. diarrhoea, *ibid.* & 176. epilepsiâ, III. 14. gutta serena, III. 234. odontalgia, II. 332. sphacelo, III. 395. verugine, III. 322. vomitu. III. 145. sine aëre in cephalalgia rheumaticâ, II. 255. cum aquâ Regine Hungariae in flatulentia, III. 344. in impotentia movendi à podagra, II. 348. hypochondriaco malo, III. 72. cum aquâ felleptariâ adinjectionem in gonorrhoeâ. III. 363. cum cortice aurantiorum syrupo in putredine gingivarum, III. 380. cum liquore amygdino in aphoniâ, III. 249. colicâ, II. 289. dysenteria, III. 156. singultu ; III. 125. nocet in capitis adfectibus ex virio primarium viarum, III. 227. in morbis a plethorâ & congestione. III. 231.

BAROMETRA commendata. I. 105.

BARTHOLINUS, I. 19.

BECCABUNGA cur excellens antiscorbuticum ? III. 378.

BECCHERUS I. 21.

BELGI cur phthisi sint obnoxii ? III. 29.

BELLINUS I. 17. & 21.

BERENGARIUS (JACOBUS), I. 21.

BERGARIUS I. 17.

BESORDICA utilis in exanthematicis, I. 408. præferenda sudoriferis. I. 416.

BETTERDUCUS pulvis in principio pestis commendatur. I. 204.

BIANCHI I. 17.

BILIS quid sit ? I. 61. alcalinæ est indolis, *ibid.* & sæpè cum urina secedit, I. 69. in quo viscere seernatur ? III. 102. ejus secreto motu peristaltico adjuvatur, III. 66. ad secretionem quæ faciunt. I. 62. officina hepatis. I. 61. examen ipsius *ibid.* principia constitutiva, III. 342. quantitas ; I. 62. sanguine ponderosior est. I. 61. sapo animalis *ibid.* usus, & quæ usum probent. I. 62. III. 302. & 342. ad elaborationem chyli facit. I. 61. corpori venenoso qui fiat ? I. 63. humor excrementitius idemque utilisissimus I. 62. coloris & fortioris excrementorum causa I. 384. in duodenum maximè ab ira effunditur, & quomodo ? II. 329. singularis profusæ casus. III. 342. afflate copiose generatur. I. 384. motum ejus quæ adjuvent ? I. 61. deficiens quomodo suppletur ? I. 63. & 118. quibus corrigatur remedia ? I. 190. excicata flammam concipit. I. 61. infusata æquæ in aquâ & spiritu vini solvitur. I. 61.

BILIS ATRA quæ veteribus dicatur ? III. 310. unde ortum trahat ? I. 252. ab acidis nigrescit. I. 379.

BILIS BOVINA, cum eâ experimenta instituta. II. 384.

BILIS CAUSICA facta veneni dati signa mentitur. II. 171.

BILIS COMMOTA ex quibus causis suscipiat acrimoniam, III. 171. & quomodo temperanda ? II. 113. 329.

BILIS CORRUPTA & inerti vomitum concitat, III. 142.

BILIS corrupta & inerti vomitum concitat, III. 142.

BILIS corrupta & inerti vomitum concitat, III. 142.

BILIS corrupta & inerti vomitum concitat, III. 142.

BILIS corrupta & inerti vomitum concitat, III. 142.

BILIS corrupta & inerti vomitum concitat, III. 142.

BILIS corrupta & inerti vomitum concitat, III. 142.

BILIS corrupta & inerti vomitum concitat, III. 142.

BILIS corrupta & inerti vomitum concitat, III. 142.

BILIS corrupta & inerti vomitum concitat, III. 142.

BILIS corrupta & inerti vomitum concitat, III. 142.

BILIS corrupta & inerti vomitum concitat, III. 142.

BILIS corrupta & inerti vomitum concitat, III. 142.

BILIS corrupta & inerti vomitum concitat, III. 142.

BILIS corrupta & inerti vomitum concitat, III. 142.

BILIS corrupta & inerti vomitum concitat, III. 142.

BILIS corrupta & inerti vomitum concitat, III. 142.

BILIS corrupta & inerti vomitum concitat, III. 142.

BILIS corrupta & inerti vomitum concitat, III. 142.

BILIS corrupta & inerti vomitum concitat, III. 142.

BILIS corrupta & inerti vomitum concitat, III. 142.

BILIS corrupta & inerti vomitum concitat, III. 142.

BILIS corrupta & inerti vomitum concitat, III. 142.

BILIS corrupta & inerti vomitum concitat, III. 142.

BILIS corrupta & inerti vomitum concitat, III. 142.

BILIS corrupta & inerti vomitum concitat, III. 142.

BILIS corrupta & inerti vomitum concitat, III. 142.

BILIS corrupta & inerti vomitum concitat, III. 142.

BILIS corrupta & inerti vomitum concitat, III. 142.

BILIS corrupta & inerti vomitum concitat, III. 142.

BILIS corrupta & inerti vomitum concitat, III. 142.

BILIS corrupta & inerti vomitum concitat, III. 142.

BILIS corrupta & inerti vomitum concitat, III. 142.

BILIS corrupta & inerti vomitum concitat, III. 142.

BILIS corrupta & inerti vomitum concitat, III. 142.

BILIS corrupta & inerti vomitum concitat, III. 142.

BILIS corrupta & inerti vomitum concitat, III. 142.

cum lacte in infantum in seipsum flagrans tormen-
tum caufa. II. 287.
Bilis cythica differt ab hepatica, I. 62. quâ diffe-
rentiâ uterque effluit? I. 63. cythicae usus I.
62.
Bilis intemperata cur à veteribus caufa februm in-
termittentium dicatur? II. 13.
Biliaris ductus motu gaudent peristaltico, I. 304.
spasmo affecti morbos gignunt, I. 304. 320.
consentient cum ventriculo; I. 320. convulsi
diuturnæ & cholerae caufa. I. 306.
BISTORTÆ radix alvum adstringit. I. 261.
BLANCARDUS I. 17.
BOERHAAVE I. 17.
BORNIUS I. 17.
BOLÆ alvum adstringunt, I. 261. absorbent, I. 228.
adstringunt simul. *ibid.*
BONTAS *errevise* unde pendat. I. 113.
BONTEKOE I. 17.
BORBORYGMI unde? III. 66. in epilepsiâ, III. 11.
ab aqua mineralibus frigida potus sæpe exacer-
bantur. III. 348.
BOSELLUS I. 17. & 20.
BOETIUS I. 21.
BOYLE refutatur, quod mercurium dulcem in dy-
senteriâ laudaverit. III. 157.
BRASSICA crassa, *Braunkol*, cur nonnunquam in-
ficiat? I. 232.
BRONCHIA quid, III. 109. eorum tunica glandulo-
sa I. 45. constricta formalem tussis constituunt
causam. III. 116.
BRUNNERUS I. 17.
BRUTA cur minis frequenter agrotent, quàm ho-
mines? I. 180.
BUSONES pestilenciales quales dicantur? II. 94. re-
trocedentes necant. I. 395. quomodo tractandi?
II. 98. *Veneris* quomodo generentur? III. 452.
à variis causis oriuntur; *ibid.* retrogradi; I. 107.
ex calidioribus tractata gonorrhœa. I. 340. re-
pulsis gravia inferunt mala. *ibid.* oriuntur à go-
norrhœa suppressâ, vel parum assimilatâ; III.
358. 361. 424. febris sæpe ipsi supervenit. II.
188. quibus internis, III. 452. & externis tra-
ctandi? III. 362.
BUTYRUM quale alimentum? I. 107. & seq.

C.

CACHEXIA quæ dicatur? III. 311. ab Aurelia-
no, III. 312. & Aretæo optimè describitur.
ibid. unde? I. 262. differt ab anasarca, atro-
phiâ, cacochymia, & leucophlegmatia; III.
314. à chlorosi & fluore albo. *ibid.* à scorbuto.
ibid. qualis in eâ sanguis I. 373. pulsus? I. 371.
ubi residet? I. 167. apud senes I. 241. & vete-
ras. I. 243. ejus signa III. 311. funesta, I. 394.
prognosis. III. 314. caufa proxima. III. 312.
causa lethalis cachexia I. 400. caufe occasiona-
les sunt animi pathemata III. 313. dieta inor-
dinata III. 312. desperatur à vicio dietæ indu-
ctæ casus, III. 318. excretionibus sanguineæ im-
minuat aut nimis III. 313. habitus corporis
spangiosus; III. 312. ex infano amore; I. 194.
ex potione frigida *ibid.* ex atonia hepatis &
lienis, I. 307. 320. suppressis menses, I. 341.
nimis hæmorrhagia. I. 349. puerperio, I. 350.
affluente, I. 352. alvi fluxibus male tractatis.
ibid.

Cachexia à diuturno macore exemplum III. 316.
ab inordinatâ vitâ & gravi macore suborta
III. 317. hæmorrhagiam rariam excipientis ob-
servatio III. 318. à malè curatâ quantâ cachexia

lethalis. III. 318. cur senibus magis familia-
ris quàm juvenibus? I. 170. 184. scorbutica ubi
insanabilis? I. 184.
Cachexia non juvat naturâ, sed solâ arte cura-
tur. I. 153. nam in metu cachexia ex defectu
criticarum sanguinis evacuationum usus potius
frigidi sit commendandus? I. 476. ejus curatio-
nes pervertit, II. 227. III. 314. indicationes cu-
rationis quæ explicantur apertionibus, III. 315.
aquis mineralibus, & quâ cautione, *ibid.* bal-
neis, III. 316. corrigentibus & evacuantibus,
III. 315. martialibus, & stomachicis. *ibid.* qua-
tenus in eâ conducatur venæsectio? III. 316. &
quæ tenenda circa tumores oedematofos? *ibid.*
Cachectici sibi caveant à frigore. I. 267. cur sæpe
epilepsiâ adficiantur; III. 12. erysipelate, II.
102. singultu, III. 125. palpitatione cordis, III.
86. sphacelo, III. 388. vomitu? III. 142. 147.
hæmoptysis ipsi ut plurimum funesta. II. 209.
CACOCHYMIA, ejus generatio, I. 164. 176. cur hy-
pochondriaco & hysterico malo accedat? I.
320. quomodo inducatur à plethorâ? *ibid.* ejus
medicatio à venæ sectione inchoanda? I. 139.
Cachectici sibi caveant à frigore, I. 267. pluribus
morbis patent. I. 188.
CÆLIUS AURELIANUS I. 21.
CAMENTARI cur ad tussim proclives? III. 110.
CAFFEE potus utilis. I. 110. infusi usus frequen-
tior feminis dissuadetur. I. 254.
CALCULI sunt morbus hereditarius. I. 349. nascun-
tur ab acidis I. 252. ab arthritica materia. I. 339.
ab hæmorrhoidum & mensium suppressione I.
345. ob invadentem mœlissimam feminina concita-
tant symptomata. I. 193. 236. caufa mortis in
calculo renum vel vesicæ est plerumque renum
corruptio. I. 400. nonnunquam ventriculi & in-
testinorum sphacelus *ibid.* accedunt demum
inflammationes lethales I. 393. funesta signa *ibid.*
quibus remediis ejiciendâ? I. 236. calculosæ
concreciones unde? I. 167. 168.
Calculus felleus, ejus varia figura & forma,
II. 268. magnitudo & numerus, *ibid.* quo lo-
co maxime reperitur? *ibid.* cum humanis &
bovinis repetitis experimentis. II. 269. ejus signa
I. 330. II. 270. III. 303. per ductus bilarios
transientis signa I. 331. est sæpe asthma caufa
III. 101. colici doloris II. 287. icteri. III. 302.
pathemata inde II. 270. caufe procatartice sunt
vita sedentaria & ætas. II. 269. & seq. spirituo-
rum abusus. II. 270. sanguis spissus in feminis
quadragenarius, *ibid.* ejus in plethorico venæ-
sectionis expertæ exemplum II. 272. in hydropico
& ictero vomitu rejecti exemplum II. 273. dolo-
res inde sunt sæpe periodici II. 271. immunitas
inde natorum dolorum casus. II. 273. acutissimi
doloris inde orti exemplum II. 275. spasmus
quomodo sedandus internis II. 271. & externis
ibid. cura præservatoria quomodo instituenda
II. 272. extra paroxysmum quæ conducant? II.
271. in cystide generatur ab ira. I. 197.
Calculus renum ex quâ materiâ generetur? II.
299. ex atonia eorum I. 307. 352. à spasmō ure-
terum I. 303. quomodo fiat? I. 353. quomodo
ejus dolor à passione hysterica dilatat? II. 52.
ejus signa; I. 330. faciliè recurrit, I. 244. pri-
mæ senectutis familiaris; I. 183. cur senali ætati
frequens? II. 299. quando dolores inducat? I.
330. & III. 101. movetur à frigore I. 267. à re-
frigeratione abdominis irritatur I. 315. ureteribus
impactus facit dolores. I. 331. cur ejus diagnosi
sit difficilis II. 150. differt à colica I. 297. 331.
cum colica cur sæpe compleretur. I. 297. 330.
quomodo

- quomodo vomitum, colicam, icterum, & vesicæ calculum gignat? I. 353. quomodo febrem excitet sine renum inflammatione II. 150. quâ ratione ingeneret febrem inflammatoriam? II. 151. vomitum? I. 168. 315. III. 143. in consensum rapit ventriculum I. 315. copiosæ excretionis cum dolore nephritico exemplum II. 305. Vide *Nephritis calculosa*, urgente dolore non expellendus I. 417. diæretica præcaverunt. I. 439. curatur. *ibid.* specifica in eo. I. 452. specificum ejus liquor anodynus I. 450.
- Calculus vesicæ** ex ipsius atoniâ I. 307. Helveti & Batavi familiaris I. 253. ex renali quomodo fiat? I. 353. ejus signa. I. 331. II. 308. in senibus provectoribus insanabilis, I. 184. cur rarior? I. 185. quomodo spissum excitat? II. 308.
- Calculus** qui frequenter fiam icterici? I. 353. 354. colicæ & flatibus cur patant? I. 353.
- CALENDARUM perpetuum** in corpore habere. I. 35.
- CALLUS** in fistulis quid? III. 468. ejus durities unde? III. 462. quomodo sanationem remorat? *ibid.* & quibus remediis absumendus? III. 464.
- CALOR** quid sit & efficiat? I. 33. augeat proventum saluum. I. 69. corporis quid sit? I. 51. est a circulo sanguinis? *ibid.* quibus augeatur? *ibid.* corpori necessarius est? I. 33. consumit succos: I. 56. exhalationes concitat: I. 67. juvat sanguificationem: I. 50. vitæ necessarius: I. 51. continuus in febribus quæ sit ejus causâ? II. 175. nimis tussitantibus nocet. III. 115.
- Calidus imitator** veterum. I. 33.
- Calidiora sunt** cavenda juvenibus. I. 334. morbum benignum in malignum convertere possunt I. 207.
- Calidus potus**, vide *Potus*.
- CALX viva**, ejus vapor quamvis accersit symptomata? I. 230. exhalationes quomodo anginam producant? II. 126. asthma, III. 106. & quid in eo profit? III. 107.
- CAMERARIUS** I. 17.
- CAMPHORA**, ejus virtutes. III. 100. & seq. alexipharmacis accensetur I. 205. quandoque ipsasmodicis. I. 448. an exaritet sanguinem? II. 222. laudatur in erysipellate retropulso, III. 218. in hæmorrhagis nimis, II. 220. 222. in hæmorrhagiâ narium, II. 198. in inflammationibus, II. 239. collo appensa præcaveat contagium dysentericum III. 158.
- Campora cum nitro** specificum in inflammatione, I. 450. in malignis. *ibid.* laudatur in siphacelo à causa internâ; III. 390. in variolis malignis; II. 58. in podagris exterius adhibere noxæ exemplum. II. 351.
- Campora oleum** quomodo præparetur? II. 215. externè confert in febre stomachicâ inflammatoriâ, II. 90. tympanidè, III. 33a. vomitu cuncto, II. 215.
- Campora spiritus** in doloribus & tumoribus diversos effectus, unde? II. 351.
- CANCER**, ejus definitio & generatio, III. 445. quâ ratione à scirrho generetur, ejusque signum. III. 446. & 447. symptomata. *ibid.* prognos. III. 448. quando serpere incipiat? III. 457. cur præcipue mammae sceminarum invadat? III. 445. ad eum faciunt hæmorrhoidum & mensium suppreSSIONES, III. 446. terror & morsina. *ibid.* prava diæta & temperamentum. *ibid.* dispositio hæreditaria & externa violentia. *ibid.* curatio, III. 450. quæ circa anodyna observanda? III. 454. febrem lentam & lipothymiam? III. 453.
- Cancer oculi**, ejus descriptio, III. 445. exem-
- plum. III. 456. diu durantis casus, III. 447. ejusque curatio, III. 450.
- Cancer apertus**, ejus descriptio, III. 445. causa, III. 446. interna & externa curatio: III. 451. an excindi debeat? *ibid.*
- Cancer exulceratus**, ejus exemplum, III. 456. cur tam facile perimat? I. 178. II. 216. quomodo? I. 34. quando funestus? I. 395. est insanabilis, I. 184.
- Cancer uteri**. Vide *Uterus*.
- Cancerosa corruptio**, quomodo ex variolis restitatur queat? II. 62.
- Cancerorum chela & lapides** absorbens I. 428. diuresin simul movent. *ibid.* cum acido sanguinem resolvunt, *ibid.*
- CANDELE** sebaceæ extinctæ exhalatio quam gravis? I. 230.
- CANES** Bononienses, qui minimè satiare perminant. I. 252.
- CANON**, medico-practici cupisdam canonis sensus. I. 471.
- CANTHARIDES**, earum natura & indoles venenosa. I. 225. quale sal recondant? III. 263. specficum in hydropè. I. 451. an externè in manâ conducant? III. 263. in & externè sæpiè mictûs cruenti causa: II. 234. in gonorrhœâ internè datæ vesicæ inflammationem & spissum inducunt. II. 310.
- CAPILLAMENTUM** incuræ dentium capitis morbos gignit. I. 336.
- CAPUT**, ejus cum ventriculo & intestinis consensum I. 313. II. 293. ipsius læsiones cur sæpiè vomitus sequatur? III. 144. quomodo ejus refrigeratio ad auditûs vitia contribuat? III. 240. lationes quâ cautellâ institui debeant? I. 140. doctior situs quid efficiat? I. 48. dolores infantili ætati familiares, I. 241. debile morborum infantium I. 308. & impuritas succorum causa, I. 320. ad ejus dolores exacerbatos quamvis faciant? I. 357. quamvis damna ex tinea retro-pulsa illi obveniant? *ibid.*
- CAPSULA lumbaris** lympham recipit. I. 58.
- CARBONES**, eorum exhalationes maxime noxiæ, præsertim coarctæ; I. 239. lethiferos producant effectus; *ibid.* eorum fumus quomodo homines suffocare valeat? III. 406. quomodo ad epilepsiam disponat? III. 13. & soporosos adductus? III. 212. igni in conclavi clauso vitam possunt extinguere. I. 34. & 105. fissiles aërem insufficiunt fumo non saluberrimo, I. 105. fissiles aërem purgant. I. 113.
- Carbunculi pestilenciales** retrocedentes necant. I. 395.
- Vide *Ambrales*.
- CARDIALGIA**, ejus definitio. II. 257. III. 494. sedes. I. 163. 179. II. 257. quid sit? I. 297. ejus generatio. I. 174. 186. 262. à frigida potione, I. 233. à vermibus. I. 235. ab acido. I. 252. ejus variz cause I. 297. & seq. à spissum ventriculi. I. 303. ex præpostero topicorum usu in morbo articulorum I. 341. mensium emanatione. I. 338. scemine familiaris I. 297. & vitæ nullæ addictis, & cur? II. 267. diabeti ab inflammatione & inflatione ventriculi I. 297. II. 120. à colicâ. II. 258. realis quomodo à spurâ distinguenda, II. 257. dividitur in *stansentem* & *spasmodicam*; II. 257. utriusque signa; *ibid.* dem. *stansentia* subiecta, II. 258. cause *ibidem*. & 259. pathematum rationalia explicaria, II. 258. prognos. II. 257. ab atoniâ & inflatione ventriculi pilul. de Myrace chronicæ scilicet exemplum; II. 267. infantili quæ? & signa III. 494. ex incongruorum ciborum nimia ingestione

gitatione ortæ casus, II. 264. ex frigore & intemperantia Carolinis sanata exemplum II. 266. *spasmodica* sæpe in epilepsiam transit; III. 22. ejus causæ sunt animi pathemata, II. 259. ejus inde ortæ & sæpe recurrentis exemplum. II. 262. ex iracundiâ ab adjuvato vomitorio sanata casus; II. 267. emetica II. 259. excretiones sanguineæ suppressæ; II. 258. ex hæmorrhoidibus frigore suppressis ortæ exemplum. II. 264. ex plethorâ & hæmorrhoidum fluxu non rite succedente enata casus. II. 265. parotides suppressæ II. 260. vermes, II. 259. sæpe in febribus exanthematicis præsens & unde? *ibid.* in dysenteridâ epidemica; *ibid.* in plethorico sub æstusâ coelo proficiscente ortæ exemplum, II. 264. evenus, II. 260. quibus levanda, I. 338. & 445. specificum ejus liquore anodynum; I. 450. in eâ hæmorrhoides salutare, I. 343. Carolinis & Tœplicesibus curatæ exemplum. II. 266. quæ præservacione sine constant? II. 262. indicaciones curatorie; II. 260. quæ expleantur aorborbentium, demulcentium, & laxantium *ibid.* clysterium II. 261. & extermorum usu. *ibid.* post tertianam enata quomodo tractanda? II. 260. ex crudasibus orta quomodo sananda? II. 261. ex veneno inducta quibus depellenda? *ibid.* in-fantilis quomodo tractanda in & extrâ paroxysmum? III. 494. *Symptomaticæ* quâ ratione curatio instituenda? II. 261. a mensium defectu quæ conducant? *ibid.* cautela circa verminose curationem II. 262. & filia. *ibid.*

CARNES ossium quomodo differat ab ulceribus? III. 443. ex quibus cognoscenda? III. 444. 465. in his venerea periculosa, III. 417. & quomodo tractanda? III. 420. 449. & 465.

CARNINATIVA ex quibus consistit, & quam sint? III. 343. quando nocent in graviore dolore intestinorum? II. 291. quando clysteribus addenda? I. 467.

CARO plus fluidi quam solida habet. I. 367. Carnes altæ ab elixis in quo differant? I. 108. augment partem sanguinis sulphuream: *ibid.* serarum, quo differant a domesticorum caribus? *ibid.* dant multum chylum, I. 63. plus nutriunt vegetabilibus: I. 106. quæ nutriendo optineant? I. 56. in morbis puerilis nocent. I. 109. earum usus senibus circumciendus, I. 135. & seq. animalium ex morbo mortuorum aliquid virulentum continent. I. 232.

CAROLINÆ *Aque* quibus principijs agunt? II. 245. III. 82. earumque virtutes: III. 83. ante earum usum quæ tenenda? II. 272. & 347. quæ diæte ratio habenda sub earum usu, III. 305. 310. quæ post illos conducant? III. 56. sunt frigidi acidi in morbis mulierum tiores. *ibid.* eas potantium urina qualis I. 69.

Carolinae Aque internæ & externæ usurpatæ abortum præcavens, III. 187. laudantur in asthma rheumatico, III. 108. cachexiâ ex mensium & hæmorrhoidum suppressione, III. 316. in calculis & quomodo eos resolvunt? II. 272. 303. in cancro & scirrho, III. 452. cardialgia hypochondriaci & spasmodici, II. 262. & 266. in cephalæ ex quartana, II. 255. colicâ sanguineâ cum arthritide alternante, II. 296. convulsionibus hysterici, III. 71. gonorrhœâ inveteratâ, III. 362. doloribus intestinorum & quibus? II. 290. utilissima sunt ad hæmorrhagias promovendas I. 444. laudantur in hæmorrhoidibus suppressis, II. 266. 326. III. 214. malo hypochondriaco, III. 72. & in hoc subjungenda balnea naturalia, III. 74. in hysterico malo, III. 56.

Frid. Hoffmanni Oper. Tom. III.

ictero, III. 305. 310. in mensibus suppressis, III. 319. ad polypos præsentis eodque præcavendos, III. 91. 283. ad podagræ recidivam attendam, III. 347. in plethorâ hypochondriaco-forbuticâ, III. 291. quartanâ & quando? II. 36. rheumaticâ & quando? II. 326. singultu hypochondriaco, III. 127. scorbuto, III. 377. virgine & quali? III. 225. ulceribus, III. 449. vomitu, III. 149. uteri obstructionibus; III. 458. revocando purpuram delirium tollunt; II. 72. tumores oedematosos citò abigunt & cur? II. 245.

CAROLINÆ *Aque* quando noceant in asthma, III. 105. in calculo I. 380. morbis capitis, II. 246. cur in balneo gignant febres I. 335. nocent in fluore albo, III. 363. in hæmorrhoidibus, II. 206. in renum adfectibus, II. 152. vesicæ exulceratione, II. 313. uteri erosione? III. 458.

CAROLINARUM *Aquarum* *sal* quâ dosi exhibendus? III. 70. ejus virtutes, III. 331. laudantur in cachexiâ, III. 315. in hydropo, III. 331. in ictero, III. 305. ad vermes exturbandos. III. 492.

CARTESII secta in Medicinam redundavit. I. 17.

CARUNCULÆ in urethra & gonorrhœa quomodo generentur & tollantur III. 358. 362.

CARUS quid & quoruplex sit? III. 210. differt a lethargo & apoplexiâ, III. 212. à syncope & suffocatione hysterica; *ibid.* cur sæpius febribus acutis jungatur, III. 211. & illas excipiat? III. 212. causæ mediatae, *ibid.* post malè tractatam febrem erysipelatam oborti exemplum, III. 217. post hæmorrhoides cessantes aquâ frigidâ curati; *ibid.* periodicè revertentis casus; III. 216. cum febre tertianâ complicati exemplum; III. 214. curatio. *ibid.*

CASEUS quale alimentum? I. 107.

CASERIUS, I. 19.

CASTORINA, eorum effectus in corpus humanum, III. 57. laudantur in hysterico paroxysmo, III. 55. in singultu, III. 125. vomitu. III. 145.

Castoreum non semper est anihystericum I. 153.

CASTRENSES febres quæ dicantur? II. 86.

Castrænsium morborum causæ. I. 210.

CATALEPSIS quæ dicatur? III. 44. ejus signa. *ibid.*

& I. 299. est morborum omnium rarissimus. III. 44. ab apoplexiâ differt. I. 299. an à tetano & caicho differt? III. 44. ejus paroxysmi, III. 45. subiecta, *ibid.* eâ defunctionum anatome; III. 46. sententiæ medicorum de ipsius causis, III. 45. causâ proxima; *ibid.* quomodo in hac liquidi nervi influxus intercipiatur? III. 46.

Symptomatum ratio; *ibid.* causæ mediatae sunt animi pathemata, III. 47. frigus horrendum, *ibid.* humores crassi præsertim commoti, III. 46.

primarum vitium, III. 50. ex vermis & hysterici passionis ortæ exemplum, III. 49. & alie occasionales, III. 47. ex fœtioribus meditationibus inductæ casus, III. 50. prognosis. III. 47.

quomodo tractanda in paroxysmo? III. 48. quæ conferant, si ex animæ vitio & frigoris vehementiâ, *ibid.* & ab excretionibus sanguineis suppressis fuscâ melancholicâ; *ibid.* cautela quæ tenenda circa acidâ & volatilis in paroxysmo *ib.* & narium scarificationem? III. 49.

CATALEPSIA externum retropellendi pollet facultate; I. 207. adstringens in hæmorrhagiâ uteri; II. 226. discutiens; II. 19. emolliens in bubonibus; III. 360. roborans in diarrhœâ contumaci, III. 169. in vomitu compescendo; III. 145. suppurans in tumoribus, III. 452. egregie virtutis in cancro & scirrho, III. 450. ophthalmiâ, II. 168. in podagrico dolore. I. 348.

CATARACTA, incipiens, spuria, & vera unde & quid? I. 91. ejus signa? III. 224. 234. incipiens ex ventriculo. I. 314. in quo differat a gutta serena, III. 228. suffusione, III. 235. a vera, III. 228. quomodo ex vicio primarum viarum oritur? III. 224. spuria cum vertigine junctæ exemplum & curatio. *ibid.*

CATARRHUS & coryza salutares quandoque morus: I. 120. & 410. unde. I. 165. à terrore; I. 191. cur frequentiores? I. 185. ex subtili mutatione aëris & perspiratione suppressa? I. 335. suppressus nocet. I. 340. venæ sectione quandoque gignitur. I. 460. & accretur *ibid.* cur circa æquinoctia plethoricis familiaris? III. 117. an ejus sola causa transpiratio prohibita? III. 119. cum cephalalgia narium fluxu soluta, II. 49. eorum frequens incurfus subleuatur: II. 48. quomodo venæsectione præserventur? *ibid.* balnea non ferunt: I. 465.

Catarrhus capitis quâ ratione ad auditus vicia disponit. III. 241.

Catarrhus pectoris unde? III. 285.

Catarrhus suffocatus unde? I. 187. sæpe ab oedemate pedum retropulsio, III. 119. 333. à polypto cordis III. 279. & vasorum pulmonalium. I. 330. à paralyfi nervorum pneumonicorum; I. 306. distinguendus ab asthma convulsivo; I. 299. III. 94. ejus signa & symptomata; I. 299. funesta ejus signa I. 394. quibus familiaris? *ibid.* infanti ætati familiaris I. 241. vetularum unde? I. 243. post morbillos variolas: I. 355. suffocatione perimit, I. 394. causa mortis in eo. I. 397. morbillos accedens quomodo tractandus. II. 67.

Catarrhalis benigna quæ dicitur? II. 44. ejus historia tractatur, *ibidem.* subjectis, *ibid.* sedes & causa, *ibid.* origo I. 173. 409. ex subtili mutatione aëris, I. 335. qualem habet pullum? I. 371. crises servat, I. 388. nonnunquam anniveriatur I. 183. quo tempore fit frequens II. 44. cur vere & autumnus potissimum infestet? *ibid.* cur maxime generetur tempore verno I. 266. in quo differat ab adfectibus colli scorbuiticis & venericis, II. 45. à catarrhali maligna, I. 293. II. 45. à quondam intermittente, II. 33. à rheumatica? II. 45. in quibus subsistit sit gravior? *ibid.* quæ exierat symptomata in feminis quæ menstruis carent? *ibid.* an sit periculosa, quibusque modis solvatur? *ibid.* an locum habuit recidiva? II. 47. methodus naturæ & artis in sananda ipsa. I. 409.

Catarrhalis contagiosa an & cur sit? II. 45.

Catarrhalis epidemica quo tempore grassetur? II. 45. & 47. anno 1709. epidemica describitur. II. 47. ejus in hypochondriaco malè pro malignâ habuit casus: *ibid.* cum colicâ complicatæ & venæsectione curatæ exemplum: II. 48. ex auri fulminantis usu funesta: II. 49. quomodo præservari queat. II. 45. & recidiva arceri queat? II. 47. quæ sint curandi indicationes? II. 46. quæ curatio specialis, *ibid.* præsertim in feminis menium suppressione laborantibus, II. 47. in hypochondriaci? *ibid.* quæ conferat regimen, II. 46. quæliis diætæ? *ibid.* quando conducatur vinum & nitrum, *ibid.* venæsectio? II. 47. 48. quomodo alvus solvenda, II. 46. uisus serena tractanda? *ibid.* in eâ nocent pectoralis dulcia, II. 47. & purgantia. II. 46.

Catarrhalis maligna, vid. *Petehtianæ.*

Catarrhalis rheumatica unde oritur? II. 49.

Catocius quæliis morbus? II. 44. an differat à cataplexi? *ibid.*

CAUSA præxima omnium, quæ in corpore humano sunt, est morus. I. 24.

Causarum metaphysicarum usus nullus in pathologia, I. 171. *morbificarum* ordines non confundendi. I. 173.

Causa morborum quæ sint? I. 406. simplices & manifestæ; I. 424. rebus externis maxime continentur; I. 291. plenumque ignorantur; I. 322. in nervosas maxime partes agunt, I. 308. 406. sectione patescunt; I. 290. 322. plures concurrunt ad proximam; I. 291. quosdam inepetæ I. 322. non confundendæ cum causâ mortis, I. 290. 402. Medico noscendæ, I. 286. 321. & seq. faciunt ad ejus famam, I. 322. in prognosi distinguendæ, I. 396. certa auxiliorum genera indicant; I. 322. difficulter cognoscuntur, *ibid.* cognitz non sufficient ad curandum, I. 290. 322. removenæ motu solidorum & fluidorum, I. 406. in eorum remotione methodus medendi politis; I. 406. 407. ex præcipuis imbecillitas. I. 348.

Causa mortis medico noscendæ, I. 396. sectione patescunt; *ibid.* non confundendæ cum causâ morbi, I. 290. quæ sint in genere, I. 396. in variis morbis? *ibid.*

CAUSTICA in nervosis partibus atrocia cient pathemata. I. 310. 311.

CAUSUS, ejus signa, I. 293. differt à tertiana continua; *ibid.* in eâ crisis fit. I. 388. Vide *Ardens febris.*

CAUTELE in therapiâ necessariæ. I. 286.

CAUTERIA quomodo agant? III. 230. quæ ante eorum usum observanda? *ibid.* quæ & quando conducunt in amputatione partis sphacelate, III. 390. in apoplexiâ, II. 244. epilepsiâ, III. 15. guttâ serenâ, III. 230. odontalgia? III. 332.

CEPHALICA quid & quomodo differat à cephalalgia, II. 247. et desinctorum anatome, II. 248. symptomata, *ibid.* sæpe ex ira ante sumtum cibum, & quomodo tractanda? II. 254. 255. ex gonorrhœa virulenta decocto sudorifero discutias, II. 256. ex consensu narium hæmorrhagiâ suppressâ orta, *ibid.* ex quartanâ cortice chinæ profligata carolinis discissa; II. 255. hypochondriacorum quomodo tractanda? II. 252. causas vide sub voce subjunctâ *Cephalalgia.*

CEPHALALGIA ejus ortus I. 163. 174. sedes sæpe est in dura matre, II. 47. pericranio, *ibid.* & tunica pinitaria; *ibid.* differt à cephalicâ gradu *ibid.* quantum causa generalis? II. 248. ejus variæ causæ I. 296. ex veribus I. 235. abscessus sinibus frontilibus I. 326. vino in venarico, I. 314. polypto sinuum cerebri, I. 303. coryza per frigus suppressâ, I. 340. menium suppressione, I. 341. narium hæmorrhagiâ, I. 346. spasmus pericranii debetur: I. 303. qualis à sanguine spisso & sero mucido? II. 248. qualis à lue venericâ, *ibid.* à materiâ filina ex corporis cortice retrocedente, *ibid.* à podagra retrocedente quomodo ingeneretur? II. 341. cur pueris familiaris? II. 249. cur adulescentibus? I. 184. cur frequentior? I. 185. periodica unde? I. 186. ventriculum per consensum afficit. I. 314. 319. narium stilicidiosis mitefit. I. 346. immanis cum auditus difficultate ex neglectâ venæsectione curatæ casus; II. 253. pernix cum oculorum ardente & dolorificâ desluatione in personâ diætæ vinozæ dedita curata. *ibid.*

Cephalalgia rheumatica unde? II. 253. in sacerdotibus hypochondriaco Carolinis curata: *ibid.* ex menium anomaliâ orta. II. 255.

Cephalalgia

Cephalalgia symptomatica & idiopathica origo, I. 475. II. 249. symptomatica quomodo in febre ardente tractanda? II. 114. sæpe quantæ juncturæ, II. 28. & quomodo tractanda? II. 255. unde oritur in tertiana? II. 49. prognos, II. 249. methodus præservatoria, II. 252. & curatoria ab organico orta quomodo instituenda? II. 249. an eo præsentè conferat venesectio, & quando? *ibid.* & 252. quatenus laxantia? II. 250. quo casu arteriotomia conducatur, II. 251. clystères, *ibid.* epithemata, *ibid.* trepanatio & vesicatoria? II. 250.

CEPHALICA spirituosæ in affectibus capitis ex resolutione pedibus applicanda. I. 318.

CEREBRUM humanum; ejus moles: I. 84. substantia corticalis: I. 85. sine glandulosis? *ibid.* ejus usus secretorius, *ibid.* vulnera que lethalia? I. 85. cum reliquis corporis partibus mira est consensio; I. 158. consensit cum ventriculo & intestinis, I. 287. cum corde; I. 289. tunicis quædam inserta? I. 224. ejus dispositio in morbis, & quomodo cognoscenda? I. 289. extravasatio in eo cur lethalis? I. 397.

CEREVISIA quænam bona dicenda? II. 323. optima, I. 112. præter effectus *ibid.* que infalubris? I. 288. inebriativa infalubris? I. 257. utrica noxia infirmis; I. 252. tenuis liberalior potus commendatur mulieribus; I. 243. qualis disponat ad dysenteriam, III. 155. epilepsiam, III. 13. nervorum resolutionem, III. 202. scorbuti genus? III. 376. nocet in convulsionibus, III. 27. delirius melancholicis & maniacis, III. 261. epilepsia, III. 16. gonorrhœa, III. 300. hæmorrhagia uteri, II. 227. mortis chronica, III. 155. purpura, II. 71. rubi, III. 114. verigine & vomitu, III. 146. Medicata pro bibulo hæctico, II. 182. in febribus, III. 376.

CERUMEN quid & unde? I. 91.

CERUOSA venenosa est natura. I. 228.

CHAMOMILLA vulgaris, ejus virtus antispasmodica unde? II. 42. ex ipsâ præparata laudatur in cardiacis, II. 261. nimio hæmorrhoidum fluxu, II. 220. in intestinorum doloribus; II. 288. cum lacte decocta pro senu in oalgi laudatur: II. 261. ejus flores peculiaris virtutis, I. 422. siliunt febres motus. I. 318. & 450.

CHARLOTTENBURG febribus obnoxium I. 208.

CHINA, ejus cortex cur sit efficax antipyreticum, I. 170. non tamen infallibile? I. 153. & 154. alvum adstringit; I. 261. pulum marat, I. 369. fibriles motus sistit; I. 318. cur alias antileptilibus præferenda? I. 422. quando proficit febribus? I. 380. continuato usu tollit febres, I. 423. specificum intermittentiæ; I. 450. quas inducat mutationes? I. 321. balnes secundantur. I. 464.

CHIRAGRA à spasmis ligamentorum I. 303.

CHOLEDOCUS dillus spasma corripitur, I. 304. unde icterus; *ibid.*

CHOLERA quid? I. 306. III. 165. differt à dysenteria, III. 165. à diarrhœa biliosa; *ibid.* est vel sicca, vel bumida; *ibid.* ejus subiecta; *ibid.* historia morbi, *ibid.* à veteribus traditur: III. 166. sicca ab Hippocrate delictitur, III. 165. genus nervosum in consensum trahit; I. 316. symptomatum ratio: III. 166. est peremptorium anatomicæ *ibid.* sedes, *ibid.* funesta signa, I. 393. causa proxima, III. 166. materialis, *ibid.* mediata sunt arsenicalia & alia venenosa; III. 167. ex fumo arsenico lethalis, III. 170. 171. à comestis passillis venenosis orta, III. 172. à bile caustica; I. 316. à convulsivâ affectione ductum

Frid. Hoffmanni Oper. Tom. III.

biliorum & intestinorum, I. 306. cibi dulces & fermentisibiles, III. 167. 168. per fraga copiosius assumpta productæ exemplum: III. 174. quomodo tractanda & tollenda? III. 168. & 170. gravis iracundia III. 167. eam subiectæ & potu aquæ frigide curatæ casus, III. 173. sero luctis sanata exemplum; *ibid.* falso à veneno derivata, III. 171. sicca cum humidâ complicate casus, III. 174.

CHOLERA infantilis unde? III. 167. prognos, III. 168. cautela tenenda circa anodyna & roburantia III. 169. aquæ frigide potum *ibid.* lac ejusque serum & laxantia, *ibid.* & venesectiones, *ibid.*

CHOLECYSTIS quæ dicatur? II. 112. quæ vocetur acutissima, *ibid.* & mitis acuta? *ibid.* ejus causa proxima; *ibid.* citio sanata exemplum: III. 117. ejusdem potu aquæ frigide curatæ casus; II. 118. tertianæ typum habentis & curatæ casus; II. 119. quomodo tractanda sit? II. 112. an in eâ conducatur venesectio? *ibid.*

CHOLERICI qui sint? I. 44. habent fibras tensas, I. 36. eorum proprietates, I. 131. & dieta; *ibid.* in quos morbos facile incidunt? I. 243. cur doloribus magis sine expositi? I. 180.

CHORDAPSUS qui dicatur? II. 172. 275.

CHORION utero continuum. I. 79.

CHRONICI morbi non juvantur & curantur à sola natura, I. 153. & 410. quomodo curandi? I. 260. cause eorum frequentissime obstructions; I. 411. quæ ad generationem ipsorum ficiant? I. 403. quomodo arcendi? *ibid.* optima eis sanandi methodus. I. 411. continuato medicamentorum usu tolluntur. I. 423.

CHRONICARUM passium fundamentum I. 158. 164. 174.

CHYLEUS quis sit? I. 63. ejus natura I. 273. albedo unde? *ibid.* elaboratio perficitur in intestinis: I. 61. progressum que juveni? I. 65. secretionem juvant valvule conniventes dicte, *ibid.* differt à sanguine, I. 50. non est proxima nutritionis materia; I. 56. quomodo fiat sanguis? I. 50. copiosum chylum que alimenta suppeditent? I. 63.

CHYLIFICATION que faveni? I. 139.

CHYMI in ventriculo reliquæ acide juvant digestionem. I. 60.

CHYMICA scientiâ Medico opus, I. 14. & 20. Chymica remedia quando periculum in mora proficiunt. I. 422.

CIBUS loco salubri & puro & sereno capi debet? I. 104. & 264. non assumendus in locis contagio infectis: I. 204. ordine assumendus, I. 110. non simul & semel: I. 115. cibi multum faciunt ad sanitatem. I. 287. sumendum regula. I. 115. crudiores quas noxas inferant? I. 110. ingesti mutant pulum I. 368. viscosi inflationem ventriculi, I. 297. flatulenti colicam; *ibid.* avidius ingesti recidivas parant. I. 289. corripui & alieni cur noxi? I. 197. ad illorum promotionem coctionem quænam aqua adhibenda? I. 469. pauciores alvum adstringunt: I. 261. optimorum abundantia nocet: I. 114. nimietas sanitati inimica, I. 246. non tamen aquæ nocet robustis ac imbecillis; I. 247. quantitas differt secundum individua. I. 114. & seq. varietas facit voraces. I. 115. abstinentia in dolore graviori utilisima. I. 237.

CICUTA; ejus natura venenosa: I. 197. extenuis incommode usurpata petuoscia concitat symptomata; I. 199. quo pacto vim suam summat exercet? I. 198. terrestris cocta furorem parit: I. 200.

Y y 2 Cui

CINNABARIS aream antepilepticum I. 423.
Cinnabarius quâ ratione rite preparatus dicatur? III. 16. laudatur in epilepsia à violentia externa, *ibid.* gutta serena, III. 14. lue venerâ, III. 423. in purinacibus oculorum & capitis doloribus, II. 169. in rachitide: III. 483. nocent in moribus spasmodicis: III. 40. quomodo antispasmodica? I. 448.
CIRCULUS sanguinis sine respiratione non fit: III. 94. est ipsa natura veterum morborum medicatrix; I. 52. est totius Medicinæ fundamentum I. 372. est causa agilitatis & roboris, I. 51. caloris, *ibid.* chylicationis, I. 50. secretionum & excretionum. I. 51. quoties hori succedat? I. 368.
Circulus sanguinis diffusus per caput, I. 17. per hepar, I. 48. venam portæ, I. 49. omentum, lien, I. 48. colon, I. 48. vasa spermatica, I. 49. uterum, *ibid.* tardus & impeditus in abdomine quomodo producat quantam? II. 24. in capite quomodo cephalalgiam inducat? II. 248. quâ ratione cacochymiam inferat, III. 445. calculum felleum, II. 84. rheumatismum? II. 319. cur obesitas & spongiosis talis maximè deprehendatur, III. 186. proceribus? III. 281. præsertim cur talis sit per hepar, III. 77. 280. pedes, II. 346. & uterum? III. 186. *celer* per pulmones & renes I. 50. *creber* cur necessarius I. 368.
Circulus sanguinis aequalis & liber unde dependet? III. 388. arceat putredinem, III. 455. præservat à morbo: I. 52. functiones animales conservat; III. 10. quibus promoveatur & restitatur? III. 70. *austior* an constituat febrem? II. 10. *inæqualis* quid efficiat I. 43. & in quo consistat? I. 165.
CIRCUMGYRATIO, ejus sensus in vertigine unde? III. 220. 252.
CITRI succus optime alexipharmacus. I. 204.
CLAVUS periculosè exciditur I. 311. *hystricus* a spasmu pericranii. I. 303.
CLIMA mutat ingenia. I. 97.
CLOPTON *Hoeveri* laudatus. I. 20. & 72.
CLYSTERES quotuplices? I. 466. affines balnei; *ibid.* variè quomodo parandi? I. 467. tenuia potissimum afficiunt, I. 468. late vim diffundunt; I. 318. & 468. quidam ferre nequeunt, I. 468. post passum manus proficui, *ibid.* non nimis crebro injiciendi, *ibid.* variè in morbis usui; *ibid.* non capiant qui sunt nature sensibilis, *ibid.* acres non statim applicandi; *ibid.*
Clysteres non habent locum in acutis & exanthematicis morbis, III. 274. in febrium epidemiarum paroxysmo; II. 64. cur in torminibus ventris sæpè non incommittit possint? III. 48. in dysenteria applicari & regredientes quale signum præbeant? III. 155. in febribus utiles. I. 355. antifebriles & nutrientes secretionem in crassis fieri confirmant. I. 64. emollientes commendantur calculo laborantibus. I. 336. qui & quando convenient in apoplexia, II. 243. asthma, III. 98. calculo renali, II. 300. cardialgiâ III. 261. cataleptico paroxysmo III. 15. cephalalgia, II. 249. convulsionibus & epilepsia infansia, III. 17. 28. 485. dentitione difficili, II. 222. dysenteria, III. 156. flatulentia, III. 444. fluore albo, III. 352. gravidis, III. 182. gutta serena, III. 230. hæmorrhagiarum, II. 199. hydrops, III. 330. hypochondriaco malo, III. 70. 73. passione hysterica, III. 55. 63. ictero, III. 304-309. iliaca passione ab hernia, II. 278. febribus intestinorum inflammato-

ris, II. 172-173. odontalgia, II. 331. palpitatione cordis, III. 88. in invemiente paroxysmo podagrico, II. 348. quartana, II. 26. 28. rachitide, II. 201. III. 489. & 490. scorbuticis abdominis doloribus, III. 380. singulis infantili, III. 126. tertiana, II. 16. 17. 20. torminibus infansum, III. 479. tussis, III. 113. vertigine, III. 221. vesicæ ipsasmo, II. 312. vomitu, III. 146. vomitu creto? II. 215.
Clysteres antelmintici III. 29. 32. *antifebriles* I. 467. *ex cortice china* quatenus in quartana conferant? II. 28. 31. fieri qui sint & an concineant in intestinorum doloribus? II. 270. & 289. *ex urina*. I. 467.
COBALTI nativi vis venenosa. I. 196.
COCCULI picibus moriferi. I. 198.
COCHLEARIA, ejus principia cohibitiva, III. 378. cum lacte infusa laudatur in scorbuto; *ibid.* *Conserve*, quâ ratione commodè biliosis ostenda? III. 379. *spiritus* cur junioribus & biliosis cautè exhibendus? *ibid.*
COERCITAS ex repulsa tinea capitis. I. 336. scabie, *ibid.* consolidatis antiquis ulceribus, I. 337. *ex epilepsia*. I. 359.
COELUM asperum & frigidius quare ab ægre vivendum? I. 358.
COENA qualis optima? I. 110. senum sit levis; I. 134. in eâ quæ non sint apta? I. 115.
COFFEE fabæ quale sub additione suscipiant principium? III. 403. ejus potus noxius & lenoxius; *ibid.* & II. 74. cur Asiaticis populis minus nocet? III. 403. cur in pleuritique alvum adstringat? *ibid.* an conferat in paroxysmo febri; II. 17. quâ ratione ad chlorosum III. 313. & purpuræ genesis contribuat? II. 7074.
COGITATIO intensius quid efficiat? I. 102. profundè corpori nocent; I. 194. limitatum habere vim in actiones mechanicas. I. 405.
COITUS cur brevis epilepsia dicatur? III. 33. quâ ratione chlorosis tollat, III. 316. deliria, III. 262. epilepsiam, III. 12. 18. malum hystericum? III. 56. 64. multos foeminarum morbos aufert: I. 78. post gravem affectum non celebrandus; I. 196. sæpè cum celebrantibus quæ sint terrenda? I. 119. *inmoderate* ad abortum disponit, III. 179. lactationis tempore institutus quæ inde in infansum redundent mala? III. 471. *impur* quâ ratione gonorrhœam, III. 358. & luen veneream inducat? III. 413. nimius & præmaturus, *vid. Veneris Excretionem*.
COLOCYNTHUM venenatè est natura. I. 20.
COLICA quæ dicatur? II. 284. unde? I. 163. ejus sedes primaria, I. 164. quæ pars in eâ maximè patiatur? II. 284. senum unde dependet? I. 241. subjecta. II. 286. calculosis cur familiaris I. 353. hypochondriaci & puerperis II. 290. & quomodo in his tractanda. *ibid.* prognos; II. 287. & 288. symptomatica unde? II. 284. oritur sæpè à morbis prægressis improvidè curatis, II. 287. & quomodo tra tractanda? II. 296. ex morbis exanthematicis vel retrocedentibus, vel non expulsi, & quâ ratione tollenda? II. 297. ex arthritide præpositè tractata I. 339. à frigida potione. I. 233. suppressis menses, I. 345. hæmorrhoidibus, I. 345. 374. quomodo differat à cardialgia? II. 258. à doloribus iliaci II. 284. à dolore calculi & hypochondriaci? I. 297. à ipsasmo intestinorum. I. 303. nonnumquam nephrenica I. 297. partit icterum I. 314. 354. faciliè recidivat, I. 356. parafin relinquit, I. 354. sphacelo necat. I. 401. eâ de functionum anarome; II. 288. quomodo ad epilepsiam contribuat, II. 287.

- 287.** III. 12. 15. & peripneumoniam? II. 142. ejus cum febre catarrhali benignâ junctæ exemplum. II. 48. cur sub frigore ingravescat, sub æstu remittat? II. 48. 49. venæsectione sæpè tollitur. I. 344. quibus levanda? I. 445. anodynus primum excipienda, I. 447. ejus specificum liquore anodynus; I. 450. in hac curandâ interdum ad contraria remedia transiendum. I. 473.
- Colica biliosa**, ejus causæ & symptomata; I. 297. II. 286. a spasmo ilei; I. 304. cur sæpè ictero jungatur? III. 307. in œmopota ex frigore curatæ exemplum; II. 293. quomodo curanda? II. 288.
- Colica cardiaca** ex coctione carnis affatæ vervecinæ & frigore ortæ casus; II. 263.
- Colica chronica** quæ? II. 287. ejus cum antriuæ alternantis exemplum; II. 295. herniam producentis Carolinis & Tarpicenisibus curatæ casus. II. 292.
- Colica convulsiva** I. 297. metallurgis unde familiaris? III. 203. ejus ex gonorrhœâ adstringentibus suppressæ exemplum; II. 295. ex icl & superveniente terrore subortæ casus. II. 291. consensibus intestinorum testis. I. 316. venæsectione curatur. I. 460.
- Colica flatulenta** quæ dicatur, & unde? I. 297. 332. II. 285. primæ senectutis familiaris I. 184. quâ ratione differat à flatulentia? II. 285. a nephritico calculo dolore? II. 298. ejus causæ, symptomata, & generatio. II. 285. 286. ejusdem cum salivatione rati & singulari exemplum. III. 347. ex icl & superingestâ carne suillâ indolentæ casus; II. 295. quomodo sananda, II. 289. & an in eâ conducant carminativa? II. 290. venæsectione exacerbatur. I. 360.
- Colica hamorrhoidalis** I. 297.
- Colica hysterica** I. 297.
- Colica sanguinea** ex quibus causis oritur? II. 286. ipsius ex laudâ diutâ & vinorâ ortæ casus; II. 293. ex mensibus terrore suppressis aquâ frigida curata. II. 294. ex hæmorrhoidibus minus rite fluentibus enata, II. 295. quomodo tractanda? II. 288.
- Colica saturnina** unde? II. 286. ejus curatio; II. 289.
- Colica spasmodica** quæ? II. 285. ejus signa & causæ I. 297. & sæpè, endemia quandoque est; II. 287. symptoma sæpè est calculi fellei, *ibid.* aut renalis, *ibid.* interdum ex tertiana intermittente oritur. I. 164. existit interdum vomitus causâ; III. 143. metallurgis solemnis; I. 316. vehementissima, I. 297. in eâ coalescunt quandoque intestina; I. 402. levatur clysteribus oleosis; I. 467. minus in eâ conducunt purgantia; II. 290. & quæ cautelæ tenendæ circa acidas & theriacas, III. 100. & opiata? II. 290.
- COLLYRIUM** ad ophthalmiam; II. 166. *acria* in epithorâ quæ pariat damna? III. 236. *frigidâ* quæm causè sint adhibenda? II. 167.
- COLOCYNTHIS** an in hydropse conveniat? III. 332. cocta vim purgativam perdit. I. 214.
- Colocymbiacorum** virtus. I. 215.
- COLUM**, ipsius situs & textura; II. 284. III. 66. flexura elevata quæ pariat incommoda? III. 341. flatus sæpè in hoc tumorem durum constituunt, III. 66. 77. 344. flatus sæpè distenditur. I. 352.
- COLOR** ex atro viridescens in hydropse analarica unde? III. 323. flavus in ictero; III. 302. pallidus in cachexiâ. III. 312.
- COLOSTRUM** quid? III. 473. ejus usus; *ibid.*
- Frid. Hoffmanni Oper. Tom. III.*
- COMA somnolentum**, ejus historia & differentia à vigili; III. 210. causa proxima; III. 211. remotione causæ; III. 212. subiecta; III. 211. 212. ex erysipelate repulso orti exemplum; III. 215. ejusdem chronici à retropulsâ podagrâ casus; III. 218. scorbutici observatio; III. 215. curatio illius tam à causâ calidâ, quam frigidâ enata; III. 214. *Vigil*, ipsius signa & differentia à pervigilio, III. 213. à somnolentio; III. 210. cur febribus acutis III. 211. & hemiplexiæ maxime se jungat? *ibid.* utriusque prognosis; *ibid.* & 212. quomodo tractanda in febribus acutis & hemiplexiâ? III. 213. 214. quomodo utriusque recidiva arcenda? III. 213. cautelæ circa utrumque tenendæ & quidem circa opiata & suaveolentia, III. 214. sternutatoria & theriacas, *ibid.* venæsectionem, *ibid.* & volatilia externa, *ibid.*
- COMPOSITA** veterum incondita; I. 422. non omnia spernenda; *ibid.* virtus simplicium ex eis non patet. I. 426.
- CONCHÆ** absorbent, I. 428. subadstringunt, *ibid.*
- CONCIONATORES** quibus morbis paseant? III. 89.
- CONCLAVE**, ejus usus. I. 110. hyeme non nimis calefaciendum; I. 135. quale debeat esse acutis decumbentium, II. 114. catarrhali febre benignâ adflictorum, II. 107. dysentericorum, III. 156. à frigore congelatorum, III. 47. 48. febribus intermittentibus epidemicis anomalis morbi moris laborantium, II. 39. purgâ adfectuorum, II. 71. tussientium, III. 107. 114. variolis laborantium; II. 54. calce vivâ recentior obductum quæ pariat in ipso dormientibus damna? II. 126. III. 107.
- CONDIMENTA** acida; I. 110. falsa; *ibid.* sale & acris oleosis prædita; *ibid.*
- CONFORTANTIA** spiritibus debilibus non proficua; I. 420.
- CONSENSIO** morbi fluidorum, I. 62. parium membranosorum & nervosorum. I. 25. & 29.
- CONSENSUS** partium magni momenti, I. 286. 309. non subtilis; I. 319. ex parium nexu; I. 309. à nervorum distributionibus, *ibid.* inter quas partes maxime viget? *ibid.* symptomatum suggerit rationes; *ibid.* ex medicamentorum operatione patet; I. 317. ex principii vitalis concursu non petendus; I. 310. nullus inter nervosas partes & sanguineas viscera. I. 316.
- CONSUETUDO** quid? ejus magna vis; *ibid.* altera natura jure dicitur; *ibid.* facit, ut res perniciose non noceant; *ibid.* & sæpè promiscuam motuum efficit; *ibid.* non temerè mutanda; I. 138. in morbis exploranda; I. 288.
- CONTAGIUM**, ejus natura in quo consistat? III. 65. & 415. quibus subiectis facillimè inhaerescat? II. 90. quoniam modo possit propagari, III. 423. & potissimè per vestimenta? II. 92. III. 427. ejus effectus qualia supponat corpora? II. 84. Venerei casus. III. 422. vid. plura. in verbo *Morbi contagiosi*.
- CONTINUA** febris ex repulsâ crustâ lacteâ, I. 336. scabie, *ibid.* restagnante sanguine lochiali, I. 342. malus in eâ pulsus, I. 370. in eâ profusè clystères; I. 374. venæsectio; I. 456. corruptionis viscerum comes; I. 324. Vide *Febris continua*.
- CONTRACTIO** in epilepsiâ unde? III. 11.
- CONTRACTURA** balnei maritimi tollitur; I. 464. & sæpè, specificum ejus. I. 453.
- CONVULSIONES** quæ dicantur? III. 24. sunt minus salutares naturæ motus I. 411. sedes in spinâ medullâ; I. 299. earum signa antecedentia & paro-

paroxysmorum descriptio, I. 299. III. 24. & solutio; III. 24. differunt ab epilepsia I. 299. III. 24. à motibus spasmoticis vagis III. 34. varias partes quantitas I. 305. quousque sint? III. 25. earum obiectum III. 24. subiecta, III. 25. & 484. causa proxima. *ibid.* spasmus membrarum spinalis medullæ I. 305. 393. oriuntur ab animi pathematibus, *ibid.* ab exanthematibus retropulsis, III. 25. earum à spectro visio exemplum; III. 31. cum vomitibus alternantium casus; III. 30. solà aqua frigida curatur, III. 32. quomodo tractandæ? III. 27. ex scabie retropulsâ substatum exemplum, III. 29. fornicarum casus rarus, III. 40. quâ ratione cura instituenda, III. 27. & seq. à læsionibus externis, III. 26. ex abscessu circa aurem sinistram, III. 33. ex ossis coccygi percussione ortum casus, III. 44. ab immixto & irregulari mensium fluxu casus, III. 30. hysteriarum inde exemplum; III. 58. & seq. quomodo sanandæ? III. 27. à vitio primarum viarum, III. 28. earum, quarum fomes in intestino duodeno hæsit, casus. III. 32. certæ infantibus propriæ ex ventriculo I. 314. & seq. hysteriarum inde exemplum, III. 59. & seq. quomodo sanandæ? III. 28. ex nimio & præmaruo veneti usu constatum casus, III. 33. & quomodo tollendæ? III. 27. à vermibus, III. 26. & quâ ratione curandæ? III. 28. miræ à vermibus I. 332. hæreditate sæpè in liberos transferuntur, III. 25. quâ ex causâ in apoplexiâ suboriantur? II. 241. variolis I. 61. cur epileptici motibus sæpè jurgantur? III. 25. prognos, III. 26. 485. cura præservatoria, III. 29. quando conducant potus aque simplicis, III. 27. balnea, III. 29. emetica, III. 27. lactis cura, III. 29. laxantia, III. 27. linimenta, III. 28. & 29. martialia & venæsectio, III. 29. & volatilia? *ibid.* chyliferis placantur I. 468. prodeunt mensium fluxu cessant I. 409. accedente febre solvantur quandoque I. 420. scarificationem melius, quam venæsectionem ferunt I. 461.

Convulsivi motus in quo consistant I. 306. in quibus morbis obviis? I. 305. eorum origo & sedes: *ibid.*

Cor, ejus structura ac usus. III. 84. 269. machina est motoria composita I. 30. ipsius nervi describuntur: III. 84. ex quatuor musciculis constat. I. 40. quousque sit ejus motus? III. 83. 269. quid ad ipsum requiratur? III. 85. perpetuum mobile I. 31. & 365. motum habet reciprocum; I. 30. unde is motus? I. 367. est pulsus causa *ibid.* & ei respondet. I. 367. sanguinis circulum impellit. I. 40. ejus systole quomodo contingat I. 366. imbecillia hypochymiam I. 306. ad tempus intercepta syncopen parit. *ibid.* motus auctor an febrem constituat? II. 61. unde tantam vim habeat? III. 83. ipsius systole quomodo contingat? I. 366. cur dexter ventriculus præ sinistro ad polypos suscipiendos sit idoneus? III. 280.

Corde arterie indigens & nervi; I. 33. auricula sinistra cur minor dextra? I. 40. structura muscicula; I. 20. vasorum sanguiferorum peculiaris structura: I. 33. vasorum valvulæ, I. 40. & eorum proportio mutua. I. 43.

Cor piscis in aquâ calidâ motu privatum frigide injechum reviviscit. I. 155.

Corde læso cur lethalis? I. 160.

Corde palpitatio. Vide *Palpitatio*: ex polypo insensibilis. I. 184. ejus tremor unde & quomodo differat à palpitatio? III. 83. tremorum & palpitatorum sedes. I. 179.

CORALLIA absorbent. I. 428. subadstringunt. *ibid.*

CORNARIUS sobrietate vitam produxit. I. 114.

CORNEA tunica, ejus ruptura ab usu frigidi in ophthalmiâ collyrii. II. 169.

CORNELIUS CELSIUS. I. 20. & seq.

CORPUS omne est agens I. 18. quodvis est substantiæ activæ I. 97. organicum habet virtutem generandi. I. 75.

Corpus humanum est machina perfectissima & artificiosissima; I. 29. & 309. jure dicitur machina. I. 27. est instrumentum ac domicilium mentis. *ibid.* hydraulica & vasculosa structura; *ibid.* vivum & physicum gratis distinguitur, I. 425. ex quo consistat verè sensus Hippocrates. I. 300. mixti principia I. 26. partes solida & fluida. I. 27. machina est destructibilis. I. 29. natura salium generix. I. 220. mirabilis œconomia. I. 245. & seq. ejus partes conspirant. I. 309. ad conservationem vite constructum. I. 413. in illud magnam vim habent res corporeæ. I. 369.

Corporis natura debet esse Medico cognita; I. 245. 273. differentia, I. 239. maximi momenti in arte medicâ. I. 240. in morbis considerandum, I. 289. in prognosi. I. 396. medicamentorum obligatione distinguendum. I. 421.

Corporis infantilis diuturna gestatio ad generationem rachitidis multum disponit. III. 489. ejus gravitas & lassitudo in cachexiâ, unde. III. 312. cur corpora æstate minoris ponderis quantitate hyeme? I. 265. singulis mensibus incrementum, sed per urinæ fluxum copiosorem iterum minuantur. I. 120. juniora facili nutriuntur I. 57. que motu plus egent? I. 124.

Corpora robusta quænam? I. 53. faciliè conigunt alimentorum noxios qualitates. I. 110. in quibus vires sint tantum occasioneles I. 17. ejus vires non sunt absolute sed relative I. 7. vires motus mensurat mechanice, I. 18. corporum virilium crisis. I. 259.

Corpora imbecilliora gravia à causis nocentibus afficiuntur: I. 178. *gracilia*, quid eis quadret? I. 131.

Corpus impurum periculosius à febribus prehenditur. I. 319. non bene oritur. I. 57.

Corporis habitus laxus & spongiosus multum facit ad morbos. I. 242. succussio quomodo promoveat calculum renalem? II. 171.

Corpora preetera cur difficiliora ægrotent, quam que minoris sunt stature, II. 84. cur ad asthma & polypos præclivis, III. 281. ad maciem corporis, III. 319. & phthisim. III. 300.

Corpora pinguis & spongiosa vasis exilioribus prædita, III. 188. hinc in eis progressus sanguinis tardus & difficilis; *ibid.* prona existunt ad cachexiam, III. 312. ad putredinosam corruptionem, III. 416. ad soporosos adfectus; III. 212. & cur præ aliis gravius cutis adfectibus afficiantur? III. 427.

Corporæ res magnam vim in corpora habent. I. 369.

CORRUPTIO non semper causa mortis; I. 31. & seq. putredinosa unde? *ibid.* viscerum quomodo accendat? I. 409. ex moris causa. I. 396.

CORTEX castæilla quando conducit in tertiana? II. 17. cur in febribus intermittensibus conducit? *ibid.* corticis china præferendus in quotidianâ, II. 35. in hac enim alvi fluxum movet; II. 37. laudatur in febribus intermittensibus anomalis mali moris, II. 40. nimio hæmorrhoidum fluxu. II. 221. in malo hypochondriaco, III. 72. ejus essentia quando conveniat in dysenteria? III. 156.

Cortex china quo principio maxime agit? II. 15. quo

- quo tempore tuiffimè detur ? II. 16. 20. quibus subiectis ? II. 20. 21. & num gravidis conducatur ? II. 29. num puerperis ? III. 19. num senibus ? II. 22. an urinâ exiffente crudâ tuò pomigi queat ? *ibid.* quomodo adhibendus ? II. 15. & quibus cum remediis mifcendus ? II. 30. an excreções moveat ? II. 20. non efl univerfale febrifugum. I. 14. quando conveniat in febre lenta. II. 181. quando ufurpandus in quartanâ ? II. 28. in quocunq; ei præfereendus cortex calcarille. II. 35. quomodo potiffimum in tertianâ ? II. 15. 20. nocet in femi tertianâ. II. 42. ubi ufurpandus in clyfteribus ? Vide *Clyfteres*. improvidè datus inducit cachexiam & hydropem, III. 318. hypochondriacum malum, III. 69. polypos. III. 282.
- CORTA** in quo confiftat ? III. 111. cur plethoria circa æquinoctia familiaris ? III. 117. à quibus caufis inducatur ? II. 48. falutaris fapè excretio : I. 288. 347. 410. fpafmus ftipatur. I. 302. folvit quofdam morbos. I. 410. cur frequenter ? I. 185. adolefcenribus & infantibus familiaris. I. 184. 186. unde dependat apud fenes ? I. 242. ex quibus caufis fupprimatur ? II. 325. venæfecciónē arectur. I. 460. quandoque adducitur. *ibid.* fuppreffa à frigore nocet. I. 340. fapè auditum difficilem inducit. III. 241. purgantibus exacerbatur. *ibid.* ejus in rheumatifmum aurium mutata exemplum. II. 325. efl non raro dolum gravatorum capitis caufa. II. 250. & quomodo ea tractanda ? *ibid.* febris catarrhalis benignæ. II. 44. comatis fomnolenti, III. 211. & veriginis. III. 220.
- COSTÆ**, earum fabrica : I. 44.
- COWPERUS**. I. 19.
- CRAKIUS**. I. 17.
- CRATO**. I. 21.
- CRINONUM** generatio unde derivanda ? I. 212.
- CRISTIS** ad prognofim fpectat, I. 386. ipfus figna : I. 302. fpafmo remittent. fequitur : I. 303. fit per excretiones. I. 387. quomodo fiat in pneumonica febre ? II. 138. quando imperfecta fit jodicanda ? II. 116. quid fit veteribus ? I. 386. feptenario & femi feptenario numero computanda : *ibid.* & fep. extra feptenos etiam dies contingit. I. 388. quibus folennia ? *ibid.* unde repetenda ? I. 389. quomodo rationaliter explicanda ? I. 390. non turbanda ? *ibid.* melius fuccedit ordinatis temporibus : I. 389. authorum varie de eâ fententiæ. I. 387. quæ fit in acutis. I. 388. & chronicis morbis ? I. 390. in purpurâ non obvia : I. 389. per imprudentem medicationem turbatur : *ibid.* pro circumftantiarum ratione diftinguenda : I. 388. non omnis larga evacuatio & fymptomatum remiffio crifis. *ibid.*
- CRITICI** dies quinam dicantur in febris ? II. 10.
- CROCUS** metallorum veneni naturam æmulatur. I. 213.
- CRUDITATES** quid generet ? I. 116. earum caufæ : III. 64. in inefteffis præfentes ex quibus fignis cognofcantur ? III. 155. non funt prima mali hypochondriaci caufa : I. 317. ftatus excitant, III. 239. & varia inde fymptomata : III. 84. 87. quomodo temperande & evacuande ? II. 14. vifcidas quæ diffolvant ? I. 430.
- CAVUM** inflatio & tumor in gravidis unde ? I. 168.
- CAVITA** *lactes* infantum unde dependet ? I. 183. 241. fts falutaris. I. 120. familiaris & retrograda. I. 178. repulfa febrem facit continuam, I. 336. atthipatus coovullivi fapè caufa, III. 96. & quomodo infanialium convulfionum ? III.
481. rachitidis, III. 489. & quomodo tractanda ? III. 485.
- CURICULA** quænam noxia ? I. 104.
- CUCURHA** ad aeris injuriam accendam in auditu vitis expertæ virtutis : III. 242.
- CUCURBITULÆ** vicariæ venæfecciónis. I. 468.
- CURA** per incediam jam à veteribus & quibus laudata ? III. 245. in quæ confiftat ? III. 231. ejus ufus : III. 386. quid ante ejus ufum conducatur ? III. 231. quibus subiectis & morbis conveniat ? III. 245. quatenus conducatur in auditu gravitate, *ibidem*. cutis vitis, III. 431. gonorrhœâ chronicâ benignâ, III. 363. guttâ ferenâ, III. 231. lue veneret, III. 418. odontalgia rheumaticâ, II. 334. podagrâ, II. 345. purpura chronicâ, III. 410. fcorbuto, III. 386. vertigine, III. 223. & ulcerum felici curatione ? III. 448.
- CURS** anxie cur turbent egeffionem alvina ? I. 241. 261. fenibus noxiæ, I. 170.
- CURSUS** vehementior motus, I. 122. quibus nocet ? *ibid.*
- CUTIS**, ejus ftructura, I. 67. III. 400. differt fecundum ætatem III. 427. ejus tonus modificat tranfpirationem, I. 68. efl tubulus pervia I. 67. tactus organon : I. 94. univerfi corporis emunctorium, I. 258. fulphurearum fœdum excretorium, I. 381. elastica, I. 382. confenfit cum ventriculo : I. 315. ad fudoris fuccellum facit. I. 382.
- CURIS** *adfectus* qui ? II. 426. funt contagiofi & cur ? III. 427. fedes, *ibid.* subiecta ; *ibid.* differt fecundum ætates, *ibid.* & partes quas infeftant, & materiæ diverfitatem, III. 428. quomodo à veneris ? III. 415. vicia unde ortum habeant ? I. 168. caufâ proxima ; III. 428. mediatæ, III. 429. prognofis ; III. 430. fpafmo affecta tranfpirationem cohibet : I. 303. varia mala gignit. *ibid.* & fep. curatio ; III. 431. quando externa in his conducatur ? III. 436. *Rebelle* unde ? III. 441. *Retrudentes* quomodo revocandi ? III. 435. ipfus *ariditas* unde ? III. 42. & fep. arida peffant omnis in acutis : I. 391. quomodo ejufdem *afprede* tractanda ? III. 436. *Reffuta* imbecillitatem prodit, I. 307. fudoris frigidi & colliquativi caufa. *ibid.* fumma metallifibus perniciofis maxime obnoxia efl, I. 357. cujus tonus & aeris mutatione repentinâ viciatur, I. 360. hinc æquabilis moderatus confervandus. I. 362.
- Cunicula** tactum moderatur. I. 94.
- CYNANCHE** quid & quæ dicatur ? I. 295. II. 125. figna ejus, I. 295. & funefla I. 393. anginae fpecies ; I. 295. differt à fpafmo faucium ; *ibid.* fixatione perimit. I. 394.
- CYNICUS** *fpafmus* poft podagram, I. 315.
- CYNOGLOSSÆ** pilulæ cautè adhibendæ. I. 223.
- CYSTICI** *ductus* fpafmus affecti diarrhoeæ & vomitus biliofos movent. I. 304.

D.

DARM - GICHT quid ? III. 167. in infantibus unde oriatur ? *ibid.*

DATURÆ Indicæ femen cujus indolis ? I. 172. 177. quæ gignat fymptomata ? I. 200.

DEANGLATIA leviffima motus fpecies. I. 121.

DEBILES quomodo nutriendi ? I. 116. qui funt ? I. 396. 420. quomodo diagnofcendi ? I. 348. medicâ egent ; *ibid.* fortiora medicamenta non ferunt ; I. 420. nec valentis alimenta. I. 421.

Debiliores fugiant edacitatem ; I. 115.

DECOCTA continuo ufu juvant, I. 423.

Y y 4

Decedum

Decollum Anagallidis maris Michaelis in delirio chronicis laudatur. III. 261.
Decollum antihebrile cum chinâ. II. 22.
Decollum antipneumaticum Foresti in calculo renali. II. 300.
Decollum antipodagricon, III. 348.
Decollum antiscorbaticum; III. 380.
Decollum antivenereum; II. 256. III. 417.
Decollum aperitivum, III. 411. aliud, II. 303.
Decollum avenae, vid. *Avena*.
Decollum guaiaci ligni in lue venerea laudatur e-
 jusque potandi modus; III. 417. cur scabiosis
 macilentioribus noceat? III. 440. probatum in
 hæmoptysi; II. 205. ad injectiones in ulceribus
 sinuosis; III. 449.
Decolla lenientia profunt in exanthematicis. I.
 408.
Decollum lignorum in gonorrhœa sæpe nocet &
 cur? III. 361.
Decollum manatum, III. 334.
Decollum massibinum in fluore albo laudatur. III.
 356.
Decollum nigrum quomodo coquatur? II. 62.
 III. 261.
Decollum septalii quomodo præparetur? II. 227.
 laudatur in hæmorrhagiâ uteri. *ibid.*
Decolla sudorifica balneis nupta juvant. I. 464.
Decollum Sydenhamii antidyentericum. III. 158.
Decollum ad varices an in nimio hæmorrhoidum
 fluxu. II. 221.
Decollum Viennense antipodagricon quibus con-
 veniat? II. 349.
DECUBITUS in latere dextro quando conveniat? I.
 128. in lecto qualis optimus? *ibid.* fugius re-
 probatur, *ibid.*
DEFORDINATIONES *cruis* cum salute sæpe sunt; I.
 410. speculica in iis. I. 453.
DEGLUTITIO cupis beneficio fiat? III. 130. & seq.
 difficilis unde, I. 306. & quomodo fiat ab ato-
 niâ pharyngis, III. 130. & seq. aut ipsius spas-
 mi, *ibid.* aut tumore, aut frustro œsophago in-
 hærentes? III. 132.
DEJECTIO nigra; fetida per alvum unde proveni-
 nit? I. 167.
DELIRIUM, ejus sedes; III. 253. causa proxima;
ibid. à veribus excitatum; I. 235. ex dentium
 dolore; I. 236. ex aciculâ deglutiâ; I. 237. cur
 ex læsione nervi oriat? I. 158. de eo veterum
 opinio. III. 253. eo defunctorum anatome. *ibid.*
 in acutis *levis* in quo differat a phrenitide? II.
 132. quid ejus accessum prænunciet in illâ? *ibid.*
 & III. 241. interdum hæcica & phthysi super-
 venit. II. 211. *chronicum*, quæ in eo sint ex
 usu? II. 136. quomodo in *petechiante* febree sit
 avertendum? II. 79. ejus ex retrocedente *purpu-
 ra* orti & Carolinis hæc revocatâ, curati exem-
 plum: II. 72. in *synochi* quomodo curandum?
 II. 107. in *varioli* sufficienti natum hæmorrhagi-
 a solvitur: II. 56. quomodo in iis sanandum?
 II. 58. Vide *Mania* & *Melancholia*.
DENTES quomodo generentur? III. 476. quando
 primùm erumpant? *ibid.* *meliores* habent, qui
 aquam potant; I. 112. cur *nişredines* contrahant
 à dulcibus? I. 254. *carriji* cur ad dolorem
 suscipiendum proclives, II. 331. eorum *dolor*
 etiam adultioribus gravis parit mala I. 236.
 quo pacto omnium facillimè distant? I. 237. opti-
 me in fistulâ genæ extrahuntur. III. 460. eorum
lapsus quomodo præcavendus in salivatione
 mercuriali? III. 419. *vaccillantes* quomodo in
 scorbuto confirmantur? III. 386.
Dentitia difficilis quæ dicitur? III. 476. ejus signa.

ibid. quæ periat symptomata? I. 236. prognosia
 III. 480. ratio eorum symptomatum. I. 314-319.
 III. 477. sæpe est epilepsia causa I. 163. III. 112.
 singultus & vomitus infantilis; III. 456. cur ple-
 rumque cum doloribus intestinorum juncta sit,
 II. 287. cum tussi periculosa, III. 112. quæ an-
 te & sub eâ diætâ conveniant? III. 477. curatio
 ex parte infantis, *ibid.* ex parte nutricia; *ibid.*
 quæ externa conducant, III. 478. & quæ te-
 nenda circa alvum apertam servandam? III.

477.
DERIVANTIUM ratio. I. 43.
DESIDERIUM vehementis effectus. I. 102. ventriculo
 nocet. I. 313.
DIABETES ex atoniâ renum. I. 307.
 DIÆTA non omnibus una convenit; I. 129. *varia*
 secundum ætatem, I. 132. secundum virium di-
 versitatem, *ibid.* temperaments, I. 131. sexum,
 I. 136. anni tempora. I. 135. foetum, I. 136.
 gravidarum I. 79. 136. & seq. juvenum I. 134.
 lenum *ibid.* sanationi servit. I. 422. à præficia op-
 timè commendata. *ibid.*
DIÆTETICA *Medicina* quam sequatur regulam.
 I. 129.
DIAGNOSIS scitu necessaria; I. 292. ex observatio-
 nibus haurienda? I. 293. nimir signis; *ibid.*
 plerumque negligitur; I. 292. a seum referendus
 pulsus. I. 364. erronea Medicis auditio exponit.
 I. 292.
DIAPHORETIS movetur quandoque acidulis & ci-
 trostis. I. 428.
DIAPHORETICA, eorum usus in morbis. I. 437. & seq.
 II. 255. ipsorum apparatus, I. 437. modus ven-
 di; *ibid.* quibus malis conducant? I. 363. &
 lychæria; I. 437. sudoriferis præferenda; *ibid.*
 fixa ubi aciculâ deest parçè danda; I. 438. he-
 xiora porrigenda in morbis incognitis, I. 287.
 morbos contagiosos in primâ herbâ tollunt. I.
 205. in pulvere alvum sæpe movent; I. 438. in
 doloribus anodynâ scienda. *ibid.* quatenus con-
 ducant in auditu vitii? III. 242. in dynteritide,
 III. 156. in exanthematum populsionem, III.
 434. in hæmorrhoidum fluxu nimio, II. 220.
 in hydrope, III. 331. in ophthalmiâ, II. 167.
 in palpitatione cordis, III. 89. in podagra,
 II. 347. in rheumatismo & arthritico dolore,
 II. 321. in scorbutu, III. 379. in tussi, III.
 113.
DIAPHRAGMA, ejus structura, III. 122. usus in
 respirationis negotio; *ibid.* ipsius læsio asthma
 suffocativi causa III. 96. & difficilis respiratio;
 III. 330. spasmus patet; I. 304. contenta om-
 ventriculo; I. 315. convellitur quandoque; I.
 306. in fluxuatione per consensum afficitur;
ibid. nullatione commotum cachectico movet;
ibid. spastica affectione asthma; I. 304. 306. &
 320. & hepatis obstructionem causatur. I. 320.
 convulsam asthma & singultus causa, I.
 306.
DIARRHŒA, ejus incunabula I. 168. 175. 179. 187.
 241. quomodo succedat I. 385. per spasmos I.
 302. nonnunquam antivenerea I. 189. sæpe sa-
 lutaris excreto I. 288. 302. 347. 384. 386. 410.
 in febribus etiam malignis I. 386. critica quan-
 doque I. 387. critica in ardente cohibita produ-
 cit phrenitidem I. 134. solvit morbos I. 416. in
 imprimis capitis I. 386. & sæpe deliria III. 256.
 288. anginam, suppreffaque varia revocat sym-
 ptomata II. 129. à convulsiva affectione ductum
 bilisarium & intestinum I. 306. ex pedum re-
 frigeratione I. 315. à tunica villosa obstructa I.
 385. ex usu electuarii antifebrilis II. 37. quomodo
 à spicuis

à spirito niri excusetur II. 89. quandoque minus salutaris naturæ motus I. 411. *seq.* sibi celo intestinum necat I. 421. intestina debilitat I. 420. suppreffa nocet I. 288. 347. ingrimis per adstringentia I. 352. tuncque sæpe colicæ causâ II. 287. & singulus III. 125. ejus exemplum III. 128. opimis cohibetur & hinc mali hypochondriaci causâ exemplum III. 75. clysteribus levatur I. 420. post eam roborantibus utendum I. 420. lyptomatica noxia I. 412. quomodo compescenda in febribus, I. 386. ex purgantium usu in catarrhis incompehensibilibus I. 340. quare malum signum I. 362. quomodo in febribus epidemicis tractanda II. 40. in morbillis II. 64. in iis retrocedentibus morbum absque revocatione exanthematum solvit II. 65. post eos suppreffa infert ulcus mali moris cum infecta morte *ibid.* quando fit salutaris in febre petechiali II. 87. diversa ejus est ratio in petechiæ II. 80. quomodo in ea moderanda II. 79. *phlogis* superveniens quale signum præbeat III. 288. quomodo in *femtertianis* tractanda II. 42. quomodo has solvat II. 41. an sit perimecenda in variola II. 51. 60. quando in iis fit salutaris II. 55. quomodo in iis tractanda II. 58. 65.

DIARRHÆA aquosa in febribus ardentibus unde oritur & quid significet? II. 117.

DIARRHÆA biliosa quid III. 165. differt à cholera *ibid.* quomodo à dysenteria III. 151. subiecta III. 165. Indis & Arabibus familiaris III. 167. variis symptomatibus stipatur exemplum *ibid.* & 176. causa mediata III. 167. procatartice *ibid.* diuturna nocet I. 384. contumax quomodo tractanda III. 170. prognostica III. 168. mala medicamine in euentam chronicam transeuntis exemplum III. 175. curatio absoluitur evacuantibus & temperantibus III. 169. 170. que tenenda circa laxantia *ibid.* victum III. 170. sudarifera & usum niri. *ibid.*

DIARRHÆA hæmorrhoidalis chronice exemplum III. 175.

DIARRHÆA nigra quid significet in inflammatione intestinorum? II. 174.

DIARRHÆA purulenta cum febre ex lapsu in abdomen lapsa; II. 174. quomodo oritur ex abscessu mesenterii, II. 176. & ulcere uteri: *ibid.* solvit abscessum mesenterii; II. 177. 182. quomodo tractanda? II. 172. 183.

DIARRHÆA sanguinea in febribus intestinorum inflammationis ex mesenterio quomodo sananda? II. 172.

DIASTOLE cordis & arteriarum; I. 30. systolen sequitur & præstat. I. 365.

DIGESTIO, eam calor adjuvat, I. 60. turbatur ab affectibus I. 102. & *seq.* ab ira, III. 31. à nimis & diuturna tussi III. 118. *præva* quos morbos generet? I. 185. sæpe tabis causâ, III. 112. 286. est in scorbutis: III. 372.

DISECTIONES, earum utilitas. I. 176.

DIURETICA evacuantium generis, I. 438. eorum apparatus, *ibid.* modus agendi, *ibid.* & *seq.* usus pro ratione circumstantiarum discrepans, I. 439. in doloribus arthriticis & rheumaticis proficua; *ibid.* quæ optima? *ibid.* in complexibus morbis proficua: *ibid.* & *seq.* calidiora profunt humidioribus, *ibid.* & ubi viscidæ sordes in renibus *ibid.* quæ in asthma conveniunt? III. 99. 100. in capitis morbis serofa? III. 242. quatenus conducant in calculo renali? II. 302. 307. hydrope, III. 331. scorbuto, III. 379. in tussi, III. 114. acriora quomodo producant mictum cruentum? II. 234. 238. nocent plethorica, *ibid.* renibus

debilitatis; I. 353. & ubi dolores adfunt, I. 439. in arthriticis & rheumaticis doloribus, III. 323. in gonorrhœa benigna, III. 361. in spualio vesicæ. II. 313.

DOLOR perceptionum species, I. 94. ejus subiectum membrana; *ibid.* spualio in parte nervosa debetur I. 296. 303. varius est, *ibid.* variz species I. 296. 303. pro locorum differentia variatur *ibid.* quibus sopiendis? *ibid.* cum sustendi scopi I. 225.

Dolores, eorum effectus veneni effectibus non asimiles, I. 237. omnes functiones perturbant; III. 244. & *seq.* alvum & vias urinarias constringunt I. 261. succos inquinant I. 319. excretiones cohibent I. 320. partes toni privant I. 354. à causâ calidâ qui veteribus dicitur? II. 248. in arthritide & rheumatismo unde? II. 318. criticæ quandoque solvuntur; I. 350. levatur liquor anodynus, I. 317. oleo amygdalarum dulcium, I. 318. balneis, I. 463. fomentis emollientibus, I. 431. specifica in iis. I. 450.

Dolores acuti unde & cum variis symptomatibus quid indicent? II. 271. *atrociter* gravium morborum causæ, I. 236.

Dolores aurium, vide *Otalgia*.

Dolores à calculo felleo in quo differant ab hepaticis signa? II. 144.

Dolores capitis & oculorum; in iis laudantur cinnabarina & mercurij dulcis. II. 169. in imminutione & prodeuntibus mensibus unde? II. 213. III. 350. post mortillos ponderis instar unde? II. 257. vide *Cephalalgia* & *Cephalæa*.

Dolores dentium, vide *Odontalgia*.

Dolores gravitativi unde I. 166.

Dolores hypochondrii dextri in quo differant ab hepaticis signa? II. 144.

Dolores illiaci qui dicantur? II. 285. in lue venerea quales? II. 248. *umbilicorum* in hysterica unde oriantur, II. 288. III. 51. in mictione cruentâ? II. 231.

Dolores intestinorum, vide *Colica*.

Dolores obtusi & gravitativi. II. 241.

Dolores oesophagi qui dicantur? II. 23.

Dolores in serabulo cordis unde? III. 82.

Dolores uteri ex equo cancro quomodo complacandi? II. 160.

DUBITATIO medico præcipue commendanda. I. 154.

DULCIA multum nutriant, I. 252. indoli sanguinea non conveniunt, I. 108. cum fermentabilibus non jungenda, I. 111. cum acidis sumpta sunt noxia, I. 252. lympham corrumpunt I. 254. stomacho infuso aliena, *ibid.* jejuno ventriculo haud sumenda; *ibid.* cur morbos exasperent? *ibid.* quæ disponant ad epilepsiam? III. 13. nocent in asthma, III. 100. in tussi stomachali, III. 114. & vomitu cruento. II. 215.

DUODENUM, ejus structura, III. 140. ventriculus est parvus & succenturiatus. I. 61. 63. & 307. consensum cum aliis nervosis partibus agit, III. 141. statum generationi faveat & cur? III. 66. plurimum morborum sedes; I. 179. 307. ejus flexura febrium fons & origo, *ibid.* unde in hoc bilis corrumpatur? III. 142. 166. atoni affectum quæ pariat mala? I. 307. inflammati & sphacelati signa; I. 324. erosi indicia; I. 333. scirrhi in eo signa & effectus I. 329. ejus angustia vomitus lethalis causâ est; III. 151. sedes est sæpe cholerae, III. 166. convulsionum, III. 26. epilepsie, III. 12. 22. morborum peritodicorum, III. 36. vomitus biliosi, I. 40. 142.

139.
DURA

DURA MATER, ejus structura, officium, & usus. I. 85. II. 247. ejus sinus. I. 85. omnium membranarum nervosarum principum & origo. I. 305. III. 11. & cum his consensum alie. I. 305. & seq. habet systolen & diastolen. I. 85. III. 11. motu tonico gaudet; I. 305. sanguinis progressum per caput moderatur. *ibid.* sæpe sedes dolorum capitis; II. 247. lésiones graves novas inferunt. I. 85. spasmi pectus. I. 305. ab ejus spasmo mentis & capitis morbi, *ibid.* epilepsia, *ibid.* & seq. ejus atonia gravium cerebri morborum causa. I. 306.

DURATIO quid sit? I. 26.

DURETUS, I. 19. 21.

DYSMETETI qui dicantur? II. 139. 141.

DYSENTERIA quæ dicitur III. 151. ejus incubacula I. 179. cur contagiosa sit natura I. 204. differt à cholera III. 165. diarrhoea III. 151. ab haemorrhoidibus. *ibid.* & I. 296. ab affectu *le mal de Paris* dicto III. 152. distinguitur in benignam & malignam *ibid.* rubram & albam *ibid.* & I. 296. subjecta III. 152. levioris & gravioris symptomata *ibid.* sedes III. 153. causa formalis & proxima *ibid.* materiales causas eadem cum quartana agnoscere possit II. 30. quæ de his sentiant auctores III. 153. eorum ratio III. 154. causas occasionales sunt tempestas *ibid.* quo tempore maxime grassetur III. 152. miasm contagiosum III. 154. & 160. epidemia proles roris corrosivi I. 211. epidemia anno 1683. III. 162. anno 1709. & 1726. III. 163. ex imaginatione orta III. 161. ex fructuum horarum abusu III. 154. ex scabie retro pulsâ I. 336. ea defunctorum anatome III. 153. ecrementa in ea I. 385. qualis in ea pulsus. I. 371. prognos. II. 44. 172. III. 155. funestas signa I. 393. eff. minus salutari natura motus I. 412. solvit quondam morbos I. 410. inflammatione & sphacelo afficit intestina I. 324. sphacelo necat I. 401. genus nervosum afficit universum I. 315. abortum sæpe causatur III. 182. cohibita non raro cardialgia III. 259. & singulas causas III. 125. incursa diu colicam facile ingenerat II. 287. quomodo hydropeo-cachecticum statum post se relinquere possit III. 335. quomodo præcavenda III. 157. 158. quo pacto caute curanda I. 262. quomodo curanda per anodyna, III. 156. luvacum prodest in ea I. 318. demulcentia, III. 156. diaphoretica & purgantia, III. 155. 156. & 158. roborantia, *ibid.* subadstringentia? *ibid.* quale regimen in ea tenendum? *ibid.* cautela quæ tenenda circa alexipharmaca, III. 158. opista & adstringentia? *ibid.* non sine periculo adstringentibus sistitur I. 262. adstringentibus perperam curatur I. 352. quæ cautela tenenda circa lactis ejusque seri usum, III. 158. circa laxantia & purgantia, & circa ipecacuanhæ radicis & mannae usum, III. 157. mucilaginosi, III. 158. pilulæ polychrestas, III. 157. circa salina, *ibid.* venæsectionem? II. 44. III. 158. levatur febribus I. 465. chyliferibus I. 418. ejus specificis. I. 452. tenemus in ea quomodo tractandi? III. 159. coalescentes ex ea quomodo tractandi? *ibid.* post eam interstitia roborantia I. 420. maligna quo pacto facillime jugulatur? I. 201.

DYSENTERIA in hysterica casu III. 159. feliciter sanata *ibid.* in juvene brevi curata III. 160. cito curata III. 161. cum semiteristica complicata & funestæ exemplum II. 44.

DYSURIA quibus morbis accedit? II. 153. an inflammationem vesicæ semper pro causa agnoscat? *ibid.* oritur sæpe à calculo; II. 308. à gonorrhœa

male curata, II. 315. III. 361. à spasmo vesicæ, II. 308. à materiâ podagrica; II. 109. sæpe eorum aut vesicæ equalcationis symptoma. II. 235.

E.

EBRIETAS frequens cerebrum & genus nervosum debilitat, III. 217. ad aphonium disponit, III. 248. ad comam somnolentum, III. 211. ad deliria, III. 254. ad Epilepsiam, III. 13. ed. soporosos adfectus: III. 217.

ECLAGMATUM usus nimis nocivus. I. 254.

EGESTIONES respondere debent ingestionibus I. 246.

EGRANTÆ aquæ, ante eorum usum corpus riè preparari debet; II. 272. laudatur in calculo felileo, *ibid.* in ictero, III. 305. in malo hypochondriaco, III. 71. in scorbuto, III. 377. 378. in viis caligine & quando? III. 238. cum lacte in phthisi à tertianâ contumaci, III. 297. in rhuematismo scorbutico, II. 322. in ulceribus, III. 449. nocent in hæmoptiâ, II. 206. eorum *sal*, ejus virtutes, II. 14. quâ dosi, quove vehiculo exhibenda? *ibid.* commendantur in cachexiâ, III. 315. in hydrope, III. 331. in ictero, III. 305.

ELÆOSACCHARUM myrtharum quomodo præparatur, ejusque usus. II. 298.

ELASTICITAS, ejus insignia exempla in corpore humano. I. 35.

Elasticum quid. I. 35.

ELÆTERIUM, ejus virtutes, I. 215. coctum vim purgativam amittit, I. 214. quomodo aquas hydropicorum evahat, I. 316. in hydrope ab auctioribus laudatur, III. 328. sed minus coovenit, III. 332. veteribus specificum ad hydropem. I. 451.

ELECTUARIUM antisepticum, II. 15. m. præsertim in quartanâ laudatur: II. 32. *elæctum* alvi fluxum sollicit; II. 39. *lexant* in gravidis, III. 181. de ovo efficacis in peste. I. 226. ad tormina insanum, III. 479. ulsum ferinum, II. 46. III. 113. *roboras* in tussis declinatione, III. 116. in vertigine hypochondriacâ. III. 222.

ELEPHANTIASIS origo. I. 202. quid sit? II. 427. ab Aretæo & Celso describitur; *ibid.* ejus subjecta; *ibid.* huic simile exemplum; III. 441. curatio secundum Aretæum III. 431. & Celsum *ibid.* cur mercurialis exposcit? III. 432.

ELEVATIO oneris sæpe ad initium cruentum facit; II. 233. ad spasum vesicæ graviorem redditum. II. 314.

ELIXIR alexipharmacum sine menstruo spirituloso; II. 52. antisepticum in quartanâ; II. 32. antispasmodicum; III. 380. in ictero, III. 307. emmenagogum, III. 61. *lexans* in quartanâ; II. 32. pectorale temperatum, III. 495. proprietas cum cochlearis spiritu in scorbuto laudatur; III. 387. stomachicum; III. 354. viscerales temperatum. III. 411.

ELLENORUS, ejus virtutes I. 215. quomodo strangulationem faucium inducat? II. 126. à veteribus sæpe usurpatur; III. 259. ipsius à Lindero quomodo facta correctio? *ibid.* judicium de eâ. III. 215.

ELLYCHNI extincti sumus quàm noxius? I. 230. EMETICA duplici generis, I. 432. eorum apparatus; *ibidem.* modus agendi, *ibidem.* pulsum mutant I. 369. in quas partes maxime agant? III. 305. quam caute cum iis à Medico procedendum? II. 124. perperam è foro Medico eliminantur, I. 154. melius in forma liquida. I. 433.

I. 433. & pariori dosi propinantur I. 416.
Emetice ubi vitanda? I. 213. quando noceant? I. 433. veneni naturam imitantur I. 212. quando veneni vim habeant II. 125. III. 167. quo casu maxime damna exhibent II. 124. nocent in affe-
 ctibus ab ira productis, I. 190. cur post iram noceant? I. 313. II. 122. & que sufficiunt ma-
 la? III. 167. que parient damna in gravidis? II. 161. III. 179. locum non habent in affectibus periodicis & retrogradis, I. 187. icterum gignunt, I. 314. tempore paroxysmi non danda; I. 418. in erysipellate data inflammationem ven-
 triculi gignunt; I. 337. necantia que habeant signa? I. 393. antimonialia præsertim nocent in asthmate, III. 99. in colica biliosa; II. 297. palpitatione cordis, III. 90. vomitu cruento, II. 215. quando inducant animi deliquia, III. 271. cardialgiæ & quando, II. 259. choletam, III. 167. passionem iliacam, II. 276. hypochondria-
 cum malum, III. 72. paralysis linguæ, ejusque exemplum, III. 250. singulum, III. 126. & quomodo cicatriza? III. 127. quando in peri-
 pneumoniâ noceant? II. 142.
Emetica in principio pestis commendantur; I. 176. 204. qualia & quatenus in pestilentia proficua? II. 97. ad morbos præcidendos in principio optima, I. 414. & 415. in hydropicis per infe-
 riora agunt & cur? I. 432. III. 330. bilicis uti-
 liter sociantur; I. 464. clysteribus in apoplexiâ & hydropse infندا; I. 467. in clysteribus ulu-
 rus mirum ferocitates educunt; II. 330. valen-
 tiora quando conducant? I. 432. & *sepe*. que post ipsa convenient? II. 122. 267. cum laxan-
 tibus parata in convulsionibus laudantur; III. 27. quando conducant in cardialgiâ, II. 260. in comate somnolento, III. 214. in dysenteria, III. 155. in epilepsia; III. 22. in ietere, III. 305. in lenta febre, II. 178. quomodo malig-
 nas in primâ quasi herbâ suffocare valent? II. 92. quando convenient in morbilis, II. 63. 97. in peripneumoniâ, II. 143. in petechiali febre, II. 79. 82. ad podagræ recidivam ardentem; II. 346. in quartana; II. 27. in quotidianâ; II. 35. rachitide, III. 489. in semitertiana; II. 227. in tertiana, II. 15. 16. in tussi infantum stomachi-
 li, III. 114. in variolis, II. 53. 54. & quomodo harum eruptionem juvent? II. 62. contra venena stupescitiva remedia I. 201. quando con-
 veniant in virgine symptomatice; III. 221. vomitu? III. 145. eorumdem formulæ; II. 92. 184.
Emeticus Julepus, vid. *Julepus*.
Emeticus Pulvis, vid. *Pulvis*.
EMMENAGOGA quæ sint? I. 439. & *sepe*. quomodo petite adhibenda, I. 440. & exhibenda? III. 220. nonnisi præparatis viis & humoribus offe-
 rendi; I. 415. ante venesectionem nocent; III. 62. intempestive usurpata sæpe abortum provo-
 cant, III. 177. cachexiam cum hæcicâ, III. 320. vomitum cruentum, II. 213. nocent in lipothymia à menibus obstructis? III. 273. 276.
EMOLLIENTIA quæ sint? I. 430. quomodo agant? I. 431. usus internus & externus. *ibid*.
EMPIRIA differt à rationali medicinâ; I. 424. ejus fævet sententia de principio interno activo. I. 425.
EMPIRICORUM præter Juba; I. 14. vetus scôla in quo laudanda? I. 16. in quo defectiva? *ibid*.
EMPLASTRUM iosophoniâ probatum; III. 249. quæle conveniat in otalgia II. 337. in asthmate III. 108. in paroxysmo hysterico III. 55. in passione

iliaca II. 279. experte virtutis in pollutione no-
 cturna, III. 359. in spasmo & inflammatione ute-
 ri probatum II. 254. in furbo & cancro III. 450. 451.
Emplastrum Agricole in ulceribus suppurandis; III. 453. cum alio mixtum ad bubones maturandos laudatur; III. 362.
Emplastrum anodynum capitis dolores & vomitus placat; I. 318.
Emplastrum antispasmodicum Hieronymi quando in malo hypochondriaco conducit? III. 72.
**Emplastrum ceratum stomachale maglicinum Gale-
 ni** in cholera quando conducit? III. 169.
Emplastrum de crustâ panis in cholera; III. 169. vomitu. III. 145.
Emplastrum constringentia retropellendi facultate pol-
 lent; I. 207.
Emplastrum diaspheuriæ Rulandi in tussi phthifica; III. 113.
Emplastrum menis Dei cum aliis permixtum in tophis veneris; III. 420. in ulceribus; III. 453.
Emplastrum pectorale. III. 297. in tussi rheumaticâ; III. 113.
Emplastrum Rostingii ex quibus speciebus præpa-
 retur? III. 181. laudatur ad abortum præcaven-
 dum. *ibid*.
Emplastrum saponatum & bene camphoratum in asthmate cardialgico; III. 100. ad bubones ma-
 turandos; III. 362. in fluxulentia, III. 345. in malo hypochondriaco, III. 72.
Emplastrum samigeratissimum Ströbelbergeri adver-
 sus quartanam; II. 26. paroxysmos intermitte-
 ntium sistit. I. 318.
Emplastrum Vigonis cum mercurio in tophis vene-
 reis; III. 420.
EMPYEMA pulmonum ex pleuritide quandoque or-
 ritur, & quomodo? I. 165. 351. facilis gene-
 ratur ex pleuritide quàm peripneumoniâ; *ibid*.
 ex imprudenti venesectione in pleuritide; *ibid*.
 ex pleuropneumoniâ ortum & curatum; II. 142.
 ex petipneumoniâ extrâ thoracis cavitatem rup-
 tum; III. 298.
EMULSIO in ardente, II. 117. cholera, III. 168. 170. in cancro cum febre hæcicâ, III. 453. ce-
 phalalgia ab orgasmo, III. 250. in diarrhoeâ III. 170. in dolore à calculo renali, II. 300. in dysenteria, III. 156. in gonorrhœâ, III. 360. in hæmoptysi, II. 205. ad expellendas variolas, II. 52. in vomitu cruento. II. 215.
ENDEMIT morbi quinam? I. 181. unde oriuntur? I. 209. quo pacto avertendi ab urtibus? I. 212. aëtis vitio debentur. I. 335.
ENULÆ radix, ejus principia constitutiva & usus. III. 382.
EPHEMERA FEBRIS, ejus signa, I. 293. in eâ crisis succedit; I. 388.
EPIALA FEBRIS quæ dicatur? Vide *Ventriculi inflammationem*.
EPICARPIA quomodo in quartana paranda sint? II. 26. 28.
EPIDEMICÆ FEBRES, vide *Febres epidemicæ*.
Epidemici morbi, vide *Morbi epidemici*.
EPIGLOTTIS est primum vocis instrumentum; III. 115. ejus relaxatio quomodo curanda? *ibid*. ejus infectio cum muco quid efficiat? III. 130.
EPILEPSIA, ejus varie denominationis ratio, III. 9. definitio, *ibid*. est universalis convulsio. I. 306. incubula I. 179. historia cum paroxysmorum ratione; III. 9. est sæpe periodica *ibid*. facile recidivat & cur I. 244. 356. symptomatum ratio, III. 11. *spasmus* stipatur I. 302. subjecla. I. 179. III. 9.

III. 9. cur non adeo frequens in brutis? I. 180. infantili aetati familiaris I. 241. senibus rarius I. 185. cur maxime generetur tempore verno? I. 266. saepius hereditaria est, I. 243. & 349. & III. 10. sedes *ibid.* in cerebri membranis I. 299. ejus signa. *ibid.* & III. 10. qualis in ea pullus I. 371. minus salutaris naturae motus. I. 411. & *seq.* prognostis salutaris, III. 13. mala & funesta. *ibid.* in adultioribus periculosior quam in infantibus I. 183. hereditaria incurabilis I. 244. differt ab animi deliquis, III. 269. a moribus spasmodicis vagis. III. 24. a passione hysterica; III. 52. a convulsione. I. 399.

Epilepsia causa proxima III. 11. causa mortis in ea; I. 396. oritur non raro ab animi adfectibus & pathematibus I. 185. III. 12. ejus exemplum III. 21. ex terrore I. 191. ex terribili haemorrhagia narium sanata. III. 16. ab eadem causa matrimonio subacta exemplum, III. 20. ab obstructionibus, III. 11. post male tractatam febrem producta. III. 18. in puerperâ à cortice chinæ ortae exemplum, III. 19. à mensibus suppressis & retentis, I. 341. III. 17. ex suppressa narium haemorrhagia I. 346. in viro à tertiana suppressâ, III. 20. ex intermissâ venæsectione, III. 23. ex primis viis III. 22. ab externâ capitis violentiâ III. 18. à calculis I. 236. à dolore dentium I. 168. 236. à vermicibus I. 235. ex nervi lésione; I. 158. à spâsmo possibillimum duræ matris; I. 306. 407. ex repulsa crustâ lactis, I. 336. scabie, *ibid.* consolidata ulceribus, I. 337. podagrâ præpositè tractatâ I. 328. post atroces dolores cur oritur? I. 354. ex pollice pedis sæpè ortum summi I. 315. nonnunquam mercurialium prognos. I. 220.

Epilepsia dividitur in idiopathicam & symptomatice. I. 182. III. 11. datur cachectica, hypochondriaca, sympathica, III. 12. & habitualis, *ibid.* nephretica, hysterica, aut verminosa. *ibid.* verminosa exemplum. III. 19.

Epilepsia cur inducat oculorum visus? I. 350. per cutem quandoque diffundit; I. 390. febre intermittenste nonnunquam solvitur. I. 410. III. 22. mensium fluxu prodeunte sæpè cessat; I. 409.

Epilepsia curatio III. 13. & *seq.* specifica ipsius, I. 451. ad præservationem quæ conveniunt? III. 16. quæ incurabilis? I. 244. non indistinctè curatur lumbricis terrestribus, I. 153. scarificationem melius quam venæsectionem fert. I. 461. clysteribus abigiur; I. 468. si ab animi affectibus, biliosa acris materia & doloribus, quomodo tractanda? III. 15. si à fero acris impuro e-nata, si periodica? *ibid.* in variolis quomodo tollenda? III. 53. à vermicibus quibus expugnanda? III. 15. cautela circa epilepticam, potum, opiata, spirituosâ & volatilia in paroxysmo, & venæsectionem. III. 16.

Epilepsia infantilis quâ ætate maxime frequens. III. 484. ejus subjecta, *ibid.* prognostis, III. 485. causæ remotæ sunt vitia nutricia; III. 484. ex vitio nutricia ortæ casus; III. 23. ex terrore nutricia, III. 17. dolores & spasmi in infante nervosorum partium ex variis causis induciti. III. 484. & 485. exanthematum retrocessio, III. 485. à meconio non ritè expurgato orta, & nimis ventriculi repletionem III. 485. quomodo tractanda, si ab animi adfectibus nutricia, *ibid.* si ab exanthematum retrocessione? *ibid.*

EPITHORA quæ dicitur? III. 233. levior quæ? *ib.* differt ab ophthalmiâ & fugillatione; *ib.* ejus signa, III. 234. sedes, *ibid.* subjecta, III. 235. genesis,

III. 234. prognostis à Celso tradita. III. 234. 235. suas habet periodos, III. 235. 236. unde veniat feri falsi effusio, dolor ac rubor? III. 234. tumore glandularum in collo sustentatae casus. III. 237. per malum vite regimen in plenariam visus privationem terminatæ casus; *ibid.* ab incongruâ diæta ex eâ in visus hebetudinem transiens casus, III. 238. ex ipsâ visus immutatione cum paralytica & soporosa adfectibus completæ exemplum; III. 236. curatio ab internis inchoanda & quibus? III. 235. quando in ei conveniant externa, III. 236. fronticali, stercæ & vomitoria? *ibidem.* specificum ejus. I. 453.

EPITHEMA in aphonia, III. 250. in cardialgiâ, II. 262. in cephalalgâ; II. 249. discutitis, II. 109. in gonorrhœâ, III. 359. in guttâ serena, III. 231. in guttâ rosacea, III. 437. in leprâ, III. 442. ad inflammationem uteri, II. 159. in morbis malignis cordi applicatum quare locum habeat? II. 96. in melancholico & manico furore, III. 266. in interitiorum doloribus verminosis; II. 289. in hæmorrhoidibus cæcis, *ibid.* ad phrenitidem; II. 133. roborem in vomitu, III. 145. ad putredinem arcendam, III. 395. in penis ulceribus, III. 362.

EQUISETUM palustre venenatæ naturæ: I. 210. **EQUITATIO** motus species; I. 121. quibus continetur? I. 122. ejus gradus; *ibid.* quibus morbis avertendis profic? *ibid.* non statim post partum instituerenda, & quando? III. 62-73. qualem in hæcticâ præstet utrum? II. 181. in malo hypochondriaco; III. 72. in phthisi à Sydenhamio laudatur, III. 295. & quando in eâ locum inveniat? III. 294. fortior dolores ex calculo excutit, II. 298. 304. mîchum cruentum, II. 277. ad ani fistulam disponit; III. 461. palpitationis cordis causa; III. 93. nocet in gonorrhœâ. III. 359.

ERDENKOFF cum pane comestum quænam producat symptomata? I. 230.

ERRHINA quæ sint? I. 442. quomodo agant? *ibid.* usus & noxa: *ibid.* laudantur in dolore capitis à coryzâ suppressio. II. 250.

ERUCTIONES ab acidis. I. 252.

ERYSIPELAS quomodo gignatur? I. 302. ejus causæ procacitæ, II. 100. eventus bonus & malus, *ibid.* quomodo mori in ipso contingat? *ibid.* quibus cognoscatur signis? I. 295. & *seq.* diversum est ratione subjectorum & partium quæ occupat II. 99. in quo differat ab aliis inflammationibus, *ibid.* præsertim à phlegmone? *ibid.* & I. 295. & *seq.* haud repemè repemendum; I. 263. quando res magna periculi habeatur? I. 362. futuriter per iram excitatum I. 190. spâsmis stipatur; I. 302. cur sit frequens **Phthasis**? II. 104. cur pedes frequentissimè occupet? II. 102. gravidarum unde deducenda? I. 243. cur difficilis in cachecticis discutitur? II. 102. ejus in fene sunelli casus; III. 102. ejus topica corrupti, internis sanati exemplum; II. 103. crebro recurrentis Caroliniquæ depulsi casus. II. 103. in ulcus transiens signa. II. 101. iram quandoque subsequitur: I. 190.

Erysipelas capitis incuratè tractatum multa mala profert; I. 357. periodicum unde? I. 186.

Erysipelas exulceratum quale dicitur? II. 99. ejus exemplum, II. 102. quomodo tractandum? II. 101.

Erysipelas introversum lethale. I. 187. **repellendum** nocet I. 337. **retirapulum**, ejus exemplum, II. 350. sæpè phthiasea causa, III. 287. vomitus lethalis,

lethalis, III. 142. 150. singultus, III. 124. à spiritus camphorato retropulli exemplum, III. 105. retrocedens necat, I. 395. & quæ machineatur symptoma, & quibus ex causis retrocedat? II. 100. retrogradum, I. 187.
Erysipelas febricitans quale dicatur II. 99. ejus sæpe recidivans exemplum II. 104. quomodo tractandum? II. 102.
Erysipelas simplex quale dicatur? II. 99. ejus recidivæ crebre quid indicent? II. 103. & quomodo arcende? *ibid.* & 102.
Erysipelas symptomaticum quibus accedat morbis? II. 99. ejus quædam malignæ species; *ibid.* illud curandi indicationes, II. 100. & *seq.* quomodo tractandæ in febrilibus epidemics? II. 40. quod requiritur regimen? II. 101. quomodo arcendus sphacelus? *ibid.* quâ ratione topica adhibenda? *ibid.*
Erysipelacea febris, II. 98. quomodo generetur? II. 99. ex mensum emansione; I. 341. in quo cum febris pestilentiali conveniat, *ibid.* & ab ipsâ discrepet? *ibid.* ejus subjecta: II. 100. causæ materiales; II. 99. an & quando proficit in eâ venæsectio? II. 101. Vid. supra *Erysipelas*.
Erysipelacea macula remansens post variolas, quid significet? II. 52.
ESCULENTA venenâ naturam inducunt I. 230. venenosa. *ibid.*
ESSENTIA carminativa, II. 289. III. 344. *Wedelii* unde ipsi virtus status discutiens II. 296. *incarnans*, III. 465. *stomachica pectoralis*: III. 134. 137.
ESSENTIA humanæ naturæ in quo consistat I. 26.
ESULA cocta vim purgativam perdit. I. 214.
EVACUANTIA vari generis I. 431. & *seq.* operantur ratione circumstantiarum. I. 425. præparata materia; I. 415. in principio & fine morbi officenda. I. 414.
EVACUATIO per congrua loca, I. 415. brevissima via, I. 414. & præparata materia suscipienda. I. 415. non impetuosè urgenda: I. 416.
EVACUATIO, eorum qualis corpora? I. 76. cur non tam facile podagra obnoxii? III. 343.
EXANTHEMATICA unde? I. 174. quo pacto ex ulu alexipharmacorum enasci queant? II. 118. & *seq.* critici solvunt quandoque capitis & nervorum morbos I. 390. cur sint diversâ in petechizante febree? II. 76. eorum eruptio retardatur obstruptione alvi. II. 43. repulsa a terrore I. 191. repelluntur per spasmos I. 302. refrigerationem, I. 337. & *seq.* purgantia & emetica; I. 416. sub situ erecto disparent I. 338. repulsa perniciosa; I. 302. 315. 337. faciunt oppressionem pectoris; I. 305. sudoriferâ non expellenda. I. 418. venæsectionem non semper interdicunt I. 457. eorum retrocessu quomodo apoplexiam inducat, II. 241. & *seq.* asthma convulsivum, III. 96. cardialgiam, II. 259. convulsiones, III. 25. 28. dolores capitis, II. 248. & intestinorum; II. 286. motus spasmodici vagos, III. 37. palpitationem cordis, III. 86. paralytin, III. 197. phlegmâ III. 287. rachidem, III. 488. vericæ spasmus III. 309. singultum, III. 126. vomitum? III. 142. ventriculi inflammationem minitantiâ quomodo tractanda? II. 121.
EXANTHEMATICA purpuracea quomodo à veneno sumto inducantur? III. 172.
EXANTHEMATICA febres, naturæ & artia processus in sanandis iis, I. 408. quæ noxia in iis? *ibid.* clysteres ferunt, I. 468. nec non venæsectionem, I. 456. sed jussam: I. 459. vide *Febris Exanthematica*.

Frid. Hofmanni Oper. Tom. III.

EXANTHEMATICA materia quævis specificam habet indolem, II. 68. III. 428. in quo omnia conveniunt? II. 68. in plerisque morbis epidemics subesse solet. II. 75. repulsa venenâ vim habet; I. 336. cur tam graviter noceat? I. 337. facit oppressionem pectoris. I. 305. restituta quæ pariat symptoma? I. 315.

EXANTHEMATICI morbi, vide *Morbi Exanthematici*.

EXCREMENTA non evacuatâ sunt venena I. 206. alvi inspicendi in morbis; I. 384. signa ex iis; *ibid.* sctor unde? *ibid.* cur lorum sæpe pellantur? III. 341. an per os in passione iliaca evomi possint? II. 277. qualia sint delirantium? III. 255. quæ ad ea educenda conveniant? III. 70.

EXCREMENTA ALBA quomodo generentur? III. 82. ex bilis defectu: I. 384. in ictero unde III. 302. *dura nimis* unde? I. 385. *dura & cretacea* unde? III. 309. ipsorum & magnorum oclorum exemplum III. 42. 43. sæpe sunt colicæ flatulentæ causæ II. 286. passionis iliacæ: II. 277. *filamentosa membranacea* quid sint? III. 78. cum filamentis membranaceis resectorum exemplum, *ibidem*. *flava* in ictero unde? III. 302. *ferida & cadaverosa* in dysenteria unde? III. 152. & quid indicent? III. 154. *fusca & bruna* ex bilis copiâ, I. 384. *liquida copiosa* ex obstructione villosæ I. 385. *muco* unde? *ibid.* *nigra & pici* similis à sanguine I. 385. *nigra* à vitiolacis aut martialibus: I. 66. quid indicant in vomitu cruento? II. 214. *sanguinolenta* unde? I. 385. *Viridis & caustica* unde? I. 319. 384. III. 479.

EXCRETA indicia præbent; I. 375. respondere debent ingessis: I. 288. 333.

EXCRETIONES pendunt à circulo sanguinis; I. 54. respondere debent ingestis; I. 66. 117. & iis æquales esse: I. 157. sunt variz: I. 66. 333. cur sine his homo vivere non possit? I. 157. diminutæ ante omnia restituendæ; I. 260. quomodo ciente in corporibus tum macilentioribus, tum spongiosis? *ibidem*. præterit moderandæ à medico, I. 259. & considerandæ. I. 288. 333. earum successus medico curæ esse: I. 139. suppressæ nocent I. 334. 348. & mox revocandæ I. 348. plurium morborum causæ; I. 176. rite peractæ non unica viæ ac sanitatis causâ sunt. I. 152. iis vigentibus totum viget corpus; I. 258. ad sanitatem necessariæ; I. 288. 333. in morbis salutaris; I. 407. præcipua perispiratio, I. 334. evacuationibus turbantur; I. 348. naturâ dehiemte promovendæ. *ibid.* critica salutaris, I. 288. duplici modo I. 419. septenario numero adstrictæ. *ibid.* non interceptiendæ; *ibid.* etiam si fuerint nimiz. *ibid.* suppressæ nocent I. 288. 389.

EXHALATIONES ex æquis flagrantibus venenosæ sunt. I. 207. earum copia è corpore humano. I. 265.

EXPECTORANTIA quæ sint? I. 441. quomodo agant? *ibid.* cum discrimine usurpanda. *ibid.* quantenus in poeumonicis febrilibus profuit? II. 120. in tussi stomachi. III. 116.

EXPELLENTIA quæ damna pariant in variolis? II. 54.

EXPERIENTIA medica quali, I. 14. *seq.* sola non est sufficiens; *ibid.* effectum remedium docet; I. 426. non tamen una sufficit: *ibid.*

EXPERIMENTUM probans vivisne an mortuus fuerit infans? I. 80.

EXPECTATIO arcanum in medicina I. 414.

EXPIRATIO quid? I. 44.

EXTERIORUM usû cur non omnes æquè ferant? I. 89.

Z z EXTRA-

EXTRAVASATIO lethalis in capite quomodo accendat? I. 402. sanguinis inter fibrarum interstitia commensum: I. 365. ex chotoideo plexu apoplexia causa: I. 324. ovarii ex vasis, I. 327. ex heme disrupto, I. 329. feri, I. 328. sanguinis vel feri quomodo necet? I. 397.

EXULCERATIONUM scdorum octus. I. 168. pulmonum fistulose insanabiles. I. 184.

F.

FACIES; ejus color vivus unde mutetur? I. 166. ejus color ad historiam morbi pertinet I. 287. indicia ex florido, *ibid.* livido; *ibid.* Hippocratica quae de unde? I. 392. ejus pulchritudo in flore albo cur perat? III. 349. *ruber* in cataplesi unde? III. 46. in vomitu? III. 141. *tumor* in febre ardente unde? II. 111.

FALLACIA *causa* ut *causa* frequens in Medicina: I. 425.

FAMES ingens a vermibus: I. 235. canina a icterico pancreatis: I. 328.

FASTIDIUM quid? III. 132. quomodo ad spasimum oesophagi disponat? *ibid.* ciborum in gravidis unde? I. 243.

FAUCES qualem consensum habeant cum oesophago? II. 129. earum debilitatio ad quae disponat symptomata? II. 130. *derivatus* serofus quomodo tractandus? II. 128. *inflammationis* signa. III. 131. *strangulatio* in hysterica unde? III. 59. *tumor inflammatorius* a sero acri quomodo tractandus? II. 128. praesentium si in suppurationem tendat? II. 129. quid de topicis in eo sentiendum? *ibid.* *ulcerum* in lue veneris exemplum, III. 422. & quomodo ea tractanda? III. 420.

FATI repulsi asthma gignunt. I. 336.

FEBRES quid sit. I. 370. & *seq.* spasmus universalis I. 302. duplici motu absolvinr I. 301. 407. II. 10. ejus vera definitio, *ibid.* quomodo explicanda veterum definitio? *ibid.* denominatio multis communis; I. 293. cur morbus universalis dici mereatur? II. 9. diversae species distinguendae; I. 293. unde proveniant? II. 10. ejus signum pathognomicum pulsus frequens I. 370. pulsum habet durum. *ibid.* mala signa: I. 391. nulla sit sine rigore partium externarum: I. 475. quare praesentis medicis pro medicinis sit habita? I. 476. causa formalis II. 10. formalis ratio spasmum continetur; I. 302. causae materiales. II. 10. unde oriatur in genere? II. 105. an à quovis circuli sanguinis augmento enascatur? II. 10. oritur ex aciculâ deglutitâ. I. 237. ex denatatione difficili I. 236. à dolore dentium, I. 168. ex lacte flagnante, *ibid.* a vermibus I. 225. 332. ex lesione nervorum I. 158. ex cohibito fluore albo, I. 340. ex refrigeratione post iram & calorem, I. 335. in Carolinis ex tempore quomodo gignatur? I. 335. quo pacto sint juxta Hippocratem? I. 167.

Febris quando *salutaria*? I. 170. & *seq.* ejus salubritas ostenditur, II. 9. praesertim in inflammationibus; II. 144. 163. convulsiones & epilepsiam solvit I. 410. saepe *perniciosa* I. 411. per se non salutaria; I. 303. succos vitales corruptit, I. 319. vires destruit, *ibid.* ad chronicas passiores disponit; *ibid.* in corpore impuro pejor; *ibid.* quo mors sub ea contingat? II. 10. quare non adeo frequens in brutis? I. 180. quare faciliè patitur recidivam? I. 169. soluto spasmu remittit. I. 301. 303. quo pacto facillimè accendat? I. 260. quomodo solvantur? II. 10. naturae & artis methodus in sanandâ ipsâ I. 407. II. 10. in principio optimè fert laxantia vel emetica; I. 415. cly-

steribus fistitur; I. 467. quatenus in ea conveniant absorbentia? II. 17. quatenus aqua in ea conducatur? I. 471. quando potus calidus, quandoque frigidus conducatur? II. 115. & *seq.*

Febrilis motus indoles & natura II. 319. federe habet in spinali medulla I. 305. in podagra unde? II. 342. cur haemorrhagias semper antecedit? III. 226. quibus fistitur? I. 318.

Febrilis materia num per sudorem post paroxysmum excernatur? II. 30.

Febricitantes plethorici, si respuant venesectionem, quomodo tractandi? II. 19. *caustice* quomodo tractandae? II. 17.

FEBRUM VARIE SPECIES.

Acuta, quid in ea largi sudores statim ab initio indicent? II. 89. an fador frigida semper sit funestus? *ibid.*

Alba, vide *Chlorasia*.
Ardens, ex animi pathematibus oritur I. 185. vide *Ardens febris*.

Benigna quando sit maligna? I. 181.

Calcule renum quomodo accedat? II. 151. *abique* renam inflammatione: II. 150.

Catarrhalis benigna; vide *Catarrhalis benigna*.

Catarrhalis maligna, vide *Ptychizans*.

Cholerica, vide *Cholerica febris*.

Contagiosa, ejus venesectione compressa casus. II. 92.

Continua, quo tempore in intermittentem converti solet? II. 118. quid in ea rigores significant? II. 114. quando & quomodo naturae motus in ea juvenit? *ibid.*

Erysipelacea, vide *Erysipelacea febris*.

Exanthematica emetico jugulata. II. 92. quatenus sit praeservanda? II. 82. vide *Exanthematica febris*.

Glandularum tumoribus accedens cur sit periculosa? II. 185. 188.

Hedica, vide *Hedica*.

Inflammatoria, vide *Inflammatoria febris*.

Intermittens cur frequentius? I. 185. quando post venesectionem generetur? II. 36. quâ ratione aquae minerales in ea conducantur? II. 28. 35. quomodo apud fontes medicatos faciliè curetur? II. 22. malè curata saepe ad rheumaticos dolores convertit, II. 320. cataplesin, III. 47. epilepsiam, III. 22. quam accedens saepe solvit; *ibid.* ad suppressionem mensium. II. 213.

Intermittens chronica quibus causis sustentetur & quomodo curetur II. 36.

Intermittens continua qua ratione sit tractanda II. 43.

Intermittens epidemica, ejus historia. II. 38. *causa* procatarractica, *ibidem.* materialis causa; II. 39. quibus locis & subiectis familiaris fuerit? *ibid.* quomodo praecaveri possit? *ibid.* eam curandi indicationes, *ibid.* ipsaeque curatio; *ibid.* quâ ratione in principio tractanda? *ibid.* quomodo in ea tractanda diarrhoea, II. 40. purpura & erysipelas, *ibid.* vomitus, *ibid.* quomodo tractanda si mutetur in intermittentem? *ibid.* an conferat venesectione? *ibid.* nocent alexipharmaca, *ibid.* clysters in paroxysmo, *ibidem.* & purgantia. *ibid.*

Intermittens maligna an detur II. 38. ejus signa *ibid.* in quo differat à feminatiana? II. 41.

Laetia I. 80. quomodo oriatur? II. 157. 186. quo die ingratum? *ibid.* ea laborantes numerum lac sanum infans praebet. I. 80. & *seq.*

Lenta unde generetur? I. 167. vide *Lenta febris*.

Maligna; vide *Ptychizans febris*; cur in Austria atque Pannonia sit frequentissima? II. 89. quando

In prima herba suffocari querat ? II. 92. quomodo in ea serum lactis conveniat ? *ibid.* quomodo ejus recidivæ arcenda ? *ibid.*
Febris Mefenterica unde generetur ? I. 167. qualis sit ? II. 170.
Miliaris, vid. *Miliaris febris*.
Nephritica, vid. *Nephritica febris*.
Ophthalmico-cephalica. II. 169.
Pegilemialis cur maligna ? I. 161. Vide *Pegilemialis*.
Petechialis cur maligna ? I. 161. Vide *Petechialis febris*.
Petechialis, vide *Petechialis febris*.
Purpurata, vide *Purpura*.
Quartana, vide *Quartana febris*.
Quotidiana, vide *Quotidiana febris*.
Rheumatica cur frequentior ? I. 185. Vide *Rheumatica febris*.
Secundaria, variolorum qualis sit ? II. 186.
Stemachica que dicitur ? II. 120. vid. *Ventriculi inflammatio*.
Symptomatica que dicitur ? II. 186. quibus accedat morbis, *ibid.* & externis læsionibus ? *ibid.* ejus buboni venereo accedentis calus, II. 188. ejus ex punctura tendinosis pedis ortæ exemplum ; II. 187. quomodo tractanda sit, *ibid.* imprimis si oriatur a doloribus ? *ibid.* quæ topica conveniant ? *ibid.*
Synocha, vid. *Synocha febris*.
Tertiana incongrua perniciosa, I. 183. vid. *Tertiana febris*.
Verminea, quæ symptomata habeat ? II. 186. in quo differat a lena ? II. 187. quomodo curanda ? *ibid.* ejus curatæ exemplum. *ibid.*
Uterina a secundinâ & lochiis retentis sanata, II. 163. sudore soluta, II. 162. sine venæsectione curata, II. 163. repetita venæsectione & sudoriferis curata, II. 164. nimia venæsectione lethalis facta, II. 165. Vide *Uteri inflammatio*.
Vulneraria quomodo oriatur, II. 186. & curanda sit ? *ibid.*
FERNENTUM morbosum falso pro omnium morborum causâ venditur : I. 151.
FERNKLI laudes. I. 21.
FIBRÆ, earum structura multum tribuit ad æquabilem sanguinis motum ; I. 156. earum constitutio robur præstat ; I. 87. ex his quo pacto robur aut imbecillitas corporis metienda ? I. 240. motrices, I. 27. habent duplicem motum, I. 87. causarum morbosarum subiectum, I. 179. musculorum tensio quid efficiat ? I. 36. in febribus nimis duræ & solidæ sunt ; I. 162. densiores & laxiores non tam acerbis doloribus sunt exposte quam teneriores ; I. 180.
FIOULI cur ad tussim proclives ? III. 110.
FISTULÆ quid ? III. 459. sedes : *ibid.* differunt ratione loci, III. 460. ab ulceribus ; III. 459. earum materia qualis, III. 462. quomodo explorandæ & cognoscendæ ? *ibid.* causa proxima ; III. 460. remotæ sunt abcessus & ulcera, III. 461. variolularum reliquæ, I. 355. dietæ errores, III. 461. remedia acris & calida ; *ibid.* callus in his unde, *ibid.* & sinus ? III. 462. prognostici differunt ratione loci III. 463. & circumstantiarum ; *ibid.* quomodo sanandæ ? III. 464. antiquæ an consolidandæ ? III. 463. callus quomodo tractandus per dilatationem orificii & lepeica ? III. 464. & quomodo consolidandæ ? III. 465.
Fistula ani, ejus causa ; III. 461. consolidata spemplexim gignit : I. 347. & seq. quomodo tractanda ? III. 466.
Frid. Hoffmanni Oper. Tom. III.

Fistula colli, III. 460.
Fistula gena & maxillaris quid ; III. 460. ipsius curatæ exemplum. III. 466.
Fistula lachrymalis, III. 460. sedes & signa. *ibid.* causa, III. 461. quomodo sananda ? III. 466.
Fistula mamma III. 360. ejus exemplum ; III. 467. & quomodo tractanda ? *ibid.*
FLAMMULA vitalis, terminus nihil significans, I. 151.
Flammula Jovis venenatæ est naturæ. I. 210.
FLATULENTIA quid ? III. 339. differt à colicâ flatulentiâ, II. 285. signa & symptomata concomitantia ; III. 339. symptomatum ratio, III. 340. subiecta, *ibid.* causa formalis, II. 258. III. 340. cause materiales sunt flantules, III. 340. remotæ sunt morbi prægressi, *ibid.* primarum viarum spasmus, III. 341. intestinorum angustia ; *ibid.* cum intestinorum doloribus à verminibus exemplum ; III. 345. ab adstringentibus inductæ causæ, III. 346. intestini colici exemplum ; *ibid.* cum borborygmis junctæ, III. 347. prognostici III. 343. curatio quæ clysterum applicatione solvitur, & quæ circa illa notanda ? *ibid.* & seq. laxantibus, roborantibus & carminantibus, *ibid.* & aliis externis ; III. 344. quæ conveniant in statu plethorico hæmorrhoidalibus *ibid.* ex utri vitiõ orta quomodo tractanda ? *ibid.* quatenus conducant calidiora & purgantia ? *ibid.*
FLATUS quid ? III. 339. unde generentur ? I. 67. quomodo generentur ? I. 332. II. 263. semper præsentem sunt in intestinis, II. 285. intestina & abdomen distendunt, I. 332. quando dolorem excitant ? II. 285. quo loco quam maximè producuntur ? III. 64. quomodo à motu peristaltico destructio proveniat ? III. 66. materiales cause, III. 340. a cibis viscosis, I. 297. cum spasmis junguntur ? III. 341. colon sæpius obducit, I. 332. & in eo maximè sævientiū suum exerunt ; III. 77. faciunt ad asthmata, III. 96. ad aurium vicia, III. 241. ad lipothymiam, III. 273. ad nephritidiam exacerbationem III. 249. ad colorum adfectus, III. 239. ad palpitationem cordis, III. 87. causa atrocium pathematum, I. 332. inflationem ventriculi, I. 297. in quo incarcerati cum dolorifice extendunt, II. 257. doloris in sinistro hypochondrio, I. 332. 126. in sinistro latere tumorem concitant ; III. 66. pulsum quandoque suspendunt, I. 370. cum calculosis familiares ? I. 353. quibus ducendi & eliminandi ? I. 445. 450. II. 263. an clysteribus resistere possunt ? III. 42. & seq.
FLUIDA crassiora, I. 27. vel subileiosa, *ibid.* tenuiora maximè expanduntur à calore ; I. 33. nominis motus experta morbum faciunt, I. 170. corporis humani solida quantitate superant, I. 367. cur in sanguine prævalere debeat solido I. 157. ex solida vitium caput ; I. 339. depravantur in febribus, *ibid.* animi adfectibus, *ibid.* doloribus, *ibid.* eorum temperies continuâ agitatione tandem destruitur. I. 28.
Fluidum nervosum ex tenuissimis partibus chylis, lymphæ, & sanguinis delibatur, I. 83. illud dari probatur, I. 27. duplicis est substantiæ, I. 83. veteres dicere ipsimum animale, *ibid.* an sit lucide igneæ naturæ ? *ibid.* est causa motuum, I. 86. dat musculis visum motum à motum I. 88. quod experimento probatur ; I. 84. facit ad sensationem ; I. 89. ad robur partium requiritur, I. 36. salivam subit, I. 59. lac subit, I. 81. in generatione multum efficit, I. 75. sanguini partem redditur, partem expirat ; I. 86.
FLUOR ALBUS quid ? III. 348. sedes, III. 345. subiecta,

- jecta. III. 348. cur Belgis frequens III. 350. ex quibus viis profusit? III. 349. inordinatus est, III. 348. excretio salutaris unde? I. 242. differt ratione coloris, & consistentie, *ibid.* ratione gradus, *ibid.* à cachexia, *ibid.* & 314. à mensibus decoloribus & fluxu contagiolo; III. 350. causæ mediatæ, *ibidem.* à mensibus suppreſſis sæpè oriur; *ibid.* & I. 341. ejus exemplum III. 355. ex eadem causâ enati calui, III. 156. ex puerperio, I. 350. post crebriorem abortum & puerperium orti calui; I. 353. III. 355. à partu laborioso, III. 356. cum aliâ malis complicati exemplum, III. 353. cum statu cachectico - hydropico, III. 355. eo defunctarum scitio aomatoma III. 349.
- Fluxor albus diuturnus** disponit ad abortum, III. 179. 351. cancer & scirrhum uteri, III. 446. *suppreſſi* prognosis, III. 350. quæ mala pariat? I. 263. præpositè colubitus nocet, I. 326. facit ad purpuram; III. 402. curatior indicationes, quæ explentur externis balneis & dietâ, III. 351. & *ſeq.* rhabubarina, *ibid.* quomodo tractandus si cum cachexia jungitur? III. 352. in scorbutis & purpura, III. 353. si ventriculus cruditatibus ſcatet; *ibid.* quæ tenenda circa adſtingenda, III. 352. circa balnea, III. 353. circa Carolinarum ulum, III. 352. circa clyſmata & peſſaria, *ibid.* circa ſuffragia. III. 353. & circa venæſectionem? III. 352.
- FLUVIUM inundationes** morborum epidemiorum causæ: I. 208.
- FORMINÆ**, earum habitus corporis qualis? III. 45. alunt plus ſanguinis quam viri; I. 73. viris imbecilliores; I. 136. 287. 349. valent purgatione menſtruâ recte procedente; *ibid.* iis motus commendandus; I. 124. cur morbis plus expoſitæ quàm viri? I. 243. earum morbi unde poſſimum deducendi? *ibid.* quo pacto præveniendi? *ibid.* morbis magis obnoxie, I. 349. peculiaribus etiâ, I. 287. qualem habeant pulſum? I. 368. experiantur quandoque hæmorrhoides: I. 342. & *ſeq.* quæ ſint ad lochia difficiles? II. 162. viduatæ juniores cur ad paſſionem hyſtericam proplices? III. 51. cachecticæ ſcibitantes quomodo? II. 17. ad animi deliquia ſunt prone, III. 269. ad cachexiam, III. 313. præ viris ad hydropem, III. 336. ad motus inordinatos, III. 45. ad purpuram: III. 401. cur non ſacilè podagram obnoxie? III. 343. quænam diſcile pariant? II. 163. hypocondriacæ cur inſtantibus menſibus malè habeant? III. 65. valerudinariæ ſub graviditate infirmos edunt liberos, II. 59. exemplum quadrageſimæ nunquam menſium fluxum experitæ. II. 281.
- FOETUS laudatus:** I. 19. & 21.
- FOETOR excrementorum alvi** unde? I. 66. in violentâ morte perceptus hæud deprehenditur. I. 160.
- FOETUS** an per os nutriatur? I. 80. an per ultimos ſaltem menſes? *ibid.* humanus cyſtidem bile repletam habet; I. 63. non reſpirat; I. 80. nutritio quomodo fiat? I. 79. *mortuus* qui dicatur? III. 177. ex quibus cauſis in utero moritur? III. 178.
- FONTES ſalubres** ſunt medicina præſtantiſſima: I. 139.
- Feniculi** in morbis contagioliſ commendantur: I. 205. sæpè ſalutari ſerviunt excretioni; I. 347. quando & quo loco conducant in epileſiâ chronica, III. 16. in mania, III. 263. in morbis ſpaſmodica vagis, III. 39. ad peſtis præſervationem, II. 95. ad ulcerum canciſationem? I.
- III. 448. quâ ratione ſint diſmoſi? I. 358. & *ſeq.* oculi obſunt; I. 337. præternaturæ conſolidati apoplexiæ ſæpiè cauſa, II. 241. aſthmaria, III. 96. phthiſes: III. 287.
- FORAMEN ovale.** I. 80.
- FOTUS** in alvi adſiſtione pertinaci laudantur, II. 280. in palſatione cordis, III. 88. in aſturium viris à ſuccitate, III. 243. in guttâ ſerenâ, III. 231. in dyſenteria I. 465. & dyſenterico terrefmo, III. 159. ad hæmorrhoidum fluxum promovendum; I. 465. III. 73. in teſticulo venereo, III. 425. ſicci quomodo à veteribus parati & quando conducant? III. 345.
- FREYENWALDENſES aquæ** laudantur in fluore albo. III. 352. in malo hypocondriaco, III. 72. in morbis ſpaſmodici vagi. III. 39.
- FRIGIONES** quales eſſe debeant? I. 123. juvant corpus: *ibid.* ſeribus utiles; I. 135. faciunt ad progreſſum ſanguinis, I. 321. in ſyncopis utiles; I. 318. ante pediluviorum ulum, ſi pedes frigidi ſunt, conſervet. III. 90. 319. laudantur in animi deliquiis, III. 272. in apoplexiâ, II. 244. in febre ardente ad rheumaticum arcedandam, II. 115. in arthride & rheumatismo, III. 322. in comate ſomnolento, III. 214. in epileſiâ, III. 16. in frigore congelatis membris, III. 48. in palſatione cordis & quando? III. 88. in rachide, III. 489. in ſuffocatione hyſterica, III. 57. in ſoporofis adſectibus, III. 213. quando poſt ſalivationem mercurialem conducant? III. 456.
- Friſtiones capitis à Celſo** laudantur in tuſſi humida III. 115.
- FRIGUS** unde corpori oboriatur? I. 50. & *ſeq.* quæ in corpore edat effectus? I. 105. 470. III. 118. III. 254. 399. corpori eſt inimicum; I. 185. quibus partibus maxime nocet? I. 105. quibus maxime nervis eſt inimicum, II. 223. III. 45. & tuſſientibus; III. 114. purgationem menſtruam turbat, I. 136. ſenes ledit. I. 134. ejus internus ſenſus ſine externo unde? III. 43. externum perſpirationem cohibet. I. 261. ex eo in magnam calorem concedere periculolum; I. 106. extoremur in hypocondriaciâ unde? III. 67. cur cum ſalivatione mercuriali junctum? III. 456. poſt ætheris noxiû I. 335. excretiones criticas ſiſtit, I. 288. exanthemata repellit, I. 302. colicæ cauſa eſt, I. 297. in febribus à ſpaſmo cutis. I. 302. quomodo diſponat ad apoplexiâ, II. 242. ad aſthma, III. 57. ad catalepfim, III. 47. ad catarrhales deſluſiones, III. 115. ad cephalalgiam, II. 249. ad convulſiones, III. 25. ad deliria, III. 254. ad dolores ex calculo, II. 298. ad hæmoptili, II. 204. ad hypocondriacum malum, III. 68. ad morbos ſpaſmodicos, III. 47. 58. ad ſphacelum, III. 388. ad rheumaticos & arthricos dolores? III. 318. & *ſeq.* ad podagram, II. 351. an & quomodo podagricis levamentum ſit? I. 360. ad vomitum? III. 144. in nutritibus ad mammas admiſſum III. 471. in puerperis, II. 164. 286. in purpura, III. 407. in ſcabie. III. 29.
- Frigus interſum** quos habeat effectus in corpore humano, III. 388. & quomodo nocet? III. 47. quomodo hominem ſerimat? I. 30. eo enecata quomodo ſuccurrendum? I. 31. eo ambaſta non ſunt nimium & ſubito caleſcenda; I. 106. infantes ledit; I. 133. ſub eo quibus utendum? I. 105. *noſturnum* quo tempore maxime ſit cavendum? I. 106. *humidum* plus valeudini inferſum quàm ſiccum; I. 267. *ſiccum* boreale ubi & quibus nocet? I. 266. ſicci & humidis natura atque efficacia. *ibid.* & *ſeq.*
- Frigida*

Frigida potio quâ ratione salutarem edere possit effectum? I. 233. & 471. quatenus & cur nociva? I. 178. 233. copiosius in calefactum corpus ingesta deliquium parit, I. 233. vitam tollit; *ibid.* aduersa maxime ventriculi & intestinorum textura; *ibid.* febrili âstu correptis exitium infert; I. 234. cur corporis excretiones sistat, *ibid.* imprimis pessimas, ubi ventriculi imminet quædam inflammatio? *ibid.* maxime infensa senibus. I. 235. Vide *Forma frigida* & *Aqua*.

FRONS, ejus pustulæ in lue venerea quomodo tractandæ? III. 421.

Frontalis vena utiliter in capitis morbis secatur, I. 458. non tamen semper, I. 459.

FRUCTUS horæi; I. 109. quomodo disponant ad dysenteriam, III. 152. & ad epilepsiam? III. 13. laudantur in fortore oris scorbutico; III. 381. nocent maxime sub acidularum & thermanum usu; III. 300. immaturi quomodo contribuant ad passionem iliacam? II. 277.

FRUMENTA quomodo ab aëre corrumpantur? II. 86.

Frumentacea terram sanguinis partem augent: I. 108.

FUMI Carbonum; vide *Carbones*.

Fumi metallici quomodo asthma convulsi causa existant, III. 96. colicæ, II. 287. tussis? III. 110.

FUNCTIONES triplices in homine, I. 405. in morbis læduntur; I. 289. mechanice medicinæ obiectum; I. 405. læsæ quomodo explorandæ? I. 289.

FUNGI facultate pollent deleteriâ; I. 231. quamnam excitent symptomata? *ibid.* unde veniant tristes illa symptomata? I. 232.

FUNICULUS umbilicalis, I. 78.

FURUNCULI in locum suppurandarum variolarum evenientes, II. 57.

G.

GABELCOVERI hydromel describitur: III. 114.

GALENUS, ejus merita, I. 21. Aristotelis principia in medicinam intulit; I. 16. nimis multas finxit pullum species, I. 364.

Galenici cum Chymicis jungendi, I. 22.

GALLI cui venæsectionem faciliè tolerant? I. 37.

GANGRÆNA quid? I. 296. ejus signa; III. 388. quomodo differat à phlegmone, I. 296. à sphacelo? III. 388. ejus indicia observant in rustico canis rabidi morfu extincto: I. 200. quo remedio in scorbuto averti possit? III. 380.

GARGARISATA quatenus ad faucium adfectus inflammatorios convenient? II. 128. laudantur in oris & faucium vitis sub salivatione mercuriali, & quæ? III. 420. contra saucitatem in tussis, III. 114.

GAUDIUM quos effectus exerat in corpus? III. 87. exaltationum post catalepsi unde? III. 46.

GLAUCINOSA proximè in sanguinem vertuntur: I. 37.

GENERATIO quid sit? I. 55. 75. perinet ad actiones naturales: I. 75.

GENITALIA cum oculis magnum alunt consensum, III. 229.

GENUS nervosum in morbis omnibus affectum, I. 308. à causis & venenis ad anomalos motus abripitur, I. 310. universali spasmo affectum mali ominis, I. 392.

GESTATIO infantum continua quomodo ad rachtidem conferat? III. 488. & 489. gestationis comoda: I. 123.

Frid. Hoffmanni Oper. Tom. III.

GIEFT - MEHL.

I. 196.

GINGIVA, earum incisio lædatur in dentitione difficili, III. 478. insumentia cum oris fortore à mercurio dulci in istero; III. 306. laxitas quomodo præcavenda in salivatione mercuriali? III. 420.

GLACIES deglutita dysenterias parit, I. 233. & *fer*.

GLANDULÆ, & earum secretionis intimior cognitio quibus debeat? I. 19. sunt simplices vel composita? I. 54. continuati ductus arteriarum, I. 55. simplices nihil separant; I. 54. conglobatae dant lymphæ nupellum, I. 58. conglobatarum vitio enata corpori damna, I. 58. laxitas & æmia quid causentur? I. 168. earum obstructio tumefactio, *ibidem*, earum obstructions in quantâ quomodo referandæ? II. 31. spasmò afficiuntur I. 304. *sep.* tumores unde? I. 183. earum tumoribus accedentes febres cur sint periculose? II. 185. 188. tumores & ulcera gignantur; I. 304.

Glandularum colli tumores ætati infantili familiares; I. 241. unde dependent? *ibid.* sæpè à lue venerea orti, III. 424. & quomodo tractandi? *ibid.*

Glandule Cooperianæ, I. 72.

Glandule faucium & palati contractæ suis I. 304. iterato siccitæ & laxitæ salivationis causa, *ibid.*

Glandule inguinales, earum structura, III. 144.

Glandule lacrymales anatomice describuntur: III. 234. *lenticulares* intestinorum muci emanatorium, I. 71.

Glandule mammarum spasmo affectæ secretionem lactis impediunt, I. 304.

Glandule mesaraicæ, earum obstructions unde oriuntur? II. 176. *mucilaginosæ* juncturarum I. 20. 72. *mucosæ* erosæ quæ faciunt? *ibid.*

Glandule prostaticæ gonorrhoeæ sedes sunt; II. 215. malè continuatæ quomodo dysuriam inducant, *ibid.*

Glandule scirrhusæ in ulcera faciliè abeunt, III. 444.

Glandule vaginæ meri; I. 72. *vesica urinaria*, *ibid.*

GLAUBERUS, I. 21.

GLAUCOMA unde? I. 91.

GLUTINOSA remedia cautè debent in dysenteria propinari & cur? III. 158.

GLYCIRRHISÆ radix, ejus virtus, III. 301. ejus succus Hispanicus in tussis quando conveniat? III. 112. & *sep.*

GONAGRA unde? I. 163. semibus familiaris, I. 183. à spasmis ligamentorum: I. 303.

GONORRHOEA quid? III. 357. unde? I. 168. sedes; III. 358. differt à pollutione; III. 357. signa & symptomata, III. 358. dividitur in benignam & malignam, III. 357. malè tractata sæpè inflammationis vesicæ causa; II. 153. inveterata insanabilis, I. 184.

Gonorrhoea benigna causa III. 358. ab ætioni vesicularum feminalium; I. 307. faciliè recidivat, III. 363. benignæ chronicæ exemplum, III. 362. chronicæ & sæpè recidivantis casus, III. 363. cur difficilis sanationis? III. 359. prognos; III. 358. ejus curatio absolvitur balneis, III. 359. laxantibus *ibid.* soborantibus in- vel exterius; *ibid.* cautelæ circa balsamica, diuretica, & purgantia; III. 361. curam per inediam & venæsectionem: *ibid.*

Gonorrhoea muliebris sedes, III. 358. signa, III. 350. differt à fluore albo, *ibid.*

Z z 3

Gonorrhoea

Genorrhoea sanguinea quomodo differat à mielu cruento? II. 232.
Genorrhoea virulenta, ejus causæ & symptomata, III. 358. qualem habeat urinam? I. 380. adstringentibus & siccantibus suppressit noxa, III. 358. & 363. parum adfirmata bubones sæpe excitat, III. 424. io luem veneream mutat exemplum; III. 421. cohibita & calidioribus excepta luem veneream gignit; I. 340. inveterata infanabilis I. 184. quo pacto in primâ herbâ tollenda? I. 205. ipsius specifica. I. 452. diuretica fert. I. 439. quomodo tractanda? III. 421. & seq. inconfusè adstringentibus tractata quæ mala pariat? I. 263. adstringentibus perperam tractatur; I. 353. & seq. ex malè curata scierbus proflaturum? I. 329.
Genorrhoea suppressæ prognosia, III. 358. disponit ad colicam convulsivam, II. 295. ad vesicæ laciones, III. 364. & ipsius inflammationes, II. 153. ac ad ejus spasmus, II. 315. & quomodo? *ibid.* cur demum in senili ætate incommoda vesicæ adferat? *ibid.* curatæ signa, III. 358. inveterata cur raro curetur? III. 362. & quomodo ex eâ ortæ laciones vesicæ sanandæ? III. 360. si ab impuro coitu quomodo præservanda *ibid.* curatio absoluitur per balsamica subadstringentia, *ibidem*, per demulcentia & roborantia externa, *ibid.* purgantia; *ibid.* quale observandum diatæ regimen? III. 361. cautele quæ tenendæ circa subjecta & humorum constitutionem, *ibid.* circa adstringentia, *ibid.* diuretica & venæsectionem? *ibid.* & seq. si siliatur quid faciendum? III. 362.
GRAAFIUS, I. 20.
GRAMINIS succus in calculo laudatur, II. 271. & radix in ichero, III. 305.
GRAMMANNI tinclura antiphthica periculosa. I. 228.
GRAVEDINES infantibus & adolescentibus maximè familiares, I. 183. 243. cur frequentiores? I. 198. cur maximè generentur tempore verno? I. 266. senum unde dependant? I. 241. causâ generalis? I. 168.
GRAVEOLENTIA specificum in hysterica passione. I. 451.
GRAVEDIÆ hæmorrhoides salutariter ferunt; I. 342. si de ardore ac æstu interiorum conquerantur, quid significet? II. 72. cur primis mensibus vomitibus obnoxie? III. 142. 187. quomodo se ab abortu præcavere possint? III. 181. quomodo morborum insaetum causâ existant? III. 470. cur sæpe purpurâ venentur? III. 401. cur cardialgiâ flatulentâ? II. 258. cur lipothymid, III. 275. hæmoptysi, II. 204. odontalgia, II. 335. singula, III. 125. vomitu, III. 141. vomitu cruento? II. 213. ab istâ sæpe in syncopen & malum hystericum incidunt; III. 51. nulli venæzæ non raro abortum patiuntur; III. 112. quatuor laborantes quomodo tractanda? II. 28. quomodo vertigine vexatæ, III. 222. & vomitu adfectæ? III. 147. quæ damna patiuntur ab emetico? II. 161. cur regimen quale sit, II. 74. III. 406. & esse debeat ad præcavendas à partu febres uterinas? II. 159. eas oportet studere transpirationi liberæ, I. 137. & sugere animi commotiones; *ibid.* his nocet vita sedentaria, I. 79. prodest venæsectio tempestiva. I. 137. & seq.
GUAIACUM, ejus signum quale recondat principium III. 417. 440. ejus effectus in corpore III. 449. decolorum in epilepsia laudatur & quasi III. 14. in lue venerea III. 417. subcunctos morbos III. 432. in ulceribus mali moris III. 419. *resina* quo-

modo præparetur III. 230. est stermutatorium III. 440. laudatur in guta serena III. 230. effentia quomodo conficiatur III. 417. ejusque variis adhibendi modus *ibid.*
Graviditas à scierbo menses interii quomodo distinguenda? I. 329.
GRIEBEL - KRANCKHEIT, ejus causa. I. 230.
GULA inferior, ejus structura & situs, III. 131. functio, *ibid.* signa spasmorum in hac, III. 100. qui differunt ab aliis ejusdem adfectionibus; III. 131. ratio symptomatum, III. 132. prognosia, III. 134. ipsius cum ventriculi spasmis exemplum; III. 137. contumacissimi casus; *ibid.* rejectione multi muci casus, III. 138. ex moco ipsi impactio orti exemplum; III. 139. curationis indicationes; III. 134. si ab istâ inter passum, quid faciendum? III. 132. si à sanguinis dystrasia? III. 133. cautele circa topica, &c. III. 135.
GUMMI *gutta* in hydropse an conducatur? III. 332.
GUSTUS, ejus organum lingua, I. 93. in papillula nervis residet; *ibid.* quomodo fiat? *ibid.* & seq. cum odore sympathiam alit, I. 305. à spasmotunica pituitaria impeditur. *ibid.*
GUTTA ROSACEA quid? III. 437. causa; *ibid.* haud repente remittenda; I. 263. retropulla sæpe phthosica causa, III. 287. tussis ferine; III. 111. raucedinem cum difficili spiratione concitat, I. 357. curatio interna & externa. III. 437.
GUTTA SERENA quid? III. 228. sedes, III. 229. differt à catarrachæ & vertigine, III. 228. signa & symptomata, *ibid.* dividitur in perfectam & imperfectam; *ibid.* subjecta; III. 229. utrique sedes; *ibid.* eâ preceptorum anatome, III. 228. causâ proxima, *ibid.* causæ occasionales; III. 229. ejus defectus, *ibid.* feri ac lymphæ vitium, *ibid.* incipientis exemplum; III. 231. ex morbillis relicte casus, II. 64. post purpuram rubram ortæ casus; III. 231. unde oritur? I. 187. ex paralyti nervi optici, I. 306. consolidantur antiquis ulceribus, I. 337. ex epilepsia quomodo? I. 350. ex suppressâ purpurâ, III. 232. ex subsistentibus variolis, *ibid.* spuræ casus, III. 233. accedente fluxu menstruo interdum sanatur; II. 65. sanatio requirit cauteria actualia & setacea, III. 130. & quid cautione ea debeat applicari? *ibid.* hirudinum ad tempora applicationem, *ibid.* laxantia, *ibid.* venæsectionem; *ibid.* ejus specificum sulphur antimonii: I. 453. inveterata quomodo tractanda? III. 130. quando conducatur stermutatoria & externa roborantia? *ibid.* & cura per inediam? III. 231.
GYPSA materia excreta per alvum cum doletur io hepate: II. 274.

H.

HABITUS corporis qui morbosus, qui sanus? I. 287. 348. facit ad pulsum; I. 368. in his morborum exponendus. I. 286.
HÆMATITIS tinclura alvum adstringit: I. 261.
HÆMOPHTYSIS unde? I. 166. ejus differentie & signa, I. 296. quomodo succedat? I. 301. menstrua, I. 186. nonnunquam hereditaria I. 183. 349. pueris & senibus rarior: I. 185. ex animi pathematibus, *ibidem*, à terrore, I. 191. ex disruptis vasis pulmonalibus, I. 49. & ab eorum polyptia; I. 329. 398. ex mensium suppressione; I. 340. spasmus debetur; I. 202. ingruit phthisis; I. 350. præcipue in foemina, I. 341. causa mortis in eâ. I. 398.
HÆMORRHAGIÆ sunt quibusdam locis ordinariae II. 194. aliis insuetæ *ibid.* quibus familiares subjectis *ibid.*

ibid. earum differentie I. 296. differunt pro ætate & anni temporibus II. 194. cur maxime generentur tempore verni I. 266. signa antecedentia II. 295. qualis ante & post eas pulsus I. 371. sunt sæpe hereditariae. II. 195. causæ earum proximæ; antecedentes que *ibid.* quomodo succedant I. 301. unde fiant I. 185. debentur spasmus I. 301. 342. fiant ex animi pathematibus I. 185. quando salutaris & minus tales II. 195. salutaris I. 288. 409. considerandæ sunt I. 288. 344. solvunt morbos I. 409. & si deficient promovendæ I. 410. quomodo in genere tractandæ II. 196. quibus præfidia & quomodo movendæ I. 439. frq. antispasmodica rectius sistantur quam stupefacientia I. 417. & adstringentibus I. 447. earum speciem I. 452. pilulis de cynoglossa & martiali liquore compescuntur. I. 318. à spasmus supprimuntur I. 302. in hydropse periculosa III. 333. in variola de morbillis quid indicet II. 66.

Hæmorrhagia abortiva terrore suppressæ syncopes causâ III. 63. quomodo tractandæ? III. 73. post amputationem partis sphacelatæ quomodo compescendæ? III. 391.

Hæmorrhagia cancerosa; ex parte adfecta ejus exemplum, III. 457. quomodo sistendæ? *ibid.* & 451.

Hæmorrhagia terrore cohibita I. 192. repente cohibita que mala pariat I. 263.

Hæmorrhagia quandoque critica, I. 387. sæpe rheumatismum & arthritidem tollunt: II. 320.

Hæmorrhagia cessans, sæpe hæmoptysin inducit, II. 203. palpitationem cordis, III. 86. rheumatismum, II. 319. vertiginem, III. 224. & quibus refarcienda? III. 243.

Hæmorrhagia narium quâ ratione fiat? II. 196. differt ratione quantitatis, successus, & subiecti, II. 197. signa antecedentia; II. 196. causâ proxima, *ibidem.* quomodo originem trahat à plethorâ, *ibid.* excretionibus sanguineis suppressis, II. 197. obstructionibus viscerum, *ibid.* & spasmoticis morbis? *ibid.* cur circa æquinoctia autumnale & vernale maximè frequens? II. 197. quandoque salutaris, I. 120. menstrua, I. 186. quâ ratione apoplexiam solvat, II. 243. deliria, III. 256. & synochum? II. 106. in cachecticis, hydropicis, & scorbuticis non raro contingit, II. 197. & ex apoplexiâ demortuis, II. 240. qualem in hac indicet apoplexiam? II. 245. unde post amputationem partis sphacelatæ, aut contusionem oriantur? III. 293. febrilibus sæpe supervenit; II. 197. in perichitizante quid indicet, & quomodo tractanda? II. 86. in cachectico lethale exemplum: II. 200. copiose & rebellis post frigido curatæ casus; II. 201. ex istero nigro lethalis, II. 200. morbillis accedens curata; II. 202. cum quantâ sanata; *ibid.* in puerperâ lethalis; II. 200. in synochâ venesectione cum damno turbata; II. 201. ex venesectione omittit, II. 202. artificialiter producta sæpe deliria tollit, III. 256. epilepsiam, III. 16. phrenitidem, II. 132. synochum; II. 102. cessat per ætatem: III. 243. Vide *Narium Hæmorrhagia*.

Hæmorrhagia nimia debilitat, I. 349. exitiosa; *ibid.* funesta signa; I. 395. quomodo ad animi deliquia disponat, III. 271. ad cachexiam, III. 314. ad epilepsiam III. 13. ad guttam serenam, III. 259. ad hydropem, III. 335. ad singultum III. 125. ad suffusionem oculorum, III. 236. ad phthim? II. 287. in morbillis quomodo tractanda? II. 64. 66. in variola unde oritur? II. 54. ex oculo in variolis lethalis; II. 56. quo-

modo in iis tractanda.

Hæmorrhagia ex incongruis locis suppressis mensibus; I. 340. ex præputio rariores observantur. I. 296.

Hæmorrhagia suppressa à spasma: I. 302. nocet. I. 288. 302. quæ mala pariat? III. 255. 391. non tamen omnium morborum causa; I. 345. quando salutaris, II. 198. & periculosa? *ibid.* cura præservatoria; II. 199. quomodo tractanda, si ab animi pathematibus, II. 200. ab orgasmis, II. 198. si periodica? II. 199. 201. si exanthematicis & scorbuticis supervenit, quomodo tollenda? II. 200. emanens quomodo revocanda? *ibid.* quatenus in eâ conducant anodyna, II. 198. 199. & externa adstringentia? *ibid.*

Hæmorrhagia uteri quid & qualis? II. 224. cum mensibus non debet confundi; I. 79. subiecta, II. 225. causâ proxima; *ibid.* mensibus emanantibus & emanantibus supervenit; *ibid.* rebellis post ipsos emanantes exemplum; II. 229. inducitur à spasma; II. 225. ejus antispasmodicis sanatur casus: II. 228. a molis, II. 225. cum molis junctæ & sinas exemplum, II. 229. ab uteri polypo, III. 279. frequens atoniam inducit utero; II. 230. post partum vires deicit, III. 276. disponit ad epilepsiam, III. 13. ad cachexiam, III. 313. ad singultum, III. 125. ad rheumatismum & arthritidem, II. 318. abortivæ rariores, quam partus septimestris exceptis, observatio, III. 184. cum febre lenâ in vetulâ lethalis exemplum; II. 228. pesto stupido sanatur casus, *ibid.* disturnæ analeptica & diaphoretica mixturâ curatæ exemplum, II. 229. ex infelici secundina extrahione ortæ exemplum; II. 230. pathematum exinde ortorum pulvere Heurnii persianatorum casus; *ibid.* prognosis, II. 225. quatenus in iis conveniant adstringentia in vel externa, II. 226. anodyna, *ibid.* diluentia & refrigerantia, *ibid.* emetica, II. 227. venesectio? *ibid.* & quæ diæte ratio habenda? *ibid.* Vide *Uteri Hæmorrhagia*.

Hæmorrhoides in malo hypochondriaco unde oriuntur III. 65. in morbis ab earum suppressione apertendæ I. 344. intemptive pulsæ nocent I. 345. 346. nonnulli præmissis præparantibus pellendæ I. 415. quibus præfidia & quomodo movendæ I. 440. specifica in viciis eorum I. 452. earum dolor unde I. 163. à spasma I. 303. quantum ad epilepsiam contribuant. III. 12.

Hæmorrhoides alba quæ dicantur? II. 155. 316. unde? I. 342.

Hæmorrhoides ceca quæ dicantur, & unde? II. 289. sæpe doloris intolerabilis inessenti recti causâ; *ibid.* quantum ad mictum cruentum contribuant? II. 232.

Hæmorrhoidum fluxus est naturalis & præternaturalis I. 74. præternaturalis quid I. 342. cum iere semper motus febriles antecedunt III. 226. quibus solemnia I. 342. primæ senectûs familiaris I. 183. cur sensibus magis familiaris quam juvenibus I. 170. in infantibus quid significet II. 23. feminis quandoque accidit I. 342. gravidis quoque *ibid.* ejus signa I. 296. distinguendus à dytenceria *ibid.* III. 151. quomodo erumpat I. 301. 342. ejus causæ I. 19. 63. 49. 74. 157. spasmus debetur I. 301. imprimis hypochondriacum I. 345. hæreditarius est I. 343. mensibus suppressis intermanat I. 342. salutariter menses per ætatem cessantes excipit II. 324. nonnunquam cum lechii, adeest I. 342. cur adeo familiaris I. 343. ejus comoda I. 74. 157. est salutaris excretio I. 120. 288. 342. solvit multos morbos I. 409. curat ve-

- lenit morbos chronicos I. 260. mentis morbos solvit & præservat, I. 343. solvit sæpe deliria III. 256. Nephriticidem curat I. 343. præservat ab hæmoptysi, antrixie, pleurisiæ, *ibid.* ab cutis defecatione, hypochondriaco malo, *ibid.* illud quando sublevet III. 76. 224. præservat a scorbuto & scotomia I. 343. certa ad ipsum revocandum non dantur remedia I. 346. solibus revocat I. 465. spalinia suppriumit I. 303. venæsectione in brachio fititur I. 459. quomodo promovendus II. 244. in pueris & infantibus cur circa pubertatis ætatis lethalem sæpe eventum habet II. 23. in juventute ab hereditaria dispositione oborti exemplum II. 328.
- Hæmorrhoidum fluxus cessans* quomodo ad nephriticidem calculosam contribuat II. 298. ad spalinum vesicæ? II. 308.
- Hæmorrhoidum fluxus nimius* qualis dicendus? II. 219. differt à dysenteria; III. 151. signa II. 219. subiecta, *ibidem.* & seq. sanguinis qualitas & quantitas in iis, *ibid.* ex hepatis & lienis vitio I. 320. quomodo post menses cessantes oriantur? II. 324. nunquam vi comprimendus I. 344. camphorato compositurum exemplo; II. 222. sanaturum II. 223. in hypochondriaco lænetarum, *ibid.* lethaliū post Pyramontas; II. 222. ex terrore ostarum & curaturum; II. 223. prognosia; II. 219. stipitici & narcotici cur non sistentæ? III. 333. quomodo subito cohibet revocandæ? II. 222. quinam in his curandis ordo servandus? II. 221. organismus quomodo compescendus? II. 220. quatenus aperientia & obstructions relaxantia conducant, *ibid.* in & externa anodyna, II. 222. laxantia & diaphoretica, II. 220. & venæsectione? *ibid.* & seq.
- Hæmorrhoidum fluxus suppressus* I. 288. 302. ex animi pathemacibus I. 185. a terrore I. 191. nocet I. 120. quos morbos generet I. 185. difficulter revocat I. 263. adstringentibus suppressus ad apoplexiam confert; II. 242. quatenus ad aurium tinnitum, III. 241. ad cardialgiā, II. 258. ad colicam, I. 297. II. 286. ad flatum, III. 341. ad hæmoptysin, II. 304. ad malum hypochondriacum, III. 68. ad maniac-melancholicum adfectum, III. 264. mictum cruentum, II. 232. ad palpitationem cordis, III. 86. ad phreniticidē, II. 131. ad podagram, II. 344. ad rheumatismum, II. 319. ad scabiem, III. 429. ad scirrhum, III. 446. ad scorbuto, III. 373. ad soporosos adfectus, III. 212. ad vertiginem, III. 125. ad vesicæ inflammationem, II. 153. ad vomitum I. 143. quomodo revocandæ? II. 205. in ipso quomodo sanguis mittendus? I. 459.
- Hæmorrhoidum fluxus turbatus* morbos gignit I. 157.
- Hæmorrhoidalis sanguinis stagnatio* quas pariat æmuras? I. 175.
- Hæmorrhoidalis vasa* cum vesicâ communicant, & quæ? II. 232. cum ventriculo & intestinis, III. 226. quantum fundant sanguinem? II. 219.
- Hæmorrhoidales venæ internæ* lethalem rupturam passi, I. 327. à sanguisugis non evacuantur. I. 462.
- Hæmorrhoidarii abstinent* debent ab emeticis. I. 213. & seq. cur tam atroces sentiant dolores? I. 167.
- HEREDITARIA dispositio* in quo consistat? III. 286. multum facit ad morbos, I. 287. 349. morbos difficiles gignit, *ibid.* in hisioris morborum recensenda. I. 287.
- Hereditarii merbi* qui sint? I. 349. à solidorum vitio pendent difficiles sanari. I. 287. 349.
- HAMECH* confectio vis purgativa. I. 214.
- HARVEUS* in quo medicinæ pro fuerit? I. 19.
- HÆCTICA* ex nimia æquarum ardentium potatione I. 255. quare insanabilis? I. 184.
- Hellica febris* quæ dicatur? II. 175. in quo differat à lenta? *ibid.* & I. 294. ejus signa. I. 294. lethalia, II. 177. nunquam salutaria; I. 411. quid post mortem deprehendatur? II. 178. quando spes salutis in eâ superfit? II. 182. 186. sæpè sola atoniâ viscerum nititur, II. 182. & eorum corruptione soletur, I. 323. quomodo ex suppressis excretionibus oritur? II. 176. ex suppressione mensium I. 341. lochiorum, I. 342. nimis hæmorrhagiis, I. 349. & hæmorrhoidibus? II. 176. & 220. ex mesenterio, II. 176. ejus exemplum ex abcessu mesenterii oritur, & per diarrhoeam saniofam curatur; II. 183. causa moris abcessus ruptus, I. 400. sudor largus in eâ unde? I. 383. ex corruptione internâ sphacelofata lethalis casus, II. 184. in juvene bubulo curatur casus; II. 185. in eâ maturè succurrendum; II. 181. quid faciendum si sola viscerum atonia nititur? II. 182. an & quatenus in eâ conveniat antihæcticum Poterū, II. 181. balnea, *ibid.* lac, II. 180. motus corporis, II. 181. situmina, *ibid.* tinctura antipthiatica Grammanni, *ibid.* venæsectione? II. 183. Vide plura in ver. *Lenta febris.*
- Hellica intestinalis* quæ dicatur? II. 177. quomodo tractanda? II. 179.
- Hellica phibica* incipiens curata; II. 182. lethalis ex venæsectione? II. 183.
- Hellica similis.* Vide *Marasius.*
- Helica stomachica* quæ dicatur? II. 177. quomodo tractanda? II. 179.
- HEISTERUS* laudatus. I. 79.
- HELLEBORUS* coctus vim purgativam perdit; I. 214. specificum veteribus ad insaniam; I. 451. albus vetum emeticum, I. 432. ejus succus relictis illius, necat. I. 187.
- HELMONTIUS.* I. 17. 21.
- HELVETI* unde proceri? I. 107.
- HEMICRANIA* quid? I. 303. II. 247. & seq. est sæpè symptomatice. I. 249. non rarò à stomachi vitio oritur, *ibid.* à spismo pericranii, I. 303. ex mensium suppressione; I. 341. puerperio; I. 350. facit recidivat; I. 356. cum cardialgiā quandoque alternat; II. 260. ophthalmica ex ulcere præmaturè consolidato, II. 170. curatio? II. 250.
- HEMIPLEXIA* quid & unde? I. 307. quæ dicatur? III. 195. sedes de eâ perceptorum anatome, III. 196. differt à paralyti alterius lateris; III. 205. pulsus in ipsa; I. 371. causa moris; I. 396. medietate causæ, III. 196. ejus à dietâ pravâ subortæ & lunellæ observatio, III. 208. ejus ex sanguinis mole in dextro latere casus, III. 201. insultus sanguinis abundantia productus; III. 207. mensium fluxum subito cohibent excipientis casus; III. 203. in dextro latere a sudoribus consuetis suppressis subortæ exemplum; III. 204. causa proxima; III. 195. eventus, III. 198. quomodo tractanda? *ibid.* conducunt in eâ balnea naturalia & artificialia & quæ? III. 200. diaphoretica & purgantia; III. 199. frictions & externa spirituosæ ac roborantia; *ibid.* & seq. venæsectione & quando? III. 198. 200. cautela circa acidulas & thermas observandæ; III. 200. circa balnea naturalia & artificialia, *ibid.* circa capitis lotiones, II. 201. diætama, *ibid.* & curam per inediām. *ibid.*
- HEMITATYLOS;* vid. *Semiteriana.*
- HESPER,*

HEPAR, ejus vasa sanguifera, III. 67. usus, III. 302. cur per ipsum sanguinis circulus fit tardus? III. 68. cur omnium difficillime sanguinem transfundat? I. 167. unde augeatur? I. 227. scirrhum fit ab ira? I. 218. scirrhus facillè afficitur? I. 329. non alit consensum cum nervosis partibus? I. 317. ad atoniam cur pronum? I. 307. atonia laborans multorum morborum causa? I. 307. 317. 320. maximè affectum in scirrhus, I. 379. ejus consuetudo in morbis consideranda? I. 289. unde cognoscenda? *ibid.* in eo locum habent corruptiones, II. 144. lethalis corruptionis signa? I. 394. labe affectum quibus curandum? I. 446. ejus inflammatio, *vid.* *Hepatitis*.
Hepatitis obstruclio quæ inducat symptomata? II. 274. immunis: va & lethales sæpè inducit hæmorrhagias, II. 209. quartanam & hydropem, III. 274. & ulcera, III. 445.
Hepatici dactyli spumino correpti diarrhæas & vomitus biliosos causantur, I. 304.
Hepatitis distinguenda ab inflammatione ventriculi? I. 294. ejus signa, *ibidem*. & *seq.* differentia. I. 295. spuria quæ fit, & quomodo à veteribus dilanguat? II. 143. cum pleuritide spuria sæpè complicatur? II. 144. in quo ab ea differat? *ibid.* nec non à doloribus ex calculo felico, *ibid.* dextræ hypochondrii, *ibid.* inflammatione maculorum abdominis; *ibid.* ejus symptomata, *ibid.* causæ, *ibid.* eventus bonus II. 145. & malus; *ibid.* ejus ex lapsu in abscessum declinantis & lethalis exemplum, II. 146. sudore discussæ causæ; *ibid.* quomodo tractanda II. 145. speciem quoad symptomata? II. 146. quatenus in ea convenientia topica & venæsectio? II. 145. vera cur fit rarissima? II. 143.
HERNIA intestinalis ex fortiori emetico? I. 213. *scrotalis* & *inguinalis* quæ dicatur? II. 276. cur hæc in scemini periculosior quam in viris? *ibid.* si passiois illius causa quomodo tractanda? *ibid.* & 278. si reponi nequeat, quid faciendum? II. 280. ejus recidiva quomodo arcenda? *ibid.*
HERPES, ejus ortus, I. 163. sæpè annuus & salutaris, I. 347. scabiei assimilatur & expropter ejusdem est effectus? I. 358. *exedens* & *miliaris* quid? III. 426. ejus signa, *ibid.* sedes, III. 427. quomodo differat à lue veneræ? III. 415. est contagiosa, III. 427. & scribis familiaris; III. 426. prognos, III. 430. curatio; III. 435.
HERTZ-BRAUNE quæ dicatur? II. 126.
Hertz - colique quid? II. 258.
Hertz - *Gespann* infantibus familiaris, & quid? II. 258.
HEURNIUS, I. 19. 21. ejus pulvis adstringens ex quibus ingredientibus constat? II. 227.
HIGHMORE intra? I. 71.
HIPPOCRATES Medicinæ rationalis parens, I. 16. anatonem coluit, I. 18. chirurgiæ navavit operam, *ibid.* circulum sanguinis an cognoverit? I. 19. corporum & naturarum diversitatem considerare jussit, I. 18. ignem fecit primum motorem; I. 33. mechanice rationibus studuit, *ibid.* morum & decoi doctrinam non neglexit, *ibid.* in morbis judicandis excelluit, *ibid.* motus prudenter judicavit; *ibid.* observationes condidit, *ibid.* physicam coluit, *ibid.* præservationem à morbis commendavit, *ibid.* regulas ex observationibus formavit, *ibid.* totum partium indigavit, I. 36. quæ ratione imitandus? I. 19. ad ipsius lectionem subsidia, *ibid.* quæ ex eo capiendum ecclesiæ? I. 20. ipsi non satis potuit natura humani corporis; I. 26. ipsius successores à

more ejus deserviverunt, I. 19. optima jecit artis fundamenta à posteris relicta; I. 299. & *seq.* posteriora & præstantiora ipsius dogmata; I. 300. perit meminit signorum ex pulsibus, I. 364.
HYPOCRAS morbus niger unde? I. 166.
HIRUDINES unum ex præcipuis morborum remediis: I. 260. evacuationis sanguinis inservit; I. 462. non plus quam scarificatio vel venæsectio præstant; *ibid.* quæ earum usum ad hæmorrhoides promovendas funderet & dissuadet? II. 244. III. 173. quo loco & quando in gusti frenâ? III. 230.
HISPANI aque *itali* quare frigido pota untantur? I. 470.
HISTORIA morborum præcipuum pathologiæ & therapie fundamentum: I. 147. 286. quid ad integrum morbi historiam requiratur? I. 148. perfecta fit: I. 286. quomodo consignanda? *ibid.* ad hypothesi examinandas utilis? I. 291.
HOECHSTEDTERI medicamentum ophthalmicum quod fit? I. 167.
HOLLARIUS, I. 19. 21.
HOMO, ejus definitio, I. 26. ortus ex ovo, I. 77. citra distincta insunt principia; I. 77. 95. cur crebrioribus & gravioribus morbis expositus, quam bruta, I. 180. cur tamen diutius in vivat? *ibid.* triplices in eo actus obvi. I. 405.
HORRIPALATIO unde I. 166. omnibus doloribus atrocioribus juncta, I. 167. in febribus unde, II. 10. in hypochondriaciis, III. 67. in podagra? II. 341.
HORSOR, ejus vis in corpus, I. 194.
HUMIDUM cur corporis conservationi adeo inimicum? I. 267. quare corpori humano utile? I. 469. frigidum an sensibus sine noxâ dari possit? I. 476.
HUMOR, quando propter illum infesta materia nervi repellatur? I. 360. quidam illius motum omnium maximè reprimere vult? *ibid.* retropulsus, nam funestorum symptomatum sola causa existit? I. 361. quare diffculter, etiam ope convenientium remedium, ad pristinum locum relegari possit? I. 362. bonus si nimius, & evacuandus; I. 219. superfluous ubi excroscatur? I. 118. utilis quoniam? I. 51.
Humorum motus quoniam conservandus? I. 362. proportio elementorum, I. 287. quantitas, I. 365. 367. non extravasantur inter fibram interitibus; I. 365. cur tam vari ex sanguine? I. 381. ad crasin eorum facit potus, I. 288.
Humorum corruptio quotuplex fit? II. 69. corrupti, quomodo ad appropriatam sedem reducendi? I. 363. corruptio *acida* - *vappida* in quibus præsertim locum habeat? *ibid.* interna unde oriatur & cognoscatur? II. 185. *sulphureo* - *ferida* quibus humoribus fit familiaris? II. 69. cum illis qui è vesicis post adulationem & vescicatoria educti sunt, experimenta instituta. III. 381. & *seq.*
Humores oculorum quotuplices sint? III. 234. cum ipsis in epiphorâ exsiliantibus experimenta instituta: *ibid.* eorum temperies & crasin in quo generation consistat? III. 371.
HUNGARICA febris à qualitate cæli derivanda: I. 335.
HUTTEN - RATZE quid? II. 287.
HYDATIDES quæ dicantur? III. 326. quæ ratione generentur? III. 279. unde in pectore? III. 97. cur facillè in utero? III. 326.
HYDROCELE quomodo generetur, ejus exemplum, & quomodo tractanda? III. 332.
HYDROCEPHALUS quid fit? I. 328.
HYDRO-

HYDROPHOBIA ex morbo canis rabidi nascitur; I. 199. quo pacto sananda? I. 201. ejus signa; I. 295. differt à phrenitide. *ibid.*

HYDROPS quid? III. 322. ejus ortus, I. 166. & *seq.* 175. 243. 255. sedes, I. 167. diversæ ejus species, III. 323. historia, *ibid.* differt à tumore œdematoso pedum, III. 328. à flatulentis tumoribus, *ibid.* à gravidarum tumore, *ibid.* à scieribus mesenterii; I. 329. signa III. 322. pulsus in eo qualis? I. 371. funesta ipsius signa, I. 394. III. 322. causa mortis: I. 399. eâ defunctio-rum anatome: III. 324. ratio tumoris; III. 325.

Hydrops quandoque congenitus I. 183. quâ ratione ab animi pathematibus oritur? III. 327. à sinistra febrium curatione, præsertim intermittentium, III. 334. à quartana I. 164. 352. à diætâ prævâ, III. 327. à morbis retro pulsus arthritici & exanthematici, III. 328. ab excretionibus sanguineis suppressis aut nimis, II. 220. III. 327. ex suppressis mensibus; I. 341. ex hæmorrhoidibus; I. 343. nimis hæmorrhagiis, I. 349. à polypo, III. 347. ex affluente; I. 305. 320. 400. ejus cum affluente casus III. 338. cum cachexiâ juncti exemplum, III. 317. & *seq.* ex atonia hepatis & lienis, I. 307. 320. hepatis obstructione, viscerum, & glandularum, I. 400. uteri vitio, *ibid.* symptomatici casus, III. 337. eventus bonus III. 329. & malus; *ibid.* subje-cta III. 326. cur gravidis præsertim familiaris? *ibidem.* cur senibus magis familiaris, quoniam juvenibus? I. 170. cur facili recurrit? I. 224. 356. cur rarior? I. 185. cur mensis tempore homines afficiat? I. 234. ambulatiores est ab unâ parte corporis ad alias, etiam internas; I. 359.

Hydrops curatio: ascites insanabilis: I. 184. ejus specifica. I. 451. quando in eo convenienter clystere, III. 330. diaphoretica, III. 331. diuretica, *ibid.* quæ cum optimè urcent; I. 441. paracentesis, III. 329. intra duplicaturam peritonæi paracenthesim admittit I. 326. purgantis fortioris & mioris, III. 330. & *seq.* externa roborantis & resolventis, III. 331. & venæsectio. III. 332. quomodo tractandus in affluente; I. 329. quomodo ex flatulentia ortus, III. 333. ab excretionibus sanguineis suppressis enatus, *ibid.* in scorbutica? III. 332. hæmorrhagiæ huic super-venientes quibus sistende, III. 33. & qua ratio-ne ulcera pedum curanda? *ibid.* uteri fluxu spon-tè sanatus. I. 410.

Hydrops pectoris quomodo generetur? III. 87. 97. signa, *ibid.* & I. 328. quibus solemnis? I. 328. à polypis vasorum pulmonalium, I. 330. ex suppressis mensibus, I. 341. affluente, quo-modo? I. 352. eo defuncti anatome, III. 337. & *seq.* sæpè affluente suffocativi causa est, III. 97. quomodo necet & inferat symptomata? III. 337. ejus curatio, III. 99. quando insanabilis? I. 184. uteri fluxu sponitè quomodo sanatur, I. 410. quatenus in eo conducit paracentesis? III. 337.

Hydrops pericardii quomodo generetur? III. 334. cur sæpè jungatur affluenti spulmodico? I. 166. ut plurimum à polypo enascitur. III. 339.

Hydrops sacatus qui dicitur? III. 328. lapsu cu-ratur. I. 410.

Hydrops subitaneus ex ruptis tumoribus scroliis in abdomine: I. 326.

Hydrops uteri quomodo generetur? III. 326. à polypis, I. 330. ex suppressione mensium; I. 341. cur facilius curetur quàm is, qui ex hepa-tis vitio? III. 336.

Hydropici sibi caveant ab humiditate frigida: I. 267.

HYEMS quos producat morbos? I. 266. eo tempo-re studendum liberæ transpirationi, I. 135. vi-etum duriorum faciliè toleramus, *ibid.* vini & ce-revisiæ generosioris potus commendabilia. *ibid.*

HYGIENE quid? I. 14. debet nisi principii certis. I. 99. proximum à Physiologiâ locum tenet, I. 14. 99. qualis scientia? I. 99. quid supponat? *ibid.*

HYGROMETRA commendata. I. 105.

HYOSCYAMUS venenis annumeratur: I. 200. faciliè mentem alienat. I. 223.

HYPNOTICA ubi tentanda? I. 225. Vide *Separifera*.

HYPOCHONDRIACUM malum quid? III. 64. ejus his-toria *ibid.* à veteribus describitur III. 65. in quo consistat I. 352. in quo differt à colica I. 297. III. 70. à flatulentia simplici III. 66. in quo con-sistat I. 352. malum testatur consensum partium membranarum I. 29. est affectio generis ner-vosi I. 317. subjecta III. 65. eo defunctorum a-natome III. 68. flatulentiorum symptomatum III. 66. & spasmodicorum ratio III. 67. unde ortum trahat I. 474. causa proxima III. 66. causa pri-ma non crudities I. 317. nec unica stagnatio sanguinis in vasis venæ portæ I. 345. remote causæ sunt plures I. 177. variet I. 345. animi pathemata I. 313. III. 69. ejus à diuturno me-more oborti & suppressa per terrorem quantum exemplum III. 77. ex gravi terrore enati cûa III. 75. aëris frigidi constitutio III. 68. excres-ciones sanguineæ suppressæ *ibid.* à suppressione hæmorrhoidum I. 343. exemplum III. 80. morbi prægressi III. 69. ex febre acuta ter tolerata casus III. 76. ex tertiana intermitten-te I. 164. male curata I. 352. eaque suppressa III. 74. ex diar-rhœa opiatu suppressa III. 75. alvi fluxu I. 352. dispositio hæreditaria III. 69. nam est morbus hæreditarius I. 183. 244. 349. hæreditarii ex va-riis causis adaucti exemplum III. 77. & *seq.* à crebris puerperis obortum III. 79. vitius crassior & vita sedentaria III. 69. diuturni ex vita seden-taria casus III. 76. imbecillius naturæ proles I. 345. ex potu frigido post iram *ibidem.* sanguinis stagnatione in visceribus abdominis I. 317. diu-turni ex vita sedentaria casus III. 76. signa I. 297. *spasmodici* cum suspitione falsi cui exemplum, III. 79. *stomachici* casus; III. 82. quo tunc ut scorbuticus sæpè evadat, III. 67. *hysterici*, *ibid.* singulare hujus exemplum, III. 78. unde *melancholicum* oritur? III. 67. 255. ejus hære-ditarii casus, III. 80. *melancholicus* - *maniaci* exemplum, III. 81. 264. cum mania periodici alternantis exemplum; III. 264. fluentibus hæ-morrhoidibus affligit, I. 345. hæmorrhoidalia molimina gignit; *ibid.* hæmorrhoidibus levatur; I. 343. efflorescente purpurâ quomodo discedit; I. 410. eventus III. 70. quomodo tractandum? III. 74. cura fundamentalis; I. 317. specifica in eo præstidia; I. 451. quâ medellâ curandum? I. 474. curatio in paroxysmo fit per antispasmo-dica, III. 70. & *seq.* clystere & laxantia, *ibid.* & I. 467. temperantia, *ibid.* & tonica *ibid.* re-quirat præterea exactum vitæ vicium regimen & quale? III. 71. 73. quando in eo conducant a-quæ minerales, III. 71. hirudines; III. 73. la-xantia & purgantia, *ibid.* mannæ & clystere, *ibid.* martialia, III. 74. externa remedia; III. 72. variaz.

veneseccio? III. 71. 73. non indistincte curatur acidulis ac martialibus I. 153.

HYPOTENDRIACI flatulentia vexantur? I. 67. in melancholiam prout? I. 103. cur phantasia corrupta laboret? I. 200. abstinere debent ab emeticis I. 214. & anodynis? I. 224. caveant sibi ab iracundiâ? I. 150. cur adeo voraces? I. 248. ad omnem cibum male se habent? I. 253. spasmi cur atate conqueantur? I. 265. cur vere & autumnus pejus se habeant? II. 28. & seq. cur hyeme? III. 68. ex quibus causis post paupum maxima incommoda sentiant? III. 67. & praesentium palpitacionem cordis? III. 86. & seq. cur ut plurimum pharmacomania laborent III. 70. & catarrhia gravius decumbant? III. 45. quomodo in iis tractandi? II. 47. cur rursus morbis grassantibus sufficiantur? III. 65. maxime apoplexie sunt obnoxii? III. 241. asthma? III. 95. cardialgie flatulentæ? II. 288. colicis doloribus? II. 286. comati formolento? III. 211. epilepsie? III. 12. guttae feræ? III. 229. hæmoptysi? II. 203. hæmorrhoidibus? II. 195. morbo nigro Hippocratis? II. 214. melancholia? III. 67. motibus spasmodicis vagis? III. 36. scorbuto? III. 67. vertigini? III. 220. ulceribus? III. 445. vomitui cruento? II. 214. & nigro? III. 142.

HYPOTHESES medica non omnes quidem rejiciende? I. 150. quia tamen discordantur sunt prognostices? ex iis emergere sudeat Philæus? I. 154. earum tria genera? I. 151. multæ in medicina? I. 291. quomodo examinande? *ibid.* earum lapsi lydiæ. I. 14.

HYSTERICUM malum quod dicatur? III. 50. ejus historia? III. 51. paroxysmorum descriptio? *ibid.* solutio? *ibid.* subjecta? III. 52. est morbus periodicus? I. 186. gravidæ & puerperis imprimis familiare? III. 53. fides? I. 164. III. 52. non in utero? sed ventriculo & intestinis? I. 316. hæreditarius morbus? I. 349. differt ab apoplexiâ? III. 52. à calculo renum? *ibid.* ab epilepsiâ? *ibid.* à malo hypochondriaco? III. 51. & syncope? III. 52. eo desinaculatur anatome? III. 54. ejus symptomata ex terrore? I. 191. prognostis? III. 55. causa proxima? III. 52. cause externe & interne? I. 173. materiales cause? III. 53. non à nervis? sed sanguine stagnante derivandum? I. 316. ex puerperio? I. 350. atoniâ uteri? I. 307. mediolum defectu? I. 316. 341. III. 54. ex mensibus imminutia orti exemplum III. 59. cum epilepsiâ ex mensibus suppressis juncti casus? III. 61. & quomodo tractandum? III. 56. cohibito fluore albo? I. 340. ejus à fluore albo suppressio casus III. 63. retinente sanguine lochiali? I. 342. à lochiis suppressis aut minuta rite fluentibus? III. 54. ex lochiis suppressis orti casus? III. 61. ex irregulari lochiorum fluxu subnati exemplum? III. 63. ex eisdem orti & pelenibus tractati casus funestus? III. 62. à simula veneris? III. 53. præprimis femine corrupte inducitur? *ibid.* ex occultato amore exemplum? III. 59. & in hoc casu expedit conjugium? III. 56. 59. in juvene sextus nobilioris contingens casus? III. 58. cum convulsionibus ex utero & primatum virum vicio ortum? III. 60. cum moribus convulsivis & epilepticis junctum? III. 58. spasmodicum vagum certæ familie peculiare? III. 61.

HYSTERICUM malum medendi indicationes III. 55. que profuit? I. 316. levatur laudando? I. 318. per absorbentia? III. 57. per antispasmodica? III. 56. in paroxysmo per clysteres? III. 55. I. 468. & graveolentia externa? *ibid.* extra paro-

xysum per anodyna & specifica? III. 56. quoniam sunt I. 451. per antispasmodica? *ibid.* diaphoretica? *ibid.* caustice circa subiecta? III. 57. castorina & dietam? *ibid.* pediluvia? & venesectionem? III. 55. non indistincte curatur caustice I. 153.

HYSTERICI flatulentia vexantur? I. 67. cur suavolentia ferre nequeant? I. 305. apoplexiâ leviori corripuntur? *ibid.* 299. 458. ad abortum sunt proclives? III. 178. & quomodo ab ipso præcavende? III. 182. ad catalepsin prone sunt? III. 46. ad guttam ferenam? III. 229. hæmoptysin? II. 203. hypochondriacum malum? III. 65. motus spasmodicos vagos? III. 36. singulum? III. 125. cur ipse frequens sit ad mingendum stimulus? *ibid.* & 52. cur minus ferant salivationem? III. 419. quomodo morbillis laborantibus tractandæ? II. 64. puerperia sibi fluxu laboventibus an salina remedia conducant? III. 57. auricis maxime infanti sunt nocivæ? III. 471. abstinere debent emeticis? I. 213.

I.

JACOTUS. I. 21.

JACOBUS Berengarius Carpentis. I. 21.

JALAPPA, ejus pulvis à Rollino in colica & ichtero laudatur? III. 307. refusa cum aliis permixta in pertinacibus cutancis morbis laudatur? III. 432. quâ ratione multos funestus effectus corpori inducat? II. 245. cur atrocia ciat pathemata? I. 316. quando infantibus nocet? III. 475.

ICTERUS quid? III. 301. signa & symptomata? *ibid.* qualis in eo unica? I. 379. differt gradu? III. 302. eo desinaculatur anatome? *ibid.* calculosis cur familiaris? I. 353. & colicis? I. 354. & primæ senectæ? I. 183. periodicus unde? I. 186. cur facile recurat? I. 244. recidivans unde? III. 310. ipsius exemplum? *ibid.* ejus frequens recursus quale signum sit? III. 303. an solvat febres? II. 44. quomodo tertiana jungatur? II. 21. unde? I. 175. causa proxima quæ? III. 302. cause mediæ sunt plethora & perversa diæta? III. 303. a plethora in gravidâ exemplum? III. 308. febres intermittentes? I. 314. exque male curantur & excretiones sanguinæ suppressæ? III. 303. cum tertiana & tussi curati casus III. 21. cur ex ira progignatur? I. 190. & 314. ex nimia aquarum ardentium potatione? I. 255. à spasmis crificis cholelechi? I. 304. ex atonia I. 307. & obstructione hepatis? III. 307. spasmis ventriculi? I. 314. purgantibus? *ibid.* venenis? *ibid.* vomitoris? *ibid.* retento meconio? *ibid.* colicâ? *ibid.* à colicâ bilioâ oborti exemplum? III. 307. retentis mensibus? I. 341. à metastasi feri ad hepatis delati? III. 308. paroxysmum febilem excipiens observatio? III. 309. febre bilioâ junctus? III. 311. gravior cum salivæ fluxu expuitione? III. 309. in nigrum mutatus? III. 310.

ILLERI niger & flavus unde? I. 379. niger cur rarior? I. 185. ejus causa? III. 303. eo desinaculatur anatome? III. 310. nigri & flavi prognostis? III. 304.

ILLERI cura præservatoria quorundam dirigenda? III. 307. specifica in eo? I. 451. à spasmis quomodo per emulsiões temperantes & leviores antispasmodica tractandus? III. 304. si ab obstructione per aperientia & relolventia? III. 305. ab iracundiâ ortus quomodo curandus? III. 122. quando salia media? rhabarbarina & roborantia conducant? III. 305. caustice circa emetica & purgantia?

purgantia, *ibid.* sudorifera & balnea, III. 306.
circa amara, *ibid.* venesectionem, *ibid.* topica
& alimenta.

JELIUSUM cur tolerabilis senibus? I. 247.
IGNAVIA cur debilitat vires? I. 245.
IGNIS *saecr* qui dicatur? III. 426.
IGNES pollent medica pestilentiae vi: I. 212.
ILEON intestinorum tenuissimus & maxime sensibile, I. 304. lumbricorum nidus, I. 331. quae pariant lumbrici ista flagrantia symptomata? II. 276. & *seq.* spasmo affectum causa doloris circa umbilicum I. 303. & colicae biliosae, I. 304. ejus motus congressus frequens doloris & spasmi iliaci causa, II. 276. quomodo fieri possit? *ibid.*

Ileus cruentum Hippocratis quomodo differat à scorbuto? III. 374.
Ileaca passio à frigida potione, I. 233. ab inverso peristaltico motu, I. 304. funestae signa; I. 394. sphacelo iostestinum necat. I. 401.

Ileico-inflammatory passio saepe epilepsiae causa, III. 12. ex ibi per spicas ficcas obstructione orta; II. 174.
IMAGINATIO, ejus vis in corpus. I. 194.
IMBECILLES cur porum alimenti desiderant? I. 247. quomodo sint? *ibid.* caveant sibi ab humiditate frigida? I. 267. ut quomodo succurrendum? I. 130. stricta dieta opus. *ibid.*

Imbecilliora corpora quomodo? I. 130.
Imbecillitas corporum morbis obnoxia I. 178. 240. quomplex? I. 241. ex praedictis morborum causa, I. 348. quibus indicatur? I. 349. quibus cognoscatur signis? I. 348. 420. istius specificata. I. 466.

IMMOBILITAS membrorum in catalepsi unde? III. 45.

IMPTIGO, ejus definitio, signa, & symptomata, III. 426. annua & saepe salutaria, I. 347. quomodo differat à lue venerea? III. 415.

IMPOTENTIA artuum unde oritur? III. 223.
IMPRUGNATUM incommoda. I. 78.
INAPPETENTIA cur malum in cachecticis & hydropticis signum? I. 324.
INCIDENTIA materiae correctioni dicata, I. 428. quae sint? I. 429. quomodo agant? I. 430. & usurpanda? *ibid.* aperiunt, *ibid.* sanguinem depurant. *ibid.*

INCUBI ratio. I. 128.
INDU cur dysenteriae obnoxii? III. 152. eorum epilepsiam curandi methodus: III. 16.
INDURATIONES unde? I. 164.
INDURIA in morbis exanthematicis non mutanda, I. 315. à sudore tinguntur, I. 381. pondere incrementum. *ibid.*

INEDIA, ea fracti non subito sunt replendi, I. 116. quae sit nocent? *ibid.* quibus conveniat? *ibid.* saepe nocet; *ibid.* longioris noxae. *ibid.*

INFANTES recens nati quomodo tractandi? III. 472. quomodo suscitandi? III. 473. primis mensibus leviter nutriendi I. 82. lactenti nocet repletio, I. 132. tenerioribus lactene praebendum; I. 132. & quando sit lactandi? I. 133. quando ablaclandi III. 475. quibus & in pulcritudine saturandi? *ibidem.* crebro sed modice cibum capiant; I. 133. quis cibis conveniat? *ibidem.* dieta eorum *ibidem.* sit circumspicienda, I. 132. firmitate & teneritudine differunt, *ibidem.* eorum sanitas pendet à sana nutritio constitutione, I. 133. sanitas periclitatur matris & nutrimentum delictis diateticis, I. 132. à numeribus adfectibus delectis multa trahunt pathemata, II. 282. multi machinantur à suis nutritibus, I. 132. den-

tientibus lac copiosum non est ingerendum, I. 133. medicinae multae & validiores non conveniunt, I. 134. docet vinum & spirituosum, I. 133. cur difficulter sudent? I. 382. debiles ex quibus signis judicandi? III. 473. calore non sunt nimis fovendi? I. 133. divitum cur rarius adolescant quam pauperum? I. 82.

Infantium morbi unde dependant? I. 241. cur ad morbos praecives? III. 473. quibus morbis adficiantur? I. 183. 241. quae signa eorum? I. 395. quae causa morborum? I. 402. sunt cardialgiae obnoxii, II. 258. catarrhalibus adfectionibus, III. 233. cunctis vitiis, III. 427. epilepsiae, III. 9. guttae serena, III. 239. iliacae pelliculi à terrore matris, II. 282. purpurae, II. 69. III. 408. morbis spasmodicis, III. 116. singulis, & cur? III. 123. tussi convulsiva, III. 121. vermicibus, III. 490. vomitibus viridibus ac aeruginosis, III. 139. 142. tollendo sibi saepe heroicam aut gibbos contrahunt, III. 111. ex quibus aliis causis gibbosi fiant? III. 473. à fructibus acidis & immaturis cur maxime laedantur? III. 311. cur lue venereae facile infici possint? III. 423. à variolis & morbillis immunes, si alios jam cutis adfectus perpelli sint, III. 427. an ipsis mercurialia in causis defecationibus debeant offerri? III. 435. quomodo à morbis praeservandi? I. 186. III. 473. Vide *Morbi Infantum.*

INFLAMMATIONES quomodo gignantur? I. 302. quae occupent partes? II. 140. in quo consistat earum essentia? II. 176. quando legimus, quando citius nocent? II. 120. sunt saepe ulcerosae, III. 444. quae sit superveniens letalis, I. 392. in sphacelum demum concedunt? I. 393. periculosiores quandoque sit mitiora adsumptissima; I. 392. in principio quomodo distinctione? I. 415. venesectione discutuntur, I. 408. quae requirant venesectionem, quae non? II. 122. nimis venesectione exacerbantur: I. 408. earum specificae; I. 450.

Inflammationes faciales leviores quomodo differant ab angina? II. 126.

Inflammationes Hepatis, vid. Hepatitis.

Inflammationes internae partium quibus personis sint familiares? II. 152. quibus signis cognoscantur? II. 124.

Inflammationes intestinorum. Vide *Intestina.*

Inflammationes Meningum, vid. *Meningitis.*

Inflammationes Mesenterii, vid. *Mesenterium.*

Inflammationes musculorum abdominis in quo differant ab hepatis puria? II. 144.

Inflammationes oculorum, vid. *Ophthalmia.* *hemus*, vid. *Nephritis.* *Ventriculi*, vid. *Ventriculus.* *Vesicae*, vid. *Vesicae Uteri*, vid. *Uterus.*

Inflammationis febris quae dicantur? II. 205. earum species & differentiae; I. 294. quae sint universales, qualesve particulares? II. 205. qualis in his pulsus? I. 371. ex suppressis mensibus; I. 342. an sint in his malum exhibeat praesagium? II. 117. recidivant quandoque; I. 356. earum recidivae quae damna pariant? II. 108. quomodo arceantur? *ibid.* meditatio earum; I. 408. nimis venesectione exacerbantur, *ibid.* jussu levantur. I. 460.

Inflammatoria febris intestinorum ex mesenterio in quo differat à fementeriana. II. 171.

Inflammatoria - iliacae febris. II. 174.

Inflammatoria - spasmodica intestinorum passio, iliacae minis. II. 173.

INFUSA, eorum usus liberalior ad arcenda contagia commendatur. I. 212.

Infusum antifebrile. II. 31.

Vesica calida corrigunt ciborum noxas: I. 110.
Infusa diaphanica præferenda fudoriferis. I. 417.
Infusum laxans. III. 435.
Infusum pectorale, III. 114.
Infusum rheiforme præcipuum facultatem aque debet, I. 463. in chronicis adflicibus, II. 324. in morbis cutaneis, III. 432. in chlorosi à suppressione mensium, III. 319. ad diaphoresin, III. 71. ad epiphoram, III. 235. ad tussim, III. 113. ad spasmos in hæmorrhagiâ uteri, II. 226. ad pneumonicas febres, II. 139. ad rheumaticos & arthricos dolores: II. 322. ad vertiginem cum nephritide, III. 222. ad arcendos vomitionis cruentæ recursum. II. 215.
Infusum vinosum laxans præferendum purgantibus I. 416. in dispositione ad abortum ex malo puerperii regimine; III. 181. ad chlorosin à suppressione mensium, III. 319. ad quartanam, II. 26. ad hydropem spectatæ virtutis, III. 330. ad gonorrhœam, III. 359. ad fluxum album, III. 351. ad obstructions viscum, III. 27. 29.
INGENIUM debile, in quo ejus causa proxima consistat? III. 217. & seq. *etvax* unde in rachitide? III. 488.
INGESTIONES debent respondere egestionibus. I. 66.
INGESTA, eorum natura, modus, & ratio probè examinanda. I. 257.
INJECTIONES in fluore albo, III. 352. in urethra exulceratione à gonorrhœa, II. 312. III. 262. in putrida sub salivatione quæ conveniat? III. 421. in uteri inflammatione, II. 159. & ipsius ulceribus, III. 458.
INQUETUDO senum unde? I. 241.
INSALUBRIMUM rerum indoles; I. 185. scientia medico maxime necessaria. I. 188.
INSANIA, ejus subjectum, I. 179. hæreditarium malum, I. 346. cur maxime tempore verno generetur? I. 266. perpetram promittit ab hæmorrhoidibus repetitur, I. 347. ex suppressâ narium hæmorrhagiâ, I. 346. facile recidivat, I. 356. hæmorrhoidibus solvitur & præservatur; I. 343. balneo levatur; I. 463. scarificationem melius quam venæsectionem fert. I. 461. specifica ipsius. I. 451.
INSECTA quomodo venenosam naturam induant? I. 195. eorum ingens copia Romæ. I. 211. in locis calidis venenosior; I. 195. morbos malignos præfigit. I. 210.
INSOMNIA terrificæ & dæmoniæ, unde? I. 166.
INSPIRATIO quomodo fiat? I. 44.
INTERPERANTIA corpori inimica. I. 185.
INTERMITTENS febris minora prima in regione; I. 313. unde symptomata ejus? *ibid.* quandoque salutaris, I. 408. & seq. quandoque exitiosa, I. 411. etiam habet crisin, I. 390. facile recidivat I. 367. quibus promittitur recidiva? *ibid.* recta eam sanandi ratio, I. 409. & sinistra. *ibid.* optime præcinditur emetico vel laxante, I. 415. specifica ad curandum ipsam; I. 450. malè curata gignit hypochondriacum malum; I. 352. contumacis fomes, I. 408. & specifica. I. 450.
INTERMITTENTIUM phenomena explicata. I. 169.
INTESTINA, eorum structura, III. 66. & seq. eorum fibra causa motus peristaltici I. 64. sensibiles I. 29. villi sunt cavi I. 64. cum aliis nervosis partibus alunt consensum, II. 284. III. 67. cum ventriculo, I. 314. cum membranis univisceribus, I. 315. in morbis valde debilitantur, I. 349. flatus obediunt & distenduntur, I. 332. coalescunt quandoque in colicâ convulsivâ: I. 402. cur in his qui veneno despecti sunt, *Erid. Hoffmanni Oper. Tom. III.*

expansâ deprehendantur? III. 173. eorum *atonia* quæ pariat mala? I. 306. quibus subinvestitur? I. 446. ab eorum *convulsivâ affectione* diarrhœa & cholera. I. 306. libere patiuntur male tractatis alvi fluxibus. I. 352. languentia clysteribus firmantur I. 467. *dolores chronici* unde originem trahant? II. 292. *erysipelis* eorum quæ signa? I. 333. erosa clysteribus consolidantur. I. 468. *Inflammationes* quibus signis cognoscantur? II. 120. quomodo eorum varia sedes determinanda? II. 170. sensibus sunt frequentiores quam meningum, II. 119. quibus modis & in quibus accendant? II. 170. inflammatione & sphacelo corrigiuntur in dysenteria, I. 324. quomodo possint præcaveri, II. 174. & in passione iliaca tolli? II. 279. ejus cruenta diarrhœa soluta & repens lethalis capus, II. 173. ex *mesenterio* quomodo oriatur? II. 170. quæ sint eorum causæ? II. 171. sunt vel graves, vel leviores; *ibid.* quomodo sint præservandæ & curandæ; *ibid.* & seq. eorum *inflatio* quibus curanda? I. 445. eorum *spasmi* quomodo laxandi, II. 173. & tollendi? I. 431. quid patiuntur à spasmo, I. 303. & seq. ipsorum *rheumatismus* qui dicendus? III. 160. & seq. *tormina* in dysenteria unde oriuntur? III. 154. eorum vehementia sæpe convulsionis causa, III. 165. & seq. à salivatione mercuriali producta quomodo compescenda? III. 420. *infantum* ex quibus signis pateant? III. 478. eorum causa proxima, *ibid.* causæ mediata, *ibid.* prognos; III. 479. quæ in his curandis ex parte nutrice & infantis conducant? *ibid.* cautela tenenda circa clysterum præparationem? III. 480. circa ea quæ à spasmo in aliis locis oriuntur, *ibid.* circa purgantia, *ibid.* & sedativa, *ibid.*
Intestina crassa ascitidum habitaculum, I. 332. eorum ad sanguinem aliquid divinitur; I. 64. quare tam gravibus stricturis spasticis sint obnoxia? I. 164.
Intestini jejuni spasmus unde cognoscatur? II. 292.
Intestinum rectum, ejus consensus cum vesicâ, II. 153. inflammatio ipsius vesicæ sæpe causatur, II. 309. spasmus alvi adstrictioris causa, III. 79. dolor sæpe ab hæmorrhoidibus cæcis; II. 289. à dolore ex hæmorrhoidibus sphacelum patitur. I. 324.
Intestina tenuia, eorum sedes, III. 340. inflammationis & sphaceli signa; I. 324. à drasticis remedia in colicâ biliosa inflammantur; II. 293. 303. à fœcibus induratis aut à vermicibus spasmus sunt obnoxia. II. 201.
INVENTA physico-medica medicinam juvant. I. 20.
JOUBERTUS. I. 21.
JPECACUANA, ejus virtus & prærogativa; I. 432. ejus radix roborat & transpirationem adjuvat, III. 354. in principio pestis commendatur, I. 204. specificum in dysenteria & quatenus in eâ conveniat? I. 452. III. 155. non semper est antidysentericum. I. 153. quatenus conducit in epilepsiâ? III. 16. in fluore albo, III. 353. 354. in hypochondriaco malo, III. 72. in motibus spasmoticis vagis, III. 38. in vertigine, III. 221. in vomitu? III. 145.
IRA, ejus effectus in corpus, I. 287. 313. 319. agit in ventriculum & intestina, I. 190. ubi inflammationes periculosas producit; *ibid.* iacuos veneno imbuit, I. 195. & seq. quibus sit remediis? I. 190. facit ad colicam, I. 298. ad cardialgiam, I. 319. ad vomitum, *ibid.* ad icterum, I. 314.

A a a ad

ad febres biliosas cholericas, I. 319. atrocitas et pathemata si calculus in cystide fellea; I. 331. quæ post eam damnosa? quæ utilis? I. 416.

INACUNDA, ejus effectus in corpore humano, I. 35. 302. II. 112. 259. præsertim in ventriculum & vicinas partes, II. 122. III. 32. 103. imprimis si cibi superingeruntur, III. 32. in plethorica, II. 18. in morbis acutis, II. 72. in feminis mox menstruandis, II. 218. mensibus fluentibus, *ibid.* & quæ excitet symptomata, III. 263. præsertim stomacho cibis pleno fermentescibilibus? II. 117. ad eam proclives sunt hepate laborantes, II. 147. quantum faciat ad abortum, III. 179. ad apoplexiam, II. 241. ad cataleptin, III. 47. ad colicam convulsivam, II. 292. ad cholera, III. 167. convulsiones, III. 25. dolores calculosus, II. 298. epilepsiam, III. 12. icterum, III. 411. ad hæmoptysin, II. 207. ad syncope, III. 272. in nutrice ad vomitus infantilis, III. 142. noxas quid augeat? I. 103. quid eisdem avertat? *ibid.* quomodo mala inde avertenda? II. 122. 218. 267. III. 474.

ISCHADICUM malum quandoque anniversarium; I. 183. senibus familiare, *ibid.* quomodo gignatur? I. 302. à spasmo oritur, I. 303. spasmus stupor, I. 302. ex mensum emanatione, I. 344. differt à nephritide; I. 295. ex hæmorrhoidum suppositione venesectione levatur; I. 344. repulsum nocet, I. 339. quando in eo venesectione insitenda? I. 459.

ISCHURIA quid? III. 493. in infantibus unde? *ibid.* quomodo cognoscenda si ex calculo, *ibid.* & quæ ratione ex ipso commoto lethalis fieri possit? II. 302. sæpe renum aut vesicæ exulcerationis est symptoma; II. 235. cur pressio pede coma somnolentum sequatur? III. 211. à materia podagrica retrogressa oritur sæpe; II. 341. à gravis sanguinis, & quid in ea prosit? II. 235. à gonorrhœa male curata ortæ exemplum; II. 315. lethalis à materie acrimonis ex renibus purulentis productæ casus; II. 317. ex mictu cruento potione mannâ sanata exemplum, II. 239. quomodo sananda in infantibus? III. 494.

JUGULARIS vena in melancholicis & phrenitide incidenda. I. 458.

JULLEPS emeticus quomodo parandus? II. 14. refrigerans, II. 115. in febribus acutis, si coma vigil urget? III. 213.

JUSCULA confortantia, quam noxam pariant in febre petechizante? II. 78. 81. *carminum gelatinosa*; I. 106. laudantur in animi deliquis à sanguinis defectu, III. 273. in motibus spasmodicis, III. 27. *medicamentosa* laudantur in cholera, III. 168. ex hæmorrhagiâ uteri convalescentibus, II. 226. in nimio hæmorrhoidum fluxu, II. 221. in huc venerat, III. 418. *pinguis* à colicâ sanaminâ præcavet. II. 289.

JUVENTUS prima debet indurescere; I. 134. quibus morbis afficiatur? I. 183. 308. qualis in ea pulsus? I. 368. quid peculiare fervet? I. 287. ei commendanda medicamina. I. 134.

K.

KORN - MUTTER quænam producat symptomata? I. 230.

L.

LABOR augeat circulum sanguinis, I. 47. mox à passu nocet, I. 66. sanitas conducit, I. 157. mutat pulsum, I. 368. *Vid. Motus.*

LAC quid sit? I. 80. ex chylo & sanguinis gelatinosa parte separatur I. 81. à spissius secreto ipsius intercipitur I. 304. ex animalis depromptum quale sit I. 469. ejus usus vetustissimus ostenditur; II. 180. alimentum universale; I. 207. optimum alimentum; I. 80. ejus bonitas unde pendet? I. 81. quomodo cognoscatur? *ibid.* examen, I. 132. quodnam sit optimum? II. 180. non unius ejusdem generis est; III. 289. cur vernale hyberno sit salubrius, *ibid.* & *seq.* ejus virtus augeat pabulo medicato, *ibid.* vel admixtione aquarum mineralium; *ibid.* optima est antidotus, I. 431. III. 168. & *seq.* & quomodo propinandum? III. 168. & *seq.* cur promptissimum contra venena remedium? I. 201. continuato usu juvat; I. 423. laudatur cum aqua calidæ vivæ à Sponio in leprâ & impiegiæ, III. 291. cum decoctis & infusis vulnerariis in phlebis & hæmoptysi, *ibid.* cum diureticis & anodynis in eodem morbo, *ibid.* cum pectoralibus balsamis; *ibid.* & *seq.* quo in casu cum aquis mineralibus permiscendum, II. 29. III. 294. quomodo & quibus cautelis insinuanda cura? III. 29. & quid ante ejus usum conducatur? III. 39. commendatur in artuum doloribus, III. 323. in dysenteria, III. 156. in epiphora, III. 235. hæmoptysi, II. 206. dolore intestinum à purpura scorbutica retrocedente, II. 297. lentis & hecicis febribus, II. 180. podagrâ, III. 347. 352. morbis subcutaneis, III. 433. purpurâ ictericâ, III. 405. an conveniat in cholerica passione, II. 117. in imminente ventriculi inflammatione, II. 124. in vesicæ morbis, II. 154. cum amylo in vomitu cruento à corrosivis excluso laudatur, II. 215. cum oleo amygdalarum dulcium in vermium præsentia, II. 262. post purgantis improvidè sumpta; III. 63. copiose haustum veneni & purgantium vix sinit I. 215. non semper est anisophiticum vel anisopodagricum. I. 153.

Lac quibus nocet? II. 180. ejus copia infantibus noxia, I. 248. trassum quæ noxas ferat? I. 332. pessimum quale? *ibidem.* tenue minus lædit crasso; I. 82. qui convertatur in venenum? I. 252. quando in hunc explicetur? I. 297. concretum venenum æmulatur; I. 312. & *seq.* inflationem ventriculi causatur; I. 297. nutrimum gravissima mala in infantibus transfert. I. 189.

Lactis serum quem præstet effectum? III. 433. in defectu aquarum mineralium optime adhibetur, *ibid.* ejus cura quomodo insitenda? *ibid.* præservat calculum renalem, II. 301. recidivæ vomitus cruenti; II. 215. quando conducit in cephalæa, II. 255. convulsionibus, III. 34. cholera, III. 169. cutis adflectibus, III. 433. dysenteria, III. 156. epilepsia, III. 15. epiphora, III. 235. hæmorrhagiâ uteri, II. 226. hæmoptysi, II. 210. nimio hæmorrhoidum fluxu, II. 220. hysterica passione, III. 55. mania & melancholia, III. 81. 82. mictu cruento, II. 235. petechiali febre, II. 88. rheumatico & arthrico dolore, II. 321. scorbuto præsertim cum herbis antiscorbuticis, III. 39. 378. tussis cum tabe, III. 113. vomitu, III. 145.

Lac asinum, ejus substantia, III. 289. cur ad calcem & butyrum conficiendum mania aptura sit? *ibid.* specificum in podagrâ, I. 450. ad longævitatem, I. 453. laudatur ad detersionem & ulcerum purgationem, III. 290. ad cutis adfectus, III. 433. scorbutum, III. 378. ad tussim cum tabe, III. 113. cum aquis mineralibus in delirio maniacis & melancholicis, III. 260. in fe-

bris

brebus lentis & heclicis, II. 180. in motibus convulsivis à malis ulcerosis suppressis, III. 28. in phthisi, I. 451. III. 289.

Lac bubulum in quo differt ab alimino? III. 289.

Lac caprillum in quo differt ab alimino? III. 289.

Ejus virtutes. *ibid.*

Lac muliebre ad usum medicum est optimum, III. 289. quid praestet? *ibid.* & II. 180. pueritiam in lena febre; II. 179. diu lactantium cuius indicia? III. 473. quoties infantibus de die exhibendum? III. 474. corruptum ab animi adiectionibus, *ibid.* à diuturno vitio, III. 471. à crebriori coitu & mensibus fluentibus lactationis tempore; *ibid.* à frigore mammae incautus admissio, *ibid.* in infante à superfluo ipsius ingestione, *ibid.* à cibis incongruis datus, *ibid.* & *seq.* à meconio retento, III. 479. corruptum quâ ratione apthas inducat, III. 480. cardialgiam, III. 494. epilepsiam, III. 11. 12. singultum, III. 124. tormina? II. 286. & quomodo corrigendum & evacuandum in nutrice & infante? III. 475. & 481.

Lacticia noxia, I. 109. corpori inimica, I. 185. senibus non conveniunt, I. 134.

Lactiferi ductus spasmos patiuntur, I. 304. spasmo affecti intercepte lactis secretionis & tumorem causat. *ibid.*

LACRIMALIS sacculus, ejus situs, III. 460. est sedes fistulae inde disced. *ibid.*

LEMO unius partis in plures redundat. I. 27.

Laseris externae lethales quales sint? I. 403. & *seq.* earum ratio in intercepto humorum circulo. *ibid.*

LAMIAE unguentum unde conficiatur? I. 172.

LANA quâ ratione aptissima ad materiam impuram succipiendam & propagandam fit medium? III. 427.

LANCISUS; I. 17.

LAPIS in vesicâ non fit post annum quadragimum secundum. I. 183.

LARYNX spasmo afficitur, I. 305. spasmo affecta constitit in gulâ sensus causa; *ibid.* irritata facit tussim ferinam? I. 306.

LAUCHSTADENHIA balnea qualia recendant principia? II. 322. III. 378. experimenta cum ipsis instituta; III. 321. commendantur in arthritico-rum & rheumaticorum doloribus, II. 322. cachexiâ & chlorosi, III. 321. fluore albo, III. 352. gonorrhœa benignâ, III. 359. nimia hæmorrhagiâ uteri, II. 227. hypochondriaco malo, III. 72. mensibus inordinatis, III. 410. motibus spasmodicis vagis, III. 39. paralyticis adfectibus, III. 200. pollutione, III. 359. scorbuto, III. 378. eorum usus internus laudatur in cachexiâ, III. 321. & quomodo à purpurâ habituali liberet? III. 400. 405.

LAUDANUM liquidum prodest in dysenteria & hysterica passione, I. 318. in febre ardente mortiferum. I. 418.

LAXANS commodum in angina. II. 127.

LAXANS aqua, vide *Aqua Laxans*.

LAXANS Elixir, vid. *Elixir Laxans*.

LAXANS pulvis, vide *Pulvis*.

LAXANS mannatum efficax. II. 14.

Laxantia qualia sint? I. 433. quomodo agant? *ibid.* veteribus minus cognita, *ibid.* preferenda purgantibus, I. 416. pro ratione circumstantiarum in usum vocanda; *ibidem*. cur in torminibus ventris sæpe vomitu rejiciantur? III. 408. profunt in principio morborum? I. 416. juvant gravidas, I. 136. ad præcavendum abortum utilia I. 354. iuno pennis commendantur, I. 322.

Frid. Hoffmanni Oper. Tom. III.

conferant ante usum aquarum mineralium III. 71. salivationis mercurialis, III. 419. & sudoriferorum, III. 328. quæ & quatenus locum habeant in auditis visis? III. 242. cholera, III. 169. dysenteria, III. 157. febre uterina puerperarum, II. 163. gula letens, III. 230. iuncta passione, II. 279. infantibus, III. 473. mortalis, II. 63. oculorum suffusione, III. 235. odontalgia, II. 331. ophthalmia, II. 166. petechiali febre, II. 88. 90. phrenitide, II. 133. phthisi, III. 294. pneumoniam febribus, II. 139. podagra imminente, II. 337. & *seq.* purpura, II. 73. III. 408. scorbuto, III. 379. synocha, II. 107. 109. tertiana, II. 16. tussis, I. 316. 416. III. 113. variolis, II. 54. vertigine, III. 221. ulceratione uteri, II. 159. & reliquis ulceribus? III. 448.

LEIPISIA febris quæ dicitur? II. 120. Vide *Ventriculi inflammationem*.

LENTA febris quæ dicitur? II. 175. signa ipsius, I. 294. in quo differt ab heclicâ, *ibid.* & II. 175. à quodidiana, II. 33. à verminosa? II. 187. unde oritur in infantibus, II. 177. in puerperis? II. 135. quomodo ortum trahit ex abscessu mesenteria, II. 176. post cohibitis excretionibus, II. 175. & *seq.* post febres suppressas, II. 178. ex hæmorrhoidum intercepto II. 179. & nimio fluxu; II. 220. nimis hæmorrhagis, I. 349. alvi fluxibus male tractatis, I. 352. suppressis criticis evacuationibus; I. 389. ex mesenterio, II. 176. ex morbillis, II. 63. post alias prægressos morbos, II. 175. ex potuum inebriantium abusu, II. 179. ex quodidiana, II. 34. ex ventriculi cruditatibus II. 178. & debilitate, I. 321. ab ejus & intestinorum erosione; II. 179. ex vitio hypochondriorum; II. 178. à virum & suorum defectu; II. 179. ejus ex terrore ortæ curatæ casus, II. 185. post tertianam selicta & curatæ exemplum, II. 184. in bibulo curatæ repetens & in phthisi funestam terminatæ casus, II. 182. causa mortis in eâ; I. 400. quomodo statim præcavenda? I. 415. quæ in eâ profunt? I. 431. quomodo tractanda in infantibus? II. 180. si orta fuerit ex cruditatibus ventriculi & intestinorum, II. 178. post febres suppressas, *ibid.* ex hæmorrhoidum intercepto fluxu, II. 179. ex hypochondriorum vitio, II. 178. ex mensium defectu, II. 179. ex potuum inebriantium abusu, *ibid.* quomodo post alias febres præcavenda? II. 43. quando adstringentia roborantibus nupta in eâ conducant? II. 180.

& seq.

LEPRA unde? I. 168. 202. cur rarior? I. 185. retrograda perniciofa; I. 206. Vide *Elephantiasis*.

LETHARGUS qui dicitur? III. 210. unde? I. 145. in quo differt ab apoplexiâ? III. 210. ejus causa proxima, III. 212. mediata causæ; *ibid.* ex erysipellate repulso, I. 338. cephalalgia & scorbuto lethali supervenit eventus; I. 396. à materia æthritica remanente casus; III. 218. post terrorem oborti casus, III. 216. quæ in eo pulsus I. 371. prognostica III. 328. causa mortis in eo I. 396. curatio, III. 214.

LEUCOPHEGMA quomodo differt ab anasarca? III. 323. signa, *ibid.* causæ, III. 328. ab abortu inducitur casus; III. 335. à male tractatâ quartana subortæ exemplum; III. 334. prognostica III. 328. ab Hippocrate curatio tradita III. 333. an in eâ paracentesis locum habeat? III. 329.

LIEN merè vasculosum. I. 49. ejus structura à quibus exposita? I. 19. salicis cur ferreâ tota ex

- canaliculis minimis constructa? I. 156. ejus excidii effectus; I. 49. multum ad mixturem fluidi cum solido in corpore humano confert; III. 372. juvat sanguificationem; I. 50. non alit contentum cum nervosis partibus; I. 317. facile laeditur; I. 49. an ad acutos & lancinatotios dolores aptus sit? III. 65. 78. fedes melancholice; I. 327. an fedes fit mali hypochondriaci III. 65. & scorbutici? III. 372. labem contrahit ex tristitia; I. 327. atonia laborans quos pariat morbos? I. 307. 317. 320. ejus ruptura lethalis; I. 328. ei perperam dolores in latere sinistro tribuuntur; I. 317. 332. post vomituum cruentum magnus & putridus reperitur; I. 341. scirrhia eo signa; I. 329. ejus vitia quomodo ad immodicas hæmorrhagias faciant? II. 197. 209. 213. & ad ulcera; III. 444. & seq. labe affectus quibus tractandus? I. 446.
- LIGATURA** artuum laudatur in enormi hæmorrhagiâ; II. 206. in mictu cruento; II. 215. strictior quâ ratione sphacelum inducat? III. 388. quomodo ad operationem filulæ an instituenda? III. 466.
- LINCTUS** ad anginam præcavendam; II. 115. ad ardorem in angina; II. 128. ad expectorationem; II. 139.
- LINGUA**, ejus structura; I. 93. III. 247. gullus organon; I. 93. ejus inspectio commendatur; II. 119. sicca in ardentibus febribus unde? II. 118. ipsius ulcera in scorbuto unde? III. 384. & seq. & cur ea sanata difficilia? *ibid.*
- LINIMENTUM** cura ambusta; III. 382. *anodynum* in motibus spasmodicis vagis; III. 38. *anepilepticum*; III. 16. *antipodegriæ* noxa observata; III. 104. nervinum in doloribus arthriticis & rheumaticis; II. 322. in convulsionibus quando applicandum? III. 29. *experite vîruntis* in cardiâ; II. 262. & infantili; III. 404. in dysenteria cum torminibus vehementibus; III. 156. in flatulentia; III. 334. in hæmorrhoidibus cæcis dolorificis; II. 289. in inflammatione intestinorum a passione iliacâ; II. 299. in parci à doloribus arthriticis oborâ; II. 322.
- LUNEA** recentia perspirationem cohibent; I. 261.
- LIPOTHYmia** que dicatur? III. 270. in quo differat ab apoplexiâ; III. 269. ab epilepsiâ; *ibid.* à suffocatione hysterica? *ibid.* ejus historia; III. 268. signa antecedentia; *ibid.* paroxysmorum solutio; *ibid.* subiecta; I. 338. ab hæmorrhagiis nimis; III. 271. à narcoticis & opiat; *ibid.* à plethorâ in gravidâ ortæ casus; III. 275. à situ erecto in acutis; III. 274. à sanguine crasso & polypto; III. 271. resurgente sanguine lothali; I. 342. à nimis ciborum post morbum ingestione enatæ casus; III. 277. in hypochondriaco sabotte exemplum; III. 273. crebrioris in cachecticâ casus; III. 275. uterinæ spasmodicæ exemplum; III. 274. prognosif summa; III. 271. & salutaris; III. 272. que convenient in paroxysmo analeptica, aque spirituosæ, & balsamica externa? *ibid.* que interna? *ibid.* extra paroxysmum quando conducant anodyna, be-
- zardica, analeptica & nutritiva? *ibid.* si ab animi adfectibus; quomodo tractanda? III. 273. si à mensibus suppressis orta, *ibid.* aut cum aliis morbis juncta; *ibid.* quid sentiendum de aquæ frigidæ potu; de cordialibus solariis & specificis; & vini usu? *ibid.*
- LAPPTUDINES** unde? I. 183. cur maxime generentur tempore verno? I. 265.
- Liquor** *anodynus*; ejus virtus unde? II. 306. celementer operatur I. 317. optimum sedans I. 449. maxime in doloribus I. 419. & quo principio maxime agat? II. 14. quâ ratione conveniat in affluente? III. 98. & seq. in calculi renalis paroxysmo; II. 300. capitis dolore; II. 216. cardiâ; II. 261. dentitione difficili; III. 477. epilepsiâ; III. 17. specificum in epilepsia symptomatice I. 451. febrili paroxysmo; II. 42. & seq. hæmorrhagiâ narium; II. 199. nimio hæmorrhoidum fluxu; II. 220. odontalgia; II. 332. singultu; III. 125. tertianâ; II. 14. ventris doloribus à scorbuticâ diathesi; III. 379. cum balsamo vite in dysenteria; III. 156. vomitu; III. 145. cum essentia castorei convenit in mensium suppressione; III. 28. cum macis oleo egrugium est antispasmodicum; III. 145. hinc laudatur in cholera; III. 169. cum menthe aqua in diarrhœâ prodest; *ibid.* cum pulvere nitrogi in hæmorrhagiâ uteri dolorificâ confert; II. 226. *Liquor balsamico - consilidans* in uteri ulceribus; III. 452. *putredini* resistens. II. 98. *salinus* ad quartanam. II. 32. *stipicus Danicus* quomodo præparetur? III. 391.
- Liquida** in corruptionem proniora solidis; I. 28. vix necessaria. I. 111.
- Liquidum nervum** tenuitatem succo nutritio conciliat. I. 57.
- LITHARGIRII** indoles; I. 172. fumus torquet figulos; I. 228. perperam olim pro veneno habebat; I. 197.
- LITHONTRIPTICA** remedia multum ad calculi generationem & mictum cruentum conferunt; II. 236. eorum noxæ exemplum. II. 238.
- LITHOTOMIA** improvidè instituta quâ ratione vesicæ vitia inducat? II. 310.
- LITTERATI** plerumque imbecilles; I. 130. quo vitæ regimine egent? *ibid.*
- Litteris** quo tempore opera sit danda? I. 130.
- Loca**, eorum proprietates nosse debet medicus. I. 149. multum faciunt ad morbos endemics & epidemics; I. 292. alioquin salubria; I. 287. humilia insalubria. *ibid.*
- LOCHIA** quibuscumque difficultus fluunt? II. 162. eorum fluxus refarcitur sudore; *ibid.* calidioribus tractata quas pariant noxas? II. 135. non rari expurgata quâ ratione abortus futuri causa? III. 178. & pallionis hysterice? III. 54. non nisi præmissis preparantibus pellenda. I. 415.
- Lochiorum profusio** repenitè cohibita que mala pariat? I. 262. *suffaminatio* unde? I. 168. *profusio* ex quibus causis? III. 61. 327. 401. à spasmo; I. 302. cur adeo noxia & que inducat pathematâ? I. 342. quomodo morbos inferat? II. 179. quomodo ad deliria contribuat; III. 255. ad dolores intestinorum; II. 290. phreniticum; II. 131. purpuram; III. 21. 401. & uteri inflammationem? II. 156. quomodo promoveri debeat? II. 75. 158. an convenient salina & purgantia? III. 62. quando conducant pellentia? II. 160. venæsectio; II. 158. 160. & quo loco sit instituenda? II. 164.
- LOCUSTÆ**, earum multitudo morbos malignos præfigit; I. 209.
- LOTUM**

- LOTUM** avenaceum temulentum quoniam exciet symptomata? I. 230.
- LONGEVITAS**, ejus praesidia. I. 453.
- LOQUELA** quid? III. 247.
- LOTICES**, cur morbis capitis pateant? III. 219.
- LOWERUS**. I. 20.
- LUCUBRATIONES** docent. I. 126.
- LUDOVICI**. I. 122.
- LUX** VENEREA, ejus prima origo, III. 413. definitio & historia, III. 414. differt secundum subiecta, *ibid.* a scorbuto ubi ejus morbis, *ibid.* recensio symptomatum praesertim in capite, *ibid.* quomodo pro causâ habent contagium? III. 415. uti Ferneli sententia de materiâ contagiosâ examinatur, *ibid.* Boerhaavius, III. 416. & auctoris judicium de eâ, III. 419. quomodo rheumatismus inducitur? II. 320. retro pulsâ cur adeo periculosa? I. 166. 206. varia ipsius symptomata cum pertinaci colli tumore, III. 424. cum nasi & facium corruptione, III. 422. cum phthisi juncta, III. 424. male initio pro scorbuto habita, III. 423. ex gonorrhoeâ male curatâ orta; III. 421. prognosâ differt pro subiectorum & graduum morbi varietate, III. 416. & seq. quo pacto in primâ herbâ suscipienda? I. 180. non semper curatur mercurialibus, I. 153. non juvenatur; *ibid.* curatio differt secundum subiecta, III. 419. de quomodo instituenda cum ligni guaiaci III. 417. aut aliorum decoctionum temperationum usu, *ibid.* & seq. sudoriferis; *ibid.* de salivationis curâ? *ibid.* & 419. quomodo tractanda si rheumatismus inducatur? II. 322. quae tenenda circa decocta? III. 418.
- LUMEN**, eorum dolor unde? I. 186. 235. & quomodo a variis causis possit induci? II. 297. unde in fluore albo, III. 356. in haemorrhoidariis? II. 297. frigus in hysteriis unde? III. 61.
- LUMBRICI** quid sint? III. 490. & 491. in quibus intestinis sedem suam habent? *ibid.* in ileo hospitantur, I. 332. eorum indicia, *ibid.* pulsum reddunt inaequale, I. 369. pleuritidem mentiuntur, I. 332. sensibus cur rariore? I. 185. ex dulcibus I. 254. quomodo extirpandi? III. 493.
- Lumbrici terrestres** non semper sunt antiepilepticum, I. 153. specificum in doloribus artuum scorbuticis. I. 450.
- LUNA** ad venae sectionem nihil facit. I. 454.
- LYCOPODIUM** specificum in plicâ polonica. I. 453.
- LYMPHA** quid sit? I. 57. ubi sanguini reasundatur, & cur? I. 17. ejus cursum quid adjuvet? I. 58. motus pendet à motu sanguinis; I. 17. spermaticae in sanguinem refluxu utilitatem, I. 76. circulus à stricturis spasticis impeditur. I. 166. spissâ quibus dissolvatur. I. 430.
- Lymphatica vasa**, eorum origo duplex; I. 57. ubi se exonerent? I. 58.
- M.
- MACRINA** quid sit? I. 27. est compositum. *ibid.* Papihana illustrat effectum caloris in concoctione. I. 60.
- MAGILENTI** ac debiles motui minus sunt apti. I. 124.
- Macilentiores** cur facilius convalescant, ac spongiosi habitus homines? I. 162.
- MACULA** lata erysipelatis species quae dicatur? II. 99.
- MAONESSA** alta quid sit? III. 291. absorbens I. 428. cur maxime in malo hypochondriaco I. 428. III. 70. & quartanâ cooferat? II. 26. ab acido soluta *Erid. Hoffmanni Oper.* Tom. III.
- fit laxans. I. 428.
- MAIUS** ac September mensis saluberrimi. I. 104.
- MAL** DE PARIS, qui morbus ita dicatur III. 152. & in quo differt à dysenteria? *ibid.*
- MALA** COTONEA adstringunt alvum. I. 264.
- MALIGNA** febris differt ab aliis; I. 293. *et seq.* quae? *ibid.* qualis in eâ pulvis? I. 371. qui malus? *ibid.* in eâ sanguis quandoque coctus; I. 373. sudor largus in eâ malus, I. 352. causa morbis sphacelus. I. 401. Vide *Febris maligna*.
- MALIGNITAS** unde cognoscatur? II. 90. speciatim in dysenteria, III. 152. morbillis, II. 63. & variolis? II. 61. ejus signa, I. 289. 323. 392. viribus infensibilis, I. 323. non ex fictis terminis exponenda; *ibid.* ejus causa putredo, *ibid.* medicis saepe imponit. I. 392.
- Malignus humor** diu delitescere potest in corpore. II. 50. III. 154.
- MALPIGHIUS**. I. 17. 19. 22.
- MAMMAE** lactis colatorium, I. 81. terrore afficiuntur in gravidis, I. 191. quâ ratione scirrhus in iis ex terrore possit excitari? III. 446. spasmus experiantur, I. 304. tumores & abscessus earum unde? *ibid.* cur praecipuis cancro sint osoniae? III. 445. earum fistulae exemplum; III. 467.
- MANDIBULAE** piscium absorbens. I. 428.
- MANIA** quae dicatur? III. 253. ejus signa & differentiae; I. 295. III. 252. differt à melancholiâ gradu, III. 251. à parentide, II. 132. III. 252. sedes, III. 253. subiecta, III. 255. eâ defensorum anatome, III. 252. causa proxima, III. 253. quantum ad eam contribuant animi pathemata & vesanus amor? *ibid.* ex iâ excitat exemplum, III. 263. ex eâdem causâ inductae casus; III. 265. à nimis meditationibus ortae exemplum, III. 267. dieta prava, III. 255. haereditaria dispositio, I. 349. III. 254. ebrietas & frigus externum, III. 254. excretionis sanguineae suppressio, III. 255. mentium I. 341. & haemorrhoidum suppressio, I. 343. à spasmu durae matris, I. 305. ex tristitia, I. 176. morbi praegressi, III. 254. narcotica & opiatâ, *ibid.* & nimia seminis profusio; *ibid.* non raro cum melancholiâ alternat; III. 264. cur saepe melancholiam excipiat? I. 305. 350. ipsius exemplum; III. 264. cur periodicè saepe recidit parum excluso? III. 265. ipsius exemplum, *ibid.* prognosâ, quae ferenda si à causâ morali orta sit, III. 265. si recidat, *ibid.* si symptomatice, *ibid.* & quando salutaris fiat solutio; *ibid.* inveterata insanabilis, I. 184. non indistinctè curatur sanguine asino, I. 153. quâ ratione praeservanda? III. 261. veterum curandi methodus per balnea, III. 258. purgantia, III. 259. & venae sectionem: III. 257. quomodo tractanda per anodyna, III. 263. per aquas minerales & simplicem fontanam, III. 260. per lactis asini, vel ejus seri usum, *ibid.* nitrum? *ibid.* quid sentiendum de forficulis, III. 263. de specificis, III. 260. de venae sectione generatim, III. 262. & speciatim frenis, *ibid.* de vesicantibus? III. 263. quomodo sananda si ex vesano amore oriatur, III. 262. aut morfa maniaci aut canis rabidi, *ibid.* vel ex abscessâ plicâ Polonica? III. 263.
- Maniacus** incussu terrore sanatus. I. 192.
- MANNA** triplici gaudet virtute. I. 422.
- Mannata** laudantur in morbis ex acrimoniâ humori, III. 406. in odontalgia, II. 331. in immenente paroxysmo podagrico, II. 348. in aësi, III. 113. quae damna pariant in cholera, III. 169. dysenteria, III. 157. malo hypochondriaco, III. 73. & variolarum declinatione, II. 54.
- MARAS,

MARASMUS senilis quomodo cognoscatur? II. 177. senibus est familiaris, I. 183. 324. ejus signa, I. 324. unde oriatur, II. 177. & 179. unde dependat? I. 242. in quo differt à febre ardente? II. 119. viscerum corruptione nititur, I. 324. est infanabilis, I. 186. quomodo tractandus? II. 179. ejus lethalis exemplum, II. 184.

MARS limatus absorbens, I. 428. adstringit simul; *ibid.* ejus liquor compescit hæmorrhagias, I. 318. ejus crocus sistit febriles motus, *ibid.*

MARTIALIA non semper sunt antihypochondriaca, I. 153. alvum adstringunt, I. 261. pulsum mutant, I. 369. balnearum usu secundantur, I. 464. quo ordine & methodo in cachectis exhibenda? III. 316. 321. quibus jungenda? III. 315. in malo hypochondriaco, III. 72. 81. in scilero, III. 305. lentâ febre, II. 178. in obstruccionibus viscerum, III. 29. cur in formâ liquidâ & cum temperato acido menstruâ semina cachecticis, magis quam viris sine præsidio? III. 336. & quomodo incaute adhibita ad polyporum generationem contribuant? III. 282.

MARTIANUS (Prosper), I. 19.

MARTINS-KORN quamnam producat symptomata? I. 230.

MASTICATION, ejus neglectus nocet: I. 115.

Masticatoria ad arcendum malina profunt, I. 432.

MATERIA an in se & sua naturâ sit passiva? I. 18. corruptibilis quæ dicatur? I. 26. morbi indoles ipsius ex quo cognoscenda? I. 289. coctæ signa, I. 303. etiam tenuissima maximas mutationes in vitali œconomia efficere potest, I. 361.

MATRES prægnantes dietam probè observent, I. 136.

MECHANICA scientiâ Medico opus, I. 14. trahit doctrinam de motu, I. 17. ejus scientia artis medicæ alterum fundamentum; I. 149. 150. ejus notio evoluta, I. 24.

Mechanici Medici non turbant disciplinam medicam, I. 17. qui fuerint? I. 29.

Mechanicus mensurat vires motrices corporum, I. 18.

Mechanicismus quid sit? I. 17. etiam in animum jus habet; I. 24. corporis ejus notitiâ fundamentum therapie, I. 286.

MECONIUM quid? III. 473. an acris sit indolis; *ibid.* quâ ratione natura ejus excretionem promoveat? *ibid.* quo tempore sit expurgandum, & quibus laxantibus? *ibid.* ejus *resensio* quantum ad cardialgiâ infantum contribuat, III. 494. ad epilepsiam & convulsiones, III. 484. ad scilenum I. 314. & tormina, III. 478. & quibus remediis in his eliminandum? III. 484.

MEDICUS quid sit? I. 13. ejus officium, I. 14. 160. 171. 173. 407. potestas, I. 22. acquiescit in causis proximis & adequatis, I. 24. auxilio & consilio juvet; I. 22. ecclésiasticus sit; I. 20. imitari debet certis principibus, I. 23. nature minister, I. 22. nocere non debet, *ibid.* pernoscit naturam humani corporis, I. 26. philolophus per cultum & ignem; I. 14. ejus functio purè mechanica; I. 97. imitari debet astronomos; I. 147. beatus quis? I. 245. naturam imitari debet, I. 407. 412. naturas distinguat; *ibid.* judicio excellat; I. 285. 372. in morborum principio & fine opem ferat; I. 354. in sermonibus cautè se gerat; I. 372. felix qui? I. 413. prognosi eximiationem consequitur, I. 292. quamnam illius primaria intentio in materiâ morbosâ ad propriam fidem reducenda? I. 363. mos quorundam medicorum perverfus in feteve curandâ; I. 471. & pota frigido

agris propinando.

Medicus & medicamenta fugere qui debeant? I. 138.

Medendi leges I. 414. methodus à Medico tenenda; I. 286. consistit in remotione causarum, I. 406. *freq.* nature optima, I. 406. quæ sit in variis morbis, I. 407. in specificorum usu servanda, I. 453.

Medicamenta certis morbis specificè accommodata non dantur, I. 153. metallica venenis annumerantur, I. 226. præcipua quænam? I. 260. veneni vim habentia, I. 212. scienda, I. 426. quæ sortia? I. 420. quæ lenia? *ibid.* pauca & selecta usurpanda; I. 421. non crebrò mutanda; I. 426. aliquandò continuanda, I. 423. 426. in eorum usu corpora distinguenda; I. 421. veterum æneas, I. 423. vires eorum non unâ experientiâ cognoscuntur, I. 426. ægritia à priori perspicitur, I. 425. à medico noscenda, I. 423. plerumque tamen ignorantur, *ibid.* multitudo eorum causâ ignorantie vitium; I. 423. 426. arti noxia, I. 423. *Vid. Remedia.*

Medicinis in morbis tempestivè instituenda, I. 414. impudens morborum causâ, I. 289.

Medicina, ejus definitio, I. 13. rectè ab Hippocrate definita, I. 300. est scientia, I. 13. nominalis & realis, I. 16. theoretica & practica; *ibid.* in quo differant? I. 13. in theoreticis & practica innititur mechanismo; I. 97. duo subsidia, ratio & experientia, I. 8. rationalis quomodo differat ab empiricâ? I. 424. existentiam quid probet? I. 14. certitudo unde pateat? *ibid.* finis, I. 22. fundamenta, I. 14. partes, *ibid.* & eorum nomen, I. 147. 285. ejus principium non est anima, I. 300. neque spiritus, I. 301. sed natura corporis; *ibid.* subiectum est corpus humanum vivum, I. 26. ejus obiectum actus in corpore mechanici; I. 405. incrementa ab observationibus, aratione & physica expectari debent, I. 19. ejus incrementa quæ retardant? I. 300. quid fuerint detrimento? I. 19. possima cura sit præservare? I. 25. universâli num detur? I. 153. & quomodo debeat esse comparata? I. 260. ecclésiastica, quid ex omnium ætatum & seculorum auctoribus boni capiat? I. 20. ab opinionibus & hypotheseis sit immunis I. 150. ob circumstantiarum differentiam difficilis; I. 424. judicio opus habet; I. 372. naturam juvat, I. 413. nature errores emendat, I. 414. hypotheseis & opinionibus referta, I. 395.

MEDIOCRITAS commendanda juvenili ætati, I. 134.

MEDITATIONES nimie sanitatem labefaciunt, I. 287. corpus debilitant, I. 349. ad capitis morbos disponunt, I. 287.

MEDULLA oblongata quâ ratione commune sensorium dicatur? III. 46. nervorum radix, I. 84. pars à corde princeps, I. 85. ejus læsio lethalis, *ibid.* spinalis, ejus structura, III. 25. & usus, *ibid.* continet materiam variolaceam, II. 50. ejus membranas consensum cum reliquis corporis partibus habent, III. 44. sedes motuum febrilium, I. 305. spasticæ contractiæ causam convulsivum consunt, *ibid.* & III. 25. quâ ratione obstruæ causam rachidias suppedient? III. 488. resolutæ cum nervis suis hemiplexiæ & paretis causa, I. 307.

MEHLTHAU, ejus natura venenata, I. 123.

MEL Præfixum quales virtutes possidet? I. 301. in exulceratione rentum laudatur; *ibid.* & I. 149. ex ipso præparata cur in altissime noceat? III. 100.

MELANCHOLIA quæ dicatur? III. 252. ejus differentie, I. 295. differt à mania gradu, III. 251. ejus signa, I. 295. III. 252. subiecta, III. 255. sedes, III. 253. eâ defunctionum anatome, III. 252. causa proxima, III. 253. quomodo occidit ab animi adfectibus? *ibid.* & 254. ex mæore ortæ casus; III. 266. ex eadem causâ enati exemplum; III. 267. à diætâ pravi, III. 255. ab hereditariâ dispositione, I. 349. III. 254. à spâsmo duræ matris, I. 305. ab excretionibus sanguinis suppressis, III. 255. ex suppressis mensibus, I. 341. hæmorrhoidibus, I. 343. frigore externo, III. 255. ex malo hypochondriaco & hysterico quomodo generetur? *ibid.* & 67. & 256. hypochondriacæ casus, III. 81. 264. cum mania periodicè alternans exemplum, III. 264. ex puerperio cur in maniam transeat sæpè? I. 305. 350. prognosim differt ratione graduum morbi, III. 266. eventus à morali causâ ortæ; *ibid.* si recidivat, quid insit? *ibid.* quomodo solvatur? *ibid.* cura præservatoria, III. 261. indicationes curatorie, III. 257. quomodo generatim tractantur etiam veteres? *ibid.* speciatim per bulnea, I. 258. quorum virtutem per aquæ frigide applicationem ad caput augebant, *ibid.* purgantis, & quidem eleborum, III. 259. venæsectionem: III. 257. quæ nunc in eâ conducant anodyna, III. 263. aquæ minerales & fontana, III. 260. lactis cura, *ibid.* nitrum, *ibid.* purgantia, III. 262. specifica, III. 260. venæsectio? III. 262.

Melancholici quanam? I. 242. eorum natura & diætâ, I. 131. temperancium, I. 44. cur adeo voraces? I. 248. in quos morbos facile incidunt I. 243.

MELLITA stomacho infirmo aliena. I. 254.

MELONES, eorum insalubritas quomodo cohercetatur? I. 255.

MEMBRANÆ unde suam trahant originem? III. 11. *nervose* sensum instrumentum, I. 89. tensa acutius *ibid.* laxæ remissius sentiant; *ibid.* ad sensum fluido animandæ; *ibid.* nimis duræ ac solidae sunt in sensibus; I. 162. spâsini patent, I. 301. III. 34. & seq. nervosè spâsini affectû dolorem faciunt, I. 303. capitis externæ cephalalgia sedes; *ibid.* cerebri spâsini affectû melancholice, mania, apoplexia, & epilepsie sedes; I. 305. sensorii auditus susurrum & tinnitum gignunt. *ibid.* spinâlis medullæ sedes totum febrilem, *ibid.* convulsionum, *ibid.*

Membranose partes plurimorum morbosum sedem constituunt. I. 179.

MEMORIA abolita ob atoniam duræ matris, I. 306. ex apoplexiâ quomodo? I. 350.

MENS quid sit? I. 88. 95. considerationem medicam possit, *ibid.* est spiritus ad imaginationem Dei conditus, I. 96. & natura non debet confundi, I. 88. 95. in corpus agit, I. 78. & *ibid.* utitur ministerio corporis & anime; I. 96.

MENSES Majus ac Septembris saluberrimi; I. 104. *October* verò & *Novembris* aut morbos generant? I. 105.

Menses, salutaris excretio, I. 157. 288. 340. eorum iusta vacuatio magna pars sanitatis I. 258. eorum fluxus quâ ætate accidat? II. 216. quo anno cesset? II. 379. quæ sint ejus causæ III. 53. spâsini debentur, I. 301. eorum mechanica ratio; I. 340. mensium negotium turbant animi affectus I. 136. solvunt convulsionem I. 409. 410. curat vel lent morbos chronicos, I. 262. iusta vacuatio magna pars sanitatis; I. 258. quomodo movendi & quibus I. 439. seq. circa eruptionem

unde oriuntur symptomata, III. 266. & quæ ut plurimum? III. 269. emanantes ob ætatis rationem, quæ gignant mala? I. 341. eorum loco sæpè fluunt hæmorrhoides I. 342. lactationis tempore obveniens fluxus quæ pariat damna in infante? III. 471. nonnisi præmissis preparantibus pellendi, I. 415. specifica in vicis eorum, I. 452. quomodo venæsectionem ferant I. 459.

Mensium fluxus cessis plenaria quomodo contribuat ad apoplexiam, II. 245. ad aurium tinnitum, III. 241. ad calculum, II. 270. 298. ad febrem lentam & hecticam, II. 176. ad hæmorrhagiam uteri, II. 324. ad mictum cruentum, II. 322. ad plethoram, III. 381. 382. palpitationem cordis, III. 90. ad podagram, II. 344. ad rheumatismum, II. 319. ad scirrhum uteri, III. 446. ad scorbutum, III. 373. velicæ inflammationem, II. 308. & vomitum cruentum, II. 213. repente cohibitus quæ mala pariat? I. 262. difficulter revocatur; I. 263. salutariter in plethorica hæmorrhoidalis ejus locus sequitur, III. 225. quibus remediis mala hæc avertenda? II. 217. III. 225. 333.

Mensium irregularis fluxus quâ ratione disponat ad cachexiam & chlorosin, III. 313. ad cardiacum, II. 258. ad desitiam, III. 255. ad epilepsiam, III. 12. hepatis obstructionem, II. 274. hysterica passionem, III. 54. ad vomitum & mictum cruentum? I. 340. II. 213. quomodo in ordinem redigendus? III. 56. cur speciatim per Lauchlacidium balnearum usum regularis fiat? III. 410.

Mensium fluxus largior & nimis unde? I. 307. quanam ejus causa proxima sit? II. 230. & seq. ex hepatis & lienis vicio, I. 320. quid in variis significet? II. 54. & seq. ad aurium rheumatismum in semina disposuit; III. 244. adhibentibus tractatur quomodo scirrhi & canceri uterini causa? III. 447. venæsectione in brachio sistitur. I. 459.

Mensium fluxus suppressio nocet, I. 288. 320. 340. & cur? I. 302. quæ symptomata inducat? *ibid.* per incongrua loca exiunt molitur I. 340. causa ejus proxima in quo consistat? II. 230. unde generetur? I. 167. 168. à spâsini suppressione, I. 302. quomodo ab acidis oriatur, III. 459. à diætâ vitiâ, III. 62. à frigore, III. 249. ab ira & terrore, I. 191. II. 218. III. 30. à sanguinis copâ vel inopiâ, II. 183. à vitâ sedentariâ; III. 82. quâ ratione inducat cachexiam & chlorosin? III. 313. cancerem & scirrhum uteri, II. 157. 161. 447. cardiacum, II. 258. colicam, II. 286. 294. dyssericalium humorum, III. 320. uterinam febrem inflammatoriam; II. 157. fluorem album, III. 350. guttum siccum, III. 229. hæmoptysin, II. 207. hysterica malum, III. 54. 59. hypochondriacam passionem, III. 68. maniam, III. 255. mictum cruentum, I. 340. II. 232. molas, III. 187. phreniticum, II. 131. podagram, II. 344. scabiem, III. 429. scorbutum, III. 373. soporosos adfectus, III. 212. ulcera mammarum, III. 459. vomitum cruentum, I. 340. II. 213. foribus revocatur I. 465. clysteribus, I. 467. & sæpè conjugio, III. 19. 21. male pellentibus provocantur, III. 320. & quibus restituendus? III. 28. 406.

Menstrua purgatio, ejus finis, I. 74. tempus ordinarium, *ibid.* cur prodeat ab utero? I. 73. est salutaris, I. 119. laeta, quid efficiat? I. 20. pertinet ad actus naturales, I. 72. post coitum fecundum cessat, I. 78. quibuldam gravidis durat,

1. 79. quibus parcius float? I. 78. cum quæ turbent? I. 119.
Menstrua evacuationes in senili ætate periculose, I. 183. haud rite factæ quæ pariant mala? I. 270.
Menstruus sanguis non est corruptus; I. 74.
Mentis cur optimum in vomitu? I. 431.
MERCURIALIS (Hicronymus) I. 21.
MERCURIUS cum aqua coctus vermes necat; I. 198. II. 289. III. 422. in iliaca passione in subfistula exhibendus quomodo prius depurari debeat II. 279. qua dosi & quibus junctis propinandus *ibid.* & quando in iliaca passione noceat *ibid.* quando detur cum fructu I. 65. an brevi insit veneni mortem inferre possit? III. 172. omnis virulentia expers I. 197. vide *Argentum vivum*. *corrosivi* natura. I. 198. solutus veri veneni naturam induit & amulatur. I. 197. 212. *diaphoreticus* singularis. I. 318. alexipharmacis annumeratur. I. 205. quomodo preparatur? III. 421. quem præfert ulum in lue veneræ, *ibid.* & in ulceribus? III. 449. *dolcis* tuiissimum salivans. I. 453. sed minus tutum laxans; I. 434. quomodo adhibendus ne moveat salivationem? II. 59. & *seq.* non cum salibus miscendus; I. 434. cum salibus alcalinis mixtus salivationem suscitatur, II. 29. cum acido mixtus corrosivum induit naturam, III. 306. specificum in contumacibus intermitentibus, I. 450. ejus varius adhibendi modus in lue veneræ, III. 418. quâ dosi in initio ad salivationem movendum exhibendus? III. 422. egregii usus est in acrimoniâ ulcerosâ; III. 360. capitis & oculorum doloribus perinacibus, II. 169. in cutis adflectionibus rescatariis, III. 432. in gonorrhœâ, III. 360. lue veneræ, III. 418. & *seq.* ossis ichiæ & coccygis dolore, II. 323. in veribus enecandis & expellendis, I. 236. III. 28. & *seq.* cur minus in ictero conducatur? III. 306. *sublimatus* an in vivum iterum possit in ventriculo converti? III. 172. minus tutus est ad sepatationem corrupti in fistulo; III. 390.
Mercurialis, eorum indoles. I. 172. eorum efficacia unde? III. 418. & *seq.* varius adhibendi modus, III. 432. quæ ante eorum usum observanda à Medico? III. 419. in eorum usu & individui, & morbi, & regiminis ratio habenda, I. 221. bene preparata interne in ulceribus laudantur. III. 45. minus rectè parata & data nocentissima, I. 312. cur tam vehementer producant effectum? I. 220. cur insensibilissima infantibus terelitis? I. 221. cavet offensa in cutis adflectionibus præprimis infantibus, III. 435. in gonorrhœâ, III. 361. ad vermes enecandos; III. 493. an infantibus conferatur? III. 476. minime conveniunt ubi succorum est magna dyscrasia salino-sulphurea; I. 220. cur magnam efficiant feri profusionem? I. 166. insit venenorum suas perficiunt operationes; I. 220. cur ægritis ea ferant scorbutici, III. 479. 425. & macilentiores? III. 419. eorum noxa; I. 218. nocent in moribus spasmoticis vagis, III. 40. in dentitionis difficultate, I. 314. non semper curant luem Gallicam, I. 153. perspirationem colubent; I. 261. quomodo salivationem movent? I. 442. & *seq.* quâ ratione anginum inducere valeant; II. 126. & guttam forem? III. 229. secundantur balnei, I. 464. externe quando in oculorum adflectionibus ea applicate debeat? III. 437.
Mercurialis aqua usurpata in scabie lipothymiam excitat, I. 199. in unchio magis noxia, quam remedium mercuriale in urò sumtum, I. 223.

MESENTERIUM cur à plethorâ gravissimè læsatur? II. 176. in eo suboriuntur stagnationes circulo sanguinis in remotioribus partibus intercepto; II. 183. quâ ratione sedem præbeant variis morbis, II. 176. atrophie infantum, III. 486. febri lente & heclicæ, II. 176. hydropi, III. 326. inflammationibus? II. 170.
Mesenterium abfcessum patitur I. 325. ejus signa *ibidem*. quomodo cognoscatur? II. 176. quibus subiectis sit familiare? II. 184. unde & quomodo oriatur? II. 177. cur brevi tempore major fiat? II. 184. quomodo à percussione parvum externarum nasci queat? II. 183. rupi signa. I. 225. quomodo solvi solet? II. 177. solvitur diarrhœa purulenta. II. 174.
Mesenterii inflammatio an locum habeat? II. 176. quibus modis in semitertianâ sit discutienda? II. 42.
Mesenterium scirrhosis tumoribus afficitur, I. 323. scirrhosis ejus differt à graviditate, mollis, hydropis; I. 329. ex ejus induratione atrophica *ibid.*
Mesenterica febris distinguenda à maligna, I. 293. ejus signa. *ibid.*
METALLURGIA morbosifica. I. 228.
METASTASIS perfecta & salutaria quænam? I. 356. illius rationalis explicatio, I. 360. quinam causas illam exponentes obnoxii? *ibid.*
METHODUS medendi an detur generalis? II. 33.
Methodus Geometrarum optima, I. 23. est syllogistica. I. 15.
Methodi quales fuerint? I. 16. in qua deserviant? *ibid.* eorum disciplina quid eclecticò suggerat? I. 20.
MIASMATA maximè per salivam hauriuntur, I. 202. non per cutis spiracula, *ibid.* veri venenaturam amulatur, I. 203. virulentiorum natura, I. 202. quo pacto facillimè pellantur? I. 203.
Miasma malignum, Vide *Petechialis febris*. *Pestilentialis*, vide *Pestilentia*. *Pneumum*, vide *Lues Venerea*.
MICTUS cruentus quid & quâsi? II. 231. ex quibus cognoscendus, *ibid.* si ex ureteribus aut vesicâ, *ibid.* & 310. aut ejus sphinctere? II. 232. ratione causarum distinguendus, I. 296. spasmus debetur, I. 301. & *seq.* differt à gonorrhœâ sanguinolenta, II. 232. à fistulâ ex præputio, I. 296. ab hæmorrhagiâ penis, II. 232. senibus familiaris; I. 296. quandoque menstrualis I. 341. & periodicus; I. 344. qualis in eo urina? I. 380. causa proxima quæ sit? I. 166. & *seq.* II. 232. quomodo succedat ex renibus? II. 232. quandoque ex vesicæ venis, I. 380. II. 232. & ejus erosione ac ulcere? II. 233. quomodo à calculo renali oriatur? II. 233. renum hæmorrhoides rectè dicitur; I. 344. ex hepatis & lienis vitio, I. 320. ex mensuum suppressione I. 341. emundione, *ibid.* hæmorrhoidibus supprellis, I. 343. II. 232. & 310. maximè in senibus; I. 344. & ab his læpè sit criticus, II. 155. à cantharidibus & acris diureticis in gonorrhœâ datis, II. 234. III. 361. à motu corporis fortiori; II. 233. à torminibus ventris, II. 234. à violentiâ externa, II. 233. ex plethorâ suborti causâ, II. 236. ejus suborti colonis insit coctæ fœcæ exemplum, II. 239. venæsectione curatur; II. 237. cum dolore nuchidico junctus, II. 238. ex scabie retrophallâ ortus; II. 237. rarus casus ex vesicæ & sphincteris vasis, II. 238. ab alvo obstructâ quomodo tractandus? II. 234. si ab organo, *ibid.* à vasorum relaxatione, II. 235. à sanguineis grumis; *ibid.* quando in eo conducant

cant acidulæ, vel cum, vel sine lacte? *ibid.* quando adstringentia? II. 236. perperam adstringentibus cohibetur? I. 447. quando lac ejusque sanum? II. 235. que tendit circa motum corporis, II. 236. posum ordinarium ac vini, II. 235. præfida in eo. I. 430. quomodo recidiva accendat? II. 236.

MILIARIIS febris quomodo in puerperis præservanda, II. 70. 74. & curanda? II. 75. *maligna*, ejusque historia, II. 74. vide plura in verb. *Purpura*.

MILITES cur dysenteriz obnoxii, III. 152. & scorbuto? III. 374.

MULLEFOLIUM, ejus summitates quales habeant virtutes? II. 301. & in specie unde ipsa antifebris & antispasmodica virtus? II. 42. specificum in calculosis renum dispositione, I. 452. laudatur in calculo ardendo, II. 301. in hæmorrhoidum viciis, I. 452. & nimio eorum fluxu, II. 220.

MUSCO sanguinis præservat ab abortu, I. 79. ad præcavendos mulierum morbos commendatur; I. 243. cur mollionibus corporibus noxia? I. 175. Vide *Venefellia*.

MIXTIO corporis nostri, I. 26. facile potest destrui, *ibid.*

Mixtura analeptica & bœwardica in animi deliquiis à malignitate, III. 272. & antispasmodica ad abortum præcavendum, III. 181. & leniter diaphoretica, II. 230. & discutit in apoplexiâ, II. 244. *antæsthenica*, III. 105. *antipileptica*, III. 179. *antidysenterica*, III. 163. *antipleuritica*, II. 141. *bœwardica*, II. 77. *carminativa & stomachica*, II. 293. ad cholerici febres, II. 115. ad dentitionem difficilem, III. 477. *diaphoretica* II. 27. 39. 43. 348. ad febres puerperarum, II. 158. ad febres petechiantes, II. 77. ad febrem quotidianam, II. 36. ad hæmorrhagias excessivas, II. 64. 66. *laxativa* ad imminuentem paroxysmum podagricum, II. 348. *pefferalis* ad tussim, III. 119. ad purpureæ retinicionem avertendam, III. 407. *Riveriana* quomodo præparetur, II. 263. & quando in passione iliaca coadunatur? *ibid.* *simplex Paracelsi* ex quibus conficiatur? III. 37. quando locum habeat in moribus spasmodicis vagis? *ibid.* *tonica* in hæmoptysi, II. 205. ad variolas suppurgandas, III. 52.

MODICUS cibis modicus Medicus, I. 114.

MOEROR, ejus noxi effectus in corpore, I. 102. 287. 319. III. 253. 382. heni maximè noxam affricat; I. 327. *largum* pedum sudorem facit; I. 382. ejus noxas quid avertat? I. 103. quantum contribuat ad genesis animi deliquiorum, III. 270. apoplexiæ, II. 246. catalepticos, III. 47. epilepsie, III. 12. idem chronicis, III. 103. hypochondriaci mali, II. 246. III. 69. malignorum morborum, II. 90. manie & melancholie, III. 267. podagræ, II. 343. polyponum, III. 282. scirrhi, III. 446. scorbuto, III. 373. & sphacele? III. 395.

MOESTITIA sensibus noxia, I. 170.

MOLÆ foeminarum unde? I. 243. 262. 307. quid sint? III. 187. fuit vel nutritiõis, eamque causæ, *ibid.* vel generandi; & que dicantur? *ibid.* earum indicia; I. 330. distinguenda à scirrho mensesi, I. 329. a polyposi concrementsis differunt; I. 330. *spuria* que? III. 187. earum exclusio quid indicet? *ibid.* & 60. earum exempla; III. 187. quomodo ad fluxorem album disponant? III. 350. quâ ratione præservandæ? III. 182. clysteribus ejiciuntur, I. 467.

MONTANUS, I. 21.

MORS, eorum definitio nominalis, I. 162. realis, *ibid.* frequentiores & rariores, I. 184. certis lo-

cis peculiare, I. 185. rariores; *ibid.* cur non sint multo frequentiores? I. 177. hujus differentie usus in therapia; *ibid.* causa ut fiat activa quid requiratur? I. 177. eorum causæ autem semper consistant in materia? II. 188. materia ubi querenda? I. 258. multorum causæ ex aere, I. 103. causa efficiens non est anima, I. 172. causæ naturales non sunt saltem occasionales, I. 152. plures quandoque concurrunt, I. 173. causa proxima, I. 163. procatartice, I. 176. spuria, I. 151. causæ virulente certis tantum partibus infensæ, I. 172. origo non tam à fluidis quam solidis repetenda, I. 372. ex observationibus addidenda, I. 291. cognita utilis ad præventionem, *ibidem* & 301. & curationem, I. 301. quandoque repetenda ex nimia repletione, I. 269. ex ingestis, I. 152. ex inæquali ingestione & excretionum proportionem gignunt, I. 157. genus, *ibid.* & causæ indagare debet medicus, I. 148. per observationes dignoscuntur, I. 291. quoniam ex insolita aëris configuratione oriuntur? II. 38. temperamentorum unde deducendi? I. 242. vis æ vehementia unde dijudicanda? I. 165. & quo pacto commode præfidiuntur? I. 259. omnes generis nervosi affectiones, I. 308. eorum quatuor genera, I. 301. debentur spiritibus, *ibid.* atoniæ, I. 306. motibus convulsivis, I. 304. probè discernendi, I. 292. differentia exquisita ionu necessaria medendi, I. 180. variant ratione subjecti, I. 286. ætatis, *ibid.* & 308. sexus, I. 287. habitus corporis, I. 288. vitæ generis *ibid.* vitæ, I. 287. climatis, *ibid.* temperamentum constitutionis, I. 334. quorundam qui sedem in primâ ventriculi regione habent exempla; I. 374. sæpè complicantur, I. 289. affinitatem alunt, I. 292. habent sensibiles remissiones, I. 289. istæ remissiones, & exacerbationes unde? I. 169. per se non sunt salutares, I. 303. corpus debilitant, I. 349. sæpè sine sanguinis vitio accidunt, I. 373. à læsione motuum in corpore pendunt, I. 301. ex perversâ medicatione, I. 288. ægri incuri, *ibid.* morborum reliquias, I. 354. ex nimia hæmorrhagiâ frigidi, I. 349. à solidiorum vino, maximeque imbecillitate, I. 348. à polyposi quoniam sint? III. 278. variolas excipientes quomodo sint tractandi? II. 60. & præservandi? *ibid.* eos incurunt edaces, I. 114. à salubri acrimonia cur noctu maximè insulant? III. 382. methodus morborum ex pustulosa & ulcerosa materia provenientium; I. 363. eorum fundamentum ex mente Hippocratis, I. 300. remittentes spasmo solvuntur, I. 303. quoniam morbi à febribus repelluntur? I. 476. spontaneus ipsorum decursus observandus, I. 290. tempora morborum in prognosi distinguenda, I. 395. & seq. eorum effectus differentes unde petendi? I. 180. medicamentis sæpè tribuuntur, I. 435. iis tempestivè occurrendum, I. 414. eos præcavere facilius quam curare, I. 22. non eodem semper modo curantur I. 153. quo pacto ut plurimum solvantur I. 184. quando in curatione morborum contraria desiderentur? I. 471. quibuscum morbis potius frigidus utilitatem præstet? I. 472. Vide *Causæ morborum*.

Morbi acuti & longi, I. 183. curantur potius nature, quam artis beneficio, I. 99. non transeunt in liberos, I. 243.

Morbi attoni, I. 183. eorum fundamentum, I. 184. & 308.

Morbi animi mutant actiones I. 97. anni temporis, unde? I. 334.

Morbus incuratus, vid. *lilurus*.

Morbus

- Morbus articularis*, in eo curando quoniam remedium utendum? I. 474.
Morbi benigni, I. 181.
Morbi cerebri à quibus causis producantur? III. 218. in quo consistat ad eos dispositio? *ibid.*
Morbi elenaci, I. 182. tentandi potius motu quam medicamentis, I. 138. expugnandus usu fontium salutarium, I. 139. quando optime curentur? I. 104. iis balnea frigida open ferunt. I. 476.
Morbi complaciti I. 289. sanatio difficilis. *ibid.*
Morbi congrui & incongrui, I. 183.
Morbi contagiosi I. 182. quam habeant causam? II. 45. optime emetici praescinduntur, I. 415.
Morbi continui periculosiores intermittentibus, I. 181.
Morbus divinus qui veteribus dicitur? III. 9.
Morbi Epidemici, I. 181. in iis plerumque subest materia exanthematica; II. 44. eorum causae I. 207. 209. 267. 291. ab aëre subitaneis mutationibus occurrunt I. 334. diversissimus habitus unde? I. 210. Historiae accuratius annotandae Medicis I. 267. seq. quomodo observationes de eis instituendae I. 291. seq.
Morbi Epidemii & Pandemii, I. 181. epidemii eum v. habent: I. 187.
Morbi exanthematici quales sint? II. 68. pro diversitate corporum diversam habent faciem, II. 67. cur frequentes sint puerperis, II. 73. potius vini deditis? II. 67. cur in iis nocent liberalior niri usus? *ibid.*
Morbi gemini & corrupti, I. 182.
Morbi hereditarii & adventicii, I. 183. unde? I. 156. haereditate accepti cur invalescentes sepe incurabiles? II. 305. cur difficilis sint curatio? *ibid.* per hereditatem propagantur. I. 287. vide *Hereditarii morbi*.
Morbi idiosyncratici & symptomatici, I. 182.
Morbi immateriales, I. 173.
Morbi infantiles quales sint? III. 469. cur cogniti sunt difficiles? *ibid.* quae circa illos inquirendos tenenda? *ibid.* causa eorum proxima, III. 470. quae materialis? *ibid.* ad eos ingenerandos quantum faciant aëris mutatio, III. 471. animi perturbata tum matris, tum proles, *ibid.* debilitatio in ipso partu, *ibid.* hereditaria dispositio, III. 470. medicamentorum abusus & regimen nimis calidum, III. 471. & vitia praeterita à matre contracta, III. 470. sepe semper cum veribus sunt iuncti, III. 10. prognostis, III. 472. & quomodo praeservandi, III. 475. & avertendi? III. 472.
Morbus Lazari quid, ejusque signa; III. 427. subiecta. *ibid.*
Morbi maligni I. 181. medicis saepe imponunt, I. 392. seq. quibus signis cognoscantur? *ibid.* summa in iis signa, *ibid.* causa mortis in iis, *ibid.* eorum malignitas unde asilanda? I. 161. vide *Malignitas*.
Morbi manifesti & occulti, I. 187.
Morborum metastasium modus, I. 361. nam illorum metastases semper periculose? I. 362. morborum a retrocessione vel translatione materiae eorum curatio generalis. *ibid.*
Morbi mulieres ut plurimum ex utero trahunt originem, III. 349. ab externo frigore, III. 54. & quid in iis facendum? *ibid.* & seq.
Morbus niger Hippocratis qui dicitur? II. 214. in quo differat ab haemorrhoidum fluxu subinde subnigrificans? *ibid.* an ex lieme & hepate recte à veteribus statutus? II. 218. & unde derivandus? II. 214. quomodo succedat? I. 302. spasmus debetur, *ibid.* cur hypochondriaci & haemorrhoi-
- daris frequens, II. 214. & potius spirituosus nimium deditis? II. 218. eo defuncti anatome; II. 216. unde mortem inferat? II. 214. 216. cur tam subito necet? I. 206. ex hepatis vitio lethalis casus; II. 218. brevi funeli exemplum; II. 216. post quatuordecim dies lethalis, *ibid.* ex tuncore brachii trichio lethalis, II. 217. cum curandi methodus ab Hippocrate tradita, II. 215.
Morbi oculorum unde derivandi? I. 90. & seq.
Morbi periculosi & ferales à putredine inversa, I. 323. vide *Acuti*, *Chronici Morbi*, *Morborum origo*.
Morbi periodici & simplices. I. 186. periodicorum fundamentum ubi? I. 186.
Morbi recentes & antiqui sive habituales, I. 183.
Morbi recidivantes I. 182. eorum recursus I. 244. Vide *Recidiva*.
Morbi retrogradi, I. 187.
Morbi salubres & exitiales, I. 184. salubres locum frequentiores quam exitiales. I. 185.
Morbi sanabiles & insanabiles, I. 184.
Morbi seniles à quā potissimum causa oriuntur? III. 383. sunt maxime circa vesicam, & qui sint? II. 316. in quo maxime consistat eorum curatio? *ibid.*
Morbi simplices & compocati, I. 182.
Morbi sporadici, I. 181.
Morbifica causa quae? I. 172.
MORALIUM eorum historia, II. 63. cur frequentiores? I. 185. cur maxime generentur tempore verno? I. 266. origo prima unde derivanda? II. 63. differunt inter se gradu; III. 482. in quo conveniant cum variolis; II. 63. in quo ab iis discrepant, *ibid.* nec non à poxibus, perquisi, rubellis, maculicis scorbuticis? *ibid.* distinguendi ab aliis exanthematibus; I. 293. eorum signa; *ibid.* symptomata, eorumque ratio, III. 482. maligni vel benigni; I. 293. unde fiant maligni? III. 483. & quibus signis si cognoscantur? II. 63. quomodo in iis mori contingat? *ibid.* & III. 483. crises servant; I. 388. in iis suspecti dolores capitis per totum morbi decursum durantes, II. 65. & epileptici motus, III. 482. & cur hi ipsi vel eos antecedant, vel subsequantur? III. 12. in iis suspectum, si acri antea doloribus artuum laboraverint? II. 65. qualis ante & post eruptionem pulsus? I. 371. eorum eruptio retardatur ab abundantia sanguinis, II. 67. à crudis humoribus primarium viatum; II. 66. sunt retrogradi, I. 187. oborto spasmus recedunt I. 302. incongrui periculosiores, I. 183. retrogradi autem periculosi? I. 166. si sunt asthmae contractivi causa, III. 96. & quomodo? III. 104. exempla illorum in hypochondriaco curantur; II. 67. quid in iis haemorrhagiae excessiva indicent? II. 66. quomodo vomitus subvenire queat, III. 142. & purpura? II. 65. cum purpura complicatur & guttam ferream relinquendum calus; II. 65. & seq. an praeservet à cunctis vitis? III. 427. saepe relinquunt epiphora, III. 234. & dispositionem ad phthisin; III. 286. exemplum ex abusu niernforam lethaliū, II. 67. cum nimis haemorrhagiarum humorum funeflorum, II. 67. emetico sublevatur; *ibid.* alvi fluxum & ulcus lethale relinquendum; II. 65. retrocedendum alvi fluxus solutorum; *ibid.* quomodo iis retrocedentibus potius copiosius salubris fuerit? *ibid.* iis imminutibus cur facienda? II. 63. III. 484. quomodo curandi? II. 63. in principio requirunt emetici vel laxantia, I. 415. & quatenus in iis conveniant? II. 66. III. 484. ut & diaphoretica, III. 483. venesectio? II. 67. reli-

- quæ eorum gignunt morbos, l. 354. & *seq.* hinc curatè subnovendæ, l. 420. imprimis alvi subductione; l. 354. quantum in iis noceant calescentia; l. 64. 67. quomodo in iis tractari debeant catarrhus suffocativus, l. 67. diarrhæa, l. 64. hæmorrhagie, *ibid.* sudores nimii, *ibid.* tormina ventris; l. 483. quomodo malignitati obviam eundem? l. 64. quid iis superatis faciendum? l. 483.
- Morbilifera febris** quæ dicitur? l. 62.
- Mors** in quo consistat? l. 94. 388. quomodo contingat ex abortu, l. 180. in angina, l. 127. in apoplexiâ, l. 242. afflimate, l. 98. cachexiâ, l. 148. cancro, l. 448. cardiâ, l. 259. cholera, l. 168. colicâ, l. 258. comate vigili, l. 212. & *seq.* convulsionibus, l. 27. diarrhæâ, l. 168. dysenterîâ, l. 155. epilepsiâ, l. 13. erysipelatè, l. 100. febribus, l. 10. lentis & hecticis, l. 177. & *seq.* hæmoptysi, l. 204. hæmorrhagiâ narium, l. 198. hæmorrhagiâ uteri, l. 225. hæmorrhoidum nimio fluxu, l. 220. hydropè, l. 329. malo hypochondriaco, l. 70. ictero, l. 288. l. 303. iliacâ passione, l. 277. inflammatione vesicæ, l. 153. manîâ, l. 256. mictu cruento, l. 234. morbillis, l. 63. œsophagi spasmo, l. 134. palpitatione cordis, l. 88. pestilentiâ, l. 95. petechiali febre, l. 85. petechizante febre, l. 77. phthisi l. 288. pneumonica febre l. 138. podagra, l. 344. purpurâ, l. 70. quartanâ, l. 31. scorbutu, l. 375. singultu, l. 125. spasmo violentiori, l. 122. syncope, l. 271. synochâ, l. 106. synochâ biliosi, l. 112. tussi, l. 112. typhoide, l. 342. variolis, l. 52. 61. a veneno, l. 259. vesicæ spasmo, l. 311. ulceribus, l. 453. vomitu cruento? l. 214.
- Mors subitanea** quomodo à polypo in cordis vasis, l. 278. 288. à putredine viscerum, l. 214. 216. & concremento sanguine in corde? l. 108.
- Morsus** animalium quando virulentus? l. 195. animantis rabiosi cur aliquando interfecto denum tempore in actum deducatur? l. 196. eo tactu quo pacto curandi? l. 200. hominis inacundi lethalis, l. 196.
- Mortuus** quid sit? l. 24. causa mutationum in rebus corporis, l. 17. præservat à corruptione; l. 28. ejus species systole & diastole, l. 24. ipsius causæ corporeæ sunt, l. 32. & *seq.* in arteriis & nervis quæri debent; *ibid.* adhaesit facili revocantur l. 187. ab iis viâ, sanitas & mortui pendunt l. 163. ex partium structura l. 309. sine sanguinis & liquidæ nervi affluxu perferre nequeunt l. 301.
- Mortuus animalis** quis? l. 86. & *seq.*
- Mortuus corporis** qualis esse debeat? l. 328. l. 72. 255. quo tempore iussuendus? l. 73. quando suscipiendus? l. 124. quâ ratione intermittendus? l. 140. ordine suscipiendus, l. 124. salubri loco adorandus, *ibid.* quousque intendendus? l. 125. ejus & laborum fructus; l. 88. multa præstat beneficia, l. 121. medicina universalis, *ibid.* sanitatem præstat, *ibid.* pulsum mutat; l. 368. à morbis præservat, l. 121. eo corpora leviora fiunt; *ibid.* ante cibum laudatur, l. 124. sed à cibo noxiis, *ibid.* alvum siccatur, *ibid.* augendo circulum sanguinis excretiones promovet; *ibid.* ad progressum sanguinis motum facit; l. 321. eum antecedit alvi depositio; l. 124. ad eum & mobile recipiendum, l. 17. eo sanguis qualis convertat cibum? l. 125. ejus &
- exercitationum prudens sit moderatio, l. 123. cuius eligendum motus conveniens genus, *ibid.* ejus varia genera, l. 121. & *seq.* leges ex statibus, l. 20. quantitas debet ingellorum molli respondere, l. 123. est communicatio in corpore, l. 26. ejus scientia medico maxime necessaria & utilissima; l. 129. ejus leges nosse debet medicus, l. 165. qualis sub aquarum mineralium usu conveniat? l. 72. quem usum præstat in gravidis, l. 183. in hypochondriaco malo, l. 73. adfectu melancholico & manico, l. 261. ad podagram arcendam, l. 345. in purpura scorbuticâ, l. 405. post terrorem, l. 283. in quartanâ, l. 27. qualis disponat ad apoplexiam, l. 241. ad hæmorrhagias, l. 195. ad mictum cruentum, l. 233. ad palpitationem cordis, l. 87. ad phthisin, l. 286. ad scorbutum, l. 373. & spasmos, l. 265. qui noceat in gonorrhœâ adfectu, l. 359. plethoricis, l. 223. 283. in nephritide laborantibus, l. 302. & ipsius vesicæ vexatus? l. 311.
- Motus elasticus** quid & ubi? l. 35.
- Motus epilepticus** quis? l. 163.
- Motus febrilis** quis, & unde cognoscatur? l. 163. ejus indoles; l. 167.
- Motus fluidorum** interosum vergentes, cur aut? *ibid.* morbos? l. 163. à centro ad peripheriam salutaris l. 301. 407. à peripheriâ ad centrum morbosus; *ibid.* Vide *Motus solidorum*.
- Motum** fortorem cibum non fluxum excipere debet. l. 125.
- Motus intestinorum** duæ species. l. 155.
- Motus Mechanicus** quis? l. 87. medici & medicinarum objectum, l. 405. ejus organa. l. 86.
- Motus microscopici** leges. l. 169.
- Motus morbosus**, eorum indoles, l. 165. morbosorum tres classes, l. 193. morbosus in nervosis partibus sedem figunt, l. 308. 406. eorum quatuor genera, l. 301. per se non salutaris, l. 303. quo sensu salutaris? *ibid.* & l. 406. & 407. in solidis & fluidis damnosus, l. 349. ad prognosin situ necessarii, l. 286. quandoque sustendi. l. 417.
- Motus peristalticus** quis dicatur, & ubi sit? l. 64. & 163. l. 66. & 141. ejus usus, l. 66. 141. placidus est, l. 64. & succellivus, l. 65. in unâ intestini parte auctus universum canalē afficit, *ibid.* indiget fluidi nervi affluxu, *ibid.* est præcipua causâ secretionis chyli; *ibid.* ejus integritas conservanda; *ibid.* tria principia; l. 67. quæ eum excitent? l. 118. quibus promoveatur & conservetur? l. 70. & *seq.* quæ turbent? l. 125. quâ ratione ab animi curis & meditationibus destruitur, l. 348. à potu glaciato, l. 267. à purgantibus fortioribus, l. 284. spasmi, l. 341. vermicibus? l. 284. quæ infestant mala? l. 68. 74. 148. 348. convulsus est dysentericæ causâ. l. 153.
- Motus salutaris** probe discernendi à pernicioso; l. 184.
- Motus solidorum & fluidorum** œconomia natura, l. 406. & medicinarum principium. l. 300. ejus causæ remotæ noo referendæ ad medicinam; *ibid.* quæ proximæ, *ibid.* systalticus unde? l. 406. solidorum & fluidorum auctior facit & solvit morbos, *ibid.* ab iisdem pendet sanitas, l. 301. à levis morbi, *ibid.* quadruplici morbo leduntur, *ibid.* non valde sustendi, l. 418. sub eorum impetu non movendum. *ibid.*
- Motus systalticus** glandularum conglobatarum, l. 163.

Metus temens intensior impedit transpirationem, I. 68.
Metus vitales & animales inter se communicant, I. 32. eorum causa, I. 29.
Motus voluntarii, eorum organa, I. 86. quomodo fiant? III. 194.
MUCILAGINES ubi profint? I. 431.
Mucilagines copiose hausta veneni & purgantium vim frangunt, I. 215.
MUCUS, ejus colatoria, I. 71. intestinalis, I. 72. unde spissescit? I. 71. ejus emunctoria consistant, I. 72. faucibus & naribus impulsus quomodo excernendus? II. 46. excreto copiosior unde obtingat? I. 72. separatio diversis temporibus varia, *ibid.* salutariter excernitur; I. 347. pellucidus per alvum secedens unde? I. 385.
MURIA purgat & clystibus admiscetur, I. 467.
MURMURA ventris unde? III. 66. in epilepsia ex qua causi oriuntur? III. 11.
MURI, eorum recentium exhalationes gravis gi-gnunt symptomata; I. 230.
MUSCULI sunt organa motus voluntarii, I. 86. eorum structura à quibus investigata? I. 20. qualis? I. 86. color rubicundus ipsis non est naturalis, I. 56. abdominis abscessum quandoque continent, I. 325. item dorsi, *ibid.*
Musculosorum fibrarum vis motrix unde? I. 87.
MUSTUM stomacho infirmo alienum; I. 254.
MUTATIO quævis lento procedat gradu; I. 138. lubita finitatem ledit, *ibid.*
MUTUS irā loquens, I. 190.
MURMURA quatenus conducant in morbillis, III. 484. in variolis, II. 58. & quos in iis exierant effectus? II. 60.

N.

N *ABOTH* ovarii novi inventor, I. 77.
NAPELLI vis virulenta, I. 198. & *seq.*
NAUSEA quæ sunt, & quomodo agant? I. 418. quomodo operentur, I. 48. 198. 222. & *seq.* III. 254. 271. volacilis & penetrans vis indolis, I. 222. pulsium mutant, I. 369. nocent, I. 35. 417. cur vires deiciant? I. 369. qui tam cito nocent? I. 178. improvidè usurpata ad animi deliquia disponunt, III. 271. ad deliria, III. 254. ad soporosos adfectus, III. 212. nocent in nimis hæmorrhagiis, in hydropse, III. 333. in intestinalium dolore, II. 290. in vomitu cruento, II. 215.
NARES olfactus organon; I. 92. eorum structura, *ibid.*
Narium hæmorrhagia spissimis debetur, I. 301. quibus solemnis, I. 346. salutaris excreto, I. 291. 346. suppreffa nocet; *ibid.* solvit in juvenibus capitis morbos, I. 409.
NASTURTIIUM aquaticum qualia recondat principia, III. 39. 378. cum lacte infusum in scorbuto prædicatur; III. 378.
NASUS, quare facile eruptio sanguinis in hoc contingat? II. 196. ejus corruptio in puero à lue venerea, III. 422. quomodo in variolis defendendus? III. 483.
NATURA, quid sit? I. 28. 88. 301. 406. quid per eam intelligatur? II. 52. 116. ejus definitio Aristotelica, I. 32. vox *naturæ*, I. 153. obscurissima, I. 162. secundum veteres quid? I. 405. quid ei tribuerit Hippocrates? I. 300. differentia est naturalium, I. 129. una ab altera distinguenda, I. 412. non est anima, I. 405. ab animalibus est distincta; I. 88. 95. ejus ratio in morbis habenda, II. 302. quo sensu morborum medi-

catix? I. 303. optimam servat medendi rationem, I. 406. 412. verum medicinæ principium; I. 301. sola sæpe sanat morbos; I. 290. 405. ejus autocratia non nimis in medendo extendenda, I. 153. medici opem non excludit; I. 413. natura prudens morbos studio inclinat est contentum & terminus nihil significans, I. 354. 352. studet eliminandis noxiis, I. 119. hunc in finem extraordinarios motus concitat; *ibid.* ejus motus in febribus continuus quomodo & quando juvandi? II. 114. & in vomitu? III. 144. & *seq.* sæpe minus salutare motus adornat; I. 411. non omnibus morbis expugnandis sufficit, I. 410. obstacula removere nequit, I. 413. succos vitiosos alterare non potest, *ibid.* sæpe non sufficienter emovet; *ibid.* externis in sanando impeditur, *ibid.* ejus pugna cum morbo quid? I. 303. ejus methodus in variis morbis, I. 407. & *seq.* effectus ipsius quandoque perpetam medicamento tribuitur, I. 425. adjuvat medicamentis, I. 137.
Natura debilis quæ sit? I. 412. II. 342. III. 268. firma & robusta quæ dicatur? I. 412. III. 237. robusta & imbecillis unde estimanda? I. 420.
NAVIGATIO, unde pathemata in insuetis? I. 310.
NAUSEA quid? III. 133. ejus natura, *ibid.* sæpe à cruditatibus, III. 67. ab iracundia, III. 134. 382. curatio in febre ardente unde? II. 212. quibus abigenda? I. 445. I. 17.
NEPHRITIS quomodo gignatur? I. 302. differt à malo ischiadico, I. 295. quomodo generetur à plethorica? II. 150. ipsius stipitatur, I. 322. et mensium emansione, I. 341. & suppreffione, I. 343. maxime in senibus, I. 344.
Nephritis simplex quæ dicatur? I. 295. ejus signa & differentia, *ibidem.* gravior quomodo in ulcus abeat? II. 147. quomodo ad eam generandam status contribuant? II. 149. cur sit frequentior reni sinistro, II. 348. non raro cum vertigine, III. 222. & cum colica jungitur, II. 287. cum arthritis interdum alteratur, II. 318. quomodo epilepsie causa? III. 12. eam curandi veterum methodus, II. 148. levior & gravior quomodo tractanda? II. 149. ejus male tractata & functis exemplum, II. 151. quatenus ad eam conveniant aque minerales, II. 149. clystere, *ibid.* topica? *ibid.* non indiffertè curatur acmoda vel parca; I. 153. ex agniti renium quibus tractanda? I. 446. eam prohibere hæmorrhoides, I. 344.
Nephritis calculosa quæ dicatur? I. 295. II. 148. difficile dignoscitur, II. 297. non ex diuina lumborum dolor oritur; *ibid.* in quo differt à colica? II. 298. sedes, *ibid.* signa diagnostica; I. 295. II. 298. est maxime reni sinistro frequens; *ibid.* causa proxima, *ibid.* causæ remotæ sunt hæmorrhagiæ & menses cessantes; *ibid.* & *seq.* casus & lactis abusus cum diætâ laui & vino, *ibid.* sæpe mictui cruento causam ministrat & cur? II. 233. est maxime hereditaria, II. 299. ejus exemplum, II. 150. 304. exulcerat sanatur exemplum, *ibid.* cum vertigine junctæ ex plethorâ exemplum, II. 303. 304. nothæ subtilitæ venesectione, *ibid.* hærcetaria; *ibid.* suppreffa ex massâ pilularum de cynoglossâ, II. 306. cura præservatoria in progressu morbi, *ibid.* difficilis, II. 301. & quâ ratione ad eam accendendam alcalina conferant, *ibid.* demulcentia; *ibid.* diæta, *ibidem.* & traumatica, *ibid.* & ipsa curatio in paroxysmo, ubi laudanæ anodyna leniora, II. 300. balnea, *ibid.* clystere, *ibidem.* linimenta,

Alimenta, *ibid.* & *nitrosa*, *ibid.* spatio sedato quando conferant antinephritica, II. 307. aquae minerales, II. 303. balnea, II. 302. diuretica, *ibid.* opata, II. 303. & venesectio, II. 302. quomodo in scorbuticis tractanda, *ibid.* & huius colica haemorrhoidalis superveniens? *ibidem* & *seq.*

Nephritis & haemorrhoidalis dolor cum numerosa calculi excretionem: II. 152.

Nephritis febris quae dicitur? II. 147. unde oritur, & quae sint ejus causae? *ibid.* ejus ex calculo ortae exemplum. II. 151.

Nervi quid sint? I. 85. III. 194. an cavi? I. 85. quo loco orientur? III. 51. & *seq.* an materiam nutritionis advehunt? I. 86. faciunt ad cordis motum, I. 42. ad sensum, motum & nutritionem; I. 86. horum opus sensus interni administrantur? III. 218. omnis generis glandulas intrans, I. 86. an obstrui possint? III. 84. in paralyti non tam obstruuntur quam comprimentur; I. 85. poris sunt pervii, I. 85. in nullis corporis parte adeo aperti ac in nervibus, I. 94. non sunt sensus sedes, I. 92. sunt causa motus partium, I. 309. datur continuitas I. 86. continuitas facit consensum partium *ibid.* cum progressu fluidorum magnus consensu I. 29. laesi atrocia cuncte pathemata, I. 311. eorum principium commotum atrocium pathematum causa, I. 310. constitutio in morbis consideranda, I. 289. eorum distributio scitu necessaria; I. 309. eorum systema probe cognitum esse debet Medico: I. 180. eorum cognitio a quibus petenda I. 20. parva novem ex cerebri prodeunt I. 84.

Nervosae partes consensum alunt I. 309. *seq.* nullam ferunt lesionem I. 311. a minimis molis materis praeter naturam motus efficiunt. I. 310. ab animi pathematibus proxime afficiuntur *ibid.* in morbis potissimum patiuntur I. 308. in eas maxime agunt morborum causae & medicamentis I. 308. 406. eorum consuetudo ex urina patet I. 380. Vide *Genus Nervosum*.

Nervoso-membranacea partes motuum morbosorum subiectum, I. 178. paullo vehementius agitate motus animi & corporis insigniter turbant. I. 179.

Nervi aurium. I. 89.

Nervi cardiaci describuntur, III. 84.

Nervorum distensio in acutis periculosa, I. 392. eorum tensio ac debilitas quid? III. 194. quomodo ea sphacelum inducere valeat? III. 388.

Nervorum fluidum facit ad motum I. 87. Vide *Fluidum, Liquidum Nervorum*.

Nervi linguae. I. 89.

Nervi nasum, I. 93.

Nervi oculorum I. 90. optici unde procedant? I. 84. eorum structura, III. 220. sedes; *ibid.* ipsorum compressio qua ratione vertiginis causa? *ibid.*

Nervorum pars olivacea ad quas corporis partes maxime feratur? II. 258.

Nervorum paralyti quomodo guttum serenam inferat? III. 228.

Nervi pneumonici spatio coarctati respirationem faciunt difficilem; *ibid.*

Nervi praecordiales spatio affecti quae pariant mala? I. 392.

Nervi pulmonum & diaphragmatis. I. 45.

Nervorum replutio quid sit? III. 194.

Nervina chylenibus quando indenda? I. 467.

NEUROLOGIA, explicavit eam Vieussens, I. 20. 86. ejus ad pathologiam usus. I. 86.

NELUS flavius, ejus exundatio pestem signat. I. 208.

Frid. Hoffmanni Oper. Tom. III.

NITRUM naturae inimicum. I. 246.

NITRUM quem praecipue habeat usum? II. 67. 198.

III. 390. optimum temperans I. 427. praeterendum acidis, *ibid.* quos praestet effectus? I. 318. calorem extinguit, I. 321. pulsum mutat, I. 369. sanguinem fluidiorem & rubicundiores reddit, I. 374. 429. specificum in nimis haemorrhagiis, I. 452. commodè miscetur absorbentibus, I. 422. quomodo sit antispasmodicum? I. 448. qua ratione conducit in catarrhali benigna, II. 46. diarrhoea, III. 168. dysenteria, III. 156. haemoptysi, II. 105. hydropes. III. 331. melancholia ad maniam inclinans, III. 260. tertiana, II. 14. cum *campchera* permixtum specificum in inflammationibus, I. 450. laudatur in insectinorum inflammatione, II. 279. in splanchno a causis interna; III. 390. *spiritus*, quos effectus ediderit in petechiali febre? II. 88. *dolea*, in quo ejus virus consistat? II. 14. laudatur in epilepsia, III. 14. tertiana. I. 14.

Nitrum fixum absorbens. I. 428.

Nitrosa quatenus conveniant in calculo renali, II. 300. in cardiaca ab ira, II. 260. haemorrhagiarum, II. 198. haemorrhoidali nimio fluxu, II. 220. pestilentia, II. 98. petechiali febre, II. 79. in purpura, II. 71. in semiteriana, II. 43. retardant morbillorum excretionem, II. 64. & sunt in his noxia, II. 67. ut & in cutis adfectibus, III. 434. & vesicae morbis. II. 154.

NONNATURALES res morbos ingignunt, I. 422. ad morbos sanandos egregie usit. *ibid.*

NOSTALGIA qualis morbus? I. 313.

NUCES alvum adstringunt? I. 261. vomica duplicis generis, I. 226. non sine periculo in usum promiscuum vocandae, *ibid.* in quibus morbis auxilium ferant? *ibid.* solibus & canibus mortiferae. I. 198.

NUCKIUS, I. 19.

NUTRITIO quid sit? I. 55. cur ea sit opus? I. 28. ad eam plura debent concurrere, I. 56. quiete opus est; I. 57. solidis aequae ac fluidis necessaria, I. 55. cur pereat in senibus? I. 162.

Nutrientia analeptica optima. I. 444.

NUTRIX bona quae dicenda? III. 474. quae optima? I. 138. cum qua danda, I. 82. quae diata ipsi habenda circa morborum infantilium praeservationem? III. 477. quomodo hoc possit corrigere? I. 132. mercenaria qua ratione damna infanti inferat? III. 474.

NYCTALOPIA excitata ab usu panis loliae. I. 230.

O.

OBES - COLIC quid? II. 258.

OBESA corpora quae sint? I. 130. non sunt in tuto collocata, *ibid.* quid tenere debeant? I. 131.

Obesi sibi caveant a frigore; I. 267. cur difficulter sudent? I. 382.

OBOLIVO obstinata à suppressis mensibus, I. 305.

Vid. *Mentaria*.

OBSERVATIONES praecipuum pathologiae fundamentum, I. 147. eorum usus amplissimus, I. 291. ad perspicuendas remedium vires proficuae, I. 289. & *seq.* de morborum spontaneo decursu utiles. I. 291.

Observationum Medicarum tenor. I. 148.

OBSTETRICES quomodo morborum infantilium causa; III. 371. quae cura ipsi circa recens natos? III. 472.

OCULI visus organon, I. 90. referunt cameram obscuram; *ibid.* eorum anatomica consideratio, *ibid.* à quibus exposta? I. 20. eorum structura anatomo-

B b b

anato-

- anatomica experimentis demonstratur. III. 228.
234.
- Oculorum morbi** unde deducendi? I. 91. defluxio-
nem & morbos experiuntur a suppreſſâ narigum
hæmorrhagiâ, I. 346. & maci excretionē, I.
347. eorum caligo in vomitu unde? III. 141. unde
in vertigine quasi convulſi apparent? III.
219. dolor & rubor in epiphorâ unde oritur?
III. 234. inflammatio, vide *epithalmia*, eorum
macula, II. 169. in iis pinguedo viperarum com-
mendatur *ibid.* pellicula sub variolâ enata quo-
modo sit auferenda? II. 53. unde in apoplexiâ
prominenter & quasi vitrei videantur? II. 241.
turbatio quomodo tractanda? II. 168. quomodo
in variolâ defendendi? II. 53. 58. III. 483.
- ODONTALGIA** quid? I. 303. II. 330. sedes, II. 331.
symptomata, *ibid.* subiecta, *ibid.* præſertim gra-
vibus familiâris, *ibid.* & 335. & ſcorbutica, III.
370. ſæpè oritur a materiâ podagricâ retrogreſſâ,
II. 341. a ſubita aëris mutatione, II. 331. a theu-
mantino, *ibid.* cum eryſipelate non raro jungit-
ur, II. 335. facile recidiva, II. 331. eventus,
ibid. periodica unde? I. 186. ex vini & dulcium
intemperantiâ. II. 336. a ipſo ligamentorum
dentium; I. 303. exempla ex incongruâ diætâ
ortæ, II. 335. ex frigore corpori plethorico ad-
miſſo aquâ frigidâ ſanatur, II. 334. ex vehemen-
ti motu ſub iniquâ temperate ortæ, II. 333. ex
omniâ venæſectione, II. 335. rheumaticæ a ſer-
oſâ colluvie curâ per inedium abſolvitur II. 334.
ejuſ ſpecificum; I. 451. indicationes curatoriæ,
II. 331. quæ abſolvuntur acidularum, II. 332.
clyſterum & pediluviorum II. 331. diaphore-
ticorum II. 332. laxantium, II. 331. ſuſſimigio-
rum & diſcutientium II. 332. & ſanguinis miſ-
ſionis uſu; II. 331. ſi a dente cariolo enata quo-
modo tractanda ſit? II. 332. & ſeq. cautelæ cir-
ca externa, rinarum ſectionem, & purgantiâ.
ibid.
- ONOR**, ejus ſedes & objectum; I. 93. ingens in
nervioſas partes potentia, I. 178. cur pereat? I.
306. a ſpalmo tunicæ pituitariæ impeditur, I.
305. errhinorum abuſu læditur, I. 442. cum
gutu alit ſympthiam, I. 305. *ſuavolemitum*
cur hyſterica infeſta? *ibid.* unde pathemata ex
eo? I. 310.
- Oderifera** cur promptè agant in cerebrum, ejus
membranas, & nervos? I. 94.
- OEDEMATI**, eorum ortus; I. 167. 175. a ſpalmo
diaphragmatis quomodo? I. 305. ex ſcabie re-
puſſâ, I. 337. ſuppreſſis menſibus, I. 341. nimis
hæmorrhagiis, I. 349. aſthmate lento, I. 352.
balneis marianiſ abiguntur, I. 464. nec non va-
poroſis, I. 465. cur ad interiora repellantur. I.
166. ſpalmo exterioribus inducto diſparent, I.
302. repuſſa graviter nocent, I. 339. ſuffoca-
tionis cauſa. I. 302. Vid. *Tumores Oedematofi*.
- OESOPHAGUS** conſtitit cum ventriculo; I. 314.
ejuſ inflammatio quibus ſignis cognoscenda? II.
129. quomodo tractanda? II. 128. *ſpaſmi* qui
dicantur? III. 130. diſſerunt inter ſe, *ibid.* eor-
um ſigna, *ibid.* diſtinguantur in idiopathicoſ
& ſymptomatiços, III. 132. cauſæ mediætæ &
remotæ, *ibid.* ſymptomatiçi qui? III. 133. pro-
gnofis, *ibid.* exemplum totiuſ oſophagi ſpaſ-
morum, III. 135. curatio quæ abſolvitur per
antiſpaſmodicâ & diſcutientia, III. 134. quomodo
tractandi ſi ab abuſu veneno ioduæ ſint?
ibid. quâ ratione chronici, ſi febris acuti ſu-
pervenit, III. 135. ſi a ventribus, *ibid.* cauſelæ
circa pediluvia, *ibid.* circa purgantiâ, *ibid.* &
venæſectionem. *ibid.*
- OLERA** dant humidum alimentum; I. 108.
OLEUM bezoardicum Wedelii quomodo prepara-
tur? II. 121.
- Oleſa** ad ascenda contagioſa commendantur; I.
212. profunt poſt venena & purgantiâ acriora
adiumpta, III. 28. & ſeq. quæ & cur vermibus
adverſa? III. 492. nocent in ulcerofis capitiſ ef-
floſcentiis III. 18. & vomitu cruento. II. 215.
- OLFACſTUS** ubi perficiatur? I. 89. ejus organum na-
res; I. 92. quomodo fiat? I. 93. cum gultu cur
coniſpuit? *ibid.*
- OLLE** carbonibus repletæ non ſine noxâ mulierum
pedibus ſubjiciuntur. I. 230.
- OMENTUM** cur difficulter ſanguinem tranſmitat?
I. 49.
- OPHTHALMIA** quæ dicatur, & quomodo oriatur?
I. 302. II. 165. ſpalmo debetur; I. 302. diſſert
ab epiphorâ; III. 233. quæ ſit levior & gravior,
ibid. atque graviffima, II. 165. ſicca & humi-
da, II. 166. vera & ſpuria, *ibid.* profundior an
ſit periculofa? II. 168. *periodica* quæ dicatur?
II. 166. exemplum, II. 168. quomodo ſuboriat-
ur ex menſium ſuppreſſione? *ibid.* *epidemica*,
quæ dicatur? II. 166. ejus cauſæ antecedentes,
ibid. prognofis, *ibid.* ejus exemplum ex icu
ſuppuratæ, II. 167. ſubite a ſeſſu ferreâ, II.
168. graviora cum rupeſtâ corneæ, II. 169.
ſpuria rebellis, II. 168. quomodo curanda? II.
166. præſertim levior, *ibid.* gravior & graviffi-
ma; *ibid.* *periodica*, II. 168. quomodo ſtaſis
in- & externâ diſcutienda? II. 166. quatenus
in eâ conveniant diaphoretica & purganda, II.
167. ſetacea, topica, venæſectio, & veficua-
ria? *ibid.*
- Ophthalmica febris**, vid. *Febris ophthalmica*.
- Ophthalmica hemicrania**, II. 170.
- OPIATA** quomodo operentur? I. 48. III. 254. 271.
ritè correctâ in uſum trahi debent, II. 306. eo-
rum viſ narcotica alexipharmacis & purganti-
bus cicuratur, III. 127. 380. inſorſibus nocent,
I. 133. juvenibus magis, quàm ſenibus conveni-
unt, II. 306. Perſis cur non noceant? I. 137.
locum non habent in affeçtibus periodicis, I.
186. alvum adſtringunt, I. 261. vid. *odynæ*
& *ſtupeſactia*; retroſpellendi poſſent ſaculate,
I. 152. ex hericozum numero; I. 418. tutiſ
omittuntur; I. 449. debilibus exiçtola, I. 344.
in calculo mortifera, I. 418. nec non febre ar-
dente; *ibid.* non offerenda utâ motus languent,
I. 418. & ſeq. inſiſ perperam ſiſuntur hæmorrhagi-
æ, I. 344. in colicâ gignunt paralytiços affe-
çtus, I. 354. 418. clyſteribus non indenda; I.
468. vid. *Laudanum*. laudantur in odontalgia,
II. 333. quæ & quando locum habeant in dy-
ſenteria, III. 157. cordis palpitatio, III. 89.
in iliacâ paſſione, II. 280. in rheumaticis & ar-
thriticis doloribus, II. 223. in ſcorbuto. III. 380.
ineanti uſurpata ad animi deliquia diſponunt,
III. 271. ad deliria, III. 254. ad polyſporum
generationem, III. 282. ad ſyncopen, III. 276.
in mania majorem inducunt demenciam & cur?
III. 263. in quibus inflammationibus ſint noxiſ-
ſiſſima? II. 156. nocent ante paritſ ſphacelatæ
amputationis operationem, III. 392. in audituſ
vitius & cur? III. 243. in cardiagiâ ab atoniâ
vicerum, II. 268. in convulſivis motibus, III.
29. inſancibilibus & debilibus, III. 16. in intelli-
guntur dolore, II. 290. in intermittentibus, II.
17. poſt terrorem, III. 91. in vomitu cruento.
II. 215.
- OPIMUM**, ejus indoles ac virtutes, I. 172. 223. qui-
bus utiliter ſocietur? I. 422.
- ORGANA**

ORGANA ad edendum motum per se non sunt idonea, I. 155. exteriora & emanatoria cur tam copiose sint constituta? I. 156. leuoriora & motoria quare in senibus amittant robur suum? I. 162.

OS, ejus fortis sepe à vernibus, III. 26. in ieturo unde? III. 307. est coarctata familiaris, III. 370. cadaverosus in phthisi quale signum præbeat? III. 288.

OSSA dimidiam fluidi partem habent, I. 367. calcinata absorbent, I. 428. diaphoretin sinu moveri, *ibid.* unguit structura & sinus, III. 460. à fistula lacrymali graviter afficitur; *ibid.* sepe ex utero excernuntur, III. 187. an à fistulosis ulceribus possint adgredi? III. 460. incurvata in rachitide unde? III. 489. eorum morbi in lue venerea unde? III. 420. cur noctu graviores? *ibid.* & *seq.* I. 428.

OTITIS absorbens.

OTALGIA quid & unde? I. 303. II. 336. ejus genesis & causæ, II. 336. symptomata eorumque ratio, *ibid.* prognostis, *ibid.* ex suppurat per se gurgulis exemplum, II. 325. à suffraginis & emplastro brachii tumori applicatis inducta, II. 336. ex ingestis vini copia & frequente refrigeratione, *ibid.* diuturnæ & immensis effluxu parit soluta; II. 339. curatio per antispasmodica in- & externa; II. 337. deficientia, *ibid.* à causâ externâ nata quomodo tractanda? *ibid.* effluens materia in hac quomodo divertenda & leniter exsiccanda? *ibid.*

OVA probum dant alimentum, I. 107. senibus & debilitatis conveniunt; *ibid.* quibus nocent? *ibid.* eorum testæ absorbent I. 428.

OVARIA quæ dicantur? III. 53.

OVARIUM vulgare an sit verum? I. 77. rectius intra uterum quaeritur; *ibid.* vasa in eo disrupta mortis causa? I. 327.

OVULUM formæ describitur; I. 77. quâ ratione masculinum producat? *ibid.*

P.

PALATUM, ejus ulcera in lue venerea quomodo tractanda? III. 420.

PALPITATIO cordis quid? III. 83. unde? I. 168. In quo differt à tremore ipsius? *ibid.* ejus histioria, III. 84. sedes, *ibid.* eâ extinctorum anatome, III. 85. ratio ejus mechanica, *ibid.* minus salutaris naturæ motus; I. 412. convulsionis species; I. 306. qualia in ipsâ pulsus? I. 368. causa proxima, III. 84. causa mortis in eâ poly-
pnea, I. 398. III. 85. 92. quantum ad eam contribuunt animi affectus? I. 185. III. 87. aqua in pericardio copiosius collecta, *ibid.* cibi flatulentis, *ibid.* humorum abundantia; III. 86. eorum crassities & defectus, *ibid.* & *seq.* humores commoventia, III. 46. 87. materia acris cordi inhærensens, III. 86. polypos III. 85. & stricture partium inferiorum, III. 87. ex suppressis men-
struis; I. 341. exempla à variis causis sustentata, III. 92. à cicuta aquatica mamma loco petroselinæ apposita, III. 93. in fene à vehementiori equitatione sustentata; *ibid.* ab hæmorrhagiâ narium cessante ortæ, III. 90. à polypo le-
thalis III. 92. à nimis sanguinis commotione, III. 91. ex sanguinis vitio, III. 90. ex terrore cum insequente hydropse lethali, III. 91. cura præservatoria, III. 89. quæ conducant interna in paroxysmo, III. 88. & externa? *ibid.* quæ extra illum, *ibid.* si ab humorum vitio quomodo tractanda? III. 89. quâ cautione adhibenda
Frid. Hoffmanni Oper. Tom. III.

emetica, III. 90. opata, III. 89. pediluvia, III. 90. purgantia, & veneseccio? *ibid.*

PALUSTRIA loca infectorum seminariorum, I. 209. 211. valde insalubria, I. 208. ideo circa ea non indormiendum, I. 211. eorum exsiccatio facit ad averfionem morborum epidemicorum. I. 212.

PANACEÆ rectè usurpatæ admittendæ. I. 443.

PANCREAS scirrho obdeditur in hypochondriaci & diuturnâ quantâ. I. 329.

PANIS alimentum universale, I. 107. quis optimus? *ibid.* calidus nocet, I. 109. turbat negotium mens-
truum; *ibid.*

PAPAVERACEORUM operandi ratio. I. 48.

PARACELSUS, ejusque nova dogmata, I. 16. an multum profuerint medicinæ? I. 17.

PARACENTHESIS in hydropse sacato proficua, I. 326. in hydropse jam à Celso laudatur, III. 329. & quando in eo conducatur? *ibid.* cur in hydropse parum juvet? III. 333. in ascite noxia, I. 328. & cur? I. 399.

PARACYNCHISE quæ dicatur? II. 126. quid sit? I. 295. distinguenda ab aliis faucium inflammationibus. *ibid.*

PARALYSIS quæ dicatur? III. 194. atoniæ gravior species I. 306. unde? I. 166. differt inter se, III. 195. quomplex sit? *ibid.* vera vel spuria I. 299. utriusque signa & sedes *ibid.* datur adhuc species particulari, *ibid.* ejus histioria, *ibid.* sedes, *ibid.* spasmus flupator I. 302. ætiologia ejus, quæ artus occupat I. 297. brachia, III. 198. & crura, *ibid.* causa proxima, III. 195. quomodo gignatur? *ibid.* causa mortis in eâ; I. 397. à terrore oriunda, I. 191. ex tristitia, I. 193. ex nimis aquarum atendum potatione, I. 255. sepe oritur a sanguinis reflatione, I. 299. ex lochiorum suppressione, I. 342. ex apoplexiâ quomodo? I. 350. post dolores atroces, I. 354. quomodo à cerebri flacciditate & nervorum debilitate oriatur, III. 193. à colicâ sanguineâ? II. 294. post colicam oritur; I. 354. ab exanthematibus retroculis, III. 197. ab excretionibus sanguineis suppressis, III. 196. à gravi iracundiâ, III. 197. exemplum iræ beneficii sanatur, I. 190. ipsius artuum & partium inferiorum à terrore lethalis exemplum, III. 202.

artuum inferiorum post partum ensæ casus, III. 206. cephalalgis & coarctato lethali eventu supervenit; I. 306. dextri lateris sinata & terrore revocata; III. 204. ab imminuto hæmorrhoidum fluxu ortæ, III. 205. manuum ex colicâ sanumina inducta, III. 203. an à febre, & quali solvantur? III. 198. prognostis, *ibid.* quomodo præservanda? III. 201. inveterata insana-
bilis, I. 184. incendii terrore cessat, I. 192. facile recidiva. I. 356. qualis diæta observanda? III. 201. levatur balneis roborantibus, I. 465. & vaporosis, *ibid.* nec non dyctylicis; I. 467. quatenus & quando in eâ conducant aciculae & thermæ, III. 200. balnea artificialia? *ibid.* cura per ineam, III. 201. diaphoretica leniora, III. 200. lotiones capitis, III. 201. roborantia, III. 199. & venesectionem. III. 200.

Paralysis nervorum atrophicorum surditatis causa, I. 306.

Paralysis nervorum lingualium aphoniæ causa, I. 306.

Paralysis nervi optici gutta serena causa, I. 306.

Paralysis nervorum pneumonicorum catarrhi. suffocativi causa, I. 306.

Paralysis palpebrarum quomodo tractanda? III. 201.

Paralysis

Bbb 2

- Paralyticæ febriusæ*, III. 201.
Paralyticorum membra cur adhuc viva discenda ? III. 388. tumores in iis quomodo tractandi ? III. 201.
 PAREGORICA quæ dicantur ? I. 448. quomodo agant ? *ibid.*
 PARESIS quid & unde ? I. 307. post colicam frequentens. I. 354.
 PARONYCHIA à spasmò periosii ; I. 303.
 PAROTIDES unde ? I. 183. quæ habeant signa ? I. 326. quam affeciones illas infrequi soleant ? I. 357. eorum tumor unde ? III. 452. cum otalgia in febribus acutis quomodo abigendus ? II. 338. fistula in iis quomodo generetur ? III. 461.
 PAROXYSMI cur tam facili revertantur ? I. 169. cur redeant statim temporibus ? *ibid.* febres quomodo diiudicandi ? II. 16. intermittentiū unde ? I. 186. nocuisti sublati causâ sistendi ? I. 417.
Paroxysmus relinquit atoniam, I. 320. seq. recrementis gignit, I. 321. quid in & extra eum agendum ? I. 289. extra eum evacuandum, I. 321. sub eo non movendum, I. 427. nec venæsectio instituenda, I. 457. ante eum urina cur tenuis, & post eum crassa ? I. 378.
 PARTES corporis fluidæ & solidæ, I. 27. conspirant, I. 309. eorum consensus conspicuus, I. 28. ex eorum structura motus & ex nexu consensus ; I. 309. diversitas variat circulum sanguinis ; I. 47. genitales à Graeco descriptæ. I. 20.
 PARTUS, ejus legitimum tempus, I. 80. qui regulares ad eum sint spasmi ? II. 213. quæ sub eo fiant ? II. 158. quæ post eum fiant, I. 80. II. 157. & 158. & post ipsum ex usu sint ? II. 157. 158. III. 181. & seq. non sine convulsione succedat. I. 306. sæpe post mortem matris fit I. 395. balneis facilitatur. I. 464.
 Partus difficilis, cur in quibusdam foemina difficilis succedat ? II. 163. quomodo ad eum & scirrhum uteri disponat ? III. 447. ad fluxum album, III. 350. ad vesicæ spasmus, II. 310. & vomitum cruciatum ? II. 213.
 Partus laboriosus quâ ratione lethalem sæpe inducat syncopem ? II. 228. funesta gravioris signa, I. 395.
 Partus septimestris quomodo differat ab abortu ? III. 177. ejus exemplum post hæmorrhagias abortivas rariore. III. 184.
 PASSIO, quam passionibus hæmestantibus & diluentibus depellantur I. 469. à frigido potu autem inducantur ? *ibid.* colica & iliaca passio unde oriatur, & quibus modis curentur ? I. 473. stomacalium passionum origo ; I. 473. & seq. hysterice passionis symptomata quænam ? I. 474. curatione difficilissima sunt. *ibid.*
 PASSULÆ minores, eorum virtus laxans unde ? III. 376. rhubarbarinae laudantur in mictu cruento, II. 206. malo hysterico, III. 57. affectu hypochondriaco, III. 70. odontalgia, II. 333. tussi. III. 112.
 PATHOLOGIA, ejus definitio, I. 147. veræ & falsæ discrimen, *ibid.* veræ fundamenta, *ibidem.* progressum quid hæcenus impediens ? I. 150. veritates fundamentales ex physiologia repetenda, I. 154. pathologia veterum cur tam manca fuerit ? I. 163. ejus objectum, I. 147. altera est medicine pars, I. 14. non potest carere neurologia, I. 86. ex moruum non humorum vitio pendenda, I. 308. nexu gaudet cum reliquis medicinarum partibus, I. 285. therapie fundamentum, I. 424. minus recte plerumque traditur, I. 300.
 ejus synopsi, *ibid.* ignorata causa ignorantie virium in medicamentis. I. 424.
 PAULLI I. 17.
 PECTORALIVM usus nimis ventriculo alienus. I. 256.
 Pectus, ejus clangoræ concussiones in infantibus quid, & quid indicent ? III. 135. rheumatici ab hæmorrhoidibus suppressis aborti exemplum ; II. 328. ejus convulsiones à potu frigido, I. 254.
 PEORS cum intestinis habent consensum, III. 68. cum ventriculo, I. 315. & cum pectore ; III. 119. cur circulus sanguinis in his difficilis ? II. 346. cur facilius immutescant quam aliæ partes ? I. 269. & seq. cur ad materiam arthriticam fovendam dispossit ? II. 342. 346. quando vena in iis incidenda ? I. 459.
 Pedum fortis suppressus quomodo ad asthma disponat ? III. 96. ad palpitationem cordis ? III. 87.
 Pedum frigiditas uiles. I. 140.
 Pedum refrigeratio quomodo aphonia inducat, III. 250. status, III. 340. tormina, III. 68. cur ventris dolores exciet ? I. 168. cutim stringit, tormina & diarrhoeam movet. I. 315.
 Pedum tumor, vide Tumores adematosi.
 Pedum vacillatio post coitum unde ? III. 33. unde in vertigine ? III. 220.
 PEOLUVIA ex quibus & quomodo paranda ? I. 465. & seq. III. 71. 242. quem habeant effectum, *ibid.* I. 140. ætate tempore profunt, *ibid.* eorum tempus commodissimum, *ibid.* pulsus mutant, I. 369. amplissimi usus in variis morbis, I. 466. imprimis spasmus & capitis morbis, I. 318. latè virtutem dissolunt, I. 466. humores derivant & fluidificant, *ibid.* excretionem promouent, *ibid.* nocent si mensum fluxus imminet, *ibid.* à constringentibus abstinendum. *ibid.* nimis calida sunt nocentissima, III. 27. 29. 57. minus conveniunt, si pedes sunt frigidi, III. 90. 319. quid horum loco sistendum *ibid.* aut quid ante eorum usum conveniat ? *ibid.* eorum usus, III. 237. 242. & quando conducant in aphonia, III. 249. auditus vitio, III. 242. capitis morbis, III. 223. comate somnolento, III. 218. convulsionibus, III. 29. hæmoptysi, II. 205. hæmorrhagiæ narium, II. 199. hysterico malo, III. 57. mania, III. 264. & quo tempore in ea instituenda ? III. 406. odontalgia, II. 331. in oedemate pedum, III. 316. palpitatione cordis, III. 89. ad podagram retrogressum innovanda, III. 101. in singulis ? III. 126.
 PENTIS hæmorrhagia differt à mictu cruento, II. 232. ejus ulcera in gonorrhœa quomodo tractanda ? III. 362.
 PERCEPTIO quid ratione animæ, I. 89. & corporis ? *ibid.* non in nervis, sed in membranis nervosis fit. *ibid.*
 PEREGRINATIO quando sanitatis causâ instituenda ? I. 104. quibus comoda ? I. 122.
 PERICARDIVM quomodo æqua in eo generetur ? III. 87. sero repletum in iis qui palpitatione cordis pereunt. I. 399. & seq.
 PERICRANIUM, ejus spasmus efficit cephalalgiam ; I. 303.
 PERIOSTIVM, ab ejus spasmò dolores. I. 303.
 PERIPNEUMONIA unde ? I. 166. 168. ejus signa funesta, I. 294. 391. II. 137. causa mortis, I. 396. differt à pleuritide ; I. 294. juvenibus familiaris, I. 183. & Westphalis ; I. 185. non fit ante putredinem, I. 183. crasis servat, I. 388. quomodo gignatur ? I. 302. spasmus debetur, *ibid.* sæpe

sæpe post colicam accidit, *ibid.* non tam facile in empyema concedit ac pleuritis, l. 351. quomodo oriatur à colicâ, ll. 142. polyo, ll. 140. III. 279. ex potione frigida, l. 234. ex hæmorrhoidum suppressione, l. 343. sanguine crasso pulmonibus impacto, ll. 140. III. 279. viro primarum viarum? ll. 143. ex quâ causâ asthma spasmodicum ipsi superveniat? ll. 107. ejus exemplum ex omniâ venæsectione lethalis, ll. 140. ex colicâ lethali; ll. 142. gravis sudore discussa, ll. 143. quando emetica in eâ conveniant & noceant? ll. 142. venæsectionem possit; l. 459. tempestivè discutienda? l. 415. providum expectorantium usum desiderat, l. 441. Vide *Pneumonica febris*.

PERISTALTICUS motus, multum confert ad tuendam valetudinem, l. 157. ad sanitatem necessarius, l. 385. quibus destruitur? *ibidem.* & seq. à spasmi inventur, l. 304. clysteribus crebrioribus laedat, l. 468. labefactatus quæ pariat mala? l. 307. inversus facit iliacam, l. 304. vide *Morus*.

PERILABUM mater absorbens, l. 428. subadstringit, *ibid.*

PERSÆ opio affluenti ab illo non læduntur, l. 137.

PERSPIRATIO libera prodest, l. 52. insulas calidas promovetur, l. 139. nocturna non est subito repellenda, l. 127. liberior quibus adjuvetur? l. 250. omnium excretionum præcipua, l. 334. minor quantitate urina, l. 375. differt à sudore, l. 380. sordes evehit maximè perniciosas l. 334. & tenuissimas; l. 381. corpus agile reddit; *ibid.* balneo movetur; l. 463. in morbis exploranda, l. 288. ex quo cognoscenda? *ibid.* ab aere mutatur, *ibid.* sub quo aëris statu optima, l. 381. à frigido - humido suffumigatur, l. 334. mutata epidemicorum morborum causa, l. 334. seq. sub doloribus & spasmus supprimunt, l. 319. suppressa omnium maximè nociva, l. 334. morbus gignit, l. 288. recidivas parit, l. 289. variâ pathemata ciet, l. 304. succos inquinat, l. 320.

Perspirationis causa & ratio duplex, l. 265. æqualis commodum, *ibid.* cohibita quæ mala gignat? *ibid.*

PESTIS signa pathognomonica, l. 175. eâ laborantes facilius alios afficiunt, quam qui eâ occubere, l. 208.

Pestilentia quæ dicatur? ll. 93. in quo differat ab aliis malignis & exanthematicis febribus, *ibid.* ab erysipelaceâ febre? ll. 99. ejus historia & symptomata, ll. 93. subiecta; ll. 94. causa mortis in eâ sphacelus, l. 385. extremi periculi morbus quare plerisque exitialis? l. 358. ejus miasma cujus sit nature, & unde acquiratur? *ibid.* quomodo corpori insinuetur? ll. 93. quibus potissimum corpori solvatur? ll. 94. quomodo in eâ mors contingat? ll. 95. quomodo optime præcaveatur? *ibid.* quo sine laudentur acida, *ibid.* fonticuli? *ibid.* ejus curandi ratio ex Langio tradit, *ibid.* optime curatur à naturâ, ll. 96. specificum in eâ, l. 450. quomodo tractanda ab initio & sub vigore? ll. 96. in declinatione, *ibid.* in eâ nocent alexipharmaca sola, ll. 97. sed in eâ conducunt acida nupta, *ibid.* nec non acida cum bezoardicis fixis, *ibid.* & analeptica; *ibid.* quatenus in eâ conveniant emetica, *ibid.* nirosa, ll. 98. venæsectio? *ibid.*

Pestilens febris, in eâ crisis succedit; l. 388.

PETECIÆ, in quo differant ab exanthematicis aliis, l. 293. ll. 85. a morbillis, ll. 63. a morbo pulicum, ll. 75. crises fervant, l. 388. quæ.

lem habeant pulsus? l. 371. qui malus est? *ibid.* per spasmus cum damno repelluntur; l. 302. an bonum, si purpurâ accedente evanescent? ll. 90. cur sæpe eas vel amecedat, vel subsequatur epilepsia? ll. 12.

Petechialis febris quæ dicatur? ll. 84. cur vocetur maligna? ll. 85. quæ fortius nominata? *ibid.* ejus historia; *ibid.* signa mala, *ibid.* unde primam originem nanciscantur? ll. 86. ejus subiecta, *ibid.* cur frequens sit in Austriâ & Pannoniâ, ll. 89. in castris, ll. 86. & locis publicis? *ibid.* ejus ratio formalis in quo consistat? ll. 85. ejus miasma quomodo intra corpus suscipiantur? *ibid.* quos in eo effectus causetur? *ibid.* a salivâ fit virulentus, ll. 86. quomodo ardeat? *ibid.* qualis sanguinis consistentia in eâ sit laudabilis? ll. 91. quam salutaris in eâ sit alvi fluxus? ll. 87. quomodo in eâ mors contingat? ll. 85. ejus exempla sub diarrhœâ funesta, ll. 89. in fessore & fratre diversæ, ll. 90. ex sinu erecto lethalis, *ibid.* vino bono lenata, *ibid.* venæsectione compressæ, ll. 91. emetico jugulata, ll. 92. quomodo fit præservanda? ll. 87. præsertim vini boni usû; *ibid.* quæ in eâ curandâ conveniant remedia? *ibid.* quomodo tractanda, si à morore provenit? ll. 90. quatenus in eâ conducant emetica, ll. 89. laxantia, ll. 87. & seq. venæsectio? *ibid.* ll. 89. 91. quomodo præservanda ejus recidiva? ll. 88. epidemica anno 1683. ejus historia & peculiaris symptomata recensentur, *ibid.* & seq. quem in eâ effectum spiritus nitri præstiterit? ll. 89. spuria quæ dicatur? ll. 75. cum purpurâ albâ, ejus historia, ll. 83. & curatio, *ibid.*

Petechians febris quæ dicatur? ll. 75. in quo differat à catarrhali benignâ? ll. 49. ejus historia, ll. 75. subiecta, ll. 76. signa bona & mala, ll. 75. an exanthematicum eruptio in eâ sit essentialis? *ibid.* & seq. cur diversâ sint exanthemata? ll. 76. quibuscum sit contagiosa? *ibid.* quæ sit ratio formalis? ll. 75. causa materiali? ll. 76. quomodo mors in eâ contingat? *ibid.* & seq. an semper sit epidemica? ll. 76. quo tempore grassetur? *ibid.* quæ subiecta ad ea felicius evadant? ll. 77. cur in eâ sit vitandus situs erectus? ll. 78. quæ animi tranquillitas læsa in eâ efficiat? *ibid.* magis à naturâ quam arte curatur, ll. 77. quæ indicationes Medico resistent? *ibid.* quomodo in curatione temperamenta sint respicienda? ll. 79. quæ in eâ probate fidei sint pharmaca? ll. 77. quo ordine & tempore sint exhibenda? ll. 78. quæ ad præcavendum humorum corruptionem inserviant? ll. 77. quæ vires fesciant? *ibid.* quæ alvum & sudorem moveant? *ibid.* quando conducant emetica, ll. 79. venæsectio, *ibid.* vesicatoria? *ibid.* quales excretiones in eâ moderandæ? ll. 79. quâ ratione symptomata tractanda? *ibid.* quale conducatur regimen? ll. 78. quid ratione lecti & vestimentorum observandum? *ibid.* fugienda sub eâ alimenta; *ibid.* epidemica anno 1698. quibus fatalis fuerit? ll. 80. ejus subiecta & symptomata essentialia *ibid.* eorumque diversitas secundum temperamenta, ll. 76. quomodo io eâ diversimodè habuerint diarrhœæ, ll. 80. exanthemata, ll. 81. hæmorrhagiæ, ll. 80. sudores, *ibid.* vomitus, ll. 81. urina? ll. 80. ejus signa bona & mala, ll. 81. eventus; *ibid.* regimen necessarium; *ibid.* quæ in eâ situs erectus noxam induxerit? *ibid.* quæle damnum effecerint alexipharmaca calida? *ibid.* methodos ei medendi, ll. 82. præsertim symptomatiæ, *ibid.* quæ proficua; fuerint pharmaca, *ibid.* quatenus pro-

- fuerint alexipharmaca cum analeptis mixta, II. 81. venesectio, II. 82. vesicatoria, *ibid.* vomitio, *ibid.* quomodo praeservari poterit. *ibid.* epidemica anno 1728. ejus historia, II. 83. quomodo inter milites praedicatoris se habuerit, II. 84. & curata fuerit? *ibid.*
- PHAGEDENA** quid? III. 444.
- PHANTASIA**, ejus vis in homine, III. 42. in actiones naturales operatur, I. 97. non agit sine causis mechanici; I. 24. ejus effectuum exempla; I. 97. limitatam in actus mechanicos vim habet. I. 406.
- PHARMACA**, maximarum quoque virium ex quâ causâ abque humido sufficienti nihil eximii praesent in curatione? I. 469.
- PHARMACEUTICAE** studium utile. I. 20.
- PHARYNX**, ejus structura & situs, III. 131. functio, *ibid.* quotuplex sit ejus spasmus? III. 137. ejus ratio formalis, III. 132. quomodo differat ab aetia? III. 130. ex quibus signis hæc cognoscatur? *ibid.* & *seq.* differunt ab ejus inflammatione & tumore ipsi inhærentes; *ibid.* ejus exemplum, III. 136. spasmi pariter, I. 305. spasmo affectus constituti in gula sensus, *ibid.* & laxatus nimis deglutitionis vitiatæ causa. I. 306. curatio, vide *Cesophagi spasmus*.
- PHILOSOPHIA** experimentalis vires remedium reducit; I. 426.
- PHLEGA** unde parentur? I. 196.
- PHLEBOTOMIA** infelix. I. 239.
- PHLEGMATICI** quinquam? I. 242. eorum natura, I. 131. in quos morbos facit incidant? I. 243. cur non adeo acerbis doloribus expositi ac cholericis? I. 180. cur purpure obnoxii, III. 400. scorbuti? III. 373. quomodo ab adfectibus catarrhalibus sint praeservandi? II. 45. & *seq.* & gonorrhoeâ laborantes tractandi? III. 361. eorum dieta, I. 131. alvus laxa. I. 67.
- Phlegmaticum temperamentum** quale? I. 44.
- PHLOGOSIS** unde? I. 166. 242.
- PHRENITIS** quæ dicatur? II. 131. in quo differat à delirio levi in acutis, II. 132. à mania? *ibid.* ejus signa & differentia, I. 295. ejus futura & praesentis in acutis signa; I. 392. II. 131. subiecta, II. 131. causa proxima; *ibid.* causæ antecedentes, *ibid.* ex peremptorum sectio, *ibid.* & III. 252. idiopathica quæ sit? II. 131. symptomatologica quæ sit, II. 132. lethalis, II. 182. 184. ejus ortus, I. 166. ex eâ fit sphacelus; I. 324. quomodo gignatur? I. 302. ex affectu iracundiae, I. 190. ex suppressâ narium hæmorrhagiâ; I. 347. quomodo accersitur in acutis? II. 135. exempla ejus ex alvi fluxu critico cohibito ortæ, II. 134. ex calidiorum usu lethalis, II. 135. in lentam & hecicam mutatur, II. 134. ex ira in chronicam insaniam mutatur & curatur, II. 136. delirium reliquoquent, II. 135. eam curandi indicationes; II. 132. jugularium sectione levatur; I. 458. quomodo tractanda si orta fuerit ex hæmorrhagiâ suppressâ, II. 134. ex materia acuta, *ibid.* ex latente phlegma Polonica? *ibid.* quomodo arceat in ardentibus? II. 114. & *seq.* quatenus in eâ conveniant analeptica, II. 135. laxantia, II. 133. medicamenta interna *ibid.* & externa, *ibid.* venesectio, II. 132. 134. 135. vesicatoria? II. 134. quale regimen? II. 133.
- PHRYGIES** quæ dicatur? III. 284. differt ab atrophâ infantili, *ibid.* à tabe ex gonorrhoeâ, pollutione nocturna, & lue veneræ ortâ, *ibid.* à tussi chronica cum copiosa phlegmatis ejectione, *ibid.* signa ex Aretæo & Hippocrate, III. 284. quomodo necet, I. 399. eâ defunctorum anatome;
- III. 285. causa mortis in eâ; I. 399. suffocatione perimit; I. 393. an sit contagiosa? III. 287. causæ antecedentes; III. 285. cur melius tempore corpora afficiat? I. 234. juvenibus familiaris, I. 183. nonnunquam congenita, *ibid.* ideoque incurabili. I. 244. quare magis vexet juvenes quam senes? I. 170. exemplum in juvene cum tussi, III. 295. senibus cur rarior, I. 185. hæreditarius morbus, I. 349. exemplum hæreditariæ à febre tertianâ contumacioris redditæ, III. 297. habituali sine periculo; III. 298. quandoque gignitur ex hæmoptysi, I. 164. & quomodo? I. 350. exemplum incipientis ab hæmoptysi per adstringentia tractata, III. 296. vel ex nimia aquarum ardentium potatione, I. 255. à pulmonum aetia, I. 307. obstructis & tumefactis pulmonum vasculis, I. 299. ex cohibito fluore albo, I. 340. mensum suppressione & inde ortâ hæmoptysi, *ibid.* vasculorum reliquis, I. 355. hæmorrhoidum suppressione, I. 343. restagnante sanguine lochialis; I. 342. exempla incipientis à materiâ ulcerosa retrocedente, III. 295. à nimia sanguinis pectus ortæ, III. 299. cum tussi & tæbe fragis hortensibus finatur, III. 294. veneræ casus, III. 424. cur tam raro curetur? III. 288. & cur inveterata nullam recipiat functionem? III. 287. signa funesta, I. 394. III. 288. & convalescentia, *ibid.* cura præservatoria, III. 292. ejus specifica, I. 451. methodus mitigativa quæ requirit balnea aque dulcis, III. 292. decoctis & infusa depurantia; *ibid.* lacticiis & pulveribus temperantibus; *ibid.* non indistincte curatur lacte; I. 153. methodus curatoria, quæ absolvitur usque anodynorum, III. 291. balneorum pectorum & diureticorum, *ibid.* laxantium, *ibid.* lactis coacta, III. 289. aut feri ipsius, III. 290. aut admixtione aquarum mineralium, *ibid.* aut cum infusis & decoctis herbarum; III. 291. cautelæ quæ tenendæ circa acutis usum, III. 293. & *seq.* lactis usum, III. 294. motum corporis, *ibid.* purgantis & venesectionem? *ibid.* quomodo sudores colligativi tractandi? *ibid.*
- Physici** in iram proci. I. 103.
- PHYSICA**, cur eâ opus sit? I. 15. qualis esse debeat? I. 14. ejus peritia medico maxime necessaria, I. 150. ejus & Anatomicæ neglectus perperit seclat in medicinâ, I. 16.
- PHYSIOLOGIA** prima medicina pars, I. 14. quid tractet? I. 285. cum aliis medicinae partibus connexionem alit. *ibid.*
- PITAS**, ejus studium facit ad vitam longam. I. 102.
- PILA PARVA**, ejus lusus vehementior motus, I. 122.
- PILULÆ** aloetica præferenda purgantibus, I. 416. hæmorrhoides movent, I. 343. cautè tamen usurpandæ, I. 441. quibus & quando conveniant? I. 434. intempestivus earum usus noxius, I. 345. quæ damna pariant in sanguineis? II. 150. & quâ ratione tuto possint exhiberi? III. 73.
- Pilule aethericæ**, III. 48. 250. 493.
- Pilule antispasmodicæ**, III. 56.
- Pilule balsamicæ** ad præservandum utiles, I. 139. non modo intestina, sed confines & partes afficiunt; I. 318. post morbos addibendæ, I. 420. egregii effectus in uteri affectibus, I. 318. puerperis, I. 355. 420. hypochondriaco malo, I. 318.
- Pilule Becheri**, quem usum habeant in mulierum morbis, II. 163. speciatim in puerperis, II. 158. cautè tamen adhibendæ, II. 160. 163. quando in clysteribus usurpandæ. II. 163.
- Pilule**

Pilula certholica in obediencie contumaci, III. 246.
Pilula de cynoglossa laudantur in convulsionibus, III. 28. ad tuſſis ferociam compediendam, III. 113. in hæmorrhagiâ, I. 318. 452. ſed cautè in hæmorrhagiâ uteri uſurpandæ; II. 227. contra hæmoptiſin egregie virtutis, II. 205. ad hydroperem, III. 330.
Pilula laxantes, II. 169.
Pilula laxantes & antipſmodicæ, II. 163.
Pilula laxantes & roborantes, III. 351. ad obſtruſiones viſcerum præſtantis virtutis, III. 315.
Pilula contra obſtruſiones ita diſtæ venales ex quibus parantur? III. 62. in odontalgia egregii uſus, III. 333.
Pilula purgantes in gonorrhœâ, III. 360.
Pilula de ſtyrace commendantur in acedine lymphæ, II. 46. in tuſſis egriæ, I. 317.
Pilula ſubadſtringentes in gonorrhœâ, III. 360.
Pilula Wildegayſi in colicâ parcin gignunt, I. 354.
 PINGUENDO unde & quid? I. 56.
Pinguetines quæ præviores, I. 109. optima antidota, I. 430.
Pinguis affligunt ventriculos acido gravatos, I. 109. non facile in ventriculo ſubjugantur; *ibid.* copioſe hauſta veneni & purgantium vim frangunt, I. 215. acida mixta quæ ſymptomata exciunt? I. 252.
 PIPER in nimium adjuſtum digeſſionem promovet? III. 412. album quatenus proſit nocetve in febrilibus intermittentibus? II. 21. tollit quartanam, II. 30.
Piperæ aque qualia recondant principia? III. 100. commendantur in aſthmate, *ibid.*
 PIRA immittunt alvum adſtringunt, I. 261.
 PIRA alvum adſtringunt, I. 261.
 PISCES dant alimentum humidum, I. 108. febriliorantibus concedendi, *ibid.* morbidis vel mortui corpori pernecium creant, I. 232.
 PISO (Carolus), I. 21.
 PITCARNIUS, I. 17.
 PYRUTA vires veterum quid ſit? III. 79.
Pyritaria tinea, Vide *Tinea*.
 PLACENTÆ noxiæ, I. 109. inſalubres, I. 255.
Placenta uterina, ejus officium, I. 79. ſupplet defectum reſpirationis in embryone, I. 45.
 PLANTÆ in flagris natæ virulentes ſunt naturæ, I. 210.
 PLANTAGINIS radix alvum adſtringit, I. 261.
 PLETHORA ejus generatio, I. 164-176. ejus nomine quid veniat? I. 268. effectus, I. 182. plurimorum morborum cauſa, I. 188. 259-347. non tamen omnium; I. 344-347. morbuſque quæ? I. 268. ſenibus familiaris, I. 455. & gravidis, III. 401. qualis illa verò maxime ſit? III. 180. quæ maxime ad eam faciant? II. 17. nociva eſt, I. 409. gravidarum facit cacochymiam, I. 136. cacochymie eſt fundamentum, I. 271. & eam gignit, I. 320. cordis & vaſorum tonum immittit, *ibid.* in acutis & continuis damnoſa, I. 456. ad vires ex atonia vaſorum, I. 307. quatenus contribuat ad abortum, III. 179. ad apoplexiam & aſthma, III. 95. aurium tinnium, III. 243. ad calculum, II. 272. coma ſomnolentum, III. 211. hæmoptiſin, II. 203. & ſeq. hæmorrhagiam uteri, II. 225. hydroperem, III. 339. menſium ſuppreſſionem, III. 410. phthiſin, III. 287. polypos, III. 281. purpura, III. 401. rheumaticos dolores, II. 334. ſcorbutum, III. 386. ſpſmodicas ex utero paſſiones, III. 63. ſuſſuſionem oculorum, III. 235. ad vertiginem?

III. 226. per hæmorrhagias ſalutariter immittitur, I. 409. ſcrificatioſes abluuntur, I. 462.
Plethorici cur circa æquinoctia maxime tuſſi inſeſtentur? III. 117. quomodo ſe à morbis poſſint præſervare? II. 174. ſibi caveant à frigore, I. 267.
 PLEURITIS unde? I. 166. 262. vera à ſpuria diſtinguenda, I. 294. utriuſque ſigna, *ibid.* non confundenda cum parietibus ex vermicibus, I. 332. deberur ſpſmiſi, I. 302. inprimis pleuræ nervoſæ, I. 303. crifes ſervat, I. 388. gignit empyema, I. 351. facilius concedit in empyema quam peripneumoniâ, *ibid.* arceatur hæmorrhoidibus, I. 343. ab irâ progenita, I. 190. ex conſolidatiſſimis ulceſibus, I. 337. hæmorrhoidum ſuppreſſione, I. 343. quomodo temporeſſe diſcubienda? I. 415. veneſectio cautè in eâ adminiſtranda, I. 351. expectorantia cauſe adhibenda, I. 442.
Pleuritis endemica utinam ſit? II. 138. *epidemia* quo tempore graſſetur? *ibid.*
Pleuritis ſpuria quæ dicatur? II. 137. 142. in quo diſſerat ab hepaticæ ſpuria, II. 144. ejus ſigna, II. 137. ſubjecta, II. 141. cauſæ, II. 137. & quomodo à materiâ podagrica II. 341. & polyppo generetur? III. 279. ejus veneſectione curatur caſus, II. 141. an in ea conveniat veneſectio, II. 137. 141. quæ quandoque utilis? I. 459. topica? II. 141.
Pleuritis vera quid ſit? II. 137. ejus ſigna, *ibid.* ejus purgantis uſu corruptæ cauſæ, II. 141. naturam hæmorrhagiâ ſolux exemplum, *ibid.* & ſeq. quomodo ſit curanda? II. 142. an conveniant topica? II. 139. veneſectio ſemper utilis, I. 459. Vide plura in verb. *Pneumonica febris*.
 PLEURO-PNEUMONIA, ejus in empyema deſinitis exemplum, II. 142.
 PLICA *Polonica* abſciſſa multos morbos inſert, I. 336. ſæpè maris cauſa, III. 263. ſpecificatiſſima, I. 453. quid in eâ conducatur? III. 263. latens quomodo evocanda? II. 134.
 PNEUMONICA febris quæ dicatur? II. 136. quæ pro diverſo quem occupat inflammatioſis loco ſortitur nomina? *ibid.* ejus hiſtoria, II. 137. cauſæ proximæ quonuplices ſint, quales ſint antecedentes; *ibid.* quomodo oriatur ex repulſis exanthematibus, *ibid.* ex ſanguine craſſo, *ibid.* ex ſpſſica abdominis conſtrictione? *ibid.* quæ habet crifes? II. 138. quomodo mors in eâ contingat? *ibid.* cur faciliſſimè recidit, *ibid.* eam curandi indicationes, *ibid.* quæ convenient remedia? II. 139. quod regimen? *ibid.* & ſeq. quis potus? *ibid.* quatenus in eâ conducant anodyna, II. 140. expectorantia, *ibid.* laxantia, II. 139. veneſectio? *ibid.*
 PODAGRA, ejus hiſtoria à Sydenhamo tradita, II. 339. ejus ſymptomata quæ poſt aliquot annos inſeſſant, II. 340. ratio formalis, *ibid.* ſymptomata ſpſmo debentur, *ibid.* & I. 302. & quomodo ille non à ſale acido vel bilioſo, ſed tartaro producatur? II. 341. quomodo hoc ſal geneſetur? *ibid.* cum calculi doloribus ſæpè alternat; II. 299. tranſit in calculum, I. 239. cur nunquam ejus paroxyſmus ſine febre accidat? II. 342. copioſus ſeri impari in hâc proventus debilitat debetur; *ibid.* ob imbecillitatem cum damno retinetur, I. 339. non venit ante pubertatem, I. 183. 185. ob ingentem triſtitiâ ſiſſimâ comitatur ſymptomata, I. 193. quandoque anniverſaria, I. 183. hieme cur gravius affligat quàm æſtate? I. 336. ſenibus ſalutariſ ſæpè, I. 410. uſque familiaris, præcipuè fixa, I. 183. facile recidit, I. 356. hæreditarium plerumque malum, Bbb 4 I. 346

- I. 346. tuncque insanabilis; I. 184. hæreditarie in hypochondriaco exemplum, II. 253. hæreditarie inveterate in corpore plethorico remanentis & Carolinis expulsi & allevate casus II. 354. incipiens quomodo differat à radicatis? II. 339. quomodo gignatur? I. 302. a spasmi, *ibid.* & maxime ligamentorum; I. 303. ejus incubula; I. 163. 179. non semper ab hæmorrhoidum suppressione repetenda; I. 345. quantum ad eam conferant animi adfectus, II. 343. desidia & luxuria, *ibid.* hæmorrhagiarum constricturarum defectio, II. 344. potus vini largior, II. 343. transpiratio prohibita, II. 344. venus immoderata, II. 343. levioris ex ira & refrigeratione factæ gravioris & metastatis exemplum, *ibid.* ut aliquando beneficio sanata; I. 184. exemplum in hæmorrhoidario ex opiatorum usu sanata. II. 353.
- Podagra introversa extialis*, I. 206. venæsectione interceptivâ cum damno reprimatur, I. 339. *retrocedens* à frigore exemplum; II. 351. quomodo necet? I. 395. funesto ordine *retropulsa*, II. 352. *retropulsa* quomodo asthmatibus convulsivi causâ fiat, III. 104. cardialgiæ, II. 259. colicæ, II. 286. comatâ somnolenti, III. 218. dysuriæ & spasmi vesicæ, II. 309. palpitationis cordis, III. 86. singultus, III. 124. & vomitus, III. 142. ejus exemplum ab empyrico *retropulsa* funestâ; II. 350.
- Podagra cura*: non indistinctè curatur lacte, I. 153. scarificationem poscit, I. 461. specifica in eâ, I. 450. & *freq.* præpotenter topicis tractata varia inter mala, I. 337. & *freq.* quamvis mala à perperam tractatâ propulsiunt? I. 359. præservatio quâ ratione legitime sex rerum non naturalium usu fieri debeat? II. 344. & *freq.* & præsertim si naturalis jam dispositio adest, II. 346. a Cætone præscripta, II. 345. an venæsectio repetita eo sine conducatur? II. 350. inveterata cur nullam recipiat sanationem? II. 346. anse paroxysmum quomodo corpus præparandum, ut miserie evadat per usum acidularum, II. 347. Carolinarum, *ibid.* diaphoreticorum, *ibid.* lactis, *ibid.* cucurbitularum cum scarificatione in dorso pedis, & venæsectione, II. 346. & vomitoriorum, *ibid.* imminente paroxysmo cur & quibus alvus ducenda? II. 348. in paroxysmo laudantur diaphoretica, *ibid.* & convenientes potus, *ibid.* quatenus & quibus conducatur decoctum Viennense, II. 349. topica & spirituosa, *ibid.* & venæsectio, & quâ ratione ea administranda? *ibid.* quomodo tumor à solutione morbi relicto tractandus, II. 350. & topi resolvendi? *ibid.* cautela circa lactis curam? II. 349. purgantis, *ibid.* & remedium usum. *ibid.*
- Podagris tumores retrogradi*: I. 187.
- POLLUTIO* nocturna quomodo differat à gonorrhœa? III. 357. unde sæpè oriatur? *ibid.* ab aëre vesicularum feminalium, I. 307. quomodo tractanda? III. 359.
- POTIO* insignem spiritus vini copiam leviter ferunt. I. 137.
- POLYPI*, eorum denominationis ratio, III. 278. qui ita dicantur? III. 85. eorum existentia observationibus anatomicis demonstratur, *ibid.* & 277. differunt invicem; III. 280. eorum indicia, I. 270. signa III. 280. signa initientium & consummatorum, I. 330. index sanguis fibrosus; I. 374. effectus, I. 156. subiecta, III. 280. quibus familiaris? I. 270. 402. quomodo generentur? I. 168. III. 280. cur necare possint? I. 31. frequentissima morborum & mortis causa, I. 29. & *freq.*
- plerumque in pectoris morbis, I. 397. quomodo generantur morbis & morborum causa existant? III. 278. ut plurimum in ventriculo cordis dextro & venis generantur, III. 280. dextrum cur plerumque occupent cordis ventriculum? I. 397. in cerebro intra venas jugulares interdum generantur, III. 279. quæ apoplexiæ & deliriorum causa existant, *ibid.* & II. 242. quâ ratione dis abque incommodo gestari queant? II. 157. III. 280. sunt in regionibus septentrionalibus magis quam calidioribus frequentes; III. 281. quomodo ad eas contribuant acidorum & spirituosorum abusus, III. 282. incutus adstringentium usus, *ibid.* animi adfectus, *ibid.* corporis proceritas, III. 281. potus frigidus I. 234. præcipue corpori calenti ingessus, III. 281. sanguinis copia & inopia, *ibid.* oriantur sæpè ex tristitia, I. 193. ex suppressis menses; I. 341. *cordis* ex nimia sanguinis abundantia, I. 188. inveniantur plerumque in subitâ morte extinctis, I. 270. *arteris* hæmorrhagiis causantur, I. 330. quomodo hæmorrhagiæ ipsius & aboribus causa sint? III. 279. causa hydrops uteri, *ibid.* distinguendi à molibus, *ibid.* quâ ratione disponant ad animi deliquia, III. 271. ad asthma, III. 97. 278. ad causum suffocativum, III. 279. ad hæmoptysin, III. 278. ad hydropsen, III. 279. peripneumoniam & pleuridem, *ibid.* phthisin, III. 278. cur magis præcavescent quam curentur? III. 88. 282. & quibus remediis sit accendi? I. 402. III. 89. 283. præsertim autem quomodo tractandi? III. 89. 284.
- PORRIGO** quid? III. 426. ejus signa & subiecta. *ibid.*
- POTENTIA** generandi in foemineis, quo tempore ordinario circumferantur? I. 78.
- POTIO** *analeptica* temperata, II. 77. III. 407. *anti-febrilis*, II. 15. *carminativa*, III. 344. *Crolii*, quâ encheiresi adhibenda? II. 16. *confortativa*, II. 97. *emetico-lesans*, II. 61. *febrilis*, III. 18. 20. 39. in gutta serena expense virtutis, III. 437. *mannata*; II. 226. *refrigerans*, III. 106. 214. ad somnum conciliandum. II. 72.
- POTUS** multum facit ad sanguinis crassam I. 288. in morbis considerandus *ibid.*
- Potus calidus* cur diarrhoeam sistat? III. 403. cur in paroxysmo febrili nocet? II. 17. nocet in ardentibus, II. 114. quando in purpura profuit nocet? II. 71. quâ ratione ad ejus generâ finitribus? II. 70. quando nocet vel profuit in variolis? II. 54. mutat pulum, I. 368.
- Potus copiosus*, quando in acutis morbis sine ulla assumi queat? II. 65. quomodo proficiunt sunt in retrocedentibus morbillis? *ibid.* alvus laxat, I. 118. ejus noxa, I. 117. III. 33. 72. minus laedit quam ciborum, I. 111. ejus defectus nocet, præsertim foeminis, I. 117. & quare nonnulli graves passiones pariat? I. 469. *parcius* quis ferat noxas? *ibid.* & 288. *liberaliter* commendatus, I. 257. multum facit ad sanguinis crassam, I. 288. in morbis considerandus; *ibid.* *spirituosus* largus nocet, *ibid.*
- Potus frigidus* quo pacto sit roborans? II. 118. quibus in febribus contrahatur? II. 115. sub frigore febrili est denegandus; II. 16. non verò in febrili æstu; I. 471. quandoque salubris, I. 470. a quodsi frigidi salubritas; *ibid.* modus operandi in potu frigidiori, *ibid.* etiam in ardente & biliosâ febree est præstantissimus, I. 471. quomodo operetur in ardentibus? II. 113. quâ cautione in iis porrigendus? II. 115. ejusdem usus in cholericis morbis, I. 472. facilius in spasmi & anxietibus præcor-

præcordiorum, dolore cardialgico, stomachi ardore, & sordis: L. 473. non imperit sed circumspiciat à medicis est applicandus; L. 476. quibus cavendus? L. 134. ejus noxa, III. 119. 120. 281. quando nocentissimus? L. 476. sanitati obest, L. 288. mortem inducere potest, L. 401. quomodo corpori calenti ingessus inflammationes & obstructions producat, III. 281. quâ ratione disponat ad malum hypochondriacum, III. 69. polypus, III. 281. purpuram, III. 399. noxa inde quomodo avertenda? III. 283. vide *Aqua*.
Potus faculentus & frigidus colicæ causâ, L. 277.
Potus glaciatus, quæ producat mala? II. 171.
Potus incongruus qualis? L. 117.
Potentilla veneni naturam inducens, L. 233. valetudini infensa. L. 255.
 Plura vide in ver. *Aqua*, *Aqua frigida*.
 la *POUDRA de succellan* saturninæ fertur esse indolis; L. 228.
 PRACTICI parùm plerumque causas norunt, L. 322.
 PRÆCORDIORUM anxietates periodicæ unde? L. 168. 186.
 PRÆGNANTES dietam peculiarem possulant, L. 136. Vide *Gravide*.
 PRÆSERVATIO in quo potissimum sita sit? L. 30. nobilissima medicinæ pars, L. 291. ex origine morborum discenda. *ibid*.
Præservere à morbis in medici potestate situm magis quam curare. L. 99.
 PRIME VIE, earum constitutio in morbis exploranda. L. 289.
 PRINCIPIA hominis tria sunt conjuncta, L. 88. 95. & seq.
Principium medicinæ quale esse debeat? L. 23. causâ proxima sit sanatus morborum, viæ, & moris, *ibid*. clarum esse debet; *ibid*. in corpore nostro existere debet; *ibid*. non potest esse res spiritalis L. 24. aut sensitiva. *ibid*.
 PROGNOSIS Medica quo pacto acquiratur? L. 149. ex difficillimis, L. 391. multum facit ad finem medici, L. 291. 364. ad finem artis propriè non spectat, L. 391. unde petenda? L. 372. 391. maxime ex observationibus; L. 291. veteribus maxime culta, L. 364. licet empiricè, L. 391. in eâ distinguenda pæhemata, tempora, & corpora, L. 395. ad eam referendus imprimis pulsus; L. 364. ex sanguinis inspectione fallax, L. 372. utilis tamen. L. 370.
 PROLAPSUS ani & uteri balneis reprimuntur. L. 465.
 PROSTATÆ muciæ lymphæ secretorum, L. 72. ulcere quandoque obfidentur, L. 327. scirrhi in his signa & effectus. L. 329.
 PRUDENTIA hominum in quo physicè consistit? II. 131.
 PRUNELLA quid? L. 295. distinguenda ab aliis faucium inflammationibus; *ibid*. in quo differat ab angina? II. 126.
 PRURITUS cutis unde? III. 428. senilis quomodo tractandus? III. 436. à sudoriferis excitatus quomodo compendendus? III. 435.
 PSELLI qui dicuntur? III. 247.
 PUBERTAS, ejus tempore corpora mutantur L. 76.
 PUERI sæpè, sed paucum cibum assument? L. 134. qui ipsis coeant cibi? *ibid*.
 PURMITA quid ratione structuræ peculiare habeat? L. 287. 349. peculiaribus morbis obnoxia, L. 349. quibus morbis pateat? L. 308. qualis in eâ pulsus? L. 368.
 PULPÆ quomodo lædantur à frigore & terrore, II. 164. ab ira & frigore? II. 159. cur facili patiantur exanthematicos morbos, II. 73. intestino-

nam dolores, II. 290. lentas febres, II. 135. melancholiam & maniam, III. 256. tympanitidem, III. 342. cur & quales uteri inflammationes patiuntur? II. 157. III. 447. quales ex febribus deperirent noxas? II. 18. cur illis familiaris sit purpura alba maligna? II. 69. quomodo ab eâ præservandæ? II. 70. 74. nimis hæmorrhagiâ uteri laborantes quomodo tractandæ? III. 276. malum earum regimen quomodo ad abortum disponat, III. 182. qualis igitur his conveniat? II. 74. III. 407. qualis potus? II. 159. quomodo statim à partu tractandæ? II. 158. quando in his conducant diaphoretica, II. 164. venæsectio? II. 158. 164. in his præstat alvum, quam sudorem movere. II. 163.
Puerperium ad morbos disponit & cur? L. 350. in eo utiles purgationes L. 355. mortis in eo signa L. 395. causa sphacelus L. 402.
 PULMONES, eorum fabrica L. 44. cur ferme tota ex canalculis minimis constructa? L. 156. officium, usus, & necessitas, L. 45. III. 284. tubercula unde? L. 168. juvant sanguificationem, L. 50. & ejus sunt officina. III. 284. eorum constitutio in morbis consideranda, & quomodo? L. 289. læduntur, & mirum labefactantur à tussi humida diuturna, L. 351. III. 116. & quomodo his succurratur? II. 47. vomitæ juvenibus familiares, L. 183. à reliquiis variolarum & morbillorum labem patiuntur, L. 354. & seq. cum pleuritæ cur in phthisi concrevant? L. 399. sphacelo correpti quæ habeant signa? L. 324. anomali affecti quæ gignant mala? L. 307. labe affecti quibus sanandi? L. 446. ipsorum vas rupta cur difficulter coalescant? II. 204. eorum substantiæ corruptionis singulare exemplum, III. 296. quandoque inflammantur, Vide *Pneumonia*.
Pulmonum ulcera cur difficulter sanentur? III. 285.
 PULSUS quid sit? L. 42. 364. quid indicet? *ibid*. ejus usum veteres ignorarunt, L. 364. Hippocrates parum exposuit; *ibid*. Galenus raris multis ejus finxit species; *ibid*. exploratio utilis, L. 42. in utraque manu explorandus, L. 43. mechanice examinandus, L. 364. experientia addidendum, L. 371. aliquandiu in utroque carpo tangendus, *ibid*. ejus celeritatem mensuranda homologio, L. 42. & 371. quot in minuto? L. 368. non semper unus in utroque brachio, L. 366. quid ex eo cognoscendum? L. 389. facit ad diagnosin & prognosin, L. 364. cautum ex eo judicium, L. 369. ejus causâ motus cordis, L. 366. ejus differentie, L. 42. quatuor tantum species, L. 365. cum multa variant, L. 42. & seq. L. 368. variat pro tempore febris, L. 371. & in capitis morbis, *ibid*. in catarrhis vesperis ingravescit, *ibid*. spasmo remittente mollescit; *ibid*. qualis in ardente sit II. 114. in cataplexi, III. 46. post coitum, III. 33. in epilepsiâ, III. 11. sub & post febrium paroxysmum, L. 11. in hysterici plethorici, III. 64. à polypo cordis, III. 84. in syncope & lipothymia, III. 269. post tussis vehementiam? II. 116.
Pulsus varie species, *aqualis* non pertinet ad essentiam pulsuum, L. 365. *amplus* non differt à magno, *ibid*. *angustus* idem ac parvus, *ibid*. *capriæus* inæqualis species, L. 366. *celer* quid? L. 365. respectu cordis, L. 367. & frequens separatum percipi nequit, L. 366. sine errore unus pro altero ponitur, *ibid*. febribus junctur, L. 370. ac durus in morbis spasmodicis ac doloribus, L. 371. *parvus* ac durus lingua si exitum molitur, *ibid*. *conclusus* idem cum parvo, L. 365. *copraclus*

contractus & parvus idem; *ibid.* convulsus dicitur respectu arterie, I. 366. & morientium est; *ibid.* debilis quid? I. 365. ratione cordis, I. 367. in lue venerea, scorbutus, hydropes, I. 371. dicitur inaequalis species, I. 366. *durus* & mollis dicitur respectu arterie, *ibid.* & frequens in febribus, I. 370. inflammationibus & doloribus, I. 371. plerumque in apoplexiā & epilepsiā; *ibid.* *fermeus* inaequalis species, I. 366. *fortis* idem ac magnus, I. 365. *frequens* non est de essentia pulsum, *ibid.* febrium pathognomonicon signum, I. 370. non tamen semper, *ibid.* ante eruptionem exanthematicum, I. 371. & sub febre secundaria. *ibid.* *parvus*, *debilis*, & *contractus* in maligna & petechialibus, *ibid.* *languidus* & *inaequalis* in pectoris morbis. *ibid.* *humilis* idem cum parvo, I. 365. *impetuosus* & magnus unus, *ibid.* *inaequalis* non de essentia pulsum, *ib.* variae ejus species, *ibid.* *intermittens* quando & cur sit? I. 367. jungitur plerumque convulsivo, I. 366. sine exitio quandoque observatur, I. 369. a lumbico; *ibid.* *latus* idem ac parvus, I. 365. *magnus* quid? *ibid.* respectu cordis, I. 367. & *celer* in fynochia, I. 371. & *creber* in haemorrhagiis, *ibid.* *manifestus* idem ac magnus, I. 365. *myurus* inaequalis species, *ibid.* *obscurus* & parvus idem. *ibid.* *parvus* quid? *ibid.* respectu cordis, I. 367. & *celer* in continuis malis, I. 371. & *frequens* in dysenteria, *ibid.* *frequens* & *debilis* in continuis pessimis, *ibid.* *durus*, & *frequens* & *inaequalis* in principio quantae, *ibid.* *profundus* non differt a parvo, I. 365. *rarus* non de essentia pulsum, *ibid.* & *mollis* in lethargo & sopore, I. 371. *robustus* idem ac magnus, I. 365. *serratus* inaequalis species, I. 366. *tardus* quid? I. 365. respectu cordis; I. 367. *crenulus* inaequalis species; I. 366. *vacuus* idem cum parvo, I. 365. *valens* & *magnus* unus; *ibid.* *vehemens* quid? *ibid.* ratione cordis, I. 367. in statu tertianae & ardentis, I. 371. *vermicularis* inaequalis species, I. 366.

PULVIS moribundis subtrahitur, quid efficit? I. 48.

PULVIS antispasmodicus, III. 105. antiepilepticus, III. 15. Dolai quomodo paratur? III. 14. antihelminticus, III. 495. antidyentericus Klapperbeinii quomodo paratur? III. 30. antifebrilis, II. 37. 40. antimephriticus, II. 141. antispasmodicus, III. 70. & *seq.* 266. *aperitiva*, III. 354. *cornuacina* quomodo in quantā adhibendus? II. 31. *diaphoreticus*, II. 52. III. 72. *emeticus*, II. 15. *Harris* contra rabiem quomodo praeparatur? III. 261. *Pleurii* adstringens ex quibus conficitur? II. 227. quando in haemorrhagiā uteri exhibendus? *ibid.* in haemoptysi expectat virtutis. II. 205. *laxans* II. 15. ad pneumoniacas febres, II. 139. *polychresus* ad febres petechiales, II. 77. *precipitans nitrosus*, III. 292. *pyrrus* ad pestilentiam commendatur, II. 98. *refolvens* in quantā; II. 26. *robustus* in gonorrhoea, III. 359. *stipicus* in haemorrhagiā sistendā ad amputatione sphacelatae partis orta, III. 391. *stomachicus*, II. 260. & *seq.* *sudoriferus* in lue venerea, III. 417. & *seq.*

PURGANTIA singula propria habent virtutem, I. 215. retropellendi facultate pollent, *ibid.* quanam sint selecta? III. 258. veterum quanam sint? III. 259. eorum ab ipsis variis exhibendi modus, *ibid.* & quā ratione fuerint innocua? *ibid.* semper reformadata a sanioribus medicis, I. 216. & nisi difficilioribus morbis magnā cum

cautione adhibita, *ibid.* quae in lue venerea conferant? III. 418. quo calu quantanum fugeant? II. 30. nocent post iram, I. 190. 313. 425. & sub menstruo fluxu II. 37. in dentitionis difficultate, I. 314. 421. 435. in morbis exanthematicis, I. 315. in catarrhis, I. 340. in febribus, I. 415. febribus, I. 135. 421. 435. sanguinis circum per vasa abdominis turbant, I. 345. gignunt icterum, I. 314. alvum cur postea adstringant? I. 385. recidivas praerant, I. 356. locum non habent in affectibus periodicis, I. 187. tempore paroxysmi intermittens non danda; I. 418. clysteribus non indenda, I. 468. quando necant quae habeant signa? I. 393. vide *Excrementa alvi*. quid de illis ob humorum retrocessionem notandum? I. 361. in fluore albo & gonorrhoea usurpanda I. 416. balneis utiliter focienda I. 464. improvide summa quid cauterent I. 168. quae mala gignant I. 214. quae concitent symptomata III. 62. & quomodo hac mitiganda. *ibid.*

Purgantia drastica virulento elemento imbuta I. 435. venenis causticis annumerantur I. 214. venem armula facultate pollent, I. 435. necitissima. *ibid.* quomodo agant I. 435. pulsum mutant I. 369. ubi proficua I. 436. robustioribus danda *ibid.* postponenda laxantibus I. 416. intestinorum consensum testantur I. 316. importunius data quae mala gignant? I. 214. moriem infensur I. 215. inducunt cholera, III. 167. levem intestinorum inflammationem, & quotidianam febrem, II. 37. nocent in catarrhali benignā, II. 46. colicā biliosā, II. 297. dysenteria, III. 157. ad excrementa dura educenda, II. 283. in ichthore, III. 305. illacā passione, II. 279. ad ichthoremovenda, III. 62. malo hypochondriaco, III. 73. melancholici, III. 259. palpitatione cordis, III. 90. podagrico dolore, II. 349. purpurā, III. 408. 434. in rheumaticis & anthracis doloribus, II. 323. in scabie infantes & pueros infestante, III. 434. in semiternā, II. 42. tertianā, II. 16. ipsam vesicā; II. 312. quomodo abortum promoveant? III. 179. quā ratione animi deliquia inducant, III. 271. convulsiones, III. 27. diarrhoeam chronicam cruentam, III. 175. illacā passionem, II. 276. mictum cruentum, II. 234. singulum, III. 124. spasma, III. 57. tormina in infantibus, III. 478. vomitus? III. 142. quomodo erysipelaceam materiam retropellant? III. 27. scabiem? III. 30. 438. num ad febres exanthematicas praeservandas conducant? II. 92. & quid de his in ophthalmiis censendum? II. 167.

Purgantia fortiora quanam? I. 214. fugienda, I. 138. laedunt gravidas, I. 137. validiora infantibus nocent, I. 133. alvinam excretionem turbant, I. 216. atque hinc tenellus & luctuens infans graviter laedunt, I. 217. maxime vero nocent ubi ventriculi inflammatio imminet, *ibid.* & ubi dolores sunt sanguinique dissolutiones metuenda, I. 218. vel vires jam sunt fractae, *ibid.* quomodo cicuranda? III. 127. eorum vis quo pacto destruat. I. 214. quando in hydropse locum habeant III. 330. 332. quandoque minus, III. 337.

Purgantia lenientia, I. 216. quae sint? I. 434.

Purgatio vernalis non est repudianda, I. 139. naturae opus juvat, I. 413. necessaria post morbos, I. 354. puerperia prodest, I. 355. necessaria in febribus, *ibid.* & ante balnearum usum, I. 465. neglecta purpure causa in puerperia, I. 355. nec non in acuta. *ibid.*

Purgatio mensis quibus offendantur? I. 136. Vide *Menses*

Menses & Menstrua purgatio.

PURPURA distinguenda ab aliis exanthematibus, & in quo ab his differat? I. 293. II. 68. ejus subiecta, II. 69. III. 232. quæ in eâ mala & funesta sint signa? III. 70. III. 298. causæ procatartice, II. 69. quomodo in eâ mora generetur? II. 70. cur certis temporibus sit frequentior? II. 69. utraque cur nostris temporibus frequentatissima I. 358. puerperis cur familiaris? I. 355. in quibus casibus & subiectis sit periculosa? II. 70. cur eam epilepsia sequatur aut antecedit? III. 12. an eâ accedente petechiæ bene ordine disparent? II. 90. quomodo morbillis & variolis superveniat? II. 65. III. 397. sudor in eâ largus unde? I. 352. crises non servat? I. 389. quo ordine continuis declinantibus superveniat? II. 116. III. 398. salutaris irâ exchata; I. 190. quomodo ex nensivis retentis oritur? II. 72. & ex quartana generetur? II. 25. ex cohibito fluore albo, I. 340. suppressis lochiis; I. 342. acutis ob purgationem neglectam accedit, I. 355. lethali eventu; I. 393. in principio adnatum emetica vel laxantia, I. 415. exempla ejus à febre malè curatâ ortæ, III. 411. post usum Carolinarum enatæ, III. 412. cum semitertianâ complicatæ, II. 43. post erysipelas ex vitio primarum viarum ortæ, II. 73. post alvi laxationem feliciter curatæ, *ibid.* delirium Carolinis curatum relinquentis, II. 72. cur non ferat cerevisiam? II. 71. quomodo sit curanda? *ibid.* præsertim si febribus epidemicis accedat? II. 70. quâ ratione in eâ alvus sit tractanda? II. 71. quomodo viribus succedendum? *ibid.* quale conveniat regimen? *ibid.* qualis potus? *ibid.* in eâ nocent tam calidiora quam refrigerantia? *ibid.* quatenus conveniat venesectio *ibid.* & ejus eruptionem juvet? II. 73. quantum profint vesicatoria? II. 71.

Purpura acuta quæ dicitur? II. 74. quæ sit ejus materialis causa? *ibid.*

Purpura alba qualis dicitur? II. 68. synochis accedens quid indicet? II. 207. ejus causa materialis est acidum lymphæ coagulans; II. 69. III. 399. cur puerperis sit familiaris? *ibid.* & cur ut plurimum in ipsâ maligna? III. 399. peculiaris ejus symptomatica eruptionem antecedentia, II. 83. ejus idiopathica sanata exemplum, II. 72. alba vel rubra in mortis acutis unde? I. 164.

Purpura benigna quæ dicitur? III. 397. ejus historia & progressus. *ibid.*

Purpura chronica, scorbuti soboles, qualis dicitur? II. 74. III. 397. signa, III. 397. quâ ratione chronica fiat? III. 398. differt ab aliis exanthematibus, III. 397. & inter se, *ibid.* prognos, III. 405. cur detrahit ante aliquot lustres prodierit? III. 402. causa materialis est serum salino-sulphureum acre, III. 399. quod effectû remedium probatur? III. 400. cur in hac major salina acrimonia, quam in alba? *ibid.* cur tam facile ac citò revertatur? *ibid.* subiecta, *ibid.* sunt semine magis quam viri, III. 401. & ex his sensibiles & delinantes, *ibid.* inspectione divites, *ibid.* fluore alio laborantes, III. 402. gravidæ, III. 401. puerperæ, si lochia haud rite fluunt, *ibid.* causæ occasionales, III. 403. & seq. ut loco scorbuti veniat à diæta est derivanda, III. 404. ipsius exempla ex morbidâ diæta ortæ, III. 411. in foemina senæ, III. 412. post nimium hæmorrhoidum fluxum lethalis, III. 409. inediâ & aquis mineralibus sanata, III. 410. scorbutum post usum coffeæ exci-

piens, III. 404. accedente albi lethalis; III. 413. qualis præservacionis causâ conveniat potus? III. 405. victus genus, *ibid.* ubi etiam aquæ medicatæ, cura lactis, & motus corporis conveniunt, *ibid.* quomodo gravitas præservandæ, III. 406. quæ ante & post partum in eundem finem conducant? *ibid.* imminenti morbo quibus obviam eundem? III. 407. & quomodo præsertim, *ibid.* lochiis in hac subsistentibus an venesectio conducatur? *ibid.* curatio requirit leniora & temperatum regimen, III. 406. fugam febris, III. 407. nimii calidi loci, III. 408. alexipharmacorum & validiorum medicamentorum, *ibid.* interpestivæ sanguinis missionis; *ibidem.* quomodo liberaliores & suppressæ alvi excretiones vel moderandæ, vel revocandæ, *ibidem.* quantum profint vesicatoria? III. 409.

Purpura idiopathica, ejus historia, II. 68. morus est periculosa quam symptomatica, II. 73. an in eâ conferant laxantia? *ibid.*

Purpura maligne quæ sit? III. 397. ejus indoles & decursus, III. 398. & quid inducit, si modo dispareat, modo appareat? *ibid.* puerperarum venesectio curata, II. 73. Vid. *Miliaris febris.*

Purpura retrocedens quæ inducat mala? II. 297. quomodo delirium, II. 72. guttam serenam, III. 232. palpitationem cordis, III. 86. phthisin? III. 287. *retrogradæ*, I. 187. cur adeo periculosa? I. 166. per ipsam cum damno recedat, I. 302. utraque quare nostris temporibus frequentatissima? I. 358.

Purpura rubra quæ dicitur? II. 63. ejus subiecta, II. 69. causa materialis est serum acre salino-sulphureum; *ibid.* sæpè sit chronica, III. 398. & cur in puerperis non tam maligna? III. 399. in morbis acutis unde? I. 164.

Purpura scorbutica efflorescens solvis hypochondiacum malum. I. 410.

Purpura symptomatica quibus morbis & subiectis accidat? II. 68. III. 398. ejus in ictero & hydrope calius, III. 411.

Purpura vesicularis alba quæ dicitur? II. 69.

Purpura febris quæ dicitur? II. 68. ejus in puerperâ fuisse exemplum. II. 72.

Pus post inflammationem ex sanguine quandoque generatur, I. 325. effusi in thoracem signa. *ibid.*

PUSTULÆ cutis unde? III. 428. earum generatio, I. 174. ex potione frigida, I. 234. cur autumno & vere frequentes? III. 441. haud repente reprimendæ; I. 263. quibus externis debeant tractari? III. 436. scorbuticarum pruriginosorum exemplum, III. 437. ipsarum curatio, III. 438. venereæ quomodo tractandæ? III. 421.

PURGATIO in quo consistat? I. 28. unde proveniat? I. 160. præsertim mortifera, I. 163. gradu differt, I. 323. quæ in corpore humano producat symptoma? III. 444. causa mortis, I. 34. malignitatis, I. 323. non est ratio formalis mortis, I. 159. corpori tamen humano maxime adversa, I. 178. 206. extinguendum circulum sanguinis sequitur; I. 34. viribus infensa, I. 323. vires motrices destruit, I. 34. viscera interna, I. 161. quomodo accenda III. 330. 451. speciatim post paracentesim III. 329. & seq.

PYLORUS, ejus situs, II. 258. scirrhus quandoque afficitur, I. 329. post isam sæpè colligitur, III. 347. ejus constitucionis signa, *ibid.* est causa cardiacæ, II. 257. colicæ flauulentæ, III. 347. vomitus, III. 143. ejus visio post mortem detecta; III. 129.

PSYMON-

PYROMONTANÆ aqua, qualis sit earum principia constitutiva? III. 315. earum virtutes, *ibidem*. quale requirit eorum usus vitæ regimen? II. 222. & quæ ante earum usum tenenda? II. 272. commendantur in cachectiâ & chlorosi, III. 315. calculo felleo, II. 272. hypochondriaco malo, III. 71. ictero, III. 305. rheumatismo scorbutico, II. 322. scorbuto & quando? III. 378. ad vermes pellendos, III. 491. in ulceribus, III. 449. nocent maxime in hæmoptili. II. 206.

Q.

QUARTANA qualis dicatur? II. 23. ejus historia, *ibid.* est vel simplex vel duplex, I. 24. legitima vel notha; *ibid.* symptoma in cachectia, *ibid.* hypochondriaci, *ibid.* infantibus, *ibid.* juvenibus, *ibid.* senibus infirmis, *ibid.* qui graviter & cum periculo ex eâ laborant? II. 31. eâ laborantes cur tam voraces? I. 248. febri ejus differentie & signa, I. 294. familiaris primæ senectæ I. 183. & Wellphalis I. 185. in principio qualis pulsus? I. 371. ejus subjecta, II. 24. causa proxima & materialis, II. 23. procacitæ, II. 24. 32. eandem cum dysenteria causam habere potest, II. 30. quid in eâ pleoriæ appetitus prostratio denotet? II. 31. quomodo & adversus quos morbos sit remedium? II. 25. convulsiones & epilepsias quandoque solvit, I. 410. quomodo ad purpuræ genitum contribuat? II. 25. quomodo gignat hydropem? I. 371. quibus modis solvatur? II. 25. præsertim in gravidis ac infantibus? *ibid.* itæ beneficio sanata, I. 190. balneis levatur, I. 463. perperam tractatur adstringentibus, I. 352. ex icæbie retro pulsa, I. 337. quomodo in eâ mors contingat? II. 25. & 31. quando exitum inferat? II. 25. in diuturna pancreas induratum I. 329. contumax cur æstus minuitur, vel potius expiret? I. 265. quæ de quo casu sit contumacissima? II. 25. & 27. cur circa vernale solstitium sponte cedat? II. 25. & vere facili oegotio sanetur? *ibid.* quos male tractata post se morbos reliquat? *ibid.* quâ occasione recidit? *ibid.* cur in plebæis frequenter recidit? II. 30. exempli ejus in gravidâ curatæ, II. 28. in sine sanæ, II. 31. in cachectico in fœtum hydropem terminatæ, II. 29. ex tertianâ cum salivatione junctæ, *ibid.* cortice chinæ eruptæ & sanatæ, *ibid.* purgatione sanatæ, II. 30. in quotidianam sæpe redeuntem mutatæ, *ibid.* primo simplicis, post duplicis cum tumore pedum sanatæ, II. 31. & seq. sæpius recidivans & pipere albo curatæ, II. 30. sæpius tumore pedum sanatur, II. 29. quo casu curatu sit facilis? II. 27. quo anni tempore facile curetur? *ibid.* pro diversitate corporum diversimodè possit medelam, *ibid.* quæ in ejus curatione occurrant indicationes? II. 26. eam curandi recta methodus, II. 32. & seq. quomodo in eâ tractandi cachectici, II. 29. pueri, II. 31. quomodo in eâ cruditates evacuantur? II. 26. præsertim si sit inveterata, *ibid.* quibus modis stricte generis nervosi demulcendæ? *ibid.* partes debiles roborandæ, *ibid.* perspiratio ante & post paroxysmum juvenis? II. 27. alvus laxanda? II. 28. laxantia & emetica in principio fert I. 415. cephalalgia levanda? II. 28. duo specifica adversus eam commendantur, I. 450. II. 26. quæ conferat potus? II. 27. quomodo adhibendus io eâ cortex chinæ? II. 28. quantum conducant amara, II. 26. emetica, II. 27. epicardia, II. 28. venæsectio, II. 27.

quomodo præcavendæ recidivæ, II. 30. & seq. tam diutâ, II. 28. quàm pharmacis? *ibid.* **QUARTANA anomala** quid indicet? II. 25. continua qualis dicatur? II. 24. duplex qualis dicatur? *ibid.* quomodo nascatur? II. 32. ejus ex simplici natæ exemplum; *ibid.* endemia quo locorum occurrit? II. 24. epidemia quo tempore grassetur? *ibid.* triplex in quo differat à quotidianâ? II. 33.

QUARTANARI cur facili salivationem patiantur? II. 29. quomodo sanguis in his sit constitutus? II. 27.

QUINQUEFOLI radix ælrum adstringit. I. 261. **QUOTIDIANA** quæ dicatur? II. 33. est vel exquisita, vel vaga, II. 34. vel legitima vel notha, II. 33. in quo differat à catarrhali benignâ & malignâ, *ibid.* leotâ, *ibid.* quartana triplici, *ibid.* tertianâ duplici? *ibid.* ejus historia, *ibid.* subjecta, II. 34. sedes, *ibid.* causa proxima, II. 33. materialis, *ibid.* antecedentes, II. 34. cur ejus paroxysmi quotidie redeant? II. 34. quomodo oriatur ex tertianâ, II. 37. ex vitio vicium abdominis, II. 33. quæ excretiones in eis sint boni ominis? II. 34. sæpe epilepsiam solvit, III. 13. quâ ratione transeat in lenam & continuam? II. 34. quibus causis in diuturnas sustineatur? *ibid.* & 38. exempla ejus rebella & Carolinis expugnata, II. 36. cum spismo cardinalio junctæ curatæ, *ibid.* ex tertianâ ortæ & sanatæ, II. 37. recidivans emeticis curatæ, II. 36. anomala post hypercathartin, II. 37. exquisita diuturnæ, II. 38. cum comandi indicationes, II. 34. quâ ratione pravi succi in eâ corrigendi, *ibid.* & evacuandi? *ibid.* & seq. quomodo robur visceribus restaurandum? II. 35. quæ sit cura specialis, *ibid.* præsertim si diuturna fuerit, II. 38. an ex levi inflammatione inflammatio fovetur? *ibid.* quæ sub eâ fugienda? II. 35. non cogendus sudor, sed alvi fluxus procurandus, *ibid.* quid sciendum, si frigus sit nimis acris? *ibid.* quando prosint aquæ minerales, *ibid.* emetica, *ibid.* sicculi ventriculo admovendi? *ibid.* specifica antiseptica, *ibid.* venæsectio? *ibid.*

QUOTIDIANA continua qualis sit, II. 33. cominus serosa, quæ dicatur veteribus? II. 75. epidemia quo tempore grassetur? II. 33. intermittens, ejus signa, I. 254. differat à continuâ & tertianâ duplici, *ibid.*

R.

RACHITIS quæ dicatur? III. 488. ejus historia, *ibid.* eâ desuntorum anatome, *ibid.* causa proxima, *ibid.* mediata causa, III. 489. remota, *ibid.* ratio symptomatum; *ibid.* prognos; *ibid.* ad curationem faciunt balnea, I. 464. III. 489. diæta, *ibid.* leniora emetica & laxantia, *ibid.* frictions, *ibid.* resolutiva, *ibid.* & thoraces *ibid.* **RAMAZZINUS**, I. 17. **RAMONEUR MONCKII** quid sit? II. 162. **RAPHANUS rufficanus** quale recondit principium? III. 78. nocet in cardialgiâ, II. 262. laudatur in scorbuto. III. 378.

RATIO

RATIO quid in Medicina denotet? I. 15.
RATIONALIUM fœta vetus, I. 16. quid eorum conatibus obstruit? *ibid.*
RAUCENDO in tussu quomodo tollenda? III. 115. senum unde dependet? I. 242. veneræ follæ mercuriali inunctione plantarum pedum curatæ exemplum. III. 425.
RAYMUNDUS LULLUS; I. 21.
RECENTIORES ubi præferendi veteribus? I. 22.
RECIDIVA, eorum indicia, I. 355. quomodo excludantur? I. 289. per spasmos inducantur, I. 302. unde? I. 355. ex suppletis cricis evacuationibus, I. 289. 389. palliatiâ curâ, I. 289. ægri incuri, *ibid.* reliquis morborum, I. 354. intermittentium cur tam frequentes? I. 355. quomodo arcenda? I. 356. 420.
Recidivantes morbi, I. 182. quo pado discantur à periodicis? I. 186. cur eadem partes rursus affligant? I. 169.
REFRIGERANTIA quibus in febris profus nocentive? II. 117. laudantur in micu cruento, II. 205. in synochâ, II. 106. quando nocent in nimio hæmorrhoidum fluxu? II. 221.
REGIUS CÆSARIUS, I. 17.
REGULÆ prognosticæ de morbis observandis insignes. I. 362.
RELIXIÆ MORBORUM novos patiunt morbos, I. 354. tempellivè summovende, *ibid.*
REMEDIA in classes distinguenda, I. 427. quatuor summa genera, *ibid.* circa materiam, vel motum occupantur, *ibid.* in fluida vel solida agunt, *ibid.* principia eorum paucis cognita, I. 425. per chymum recluduntur; *ibid.* eorum operandi ratio fieri necessaria, I. 286. plures latet, I. 425. & *freq.* vires eorum non sunt absolute, I. 290. 424. sed occasionales tantum & relative, I. 153. eorum effectus à priori indagandos, I. 425. non tamen semper cognoscitur, *ibid.* quomodo cognoscendos? I. 289. & *freq.* quodnam effectus hereticum dicendum? I. 476. operatio eorum observanda, I. 289. ex causis proximis & experientia petenda, I. 426. actio in corpus physicum & vivum gratis distinguatur, I. 425. in nervos partes maximè ac proximè agunt, I. 308. non semper morbos sanant, I. 290. sub initium & finem morbi propinanda; I. 414. eorum multitudo singulorum cognitioni obest; I. 421. Vide *Medicamenta*.
Remedia diœterica præferenda pharmaceuticis, I. 422. fortis debilibus exitiosa, I. 344. in vigore morbi non offenda; I. 414. à liberaliori eorum usu cavendum. I. 417.
REMITTENTES morbi non confundendi cum periodicis. I. 186.
RENES, eorum structura & usus, I. 70. confectiunc cum ventriculo; I. 315. 353. tono suo infirmitati sunt, I. 70. eorum atonia quid efficiat? *ibid.* atonia affecti quæ pariant mala? I. 307. *abfcessibus* parent, I. 326. *debrilitati* gignunt calculum I. 353. inflammationes, ulcerationes, *ibid.* signa puris in iis, I. 326. *labefactati* quibus firmantur? I. 446. an spasmus sint obnoxii? II. 147. *finister* cur magis nephridi obnoxius quam dexter? II. 148. 298. *exulcerati* quomodo tractandi? I. 430. quomodo ichurie lethalis causâ, II. 317. quomodo iis succurrendum? II. 235.
RES non naturales sanitatem dispendunt. I. 100. & *freq.*
RESPIRATIO quid sit? I. 44. III. 95. ad vitam est necessaria, III. 95. sanguini calorem affert, I. 46. promovet chylî progressum, I. 66. ejus usus secundari; I. 47. in recessu ratiâ cuius usus sit? *Frid. Hoffmanni Oper. Tom. III.*

III. 473. cum roncho & stertore in apoplexiâ unde? II. 241. quid densat? II. 243. naturalis in catalepsi unde? III. 46. *anterior* augeat ciculum sanguinis, *ibid.* impediât pravi effectus, I. 46. *difficilis* ejus oris, I. 168. ex stagnante sanguine lochialis, I. 342. à fluitibus incarcerationis, III. 66. à polypto, III. 250. *anxia* à spasmo nervorum pneumonico, I. 392. in acutis mala, *ibid.* ejus *oppressio* unde? I. 166. cum metu suffocationis quæ in phasi præbet signum? III. 288. *suspensiva* cum subito in epilepsiâ unde? III. 11.
RHABARBARUM quodnam sit optimum? III. 351. ejus virtutes, quas exferit in corpore? *ibid.* & 73. coctum vin purgativum perdit, I. 214. duplo plus in substantiâ, quam in infuso operatur, II. 322. ejus variâ adhibendi modi, III. 351. specificum est in hepati vitiis, III. 405. laudatur post mûlum apoplethicum, III. 244. in nimio hæmorrhoidum fluxu, II. 220. in narium hæmorrhagiâ, II. 199. in ictero, III. 305. in malo hypochondriaco, III. 70. in rheumaticis & arthriticis doloribus, II. 322. in vomitu cruento arcendo, II. 215. in vomitu bilioso, III. 145. cum *abstergebendis* in dysenteria, III. 156. cur tuissimum lactans in ea? I. 422. cum *terebinthinâ* ventrâ in pilulis egregie calculosos solvat, II. 307. *rasum* in diarrhœâ laudatur, III. 169. ejus *essentia* cum liquore terræ foliatæ tartari in hydropi prodest, III. 330. ejus *extractum* cum aliis anthelminticis ruptum in vermium eliminatione laudatur. III. 28.
Rhabarbarum in principio pestis commendatur. I. 204.
RHEUMATISMI recedendorum qui dicantur? II. 317. differunt ab arthritide, *ibid.* & I. 298. ratione causarum, II. 318. gradus & indolis, *ibid.* dividuntur in cacosymphicos, florbuicos, fixos & vagos *ibid.* unde oriuntur? I. 164. 165. 174. 175. 274. quomodo gignantur? I. 302. eorum causâ, I. 298. causâ proximâ, II. 317. materialis, II. 318. subjectâ, II. 319. procius, *ibid.* signa, I. 298. prognosia, II. 320. hæreditarius morbus, I. 349. cur dextrum lacus frequentius occupet, quam finistrum? II. 325. cur maximè generentur tempore verno? I. 266. cur verno & autumnali tempore maximè affligant? II. 319. gignantur à spasmo nervosorum membranarum, I. 303. quandoque venæsectione; I. 298. facile in arthritidem veram abeunt. *ibid.*
Rheumatismi aurium ex coryza per frigus suppressi II. 325. *capitis* ex admisso frigore venæsectione curati, II. 326. & calculo ducto, II. 299. in foemina plethorica cadus, II. 324. *chronici* superiora maximè cum febre adligentis casus, II. 327. ab excretionibus sanguineis ori, II. 326. ex hæmorrhoidibus supplevis Tæpicensibus & Carolinis curati, *ibid.* *pectoris* ab hæmorrhoidibus supplevis, II. 328. ex itâ & superingello spiritu volatili cornu cervi exemplum, II. 329. *ejus icthii*, *fæti* & *corycæ* iteratâ venæsectione curati, II. 325. *renum* & ureterum casus, III. 306. *sanguines* in Galliâ frequentes, II. 321. *scapularum* calidiori pharmaco exacerbati ab ac caput delati exemplum, II. 328. ex fero impuro copioso tunc internas quam externas partes affligentis exemplum, II. 329. *forbatus* qui dicantur? II. 328. & quomodo tractandi? II. 322. *venerei* unde? II. 320. & quomodo tractandi? II. 322.
Rheumatismorum curatio quomodo instituenda? II. 321. per diaphoretica & diaphora, *ibid.* per

beat in lue veneret? III. 418. non semper ad curam lue veneret necessaria. I. 443. quando locum habeat in gustu serenâ? III. 230. & quibus influentia? III. 231. in tumore testiculorum veneretorum, III. 426. cur scorbuticus nimis conferat? III. 419. nec hysterici & macilentis? *ibid.* & quid ejus loco substituendum? *ibid.* perperam instituta siquâ hydrops causa & quomodo tollenda? III. 333.

SALTATIO vehementior motus. I. 122.

SAMBUCI cortex medius specificum in ictero. I. 451.

SANCTORIUS, I. 22. 68.

SANGUIS, ejus definitio, I. 36. prima elementa, I. 156. est thesaurus vitæ, I. 34. præcipuus corporis humor, I. 377. aquâ specie gravior, I. 37. & 374. proportio solidi & fluidi in eo, I. 367. ab acidis coagulatur, I. 374. ab alcalinis & nitro funditur magis & rubricat. *ib.* est mixtus liquor, I. 36. gelatina purpurea, I. 37. ejus triplex substantia, I. 269. ejus partes constitutivæ III. 388. habet innatas partes solidas, I. 37. harum mutua proportio, *ibid.* partes sulphureas, *ibid.* idem an semper in corpore sit? I. 39. boni copiam præstat robur, I. 33. qualis optimus? I. 39. ei inest terreste; I. 38. terrestritas cum sulphureâ parte indolem acquirit absterisimam; *ibid.* quomodo exarantandus? I. 374. qui bonus nondum evictum, I. 372. ex eo prognosis surrenda, I. 373. quæ tamen fallax, I. 372. inspectio sola an medicum de hominis statu laus edoceat? I. 39. naturâ illius & quâ ratione efficiatur atque circumagatur? I. 469. differentia est quoad individuum, I. 37. differentia medicus perspicere debet, I. 38. differt ratione temperamentorum; I. 368. qualis plethoricorum, I. 320. cholicorum, I. 368. hysteriarum, I. 320. scorbuticorum? I. 373. malus aspectu siquâ in tanis; I. 372. & bonus in ægris. *ibid.* non solum qualitate sed etiam quantitate peccat, I. 340. Vide *Plerora*. ejus productio non aque copiosa in omnibus corporibus I. 51. quantitas diversa, I. 38. & *seq.* iusta quænam? I. 101. microscopio conspectus, I. 39. cur ex eo rot icipuerunt humores? I. 381. continuo eget supplemento, I. 47. ejus pars subtilior motum subit cordi & arteriis, I. 33. portio diaphana nutrit, I. 56. ejus resolutio chymica; I. 37. cum quæ alterant in animum jus habent, I. 96. cur citò putrefcat? I. 38. vilipenditur, quia res est obvia, I. 34. unde suppletur? I. 102. in febribus consumitur, I. 319. venæsectione & scarificatione elicitur, I. 374. ejus missiones fugiendæ in affectibus retrogradis, I. 187. qualis in nimio hæmorrhoidum fluxu excernatur? II. 219. in mictu cruento, II. 213. morbo nigro Hippocratis, II. 217. & vomitu cruento, II. 214. qualis sit cachecticorum, III. 19. 318. arthriticorum, II. 318. cutis affectibus laborantium, III. 429. delirantium, III. 255. hydropicorum, III. 325. ictericorum, III. 301. ex petechizante febre mortuorum, II. 77. quartanariorum, II. 27. scorbuticorum, III. 372. senum, II. 217. variolis malignis pretemporibus? II. 51. quæ ejus sit bona consistentia in petechiali febre? II. 90.

Sanguis calor à sulphureâ parte pendet. I. 38. calidus potu frigido dentatur. I. 233. 234. respiratione calefactus, I. 46.

Sanguis circulatus, eam Harvey in lucem proposuit, I. 39. est indubie veritatis, I. 40. circulus liber & aquabilis quis? I. 255. animam cum corpore connectit, I. 16. est causa vitæ, I. 24.

Frid. Hoffmanni Oper. Tom. III.

nutritionis, I. 51. conservat corpus, I. 52. est principium, ex quo medicina omnes partes fluunt; I. 25. sit ad leges motus, I. 40. per pulmones, I. 47. in embryone abest, I. 42. vigorem & robur dat animo, I. 52. ejus apud Hippocratem indicia, I. 39. siquâ tertia pars cerebrum petat, I. 84. ad caput difficiliter movetur, I. 47. an ex arteriis vel venis exillat? I. 74. nulla quam citò corpus totum pervadat? I. 42. quoniam undè horâ circumvolvatur? I. 368. inter interstitia fibrarum non extravasatur, I. 367. redditus ex pedibus difficilis, I. 49. regressus per venas quibus assugetur? I. 41. transitus difficilior ex collo sinistri lateris ad mæstentericum finitum; I. 49. circulatio retardata morborum causa, I. 164. circulus turbatus & subaltus morborum & mortis causa, I. 25. curius immoderatus & impeditur cur morbum formet? I. 165. ex natura illius & quâ ratione efficiatur atque circumagatur, I. 469. ejus circuitus quare in febre fiat auctor & celerior? I. 476. vide *Circulus sanguinis & Sanguinis motus*.

Sanguinis color purpureus unde? I. 38. in minimis ductibus evanescit, I. 41.

Sanguis plangi non evanescens unde? I. 374.

Sanguinis conditio animæ actiones alterat, I. 96.

Sanguinis effusiones graves & periculosæ stiles ex intestinorum spasmis, I. 269. insactus & congestio quos effectus producat in vasis abdominis? I. 166.

Sanguis coagulatus quibus dissolvendus? I. 430. 453. uretibus intarsens quomodo resolvendus? II. 35.

Sanguinis consistentia ab intestino motu laeditur, I. 39.

Sanguinis consistentia iustâ eget proportionem & qualitate, I. 101. quænam ejus partes constitutivæ? III. 388. eo recte consensu viget sanitas, I. 101.

Sanguinis copia animam afficit, I. 52. nimia redundancia non universalis est morborum causa, I. 151.

Sanguis crassus & niger vitiosus ad stagnationes & inflammationes pronus; I. 373. *crassus* quomodo à plethorâ oritur, III. 302. à victu crasso, III. 255. à vitâ sedentariâ, *ibid.* disponit ad animi deliquia, III. 271. ad polypos, III. 86.

Sanguinis defectus multos infert morbos, II. 220. & abortum, III. 179. palpitationem cordis, III. 86. polypos cordis, III. 281. phthisin, III. 287. purpuram, III. 412. spasmodicam ex utero passionem, III. 63. stagnationem & corruptionem, III. 373. quomodo rescandendus? III. 273.

Sanguinis defectus per alvum funesta ex ruptâ hæmorrhoidali, I. 327.

Sanguinis dyscrasia ex urina patet, I. 380.

Sanguinis effusiones confusæ, interceptæ multa gravia creant symptomata, I. 244.

Sanguis extravasatus nocet, I. 373. mortis causa, I. 327. in cerebro quando nocet? I. 397.

Sanguis fibrosus malus, I. 374.

Sanguis fixidus nimis malus & unde? I. 373. infestus malignâ & spasmodicâ morbis; *ibid.* non largiter extrahendus, *ibid.*

Sanguinis fluxus quo pacto præsentissimè cohibendus? I. 255.

Sanguinis humiditas facili evaporatur, I. 37.

Sanguinis impetus variis ratione ætatis & indolis, I. 170.

Sanguinis impuri indicium, I. 271. quibus corrigatur? I. 430.

Sanguinis magna inopia quas parit æmulationes? I. 175.

Sanguinis

Ccc 2

Sanguinis mensuris fluxus periodicus causas habet mechanicas, l. 74. ex uteri parietis & vaginæ vasis profuit, l. 73. an ex arteriis vel venis extillet, l. 74. Vide *Mensuræ purgatio*.
Sanguis motus, Hippocratis de eo sententia, l. 300. ordinarius sanitati præfedit, l. 100. eo sanguis consumitur & alteratur, l. 107. per renes celeritè fertur, l. 50. in arteriis cur celerior? II. 203. III. 125. velocius movetur per vasa angustissima; l. 42. ejus intestina commotio sudoris causa; l. 382. per caput à duræ matris tono pendet, l. 305. in pleuritide morbis læsus est, l. 301. à peripheriâ ad centrum morbolus, *ibid.* à centro ad peripheriam vitalis. *ibid.* interceptus gravia parit symptoma, l. 166.
Sanguis profusus excretionem diminuit, l. 260. 261. male fortioribus confligentibus compescitur, l. 262.
Sanguinis progressus, motu corporis promovenitur, l. 321. tardior ex plethorâ quas gignat agri tudines? l. 270. quadruplici modo intercipitur, l. 301. interceptus quæ pariat mala? l. 307. impediens in capite quos gignat morbos? *ibid.* quid per venam portæ interceptus? l. 317.
Sanguis serosus nimis cur vitiosus? l. 373.
Sanguis siccatus inflammabilis est, l. 37.
Sanguis spiritus & impurus quibus corrigatur? l. 403. venosus cur arterioso spiritus? II. 203.
Sanguis flagrans inclinat ad corruptionem, l. 272. cur facile flagret in intestino recto & colo? l. 269. quatenus mortem inferat? l. 268.
Sanguis temperatus qualis? l. 101. ejus temperiem quomodo Veteres intellexerint? *ibidem.* cur debeat esse temperatus & depuratus? l. 157.
Sanguis tenuis & parvus facit timidus, l. 53.
Sanguificatio, ejus ratio, l. 50. non perficitur peculiari spiritu vitali, *ibid.* non est unius visceris opus, *ibid.* eam juvant calor, *ibid.* lien, l. 56. pulmones, *ibid.* arteriæ & venæ, l. 50.
Sanguinei quinarum? l. 242. II. 194. eorum natura & diætâ, l. 131. & seq. in quos morbos facile incidunt? l. 243.
Sanguineum temperamentum, l. 43.
Sanguineo - ebolerie quinarum? l. 43.
Sanguineo - melancholici, l. 43.
SANITAS quid sit? l. 100. in quo consistat? III. 371. ejus causæ à medico investigandæ, l. 100. indicia, *ibid.* proxima causa circulus sanguinis; *ibid.* forminarum pendet à mensuris rectè fluentibus, l. 119. à solidorum & fluidorum moribus pendet; l. 301. in quo ejus fundamentum? *ibid.* ex mente Hippocratis, l. 300.
Sauis quisnam? l. 100. à medicamentis abstinat, l. 138.
SAPHURA incisâ nocet & prodest, l. 459.
SAPO ventus clysteribus commiscetur, l. 373.
SAPON ubi perficitur? l. 89. fit in lingua, l. 93. ejus obiectum sal; *ibid.* ratio, l. 61. cur deficiat? l. 94. amarus in sêtero unde? III. 308. varius unde? III. 40. ejusque exemplum, *ibid.*
SATIETAS morborum genitrix, l. 249.
SATURNINA medicamenta tristibus exemplis infamata, l. 228. alvum adstringunt, l. 261. inimicissima præteritum intestinis, l. 228. quæ producant symptota? *ibid.* cur à veteribus annu merata venenis? *ibid.* ab iis abstinendum, *ibid.* in fluore albo & gonorrhœâ usurpata disponunt ad malum hypochondriacum, III. 69. nocent in gonorrhœâ, III. 361. 363. & quæ inducant symptota? *ibid.* & II. 287. quatenus conducant in hæticâ? II. 181.

SCABIES unde? l. 168. 202. quatuorplex sit? III. 426. excretio salutaris, l. 120. in quo diffinit à morbo Lazari? III. 427. est contagiosa, *ibid.* ejus sedes, *ibid.* subiecta, *ibid.* & 429. causa materialis, III. 428. causa proxima est serum acre & viscidum, *ibid.* quod exemplis probatur, *ibid.* mediata, III. 429. climaterica, ipsius casus, III. 440. epidemica exemplum, III. 441. ferina quænam sit? III. 426. ipsius pertinacissime casus, III. 439. humida quænam? III. 426. contagiosa est natura, l. 204. insurrexerat pernicio sa; l. 206. maligna venerea quid? III. 426. ojus cum tuberculis in cute observatio, III. 439. quantum ad eam generatim contribuant aër humidus & vappidus, III. 429. ejusque & diætæ subita mutatio, *ibid.* animi pathemata, III. 430. excretiones sanguineæ suppressæ, III. 429. menses suppressi l. 341. mala ciborum incongruorum digestio, III. 430. arthriticos & rheumaticos dolores sæpe solvit, II. 320. deliria, III. 263. epilepsiam, III. 13. & alios morbos, III. 427. & seq. prognosin III. 430. quo pacto in primâ herbâ suffocanda? l. 205. post usum acicularum frigidum abortus casus, III. 438. repulsa nocet, l. 303. per spasmos topicis inductus repellitur, l. 302. *retropulsa* cur adeo periculosa? l. 166. ejus exempla, III. 428. malis artibus *retropulsa* quænam damna afferret? l. 358. quâ ratione apoplexiam inducat, III. 242. asthma convulsivum, III. 96. colicam, III. 287. convulsiones, III. 25. epilepsiam, III. 12. febres intermittentes, III. 12. guttam serenam, III. 229. incilium cruentum ejusque casus, II. 237. motus spasmodicos vagos, III. 37. palpitationem cordis, III. 86. phthim, III. 287. rachitidem, III. 489. tussim feriam? III. 111. *sicca* apud senes unde dependeat? l. 242. præpositè siccata quos gignat morbos? l. 336.

Scabiei extratio; ejus exemplum à purgantibus validiore & feliciter curatur, III. 438. quomodo & quando conducant aquæ minerales cum lacte, III. 433. balnea, III. 431. 436. cura per inedi am, III. 431. decocta sanguinem purificantia, III. 432. externa, III. 436. 437. lactis cura, III. 433. mercurialia, III. 432. 435. sanguinis depletio, III. 431. & sudorifica, III. 432. quæ tenenda circa criticism, III. 434. haud repentè reprimenda, l. 263. quæ ad expulsiorem conferant & III. 434. quomodo retrocedens revocanda? III. 30. 435.

SCAMMONIUM, ejus virtutes, l. 45.
SCARIFICATIO vicaria venæsectionis, l. 461. eodem quàm venæsectio evellit sanguinem, l. 374. 462. plethoram etiam minuit, *ibid.* evacuatoria & derivatoria, *ibid.* quibus in morbis utilis? l. 461. pinguis & spongiosus subiectis præ venæsectione commendatur, III. 431. *brachiorum* quando in aphonia infans conveniat? III. 250. *cervicis* in vertigine laudatur, III. 221. *gingivarum* in iis sanguinolentis in scorbutis, III. 380. *navium* in cataleptico paroxysmo, III. 48. in phthieride, II. 132. *nucha* in adhectibus supposita, III. 213. quando in fistularum curatione adhibenda? III. 464. in tumoris pedum oedematoso, III. 333. in podagra, III. 346. purpurâ scorbuticâ; III. 406. rheumatismo, III. 323. ipsius vesicæ, II. 311. ulceribus, III. 448. quâ ratione & quo loco in spachelo infundenda? III. 390. cur cautè cum ea in scorbutis mercandum? III. 380.

SCHAPERUS, l. 17.
SCHAUCHNERUS, l. 17.
SCIRRHUS,

SCIRRHUS, quid? III. 446. viscera & glandulas occupat, I. 328. pancreas, *ibid.* pylorum & duodenum, *ibid.* hienem, I. 329. hepar, *ibid.* mesenterium, I. 329. prostratas, *ibid.* uterum, *ibid.* vesicam I. 328. & *seq.* ex medullis suppuratione, I. 341. haemorrhoidum I. 343. quando in cancerum degeneret? III. 447. & cur in cachectici ea quam facillè accedat mutatio? *ibid.* in ipsam abeuntis signum; III. 446. & quâ ratione ulcera inducat? III. 444. 447. ejus curatio interna, III. 450. quando locum in eâ habeat exstirpatio, III. 451. & quid ante & post ejus operationem observandum? *ibid.* & *seq.* quæ externa præterea conducant? *ibid.*

SCORBUTUS qui dicitur? III. 369. signa ejus essentialia, *ibid.* in quo differat a cachectiâ, III. 314. 375. ab hypochondriaco malo & melancholico, III. 375. ab ictero nigro, III. 374. ab ileo cruento Hippocrati, III. 374. à lue venerea, III. 375. 423. a purpura rubra chronica, III. 375. lymphomata quæ se exerunt in abdomine, III. 370. capite, collo, & faucibus, *ibid.* cruribus, *ibid.* partibus externis, *ibid.* pectore, *ibid.* sedes non est primariò in liene, III. 372. sed in omnibus fere visceribus & emunctoriis; *ibid.* causa ejus proxima consistit in fucorum vitallium corruptione? III. 371. quomodo hæc generetur & ejus præsentia probetur? *ibid.* mediata causa est fluidi a solido secesso, *ibid.* quod vincitur, III. 372. qualis in eo pulsus, I. 371. & urina? I. 379. unde oritur? I. 175. ex male affecto hepate, I. 379. ejusque & lenis aetia, I. 307. 320. quantum ad eum contribuit aëris vitium, III. 373. cur jam rarius conficiatur Halæ I. 254. cur mans incolis familiaris? I. 285. ætas senilis, III. 373. & cur huic ætati familiaris I. 166. 242. & animi affectus graves, *ibid.* contagium, III. 371. febres continuæ & intermittentes prægressæ, III. 374. excretiones suppressæ & nimis, III. 373. sanguis fero livido scædens & limosus, I. 373. motus corporis nimis, III. 373. otium, *ibid.* levis, temperamentum, & viæ genus, *ibid.* cerevisiæ ex parte debetur apud Septentrionales; I. 112. in borealibus cur endemicus I. 335. cur post purpuram evanescat? III. 404. prognos, III. 375. speciemus de morbis ex scorbuticâ humorum diathesi provenientibus, *ibid.* & *seq.* & de ipsius tumoribus & ulceribus, *ibid.* variorum ejus symptomatum cum metu fistulæ aut exemplum, III. 383. ipsius rheumatismi casus, *ibid.* cum malo hypochondriaco & variis symptomatibus juncti casus, III. 384. pustularis singularis exemplum, III. 381. ejusdem in plebtoricâ à nimio magiore orti exemplum, III. 382. ejus ulcerum casus, III. 386. retropulsus cur a deo periculosus, I. 166. sola arte curatur, I. 153. haemorrhoidibus accretus, I. 343. quæ in eo proficit? I. 430. ejus specifica, I. 452. eum curandi indicationes generales, ad quas explendas commendatur aëris mutatio, III. 376. motus corporis, III. 377. potus victusque conveniens; III. 376. quantenus & quæ speciatim in eo conducant amara roborantia, III. 378. anodyna, III. 379. antiscorbatica, III. 378. & *seq.* vel aqua simplex, vel mineralis, III. 377. balnea, III. 380. diaphoretica, III. 379. diuretica, *ibid.* emollientia, *ibid.* laxantia, *ibid.* icsarificatio & venæsectio? *ibid.* quomodo in hoc tractande gingivæ putide & languinolentes, III. 38. inflammationes & tumores? *ibidem.* quæ cautele tenende circa carnivororum & calidiorum remediis, *ibidem.* opiatum & topicum

Frid. Hoffmanni Oper. Tom. III.

ulium?

Scorbutici, eorum urina salibus saturata. I. 69. cur ad auditus gravitatem prout, III. 241. ad coma fominolentum, III. 211. purpuram chronicam, III. 399. palpitationem cordis, III. 86. scabiem ferinam, III. 426. sphacelum, III. 388. & *seq.* tussim rheumaticam, III. 111. ulcera? III. 445. cur catarrhalibus adfectionibus gravius laborent? II. 45. lue venereâ adfecti cur minus ferant salivationem mercurialem? III. 419.

SCORBUICULI cordis percussio cur lethalis? I. 312. **SECALE** corruptum nigrum quenam productum symptomata? I. 230. sale scæcit subitè venenato. I. 231.

SECRETIO, ejus ratio, I. 55. liquidorum fit, vel per glandulas, vel liene illarum ope; *ibid.* alteratur atonia vel spasmò. *ibid.*

SECTIO morbis defunctorum est utilis, I. 15. cada-verum utilis, I. 249. 290. ad observationes necessaria, I. 290. medicinam apprime illustrat, I. 270. causas morborum & moris detegit, I. 290. 322. 396. cum iusticio ipsistudente, I. 290.

SECUNDINÆ quid sint? I. 78. succum albidum ex matre attrahunt, *ibid.* earum ab utero facta separatio quomodo cognoscenda? III. 183. improvidè & violentè extractæ florem album inducunt, III. 350. ejus exemplum, III. 356. cur ipsæ relicte ichorolum succulent fluxum? II. 230.

SEDATIVA quæ dicantur & sint? I. 447. III. 14. quotusq; licia, I. 447. eorum apparatus, *ibid.* & *seq.* opemum auctoris liquor anodynus; I. 449. quomodo agant? I. 448. magnæ efficaciæ, *ibid.* cautè usurpanda; *ibid.* virium ratione imprimis habita, I. 418. dolores palliative abigunt, *ibid.* præpostèrè data graviter nocent; I. 419. nocere in tertiana, II. 17. in torminibus infantum. III. 480.

SEDENTARIA vita, corpori inimica. I. 213.

SEDIMENTUM urinae unde? I. 70.

SEDULIENSES aquæ quarum habent principia constitutiva? III. 106. laudantur in cachectiâ, III. 315. in colicâ, III. 48. in morbis pituitosis, III. 106. in vermicibus pellendis, III. 492. nocent in hæmoptysi, III. 206. earum sal qualem exferat virtutem? II. 14. III. 331. & quâ dosi quove vehiculo exhibendus? II. 14. commendatur in ictero, III. 305. malo hypochondriaco, III. 70. tertiana. II. 14.

SELTENARÆ aquæ quæ recondant principia? III. 291. cur cum lacte optimè possint misceri? *ibid.* quibus jungendæ ad meliorem effectum exhibendum? III. 264. temperant & per diuresin operantur, II. 231. ad emendandum fibrosam sanguinem utiles I. 374. frigide a spasmò vexatis minimè potari debent, III. 73. 348. cum lacte commendantur ad arthritidem vngam, III. 348. ad calculi incrementum inhibendum, II. 307. ad convulsiones, III. 27. 28. ad cutis adfectiones, II. 433. ad dysenteriam, III. 156. ad epiphoram, III. 244. ad febres lentas & hecticas, III. 180. ad hæmoptysin, II. 206. ad nimium hæmorrhoidum fluxum, III. 221. ad hæmorrhagiam uteri, II. 226. ad hystericam passionem, III. 59. ad hypochondriacum malum, III. 71. ad contumaces intestinorum dolores, II. 290. ad phthisin, III. 291. ad palpitationem cordis, III. 93. ad polypos præcavendos, III. 283. ad rheumatismum scorbuticum, II. 322. ad scorbutum, III. 377. 378. ad tussim habitalem, III. 114. ad vesicæ morbos inveteratos, III. 311. 315. pro pneumonia vix laudantur in altitudine, III. 100. fluore albo, III. 356. in malo hypochondriaco, III. 72.

Ccc 3

io

- in passione hyberica & fluore albo, III. 64. in purpura scorbutica, III. 405. in scorbuto, III. 384. in vertigine, III. 222. in ulceribus, III. 449.
- SEMIN** continet totum corpus organicum, I. 75. in eo per microscopium viva animalcula apparent; *ibid.* eundem ferè cum fluido nervo habet indolem; III. 354. quod in foeminis dicatur, III. 53. & quomodo in eis corruptatur? *ibid.* ejus nimis copia nocet, I. 119. acre ac abundans quomodo ad gonorrhoeam benignam contribuat? III. 358. immoderata profusa nocet, I. 119. quomodo ad deliria faciat, III. 254. & gonorrhoeam? III. 358.
- Semina** farinacea dant multum chylum; I. 63. quæ nutriant? I. 107.
- Seminales vesiculae**, earum atonia pollutionis & gonorrhoeae benignae causa, I. 307.
- SEMIOTICA** quò pertinet? I. 14. ejus fundamentum circulus sanguinis, I. 372. cautè colenda à medico, *ibid.*
- SEMITERTIANA** quæ dicatur? II. 40. in quo differt ab inflammatoris febribus inefficiorum ex mesenterio, II. 171. ab intermittente maligna, II. 40. à tertiana continua & simplici? II. 41. ejus historia, II. 40. subiecta, II. 41. sedes ac ratio formalis, *ibid.* causæ remotæ; *ibid.* quibus locis sit familiarior? *ibid.* quibus modis solvantur? *ibid.* cur sit periculosa? *ibid.* quomodo in eâ mors contingat? *ibid.* exempla ejus curatæ, II. 43. cum dysenteria junctæ, II. 44. ictero discusse, *ibid.* cum purpura junctæ, II. 43. quæ eam curandi sint indicationes? II. 41. quomodo in eâ inflammatio discutitur III. 42. alvus movenda, *ibid.* sudor movendus, *ibid.* doloribus succurrendum? *ibid.* qualis conveniat potus? *ibid.* in eâ nocent purgatio, *ibid.* nec non cortex china, *ibid.* quæ conveniat saliva? *ibid.* quatenus conducant emetica? *ibid.* venæsectio, *ibid.* quomodo præcavendæ recidivæ? *ibid.*
- SENECTUS**, quæ ratio, I. 29. cur ipsa morbus? I. 162. quibus morbis adducitur? I. 183. quid peculiare habeat ratione structuræ; I. 287. 349. qualis in eâ pulsus? I. 368. quibus morbis patitur? I. 308. 349.
- Senes** siccam & rigidam texturam possident, III. 389. eos parcius oportet vestiri, I. 57. iis commendanda mediocritas, I. 134. sibi caveant ab humiditate frigida; I. 267. vitandum vinum quale? I. 134. quæ dieta conveniat? *ibid.* non temerè discredendum à consuetis, *ibid.* eorum circulus sanguinis tardus, *ibid.* venæsectionem utiliter ferunt, I. 424. sanguineas excretiones salubres experiuntur? *ibid.* cur difficulter fudent? I. 382. eos lœduos affectus graves, I. 135.
- Senum morbi** unde? I. 241. 455. iis quo pacto obviandum? I. 242. quibus medicamentis astantur? *ibid.* naturâ ad morbos proclivitatem habent, III. 236. cur morbis ex impuritate obnoxii? I. 336. 349. in juventute nimis laute viventes quibus morbis inde pateant, & consilientur? I. 242. III. 442. cur familiaris cæcitas? I. 89. 91. sunt ad animi deliquia proclives, III. 269. ad apoplexiam, II. 242. ad aurium vitia, III. 245. ad calculorum generationem, II. 269. 299. ad catarrhales defluxiones, II. 117. ad cornu formololum, III. 211. ad cutis vitia, III. 426. ad purpura chronicam, III. 399. ad rheumatismum, III. 330. scorbutum, III. 373. splacelum, III. 388. & seq. ad singulum, III. 123. tumina ventris, II. 352. ad tussim, III. 111. quâ ratione tertiana incurrant? II. 17. periculosa laborum quarantâ, III. 31. iis frequentior in-
- testinorum quàm meningum inflammatio; II. 119. contagiosis & acutis morbis rariò vexantur; III. 65. cur à pudgri non possint liberari? III. 344. & cur difficulter à purpura liberentur? III. 412.
- Serum** immedicabile, I. 244.
- SERNERTUS** primus ecclesiasticus, I. 17.
- SENSATIO** duplex, I. 88. intensior vel remissior unde? I. 89. non in nervis, *ibid.* in partibus tantum nervosis, *ibid.*
- Sensibilitas** imbecillitatis corporum index, I. 241.
- Sensitum** commune quodnam sit? III. 46.
- Sensus** quomodo fiant? III. 194. quinque numerantur, I. 89. mentis ideas exhibent, I. 90. eorum organa varia, *ibid.* à spasmi sensoriorum laeduntur, I. 305. ab atoniâ duræ matris abolentur; I. 306. eorum abolitio in epilepsia unde? III. 11. unde in hysterica? III. 53.
- SEPLIS** os absorbens, I. 428. specificum in gonorrhoeâ, *ibid.*
- SEPTENTRIO**, ejus incolæ cur sanæ, robusta, & quadrata habeant corpora? I. 266.
- SEPTICA** tendinosi & nervosi partibus inimica, I. 310. quâ ratione adhibenda ad calculum abluendum? III. 464.
- SERMO** intensior motus species, I. 122. circulum sanguinis accelerat, I. 123. hypochondriaci & literatis utilis, *ibid.* mutat pulsum, I. 368. intensior quomodo circulum sanguinis promoveat? I. 321.
- SERPENTES** possit cur innocui? I. 199.
- SERPIGO** quid? III. 426. ejus (speciei in scroto exemplum, III. 442.
- SERUM** viscidum flagrans quæ producat synmacta? I. 175. impuritate contrahit; I. 320. ejus viscidii albi fluxus quo pacto concutitur? I. 167. colluvies cur in abdomine veneno interestorum reperitur? I. 166. profusio cur gignatur à mercurialibus? I. 167. redundat sæpè, I. 347. 410. superfluum salutanter excernitur *ibid.* sæpè extravalatur, I. 328. extravasatum in cerebro quomodo necet? I. 397. flavum vel lividum sanguini innatus quid indicet? I. 373. limosum copiosum in lue veneret, *ibid.* paucum in ardentibus, I. 374. falsum tartareum diureticis expurgatur, I. 439.
- Serum lœvis** dulce egregium, I. 423. continuato usu juvat, *ibid.*
- SERVO** perquam noxia in morbis acutis, I. 161.
- SETACRA**, quæ ante earum usum tenenda? III. 230. quid de iis sentiendum in epilepsia? III. 15. gustu serena, III. 230. ophthalmiâ, III. 167. in motibus spasmoticis, III. 39.
- SEVI** hircini exhalatio quàm gravia exciet symptomata, I. 230.
- SEXUS** facit ad morbos, I. 349. mutat pulsum, I. 368. in historiis morborum recensendus, I. 287.
- SIMPLICIA** purè talia non dantur, I. 422. preferenda compositis, I. 421. & seq. veteribus maximè utilis, I. 422. à medicis perperam spernantur, *ibid.* quæ ex iis preferenda? *ibid.* usurpanda quando vires indagandæ, I. 426.
- SINAPT** quale recondat principium? III. 378. in icoribus laudatur, *ibid.*
- SINGULTUS** qui dicatur? III. 122. ejus historia, III. 123. differt à continuo sepi transversis spasmus, *ibid.* sedes, *ibid.* eo extincti anatome, III. 123. ratio formalis, III. 123. in infantibus unde? III. 496. & seq. unde oriatur? I. 187. quomodo oriatur ab aere frigido; III. 124. alimentorum nimis quantitate, *ibid.* assumentorum inimicâ qualitate; *ibid.* materiâ acri diaphragmati incumbente;

cumbente; *ibid.* à convulsione diaphragmatis, l. 45. & 306. refrigeratione stomachi, l. 314. præpostero topico rum usu in morbis articulo rum? l. 339. *acutus* quid? l. 123. inflammationi ven triculæ accedens malus; l. 412. quomodo a fe bribus & inflammationibus producat, l. 124. & ab inanitione? l. 125. *chronicus* qui dica tur? l. 123. ejus casus, l. 129. ejus ocltarni exemplum, l. 127. ejus causæ, l. 125. pro gnosis, *ibid.* in infantiis, l. 494. si febribus jungatur, quæ ipsas sint mala signa? l. 124. ejus ex cohibiti per opium diarrhoeæ orti exem plum, l. 128. post suppreffam tertianam enati casus, l. 129. in hæmorrhæa lethalis, l. 130. lethalis febris ardenti superveniens casus; l. 128. quomodo & quatenus tollendus per anody na & antispasmodica? l. 125. enormior iræ benefici curatus, l. 190. item terrore subitaneo; l. 192. levior quomodo tractandus? l. 127. à drastico & acri remedio inductus quibus com pescendus? l. 126. à sanguinis defectu, *ibid.* à subitâ primarum viarum, l. 125. & a trans piratione prohibita, l. 126. & quæ in- & ex te rna roborantia conveniant? *ibid.* acutis accedens quomodo tractandus? l. 127. diarrhoeæ & dy senterici, l. 126. inflammationibus, l. 127. & in specie hepaticæ? l. 146. in cachecticis & hypochondriaciis quâ ratione ei succurrendum? l. 127. præservationis cura quomodo instituen da? *ibid.*

SINUS ossium capitis maci emunctorio rum, l. 71. du ræ matris, l. 48. *frontales* quandoque abscissum foveat, l. 326.

SITUS ratio, l. 60. eam facit defectus humidi in faucibus & œsophago, *ibid.* levant somnus & anodyna; *ibid.* cum ariditate lingue unde? l. 186.

SITUS qualis conveniat in animi deliquis? l. 272. in asthma? l. 109. *erectus* in morbis acutis cur tam noxius, l. 338. & quæ in his damna pa riat? l. 113. 114. & in exanthematicis morbis, l. 272. in petechiis, l. 90. in petechizante, l. 78. 81. in purpurâ albâ & malignâ, l. 407. quâ ratione mortem acceriat? l. 61. laudatur in epilepsia, l. 16.

SODA ab acido, l. 252.

SOLANUM verum cur audiat furiosum? l. 200. qui tam cito necet? l. 178.

SOLIDA agunt in fluida, eademque corruptunt. l. 319. eorum motus duplex, l. 155. pendet a fluido nervo, l. 101. & in fluxu sanguinis arte riæ, *ibid.*

SOMNUS quid? l. 94. l. 46. ejus ratio, l. 94. 127. quæ comoda afferat? l. 126. & 127. qualia pro sit? l. 127. quis modus? *ibid.* in ac vigilia faniensum dispendiat, l. 102. sitim sedat, l. 60. vires infuscat, l. 95. viscera roborat, l. 126. vires necessarias, l. 94. perspirationi favet, l. 127. sub eo perspiratio elucit crassiores & mucidas particulas, *ibid.* quædam excretiones meliùs procedunt, l. 95. cur fibræ relaxet? l. 36. male concoctionis vires dissipet? l. 250. parati arte as firmatio l. 128. pendet à circulo sanguinis. l. 95. convenientes eo utendum; l. 158. ubi capiendus? l. 128. salubri loco indulgendum, l. 104. quan do protrahendus? l. 127. ei nox convenit, l. 128. ante median noctem melior, l. 126. meridianus nocet, l. 128. quâ conditione tolerari possit? *ibid.* statim à cibo non laudatur, *ibid.* quibus in terris minus nocet & quibus ætati bus *ibid.* lar gior quibus fit opus? l. 127. infansum fit lon gior; l. 133. quibus profundior? l. 128. nimis cavendus; *ibid.* longior cur noxius? l. 267. im-

moderatus unde? l. 128. ejus *defectus* in saliva tione mercuriali quibus restituendus? l. 420. quietus qualis? l. 127. inquietus quid denotet? l. 129. in podagra unde? l. 341. post diurnas vigilias impeditur, l. 129. quibus arceatur? l. 127. quibus turbetur? *ibid.* ab affectibus, l. 102. & ciborum corruptela, l. 249.

SOMNOLENTIA à veribus procreta, l. 235. ex tooo dure matris deperditio, l. 306. ex apoplexiâ quomodo gignatur? l. 350.

SONUS quid? l. 91. auditu percipitur, *ibid.*

SOPORIFERA quænam? l. 222. venenis annumerantur, *ibid.* cur naturæ tam insensa? *ibid.* ubi ten tando, l. 225. Vide *Anodyna* & *Stupefactiva*.

SAPOROSI affectus qui dicantur? l. 209. unde? l. 166. eorum species & differentia l. 209. in peremptorum anatome, l. 210. causa proxima, l. 211. remota, l. 212. prognosis *ibid.* cura tio, l. 213. vide plura in verb. *Cama*, *Carus*, *Lethargus*.

SORDES subtilioris naturæ emulantur venena, l. 174.

SPADANE aqua subtilissimum maris principium re condunt, l. 215. hinc obstructions referant & tonum viscerum augent, *ibid.* commendantur in chlorosi, *ibid.* in malo hypochondrisio, l. 171. in vesicæ vitis, l. 154. ulceribus l. 449. mi nimè à spasmo vexatis frigide potari debent, l. 71.

SPASMUS quid & quotuplex? l. 163. quadruplex, l. 407. morbosus motus, l. 301. 407. quomodo cognoscendus? l. 392. variis à densis & crasso sanguine suscitatur, l. 373. ex repletionem l. 269. effectus in corpore l. 407. multorum morborum causa, l. 301. naturæ & vitæ humane insensissimus l. 170. 199. partibus inducit habitudinem ac debilitatem l. 169. continuatur per totum genus nervosum l. 168. quandoque in epilepsiam transit l. 163. fortior, ejus vis l. 166. universalis quoa morbos gignat, l. 167. sanguinis cursum inter cipit, l. 305. ejus circuitum iniqualem reddit, l. 196. perspirationem sufflammat, l. 304. hæ morrhagias supprimit, l. 303. alvum adstringit, l. 304. 392. motum peristalticum invertit, l. 304. secretioem lactis intercipit, *ibidem*. gignit irra guriam, l. 303. 304. arophiarm, l. 304. sitim, *ibid.* pullum convulsivum, l. 455. salivationem, l. 304. asthma, *ibid.* faciem Hippocraticam, l. 392. nervorum tensionem, *ibid.* oppressionem pec toris, l. 305. constrictionem in gula sensum, *ibid.* mentis capitique morbos, *ibid.* & *seq.* respiratio nem anxiam, l. 392. anxietatem, *ibid.* vomitus, *ibid.* dolores varios, l. 303. febrim accessiones, l. 305. sensus lædit; *ibid.* succos inquinat, l. 319. excretionem turbat, l. 320. 392. l. 53. tenues reddit urinas, l. 377. 378. 392. in cute quæ pa riat mala? l. 391. febrim formalem rationem absolvet, l. 301. adesset in hæmorrhagiis, *ibid.* quan tum causam proximam conficiat, l. 196. sepe in primis vis causam habet, l. 19. adesset in inflammationibus, l. 362. capitis morbis, *ibid.* catarrhis, diarrhoeis, recidivis, *ibid.* retrocessione exanthematicum, *ibid.* in acutis mali ominis, l. 391. relinquit atoniam, l. 308. non tam noxia quam atonia, l. 307. à venæsectione increfci, l. 457. morbos facit & solvit, l. 406. post asthma dicitur, l. 11. 43. sudore solvitur, l. 169. quan do solutus esse cognoscatur? l. 10. an locum habeat in retribus? l. 147. spasmodicum febrim indolem quis indicet? l. 9. & *seq.* cur status si ep cum us jungatur? l. 341. remittens mor bos solvit, l. 305. utilem quædam effectum præstat, l. 309. salutariv quomodo dignoscen-

- duo* ? I. 407. levatur liquore anodyno, I. 377. oleo amygdalarum dulcium, I. 318. balnei, I. 463.
- Spasmi febiles unde* ? I. 175. *hypochondriaci* cur sentibus rationes ? I. 185.
- Spasmodici morbi*, multa eorum species, I. 298. qualis in his pulsus ? I. 371.
- Spasmodici motus vagi* qui dicantur ? III. 34. in quo differant ab affectu arthritico, *ibid.* à convulsionibus & epilepsia ? *ibid.* eorum hiliaria cum symptomatibus ; *ibid.* paroxysmorum solutio ; III. 35. epidemice non raro grassantur, *ibid.* quorum causa in aere, III. 36. & victu impuro sita est, *ibid.* causa proxima, III. 35. causæ mediatae & occasionales, III. 37. prognos, *ib.* eorum exempla ab acrimonia lymphæ & feri utrum, III. 42. ab ascaridibus copiosis, *ibid.* cum corruptâ phantasia junctorum, III. 41. à podagra retro pulsâ subnatorum, *ibid.* scorbuticorum, III. 40. 43. eorundem cum saburâ tenacissimâ intestinis impactâ, III. 43. à violentâ ossis coccygis percussione ororum ; III. 44. cura præservatoria, III. 39. quibus hi fedandi ? III. 38. fedatis iis que conducant ? *ibid.* & quomodo eorum causa materialis & corpore proscindenda, III. 37. quomodo sanandi epidemici, *ibid.* ab exanthematibus suppressis orti, III. 38. ex vizio primarum viarum enati, *ibid.* à scorbuticis humorum diathesi, *ibid.* & seq. quâ ratione inveterati tractandi, *ibid.* que tenenda circa antiscorbuticum usum, III. 39. evacuantium & narcoticorum, *ibid.* laxantium & linimentorum, III. 40. remediocum calidiorum, III. 39. salinorum ac mercurialium, III. 40.
- Specificæ dantur* ; I. 449. quo sensu intelligenda ? *ibid.* que sint in variis morbis ? I. 450. operantur per consensum, I. 318. non sola juvant, I. 453. certâ methodo usurpanda, *ibid.* ante eorum usum corpus præparandum, *ibid.* maximè locum habent ubi genus nervinum à virulentâ causâ est commotum ; I. 311. *antepileptica* quando in convulsionibus & epilepsia in usum trahenda ? III. 14. 16. 28. *antifebrilia* quo tempore tutò adhiberi queant ? II. 20. præsertim in plethoricis ? II. 19. quando sint nimia ? II. 19. 22. 30. quando & que conducant in quotidianâ ? II. 35. *antisyphilitica* quænam sint ? III. 55. *antiscorbutica* que & quibus tutò exhibenda ? III. 378. 379. in deliria quænam sint, & quando usurpanda ? III. 260.
- SPERMA*, ejus consideratio, I. 76. maturitas, *ibid.* quolibet portio est organica, *ibid.* virilis in utero formine effectus ; I. 78. dilutus & debile, I. 77. masculinum quid ? I. 76. unde elaboretur ? I. 77. vide *Semen*.
- SPHACELATIO* visceris nobilioris fit mortis causa I. 34. frequenter I. 161. præsertim in partibus internis I. 185. in plurimis morbis acutis & chronicis deprehenditur I. 206. mortiferum corporis venenum *ibidem*.
- Sphacelus* quid ? III. 387. in quo differat à gangrænâ, III. 388. ab ulceribus ? III. 387. unde proveniat ? I. 169. 206. quas in- vel externas partes maximè infestet ? *ibid.* ejus signa, *ibid.* signa ficti, I. 393. in ventriculo ex veneno, I. 323. & in eo quibus se prodât ? II. 124. duodeno, I. 324. tenuibus, *ibid.* recto & visceribus abdominis, *ib.* utero, *ibid.* marisano ; *ibid.* membranis cerebri ? I. 325. quomodo necet ? I. 35. cur tam cito perimat ? I. 178. mortis plerumque in morbis causa, I. 289. 323. in synochis quando videtur imminere ? II. 107. viscerum quomodo absque præcedente inflammatione contingere queat ? II. 144.
- quomodo animi deliquia inducat ? III. 271. causa ejus in- & externa, III. 388. proxima, *ibidem*, mediata, III. 389. occasionales, III. 318. suppuratio in eo quale signum præbeat ? III. 395. prognos, III. 389. ex inflammatione fit, I. 393. ejus à causâ internâ in pede enati casus ; III. 393. à diuturno morboe induci, III. 395. digiti gangræne supervenientes, III. 396. musculorum glutatorum in paralytico exemplum, *ibid.* eum curandi indicatines, III. 389. à causâ internâ insanabilis ; I. 184. quando alexipharmaea conducant ; III. 390. scarificatio, *ibid.* & 392. & amputatio ? III. 390. quomodo in erysipelate arcedus ? II. 107. cautela circa amputationis locum & tempus, III. 392. & ipsam operationem, III. 393. quomodo tractandus si alii morbi concurrunt ? III. 392.
- SPHINCTERES* sunt instrumenta motus mechanici, I. 87. eorum & valvularum magna sensibilitas, *ibid.* structura, *ibid.*
- Sphincter ani* resolutus feces involuntarie dimittit, I. 307. vesica urinaria spasmò affectus urinam retinet, & stranguriam facit, I. 304. resolutus urinam involuntarie fundit, I. 307. exulcerat malè tractatî gonorrhœa, I. 353. & seq.
- SPINOZISMI* fundamentum, I. 18.
- SPIRANDI* angustia ac difficultas unde ? I. 166.
- SPIRITUS* non sunt medicinæ principum, I. 301.
- Spiritus animales*, qui veteribus ita dicti ? III. 312.
- Spiritus crystallorum veneris* quid sit ? III. 213.
- Spiritus minerales acidi* pulmonibus & renibus sunt insensiti ? II. 206. an ad præservandas variolâ apti ? II. 58.
- Spiritus vini* potus an post cibum digestionem immoveat ? II. 291. quando eum vitare deceat ? I. 177. ejus abusus quanta inferat damna ? II. 270. III. 389. quomodo hæmorrhagias inducat & obstructions, III. 282. & sphacelum ; III. 389. *campheatus* in quibus tumoribus maximè conserat ? III. 145.
- Spirituosa* indolis sanguinis repugnant, I. 108. 112. cur & quando noceant ? I. 178. fluida coagulata & solida stringunt : I. 447.
- SPORADICI* morbi quænam ? I. 181.
- SPUTUM cruentum*, ejus signa, I. 296. differt ab hæmoptysi ; *ibid.*
- SQUILLA*, ejus radicis principia, III. 102. 106. quomodo agat ? III. 332. quâ ratione ejus acrimonia temperanda ? III. 102. quid ante ejus usum conferat ? III. 103. jam apud veteres in adfectibus hydropicis & chronicis in usu fuit, III. 102. laudatur in asthma hydropico, III. 332. in comate somnolento ; III. 213. ejus exymel in vultu laudatur, III. 172. in vomitu infantum ; III. 145. noceat in convulsionibus, *ibid.*
- STAGNATIONES* sanguinis morborum causæ, I. 174. manifestis periculosis ejus stases, *ibid.* feri & aliorum humorum quænam gignat incommoda ? I. 175. spasmorum sunt generices, I. 174. earum causæ antecedentes, I. 176.
- STIMULUS* usum motus tonici offendit, I. 36. laudatur ; I. 344. & seq.
- STASES* sanguinis magis periculosa, quam ejus flagrationes, I. 174.
- STATO* diuturna morbos gignit, I. 126.
- STENO*, I. 20.
- STERTITAS* unde ? I. 243. 307. ex puerperio, I. 350. sæpè à scitipho navi & tubarum Fallopiarum venit, III. 447.
- STERNUTAMENTA*, quid ante eorum usum tenendum ? III. 230. quando in apoplexiâ conducant ? II. 245. in aurium vitio, III. 243. in guttâ renâ,

na, III. 230. singula, III. 127. & soporosis affectibus, III. 213. nocent in epileptico paroxysmo, III. 16.
Stomatitis quomodo succedat? I. 93. quomodo contingat? I. 306. à convulsione liberatum nervosum in tabulis. *ibid.*
Stomatitis quæ sint & quomodo agant? I. 442. cur in capiti morbis proficiant? I. 93.
STRACTOR cum roncho in apoplexiâ unde? II. 241.
STOMACHICA quæ sint? I. 445. eorum usus in variis casibus, *ibid.* & seq. usus perverfus in infirmis. I. 248.
STRABISMUS ex epilepsiâ quomodo? I. 350.
STRAMONIUM qui tam cito necet. I. 178.
STRANGULATIO cur tam celeriter necet hominem? I. 160.
STRANGURIA quid? I. 303. ex spasmus sphincteris vesicæ, *ibid.* & 380. & urethræ, I. 304. qualis in eâ urina? I. 380.
STREPTUS ossium in scorbuticis unde? I. 78.
STRUCTURA corporis humani maximè consideranda, I. 27. eil maximè hydraulica, *ibid.* ejus scopus primarius est duratio corporis humani; *ibid.* & seq. quæ sana? quæ morbida? I. 348. in febribus & infantibus peculiaris. *ibid.* Vide *Corpus*.
STUDIA debilitant ventriculum, I. 287. 313. corpus, I. 349. alvum segnem reddunt, I. 287. malum hypochochriacum crient, *ibid.* disponunt ad capitis morbos, I. 287. Vide *Meditationes*.
STUPREFACTIVA annumerantur venenis, I. 222. operationes tamen differunt à venenis causticis, *ibid.* quando ab ipsâ abstinendum sit? I. 224. cur antiquis fuerint suspecta? I. 223. cur infantibus & senibus exiciosa, I. 224. ut & debilibus? I. 225. nuncquam utilis in morbis chronicis & cacochymicis, *ibidem*. quatenus adjuvent excretiones? I. 260.
SVAVEDOLENTIA, eorum operandi ratio, III. 277. interdum ad animi deliquia contribunt; *ibid.* cur ferre nequeant hysterice? I. 305. cur tam atrocia pathemata crient? I. 310.
SUBJECTUM sanitatis quodnam, I. 99. ejus cognitio ad historiam morbi necessaria. I. 286.
SUBLINGUALIS *vena* in cephalalgia & opthalmiâ utiliter inciditur, I. 458. in angina cum periculo pertunditur. I. 459.
SULFURATIO ventrerum à sero flagante ori & curati exemplum, II. 324. quomodo ea miellus croceni causa esse possit? II. 234.
SUMMERIS quomodo subveniendum, I. 31.
SUBSTANTIE sunt viribus activis præditæ. I. 18.
SUCCOLADA, ejus decoctum quæ symptomata producat in hypochochriacis? II. 47.
SUCCUS qualis esse debent corpori nutriendo? I. 56. ejus nimia copia nocet, I. 114. abundantia morbis exponit corpus, I. 269. temperies vires conservat, I. 245. etiam utilis copia offendit, I. 258. pancreatice ad elaborationem chyli facit. I. 61.
SUCCUSSIO in epilepsiâ unde? III. 11.
SUCTIO proprie non datur. I. 47.
SUDOR unde? I. 381. ejus causæ; I. 382. differt à perspiratione, I. 381. subtiliores sanguinis sordes *ibid.* & sulphurea recementa evehit; *ibid.* odore & colore præditus, *ibid.* in eo eliciendo cautela; I. 68. quibus moveatur? I. 382. perfragia ex eo, *ibid.* cur pro differentiâ locorum varius? I. 381. & seq. sub quo aere prodet? *ibid.* sæpi salutaris, I. 288. 470. ejus utilitas in morbis contagiosis, I. 206. quibuscum flato tempore copiosus fluit, I. 120. in paroxysmis nullus, I. 383. post eos multus sæpi nimius, *ibid.* num ante paroxysmos febiles sit salutaris? II. 30. quandoque criticus, I. 387. spasmos solvit II. 163. 320.

corpus debilitat, I. 381. in acutis morbis per totum morbum largè fluens quid indicet? II. 89. quid in scorbuto indicet? III. 371. ejus diversitas in petechizantibus epidemicis, II. 80. in purpura singularem exhibet foetorem, II. 69. in quotidianâ non est cogendus; II. 35. cohibitus præsertim pedum quæ damna pariat? & multos gignit morbos; I. 339. 347. II. 138. 241. III. 111. 248. criticus cohibitus sit venenosus, I. 206. nimius suppreffus nocet; I. 288.
Sudor acris scorbutum præcedens, I. 410. *axillærum & pedum* non succidant, I. 339. *colliquativus & frigidus* unde? I. 307. colliquativus quomodo in phthisi sedandus? III. 294. *frigidus* an semper funestus? II. 169. *nimius* vires consumit, I. 68. ejus noxa, II. 71. quomodo compellendus? I. 383. in morbillis quomodo tractandus? II. 64. *nocturnus* salutaris, I. 347. in purpura chronica quomodo à natura discutatur? III. 406. *pedum* largus à morore; I. 382.
Sudorifera quæ sint? I. 282. evacuantium genus, I. 436. eorum suppreffus & modus agendi, *ibid.* & seq. II. 306. 417. rariis locum inveniunt, I. 436. quid ante eorum usum conducit? II. 328. III. 418. cautè sunt scribis exhibenda, III. 383. cum sufficienti vehiculo propinanda; I. 436. 437. quibus in morbis proficua, I. 437. cur sæpi diarrhoeam compellant? III. 403. quando in cutis adfectibus conducant? III. 432. in gonorrhoea præservandâ? III. 360. hydropicis, III. 31. lue veneræ, III. 417. puerperis, III. 164. in contagiosis viranda, I. 437. in exanthematicis ad pellendum non danda, I. 418. 437. post iram & alio clausâ noxia, I. 416. 437. cur plethoricis maximè noxia? II. 265. 328. nocent in arthriticis & rheumaticis doloribus, II. 323. in cholera & diarrhoea, III. 170. in ictero. III. 306.
SUFFIMIGIA quæ & quando in aurium adfectibus conducant? III. 243. fluore albo, III. 352. 353. hæmorrhagiâ uteri, II. 229. hysterico malo, III. 55. & odontalgia? II. 332. an secuta sint remedia in doloribus rheumaticis? II. 338.
SUFFOCATIO hysterica quid? III. 94. ejus causa? III. 52. quomodo differat ab angina, II. 126. animi deliquia, III. 269. ab asthma, III. 94. à caro? III. 212. et strangulata quomodo retituenda? III. 57.
Suffocatus laqueo vel undis, quomodo succuri possit? I. 31.
Suffusio, ejus species unde? I. 91. ejus signa, III. 234. differentia à cataractâ, III. 235. genesis, III. 234. ratio formalis, III. 235. subiecta & cause, *ibid.* quas habet periodos; *ibid.* quomodo tractanda? III. 236.
SULPHUR, ejus lac & flores quando conducant in tussi? III. 114. ad scabiem revocandam laudantur; III. 435. *artificiale*, I. 210. *animum* veneni naturam emulatur, I. 213. *marcium* cœ tam celeriter necet hominem? I. 160. specificum in phthisi. I. 451.
SUPPURATIO quibus promovenda? I. 451.
SURDITAS unde oritur? I. 92. 166. 306. in febre acutâ quandoque critica, I. 330. & seq. post lothargum & apoplecticum insilium unde? III. 241. antiquis insanabilis, I. 184. quomodo à curâ mercuriali perperam tractatâ oriri possit? III. 247. purgant fortiori curatæ exemplum. III. 246.
SUSURRUS aurium à spismo membranarum sensu audiri. I. 305.
SYDENHAM, I. 22.
SYLVIVS, I. 17. 22.
SYMPTOMATA haud confundenda cum morbis; I. 164. quopropia? *ibid.*

SYNACHRE quæ dicatur? II. 125. anginae species, I. 295. quomodo distinguenda ab aliis inflammationibus? *ibid.* ejus curatæ exemplum. II. 129.

SYNCOPE quæ dicatur? III. 270. signa antecedentia, III. 268. concomitantia, *ibid.* lethalis in parturientibus signa, I. 395. causa mortis in eâ, I. 497. qualis in dispositione ad eam pulsus? I. 371. in quo differat ab apoplexiâ? I. 299. III. 269. à caro, III. 212. ab epilepsiâ, III. 269. à suffocatione hysterica? *ibid.* solutio paroxysmorum; III. 268. subjecta & causa proxima, III. 269. scilicet systole cordis intercepta, I. 306. unde oritur? I. 31. atoniz debetur, I. 306. quomodo oritur ab animi adfectibus, III. 270. à nimia castitate, III. 59: à diætâ pravâ, III. 270. ab hæmorrhagiis nimis & suppressis, III. 63. 271. 275. ex suppressione menses, I. 341. à polypo cordis, III. 271. à situ erecto, III. 274. vaporosis, narcoticis, & opiatâ, III. 271. venenis purgantibus & emeticis; *ibid.* lethalis, quæ ejus fit causa? II. 108. III. 275. quâ ratione ab abortu & partu laborioso talis evadat, II. 228. & venesectione in brachio à polypo? III. 338. prognosis funesta; III. 271. salutaria, III. 272. ejus ab opiato inductæ exemplum; III. 276. lethalis à venesectione improvidâ casus; III. 275. quænam remedia in paroxysmo conducant, III. 272. & extra illum? *ibid.* quid sentiendum de aquæ frigida potu, III. 273. de cordialibus & solutivis, *ibid.* de spiritibus in os infusis, *ibid.* de venesectionis, *ibid.* de vini usu. *ibid.*

Syncopeis quomodo excitandi? I. 31.

SYNOCHA quæ dicatur? II. 105. à veteribus continens diætâ I. 293. ejus signa, *ibid.* qualis in eâ pulsus? I. 371. in quo differat ab ardente, II. 111. ab aliis inflammationis febribus? II. 105. ejus subjecta, *ibid.* causa & symptomatum obviatorum differentia, *ibid.* quibus ex causis generetur? II. 108. crises servat, I. 388. quando in eâ remissio fiat? II. 109. ei accidens purpura alba quid indicet? II. 107. quando sphæcelus in eâ cogrosatur imminere? *ibid.* quâ ratione solvatur? II. 106. quomodo in eâ mors contingat? *ibid.* eâ mortui quam exhibentæ notas? II. 109. exempla ejus recedivantis lethalis, II. 107. & 64. primo die solutæ, II. 109. usui purgantis & omniâ venesectione lethalis, II. 108. ejus per venesectionem sanatur, II. 109. eam curandi indicationes, II. 106. quomodo in eâ temperanda sanguinis ebullitio? *ibid.* quomodo tractandum delirium & somnolentia? II. 107. qualis conferat potus? II. 106. quatenus coarctant laxantia, II. 107. venesectio? *ibid.* quid ei substituendum? *ib.*

Synocha biliosa quæ dicatur? II. 112. an in eâ proficiat venesectio? *ibid.* catarrhalis anno 1729. epidemica, ejus història, II. 109. signa, II. 110. causa & genesis, *ibid.* exemplum ex Henrichio, *ibid.* quantum venesectio in eâ conveniat? *ibid.* purida quæ dicatur? II. 106. ejus cum purpurâ complicata & funesta exemplum, II. 116. quæ in eâ damna ex neglectâ venesectionis eveniunt? *ibid.* simplex quæ dicatur? II. 106.

SYNOVIA quæ dicatur? II. 341. usus, *ibid.* & ex quibus causis corrumpatur? II. 342.

SYRUPUS anthelminticus, III. 493. laxans nocet in cholera, III. 169. in dysenteria, III. 177. de *abstr. Ferri* est specificum in renum labe, II. 149.

SYSTOLE cordis & arteriarum I. 31. & diastole quomodo fiant? I. 34. insinuat diastolen & diastole fulcitur; I. 364. viger in arteriis, *ibid.* cordis pulsuum causa. I. 366

T.

TABACUS, eoestate parcius utendum, I. 136. insuetus cur fumo insuetus, I. 310. cur alvum stimulet? I. 314. ejus funi suctio alvum lubricum servat, III. 262. quâ ratione ejus frequens usus in uvulæ serosâ defluxione profuerit? II. 328.

TABES cur mellis tempore homines maxime afficiat? I. 234. sentiam unde? I. 242. ex nimia aquarum ardentium potatione. I. 256.

TACKENTUS (Onto) I. 17.

TACTUS organon cutis, I. 94. & speciation ejus papillule nervæ, I. 89. quomodo fiat? I. 94. à cuticulâ temperatur, *ibid.*

TARANTULA, ejus iclus quæ producat symptomata? I. 172. 200.

TARTARI emetici natura, I. 213. *sal* absorbens, I. 428. *incitura* absorbens. *ibid.*

Tartarus in urina unde? I. 379. vide *Urina*.

TEMPERAMENTUM quid sit? I. 131. *facit ad mutationem* pulsus. I. 368.

Temperamentorum doctrina quomodo sit exponenda? I. 43. ratio in quo consistat? I. 158. cognitio medico necessaria, I. 189. 243.

TEMPERANTIA gravidis commendatur, I. 137. praestantissimum in contagiosis morbis praedium; I. 204. eorum virtus & apparatus, I. 429. triplici agunt ratione, *ibid.* cautela in eorum uso, *ibid.*

TEMPESTATES, eorum vicissitudines morborum epidemicorum causæ, I. 374.

TENDO iclus atrocia parit pathemata. I. 111.

TENESMUS, quomodo in dysenteria III. 119. & à uteri inflammatione tractandus? II. 109.

TEREBINTHINA in gonorrhoeâ usurpata sæpè laudat mictram cruentam, II. 233. in calculo renali quo sine exhiberi debeat? II. 307. ejus oleum malo cum eventu sinit gonorrhoeam; III. 363. oleum exterius in suppuratione urinae utile. I. 318.

TERRA sigillata absorbens, I. 428. adstringit simul. *ibid.*

TERROR, ejus noxius in corpore humano effectus; I. 36. 103. II. 185. quâ ratione producat abortum, III. 179. animi deliquia, III. 270. apoplexiam, II. 241. cardiacam, II. 259. convulsiones, III. 25. epilepsiam, III. 12. erysipelas, II. 102. palpitationem cordis? III. 87. maxime nocet menstruantibus, II. 218. III. 213. puerperis? II. 164. quæ post ipsum proficiat & obstat? II. 218. eo percussis quid noceat? I. 103. quid amovet? *ibid.* cur in fulorem & calorem corporis terminetur? I. 167. partes externas confringit, I. 191. & peripetrationem cohibet, I. 261. evacuationes retardat ac penitus sistit, I. 191. fluxum sanguinis quandoque sulcitat, *ibid.* gravis excipit symptomata, *ibid.* in corporibus præsertim imbecillibus, I. 192. sensibus maxime insensibus, I. 170. 192. quin & subite mortis causam præbet, I. 192. in cæcis tamen morbis est remedio; *ibid.* quo pacto salutariter solvatur? *ibid.* & symptomata ab ipso excitata avertantur? *ibid.* retropellendi pollet scilicet, I. 207. succos veneno imbuat, I. 196. ejus affectus in corpore, I. 287. facit ad colicam, I. 297. gravis gravissimorum morborum causa existit validissima, I. 360.

TERTIANA febris quæ dicatur? II. 11. ejus species, differentia & signa, I. 294. in statu ejus qualis pulsus? I. 371. dividitur in legitimam & notham; II. 12. regularem & anormalem, *ibid.* in simplicem & duplicem; *ibid.* ejus història, II. 11. subjecta, *ibid.* ratio formalis, II. 11. causa materialis,

- ialis, ibid. & 13. causæ antecedentes; II. 11. quomodo generetur? ibid. cur eam veteres à bile derivaverint, II. 13. quibus subjectis sit loco medicus? II. 22. 23. quâ ratione eam incurant senes? II. 17. quomodo mutetur in ardentem, II. 118. in quartanam, II. 29. est sepe ferè intolerabilium dolorum interiorum causa, II. 287. conficit corpus & gignit sordes biliosas, II. 13. quo diuturnior, eo vehementior, II. 12. quando salutaris? II. 185. convulsiones & epilepsias quandoque solvit, II. 410. quomodo brevior, quandoque diuturnior sit? II. 13. quomodo solvatur alvi fluxu, sudore, ulcusculis, urinâ? II. 12. malè tractata quos pariat morbos? II. 13. laxantia & emetica in principio admittit, I. 415. exempla ejus ex ardente continua bono omine lubet, II. 118. in bilioso perperam subitus exceptæ, II. 18. in plethorico cum gravibus symptomatibus absque venæsectione curatæ, *ibid.* simplicia præposterâ medicatione in duplicem convertit, II. 19. citò & tutò sanatæ, II. 20. apostema multorum abdominis relinquunt, *ibid.* cum ichterq; & tussis complicatæ, II. 21. uno remedio curatæ, & in continuam convertit, *ibid.* ventericuli inflammationem relinquunt, II. 22. in sene curatæ, II. 22. citò curatæ in Carolinis, *ibid.* in puero per radicem tormentillæ fuisse, II. 23. eam curandi indicationes, II. 13. quibus modis in eâ biliosi succi temperandi? II. 14. & evacuandi? *ibid.* quomodo siquis in paroxysmo sedandi? *ibid.* partes roborandæ? *ibid.* in quo consistat cardo curationis? II. 15. quomodo in primâ herbâ jugulari queat? *ibid.* & seq. pro subjectorum diversitate diversè est tractanda; II. 22. quomodo tractanda in feminis cachecticis, II. 17. puerperis, *ibid.* senibus, *ibid.* sub frigore, II. 16. sub æstu, *ibid.* post paroxysmum, *ibid.* si continuam mentiantur? *ibid.* si contumax sit, & in quotidianam transierit, *ibid.* si biliosa fuerit, *ibid.* si cum levi ventericuli inflammatione juncta sit? II. 18. si citò curari debeat? II. 20. qualis in eâ conveniat potus? II. 17. quomodo sub eâ tractanda cephalalgia? *ibid.* quatenus in eâ conducatur assiduitas? *ibid.* cortex cardiacæ, *ibid.* cortex chinæ, II. 15. 16. emetica, II. 14. & seq. laxantia, *ibid.* clysteres, II. 16. sâna media, II. 14. venæsectio, II. 17. nocent sedativa, *ibid.* purgantia, II. 16. quid eâ depulsa faciendum? II. 17. ejus recidivæ quomodo arceatur? II. 13. præcaveantur? II. 15. 21. digiti & arte. II. 13.*
- Terriana febris anomala** quæ dicitur? II. 12. qualis sit talis? *ibid.* quas causas habeat procatarticas? *ibid.* continua, in quo differat à semiteriana? II. 41. quâ ratione incedat? *ibid.* quas procatarticas habeat causas? II. 12. bono omine mutatur in intermittentem; *ibid.* ejus in sene fuisse exemplum, II. 19. *Cholera* quæ dicitur? II. 119. duplex in quo differat à quotidianâ, II. 12. 33. à semiterianâ? II. 41. quas causas procatarticas habeat? II. 12. ejus ex simplici enatæ exemplum, II. 19. *Endemia*, quibus locis se se exerat? II. 12. *Epidemia* anni 1721. ejus historia, II. 20. *Intermittens* quo omine mutetur in continuam? II. 12. *Legitima* quæ sit? *ibid.* an exquisitè talis in locis occurrat septentrionalibus? *ibid.* nota qualis dicitur? *ibid.* quibus subjectis, & quo anni tempore sit familiaris? *ibid.* *regularis* quæ dicitur? *ibid.*
- Testes mulieres**, an sint verum ovarium, dubium, I. 77.
- Testis virilium fabrica**, I. 76. non multum ablu-
- dit à corticali substantiâ cerebri. *ibid.*
- Testiculi** quid sint? III. 53. cur tumoribus duris & scirrhis obnoxii? III. 453. *Veneris* quomodo generentur ex gonorrhœâ suppressâ? III. 358. eorum exemplum, III. 425. quomodo in- & exterius tractandi? III. 362. 421. 453.
- TETANUS**, qualis morbus? III. 44. in quo differat à catalepsi? *ibid.*
- THEOPHRASTUS PARACELSUS**, I. 21.
- THEORETICUS** bonus, an sit malus practicus? I. 15.
- THEORIA** cum praxi jungatur; I. 22. medica vera quænam? I. 13. quis ejus character? I. 15. indiget anatomis & physices studio, I. 14. vera rationalis quænam? I. 15.
- THERAPEUTICA** medicinæ pars, I. 14.
- THERAPIA** quid sit? I. 285. veræ fundamentum, I. 149. 285. 292. præcipuum pathologiæ vera; I. 424. objectum, I. 147. consilii maxime in judicio, I. 285. ejus cardo in quo vertitur? I. 171. 289. 290. 292. nictur morborum cognitio, I. 348. nexu gaudet cum physiologiâ & pathologiâ, I. 285.
- THERIACALIA** medicamenta spūsus vomitionis cohercent, I. 214.
- THERMÆ** quæ dicantur? I. 139. earum usus feminis conducit, I. 243. an feminis & spongiosis subjectis conducant? III. 71. sunt aperivæ; I. 260. quatenus ad asthma conducant, III. 100. ad menses suppressos, III. 30. ad nephritidem, II. 249. ad vertiginem? III. 222. cur in statu cachectico inveterato montem accelerent? III. 148.
- THERMOMETRA** commendata, I. 105.
- TIMOR** qui corpora ad contagium recipiendum disponit? I. 203. ejus effectus in corpore? I. 287. vide *Terror*.
- TRACTURA aniphetica Grammani**, ejus usus in hectica; II. 181. causè adhibenda in hæmoptis, II. 208. cur intestinum tormina excutit? II. 287. *bernardica* nocent in purpurâ, III. 408. experitæ virtutis in gonorrhœâ, III. 360. *fulphuris volatilis* quomodo præparetur? II. 348. ejus abusus in metu toporum arthriticorum, *ibid.*
- TINEA capitis** quæ dicitur? III. 495. unde? I. 168. 183. salutaris excretio, I. 120. infantis ætati familiaris, I. 183. quibus morbus ita vocetur? I. 357. retropulsa cur tam periculosa, I. 166. repulsa epilepsiam & capitis morbos, coarctatæ & ophthalmiam gignit, I. 336. III. 15. quænam damna ex tinea capitis repulsa? I. 357. retropulsa quomodo asthma causa evadat? III. 66. 104. rachitidis, III. 489. tussis convulsivæ, III. 111. quomodo tractanda? III. 496. & quæ circa externorum usum observanda cautela? III. 436.
- TINNITUS aurium** unde? I. 92. à membrænarum sensu auditis spaismo, I. 305. à nimis humiditate, I. 306.
- TIRACQUELLUS** illustris hydropota, I. 112.
- TOEPLICENSIÆ aquæ**, earum principia constituta, III. 100. earum virtutes, *ibid.* laudantur ad asthma recidivam arceandam, III. 101. in cardiacâ spasmodicâ, II. 266. in convulsionibus hysterics, III. 60. in hypochondriaco malo, III. 71. in concurant intestinalium dolore, II. 290. in rheumatismo ab hæmorrhoidibus suppressis, II. 326. & singulis hypochondriacis familiari; III. 127. an conducant in adfectibus paralyticis? III. 200.
- TONICUS musus** riget etiam in arteriis, I. 365.
- TONUS** est partium fibrosarum elasticitas, I. 35. in cuet modificat transpirationem, I. 68. partium requiritur ad bonam nutritionem, I. 57.
- TORREI arthritici** ubi nascantur, I. 72. quomodo à veneris

venereis differant? III. 415. à topicorum applicatione non raro oriuntur, II. 351. qualem materiam continent? III. 341. quomodo discutiendi ac resolvendi? II. 350.

TOPICA in morbis articularum præpotenter adhibita graviter nocent, I. 338. cutis efflorescentia repellunt, I. 294. quomodo in applicatione cum illis procedendum? I. 360. 363. ad materiam corruptam in eo priorem locum restituendam varii generis adhibentur, I. 364. quæ convenient in angina? II. 127. 128. cardiologia flauitudo, II. 263. & seq. in cephalalgia tertianarum, II. 17. gonorrhoea? III. 359. & seq. in arthritide cur noxia? I. 298. & quâ cautione in eâ adhibenda? II. 351. 349. & in aurium adfectibus, III. 242. in erisipelate, II. 101. quæ damna in erysipellate scorbutica pariant? II. 103. febribus symptomaticis, II. 187. gutta rosacea, III. 437. hepatitis, II. 145. & seq. illius pullione, II. 282. nephritide, II. 149. & seq. ophthalmia, II. 167. phrenitide, II. 133. pleuritide, II. 139. 141. podagra, II. 348. 352. rheumatismo, II. 322. scorbuto? III. 370. 385. cur in verâ & in veratâ amarofo nullus sint usus? III. 231. & cur præsertim verberibus lumborum cautè applicanda? III. 19.

TORMENTILLÆ radix alvum adstringit, I. 261.

TORMINA intestinalia unde? I. 174. atrocita unde? I. 187. ex dentitione difficili, I. 236. ex quâ causâ senibus familiaria? II. 352. & seq. quomodo à materiâ podagrica existerent? *ibid.* & 341. à materiâ mucida deglutitâ in tussi humidâ infanilis? III. 341. ab incantâ ad pedes frigoris admisione? III. 17. vide *Isotonia*.

Termina ventris atrocita unde? I. 187. ex dentitione difficili, I. 236.

TRANQUILLITAS animi sanitati confert, I. 102.

TRANSPIRATIO conservanda, I. 119. in senibus procuranda, I. 135. libera infantibus servanda, I. 133. plus quam reliquæ omnes excretiones evacuat, I. 68. quibus promovetur? I. 119. semper debet esse salutaris corpore, I. 258. auctior etiam crassiora excremit, I. 68. ubi copiosior succedat? *ibid.* quibus cohibetur? I. 68. cur in senibus languida? III. 412. ejus imminutio à terrore, I. 191. impedita & prohibita valde nocet; I. 68. 135. à prohibitâ post morbum summum periculum metuendum est, I. 358. à quibus causâ prohibetur? III. 313. 399. *suppressa* quomodo contribuat ad ardentem febrem, II. 112. ad arthriticum dolorem, II. 317. ad asthma, III. 96. ad cachexiam, III. 313. ad dysenteriam, III. 154. ad podagram, II. 344. ad scorbutum, III. 373. synocham febrem, II. 105. ad tussim, III. 110. 116. vide *Peripneumonia*.

TRAUMATICA quæ sion? I. 352. quomodo agant? I. 446. quâ ratione his utendum? I. 447. optimum spiritus vini, *ibid.*

TREMOR maouum post potum Coffee quomodo oriatur? III. 403.

TRISTITIA, ejus effectus, I. 36. solvit vires corporis, I. 193. obstructions gignit, *ibid.* ideoque graves producit morbos, *ibid.* morbos alios benignos facit lethales, *ibid.* quo pacto hujusmodi morbi sint præcavendi? I. 194. ejus vis in ventriculum & intestina, I. 170.

TOEMER morbus Hungaricus, I. 249.

TUBERCULA hæmorrhoidalia unde? III. 384. & quid in his in- & externe proficit? *ibid.* in ligamentis rachicorum unde? III. 488. in sterno quomodo asthma tis spasmocidica causâ, III. 108. & seq. inopportuna ejus excisionis exemplum, *ib.*

TUMORES benigni qui dicantur? III. 454. eorum cu-

ratio; *ibid.* *cachellici* unde? III. 312. cautè sunt externis tractandi? III. 322. *glandularum* benigni qui dicantur? III. 452. *colli* sæpe cum hæ venereis junguntur, III. 424. & seq. eorum exemplum, *ibid.* & curatio; III. 425. in *hypochondriis* duri ubi sedem suam quam maxime habent? III. 66. 267. 270. *inguinalium*, vide *Bubones*. *Mahqui* qui dicantur? III. 454. in *mesenterio*, dorso, duplicatâ peritonæi, utero & ovario gignuntur, I. 326. *adenomasi* tertianæ succedentes quomodo tractandi? II. 17. *pedum* in viscum obstruktionem laborantibus familiaris sunt, III. 411. in asthma quomodo generantur? III. 95. quo casu quantæ superveniunt, præsentem diarrhoeam? II. 32. sub febre nati adeo periculosi non sunt quam qui post eam remanent; *ibid.* sponte aperti hydropem sæpe solvunt, III. 334. & quomodo hi tractandi? III. 33. generantur cautè sunt tractandi, & quomodo? *ibid.* & 316. & quando scarificatio in his conveniat? III. 333. cur Carolinis citò abigantur? II. 245. retroculi quæ damna pariant? III. 111. 119. 309. 333. *podagrici* quomodo tractandi? II. 350. *rupi* subitaneis hydropis causâ; I. 326. *sanguinei* quomodo oriuntur? III. 454. ejus in brachio aperti lethale exemplum, *ibid.* in crure lapsu oborti & curati casus, *ibid.* *stercinei*, eos nimis citò aperire non decet; III. 380. *serpenti-symphictici* intra membranam duplicatam colliguntur, I. 326. difficulter à priori cognoscuntur. *ibid.*

TUNICA intestinalium villosa quid? I. 63. *pirinaria* narium, I. 72. 94. ipsius affecta mucis excretionem impedit, I. 305. & odorem cum gustu laedit, *ibid.*

TURCKA, quare vini potus illis interdicitur? I. 490.

TURIS quæ dicatur? III. 109. cur maxime generetur tempore verno? I. 266. in infantili ætate frequens est; III. 495. ejus variz species præbè discernendæ, I. 298. auct circulum sanguinis, I. 47. quandoque salutaris excretio, I. 120. 288. 347. 410. ejus causâ formalis, III. 110. ex quibus causis oriatur? I. 166. 175. III. 110. à vermicibus, I. 236. quandoque à venæsectione gignitur, I. 466. ex variolarum & morbillorum reliquiis, I. 354. & seq. sub tertianæ paroxysmi unde oriatur? II. 11. spasmus stipatur, I. 305. quos morbos comitatur? III. 110. prognos, III. 112. Celsi ei medendi methodus, III. 115. pectoralibus cautè excipiendâ, I. 347. 441. in eâ utilis massa pilularum de styrae, I. 317. Vide *Expectorantia*. quatenus in eâ conducant aodyna, III. 113. 115. bezoarics & diaploetica, III. 113. externa, *ibid.* incideria, III. 112. in crassitas & temperantia? *ibid.* quæ in ipsius declinatione conveniant? III. 113. qualisque distat III. 114. infantili quibus sananda? III. 495. morbillis accedens quomodo tractanda? II. 67.

Tussis Catarrhalis unde oriatur? III. 110. quomodo differat à phibica? III. 117. à rheumaticâ? III. 118. ipsius exemplum, *ibid.* cum hæmorrhæa junctæ casus; III. 117. sæpius recurrentis exemplum, *ibid.*

Tussis Convulsiva ab irritatione laryngis & tunice bronchiorum, I. 306. & venarum cruditatibus; I. 315. infantibus familiaris, I. 298. cur ei complicea vomitus? I. 315. periodica unde? I. 286.

Tussis serina phibica minus salutaris naturæ motus, I. 412. serina five convulsiva causâ & sedes, I. 474. unde oriatur? I. 187. ejus historia, III. 121. perpetuò morbillis comitatur, II. 63. epidemice non raro grassatur, III. 111. cur infantibus familiaris? III. 470. causa materialis, III. 111.

III. 111. quâ ratione abortus, **III. 179.** & vomitus infantilis causa existat? **III. 146.** ejus infancilis casus, **III. 121.** epidemice exemplum, **III. 115.** in gravidâ casus, **III. 112.** quatenus in eâ conducant laxantia? **III. 113.** quomodo in catarrhali benignâ, **II. 46.** & ab exanthematibus retrogressis orta tractanda? **III. 114.**

Tussis habitualis quæ sit, ejus exemplum, quomodo tractanda? **III. 112.**

Tussis humida cur frequentior? **I. 199.** à pulmonum atonia, **I. 307. 351.** ejus diuturnæ exemplum, **III. 116.** difficilis curatio, **I. 307. 351.** dulcis non fert, **I. 352.** quæ in eâ mala ex abusu pectoralis dulcium enascantur? **III. 116.**

Tussis hypochondriaca, ejus cause & signa, **III. 112.** ejus exempla, **III. 117. 121.** quomodo curanda? **III. 115.**

Tussis phthisica quæ dicatur? **III. 110.** ejus signa, **I. 298.** ejus in juvene curatæ exemplum, **III. 117.** cum corporis tabe fragis hortenlibus sanata: **III. 294.** venesectione mutatur in hecicam lethalem: **II. 183.** quibus externis tractanda? **III. 113.**

Tussis pulmonalis quæ? **I. 298.**

Tussis purulenta, quando abscessum mesenterii sequitur? **III. 176. & seq.**

Tussis rheumatica quæ dicatur? **III. 111.** quibus familiaris? *ibid.* quomodo à causâ externâ nascitur? *ibid.* ejus in fene salutaris exemplum, **III. 120.** ab oedemate pedum retro pulso orta casus, **III. 119.** & quomodo ea tractanda? **III. 114.** cum scorbuticâ humorum diathesi juncta quomodo curanda? *ibid.*

Tussis serena unde dependet? **I. 242.**

Tussis sicca juvenibus familiaris. **I. 183.**

Tussis stomachalis sicca vel humida, **I. 298.** ejus cause & signa, **III. 112.** ejus materia latet quandoque in duodeno; **I. 298.** quomodo tractanda? **III. 114.** cautelæ generales circa anodyna, **III. 115.** dulcia & expectorantia, **III. 114.** & venesectionem. **III. 115.**

TYMPANITES quid? **I. 332.** à flutibus intestina distendentibus, *ibid.*

TYMPANICA affectio quæ dicatur, **III. 340.** signa, **III. 323. 341.** non semper cum ascite jungitur, **III. 342.** quandoque tamen, *ibid.* causa proxima, **III. 341.** quantum ad eam faciant bilis vitia? **III. 343.** infantibus vermicibus laborantibus familiaris est; **III. 342.** in puerperis uode? *ibid.* varios & morbillos non raro sequitur, **III. 340.** prognosis, **III. 343.** ipsius curatæ exemplum, **III. 345.** cordis casus, **III. 274.** cum materie purulente ex utero effluxu casus, **III. 345.** quomodo tractanda per clysteres? **III. 343.** laxantia cum anodynis juncta, *ibid.* roborantia interna, *ibid.* & externa; **III. 344.** quomodo tractanda in plethorico hemorrhoidali flatu? *ibidem.* & ex uteri vitio; *ibid.* cautelæ circa calidiora remedia, & purgantia. *ibid.*

V.

VACUUM una aucta supprimit alteram; **I. 231.** plures prohibet morborum initium, **I. 259.** non ita facile in ordinem restituntur. *ibid.*

VACUUM cur necet animantia? **I. 264.**

VALETUDO, ejus servandæ optimum consilium, **I. 258.**

Valledinarum laeduntur à cibo nimio. **I. 114. & seq.**

VALSALVA, **I. 20.**

VALVULA coli, **I. 87.** venarum, earum usus. **I. 41.** vaforum lymphaticorum. **I. 58.** earum magna sensibilitas. **I. 87.**

Frid. Hoffmanni Oper. Tom. III.

VAPOROSA, eorum effectus. **I. 95.**

VARIUM ratio. **I. 49.**

VARIOLÆ, earum historia, **II. 49.** indoles ac natura, **I. 358.** unde earum origo & universalitas sit deducenda? **II. 50.** in quo cum morbillis conveniunt, **II. 62.** & discrepent? *ib. & seq.* distinguendæ ab aliis exanthematibus, **I. 293.** certis familiis magis sunt funestæ; **II. 61.** cur non in omnibus æque benigne procedant? **I. 172.** cur frequentiores? **I. 185.** senibus rariore, **I. 190.** qualis in iis sanguis, **I. 374.** ante & post eruptionem pulsus? **I. 371.** cur maxime generentur tempore verno? **I. 266.** naturæ methodum & ordinem quam maxime sistunt; **I. 414.** in Turcia per impositionem producuntur; **I. 205.** totum systema nervosum subito adoriuntur, **II. 50.** hinc epilepsia eas sequi vel antecedit, vel subsequitur, **II. 12.** quotuplices? **I. 293.** earum est triplex genus, **II. 51.** oriuntur primariò ex corruptis humoribus **II. 50.** qui latent in medulla spinali, & quomodo inde se extricent? *ibid.* earum materialis causa est indolis causæ & putrescentia, *ibid.* & intra tubulos partium solidarum abscondita; **II. 60.** earum signa suspecta & funesta, **I. 393.** **II. 51. III. 482.** & malignitatem indicantia; **II. 61.** mala ex illis provenientia, **I. 357.** quid in iis significet alvi fluxus, **II. 51. 55.** hæmorrhagiæ excessivæ, **II. 55. 66.** sudores largi, **II. 54.** an forez nigricantes in earum medio funestum semper præbeant signum? **II. 56. & seq.** quando magis benignæ, & magis malignæ sint? **II. 59. III. 482.** incongrue periculosiores; **I. 183.** quæ subiecta gravius vel minus iis decumbant? **II. 50. 62. III. 482.** salutariter per iram excitatæ, **I. 185.** solvunt interdum quartanam, **II. 25.** cur in dorso & pectore maneant molliore; **II. 57.** unde in illa oriuntur abortus, **II. 55.** convulsiones, **II. 61.** menstruorum copiosior fluxus, **II. 55.** vomitus? **III. 142.** quomodo in iis mors eveniat? **II. 52. 61.** earum eruptio quo casu tardior fiat in facie? **II. 61.** quomodo retardetur à vitio primarum viarum, *ibid.* & à sanguinis abundantia? **II. 53.** num sint coartatiore? **II. 52.** quæ post eas remaneat valetudo? *ibid.* & cur epiphoram sæpe relinquant, **III. 234.** & dispositionem ad phthisin? **III. 286.** quo fundamento nitatur earum insitio? **II. 52.** retrograde; **I. 187.** retropulsiæ cur tam periculose? **I. 166.** crises servant, **I. 388.** per ipsarum cum dispendio recedunt, **I. 302.** earum reliquæ multos gignunt morbos, **I. 354. & seq.** hinc sollicitæ evitendæ, **I. 355. 420.** ex illis difficilioris sanationis interdum viscera sequuntur, **I. 358.** in principio possulant emetica vel laxantia. **I. 415.** Benigne quibus signis cognoscuntur, & quæ invadant corpora? **II. 51.** unde malignæ fiunt? *ibid.* unde in iis hæmorrhagiæ oriuntur? *ibid.* quæ sint inter has media? *ibid.* exempla earum ex obstructâ alvo cum insolitis pathematibus complicatarum, **II. 59.** malignarum ex vitio materni succi, *ibid.* post scabiem, morbillos, & furunculos curatarum, **II. 60.** in gemellis diversarum, *ibid.* septimo die funestiarum, *ibid.* in lactante dentitione curatarum, **II. 61.** post situm erectum lethali, *ibid.* emetico laxante sub eruptione levatarum; *ibid.* ex calore regiminis & pharmacorum exacerbatarum, **II. 62.** cancrum labii corruptionem cum funestis eventus relinquentium; *ibid.* iis si malignæ fuerint, etiam exsiccatæ non esse fidendum; **II. 60.** quando sponte curescent? **II. 52.** quæ sint curandi indicationes? *ibid.* quomodo tractandæ in lactantibus? **II. 61.** quid in iis faciendum ante eruptionem, **II. 52.** sub eruptione, *ibid.* in suppuratio

D d d

puratione, *ibid.* & exsiccatione? *ibid.* quomodo tractari sub iis debeant æstus nimius, II. 53. aphthæ, *ibid.* ardor sanctorum, *ibid.* & 58. deliria, II. 58. diarrhoea, *ibid.* & 65. epilepsia, II. 53. hæmorrhagiæ excessivæ, II. 54. 58. 66. oculorum vitia, II. 58. tormina ventris, III. 483. salivatio nimia, II. 53. tussis cum ræcedine, III. 483. vomitus? *ibid.* & II. 53. quâ cautione alvus docenda ante eruptionem, II. 54. sub suppuratione? *ibid.* quomodo cutis & facies præcavenda à vitio? II. 55. III. 483. nares & oculi defendendi? II. 53. III. 483. quatenus in iis convenient emetica, II. 53. venæsectio, *ibid.* vesicatoria? II. 55. quomodo arceant confluens, *ibid.* expellendæ retrocedentes? II. 54. 58. quæ damna oriuntur ex calidis expellensibus? II. 54. qualis ad earum curationem requiratur aer, *ibid.* victus? III. 484. an lecti & linteaminum mutatio conveniat? II. 54. quomodo post eas sint præcavendi morbi? II. 55. 60. excipientes eas morbi quomodo tractandi? II. 60. III. 484. epidemica anni 1698. contrahantur ex & sine contagio? II. 56. quæ symptomata antecesserint eruptionem benignarum, *ibid.* malignarum? *ibid.* quæ signa fuerint eruptionis bonæ, *ibid.* malæ? *ibid.* quomodo mors contingerit? II. 57. quomodo successerint suppurationi in benignis, *ibid.* malignis? *ibid.* suppurationis singularis successus? *ibid.* quomodo successerint exsiccatio? *ibid.* quæ post eam evenierint symptomata? *ibid.* num omnino præservari poterint? *ibid.* quibus mediis mitiores fuerint reddita? *ibid.* quid ab usu liquoris antivariolosi in iis eveniret? *ibid.* quomodo tractata fuerint ante eruptionem? II. 58. in eruptione, *ibid.* suppuratione, *ibid.* exsiccatione? *ibid.* quomodo symptomatibus obviam itum fuerit? *ibid.*

Variolosa febris, quæ dicatur? II. 49. secundaria qualis dicatur? II. 186.

Vasa fetus & secundina vasis uteri non sunt continua, I. 79. lactes quem recipiant? I. 64. sanguines minima cur inter membranas decurrant? I. 41. cur inter musculos & membranas sita sint? I. 36. corporis cum corde æqualem habent proportionem, I. 242. breviter facile rumpuntur, I. 327. rupta vomitum cruentum faciunt *ibid.* sæpe lethalem; I. 341. sanguifera, earum atonia causa morborum, I. 307. rumpuntur quandoque & mortem gignant. I. 327.

Vasorum ventriculi & intestinorum reptatus & anastomosis. I. 48.

Vectura quo tempore instituenda? III. 59. 72. quibus conveniat? I. 122. infirmis, III. 59. 72. hypochondriaci, III. 72. 73. in minus adjectis gravidis abortum provocat. III. 179.

Vegetabilia alimenta seni proba, I. 135. cruda ægrè concoquuntur, I. 109. stultentiam excitant; *ibid.* non habent sexum. I. 76.

Vena porta, I. 48. ejus cum cavâ in hepate concurrit, I. 62. peculiaris structuræ & officii, I. 342. evoluta quoad structuram in pathologicis vitio, I. 20. causa est multorum affectuum chronicorum, I. 48. atonia affecta morborum causa, I. 307. fluxus hæmorrhoidalibus causa; I. 342. impedio per eam progressu sanguinis morbos creat; I. 317.

Vena umbilicali fabrica. I. 79.

Vena & arteria sunt ductus continui, I. 41. habent tunicam muscularem, *ibid.* juvant sanguificationem, I. 50. arteris continuæ. I. 365.

Venesectio ad vitam longum periculum, I. 242. & unum ex præcipuis remediis, I. 260. 455. pro vasorum repletionis, atque & vitio est instituenda, II. 414. III. 431. an certis temporibus sit allegata? II. 108. quando tempellere instituat? I. 139. cur vere utiliter instituat? I. 454. cur circa æquinoctia & solstitia maxime conveniat? III. 29. 71. non semper ad æquinoctium differenda, I. 454. ter in anno quibuscumque celebranda; *ibid.* intempore retroPELLendi pollet facultate; I. 207. quæ ante & post illam observanda in diætâ? III. 73. 225. quid in ea respiciendum? I. 215. temere reformidandum; I. 154. quâ ratione sub operatione de situ erecto animi deliquia eveniant? III. 274. cur præsentem convulsionem aut spasmo sit noxia? I. 175. eundem quàm scarificatione elicit sanguinem, I. 374. naturæ opus in morbis juvat, I. 413. ad longævitate conferit I. 455. utilis est ad præcavendos morbos, I. 454. si lingua crassus & ater; I. 373. quibus cautelis admissanda? I. 461. sit sufficiens, I. 460. in sensibilibus quomodo perpetranda, I. 459. perperam superato viâ morbo adnascatur, I. 458. quibus indicetur & interdiciatur? I. 454. quoties in statu graviditatis, quo loco & tempore sit instituenda? III. 406. aquarum mineralium usus est præmittenda, I. 272. emmenagogorum usus, III. 62. salivationis curæ, III. 419. & sudoriferorum ac spirituosorum usus, III. 328. III. 251. an sensibus conducatur? I. 135. 455. III. 251. juvenibus prodest, I. 134. quando in febribus, licet sint subjecta plethorica, contraindicetur? II. 19. & *seq.* est optimum plethoricarum præservativum, II. 149. multa plethorica præstat emolumenta; I. 321. in angina periculosa, I. 459. præcavet & arceat abortum, I. 136. 353. III. 180. 184. alvum quandoque movet, I. 455. arceat apoplexiam, II. 244. utilis est in apoplexiâ leviori, I. 458. arthritidem & rheumatismum arceat, II. 320. calculum, II. 302. cardialgiam, II. 265. catarrhales deflusiones, II. 48. catarrhos quandoque advocat, I. 460. utilis in colica convulsiva, *ibid.* nocet in colica flatulenta, *ibid.* in capitis morbis à congestione prodest, I. 458. impedit erysipelas recidivum, II. 103. utilis in exanthematicis, I. 456. in via cum distinctione administranda, *ibidem.* in febribus continuis & acutis, *ibid.* arceat hæmorrhagias, II. 136. easque sæpe promovet, I. 455. utilis in morbis ex suppressione hæmorrhoidum, I. 344. hypochondriaci, I. 317. hysterici, *ibidem.* arceat icterum, III. 283. inflammationem, I. 408. II. 279. phthisin, III. 292. ubi instituenda in paroxysmis? I. 459. quandoque in iis noxia, I. 457. utilis in pleuritide & pneumoniâ, I. 459. in pleuritide quandoque empiema ciet, I. 354. podagram quandoque cum damno reprimat, I. 339. arceat polypos, II. 86. pulsum mutat, I. 369. utilis in renum vitio, I. 353. systolem cordis & vasorum augeat, I. 321. arceat tussim rheumaticam, III. 115. urinam elicit, I. 455. quatenus & quando conducit in acutis malignis & exanthematicis morbis? II. 96. in angina, II. 127. & *seq.* animi deliquiis, III. 273. apoplexiâ, II. 243. ardentibus febribus, II. 112. arthritide & rheumatismo, II. 320. & *seq.* asinmate, III. 99. audacia visis, III. 243. cachexiâ, III. 316. calculo renali, II. 302. catarrhali febre; II. 47. 49. cholera, III. 169. colicâ periodicâ, II. 290. convulsionibus, III. 27. 29. cutis adfectibus, III. 431. dysenteriâ, II. 44. 172. III. 158. epidemicis febribus, II. 40. in erysipelaceâ febre, II. 98. fistularum curatione, III. 464. in gravidis quantâ laborantibus, II. 27. gonorrhœâ, III. 361. 362. hæmoptysi, II. 205. hæmorrhagiâ narium, II. 199. hæmorrhoidibus suppressis, II. 323. hydropse, III. 332.

III. 332. hypochondriaco malo, III. 71-73. hy-
stérico malo, III. 55. ictero, III. 306. in inflam-
mationibus, III. 122. speciatim hepatis, II. 145.
renum, II. 104. ventriculi, II. 122. uteri, II. 165.
lochii promovendi, II. 290. & suppreſſis revo-
candis, II. 158. 160. 164. lue venerea, III. 418.
menſium ſuppreſſione, III. 28. miſtu cruento,
II. 234. mortalis, II. 64. odontalgia, II. 311.
ophthalmia, II. 166. 167. palpitatione cordis, III.
88. peſſentia, II. 95. 98. petechiali febre, II.
88. 89. 91. petechizante febre, II. 79. 82. phre-
nitide, II. 132. 134. 135. pleuriſide ſpuria, II.
137. 141. pneumonica febre, II. 139. & ſeq. po-
dagri, II. 344. 346. purpura, II. 73. III. 406.
ejulque eruptione juvenili, II. 73. quartana, II.
27. quotidiana, II. 35. ſcorbuto, III. 379. ſim-
tertiana, II. 42. ſingultu, III. 127. in ſoporosis
affectibus, III. 214. ſuffuſione oculorum, III.
236. ſynocha, II. 106. 109. ſynocha catarrhali,
II. 110. tertiana, II. 17. nulla, III. 115. variolis,
III. 73. veragine, III. 221. vefice vitæ, II. 130.
vomitu, III. 146. vomitu cruento, II. 215. vul-
neraria febris, II. 186. quid ejus loco febrici-
taſionibus ſir tuendū? II. 179. quando nocet
in defectu hæmorrhoidalium? II. 179. in beſtica?
II. 183. maligna? II. 84. purpura? III. 408.
virium dejectione? III. 275.

Veneficia in brachio quando inſtituenda? I. 459.
laudatur in adheſione hydroſico, III. 339. hæ-
morrhagiæ uteri, II. 226. in hæmorrhoidibus cœ-
cis, II. 289. & nimium fluentibus, II. 221. mi-
ſtu cruento, II. 234. vomitu cruento; II. 214.
raro convenit in malo hypochondriaco, II. 73.
nocet in cardiſigia, III. 175. in polyperum præ-
ſentia, III. 339. evacuatoria, revulſoria, & de-
rivatoria quæ? I. 459. in fronte, quando in do-
lore capitis conſtat? II. 249. delirio, III. 262.
gutta ſerenâ? III. 230. in fronte, jugulo, & po-
ne aures non ſola leioper ſufficit, I. 458. & ſeq.
jugularium, quæ ante earum ſectiōnem obſer-
vanda? III. 91. quem habet ulum in angina,
II. 127. apopleſia, III. 198. in epileſia, III.
15. 16. melancholia & mania, III. 257. palpi-
tatione cordis, III. 88. phrenitide? II. 132. ſub-
lingualium, quid de æſtendiū in odontalgia,
II. 332. in phrenitide, II. 132. in ſynocha?
II. 107. 109. in cephalalgia & ophthalmia utili;
I. 458. ſed in angina periculofa I. 459. *negleſta*
in ardente continuâ eſt noxia, II. 118. multum
in ſenibus ad coma ſomnolentum contri-
butus, III. 210. ad vefice vitæ, II. 316. quomodo ex in lo-
chiorum defectu moriem inferat, III. 407. phre-
nitidem? II. 135. quâ ratione epileſiæ cauſa
exiſtat, III. 23. ſebrium intermittentium, II. 24.
hæmorrhoidum nimii fluxus, II. 219. mali hy-
ſterici, III. 57. 62. peripneumonia? II. 140. *ni-
mæ* in inflammationibus, I. 408. & ſi ſanguis
tenues & floridus noxia; I. 373. nimia & intempe-
ſtiva quibus morbus anſam præbet? I. 361. in
pede quando inſtituenda? I. 459.

VENENA quid? I. 195. eorum tres notæ eſſentiales,
ibid. & 203. variant juxta regna nature, I. 195.
ratione doſes differentes edunt effectus, III. 172.
& ſeq. ſigna funeſta, I. 393. latum ſigna vera,
III. 170. 172. & dubia, *ibid.* eorum claffis la-
tè paſet, I. 174. 207. certis tantum animanti-
bus noxia, I. 198. operatio quomodo rectiſſimè
explicetur, I. 235. aliarum cauſarum morborum
indolem declarat, I. 172. ſumma partium tenui-
tate ſuas præſtant operationes, I. 148. in aère
contenta, I. 207. corporis humani, I. 201. ex
regno animali, I. 195. ex minerali, I. 196. mi-
neralia vera veteribus incognita, I. 197. in
Frid. Hoffmanni Oper. Tom. III.

quas partes corporis vim ſuam ſuneſtam exer-
ceant? I. 198. vis multiplicativa in quibus cor-
poribus ſe ſe maximè extendit? I. 203. cur intrâ
autem admiffa plus nocent, quam majori doſi
intus ſumpſa? I. 199. eorum operatio ſub
paroxyſmo frigoris ceſſet? II. 123. quæ potiſſi-
mum faucibus ſine infecta? II. 126. quâ ratione
in ventriculo operentur? II. 112. III. 166. &
ſeq. 172. cauſa moris ex iſis ſphaceus ventriculi
& inſeſtionum, I. 400. & ſeq. quomodo mortem
abſque ſphacelatione accerſant? II. 123. ſpha-
celum ingignunt, I. 324. 393. non proximè inſtar
mationem inducunt; I. 312. celerrimè totum cer-
vofum ſyſtema afficiunt, I. 317. pulſum mutant,
I. 369. per ſpafmum necant, I. 306. 312. cauſa
cur celeriter perimant hominem? I. 160. eor-
um antidota oleoſa, I. 312. corroſivorum ac
draſticorum remedia, I. 201. vis quo pacto ex-
ternè coarctanda? *ibidem.* coctione deſtruitur, I.
214. quibus ſymptomata ab ipſis concitata tol-
lenda? II. 261. III. 168.

VENEREA medicamina virulentam habent naturam,
I. 227. ideo ab iſis cavendum in corporibus in-
firmis, I. 228. quem uſum habeant circumſpectè
uſurpata, *ibid.*

Veneræ lues ex gonorrhœâ malè curatâ oriſi po-
teſt, I. 340. dolores quibus ſignatur diſtinguendi
ab arthride, I. 298. pulſus in eâ languidi, I.
371. ſerumque ſanguinis limofum, I. 375. &
ſeq. non ſemper ſalvatione eget, I. 443. balneis
vaporofis levatur, I. 427. ejus ſpecifica, I. 423.
& ſeq.

VENTER naturâ apertus magna ſanitati pars, I. 258.
ejus dolor à vermicibus, I. 235. roſionum ſedes,
I. 179.

VENTI orientales & ſeptentrionales egregiè pur-
gant aërem, I. 212. ſalubres & inſalubres, I. 264.

VENTRICULUS, ejus ſtructure, III. 66. & præcipuè
membranacea conſideratur, III. 140. & vaſculo-
ſa, *ibid.* à quâ pari nervos accipiat? *ibid.* con-
ſenſum alit cum omnibus nervofis partibus, I.
158. 312. cum capite, I. 313. III. 223. faucibus,
II. 129. veficâ urinariâ; II. 152. oſtophago, I.
314. diaphragmate & pulmonibus, I. 315. du-
ctibus biliaris, I. 314. inſeſtina, *ibid.* renibus,
I. 315. 353. pedibus, I. 315. cute, *ibid.* ejus actio
ſyſtematica, I. 60. ſenſibilia, I. 29. valv. I. 48.
poſt morbos cibis non debet oppleri, III. 384.
cur non ipſe a calore & fermento ſalivâ conſu-
matur? I. 60. cur plurimorum morborum officina,
I. 179. cur tam gravibus ſtricturis ſpaliſcia
ſit obnoxius? I. 164. robuſtus plus ferre poteſt
nutrimenti, I. 247. in omnibus ferè morbis ejus
actio læditur, I. 312. à nimis ſtudio, I. 313. &
morbis maximè debilitatur, I. 349. ab anti-
pathematibus afficitur, I. 313. à vermicibus obſide-
tur, I. 331. illius deſtructio ad quenam mala
diſponat? I. 361.

Ventriculi atonia quæ pariat mala? I. 306. 321.
quibus ſuſcinda? vide *ſtemachica. eroſio* diſſert
ab ejus inflammatione, I. 294. quæ habet ſigna?
I. 333. *expaſio* bilem exprimit, I. 62. qualia in-
ferat damna? III. 66. *inflammatio* exitialis, I. 185.
quæ ſit levior, quæ gravior, II. 121. in quo diſ-
ſerai à cardiſigia, I. 294. II. 120. ab ejus eroſio-
ne, *ibid.* inſeſtionum inflammatione, *ibid.* &
aliis inflammationibus? I. 294. inflammatione
ructuoſe unde? I. 186. *ſerulis* in acutis ſigna, I.
392. quibus ſignis cognofcatur præſens, II. 120.
& 214. & imminens in febrilibus intermittētibz?
II. 19. ejus cauſa proxima, II. 120. cauſe me-
diatæ procatarrhice, *ibid.* quomodo generetur in
variis morbis? *ibid.* ex meſium ſuppreſſione,
Ddd 2 I. 341.

1. 341. erysipelate male tractato, I. 338. præpos-
tremo topicorum usu in morbis articularum, *ibi-*
dem. potu frigido mitior, I. 295. quando in
sphacelum abisse judicanda, *ibid.* exempla ejus
ex vomitorio post iram lethalis, II. 122. ex vitro
antimonii, II. 123. ex arsenico imminens, *ibid.*
ex potu frigido & vomitorio, *ib.* decimo demum
die funestas, II. 124. ex vomitorio & sale purgan-
te post iram lethalis, *ibid.* duodeni pulmonis &
diaphragmatis lethalis, II. 125. quomodo immi-
nere præcavenda? II. 19. eam curandi indica-
tiones, II. 121. ab iracundiâ, *ibid.* & *seq.* à vengo-
no, *ibid.* quatenus in eâ convenient anodyna,
II. 122. topica, II. 121. & *seq.* venæsecção? *ibid.*
inflatio differt à cardialgia, I. 297. ejus signa,
ibid. & 332. ab atoniâ ipsius oritur, I. 306. ex
suppressione mensium, I. 341. infantibus & hy-
pochondriaci sollemni, I. 297. 332. *spasmus* pa-
rit cardialgiam, I. 303. inflationem nec non vom-
itum; I. 304. *sphacelus* quæ signa habeat? I.
324. quomodo cognoscatur? II. 124. ex veneno.
I. 324. 401. *ulcus* observatum I. 326. quæ signa
ipsius? *ibid.*

VENUS; ejus desiderium quando primum excitetur?
III. 53. ipsum supprellum sæpe epilepsie, III.
12. & palliois, hysterice causæ; III. 53. exer-
citiū moderatum sit, I. 119. astase vitandum,
I. 136. quale optimū, I. 119. immoderatum
exercitiū debilitat, I. 76. 349. omnes func-
tiones lædit, III. 79. & *seq.* solas partes destruit,
III. 69. caput hebetat, II. 344. & vires animi ac
corporis deiecit, III. 254. quomodo ad apople-
xiam disposat, II. 247. ad anthraxidem, II. 377.
auditus vicia, III. 254. gonorrhœam benignam?
III. 358. præmaturum disponit ad convulsiones,
III. 25. ad epilepsiam, III. 12. ad guttam serena-
m, III. 229. ad oculorum suffusionem; III.
235. maxime hæmorrhoidis II. 207. & podagrica
dissidendum. II. 344. rânium & intemperivum
facit ad colicam & cardialgiam, I. 298.

VEN, eo tempore cibi detrahendum, potus au-
gendus, I. 135. est aer temperator, I. 104. qua-
lis in eo pulvis? I. 368. oportet corpus munire
adversus vicissitudines noctis, *ibidem.* transpiratio
impedita maxime nocet; *ibid.* quos gignat morbo-
s? I. 334. febres generantur aliique morbi,
I. 135. cur eo catarrhales febres sint frequentio-
res, II. 44. cutis adfectus, III. 417. hæmorrha-
giæ narium, II. 197. & tussis? III. 111. & *seq.*
cur febres quarantæ curationi faveat? II. 25.
cur eo pejus habeant hypochondriaci? II. 49.

VERATRUM, ejus à veteribus in delirio variis ex-
hibendi modus. III. 259.

VERMES quid sint? III. 490. quonuplices sint? *ibid.*
eorum varia genera, I. 331. unde generentur?
III. 491. signa & symptoma, *ibid.* & 248. quos
morbos procreant? I. 235. & quæ symptoma
excitant? *ibid.* ob consensum intestinorum atrocia
cient pathemata, I. 315. etque insolita; I. 332.
cur ab eis concitata pathemata maxime circa me-
ridiem & vespertam exacerbentur? III. 497. &
qua ratione ea fuscitent? III. 26. in ilco luben-
ter boligitantur, I. 332. vel crassius, *ibid.* vel in
ventriculo, *ibid.* passioni illarum similes ferè ex-
sistant dolores, III. 345. cum omnibus ferè infan-
tilibus morbis sunt complicati; III. 10. quibus
morbis se se maxime afficiunt? III. 491. cum lue
venereâ junctorum exemplum; III. 423. quò de-
mum necent? I. 402. sæpe vomitum excernuntur,
III. 143. quâ ratione aphoriam inducant? III.
250. cardialgiam, II. 259. catalepsim, III. 47.
colicam, II. 286. convulsiones, I. 332. III. 26.
epilepsiam, III. 12. sceleris, I. 332. illarum pas-

sionem, II. 284. motus spasmodicos viget, III.
36. vertiginem, III. 221. non tantum vivi, sed
& motus maxime nocent corpori, III. 42. & ii
in adultis non raro convulsionum causa existunt,
III. 26. prognosia, III. 450. curatio, III. 492.
quomodo intestini innudantes exturbandi? III.
492. cautelar circa purgania, *ibid.* & externa,
ibid. non semper purgantibus expelluntur, I. 236.
prædictis adversus eos. I. 452. in aures ab extra
ingressi quomodo evocandi? II. 338. Vide *Af-
ferides, Lumbrici.*

Vermiculorum in aëre copia morborum malignorum
causa & prælagium, I. 210.

Vermiculatio sensus in pedibus in uno situ deten-
tis unde? II. 342.

du VERNET, I. 20.

VERTIGO quæ dicatur? III. 219. ejus incurabula,
I. 179. ejus gradus, *ibid.* in quo differat à guttâ
serenâ, III. 228. symptomata & signa, III. 219.
sedes, *ibid.* ratio formalis, III. 220. causa proxi-
ma quæ? I. 306. causæ occasionales & mediatæ,
III. 221. quandoque ex ventriculo, I. 313. ex
crassâ lactea repulsa, I. 336. lochiorum suppres-
sione, I. 342. sæpe cum passione hypochondriacâ
jungitur, III. 224. cum nephritide, III. 223. e-
jusque ratio; III. 220. cur jejuno ventriculo ma-
ximè invadat? *ibid.* & *seq.* prognosia, *ibid.* cadu-
car exempla, III. 227. ejusdem cum sensuum ab-
olitione, & artuum impotentia junctæ, III.
231. cum passione hypochondriacâ, *ibid.* cum
nephritide callosâ ex plethorâ ortæ, III. 303.
ipsius casus cum obtundatione oculorum & au-
diu difficili chronica, III. 227. ex frigore pe-
dum & immoderato vini potu obortæ, III.
226. cum catarsâ spiritali junctæ, III. 224. per-
tinacis ab ira enatæ, III. 225. ex debilitate ven-
triculi ortæ, III. 224. stomachalis, III. 225. cu-
ratio generalis, III. 221. melius scarificationem
fert quam venæsecctionem. I. 461. chronica idio-
pathica quomodo tractanda? III. 222. hypochon-
driaca, III. 221. & sympathica? *ibid.* nephriti-
ca quomodo sananda? III. 222. in gravidis quo-
modo tractanda, *ibid.* quatenus in eâ convenient
roborantia? *ibid.*

VESTICA, ejus structura & functio I. 71. ejus consen-
sus cum intestino recto, II. 153. cum ventricu-
lo, II. 152. cum utero, III. 52. à quo pari nervo
suos accipiat, III. 26. cur spasmus obnoxia? II.
308. scirrhus afflictor sæpe, I. 328. & ulcus
contrahit, I. 327. atonia affecta calculum concipit,
I. 307. ejus sphindler, vide *Sphindler*.

Vesica calculus, ejus signa & symptomata, II. 308.
ejus *erosio* ex quibus cognoscenda? II. 233. ea est
sæpe miclis cruentis causa, *ibid.* inflammatio le-
visior & gravior qualis sit, & unde oriatur? II.
152. ejus signa pathognomonica, *ibid.* causa pro-
xima, II. 308. quomodo à cantharidibus impro-
vidè datis oriatur? III. 361. à gonorrhœâ, II.
153. ex hæmorrhoidibus supprellis *ibid.* à meris-
tibus cessantibus, II. 308. ejus prognosia, II. 153.
quomodo mori in eâ contingat? *ibid.* exempla
ejus hæmorrhoidibus funestas, II. 155. à materiâ
acri lethalis, *ibid.* opiatu usu funestas, *ibid.*
& *seq.* quomodo tractanda? II. 154. ejus morbi
invenietur cur difficilior curentur? II. 153. in iis
laudantur seltzeræ, II. 154. vinum dulce; *ibid.*
quatenus conveniat lac, *ibid.* venæsecção? *ibid.*
nocent nitrofa; *ibid.* ejus *scabies* quid? II. 310.
sæpe cum gonorrhœâ jungitur, III. 309. *spasmus*
qui dicatur? II. 308. sæpe calculum inherentem
mentitur, *ibid.* quæ inducat symptomata? II.
314. & *seq.* ad superiora portecus quæ fuscitent
in intestinis pathemata? II. 309. ejus causa intra
ipsa

ipſis tunica interdum continetur, II. 155. ſæpe per intervalia invadit, II. 310. quomodo a gonorrhœa oriatur? II. 309. ab inflammatione uterini recti, *ibid.* a materiâ arthritica & podagrica, *ibid.* a miſcu cruento, II. 310. à plecthorâ, II. 311. a pure ex renibus exulceratis, II. 309. a ſanguinis ſtagnatione, II. 308. a ſero ſcurbutico, II. 309. a violentiâ externâ, *ibid.* & ſeq. prognôſis, II. 311. exempla ejus in vitæ ſanctariæ adducto, II. 316. diuturni funeſti, II. 313. a gonorrhœâ perverſe tractatâ, II. 315. ab elevatione oneris & terrore accedente gravioris, II. 314. a materiâ ſcurbuticâ purpureâ ori, *ibid.* ex ſpiciis vini abuſu funeſti, II. 316. quomodo tractandus ſi a ſanguinis ſtagnatione? II. 311. a materiâ acri humorum, *ibid.* & 312. & ſpiciatim a materiâ fonticali retrocedente, II. 312. cum miſcu cruento junctus quomodo ſopitendus? *ibid.* & quæ maxime in paroxymo conducant? II. 311. quæſtus in eo convenient anodyni, II. 313. clyſteres, II. 312. venæſectio, *ibid.* & quæ viæ viculiq; regimini tenendum? II. 311. nocent in eo diuretica, II. 312. & purgaria, *ibid.* ulcera quomodo ab urethræ exulceratione dignoſci poſſunt? III. 448. ex quibus ſignis pateant? III. 447. & ſeq.

Veficula ſellit ſitus, I. 62. ſtrutura. ibid.

VEſICATORIA quomodo parari debeant? III. 44. laudantur in apopleſia & capitis morbis, I. 318. II. 244. in aſthmate a materiâ podagrica retrogreſſâ, III. 104. aſthma ex repulſis achoribus tollunt, I. 336. laudantur in auditus viis, III. 242. catarrho ſulſcicativo morboſis ſuperveniente, II. 67. epiphorâ, III. 236. intermittentiū paroxyſmos ſolunt, I. 318. hippuradine diſcutiunt, *ibid.* utilia in rheumatismo, II. 323. ſingultu ab exanthematibus retrogreſſis, III. 126. quid de iis ſentiendum in convulſionibus, III. 32. 44. doloribus capitis, II. 250. epilepſiâ, III. 16. in ophthalmiâ, II. 167. morbus ſpatimodici vagis, III. 44. petechiæ ſæpe, II. 79. 82. & eorum in el hæmorrhagiis, II. 79. in phrenitide, II. 134. purpurâ, II. 71. ſoporosis adfectibus, III. 218. variolis? II. 55. nocent in manâ, III. 263. Vide *Cantharides*.

VEſPÆ punctio gangrenam parit, I. 250. punctura anocia ciet pathemata, I. 311.

VETERES cum recentioribus jungendi, I. 22. quid probi habeant? *ibid.* eorum lectio quatenus commendanda? I. 150.

VICTUS moderatus ſanitati conſert, I. 114. muſat ingerat, I. 97. ſimpliciffimus ſeine juvat, I. 137. qui inſalubris, I. 287. facit ad morbos epidemicos, I. 252. in hiſtoriis morborum enumerandos, I. 287. durius facit ad ſcurbutum. *ibid.*

VIEUSSENS. I. 20.

VIGILIA quid ſit & unde? I. 95. muſat pulſum, I. 368. diuturnæ cur corpori noceant? I. 95. emaciant, I. 126. abundanti vires, I. 129. eorum noxia, *ibid.* quibus inducantur? I. 95.

VILLANOVANUS (Arnoldus) I. 21.

VILLI inſeſtimorum gaudet tono, I. 64. eorum obſtructionem quid impediunt? *ibid.* quibus obſtruantur? *ibid.*

Villoſa tunica vaſculoſa & cellulôſa, I. 304. obſtructa diarrhœæ, I. 385. ſpatino affecta diarrhœæ cauſa, I. 304.

VIRGÆTOXICUM quale recondat principium, III. 126. quo caſu in ſingulis conveniat? *ibid.*

VIRUS, ejus diverſitas unde? II. 343. aquâ temperare bonum, I. 113. concoctionem pivat, *ibid.* nutritioni aptum non eſt I. 113. quodnam optimum *ibid.* ſenibus quod noceat I. 134. & ſeq.

eſt potiùs medicamentum quàm alimentum I. 113. lymphatum præſtat cereviſiâ, I. 257. Romaſcho laborantibus mane bibendum, I. 250. fortius ledit caput. I. 256. potens & generoſum morbis epidemiis averſendis aptum, I. 212. clyſtere injectum roborat. I. 467. immoderatius hauſtum quæ mala generet? I. 257. calidum veneno infectis commendatur, I. 201. vino nivem aut glaciem miſcere perniciôſum, I. 113. ejus potui deſicti cur præ aliis morbi exanthematici? I. 67. quomodo & quando noceat in corpore? II. 134. III. 45. quomodo inferat ebrietatem? III. 220. quale diſponat ad abortum, III. 179. ad apopleſiam, II. 242. artitridem, II. 317. podagram, II. 343. ſphacelum? III. 389. quale noceat in cholera, III. 175. convulſionibus, III. 27. epilepſiâ, III. 13. in evacuationibus criticis ſanguineis, II. 223. hypochoſtriaco malo, III. 73. malignis febribus, II. 91. melancholiâ & mania, III. 261. in miſcu cruento, III. 235. purpurâ, III. 405. uſſi, III. 114. veſicæ viis? II. 154. quatenus conveniat ad calculum præſervandum, II. 303. & malignas præcavendas? II. 87. 88. quale & quando conducit in calculo renali, II. 303. catarrhali benignâ, II. 46. hypochoſtriâ paffione, III. 72. ictero, III. 306. miſcu cruento, II. 235. ſcurbutum, III. 377. veſicæ morbis, II. 154. vomitu? III. 147. quid præſtat in animi deliquis, III. 273. in petechiali febre? II. 87. 91.

Vinum acido ſpirituſum quibus conveniat? I. 113. dulcia plecthoram inducunt, *ibid.* ſubagrio dulciſſimum quæ poriat damna? III. 26. *Hungaricum* quibus proſit vel noceat? I. 113. *Mofellana* & *Rhenana* alvum laxant, *ibid.* Rhenanum optimum alexipharmacum I. 204. *rubrum Gallicum*, ejus effectus, II. 174. *ſulphuratum* quas noxas inferat? III. 12.

Vini ſpiritus moderatus uſus probatur, I. 114. reſticticus ſebilis venenoſus, I. 198. optimum traumaticum, I. 447. clyſtere injectus inebriat, I. 468.

VIPERÆ decoctæ ſpecificum in cutis deſecationibus, I. 453. cum ipſis a veteribus in cutis adfectibus cura inſtituitur, III. 433. & quid de eſt ſentiendum? III. 434. earum pinguedo laudatur ad maculas oculorum, II. 169. & ſeq. ſpecificum in pelliculâ oculi, I. 453.

VIRÆ agendi in corporibus omnes ſunt conditionate & relative, I. 148. ad vitam & ſanitatē ſunt neceſſariæ, III. 267. & ſeq. ad eam multum faciunt, & ad morbos, I. 287. earum robur quid dicatur? III. 269. corpori ſolunt mortices, I. 323. unde dependent? *ibid.* & 420. earum cauſe manifeſtæ, I. 323. ex quo cognoscendæ? I. 420. in morbis conſiderandæ, I. 287. cum remediis efficacis comparandæ, I. 421. quibus rebus debentur? I. 245. naturalium defectus unde aſſumandus? I. 240. a copiâ ſanguinis quandoque depreſſæ præſtate malignitatem indicant, I. 289. 323. quomodo proſtrantur a terrore & iriſidia? III. 271. a putredine inſiſcēpâ, III. 395. a venenis & iurgantibus, III. 271. nanio venetis exercicio; III. 32. venæſectione immoderatâ, III. 29. à vigiliis aſſiduâ? III. 271. *dephe* quid indicent? II. 211. III. 269. unde oriuntur ut ſebre petechiali? II. 85. in fluore albo, III. 349. in vomitu cruento, II. 214. quomodo iis ſuccurrendum in malignis? III. 272. & quibus reſocilandæ? I. 450. in peſſilentia, II. 97. petechiali febre; II. 77. purpurâ, II. 71. III. 407. anæſteticis minus reſiciuntur, I. 444. clyſteribus reſocillantur. Vide *Robur*. iis deſicientibus decubitus corporis eſt utilis. I. 47.

VERILIS *ætas* quibus morbis patet? I. 308. qualis in ea pulsus? I. 368. ei commendanda medicocritia. I. 134.

VIRTUS *multiplicativa* in quo sita sit? I. 76.

Virtutes vera sanitatem stabiliunt. I. 102.

Vis classica succum nutritium apponit. I. 59.

VISCERA, eorum structuram qui declarent? I. 19. constitutio in morbis consideranda, I. 289. ex urina patet, I. 380. his læsis turbatur sanguificatio, I. 50. eorum corruptio in hæclicâ præstio est, I. 323. quibus cognoscatur lethalis? I. 394. quomodo accenda? I. 403. sphacelo correpta quæ habeant signa? I. 324.

Visceralia quæ sint? I. 445. & *seq.* quomodo agant? I. 446. variè sunt usû. *ibid.*

VISCIDUM non causa morborum universalis: I. 17.

VISUS, ejus organum oculus, I. 90. ejus sedes retina, I. 89. quomodo fiat? I. 90. ejus idea in mente quando excitetur? III. 228. & quid ad illum requiratur? *ibid.* ejus anisio ex dentium dolore, I. 236. hebetudo apud senes unde? I. 214. à spasmò nervi optici lædunt? I. 305. à vermibus perit, *ibidem.* ejus caliginis in hypochondriaco exemplum, III. 238. periodicæ calus, III. 236. exempla immisionis ex lippitudine ab incongrua diætâ orta, III. 237. ejus ex lippitudine cum paralytici & soporosis adfectibus complicatæ, III. 236. ejusdem ex suffusione enatæ, III. 239. clysteribus illustratur, I. 467.

VITA, ejus definitio, I. 30. 159. in quo consistat? III. 94. 396. est in ipso sanguine, I. 34. & mora mechanici sunt, I. 32. causa ejus cordis motus, I. 30. pathologie præcipuum fundamentum, I. 154. eam quæ prolongetur? I. 32. plantis improprie attribuitur, I. 30. genus quodlibet peculiaris alia morbus? I. 288. *desidia* incommoda; I. 125. *sedentaria* noxa, II. 269. III. 65. 350. 446. ad quos morbos disponat? I. 121. 125.

VITRIOLUM album specificum in epiphora, I. 453.

ULCERA quæ dicantur? III. 443. differunt ab abscessu, *ibid.* & I. 326. & *seq.* & osium carie, *ibid.* à sphacelo, III. 444. & inter le, III. 443. eorum sedes, *ibid.* causa proxima est putredo, III. 444. ex hæmorrhoidum suppressione, I. 343. varicellorum & morbillorum reliquia, I. 355. quæ signa si in ventriculo, I. 326. vesicâ, I. 327. prostratis? *ibidem.* quantum ad ea faciant abscessus, III. 444. contagium, III. 445. temperamentum, ætas, & victus, *ibid.* vicerum labe & morbi prægressi, III. 444. vulnera? *ibid.* serum sæpè utiliter evacuant I. 347. antiqua præposere consolidata varios gignunt morbos, I. 337. coeclintem, I. 348. præmaturnè consolidata quatenus inducant coma somnolentum, III. 211. guttam serenam, III. 229. palpitationem cordis, III. 86. phthisim, III. 287. tullien convulsivam, III. 110. 111. vomitum? III. 142. sponset oboia sæpè arthriticos & rheumaticos dolores solvunt, I. 320. prognosin III. 447. ejus mali moris in collo exemplum, III. 455. labii inferioris, III. 458. in mamma benigni casus, *ibid.* eorum consolidatio non nimis citò debet institui; III. 453. quomodo sananda per antimoniatæ & mercurialia, III. 449. aquas minerales & communem, *ibid.* fonticulos, III. 448. laxantia & purgantia, *ibid.* & venæsectionem? *ibid.* quomodo in succurrendum externis adstringentibus, III. 449. cataplasmatibus, *ibid.* & *seq.* leprosis & sarcois? *ibid.* Vide *Abfcessus*.

Ulcera cæcethica quæ dicantur III. 444. *canerosa* quæ sint? *ibidem.* Vide *Caner.* *carnea* quomodo tractanda? III. 449. *ferina* post variolas quomodo curata fuerint? II. 59. *nervosarum* &

tendinosarum partium quomodo tractanda? III. 450. *pedum* unde & cur difficiliora curationis? III. 333. *renum* quomodo se habeant? II. 147. vide *Caner.* *Scorbatica* differunt ratione subjechi, III. 380. & in quo differant a venereis? III. 414. & *seq.* *Scorbatica* erysipelacea quomodo tractanda? II. 101. *urethra*, vide *Urethra*. *Uteri*, vide *Uterus*.

UNGUMENTUM de *cerusa* ex quibus componatur? III. 436. laudatur in cutis adfectibus, *ibid.* nocet in erysipelate, II. 101. aliud ad epiphoram, III. 236. ad *echimas* in lepra, III. 442. ad scabiem, III. 441. ad tinea capitis. III. 436.

UNQUES cur & quid sint? I. 94. nigri cur mortis indicium? I. 150. eorum refectio infelix, I. 237.

UNICORNU animale & fossile absorbens, I. 428.

VOCABULA nihil significantia non possunt esse principium medicinæ. I. 23.

VOCIFERATIO augeat circulationem I. 47.

VOLATILIA pullum mutant. I. 369.

VOMICA pulmonum quid sit & quæ dicatur? I. 325. III. 285. quibus signis cognoscenda? I. 325. quomodo generetur? III. 285. & phthiseos causa existat? *ibid.*

VOMITUS qui dicatur? III. 139. quoduplex sit? III. 141. ejus historia, III. 139. matris excreta, diversitas, III. 140. sedes, *ibid.* subjechi, III. 142. ratio formalis, III. 141. symptomatum descriptio, *ibid.* salutaris sæpè excretio, I. 410. lætensibus proficius, *ibid.* quomodo succedat? I. 306. gracilibus non convenit, I. 130. periodicus unde? I. 186. symptomaticus & idiopathicus, I. 182. convulsionibus accensus, I. 305. quibus movendus? vide *Emetica*. quibus compendendus? I. 445. quemam potio vomitus bilioso diuturno conducatur? I. 472. & *seq.* sub frigore remittens, sub æstu ingravescentes quæ habent causam? II. 123. in variolis duplicem agnoscat causam, *ibid.* quomodo oriantur ab abstrusum qualitate, III. 142. & quantitate? *id.* bile in duodeno stagnante, *ibid.* à bile acri biliosus, I. 304. calculo? I. 353. III. 143. ex calculo quandoque lethalis, I. 353. quomodo oriatur ex capitis læsionibus & aliis externis causis? III. 144. à colicâ, hernia & ileo, III. 143. à spasmo ventriculi? I. 304. quomodo succedat? I. 306. inflammato ventriculo superveniens minus salutaris nature motus; I. 412. quomodo à vermibus? I. 235. III. 143. ab exanthematibus repulsis, III. 142. à pylori vicio, III. 143. à sanguine ad ventriculum delato, III. 142. à spasmo intestinorum, III. 143. aut ductuum biliariorum, eorumque aliò vicio, *ibid.* à ventriculi saburâ, III. 142. *acidissimus* unde? III. 67. *criticus* qui dicatur? III. 144. *niger* non semper à sanguine? III. 149. & quomodo experimentis ab altero possit distinguere? *ibid.* *meri sebaceus* in hypochondriaca unde? III. 64. an sub initio Carolinarum ulcus nocet? III. 71. causarum diagnosis, III. 144. & ad has directâ prognosin? *ibid.* exempla ejus post frequentem abortum continuè contingens, III. 188. à bile stagnante aborti, III. 149. post nimias alvi dejectiones enati, III. 148. *cachectici*, III. 147. ex duodeni angustia lethalis, III. 151. diuturni ex stonâ primarum viarum, III. 149. ejusdem à ventriculi debilitate post febrem adentem, III. 150. ab erysipelate retro pulso suborti, *ibid.* incongruè tractati lethalis casus; III. 148. cum curandi indicationes, III. 144. quibus mona ventriculi convulsiva per interna III. 145. & externa sopiendus? *ibid.* quomodo ab arthritide repressi tractandus? III. 147. quomodo biliosus, III. 145. à calculo? III. 146.

III. 146. in cholericâ febre quomodo compellendus? II. 119. quibus chronicis sopiendus? III. 146. quomodo sanandus febrilis, *ibid.* & febrilibus epidemicis accedens? II. 40. in gravidâ, III. 147. in hysterica, *ibid.* quomodo curandus ab æri materiâ & veneno inductus? III. 145. matutino tempore contingens, III. 146. & nocturnus, III. 145. à faburâ intersternorum, *ibid.* à sanguinis congestione, III. 146. à tussi convulsiva concitatus, *ibid.* in variolis, III. 53. & à ventriculi debilitate, III. 147. quando contra eum profint emetica? II. 62. III. 171. & *seq.* & quâ cautione roborantia & sedativa adhibenda? III. 146.

VOMITUS eructus qui dicatur? II. 212. in quo differat ab inflammatione ventriculi? II. 214. ab hæmoptysi, I. 296. ratione causarum differt, *ibid.* ejus typomata & signa, I. 296. 327. II. 214. sedes, II. 213. quomodo succedat? I. 301. 327. frequens gravidâ plethorica, II. 213. tenerioribus & malè menstruatis, *ibid.* parturiensibus, *ibid.* rarior pueris, I. 185. fit ex vasis brevibus, I. 327. ex hepatis & lienis viis, I. 320. 327. mensium suppressione, I. 340. & *seq.* & emansione, I. 341. eorumque cessatione II. 213. ex induratione fœcis post paralyfin funestus, I. 329. quomodo oriatur ab hæmorrhoidibus suppressis? II. 213. ab intermistentibus malè curatis? *ibid.* ex facili redit, II. 214. quando periculosus, *ibid.* & minus? *ibid.* exempla ejus in juvenicula curati, II. 215. moderati mensuris antecedentis, II. 217. ab emmenagogis calidis inducti casus, *ibid.* quibus sanandus internis, II. 214. & externis remediis? II. 215. perperam adstringentibus cohibetur? I. 447. quomodo tractandus à corrosivis remediis obortus, *ibid.* & mensuris suppressis? *ibid.* recursus quomodo arcedunt? *ibid.* morbo superato quale regimen conveniat? *ibid.* & quâ cautione anodynus & stupificus mercandus? *ibid.*

VORACITAS quibus familiaris? I. 115. facit masticationis neglectum, *ibid.* corpori onerosa, I. 185. imbecillibus familiaris, I. 247. sed noxia, I. 248.

VOX, ejus exercitia facilitatem conservant, I. 122. ventriculum juvant, *ibid.* quibus commendanda? *ibid.* clara crassius humores dissolvit, I. 260. intensio nimia nocet? I. 123. quibus maxime cavenda? *ibid.*

URETERES motu peristaltico præditi, I. 71. 304. spasmodici patent, I. 304. ab urina cum dolore distendantur, *ibid.*

URETRA, ejus tunica glandulosa, I. 72. ejus exulceratio quomodo à vesicæ erosione possit dignosci? III. 457. spasmus patiens facit stranguriam, I. 304. ejus exulceratio à gonorrhœâ indolentia quomodo tollenda? III. 362. & cur difficilior sit curatio? III. 457.

URINA quid? I. 68. quemam optima? I. 118. ejus examen, I. 68. 376. necessaria est inspectio, I. 71. in morbis inspicienda? I. 289. vide *Uremia*. excretorum præcipuum, I. 375. habet sal tartareum & ammoniacale & fixum, I. 69. subicit particule sulphureæ pingues, I. 69. ejus elementa, I. 376. proportio solida, *ibid.* color, unde? I. 70. 377. unde fiant colorationes? I. 254. quantitas unus diei, I. 376. inspirationem quantitate superat, I. 375. ex liquidis potissimum generatur, *ib.* ex potu non recipit solidum, I. 376. ex sanguine suscipit particulas sulphureas, I. 377. nec non crassiores fordes? I. 381. acida non datur, I. 69. cur facili putrefcat? I. 70. sæpè nullo infecta redditur, *ibid.* ureteres offendant quomodoque, I. 304. difficulter in scirrho vesicæ sed-

ditur, I. 329. qualis in calculo? I. 331. scorbutus, I. 379. ictero, *ibid.* lenibus? *ibid.* in inflammationibus mala, I. 378. quæ possit medicamenta? I. 380. ejus diversa ratio in petechizante epidemica, II. 80. & *seq.* ea in febre crudâ existente an cortex chinæ porrigi queat? II. 22. cum ardore excreta & turbida an semper inflammationem vesicæ indicet? II. 153.

URINA fluxus largior quoadque salutaris, I. 120. 259. 347. 410. largior fluxus mensuralis à Santorio observatus, I. 120. copiosa in scorbutica quid indicet? III. 371. copiosa in æstimate mælie ipsam solvens casus, III. 103. & *seq.* fluxus immodicus unde? I. 168. nimis diu fluens mala, I. 379. incontinentia à vermibus? I. 235. involuntarie cur fluit? I. 307. quæ eam moveant? I. 118. quæ rediant copiosiores? I. 70. supprimitur sæpè, I. 438. à spasmodis urinariorum ductuum, I. 304. à calculis, I. 236. retenta cur noxia? I. 71. 169.

URINA alba in hypochondriaci unde? I. 315. alba & turbida cum sedimento mucoso quid indicet? II. 308. aqua quibus in morbis? I. 377. unde? *ibid.* & *seq.* in febrilibus quid portendat? *ibid.* quæ possit medicamenta? I. 380. aqua & urina in hypochondriaci unde, III. 64. & calculo vesicæ laborantibus? II. 308. crassa morbis declinandis, I. 378. & *seq.* post febrium paroxysmum, *ibid.* crystalli rejecta ubi? *ibid.* lava ac crassa in ictero unde? III. 302. *purpurea* in vesicâ erosa, I. 380. num semper inflammationem vesicæ indicet? II. 155. quomodo ex spasmis fiat? *ibid.* jumentorum differt ab humana? I. 377. limpida unde? I. 70. ejus *nubecula* est dispositio ad sedimentum, II. 11. *oleosa* unde, & quid indicet? I. 379. *parca* in stranguâ, I. 380. *purpurea* in exulceratione renum & vesicæ, I. 379. quomodo sequatur abscissum mesenterii? II. 174. 177. *rufa* sine sedimento quæ & unde? I. 378. in inflammationibus mala *ibid.* quæ possit medicamenta I. 380. *subulsa* in nephride, I. 379. quæ requirit media? I. 380. *sanguinolenta* ubi & unde? *ibid.* vide *millus cruentus*; ejus *sedimentum* mucosum & glutinosum non semper pus est. II. 234. quid indicet? I. 378. nullum in febribus post paroxysmum malum *ibid.* *spissa* & *glutinea* ubi? I. 379. *tartara rejecta* unde? *ibid.* in dispositione ad calculum, *ibid.* quibus tractanda? I. 380. *tenuis* in omnibus spasmodicis morbis, I. 380. in paroxysmis febrium? I. 378. *turbida* & *crassa* in gonorrhœâ, I. 380. cur ea per se volatile oleum turbida reddatur? I. 371. & *seq.* *vaccina* interne utiliter bibitur, I. 377.

URINARI ductus motu peristaltico gaudent, I. 304. spasmus corriguntur, *ibidem.* atoniâ affecti ex urina crassâ dignoscuntur, I. 380.

UREMANTIA reprobata, I. 71. utilis ad dignoscendos & curandos morbos, *ibid.* abulsi obnoxia, I. 375.

UTERUS, ejus structura, III. 349. & ejus vasorum I. 73. copiosa constat vasis, I. 167. partibus nervosis non annumerandus, I. 316. ejus notitia anatomica in pathologicis utilis? I. 20. speciem ejus vasculosa & cellulosa structurâ consideratur, III. 178. ex quâ causâ in gravidis ita possit dilatari? *ibid.* à quo pari nervos suos accipiat? III. 26. magnum cum vesicâ urinariâ habet confectum, III. 52. ejus structura utilis? II. 162. proclivitas ad multos morbos, II. 156. III. 349. mutationes ab impregnatione subit, I. 78. sub partu quandoque rumpitur, I. 328. ex puerperio facile labem contrahit, I. 350. quas post partum subeunt mutationes? II. 157. & quomodo post ipsum aut abortum purgandus? II. 226. à sup-

pressis

pressis mensibus varia patitur mala, I. 341. non est fides mali hysterici, I. 316. ejus struclura causa fluxus mensium, I. 340. labefactus quibus fumendus? I. 446. ejus morbi curantur balneis, I. 465. nec non clysteribus. I. 467. cur ad polypos ingenerandos dispositus? III. 279. cuniculus sanguinis irregularis per eum quos pariat mirros? II. 162.

Uteri affectus I. 167. 168. 325. quibus signis cognoscatur? II. 157. apoplemate afficitur; I. 325. atenui afficitur, quid inde? I. 307. 320. ejus cancer quomodo contingat & se habeat? II. 157. ex quibus signis habeat? III. 447. unde oriatur, & quae pariat symptomata? II. 162. inde nati dolores quomodo tractandi? II. 160. ejus lethalis exemplum; II. 161. cancer exulceratur: quomodo cognoscendus & curandus? II. 160. ejus *chronica passiva* quomodo praecavenda? II. 162. in iis laudantur thermæ, II. 160. *contorsio* quae dicatur Hippocrati? II. 164. ea ejus *debilitate* varii morbi, I. 353. ejus *hemorrhagia* probe distinguenda; I. 296. quae periculosa & abortus nunciat? *ibid.* quae salutare? *ibid.* post abortum & partum ex uteri labe; I. 353. vide *Hæmorrhagia*. ejus *hydras* à polyphis, I. 330. vide *Hydras*. ejus *inflammatio* quibus signis cognoscatur? II. 156. quae levior, quae gravior sit? *ibid.* quomodo ab Aretæo describitur? *ibid.* lethalis in puerperis quibus cognoscenda? I. 395. cur & quomodo in puerperio oriatur? II. 156. & 158. quibus potissimum puerperis contingat? II. 157. quibus subjectis extra puerperium solemnis? *ibid.* ejus variae causæ; II. 156. quando abeat in scirrhum seu cancerum? II. 157. III. 447. in sphacelum seu suppurationem? II. 157. ejus post abortum ortæ & suppurae exemplum, II. 161. quomodo sit tractanda in puerperio? II. 159. si orta sit a causâ eâternâ, *ibid.* à fluore albo cohibito? *ibid.* quae convenient topica? *ibidem.* ejus post inflammationem suppurati scetio; II. 161. ejus *lesio* multos denarium post annos se prodit, II.

158. & seq. sæpè convulsiones excitat, II. 26. ex hæmorrhagiâ colubina producta; II. 161. *prolapsus* testore sanatus; I. 192. *stirrbum* contrahit, I. 329. *sphacelo* contipitur, I. 324. ejus *stilla* cum gravibus symptomatibus, II. 164. ejus facillimum exemplum, II. 228. materiz purulente ea illo excreta casus, III. 345. ejus *ulceris* cum metu canceri exemplum, III. 457. quomodo tractandum? II. 160. *impluvium* si à fluore albo proveniat? II. 159.

Uterina balnearum usus socianda. I. 464.

Uva cur bonum præbeant alimentum? I. 254.

VULNERA quomodo seipè fistularum causa exillat? III. 461. ulcerum? III. 444. vide *Lolesnes*.

Vulneraria quæ sint? I. 446. quomodo agant? I. 447. in longis quibuscumque morbis utilia, *ibid.* optimum spiritus vini. *ibid.*

Vulnerati faciliè syncope patiuntur. I. 33.

W.

W HARTONI merita. I. 19.

WILDUNGENSÆ æque pote arcent febres intermittentes, II. 13. podagram, II. 347. commendantur in cuis adlectus, III. 433. in nimio hæmorrhoidum fluxu, II. 221. malo hypochondriaco, III. 71. purpurâ scorbuticâ, III. 405. in rheumatismo scorbutico. II. 322.

WILLISUS, I. 21.

WURMSCHADE quid sit? III. 427.

Z.

Z INGIBER, an ejus usus digestionem promoveat? III. 412.

ZONA ignea erysipelatis species quæ dicatur? II. 99.

III. 426. ejus exempla ex auctoribus allegantur, II. 104. ejus à retentâ purpurâ subortæ casus, *ibid.* curatio. III. 435.

ZOSTER erysipelatis species quid dicatur? II. 99.

ZWINGERUS (Theodor.) I. 17.



F I N I S.

